EDITURA MEDICALĂ

Agenda Medicală 2005

Ediția de buzunar


Sănătatea
mai
presus
de orice
Grup
sanofi aventis
Sanatatea mai presus de orice

CLEXANE®

enoxaparin

THE LIFE PROTECTOR

Grup

sanofi aventis

Sănătatea mai presus de orice

S-a născut o speranță!

TRITACE

Ramipril

Tritace® este mai mult
decât un antihipertensiv.

Tritace® salvează vieți!

Grup
sanofi aventis
Sănătatea mai presus de orice

AGENDA MEDICALĂ
2005
– ediţia de buzunar –

EDITURA MEDICALĂ
Bucureşti, 2005

Coperta realizată de **SANOFI-AVENTIS**

© "Toate drepturile editoriale aparţin în exclusivitate Editurii Medicale. Publicaţia este marcă înregistrată a Editurii Medicale, fiind protejată integral de legislaţia internă şi internaţională. Orice valorificare a conţinutului în afara limitelor acestor legi şi a permisiunii editorilor este interzisă şi pasibilă de pedeapsă. Acest lucru este valabil pentru orice reproducere - integrală sau parţială, indiferent de mijloace (multiplicări, traduceri, microfilmări, transcrieri pe dischete etc.)"

ISBN 973-39-0533-x

Autor colaborator: Şef lucrări Dr. **SIMONA NEGREŞ**
U.M.F. „Carol Davila"
Facultatea de Farmacie,
Catedra de Farmacologie şi Farmacie Clinică

Redactor de carte: Dr. **Dan Radu RIZESCU**
Secretar de redacţie: **Maria-Elena NEAMŢ**
Colectiv redacţional: Dr. **Irina BELOIU**
Liliana PETRESCU
Corina GHINOIU
Bernadeta TRYBALSKI
Tehnoredactare computerizată: **Florina ALEXE**
Primavera PANAIT
Mihai ŞTEFĂNACHE

CE VĂ OFERĂ AGENDA MEDICALĂ 2005

1. Apariţiile noilor medicamente înregistrate şi intrate în uzul curent în ultima perioadă sunt evidenţiate cu denumirile comerciale şi monografiile aferente la denumirea comună internaţională (DCI) corespunzătoare.

2. Monografii generale, specifice Denumirii Comerciale Internaţionale, în ordine alfabetică aprobate şi utilizate oficial în România.

3. Denumiri comerciale de medicamente ale diverşilor producători corespunzătoare fiecărei Denumiri Comerciale Internaţionale (D.C.I.).

4. Date esenţiale necesare informării rapide asupra unui medicament:
    - Denumirea Comercială Internaţională
    - Denumirea Comercială
    - Producător
    - Indicaţii
    - Doze
    - Contraindicaţii (C.I.)
    - Reacţii adverse
    - Precauţii

5. Indicaţii asupra modului de prescriere conform Nomenclatorului de Medicamente şi produse biologice de uz uman elaborat de Agenţia Naţională de Medicamente.

6. Reactualizări de ultima oră privitoare la medicamentele intrate în uz în România.

7. Evidenţieri ale Suplimentelor Nutritive şi Produselor Cosmetico-Medicale aprobate pentru utilizarea largă.

GHID DE UTILIZARE AL AGENDEI MEDICALE 2005

Precizări:

- Monografiile se găsesc în ordinea alfabetică după Denumirea Comercială Internaţională (D.C.I.)
- Monografiile prezentate au un caracter general pentru a oferi informaţii imediate şi orientative. În cazul în care utilizaţi un anume produs comercial corespunzător unei D.C.I. consultaţi în special prospectul produsului comercial respectiv.
  Acordaţi mare atenţie diferenţelor existente între diferite produse comerciale în toţi parametrii (Doze, Indicaţii, Contraindicaţii, Reacţii adverse etc.) precum şi în funcţie de producător.
- În cazul în care nu sunteţi medic consultaţi înainte de orice utilizare a unui medicament medicul propriu.
- Datele prezentate nu suplinesc documentările exhaustive.

Cum folosiţi Agenda medicală 2005:

- Când cunoaşteţi Denumirea Comercială Internaţională a unui medicament
  - căutaţi fie:
    - în agendă la litera respectivă (ex.: **DICLOFENACUM** – pag. 221-225);
    - în indexul general unde este precizată pagina corespunzătoare medicamentului pe care îl căutaţi.
- Când cunoaşteţi denumirea comercială:
  - căutaţi în Indexul alfabetic general;
  - căutaţi pagina indicată.

LISTĂ PRESCURTĂRI

AI = atenţie
adm. = administrare
AINS = antiinflamatoare nesteroidiene
AVC = accident vascular cerebral
BAV = bloc atrio-ventricular
BHE = barieră hemato-encefalică
BPOC = bronhopneumopatie obstructivă cronică
C = medicament care beneficiază de compensare (C1, C2)
Cind = contraindicaţie
Cl. = clearance
clorh. = clorhidrat
Compz. = compoziţie
conc. = concentraţie g/g respectiv v/v
CPK = creatinfosfokinază
cpr. = comprimat / tabletă
cpr. div. = comprimat divizibil
cpr. eferv. = comprimat efervescent
cpr. film. = comprimat filmat
cpr. mast. = comprimat masticabil
cpr. ret. = comprimat retard
cpr. vag. = comprimat vaginal
cps. = capsulă
CSR = corticosuprarenală
ct. = cutie
DC = denumire comercială
DCI = denumire comună internaţională
dil. = diluat / diluţie
disp. = dispersabil
dj. = drajeu
Dz = doze şi mod de administrare
EC = enzimă de conversie
ECG = electro-cardiogramă
EEG = electro-encefalogramă
EPA = edem pulmonar acut
ext. = extern
extr. = extract
f. = fiolă
F.f. = formă farmaceutică
FA = fibrilaţie atrială
fl. = flacon
fl. inhal. = flacon inhalator
fl. pulb. inj. = flacon cu pulbere pt administrare injectabilă
G = medicament care beneficiază de gratuitate (G1, G2)
g. = gram
G-6-PDH = glucozo-6 fosfat dehidrogenază
Hb = hemoglobină
hidrocl. = hidrocloric
hTA = hipotensiune arterială

LISTĂ PRESCURTĂRI

A! = atenţie
adm. = administrare
AINS = antiinflamatoare nesteroidiene
AVC = accident vascular cerebral
BAV = bloc atrio-ventricular
BHE = barieră hemato-encefalică
BPOC = bronhopneumopatie obstructivă cronică
C = medicament care beneficiază de compensare (C1, C2)
Cind = contraindicaţie
Cl. = clearance
clorh. = clorhidrat
Compz. = compoziţie
conc. = concentraţie g/g respectiv v/v
CPK = creatinfosfokinază
cpr. = comprimat / tabletă
cpr. div. = comprimat divizibil
cpr. eferv. = comprimat efervescent
cpr. film. = comprimat filmat
cpr. mast. = comprimat masticabil
cpr. ret. = comprimat retard
cpr. vag. = comprimat vaginal
cps. = capsulă
CSR = corticosuprarenală
ct. = cutie
DC = denumire comercială
DCI = denumire comună internaţională
dil. = diluat / diluţie
disp. = dispersabil
dj. = drajeu
Dz = doze şi mod de administrare
EC = enzimă de conversie
ECG = electro-cardiogramă
EEG = electro-encefalogramă
EPA = edem pulmonar acut
ext. = extern
extr. = extract
f. = fiolă
F.f. = formă farmaceutică
FA = fibrilaţie atrială
fl. = flacon
fl. inhal. = flacon inhalator
fl. pulb. inj. = flacon cu pulbere pt administrare injectabilă
G = medicament care beneficiază de gratuitate (G1, G2)
g. = gram
G-6-PDH = glucozo-6 fosfat dehidrogenază
Hb = hemoglobină
hidrocl. = hidrocloric
hTA = hipotensiune arterială

Ht. = hematocrit
HTA = hipertensiune arterială
IC = insuficienţă cardiacă
ICA = insuficienţă cardiacă acută
ICC = insuficienţă cardiacă cronică
ICSR = insuficienţă corticosuprarenaliană
IEC = inhibitori de enzimă de conversie
IH = insuficienţă hepatică
IM = infarct miocardic
IMA = infarct miocardic acut
IMAO = inhibitori de monoaminooxidază
Ind = indicaţie
infl. = infiltraţie
inhal. = inhalator
inj. = injectabil(ă)
inj. i.a. = injectabil(ă) intraarterial
inj. i.artic. = injectabil(ă) intraarticular
inj. i.card. = injectabil(ă) intracardiac
inj. i.d. = injectabil(ă) intradermic
inj. i.m. = injectabil(ă) intramuscular
inj. i.v. = injectabil(ă) intravenos
inj. i.vag. = intravaginal
inj. s.c. = injectabil(ă) subcutan
int. = intern / oral / per os
inter. med. = interacţiuni medicamentoase
interv. chir. = intervenţie chirurgicală
i. rect. = intra rectal
IR = insuficienţă renală
IRA = insuficienţă renală acută
IRC = insuficienţă renală cronică
Kg = kilogram
LCR = lichid cefalo-rahidian
LED = lupus eritematos diseminat
LES = lupus eritematos sistemic
liof. = liofilizat
MAO = monoaminooxidază
max. = maxim
mcg = microgram = 10-6 g
mEq = miliechivalent gram
mens. = mensură
mg. = miligram
min. = minut
ml. = mililitru
mMol = milimol
mOsm = miliosmol
naz. = intranazal
nr. = număr
oft. = oftalmic
ORL = oto-rhino-laringologie
ott. = intraauricular
pag. = pagina
PAR = poliartrită reumatoidă
perf. = perfuzie(zabil)

pic. = picătură
pt. = pentru
pulb. = pulbere
RA = reacţie adversă
RAA = reumatism articular acut
rect. = intrarectal
ret. = retard
săpt. = săptămână
Sd. = sindrom
sist. = sistem
sl. = sublingual / perlingual
SNC = sistem nervos central
sol. = soluţie
sol. ext. = soluţie externă
sol. inj. = soluţie injectabilă
sol. int. = soluţie internă
sol. oft. = soluţie oftalmică
sol. ott. = soluţie auriculară
sol. perf. = soluţie perfuzabilă
sup. = supozitor
susp. = suspensie
TA = tensiune arterială
tbc = tuberculoză
TDDS = dispozitiv transdermic
trat. = tratament
tră = tinctură
TS = timp de sângerare
UI = unităţi internaţionale
ung. = unguent
UV = ultraviolet
vag. = intravaginal
vit. = vitamină

CUPRINS

SECŢIUNEA I

CE VĂ OFERĂ AGENDA MEDICALĂ 2005 3
GHID DE UTILIZARE A AGENDEI MEDICALE 2005 5
LISTĂ PRESCURTĂRI 6

SECŢIUNEA II

INDEX GENERAL 11

SECŢIUNEA III

MONOGRAFII ALE MEDICAMENTELOR ÎN ORDINEA DCI (DENUMIREA COMUNĂ INTERNAŢIONALĂ) 45

SECŢIUNEA IV

MONOGRAFII – COMBINAŢII 613

SECŢIUNEA V

MONOGRAFII – DIVERSE 841

SECŢIUNEA VI

MONOGRAFII – PRODUSE NATURALE/PRODUSE HOMEOPATE .. 855

SECŢIUNEA VII

MONOGRAFII – PREPARATE ŞI SUBSTITUENŢI DE SÂNGE ... 881

SECŢIUNEA VIII

MONOGRAFII – PRODUSE BIOLOGICE DE UZ UMAN (VACCINURI, SERURI, IMUNOMODULATORI) 907

SECŢIUNEA IX

MONOGRAFII – PRODUSE PENTRU DIALIZĂ 947

SECŢIUNEA X

VARIA

PRODUSE STOMATOLOGICE 959
SUPLIMENTE NUTRITIVE 961
PRODUSE COSMETICE 969

SECŢIUNEA XI

ADRESE ŞI TELEFOANE UTILE – PRODUCĂTORI ŞI REPREZENTANŢI AI FIRMEOLOR DE MEDICAMENTE 977

INDEX GENERAL

5 FU „LEDERLE" 288
5-FLUOROURACIL „EBEWE" 288
A.T. 10® 230
ABACAVIRUM 47
ABAKTAL 472
ABCIXIMABUM 47
ABITREXATE 403
ACARBOSUM 48
ACC INJECT 51
ACC® 100 51
ACC® 200 51
ACCUPRO® 5 513
ACCUPRO® 10 513
ACCUPRO® 20 513
ACECLOFEN 615
ACEMETACINUM 49
ACENOCUMAROL 49
ACENOCUMAROLUM 49
ACENOSIN 616
ACESIL 54
ACESIL T 54
ACETAZOLAMIDUM 50
ACETILCISTEINĂ 200 mg 51
ACETYLCHOLINII CHLORIDUM 50
ACETYLCYSTEINUM 51
ACICLOVIR 52
ACICLOVIR 200 mg 52
ACICLOVIR 400 mg 52
ACICLOVIR 5% 52
ACICLOVIRUM 52
ACID ACETILSALICILIC 54
ACID ACETILSALICILIC 100 mg 54
ACID ACETILSALICILIC 500 mg 54
ACID ACETILSALICILIC TAMPONAT 54
ACID FOLIC 61
ACID NALIDIXIC 67
ACID NICOTINIC 68
Acidum Acetylsalycilicum 54
ACIDUM ALENDRONICUM 56
ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM) 57
ACIDUM ASCORBICUM 58
ACIDUM AZELAICUM 59
ACIDUM CLODRONICUM 59
ACIDUM CROMOGLICICUM 60
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM 61
ACIDUM FOLICUM 61
ACIDUM FUSIDICUM 62
ACIDUM GADOBENICUM 62
ACIDUM GADOPENTETICUM 63
ACIDUM GLICIRIZINICUM 64
ACIDUM IBANDRONICUM 65
ACIDUM MEFENAMICUM 67
ACIDUM NALIDIXICUM 67
ACIDUM NICOTINICUM 68
ACIDUM NIFLUMICUM 68
ACIDUM PAMIDRONICUM 69
ACIDUM RISEDRONICUM 70
ACIDUM SALICYLICUM 71
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 71
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU) 72
ACIDUM ZOLEDRONICUM 73
ACIFOL® 61
ACIPIMOXUM 74
ACITRETINUM 74
ACT – HIB 909
ACTIFED 616
ACTILYSE 84
ACTIVELLE 616
ACTONEL® 5 mg 70
ACTONEL® 30 mg 70
ACTOS® 483
ACTOVEGIN DRAJEE FORTE 843
ACTOVEGIN 20% gel 844
ACTOVEGIN 20% GEL OCULAR 844
ACTOVEGIN 5% cremă 843
ACTOVEGIN 5% unguent 843
ACTOVEGIN FIOLE 843
ACTRAPID HM 337
ACTRAPID HM 337
ACTRAPID INNOLET 337
ACTRAPID® HM 337
ACTRAPID® HM PENFILL 338
ACTRAPID® NOVOLET 338
ADALAT CR 20 442
ADALAT CR 30 442
ADALAT CR 60 442
ADALAT RETARD 442
ADDAMEL N 617
ADENOCOR 75
ADENOSINUM 75
ADENOSTOP 857
ADIPIODONUM MEGLUMINUM 76
ADIURETIN® 214
ADIURETIN® SD 214
ADOL 469
ADRENALINĂ 255
ADRENOSTAZIN 146
ADRIBLASTINA CS 10 mg 242
ADRIBLASTINA CS 50 mg 242
ADRIBLASTINA PFS 243
ADRIBLASTINA RD 243
ADRIBLASTINA RD 50 mg 243
ADRIBLASTINA® PFS 10 mg/5 ml 243
ADRIBLASTINA® PFS 50 mg/25 ml 243
ADULT MELTUS 316
ADVANTAN 407
ADVANTAN® MILK 407
ADVIL COLD® 617
ADVIL® 327
AERIUS 213, 214
AERODIN 941
AETHEROLEA 76
AFACORT 618
AFLEN 591
AFRIN® 465
AFTOLIZOL 857

AGALSIDASUM ALFA 76
AGAPURIN 600 RETARD 476
AGAPURIN R RETARD 476
AGENERASE® 101
AGGRASTAT 579
AIROL® 588
AIROL® cremă 588
AIRONYL 565
AKINETON 122
AKNEMYCIN-PLUS 618
ALBENDAZOLUM 77
ALBENDOL 77
ALBUMINĂ UMANĂ 20% 883
ALCAINE 503
ALCON CILOXAN 182
ALDACTONE 546
ALDACTONE® 546
ALDARA® 5% 334
ALDECIN INHALER 113
ALDIZEM 230
ALDOLOR 469
ALEMTUZUMABUM 78
ALERID 169
ALERID 10 mg 169
ALEXAN® 207
ALFACALCIDOLUM 79
ALFLUTOP 845
ALFOGEL 618
ALFUZOSINUM 80
ALGOCALMIN 400
ALGOCALMIN 1000 mg/2 ml 400
ALGOCALMIN 500 400
ALGOCALMIN SAN 500 g 400
ALGOMIN 619
ALGOSTOP 619
ALGOZONE 400
ALILESTRENOL 82
ALKA SELTZER "ZITRONEN" 620
ALKA-SELTZER® 55
ALKERAN 394
ALLERGODIL NASEN SPRAY 110
ALLERGODIL SOLUŢIE® 109
ALLERGODIL TABS 110
ALLOPURINOL 81
ALLOPURINOLUM 81
ALLYLESTRENOLUM 82
ALMAGEL 620
ALMAGEL A 620
ALMIRAL 221
ALMIRAL 25 221
ALMIRAL 50 221
ALOMIDE 380
ALOPEXY 414
ALPHA D_3 79
ALPHACAINE-N 620
ALPHACAINE-SP 621
ALPRAZOLAM 82
ALPRAZOLAMUM 82
ALPRAZOLAMUM LPH® 82
ALPROSTADILUM 83
ALS-SOTALOL 544
ALS-ZOPICLON 610
ALTEPLASUM 84
ALTIAZEM® RR 230
ALTRAMET 178
ALTRAMET 300 178
AMANTADINUM 85
AMARYL® 310
AMBAZONUM 86
AMBOLAR 86
AMBROHEXAL 86
AMBROXOL 86
AMBROXOL AL PICĂTURI 86
AMBROXOL AL SIROP 86
AMBROXOL CLORHIDRAT 30 mg 86
AMBROXOL Q 86
AMBROXOLUM 86
AMFEPRAMONUM 87
AMIFOSTINUM 88
AMIKACINUM 89
AMIKIN 89
AMIKOZIT 89
AMINOFILIN 100 mg 90
AMINOFILINA 90
AMINOFILINĂ 100 mg 91
AMINOFILINĂ 200 mg 91
AMINOGLUTETHIMIDUM 90
AMINOMIX 1 621
AMINOMIX 2 622
AMINOMIX 3 623
AMINOPHYLLINUM 90
AMINOPHYLLINUM RETARD 91
AMINOPLASMAL -5%E, -10%E 623
AMINOPLASMAL HEPA 10% 624
AMINOSOL KE 624
AMINOSOL L 600 624
AMINOSOL L 800 624
AMINOSTERIL KE 625
AMINOSTERIL KE NEPHRO 625
AMINOSTERIL N-HEPA 8% 625
AMINOSTERIL® KE 10% CU ELECTROLIŢI ŞI FĂRĂ CARBOHIDRAŢI 626
AMINOSTERIL® KE 10% FĂRĂ ELECTROLIŢI ŞI FĂRĂ CARBOHIDRAŢI 626
AMINOVEN 3,5% GLUCOZĂ/ELECTROLIŢI 627
AMINOVEN 5% 628
AMINOVEN INFANT 10% 630
AMINOVEN® 10% 629
AMINOVEN® 15% 629
AMIODARONĂ 91
AMIODARONĂ LPH® 200 mg 91
AMIODARONE 200 mg 91
AMIODARONE-RIVO 200 91
AMIODARONUM 91
AMIOKORDIN 91
AMISULPRIDUM 92
AMITAL 200 94
AMITRIPTILIN 25 R. DESITIN 93
AMITRIPTILIN 50 R. DESITIN 93
AMITRIPTILIN 75 R. DESITIN 93
AMITRIPTILINĂ 93
AMITRIPTYLINUM 93
AMLODIPINUM 94
AMLOHEXAL 10 86
AMLOHEXAL 5 86
AMOBARBITAL 94
AMOBARBITALUM 94
AMOKLAVIN 96
AMOKSIKLAV 96
AMOXICILINĂ 94
AMOXICILINĂ 125 95
AMOXICILINĂ 250 95
AMOXICILINĂ 250 mg 95
AMOXICILINĂ 500 mg 95
AMOXICILINĂ FORTE 500 mg 95
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM 96

AMOXICILLINUM 94
AMOXIFARM 95
AMOXIKLAV 2x 96
AMOXIKLAV FORTE 96
AMPEN 98
AMPICILINĂ 98
AMPICILINĂ 250 98
AMPICILINĂ 250 mg 98
AMPICILINĂ 500 mg 98
AMPICILINĂ 1 g 98
AMPICILINĂ FORTE 98
AMPICILINĂ PLUS 750 mg 100
AMPICILINĂ PLUS 1,5 g 100
AMPICILLINUM 98
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMĂ 100
AMPICLOX 630
AMPIDAR 98
AMPIPLUS® 100
AMPISID 100
AMPISID 554
AMPRENAVIRUM 101
AMRASE 631
ANAFRANIL 192
ANALGIN 400
ANALGIN 500 mg 400
ANASTROZOLUM 101
ANATOXINĂ STAFILOCOCICĂ PURIFICATĂ ŞI CONCENTRATĂ 909
ANATOXINĂ STREPTOCOCICĂ 909
ANAXERYL 631
ANDROCUR 206
ANEXATE 285
ANGHIROL® 857
ANGIOPENT 400 EP 476
ANGIOPENT 600 EP 476
ANSILAN 391
ANTALCOL 236
ANTALGIC 631
ANTALGIC-P 632
ANTIBIOPTAL 632
ANTIDIAREICE 857
ANTIDOL 327
ANTIFLEBITIC MK 632
ANTIFOLAN 2,5 mg 403
ANTIFOLAN 50 mg 403
ANTIGAST 633
ANTIGRIPAL 633
ANTIGRIPAL PC 633
ANTIHAEMOPHILI C FACTOR 883
ANTINEVRALGIC P 634
ANTITHROMBIN III IMMUNO 884
ANXETIN 289
ANZEMET® 12,5 mg/0,625 ml 238
ANZEMET® 100 mg/5 ml 238
ANZEMET® 200 mg 238
APĂ DISTILATĂ 845
A-PARKIN 85
APICARPIN 482
APITROPIN 108
Apomorfinum 102
APROTININUM 102
APROVEL® 351
APROVEL® 150 mg 351
APROVEL® 300 mg 351
ARAVA 368
ARCOXIA® 60 mg 271
ARCOXIA® 90 mg 271
ARCOXIA® 120 mg 271
ARDINEX 634
ARDUAN 483
AREDIA 69
ARGININĂ – SORBITOL 634
ARGININUM 103
ARICEPT 239
ARIMIDEX 101
ARISTIN-C 182
ARLEVERT 635
ARMON 858
ARNETIN 515
AROMASIN® 273
ARTHREX CELLUGEL 221
ARTHROTEC 635
ARTHROTEC 75 636
ARUTIMOL 577
ASALINE 500 55
ASAprin 160® 55
ASAprin 500® 55
ASAprin T® 55
ASCOFER 636
ASCOLECITIN® 636
ASCOVIT 100 58
ASCOVIT 200 58
ASDILT 231
ASKINE 637
ASLAVITAL 637
ASMANEX TWISTHALER 200 µg 418
ASMANEX TWISTHALER 400 µg 418
ASMOFUG® 638
ASORIAN 638
ASPACARDIN 638
ASPACO EEL 639
ASPACORD 639
ASPACORD + COENZIMA Q10 640
ASPARAGINASE 5000 MEDAC 103
ASPARAGINASE 10000 MEDAC 103
ASPARAGINAZUM 103
ASPATOFORT 640
ASPAVIM 640
ASPENTER 75 mg 55
ASPENTER 325 mg 55
ASPICALCIC 55
ASPIKAM 55
ASPIMAX 55
ASPIRIN 100 cpr. 55
ASPIRIN 500 cpr. 55
ASPIRIN 100 mg 55
ASPIRIN DIREKT 55
ASPIRIN PLUS C® 640
ASPIRIN® PROTECT 55
ASTEMIZOL 104
ASTEMIZOLUM 104
ASTMOPENT 458
ASTONIN-H 284
ATACAND 141
atazanavirum 104
ATECOR 105
ATENOCOR 50 105
ATENOCOR 100 105
ATENOLOL 105
ATENOLOL 50 mg 105
ATENOLOL 100 mg 105
ATENOLOLUM 105
ATENOVA 106
ATORVASTATINUM 106
ATRACURIUM 107
ATRICAN 250 562

ATROPINUM 108
ATROVENT® 350
ATROVENT® METERED DOSE INHALER 350
ATROVENT® NAZAL 0,03% 350
ATROVENT® NAZAL 0,06% 350
AUGMENTIN 96
AUGMENTIN 1 g 96
AUGMENTIN 375 96
AUGMENTIN 625 96
AUGMENTIN BIS 96
AUGMENTIN INTRAVENOS 1,2 g 96
AUGMENTIN INTRAVENOS 2,2 g 96
AUGMENTIN INTRAVENOS 600 mg 96
AULIN 100 TABLETE 444
AULIN 100 444
AULIN 100 GRANULE 444
AULIN® 100 mg 444
AURONAL 2,5 mg 275
AURONAL 5 mg 275
AURONAL 10 mg 275
AVANDIA® 1 mg; 2 mg 528
AVANDIA® 4 mg; 8 mg 528
AVAXIM ADULT 910
AVELOX 422
AVERTIN® 6 mg 118
AVODART® 247
AVONEX 346
AXETINE 166
AXID 448
AXID 449
AXYCEF 125 mg 166
AXYCEF 125 mg/5 ml 166
AXYCEF 250 mg 166
AXYCEF 500 mg 166
AZAPENTACEN POLISULFONAT DE SODIU 108
AZATHIOPRINUM 109
AZECTOL 106
AZELASTINUM 109
AZITROMOCINĂ 250 mg 110
AZITROMOCINĂ 500 mg 110
AZITROMYCINUM 110
AZITROX 250 110
AZITROX 500 110
AZMACORT INHALER 589
AZOPT 125

B
BABY DRINK 858
BABYNOS 858
BACLOFEN AWD 10 111
BACLOFEN AWD 25 111
BACLOFENUM 111
BACTRIM 551
BACTRIM FORTE 551
BACTROBAN 423
BAMBEC 112
BAMBUTEROLUM 112
BANEOCIN 641
BARAKA 858
BARII SULFAS 112
BASILIXIMABUM 112
BATRAFEN 176
BAYMYCARD® 5/10 445
BCG - MEDAC 641
BECLOCORT FORTE 113
BECLOCORT MITE 113
BECLOFORTE INHALER 113
BECLOMET EASYHALER 113
BECLOMETASONUM 113
BECONASE NASAL SPRAY 113
BECOTIDE 50 INHALER 113
BELMAZOL 455
BELOMET 179
BEMAGNUM FORTE 643
BENAZEPRILUM 114
BENCYCLANUM 115
BEN-GAY EXTRA STRENGTH SPORTS® 643
BEN-GAY GREASESALESS® 643
Benzalkonii Chloridum 115
BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM 115
BENZOAT DE BENZIL MK CREMĂ 845
benzydaminum 116
BENZYLPENICILLINUM 116
BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 117
BEPANTHEN 217
BERES PLUS 845
BERIATE P 884
BERIGLOBIN P 885
BERININ P 600 UI 886
BERIPLAST HS COMBI SET 886
BERIRAB P 887
BERLICORT 589
BERLOCID 240 551
BERLOCID 960 551
BEROCCA CALCIUM ŞI MAGNESIUM 644
BERODUAL 644
BERODUAL N® 644
BETABIOPTAL 645
BETACORTEN SCALP APPLICAT 118
BETADERM 118
BETADINE® ovule vaginale 491
BETADINE® săpun chirurgical 492
BETADINE® soluţie 491
BETADINE® unguent 491
BETAFERON® 347
BETAHISTINUM 118
BETALOC 408
BETALOC ZOK 408
BETAMETHASONUM 118
BETAPROL 100 408
BETAPROL 50 408
BETAPROL 100 408
BETASERC 118
BETASTIN 118
BETAXOLOL 120
BETAXOLOLUM 120
BETOPTIC 120
BETOPTIC-S 120
BEXTRA 596, 597
BEZAFIBRATUM 121
BEZALIP RETARD 121
BIAFINE 590
BIAZOL 1% 122
BICALUTAMIDUM 121
BICARBONAT DE SODIU 8,4% 541
BICOLAX 123
BIFONAZOLUM 122
BILICHOL 646
BILOBIL® 307
BIO-BILOBA 646
BIO-CALCIU + D_3 + MAGNEZIU + SILICIU 647
BIO-CAROTEN + E 647
BIO-CHROM-FTG 647
BIO-CLA 1000 648
BIOCLAVID 96
BIOCRON MELATONIN 648

BIO-C-ZINC 647
BIODROXIL-500 153
BIO-FIBER 648
BIO-GLADIN 648
BIOLON 542
BIO-MAGNEZIU 649
BIO-MARIN PLUS 649
BIO-MELATONINĂ 393
BIO-MELATONINĂ 649
BIO-MULTI 650
BIOPAROX® 301
BIORINIL 645
BIORINIL 650
BIO-SELENIU + ZINC 650
BIO-SILUET 650
BI-PENICILLIN 646
BIPERIDENUM 122
BISACODIL 123
BISACODYLUM 123
BISEPTOL 551
BISEPTOL 551
BISEPTOL 480 551
BISEPTRIM 651
BISEPTRIN 552
BISMUTH SUBSALICYLATE 123
BISMUTHI SUBCITRAS COLLOIDAL 124
BISOGAMMA® 5 124
BISOGAMMA® 10 124
BISOLVON® 127
BISOPROLOLUM 124
BIVACYN 652
BIXTONIM 653
BLEOCIN 125
BLEOMYCINUM SULFAS 125
BLEXON 552
BLOCOTENOL 100 mg 106
BLOCOTENOL 50 mg 106
BLOXAN 408
BOICIL FORTE 859
BONDRONAT 65
BONEFOS 59
BONEFOS 60 mg/ml 59
BONEFOS 800 59
BOROCARPIN-S 482
BRAINAL 444
BRASAN 846
BRICANYL 565
BRICANYL TURBUHALER 565
BRINERDIN 653
BRINZOLAMIDUM 125
BROMAZEPAM 1,5 mg 126
BROMAZEPAM 3 mg 126
BROMAZEPAM LPH® 126
BROMAZEPAMUM 126
BROMCRIPTIN 128
BROMCRIPTINA DOROM 5 mg, 10 mg 128
BROMHEXIN 127
BROMHEXIN 10 BC 127
BROMHEXIN 12 127
BROMHEXIN 12 BC 127
BROMHEXIN 12 mg 127
BROMHEXIN 8 127
BROMHEXIN 8 mg 127
BROMHEXIN CLORHIDRAT 127
BROMHEXIN EEL 127
BROMHEXINUM 127
BROMOCRIPTINUM 128
BRONCHICUM ECHINACEA 859
BRONCHICUM ELIXIR 859
BRONCHICUM HUSTENSIRUP 860
BRONCHO-VAXOM ADULŢI/CHILDREN 910
BRONHODIN NEDILUAT ŞI DILUAT 1/10, 1/100, 1/1 000,1/10 000 942
BRONHOSOLVIN 0,2% 127
BRONILIDE 285
BRULAMYCIN 580
BRUXICAM 0,5% 488
BUDENOFALK® 129
BUDESONIDUM 129
BUFLOMEDILUM 130
BUFORMINUM 130
BUPIVACAINĂ 25 mg 131
BUPIVACAINĂ 50 mg 131
BUPIVACAINE SPINAL 131
BUPIVACAINUM 131
BUPROPIONUM 132
BUSCOPAN 135
BUSCOREM 135
BUSERELINUM 132
BUSPAR 133
BUSPIRONUM 133
BUSULFANUM 133
BUTAMIRATUM 134
BUTORPHANOLUM 134
BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM 135
BYOL 10 mg 124
BYOL 5 mg 124

C
CABASER 136
CABERGOLINUM 136
CAELYX 243
CALCICHEW ORANGE FLAVOUR 136
CALCII CARBONAS 136
CALCII CHLORIDUM 137
CALCII DOBESILAS 137
CALCII FOLINAS 137
CALCII GLUBIONAS 138
CALCII GLUCONAS 139
CALCII GLUCONOLACTAS 139
CALCII LACTAS 139
CALCIJEX 1 μg sau 2 μg/ml 141
CALCIPARINE® 319
CALCIPOTRIOLUM 139
CALCITONINA HUBBER NASAL 140
CALCITONINUM 140
CALCITRIOLUM 141
CALCIU 136
CALCIU ŞI MAGNEZIU 655
CALCIU CU VITAMINA D 654
CALCIU EFERVESCENT 200 139
CALCIU LACTIC 139
CALCIU MAGNEZIU CU VITAMINA D 654
CALCIU MAGNEZIU ZINC 655
CALCIU-D$_3$ Comprimate masticabile 654
CALCIUM EFF. INSTANT 655
CALCIUM FOLINAT 137
CALCIUM FORTE 500 138
CALCIUM FROM OYSTER SHELL 656
CALCIUM PHARCO 138
CALCIUM SANDOZ 656
CALCIUM SANDOZ + VIT. C 1000 656
CALCIUM SANDOZ R FORTE 656
CAL-C-VITA 653
CALGEL 657
CALMA FORTE 657

CALMANT FORTE 657
CALMEPAM® 126
CALMOFLUID T 657
CALMOGEN 657
CALMOPYROL 488
CALPOL® ŞASE PLUS SUSPENSIE 469
CALPOL® SUSPENSIE PT. COPII MICI 469
CALYPSOL 360
CAMPTO 352
CANCIDAS® 50 mg 151
CANCIDAS® 70 mg 151
CANDESARTANUM CILEXETIL 141
CANESTEN HC 658
CANESTEN® GYN 3 195
CANTASTIM 942
CAPD/DPCA 2 950
CAPD/DPCA 2 A.N.D.Y. - PLUS® 949
CAPD/DPCA 2 STAY SAFE® 949
CAPD/DPCA 3 950
CAPD/DPCA 3 A.N.D.Y. - PLUS® 949
CAPD/DPCA 3 STAY SAFE® 949
CAPD/DPCA 4 950
CAPD/DPCA 4 A.N.D.Y. - PLUS® 949
CAPD/DPCA 4 STAY SAFE® 949
CAPECITABINUM 142
CAPOCARD® 143
CAPTOPRIL 143
CAPTOPRIL 12,5 mg 143
CAPTOPRIL 25 mg 143
CAPTOPRIL 50 mg 143
CAPTOPRIL LPH® 25 mg 143
CAPTOPRIL LPH® 50 mg 143
CAPTOPRIL 100 mg 143
CAPTOPRILUM 143
CAPTOSPES H 658
CARBACHOLUM 144
CARBAMAZEPIN 144
CARBAMAZEPIN EEL 144
CARBAMAZEPINA 144
CARBAMAZEPINĂ 200 144
CARBAMAZEPINA 200 mg 144
CARBAMAZEPINE 144
CARBAMAZEPINUM 144
CARBAVIM 145
CARBAZOCHROMI SALICYLAS 146
CARBENICILINĂ 147
CARBENICILLINUM 147
CARBEPSIL 200, 400 145
CARBIMAZOLE 5 147
CARBIMAZOLUM 147
CARBO MEDICINALIS 147
CARBO MEDICINALIS 147
CARBOCISTEINA 148
CARBOCISTEINUM 148
CARBONAT DE LITIU 380
CARBOPLATIN 148
CARBOPLATIN SINDAN 50 149
CARBOPLATIN SINDAN 450 149
CARBOPLATINE "EBEWE" 149
CARBOPLATINUM 148
CARDIOVIT 658
CARDIOXANE® 218
CARDURA 241
CARDURA XL 4 mg 241
CARDURA XL 8 mg 241
CARGOSIL 52
CARMOL 659
CARNIL 149
CARNITENE 149
CARNITINUM 149
CARPICON 860
CARSIL 539
CARTEOL 150
CARTEOLOLUM 150
CARVEDILOLUM 150
CASLAX 860
CASODEX 121
CASPOFUNGIN® MSD 50 mg 151
CASPOFUNGIN® MSD 70 mg 151
CASPOFUNGINUM 151
CATHEJELL CU LIDOCAINĂ 659
CAVERJECT 83
CAVINTON 605
CAVINTON FORTE 605
CAVIT 659
CAVIT 9 FORTE 659
CAVIT JUNIOR 659
CEBION 1 g BLUTORANGE 58
CEBION 1 g CITRUS 58
CEBION® PLUS 659
CEBION® PLUS VITAMIN C CALCIUM 660
CEBION® PLUS VITAMIN C MAGNEZIUM 660
CEC 152
CEC® FORTE 152
CEC® FORTE 63 g 152
CECLODYNE® 152
CECLODYNE® 125 mg/5 ml 152
CECLODYNE® 250 mg 152
CECLODYNE® 250 mg/5 ml 152
CECLODYNE® 500 mg 152
CECLODYNE® FORTE 500 mg 152
CECLOR® 152
CECLOR® MR 152
CEDAX 164
CEDOVIX UNGUENT 860
CEDROX 153
CEFACLOR 152, 153
CEFACLOR „BIOCHEMIE" 153
CEFACLOR 250 mg 153
CEFACLORUM 152
CEFADROXIL 250 mg 153
CEFADROXIL 500 mg 153
CEFADROXILUM 153
CEFAKLOR 153
CEFALEXIN 154
CEFALEXINĂ 155
CEFALEXINE 155
CEFALEXINUM 154
CEFALIN 155
CEFALOTINĂ 156
CEFALOTINUM 156
CEFAMANDOLUM 156
CEFANTRAL 161
CEFATRIZINUM 157
CEFAZOLIN "SANDOZ" 157
CEFAZOLINĂ 157
CEFAZOLINUM 157
CEFEPIMUM 158
CEFIXIMUM 158
CEFOBID 160
CEFONICIDUM 159
CEFOPERAZONUM 160
CEFORT® 164
CEFOTAX 161
CEFOTAX T3A 161
CEFOTAXIM 161

CEFOTAXIME 161
CEFOTAXIMUM 161
CEFOTRIX 1 g 165
CEFOZON 160
CEFPIRONUM 162
CEFPROZILUM 162
CEFROM 162
CEFTAMIL® 163
CEFTAZIDIMUM 163
CEFTIBUTENUM 164
CEFTIDIN 1 g 163
CEFTRIAXON 1 g 165
CEFTRIAXON 2 g 165
CEFTRIAXON 250 mg 165
CEFTRIAXON 500 mg 165
CEFTRIAXONE/GENEFHARM 1 g 165
CEFTRIAXONUM 164
CEFUROXIM 166
CEFUROXIMA 166
CEFUROXIME "SANDOZ" 166
CEFUROXIME PANPHARMA 166
CEFUROXIMUM 166
CEFZIL 125 mg/5 ml 162
CEFZIL 250 mg 162
CEFZIL 250 mg/5 ml 162
CEFZIL 500 mg 162
CELEBREX 100 mg 167
CELEBREX 200 mg 167
CELEBRYL 485
CELECOXIBUM 167
CELESTONE 118
CELIPRES 168
CELIPROL® 100 168
CELIPROL® 200 168
CELIPROLOLUM 168
CELLCEPT 250 mg 423
CELLCEPT 500 mg 423
CELLCEPT 1 g/5 ml 423
CENTRUM DE LA A LA ZINC 660
CENTRUM SILVER 660
CEOLAT 539
CEPHALEXIN 155
CEPHYL 875
CEREBRAL 179
CEREBROLYSIN 846
CERETEC 272
CEREZYME 332
CERUCAL 407
CERVIRON 661
CERVUGID 661
CESOL® 494
CETAZIME 1 g 163
CETAZIME 2 g 163
CETEBE® 58
CETIRIZINUM 169
CETRIMIDE 170
CETRIMIDUM 170
CETRINE 169
CETRORELIXUM 170
CETROTIDE 170
CEVINOLON 52
CEVITIL 58
CEXYL 154
CEXYL 1 g 154
C-FILM LUCCHINI 450
CHILDREN'S TYLENOL 469
CHINIDINA 200 mg 171
CHINIDINĂ EEL 171
CHINIDINĂ SULFAT 171
CHINIDINĂ SULFURICĂ 171
CHINIDINI SULFAS 171
CHLORAMBUCILUM 171
CHLORAMPHENICOLUM 172
CHLORHEXIDINUM 173
CHLOROPYRAMINUM 173
CHLOROTRIANISENUM 173
CHLORPHENAMINUM 174
Chlorproethazinum 174
CHLORPROMAZINUM 175
CHLORQUINALDOLUM 175
CHLORURE DE SODIUM 0,9% 433
CHLORZOXAZONUM 176
CIALIS® 557
CIBACEN® 5 mg 114
CICADERMA 875
CICLOPIROXUM 176
CICLOPLATIN 149
CICLORAL HEXAL 25 177
CICLORAL HEXAL 100 177
CICLOSPORINUM 177
CIFRAN 182
CILAZAPRILUM 178
CILEST 661
CIMAL 269
CIMEDINE 200 179
CIMEHEXAL 200 179
CIMETIDIN 179
CIMETIDINĂ 179
CIMETIDINUM 178
CIMETIDINUM 200 mg 179
CINARIZIN 25 mg 180
CINARIZINĂ 180
CINARIZINĂ 25 mg 180
CINEDIL 180
CINNARIZIN 180
CINNARIZINUM 179
CINNASAN 180
CINOBAC® 181
CINOLAZEPAMUM 180
CINOXACINUM 181
CIPHIN 250 182
CIPHIN 500 182
CIPHIN 750 182
CIPHIN® 182
CIPLOX 182
CIPRINOL 182
CIPRO QUIN® 183
CIPROBAY® 182
CIPROBAY® 100 182
CIPROBAY® 200 182, 183
CIPROBAY® 400 183
CIPROBAY® 500 183
CIPROBID 183
CIPROCIN 183
CIPROCORE 183
CIPRODAR® tb. film. 183
Ciprofibratum 181
CIPROFLOXACIN 183
CIPROFLOXACINĂ 183
CIPROFLOXACINĂ 250 mg 183
CIPROFLOXACINĂ LPH® 250 mg 183
CIPROFLOXACINĂ LPH® 500 mg 183
CIPROFLOXACINUM 182
CIPROHEPTADINĂ 206
CIPROLEN 250 183
CIPROLEN 500 183

CIPROLOX 182
CIPROLOX 182
CIPROXIN 5% 183
CIPROXIN 10% 183
CIRRUS® 662
CISPLAMIN 185
CISPLATIN "EBEWE" 10 mg 185
CISPLATIN "EBEWE" 25 mg 185
CISPLATIN "EBEWE" 50 mg 185
CISPLATIN INJECTABIL 10 mg/10 ml 185
CISPLATIN INJECTABIL 50 mg/50 ml 185
CISPLATINUM 185
CISRELAX 250
CITERAL® 250 mg 183
CITERAL® 500 mg 183
CITOCARTIN® 100 662
CITOCARTIN® 200 663
CITOMID 604
CITRAT BAZIC DE BISMUT 124
CITROLIN 664
CLADRIBINUM 186
CLAFEN® 221
CLAFORAN 161
CLANISEN 24 mg 173
CLARINASE 664
CLARITHROMYCINUM 187
CLARITINE 382
CLARITROMICINĂ 187
CLAVUMOX DUO 1 g 97
CLAVUMOX DUO 625 mg 97
CLAVUMOX DUO susp. 97
CLAVUSIN 71
CLEMASTIN 1 mg 188
CLEMASTINUM 188
CLEXANE 252
CLIACIL 478
CLIMARA 263
CLIMEN® 665
CLINDACIN 189
CLINDAMYCINUM 189
CLIVARIN® 520
CLOBETASOL 190
CLOBETASOLUM 190
CLOBUTINOLUM 190
CLODERM 190
CLOMIFENUM 191
CLOMIPRAMIN 192
CLOMIPRAMINUM 192
CLONAZEPAMUM 193
CLONIDINĂ 193
CLONIDINĂ 0,15 mg 193
CLONIDINĂ CLORHIDRAT 193
CLONIDINUM 193
CLOPIDOGRELUM 194
CLOPIXOL 610
CLOPIXOL ACUPHASE 610
CLOPIXOL DEPOT 610
CLORACEF® 125 153
CLORACEF® 250 153
CLORACEF® FORTE 500 153
CLORAMFENICOL 172
CLORAZEPAS DIKALII 194
CLORCHINALDOL 175
CLORCHINALDOL 100 mg 175
CLORDELAZIN 175
CLORFENIRAMIN 4 mg 174
CLORHIDRAT DE BROMHEXIN 127
CLORHIDRAT DE PAPAVERINĂ 468
CLORHIDRAT DE PROCAINĂ 499
CLOROCALCIN 137
CLORURĂ DE CALCIU 137
CLORURĂ DE POTASIU 1000 mg 358
CLORURĂ DE POTASIU 7,45% 358
CLORURĂ DE SODIU 434
CLORURĂ DE SODIU 0,9% 434
CLORURĂ DE SODIU 0,9% ŞI GLUCOZĂ 5% 665
CLORURĂ DE SODIU 5,85% 434
CLORURĂ DE SODIU/VIOSER 434
CLORZOXAZON 250 mg 176
CLORZOXAZONĂ 176
CLORZOXAZONĂ 250 mg 176
CLOSTILBEGYT 191
CLOTRIMAZOL 195
CLOTRIMAZOL 100 mg 195
CLOTRIMAZOL B 666
CLOTRIMAZOLUM 195
CLOVIRAL 53
CLOZAPINUM 196
COAXIL 575
COBIDEC-N 667
COD LIVER OIL 667
CODAMIN P 668
CODEINĂ FOSFAT 197
CODEINĂ FOSFAT 15 mg 197
CODEINĂ FOSFORICĂ 197
CODEINĂ FOSFORICĂ 15 mg 197, 198
CODEINE PHOSPHATE 198
CODEINUM 197
CO-DERGOCRIN 198
CODERGOCRINUM 198
CO-DIOVAN® 80/12,5 666
COENZIMA Q10 595
COENZIMA Q10 10, 15, 30 595
COFEDOL 668
COFEINUM 199
COFEINUM NATRIU BENZOIC 199
COGNITIV® 5 mg 534
COGNITIV® 10 mg 534
COLBIOCIN 668
COLCHICINĂ 199
COLCHICINUM 199
COLDREX 668
COLDREX BRONCHO 669
COLDREX HOTREM BLACKCURRANT 670
COLDREX HOTREM LEMON 670
COLDREX LARYPLUS (AROMĂ DE LĂMÂIE) 669
COLDREX MAXGRIP LEMON 670
COLDREX NITE 671
COLEBIL 671
COLECALCIFEROLUM 200
COLISTIN 200
COLISTINUM (SULFAS) 200
COLOBUTINE 592
COLOMINT 861
COLOSPASMIN 390
COLPOSEPTINE 671
COLPOTROPHINE® 502
COLVITIOD 672
COMBIVIR 672
COMMON COMFREY BALM 861
COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POLIMALTOZAT 201
COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) SUCROZĂ 203
COMTAM 253
CONCADEN 435
CONCOR 5 124

CONCOR 10 124
CONCOR® COR 2,5 mg 124
CONCOR® COR 5 mg 124
CONCOR® COR 10 mg 124
CONDYLINE 491
CONTACT 400 672
CONTROLOC 467
CONTROLOC 20 mg 467
CONTROLOC® i.v. 467
CONVENIL 148
CONVULEX® 72
COPAXONE 308
COPEGUS® 521
CORAL 21 (TRINORDIOL) 672
CORDAMIL 40 601
CORDAMIL 80 601
CORDANUM 557
CORDARONE 150 mg/3 ml 92
CORDARONE 200 mg 92
CORDIL 354
CORDIL 10 354
CORDIL 20 354
CORDIL 40 mg SR 355
CORDIL 40 SR 354
CORDIPIN 442
CORDIPIN RETARD 442
CORINFAR 10 RETARD 442
CORINFAR 20 RETARD 442
CORLAN 227
CORSODYL MINT MOUTHWASH 173
CORYZALIA 876
CORZEM® 60 231
CORZEM® 120 231
COSMEGEN® 209
COSOPT 673
CO-TRIM 552
CO-TRIM MITE 552
COZAAR® 385
CRATEGUS 861
CREDANIL 373
CRESTOR 529
CRISTACOR 94
CRIXIVAN GOLD 334
CRIXIVAN® 100 mg 334
CRIXIVAN® 200 mg 334
CRIXIVAN® 333 mg 334
CROMOHEXAL® 60
CRUPODEX 218
CUMINOL 250 183
CUMINOL 500 183
CURIOSIN 673
CUROSURF 846
CUTADEN 674
CUTIVATE 292
CYANOCOBALAMINUM 203
CYCLO 3 FORT 674
CYCLOPENTOLATUM 204
CYCLOPHOSPHAMIDUM 204
CYCLO-PROGYNOVA® 21 674
CYCLOSERINUM 205
CYMEVENE® 304
CYNT® 422
CYPROHEPTADINUM 206
CYPROTERONUM 206
CYSTENAL 675
CYTARABINUM 207
CYTOBLASTIN 604
CYTOSAR™ 207
CYTOTEC 415

D

D.T. COQ 910
D.T. VAX 911
DACARBAZIN LACHEMA 100 208
DACARBAZIN LACHEMA 200 208
DACARBAZINUM 208
DACLIZUMABUM 208
DACTINOMYCINUM 209
DAD APA DE GURĂ 320
DADCROME® 60
DAFNEGIN 177
DAIVOBET 675
DAIVONEX® 139
DAKTARIN 411
DALACIN C 189
DALACIN T 189
DALACIN® C 150 mg 189
DALACIN® C 300 mg 189
DALACIN® V 189
DALERON C 675
DALERON C JUNOR 676
DALTEPARINUM 210
DALTRIZEN 208
DANAZOLUM 211
DANOFRAN T3A 4 mg 457
DANOFRAN T3A 8 mg 457
DANOL 211
DANOL 100 211
DANOVAL 211
DAROB® 544
DARTELIN 476
DAUNOBLASTINA 211
DAUNORUBICINUM 211
DAVERIUM 229
DEBRIDAT 592
DEBRIDAT 100 mg 592
DEBRISAN 218
DECANOFORT 25 mg 428
DECARIS 371
DECLOPHEN 221
DEFEROXAMINUM 212
DEFLAMON - FLEBO 409
DEMETIL 571
DE-NOL 124
DENTINOX TEETHING GEL 676
DENTOCALMIN 377
DEPAKINE® 200 mg 72
DEPAKINE® CHRONO 300 72
DEPAKINE® CHRONO 500 72
DEPAKINE® sirop 72
DEPO PROVERA® 392
DEPO-MEDROL 405
DERMASONE 190
DERMATIN 195
DERMATOP 495
DERMAZIN® 550
DERMESONE-N 676
DERMIX 677
DERMOCARE 677
DERMOVATE 190
DERMOZOL 411
DESFERAL 212
DESIRUDINUM 213
DESLANOSIDUM 213
DESLANOZID 213
DESLORATADINUM 213

DESMANOL 677
DESMOPRESSINUM 214
DESONIDUM 214
DESORELLE 678
DETRALEX 678
DETRUNORM 504
DETRUSITOL SR 583
DETRUSITOL® 583
DEXAGRANE 215
DEXAMED 215
DEXAMETHASONE CU NEOMICIN 678
DEXAMETHASONE SODIUM PH 215
DEXAMETHASONUM 215
DEXIR® ADULŢI 218
DEXIR® COPII 219
DEXKETOPROFENUM 216
DEXONA 215
DEXPANTHENOL 217
DEXPANTHENOLUM 217
DEXRAZOXANUM 218
DEXTRAN 40- CLORURĂ DE SODIU 0,9% 679
DEXTRAN 40- GLUCOZĂ 5% 679
DEXTRAN 70- CLORURĂ DE SODIU 0,9% 679
DEXTRAN 70- GLUCOZĂ 5% 680
DEXTRANOMERUM 218
DEXTROMETHORPHANUM 218
DEXTROSE 5% 312
DEXTROSE 10% 312
DEXTROSE 10% VIOSER 312
DEXTROSE 20% 312
DEXTROSE 5% VIOSER 312
DHC CONTINUS 228, 229
DHC CONTINUS 120 229
DHC CONTINUS 60 229
DHC CONTINUS 90 229
DIABREZIDE® 309
DIACORD 231
DIACORDIN® 231
DIAFORMIN 401
DIAKARMON 305
DIAMALIN 25 mg 588
DIAMOX 50
DIAMOX SR 50
DIANE - 35 680
DIANEAL PD 4 GLUCOZĂ 1,36% 951
DIANEAL PD 4 GLUCOZĂ 2,27% 952
DIANEAL PD 4 GLUCOZĂ 3,86% 952
DIAPREL 309
DIAPREL MR® 309
DIAZEPAM 220
DIAZEPAM 2 mg 220
DIAZEPAM 10 mg 220
DIAZEPAM DESITIN® soluţie rectală 5 mg 220
DIAZEPAM DESITIN® soluţie rectală 10 mg 220
DIAZEPAMUM 220
DIBEN 681
DICARBOCALM 681
DICLAC 75 ID 221
DICLAC® 5% gel 221
DICLO-75 VON CT 221
DICLOBERL 50 221
DICLOFEN 221
DICLOFENAC 221, 222
DICLOFENAC 100 mg 221
DICLOFENAC AL i.m. 222
DICLOFENAC DUO 222
DICLOFENAC MK CREMĂ 221
DICLOFENAC MK GEL 222
DICLOFENAC SODIC 222
DICLOFENAC SODIC 50 mg 222
DICLOFENAC SODIC 75 mg/3 ml 222
DICLOFENACUM 221
DICLOGESIC 222
DICLOGESIC® 100 222
DICLOSAL GEL 222
DICLOSIN 222
DICLOTARD 100 mg 223
DICYNONE 267
DIDANOSINUM 225
DIFABIOL 861
DIFLAZON 283
DIFLAZON 50 mg 283
DIFLAZON 100 mg 283
DIFLAZON 150 mg 283
DIFLAZON 200 mg 283
DIFLUCAN® 283
DIFLUNISAL 227
DIFLUNISALUM 227
DIFRAREL® 100 681
DIFRAREL® E 682
DIF-TET-ALL (ADULT/PEDIATRIC) 911
DIGESTIN 682
DIGNOBROXOL 86
DIGOXIN 227
DIGOXIN 0,5 mg/2 mg 227
DIGOXINUM 227
DIHYDROCODEINUM 228
DIHYDROERGOCRIPTINUM 229
DIHYDROTACHYSTEROLUM 230
DILATAN 20 mg 592
DILATREND 150
DILCEREN comprimate 444
DILCEREN soluţie perfuzabilă 444
DILTIAZEM 231
DILTIAZEM 60 mg 231
DILTIAZEM HYDROCHLORIDE 231
DILTIAZEMUM 230
DILZEM 231
DILZEM PARENTERAL 231
DILZEM RETARD 231
DIMENHYDRINATUM 232
DIMETINDENUM 232
DINICORD RETARD 20 mg 355
DINITER SR 20 mg 355
DINITER SR 40 mg 355
DINOPROSTONUM 233
DIOSMECTITA 233
DIOSMIN 234
DIOSMINUM 234
DIOVAN® 160 599
DIOVAN® 80 599
DIPEPTIVEN 847
DIPHERELINE 0,1 mg 593
DIPHERELINE® 11,25 mg 593
DIPHERELINE® 3,75 mg 593
DIPIRIDAMOL 234
DIPRIVAN 504
DIPRIVAN 1% 504
DIPRIVAN 2% 504
DIPROGENTA 682
DIPROPHOS 118
DIPROSALIC® 683
DIPYRIDAMOLUM 234
DIRITHROMICINUM 235
DISPAMOX 95
DISSENTEN 381

DISTIGMINI BROMIDUM 235
DISTONOCALM 683
DISULFIRAMUM 236
DI-TE ANATOXAL BERNA (ADULT/PEDIATRIC) 911
DITHRANOLUM 236
DIUREX 100 547
DIUREX 50 547
DIVASCAN 351
DIVINA 683
DOBUTAMIN SOLVAY INFUS 250 mg 237
DOBUTAMINUM 237
DOBUTREX SOLUTION 237
DOBUTREX® 237
DOCETAXOLUM 237
DOLASTERONUM 238
DOLICOCCIL 1000 876
DOLOBID 227
DOLOMIT 683
DOLTARD 421
DOLTARD-10 mg 421
DOLTARD-100 mg 421
DOLTARD-30 mg 421
DOLTARD-60 mg 421
DOMPERIDONUM 239
DONA® 312
DONEPEZILUM 239
DOPAMIN AWD 240
DOPAMIN SOLVAY® 200 240
DOPAMINA CLORHIDRAT 240
DOPAMINUM 240
DOPEGYT 404
DORMICUM 412
DORMICUM 7,5 mg 412
DORNAZA ALFA 240
DORZOLAMIDUM 241
DOSTINEX 136
DOSTIRAV 30 mg 510
DOSTIRAV 60 mg 510
DOXAZOSINUM 241
DOXEPIN 25 mg 242
DOXEPINUM 242
DOXICICLINA 244
DOXICICLINĂ 244
DOXILEK 137
DOXIPROCT PLUS® 684
DOXIPROCT® 684
DOXIUM 137
DOXIUM 500 137
DOXIVENIL 684
DOXOLEM 243
DOXORUBICIN "EBEWE" 243
DOXORUBICIN TEVA 243
DOXORUBICINUM 242
DOXYCYCLINUM 244
DOXYDAR 245
DOZASIN® 1 mg 241
DOZASIN® 2 mg 241
DOZASIN® 3 mg 241
DOZIC HALOPERIDOL 317
DR. THEISS NOVA FIGURA 876
DRILL® MIEL ROSAT 685
DRILL® PASTILE 685
DRILL® SANS SUCRE 685
DRIPTANE 463
DROPIL 482
DROSETUX 877
DROTAVERINUM 246
DROTRECOGINUM ALPHA 246
DROXIL 154
DROXIL 500 154
DUADOR 200 mg 77
DULCOLAX 123
DULCOPIC 542
DUOFILM 685
DUOMOX 95
DUOVIT 685
DUPHALAC 365
DUPHALAC 365
DUPHALAC® 365
DUPHASTON® 248
DURACEF 154
DUROGESIC 25 g/h 277
DUROGESIC 50 g/h 277
DUROGESIC 100 g/h 277
DUSPATALIN 200 mg 390
DUTASTERIDUM 247
DYDROGESTERONUM 248
DYNABAC® 235
DYNASTAT 471

E
ECOBEC 100 µg CFC FREE 113
ECOBEC 250 µg CFC FREE 114
ECOBEC EASI-BREATHE 100 µg CFC FREE 114
ECOBEC EASI-BREATHE 250 µg CFC FREE 114
ECOCAIN 2% CU ADRENALINĂ 1:100000 686
ECOCAIN 2% CU ADRENALINĂ 1:50000 687
ECOMI 249
ECON 249
ECONAZOLUM 249
ECOZONE 687
EDEREN 250 mg 50
EDETAMIN 433
EDICIN 500 599
EDNYT 250
EDRONAX® 517
EDULCICLAM® 435
EFAVIRENZUM 249
EFECTIN 601
EFECTIN ER 601
EFEDRINĂ 255
EFEDRINĂ 50 mg 255
EFERALGAN CODEINE 687
EFFERALGAN JEUNE ENFANT 469
EFFERALGAN NOURRISSONS 469
EFFERALGAN PT. COPII 469
EFFERALGAN VITAMINE C 687
EFFERALGAN® 500 469
EFICEF® 200 mg 158
EFITARD 117
EFORTEX 688
EGILOK 408
EGLONYL 50 mg 554
EGLONYL 100 mg/2 ml 554
EGLONYL 200 mg 554
EKTEBIN 508
ELECTOVIT® 688
ELMETACIN 335
ELOCOM 418
ELOSALIC 419
ELOSALIC 688
ELOXATIN 5 mg/ml 462
ELOXATIN® 50 mg 462
ELOXATIN® 100 mg 462
EMADINE 250
EMEDASTINUM 250

EMEPRONII BROMIDUM 250
EMESET 457
EMETIRAL 500
EMETOSTOP 390
EMLA 689
EMOCLOT 250 D.I. 888
EMOCLOT 500 D.I. 888
E-MOX® 95
ENALAP 250
ENALAPRIL 5 mg 250, 251
ENALAPRIL 10 mg 250, 251
ENALAPRIL 20 mg 250, 251
ENALAPRIL LACHEMA 20 251
ENALAPRILUM 250
ENAP 251
ENAP 2,5 251
ENAP 5 251
ENAP® H 690
ENAP® HL 690
ENARENAL 251
ENBREL 267
ENCEPHABOL 511
ENCEPHABOL FORTE 511
ENCEPUR (ADULT) 912
ENCEPUR K (PEDIATRIC) 912
ENDOBULIN S/D 889
ENDOTELON 50 mg 500
ENDOTELON 150 mg 500
ENDOXAN 204
ENDOXAN-ASTA 204
ENELBIL 100 RETARD 426
ENERBOL 511
ENERION® 550
ENFLURAMINUM 252
ENGERIX B 10 µg/0,5 ml 912
ENGERIX B 20 µg/1 ml 912
ENOXAPARINUM (NATRICUM) 252
ENTACAPONUM 253
ENTERAMID 381
ENTEROL 250 848
ENTOCORT 129
ENTOCORT 2 mg clismă 129
EPERVUDINUM 255
EPHAMOX 95
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 255
EPHICILIN 98
EPHICORD 251
EPHIMIGRIN 691
EPHITENSIN 100 mg 106
EPICOCILLIN 98
EPICOGEL 691
EPIFENAC 223
EPIGEN 848
EPIGEN „INTIME” 64
EPILAT RETARD 442
EPINEPHRINUM 255
EPINOR 450
EPIRAX 691
EPIRAZOLE 455
EPIRUBICINUM 256
EPISINDAN 256
EPITRIM 552
EPIVIR 366
EPOETINUM 256
EPOMAX 2 256
EPOMAX 4 256
EPREX 1000 257
EPREX 10000 257
EPREX 2000 257
EPREX 3000 257
EPREX 4000 257
EProsartanum 258
EPTIFIBATIDUM 258
EQUITON 692
EQUORAL 177
ERCEFURYL 443
ERDOMED 259
ERdosteinum 259
EREMFAT 450 522
EREMFAT 600 522
ERGOCALCIFEROLUM 259
ERGOCEPS 198
ERGOMET 260
ERGOMETRINUM 260
ERITRO 200 251
ERITRO 200 261
ERITROMAGIS 200 mg 261
ERITROMICINĂ 261
ERITROMICINA 200 mg 261
ERITROMICINĂ 200 mg 261
EROLIN 382
ERTAPENEMUM 260
ERVEVAX 913
ERYC 261
ERYFLUID 693
ERYHEXAL 261
ERYTHRODAR 261
ERYTHROMYCIN RIVO 125 262
ERYTHROMYCINUM 261
ERYTRO-TEVA 262
ESKAZOLE 77
ESMERON® 50 mg 527
ESMERON® 100 mg 527
ESMERON® 250 mg 527
ESOGAST 693
ESOMEPRAZOLUM 262
ESPUMISAN® 539
ESSAVEN 319
ESSAVEN 693
ESSENTIALE-FORTE N 694
ESTIVAL 148
ESTRACYT® 265
ESTRADERM TTS-25 263
ESTRADERM TTS-50 263
ESTRADIOL 263
ESTRADIOLUM 263
ESTRAMUSTINUM 265
ESTREVA 264
ESTRIOL SALBE 265
ESTRIOLUM 265
ESTROFEM 264
ESTROGENI CONJUGAŢI 266
ETA BIOCORTILEN V.C. 694
ETACRIDINUM 266
ETAMBUTOL 268
ETAMBUTOL 250 mg 268
ETAMBUTOL 400 mg 268
ETAMSILAT 267
ETAMSYLATUM 267
ETANERCEPTUM 267
ETHAMBUTOLUM 268
ETHOSUXIMIDUM 268
ETHRANE 252
ETHYOL 88
ETILEFRINUM 269
ETOFENAMATUM 269

ETOMIDAT-LIPURO 270
ETOMIDATUM 270
ETOPOSID EBEWE 50 mg 270
ETOPOSID EBEWE 100 mg 270
ETOPOSID EBEWE 200 mg 270
ETOPOSIDE 270
ETOPOSIDE PIERRE FABRE 100 mg/5 ml 270
ETOPOSIDUM 270
ETORICOXIBUM 271
EUCAR 149
EUCARBON 694
EUCIPRIN 183
EUFILINĂ – EEL 91
EUPADONT 694
EUPHYLLIN QUICK 200 91
EURESPAL 276
EURESPAL 80 mg 276
EURO 10 595
EUROPIRIN 55
EUROPIRIN T 695
EUROPRIL 143
EUROSEPT 695
EUROZEPAM 391
EUTHYROX® 25 376
EUTHYROX® 100 376
EUTHYROX® 200 376
EUVAX – B (ADULT) 913
EUVAX – B (PEDIATRIC) 913
EUVIROX 53
EUVIROX 200 mg 53
EVARTAN 567
EVISTA 514
EXAMETAZIMUM 272
EXELON 526
EXEMESTANUM 273
EXIBA 10 mg 394
EXIBA 10 mg/g 394
EXIGAN® 695
EXLUTON 385
EXODERIL 426
EXODERIL 1% 391
EXPECTORANTE 861
EXTRA STRENGTH NON ASPIRIN 469
EXTRANEAL 329
EXTRANEAL 953
EXTRASEDYL 696
EXTRAVERAL 696
EZETIMIBUM 273
EZETROL 273

F
FALICARD 601
FALICARD 40 601
FALICARD 80 601
FALICARD 120 601
FALICARD LONG 602
FAMCICLOVIRUM 274
FAMODAR 10 274
FAMODAR 20 274
FAMODAR 40 274
FAMODIN 20 274
FAMODIN 40 274
FAMOSAN 274
FAMOTAK 274
FAMOTIDIN 274
FAMOTIDINĂ 20 mg 275
FAMOTIDINĂ 40 mg 275
FAMOTIDINUM 274
FAMVIR 274
FARAGEL FORTE 697
FARCONCIL 95
FARCOPRIL 143
FARCORELAXIN 135
FARCOVIT-B_{12} 697
FAREBIL 697
FARESTON 584
FARINGOSEPT „L" 10 mg 86
FARINGOSEPT 10 mg 86
FARLUTAL 500 mg 392
FARMACOD 198
FARMALEXIN 155
FARMORUBICIN C.S. 256
FARMORUBICIN PFS 256
FARMORUBICIN RD 256
FARMORUBICIN® PFS 10 mg/5 ml 256
FARMORUBICIN® PFS 50 mg/25 ml 256
FASCONAL "M" 697
FASCONAL P 698
FASCOREM 698
FASIGYN 577
FASPIC® 400 327
FASPIC® 600 327
FAST 699
FASTUM GEL® 362
FEBRICET 469
FEIBA™ TIM 4 IMMUNO 890
FELDENE 488
FELOCORD 5 mg 275
FELOCORD 10 mg 275
FELODIPINUM 275
FELOHEXAL 10 mg 275
FELOHEXAL 5 mg 275
FELOTARD 10 mg 275
FELOTARD 2,5 mg 275
FELOTARD 5 mg 275
FEM 7 264
FEMARA 370
FEMODEN (FEMOVAR) 699
FEMOSTON conti 1/5 700
FEMOSTON 2/10 700
FEMOSTON® CONTI 1/5 699
FEMSEVEN 75 264
FEMSEVEN 100 264
FENIGIN B 701
FENILBUTAZONA 701
FENILBUTAZONĂ 479
FENISTIL 232
FENITOIN 100 mg 481
FENOBARBITAL 478
FENOFIBRAT 100 mg 276
FENOFIBRAT 200 mg 276
FENOFIBRAT LPH® 100 mg 276
FENOFIBRAT LPH® 200 mg 276
FENOFIBRATUM 276
FENORIN 148
FENOSEPT 0,3 mg 481
FENSPIRIDUM 276
FENTANYL 277
FENTANYL–JANSSEN 277
FENTANYLUM 277
FENTICONAZOLUM 278
FERPLEX® 507
FERRETAB 702
FERROCHOLINATUM 278
FERRO-FOLGAMMA® 702
FERROGRAD-C 703

FERRO-GRADUMET 280
FERRONAT 279
FERROSII FUMARAS 279
FERROSII GLUCONAS 279
FERROSII SULFAS 280
FERROZINC C 703
FERRUM HAUSMANN 201
FER-SOL 278
FERUCARBOTRANUM 280
FERVEX "ENFANT" 704
FERVEX, FERVEX "SANS SUCRE" 703
FESTAL N® 704
FEVARIN 295
FEXOFENADINUM 281
FILGRASTIMUM 281
FINALGEL® 488
FINALGON® 704
FINASTERIDUM 282
FINLEPSIN® 145
FINLEPSIN® 200 RETARD 145
FINLEPSIN® 400 RETARD 145
FIOBILIN 61
FITODIAB 862
FITOLIP 862
FITOMENADIONĂ 481
FLAGYL 409
FLAMEXIN® 490
FLAVOSOL 862
FLAVOTAN 40 mg 307
FLEBOCORTID 323
FLECAINIDUM 282
FLEXEN 362
FLIXONASE™ 292
FLIXOTIDE® 25 INHALER 292
FLIXOTIDE® 50 INHALER 292
FLIXOTIDE® NEBULES® 0,5 mg/2 ml 293
FLIXOTIDE® NEBULES® 2 mg/2 ml 293
FLIXOTIDE® 125 INHALER 292
FLIXOTIDE® 125 INHALER CFC-FREE 292
FLIXOTIDE® 250 INHALER 292
FLIXOTIDE® 250 INHALER CFC-FREE 292
FLOGOFENAC 223
FLONIDA 705
FLONIDAN 10 mg 382
FLONIDAN 5 mg 382
FLONIDAN® 382
FLOSTERON 119
FLOXET 289
FLUAMOX 705
FLUANXOL DEPOT 290
FLUARIX 914
FLUCINOM® 292
FLUCONAZOLUM 283
FLUCORIC 283
FLUCOVIM 50 283
FLUCOVIM 100 283
FLUCOVIM 150 283
FLUDARA 284
FLUDARA® ORAL 284
FLUDARABINUM 284
FLUDROCORTISONUM 284
FLUIDOL 148
FLUIMUCIL 51
FLUIMUCIL® 100 51
FLUIMUCIL® 200 51
FLUIMUCIL® 600 51
FLUMAZENILUM 285
FLUMETASONUM 285
FLUMETOL 288
FLUMETOL S 288
FLUMETOL SEMPLICE 288
FLUNISOLIDUM 285
FLUNITRAZEPAM 1 mg 286
FLUNITRAZEPAM 2 mg 286
FLUNITRAZEPAMUM 286
FLUOCAL 435
FLUOCIM 289
FLUOCINOLON ACETONID 286
FLUOCINOLON D 706
FLUOCINOLON G 706
FLUOCINOLON N 286
FLUOCINOLON N 707
FLUOCINOLONI ACETONIDUM 286
FLUOCORTOLONUM 287
FLUOHEXAL 20 289
FLUOR VIGANTOLETTEN 500; 1000 707
FLUORESCEINUM NATRIUM 287
FLUORESCITE® 287
FLUorometholonum 288
FLUORORINIL 707
FLUOROSINDAN 288
FLUOROSTOM 435
FLUOROURACILUM 288
FLUOXETIN LPH® 20 mg 289
FLUOXETINUM 289
FLUOXIN 289
FLUPENTIXOLUM 290
FLUPHENAZINUM 290
FLURAN 289
FLURBIPROFENUM 291
FLUROBLASTIN 288
FLUTAMIDA SINDAN 250 mg 292
FLUTAMIDUM 292
FLUTAN 292
FLUTICASONUM 292
FLUTRIMAZOLUM 293
FLUVAL 20 mg 289
FLUVASTATINUM 295
FLUVOXAMINUM 295
FOLINAT DE CALCIU 137
FOLINAT DE CALCIU SINDAN 100 mg/10 ml 137
FOLINAT DE CALCIU SINDAN 30 mg/10 ml 137
FOLINAT DE CALCIU SINDAN 30 mg/3 ml 137
FOLLEGON 596
FOLLITROPINUM ALFA 295
FOLLITROPINUM BETA 296
FORANE 353
FORLAX 386
FORMESTANUM 296
FORMOTEROLUM 297
FORSTEO® 566
FORTIFIED PROCAINE PENICILLIN 117
FORTOVASE 533
FORTRAL 475
FORTRANS 708
FORTUM® 163
FORTWIN® 475
FORTZAAR® 100/25 708
FOSAMAX 56
FOSAMAX 10 mg 56
FOSAMAX 70 mg 56
FOSFAT DE CODEINĂ 198
FOSFAT DE CODEINĂ 15 mg 198
FOSFESTROLUM 297
FOSFOBION 593
FOSFOCREATININUM 298

FOSFOMYCYNUM 298
FOSINOPRILUM 298
FOTEMUSTINUM 299
FRAGMIN 210
FRAMEX 289
FRAXIPARINE 0,3 ml 424
FRAXIPARINE 0,4 ml 424
FRAXIPARINE 0,6 ml 424
FRAXIPARINE 0,8 ml 424
FRAXIPARINE FORTE 0,6 ml 426
FRAXIPARINE FORTE 0,8 ml 426
FREBINI® ENERGY DRINK 709
FREBINI® ORIGINAL FIBER 709
FRECŢIE GALENICĂ 76
FRECŢIE GALENICĂ FORTE PP 76
FREKADERM 710
FREKASEPT-80 710
FRENASMA 364
FRESUBIN® HEPA 710
FRESUBIN® HP ENERGY 711
FRESUBIN® ORIGINAL 711
FRESUBIN® ORIGINAL FIBER 712
FROMLID 250 187
FROMLID 500 187
FROMLID® 125 mg/5 ml 187
FRONTIN 82
FRUCTOSE 5% 299
FRUCTOSUM 299
FUCICORT® 712
FUCIDIN® 62
FUCIDIN® H 713
FUCITHALMIC® 62
FULSED INJECTION 412
FUNGICIDE 360
FURAMEBE FORTE 713
FURAZOLIDON 299
FURAZOLIDONA EEL 299
FURAZOLIDONA FORTE EEL 299
FURAZOLIDONUM 299
FURIX RETARD 30 mg 300
FURIX RETARD 60 mg 300
FURORESE 300
FUROSEMID 300
FUROSEMID EEL 300
FUROSEMID LPH® 40 mg 300
FUROSEMIDĂ 40 mg 300
FUROSEMIDUM 300
FUROSIL 300
FUSAFUNGINUM 301
FUSID 300

G
GABAGAMMA 100 301
GABAGAMMA 300 301
GABAGAMMA 400 301
GABAPENTINUM 301
GADOBUTROLUM 303
GADODIAMIDUM 302
GADOVIST® 303
GALACTOGIL 862
GALIFIX 848
GAMAGLOBULINĂ 16% 891
GAMAGLOBULINĂ ISI 891
GAMMA-VENIN P 892
GANCICLOVIRUM 304
GANIRELIXUM 304
GARASONE 713, 714
GASTAL 714
GASTRALGINE 715
GASTROBEN 715
GASTROCYNÉSINE 877
GASTROFAIT 550
GASTROGRAFIN® 431
GASTROGRAFIN® 716
GASTROMIRO 349
GASTROPAC 112
GASTROSIDIN 275
GELASPON 848
GELOFUSINE 717
GELONIDA 717
GEMCITABINUM 305
GEMFIBROZILUM 305
GEMZAR 305
GENAC 51
GENOTROPIN 543
GENOTROPIN 16 UI 543
GENOTROPIN 36 UI 543
GENOTROPIN PEN 5,3 543
GENTAMED 305
GENTAMICIN 306
GENTAMICIN „SANDOZ“ 40 mg 306
GENTAMICIN „SANDOZ“ 80 mg 306
GENTAMICIN LEK 80 mg/2 ml 306
GENTAMICINE LEURQUIN 80 mg 306
GENTAMICINUM 305
GENTAMYCIN 306
GENTAMYCIN „BIOCHEMIE“ 306
GENTAMYCIN SULPHATE 306
GENTICOL 306
GERIATON® FORTE 717
GERODORM 180
GEROVITAL H_3 718
GERTEMYCIN 157
GERTOCALM 515
GIARDINOCID 718
GILUCOR 544
GILUCOR MITE 544
GINKGO BILOBA 307
GINKGO BILOBA 307
GINKOGINK 307
GINKOR FORT 718
GINSAVIT 719
GINSENG 863
GLAtimer acetat 308
GLAVERAL 455
GLIBENCLAMID 308
GLIBENCLAMID 5 mg 308
GLIBENCLAMID LPH® 1,75 mg 308
GLIBENCLAMID LPH® 3,5 mg 308
GLIBENCLAMIDUM 308
GLIBIL 5 308
GLIBOMET® 719
GLICERIN SUPOZITOARE 314
GLICLAZIDUM 309
GLIDIET 309
GLIFORMIN® 720
GLIMEPIRIDUM 310
GLIPIZID LPH® 5 mg 310
GLIPIZIDUM 310
GLIQUIDONUM 311
GLIVEC 100 mg 331
GLIVEC 50 mg 331
GLUCAGEN® HYPOKIT 1 mg 311
GLUCAGONUM 311
GLUCOBAY 100 mg 48
GLUCOBAY 50 mg 48

GLUCONAT DE CALCIU 139
GLUCONAT FEROS 279
GLUCONOLACTAT Ca + Mg 721
GLUCOPHAGE 1000 mg 401
GLUCOPHAGE 500 mg 401
GLUCOPHAGE 850 mg 401
GLUCOSAMINUM 312
GLUCOSE 5% 312, 313
GLUCOSE 5% m/v 314
GLUCOSE 10% 313
GLUCOSE 10% 314
GLUCOSE 10% m/v 314
GLUCOSE 20% BRAUN 313
GLUCOSE INFUNDIBILE 5% 313
GLUCOSE INFUNDIBILE 10% 313
GLUCOSTERIL 5% 313
GLUCOSTERIL 10% 313
GLUCOSUM 312
GLUCOTROL XL 310
GLUCOZĂ 313
GLUCOZĂ 5% 313
GLUCOZĂ 10% 313
GLUCOZĂ 20% 313
GLUCOZĂ 33% 313
GLUCOZĂ 40% BRAUN 314
GLURENORM 311
GLUTAMAG® + B_6 722
GLYCEROLUM 314
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM 314
GONAL-F 37,5 UI 295
GONAL-F 75 UI 295
GONAL-F 150 UI 295
GOPTEN® 586
GORDOX 102
GOSERELINUM 315
GRANDAXIN 581
GRANISETRONUM 316
GRANOCYTE 369
GRANUDIAL ACETAT AT 11 542
GRANUDIAL ACID AF72 954
GRANUDIAL BICARBONAT BI84 542
GRAVIBINON 722
GRENIS 450
GRENIS-CIPRO 183
GRIPEC 863
GRIPEC BABY WATER 863
GRIPECALM 722
GRIPPOSTAD® C 723
GRISEOFULVIN 316
GRISEOFULVINUM 316
GUAIFENESINUM 316
GUTRON 413
GYNE LOTRIM 195
GYNIPRAL 0,5 mg 321
GYNIPRAL 10 mg 321
GYNO-DAKTARIN 411
GYNO-TRAVOGEN 353
GYNOZOL 411

H
HAEMATE P 892
HAEMITON 193
HAES-STERIL® 6% şi 10% 723
HAIRGROW 414
HALDOL 317
HALIDOR® 115
HALOPER 317
HALOPERIDOL 317
HALOPERIDOL 5 mg/ml 318
HALOPERIDOL DECANOAT 318
HALOPERIDOLUM 317
HALOTANE LIQUID 318
HALOTHANUM 318
HARTMAN 724
HAVRIX JUNIOR 914
HAVRIX™ 1440 ADULT 914
H-B-VAX II 915
HBVAXPRO 915
HDY 138 CONC. HEMODIALIZĂ 955
HELEX 82
HELMINTOX 125 509
HELMINTOX 250 509
HELMINTOX® 509
HELPOCERIN 205
HELPODERM 119
HEMOGAL 725
HEMOHES 6%, 10% 725
HEMORZON 726
HEMORZON "O" 726
HEPA-MERZ 726
HEPARIN 319
HEPARIN "SANDOZ" 25000 UI/5 ml 319
HEPARINA 319
HEPARINE SODIQUE PANFARMA 319
HEPARINUM 319
HEPAROID LECIVA 849
HEPASOL A 727
HEPATHROMBIN 30 000 727
HEPATHROMBIN 50 000 727
HEPATOBIL 863
HÉPATO-DRAINOL 877
HEPATOFALK PLANTA 863
HEPOMETIL 724
HERCEPTIN® 150 mg 587
HERMES CEVITT® 58
HERMES MULTIVIT® + MINERALS 728
HERMES® MULTIVIT JUNIOR 727
HERNOVIR 53
HERPESIN 250 53
HERPESTOP® 728
HERPIN 53
HEVIZOS 255
HEXESTROLUM 320
HEXETIDINUM 320
HEXOPRENALINUM 321
HEXORAL® 320, 321
HEXORALETTEN N 728
HF 24 955
HIBERIX 916
HIDONAC 51
HIDRASEC 514
HIDROCORTIZON 323
HIDROCORTIZON ACETAT 323
HIDROCORTIZON HEMISUCCINAT 323
HIDROMORFON 324
HIDROMORFON CU ATROPINĂ 729
HIDROXIZIN 326
HIRODOID® 729
HISTAC 75 515
HISTAC EVT 515
HISTODIL 179
HIVID 607
H-KETOTIFEN 364
H-NORFLOXACIN 400 mg 450
HOLETAR® 384
HOLOXAN 200 mg 330

HOLOXAN 500 mg 330
HOLOXAN 1 g 330
HOLOXAN 2 g 330
HOMEOGENE 9 877
HOMEOPLASMINE 877
HOMEOVOX 878
HONVAN 297
HOTEMIN 488
HUMAGLOBIN 893
HUMALOG 342
HUMALOG MIX 25 342
HUMALOG MIX 25 PEN 342
HUMALOG MIX 50 342
HUMALOG MIX 50 PEN 342
HUMALOG PEN 342
HUMANALBIN 5% 894
HUMAPENT 204
HUMEGON 394
HUMEX 219
HUMEX EXPECTORANT 148
HUMEX RĂCEALĂ ŞI GRIPĂ 729
HUMOXAL 730
HUMULIN L 338
HUMULIN N.P.H 338
HUMULIN REGULAR 338
HUMULIN® M3 (30/70) 338
HUMULIN® N 338
HUMULIN® R 338
HUMULIN–M1 338
HUMULIN–M2 338
HUMULIN–M3 338
HUMULIN–M4 338
HUMULIN–M5 338
HYCAMTIN 584
HYDERGINE 198
HYDREA 325
HYDROCHLOROTHIAZIDUM 322
HYDROCORTISONE 100 mg 323
HYDROCORTISONE 500 mg 323
HYDROCORTISONE NA SUCCIN. 323
HYDROCORTISONUM 323
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM 324
HYDROMORPHONUM 324
HYDROTALCITUM 325
HYDROXICARBAMIDE 325
HYDROXYCARBAMIDUM 325
HYDROXYCHLOROQUINUM 326
HYDROXYZINUM 326
HYPNOGEN® 10 mg 609
HYPOTEN 106
HYPOTENSOR 143
HYTRIN 563
HYTRIN STARTER PACK 563
HYZAAR 730

I
IBUFEN® 327
IBUGESIC® 327
IBUPROFEN 327
IBUPROFEN 200 mg 327
IBUPROFENUM 327
IBUTIMEN RETARD 600 327
IBUTIN® 592
ICODEXTRINUM 329
IDARUBICINUM 329
IDEOS 731
Ifosfamidum 330
IKOBEL 580
ILETIN II LENTE 338
ILETIN II NPH 338
ILETIN II REGULAR 338
ILOMEDIN® 20 330
ILOPROSTUM 330
IMACORT 732
IMATINIBUM 331
IMIDAPRILUM 331
IMIGLUCERASUM 332
IMIGRAN SPRAY NAZAL 555
IMIGRAN® 50, 100 555
IMIPENEMUM + CILASTATIMUM 333
IMIQUIMODUM 334
IMMUNATE 895
IMMUNINE 896
IMODIUM 382
IMODIUM 2 mg 382
IMOVANE 610
IMOVAX DT ADULT 917
IMOVAX POLIO 917
IMUDON 849
IMUDON 943
IMUNOSTIMULENT BCG LIOFILIZAT 943
IMUNOSTIMULENT SRE "CORYNEBACTERIUM PARVUM" 944
IMURAN 109
INDAPAMID 1,5 mg 334
INDAPAMID 2,5 mg 334
INDAPAMIDUM 334
INDAPSAN 334
INDERM 262
INDINAVIRUM 334
INDOCOLLYRE 335
INDOMETACIN 335, 336
INDOMETACIN 25 mg 336
INDOMETACIN 4% 336
INDOMETACIN 50 mg 336
INDOMETACIN MK CREMĂ 335
INDOMETACINUM 335
INDOSIN GEL 336
INFANRIX DTPa 917
INFANRIX HEP B 918
INFANRIX HEXA 918
INFANRIX PENTA 920
INFANRIX-HIB 919
INFANRIX-IPV + HIB 919
INFANT'S TYLENOL 469
INFANT'S TYLENOL ACETAM. 469
INFECTOFLAM 732
INFERGEN 343
INFESOL 40 X-E 732
INFLIXIMABUM 336
INFLUVAC 921
INFUSAMIN 10% 733
INHALANT 864
INHIBACE 178
INNOGEM 305
INNOHEP 578
INOSINUM 337
INSADOL 864
INSULATARD HM 339
INSULATARD HM INNOLET 339
INSULATARD HM NOVOLET 339
INSULATARD HM PENFILL 339
INSULATARD® HM PENFILL 339
INSULIN MIXTARD 30 HM 339
INSULIN MIXTARD 50 HM 339
INSULIN MONTARD HM 339

INSULINE 337
INSULINE ASPART 341
INSULINE GLARGINE 341
INSULINE LISPRO 342
INSUMAN BASAL 339
INSUMAN BASAL OptiSet 339
INSUMAN COMB 25 339
INSUMAN COMB 25 OptiSet 339
INSUMAN COMB 50 339
INSUMAN COMB 50 OptiSet 339
INSUMAN RAPID 339
INSUMAN RAPID OptiSet 340
INTEGRILIN™ 258
INTERFERONUM ALFA-2A 343
INTERFERONUM ALFA-2B 344
INTERFERONUM ALFA-2b + RIBAVIRINUM 346
INTERFERONUM ALFACON-1 343
INTERFERONUM BETA-1A 346
INTERFERONUM BETA-1B 347
INTRALIPID® 10% 733
INTRALIPID® 20% 734
INTRALIPID® 30% 734
INTRON A 344, 345
INTRON A PEN 345
INTRON A 18 milioane U.I. 344
INTRON A 30 milioane U.I. 344
INVAZ 260
INVIRASE® 533
INVORIL 5 mg 251
INVORIL 10 mg 251
IODAMIDUM 347
IODIDUM 347
IODINĂ 10% 492
IODISEPT 492
IODISOL 492
IODISOL SOLUDEIDE 492
IODIS-T 10% 492
IODIXANOLUM 348
IODOSEPT 492
IODURĂ DE POTASIU 359
IOHEXOLUM 348
IOPAMIDOLUM 349
IOPAMIRO 200 349
IOPAMIRO 300 349
IOPAMIRO 370 349
IOPROMIDUM 350
IPATON 576
IPERTROFAN 395
IPERTROFAN 40 395
IPOLIPID 305
IPRATROPII BROMIDUM 350
IPRAVENT 20-INHALER 350
IPRAZOCHROMUM 351
IRBESARTANUM 351
IRINOTECANUM 352
IRS-19 921
ISCADOR M 864
ISCADOR P 864
ISCADOR QU 865
ISCHEMOL-A 734
ISEPAMICIN® 352
ISEPAMICINUM 352
ISICOM 373
ISIVEN V.I 897
ISOCONAZOLUM 353
ISODINIT 355
ISODINIT RETARD 355
ISOFLURANE 353
ISOFLURANUM 353
ISO-MACK Retard 355
ISO-MACK SPRAY 355
ISONIAZIDĂ 354
ISONIAZIDĂ 100 mg 354
ISONIAZIDUM 354
ISOPRINOSINE 337
ISOPTIN 602
ISOPTIN 80 602
ISOPTIN MITE 40 602
ISOPTIN RR 602
ISOPTO CARPINE 2% 482
ISOREL-A 865
ISOSORBID 355
ISOSORBID DINITRAT 355
ISOSORBID DINITRAT 10 mg 355
ISOSORBIDE DINITRATE 355
ISOSORBIDI MONONITRAS 356
ISOTONE KOCHSALZ-LOSUNG 434
ISOTRETINOINUM 357
ISOTREXIN® 734
ISTEROPAC E.R. 347
ITRACONAZOLUM 357
IXEL 413
IZOCON 1 353
IZOCON A 735
IZOFEN 50 mg 584
IZOLTIL 95
IZORIFARM 735

J
JEANINE® 736
JODID® 100 359
JODID® 200 359
JODTHYROX 737
JOSAMYCINUM 358
JULPHAMOX 95
JUMEX 5 mg 534
JUNIOR MELTUS 317

K
KABIVEN™ 738
KABIVEN™ PERIPHERAL 738
KALETRA 739
KALII CHLORIDUM 358
KALII IODIDUM 359
KALII PERMANGANICUM 359
KALIUM 40 739
KALIUM PERMANGANICUM 359
KALIUM-MAGNESIUM "APOGEPHA" 740
KALIUM-MAGNESIUM-ASPARAGINAT 740
K-ALMA 584
KAMIREN® 241
KANAMICINĂ 359
KANAMICINĂ SULFAT 359
KANAMYCINUM 359
KARBAPIN 145
KARVOL 740
KEFADIM 163
KEFADIM 1 g 163
KEFLEX® 155
KEPPRA® 250 mg 371
KEPPRA® 500 mg 371
KEPPRA® 1000 mg 371
KERATYL 428
KETALGON® 100 mg/2 ml 362
KETAMINE PANPHARMA 360
KETAMINUM 360

KETANOV 363
KETEK 559
KETEROLACUM TROMETHAMIN 363
KETOCONAZOL 361
KETOCONAZOL 200 mg 360
KETOCONAZOL LPH® 200 mg 361
KETOCONAZOLUM 360
KETODAR® ŞAMPON 361
KETOF 364
KETO-GAL 364
KETONAL 362
KETONAL 2,5% GEL 362
KETONAL DUO 362
KETONAL FORTE 362
KETONAL RETARD 362
KETOPROFEN 362
KETOPROFEN SR 100 mg 362
KETOPROFEN SR 200 mg 362
KETOPROFENUM 362
KETOROL 363
KETOSTERIL 741
KETOSTIN 200 mg 361
KETOTIFEN 364
KETOTIFEN LPH® 364
KETOTIFENUM 364
KETRODROL 363
KINIDIN DURULES 171
KIRIN 545
KLABAX 187
KLACID 187
KLACID 500 187
KLACID SR 187
KLERIMED 250 187
KLERIMED 500 187
KLIMICIN 189
KLIMODIEN 741
KLINDAN 300 189
KLINDAN 600 189
KLIOGEST® 742
KLION - D 100 742
KLION 0,5% INFUSION 410
KODAN TINKTUR FORTE COLORAT; KODAN TINKTUR FORTE INCOLOR 742
KREON 10 000 742
KREON 25 000 743
KYBERNIN HS 500 898
KYTRIL 316
KYTRIL 1 g 316
KYTRIL 2 g 316

L
LACIDIPINUM 365
LACIPIL® 2 mg 365
LACIPIL® 4 mg 365
LACRISIFI 743
LACRYVISC™ 743
LACTATED RINGER'S 743
LACTOBIONAT ERITROMICINĂ 262
LACTULOSE 365
LACTULOSE AL SIROP 365
LACTULOSUM 365
LADY 4 744
LAEVOLAC® 365
LAGOSA® 539
LAMICTAL 366
LAMICTAL 25 mg 367
LAMICTAL 100 mg 366
LAMICTAL® 2 mg 367
LAMISIL® 564
LAMIVUDINUM 366
LAMOGINE 25 mg 367
LAMOGINE 50 mg 367
LAMOGINE 100 mg 367
LAMOTRIGINUM 366
LANACINE 189
LANOXIN 227
LANREOTIDUM 367
LANSOPRAZOLUM 367
LANTIGEN B 944
LANTUS® 100 UI/ml 341, 342
LANTUS® OPTISET® 341
LANVIS 579
LANZAP 367
LANZUL 368
LASIX 300
LASONIL N 744
LASOPROL 30 mg 368
LATANOPROSTUM 368
LAURINA 744
LAURONIL 745
LAXATOL® 123
LECITINĂ CU VIT D_2 745
LEFLUNOMIDUM 368
LEGALON 745
LEGALON 70 mg 539
LEKOKLAR® 250 mg 187
LEKOKLAR® 500 mg 187
LEKOKLAR® XL 500 mg 187
LEMESIL 444
LEMOD SOLU 125 mg 405
LEMOD SOLU 20 mg 405
LEMOD SOLU 40 mg 405
LEMOD SOLU 500 mg 405
LENDACIN 165
LENICALM 866
LENOGRASTINUM 369
LENTARON DEPOT 250 mg 296
LEPONEX 196
LERCANIDIPINUM 369
LERIDIP® 369
LERIVON 10 mg 411
LERIVON 30 mg 411
LESCOL 20 295
LESCOL 40 295
LESCOL XL 295
LETROZOLUM 370
LEUCOMAX® 416
LEUCOVORIN 137
LEUCOVORIN 15 mg 138
LEUCOVORIN CA-25 138
LEUCOVORIN-TEVA 50 mg/5 ml 138
LEUCOVORIN-TEVA 100 mg/10 ml 138
LEUKERAN 171
LEUPRORELINUM 370
LEVAMISOLUM 371
LEVETIRACETANUM 371
LEVITRA 600
LEVITRA 5 mg, 10 mg, 20 mg 600
LEVOCABASTINUM 372
LEVOCETIRIZINUM 372
LEVODOPA & CARBIDOPA 373
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM 372
LEVODOPUM + CARBIDOPUM 373
LEVODROPROPIZINUM 374
LEVOFLOXACINUM 374

LEVONORGESTRELUM 375
LEVOPRAID® 375
LEVOPRONT SIROP 374
LEVOPRONT SOLUŢIE ORALĂ ÎN PICĂTURI 374
LEVOSULPIRIDUM 375
LEVOTHYROXINUM 376
LEVOVIST 745
LEXOTANIL 126
LEXOTANIL® 126
LEXPEC 746
LICHOL 276
LIDOCAIN 377
LIDOCAIN HYDROCHLORID 377
LIDOCAINUM 377
LIFUROX® 166
LI-LIQUID 380
LINCOCIN ™ 378
LINCODAR 378
LINCOMYCINUM 378
LINESTRENOL 385
LINEZOLIDUM 379
LIORESAL 111
LIOTON 319
LIPANOR® 100 mg 181
LIPANTHYL 276
LIPANTHYL 200 M 276
LIPANTHYL SUPRA 160 mg 276
LIPIODOL® 190 mg 347
LIPIVIM 276
LIPOFIB LPH 100 mg 276
LIPOFIB LPH 200 mg 276
LIPOFIB SR 250 mg 276
LIPOFUNDIN MCT/LCT 10% 746
LIPOFUNDIN MCT/LCT 20% 746
LIPOSTAT® 493
LIPOVENOES 10% PLR 747
LIPOVITAN 747
LISINOPRILUM 379
LITAK® 10 SOLUŢIE 186
LITHII CARBONAS 380
LITHII CITRAS 380
LITHIUM CARBONICUM 380
LITHOFALK 748
LIV. 52 866
LIV-52 748
LIVERCYN 748
LIVOSTIN 372
LIZADON® P 748
LOCOID 324
LOCOID CRELO 324
LOCOID LIPOCREAM 324
LODOXAMIDUM 380
LODRONAT 59
LOGEST 749
LOGIMAX 749
LOKREN® 120
LOMADAY 381
LOMEFLOXACINUM 381
LOMEXIN 278
LOMEXIN T 278
LOMUSTINUM 381
LOPERAMID 382
LOPERAMID 2 mg 382
LOPERAMIDUM 381
LORASTAMIN 10 mg 382
LORATADIN 382
LORATADINĂ LPH® 10 mg 382
LORATADINUM 382
LORATIN 382
LORAZEPAMUM 383
LORIVAN 383
LORNOXICAM 383
LOSEC 456
LOSEC MUPS 456
LOTRIMIN 195
LOVASTATIN 20 mg 384
LOVASTATIN 40 mg 384
LOVASTATINUM 384
LOVIR 200 mg 53
LOVIR 400 mg 53
LOVIR 800 mg 53
LOZARTANUM 385
L-THYROXIN- 25 376
L-THYROXIN- 50 376
L-THYROXIN-100 376
L-THYROXIN-150 376
LUCETAM 485
LUCETAM® 1 g 485
LUCETAM® 1200 mg 486
LUCETAM® 3 g 486
LUCRIN DEPOT, 11,25 mg 370
LUCRIN DEPOT, 3,75 mg 370
LUDIOMIL 389
LUISAR 750
LUIVAC 944
LUMAREN 516
LUSOPRESS 446
LUTENYL 449
LUTROPINUM ALFA 385
LUVERIS 75 ui 385
LYFORAN 1 g 161
LYNESTRENOLUM 385
LYORODIN DEPOT 290
LYRAMYCIN 306
LYSTENON 555
LYSTENON 2% 555
LYZOLIN 157

M
MAALOX 750
MAB CAMPATH 78
MABRON 585
MABTHERA 525
MACMIROR 443
MACMIROR COMPLEX 443
MACMIROR COMPLEX 750
MACMIROR COMPLEX-500 750
MACROGOLUM 386
MADOPAR 372
MADOPAR 750
MADOPAR® HBS 373
MAG-ANGHINAR 866
MAGNE-B_6 751
MAGNEROT 387
MAGNESII CITRAS 386
MAGNESII OROTAS 387
MAGNESII OXIDUM 387
MAGNESII SULFAS 388
MAGNESIUM DIASPORAL 300 387
MAGNESIUM DIASPORAL ORANGE 100 386
MAGNESIUM TYGGETABLETTER 751
MAGNEVIST 63
MAGNEZIU FORTE CU VITAMINA B_6 751
MAGNEZIU MARIN B_6 751
MAGRILAN 289
MAGUROL 241

MALATHIONUM 388
MALTOFER® FOL 752
MALUCOL 752
MALUGEL 752
MALUGEL B 752
MANDOL® 156
MANGAFODIPIRUM 388
MANINIL 308
MANITOL 388
MANITOL 10% 388
MANNITOL VIOSER 388
MANNITOLUM 388
MAPROLU - 50 389
MAPROTILIN 389
MAPROTILINUM 389
MARCAINE 131
MARCAINE SPINAL 0,5% 131
MARCAINE SPINAL HEAVY 0,5% 131
MARCOFEN 327
MARIMER 850
MARVELON 21 753
MASTODYNON 878
MATERNA® CU SELENIU 753
MAXALT® 5 mg 526
MAXALT® 10 mg 526
MAXALT-RPD 5 mg 526
MAXALT-RPD 10 mg 526
MAXAQUIN 381
MAXIDEX 215
MAXIL 750 166
MAXIL 1500 166
MAXIMUM STRENGTH SINUS 754
MAXIPIME® 158
MAXITROL® 754
MAYCOR® Retard 20 355
MAYCOR® Retard 40 355
MDP-KIT IN VIVO TC99M 754
MEBENDAZOLUM 389
MEBEVERINUM 390
MECLON; MECLON 1 000 754
MECLOSULFONATUM 390
MECLOZINUM 390
MECLOZOL 755
MECOPAR FORTE 755
MEDACTER 411
MEDAPRIL 379
MEDAZEPAM 10 mg 391
MEDAZEPAMUM 391
MED-CAPTOPRIL 143
MED-CLOTRIMAZOL 195
MED-DICLOFENAC 223
MED-FUROSEMID 300
MEDIBUPROFEN 327
MEDOCEF 160
MEDOCLAV 97
MEDOCLAV 375 mg 97
MEDOCLAV 625 mg 97
MEDOCLAV FORTE 97
MEDOCLOR 250 153
MEDOCLOR 500 153
MEDOCRIPTINE 128
MEDOSTATIN 384
MEDOVIR 53
MEDOXERUTIN 594
MED-PIROXICAM 488
MED-RANITIDIN 516
MEDROL 16 405
MEDROL 32 405
MEDROL 4 405
MEDROXIPROGESTERON ACETAT 392
MEDROXYPROGESTERONUM 392
MEGACE 392
MEGAPRESS 251
MEGESIN 393
MEGESIN 40 mg 393
MEGESTROLUM 392
MEGESTRON 392
MEGUAN 401
MEGUAN 500 mg 401
MELAGENINA 850
MELATONINUM 393
MELOXICAM 7,5 mg, 15 mg 393
MELOXICAMUM 393
MELPHALANUM 394
MEMANTINUM 394
MEMO 755
MEMOTAL® 400 mg 486
MEMOTAL® 1 g/5 ml 486
MENCEVAX A + C 922
MENOGON 394
MENOTROPINUM 394
MENTHOLAX 867
MEPARTRICINUM 395
MEPIVACAINUM 395
MEPIVASTESIN 3% 395
MEPROBAMAT 396
MEPROBAMATUM 396
MEQUITAZINUM 396
MERCAPTOPURINUM 397
MERCILON 756
MERONEM 397
MERONEM (i.m.) 397
MERONEM (i.v.) 397
MEROPENEMUM 397
MESALAZINUM 398
MESID® 444
MESNUM 399
MESTINON 510
MESULENE 444
METADOXIL 399
METADOXINUM 399
METALYSE 10 000 561
METALYSE 6 000 561
METALYSE 8 000 561
METAMIZOL 400
METAMIZOL EEL 400
METAMIZOLUM NATRICUM 400
METANDIENONUM 400
METASPAR 756
METASTRON 549
METENAMIN 402
METFOGAMMA 401
METFORMIN AL 500 401
METFORMIN AL 850 401
METFORMIN BMS 401
METFORMIN LPH® 401
METFORMINUM 401
METHADONUM 402
METHENAMINUM 402
METHIMAZOL 572
METHOTREXAT "LEDERLE" 403
METHOTREXAT "LEDERLE" 1 000 403
METHOTREXAT "LEDERLE" 25 403
METHOTREXAT "LEDERLE" 5 000 403
METHOTREXAT "LEDERLE" 50 403
METHOTREXAT "LEDERLE" 500 403

METHOTREXAT EBEWE 403
METHOTREXAT EBEWE 10 mg 403
METHOTREXAT EBEWE 5 mg 403
METHOTREXAT EBEWE 50 mg 403
METHOTREXATUM 403
METHYLDOPUM 404
METHYLERGOMETRINUM 404
METHYLII NICOTINAS 404
METHYILPREDNISOLONUM ACEPONAT 407
METHYLPREDNISOLONUM 405
METILERGOMETRINĂ MALEAT 404
METIPRANOLOLUM 407
METOCLOPRAMID 408
METOCLOPRAMID 10 mg 408
METOCLOPRAMIDUM 407
METOPROLOL 408
METOPROLOL 100 mg 409
METOPROLOL 50 mg 409
METOPROLOL AL 100 409
METOPROLOL AL 50 409
METOPROLOLUM 408
METOVIM 100 409
METOVIM 50 409
METRONIDAZOL 410
METRONIDAZOL 250 mg 410
METRONIDAZOL 500 mg 410
METRONIDAZOL A 410
METRONIDAZOL A 0,5% 756
METRONIDAZOL B 410
METRONIDAZOLUM 409
MEVACOR® 384
MEXILETIN 200 mg 410
MEXILETINUM 410
MEXITIL 410
MEZYM FORTE 757
MIACALCIC 140
MIACALCIC NASAL-200 140
MIADENIL 140
MIALGIN 477
MIANSERIN 411
MIANSERIN 10 DESITIN 411
MIANSERIN 30 DESITIN 411
MIANSERINUM 411
MICARDIPLUS® 757
MICARDIS 560
MICETAL 293
MICETAL CREMĂ 293
MICETAL GEL 293
MICETAL SPRAY 293
MICONAFT 582
MICONAL ECOBI 412
MICONAL ECOBI LAVANDA VAGINALĂ 412
MICONAZOLUM 411
MICOTOP 412
MICOTOP GEL 2% 412
MICROGYNON® 21; MICROGYNON® 28 757
MICROLAX® 758
MICROSER 118
MIDAZOLAMUM 412
MIDODRINUM 413
MIDRO TEA 867
MILGAMMA® 758
MILGAMMA® N 758
MILGAMMA® N 758
MILK OF MAGNESIA (LAPTE Mg) 387
MILNACIPRANUM 413
MILTEFOSINUM 413
MILTEX 413
MILURIT 81
MINIDIAB 310
MINIPRESS 494
MINITEN 25 143
MINITEN 50 143
MINITRAN 5 447
MINITRAN 10 447
MINOXIDILUM 414
MINOXITRIM 414
MIOCHOL - E 50
MIOCOR 149
MIOFILIN 91
MIOFILIN 100 mg 91
MIOFILIN 25 mg UZ PEDIATRIC 91
MIORITMIN 92
MIOSTAT® 144
MIOSTIN 437
MIRAPEXIN™ 493
MIRENA® 375
MIRTAZAPINUM 414
MIRTILENE 867
MISOPROSTOLUM 415
MITOMICINUM 415
MITOXANTRONUM 415
MIVACRON 416
MIVACURIUM 416
MIVASTIN 10 540
MIVASTIN 20 540
MIXTARD® 20 HM NOVOLET 340
MIXTARD® 20 HM PENFILL 340
MIXTARD® 30 HM 340
MIXTARD® 30 HM PENFILL 340
MIXTARD® 30 INNOLET 340
MIXTARD® 30 NOVOLET 340
MIXTARD® 40 HM NOVOLET 340
MIXTARD® 40 HM PENFILL 340
MMR II 922
MOBILAT 759
MODAFEN® 759
MOLDAMIN® 115
MOLGRAMOSTIMUM 416
MOLSIDOMINUM 417
MOLSIHEXAL 1 mg 417
MOLSIHEXAL 4 mg 417
MOLSIHEXAL RETARD 417
MOMETASONUM 418
MOMETASONUM + ACIDUM SALICILICUM 419
MONAZOLE 7 412
MONO MACK 356
MONO MACK DEPOT 356
MONOCID 159
MONOCLATE P 898
MONONITRON® 356
MONOPRIL 298
MONOTARD HM 340
MONTELUKASTUM 419
MONURAL 298
MORADOL 134
MORFINĂ 421
MORFINĂ-ATROPINĂ 760
MORNIFLUMATUM 420
MOROXIDIN 420
MOROXYDINUM 420
MORPHYNUM 421
MORRIS 867
MOTILIUM 239
MOTILIUM 10 mg 239
MOTILIUM LINGUAL 239

MOVALIS 393
MOXIFLOXACINUM 422
MOXILEN 95
MOXILEN FORTE 95
MOXONIDINUM 422
MST CONTINUS 10 mg 421
MST CONTINUS 100 mg 421
MST CONTINUS 200 mg 421
MST CONTINUS 30 mg 421
MST CONTINUS 60 mg 421
MUCOFALK APPLE 867
MUCOFALK ORANGE 868
MUCONASAL® PLUS 586
MUCOSOL 148
MUCOSOLVAN 87
MUCOSOLVAN JUNIOR 87
MUCOTREIS 148
MUCOVIM 100 51
MUCOVIM 200 51
MULTI SYMPTOM F. TYLENOL COLD 761
MULTIBIONTA® JUNIOR 761
MULTIBIONTA® PLUS CALCIU ŞI MAGNEZIU 761
MULTIBIONTA® PLUS MINERAL 761
MULTIGLUTIN 761
MULTIHANCE 62
MULTIROVITAL 762
MULTISIS V 762
MULTIVITAMINE 762
MULTIVITAMINE PLUS FIER 763
MUPIROCINUM 423
MUSE 125 µg; 250 µg; 500 µg; 1000 µg 83
MUSTOPHORAN 299
MUTAMYCIN 415
MUXOL cpr. 87
MUXOL sol. orală 87
MYCOBUTIN 521
MYCO-FLUSEMIDON 122
MYCOHEAL 412
MYCOHEAL 200 412
MYCOMAX 50 283
MYCOMAX 150 283
MYCOMAX INF 283
MYCOMAX SIR 283
MYCOPHENOLATUM 423
MYCOSPOR® 122
MYCOSPOR® ONYCHOSET 763
MYCOSYST 50 mg 283
MYCOSYST 100 mg 283
MYCOSYST 150 mg 283
MYCOSYST 200 mg 283
MYD FRIN 480
MYDOCALM 582
MYDRIACYL 594
MYDRUM 594
MYLERAN 133
MYOBLASTAN 50 mg 570
MYOVIEW 570

N
NAAXIA 424
NABUMETONUM 424
N-ACETYL ASPARTYL GLUTAMAT DE MAGNEZIU 424
NaCl INFUNDIBILE 0,9% 434
NACLOF 223
NADROPARINUM 424
NAFA-GAL 428
NAFAZIN 465
NAFTIDROFURYLUM 426
NAFTIFINUM 426
NAFTILONG 426
NAKLOFEN 223
NAKOM 373
NAKOM MITE 373
NALIDIXIC ACID 67
NALIXID® 500 mg 68
NALORPHINE 427
NALORPHINUM 427
NALOXONUM 427
NANDROLOLUM 428
NAPHAZOLINUM 428
NAPHCON-A 763
NAPOSIM 400
NAPROREX 500 429
NAPROXENUM 429
NARAMIG 430
NARATRIPTANUM 430
NARCANTI 427
NARCOTAN 318
NAROPIN 528
NASACORT® AQ 589
NASAL SPRAY 465
NASIVIN 0,01% 465
NASIVIN 0,025% 465
NASIVIN® 465
NASONEX 418
NASPOR 161
NATAMYCINUM 430
NATRII AMIDOTRIZOAS 431
NATRII AUROTHIOMALAS 432
NATRII CALCII EDETAS 433
NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM CUM LACTATO (SOL. HARTMANN) 764
NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM GLUCOSO 5% 763
NATRII CHLORIDUM 433
NATRII CYCLAMAS 435
NATRII FLUORIDUM 435
NATRII THIOSULFAS 435
NATULAN 499
NATURLAND CALLEDDULA BALM 868
NATURLAND INNO-RHEUMA 868
NATURLAND SPORTS KREM 868
NAVELBINE 605
N-DICLOFENAC 223
NEBILET® 436
NEBIVOLOLUM 436
NEDOCROMIL SODIUM 436
NEFRIX 322
NELFINAVIRUM 437
NELOREN 378
NEMATOCTON 485
NEMOTAN 445
NEO ENDUSIX 562
NEOBACIN 764
NEOCOPIRIN 764
NEOCRYSTEPIN 765
NEODEX 765
NEODOLPASSE 766
NEO-ENTEROSEPTOL® 382
NEO-PANPUR 764
NEOPREOL 766
NEORECORMON 500 257
NEORECORMON 1000 257
NEORECORMON 10000 257
NEORECORMON 2000 257

NEORECORMON 4000 257
NEORECORMON 5000 257
NEOSTIGMINI BROMIDUM 437
NEOTIGASON 74
NEOTON 298
NEOXAZOL® 551
NETILMICINUM 438
NETROMYCINE 438
NETTACIN 438
NEUPOGEN 281
NEURIPLEGE® 25 mg 174
NEUROL 0,25 82
NEUROL 1,0 82
NEUROMULTIVIT 766
NEURONTIN 301
NEUROSTIM 400 mg 302
NEUROSTIM 400 mg 486
NEUROSTIM 800 mg 302
NEUROSTIM 800 mg 486
NEUROTOP 145
NEVAKSON 1 g i.m. 165
NEVAKSON 500 mg i.m. 165
NEVIRAPINUM 439
NEVRALGIN 400
NEXIUM 20 mg 262
NEXIUM 40 mg 262
NICERGOLINUM 440
NICERIUM-10 440
NICERIUM-15 440
NICERIUM-30 440
NICLOSAMID 441
NICLOSAMIDUM 441
NICOLEN 766
NICORETTE MINT 441
NICOTINUM 441
NIDOFLOR 767
NIFADIL 442
NIFECARD XL 60 mg 442
NIFEDIPIN 442
NIFEDIPIN 10 mg 442
NIFEDIPIN PHARMAVIT 442
NIFEDIPIN RETARD 20 mg 442
NIFEDIPINUM 442
NIFLUGEL – GEL PERCUTANE 68
NIFLURIL 68
NIFLURIL 420
NIFURATELUM 443
NIFUROXAZIDUM 443
NILEFRIN sol. oft. 5% 480
NILFAN 173
NILIUM 286
NIMESIL 444
NIMESULID 100 mg 444
NIMESULID LPH 100 mg 444
NIMESULIDUM 444
NIMODIPIN 445
NIMODIPINUM 444
NIMOTOP 445
NIMOTOP® 445
NIPALKIN 381
NISOLDIPINUM 445
NISTATIN (STAMICIN) 451
NISTATINĂ 452
NITRAZEPAM 2,5 mg 446
NITRAZEPAM 5 mg 446
NITRAZEPAMUM 446
NITRENDIPIN 10 mg 446
NITRENDIPINUM 446
NITRO 5 mg/ml (conc. perf.) 447
NITRODERM TTS 5 447
NITROGLICERINĂ 447
NITROGLYCERINUM 447
NITRO-MACK RETARD 447
NITROMINT RETARD 447
NITROMINT® SUBLINGUAL 447
NITROPECTOR 475
NIX 477
NIZATIDINUM 448
NIZORAL 361
NIZORAL 200 mg 361
NIZOTIN® 150 mg 449
NIZOTIN® 300 mg 449
N-KETOCONAZOL 200 mg 361
N-METOCLOPRAMID 408
NOLICIN® 450
NOLVADEX 557
NOMEGESTROLUM 449
NON ASPIRIN CHILDREN'S CH 469
NONOXYNOLUM 450
NOOTROPIL® 486
NOOTROPIL® 800 mg 486
NOOTROPIL® 1200 mg 486
NORCURON 601
NORDITROPIN 543
NORDITROPIN PEN-SET 543
NORDITROPIN SIMPLEX 543
NORETHISTERONUM 450
NORFLOX 450
NORFLOX-400 450, 451
NORFLOXACIN 451
NORFLOXACIN 400 mg 451
NORFLOXACINĂ-400 451
NORFLOXACINUM 450
NORIDAY® 450
NORIT 147
NORIT CARBOMIX 148
NORMIX 523
NORMODIAB 869
NORMOPONDEROL 869
NORVASC 94
NORVIR 525
NO-SPA® 246
NO-SPA® FORTE 246
NOSTAMINE 767
NOVALGIN 400
NOVALMIN 400
NOVALOX 767
NOVANTRONE 415
NOVECIN 453
NOVESINE 0,4% 463
NOVO FAMOTIDINE 275
NOVO NORM® 517
NOVO-ATENOL 106
NOVOCALMIN 400
NOVO-DIFENAC 223
NOVO-DIFENAC SR 223
NOVOMIX 30 PENFILL 341
NOVOMIX® 30 FLEXPEN® 341
NOVOPONE 68
NOVO-RANITIDINE 516
NOVORAPID PENFILL® 341
NOVORAPID® FLEXPEN® 341
NOVOSEF® 0,5 g i.m. 165
NOVOSEF® 0,5 g i.v. 165
NOVOSEF® 1 g i.m. 165
NOVOSEF® 1 g i.v. 165

NOVOTHYRAL 768
NOVYNETTE 768
N-PARACETAMOL 469
N-PIRACETAM 486
N-PIROXICAM 20 mg 488
N-PREDNISON 496
N-PROPRANOLOL 10 mg 505
N-RANITIDIN 516
NUROFEN 327
NUROFEN FORTE 327
NUROFEN GEL 328
NUROFEN PT. COPII 328
NUROFEN RĂCEALĂ ŞI GRIPĂ 768
NUTRIFLEX LIPID PERI® 769
NUTRIFLEX LIPID PLUS® 769
NUTRINEAL PD4 CU 1,1% AMINOACIZI 769
NUTRINEAL PD4 CU 1,1% AMINOACIZI 955
NYCOPREN 250 mg 429
NYCOPREN 500 mg 429
NYLEX® 140
NYOLOL GEL® 577
NYSTATIN 452
NYSTATINUM 451

O
OBIDOXIMI CHLORIDUM 452
OBOLIZ 769
OCTAGAM 899
OCTANATE 900
OCTENISEPT 770
OCTREOTIDUM 453
OCULOTEC 519
OCULOTECT® FLUID 492
OCUVITE LUTEIN 770
ODASOL 456
ODISTON 431
ODOURLESS GARLIC 869
ODOXIL 154
OESCLIM 264
OESTROGEL 264
OFLOXACIN 453
OFLOXACINUM 453
OFLOXIN 200 453
OFLOXIN INF 453
OFRAMAX 250 mg 165
OFRAMAX 1 g 165
OKACIN 381
OLANZAPINUM 454
OLBETAM 74
OLICARD 40 RETARD 356
OLICARD 60 RETARD 356
OLINAPRIL 5 mg 251
OLINAPRIL 10 mg 251
OLINAPRIL 20 mg 251
OLOPATADINUM 455
OLYNTH 0,05% 607
OLYNTH 0,1% 607
OMACOR 770
OMEGAVEN 771
OMEPRAZOL 456
OMEPRAZOL 20 mg 456
OMEPRAZOLUM 455
OMERAN 456
OMEZ 456
OMNIC 558
OMNIPAQUE® 348, 349
OMNISCAN 302
ONDANSETRONUM 457
ONKOTRONE 416
OPATANOL® 455
OPHOSEPT 266
OPHTAGRAM 306
OPHTAMESONE 119
OPHTAMESONE-N 771
OPHTAMOLOL® 0,5% 577
OPHTAZOLIN 771
OPRASKIN 851
OPTICAL 772
OPTICAL COMPOUND 772
OPTI-FREE 851
OPTI-FREE ENZYMATIC CLEAN 851
OPTIMA FORTE 772
OPTIPRES 120
OPTOCAIN 3% 395
OPTOCAIN® 2% 772
OPTREX 870
ORACEF 155
ORAP FORTE 482
ORCIPRENALINUM 458
ORFIRIL 72
ORFIRIL® LONG 150 mg 72
ORFIRIL® LONG 300 mg 72
ORFIRIL® LONG 500 mg 73
ORFIRIL® LONG 1000 mg 72
ORFIRIL-150 72
ORFIRIL-300 72
ORFIRIL-300 RETARD 72
ORFIRIL-600 RETARD 72
ORGALUTRAN 304
ORGAMETRIL 385
ORLISTATUM 458
ORLOBIN 89
ORNIDAZOLUM 459
OROFAR 773
OROPIVALONE – BACITRACINE 773
OROSTIM 945
ORTANOL S 10 mg 456
ORTANOL® 456
ORUNGAL 357
OSCILLOCOCCINUM 878
OSELTAMIVIRUM 459
OSETRON 457
OSMOFUNDIN 10% 773
OSMOFUNDIN 10% N 773
OSMOFUNDIN 15% N 773
OSPAMOX 95
OSPEN 400 478
OSPEN 500 478
OSPEN 1000 478
OSPEN 1500 478
OSPEXIN® 155
OSSIN 435
OSTEO D 141
OSTÉOCYNÉSINE 879
OSTEOGENON 851
OSTEOVIT 774
OTALGIN 774
OTILONIUM BROMIDUM 460
OTIS-T 774
OTOCALM 775
OVA-MIT 191
OVESTIN 265
OVIDREL 314
OVOCON 353
OXACILINĂ 460, 461
OXACILINĂ 250 461

OXACILINĂ 500 461
OXACILINĂ FORTE 461
OXACILLINUM 460
OXALIN 461
OXALIPLATINUM 462
OXELADINUM 462
OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT 462, 463
OXIGEN NW 32 463
OXIGENUM 462
OXIMED 775
OXIS TURBUHALER 4,5 μg/doză 297
OXIS TURBUHALER 9 μg/doză 297
OXITOCINĂ S 466
OXYBRAL 604
OXYBRAL SR 604
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM 463
OXYBUTYNINUM 463
OXYCODONUM 464
OXYCONTIN® 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg 464
OXYMETAZOLINUM 465
OXYTEX® 775
OXYTOCIN 466
OXYTOCINUM 466

P
PACLITAXELUM 466
PACSIN 776
PADUDEN 328
PADUDEN SR 300mg 328
PAMECIL 98
PANADOL 470
PANADOL BABY 470
PANADOL EXTRA 776
PANADOL RAPIDE 470
PANADOL® 470
PANALBA 275
PANANGIN 776
PANCARDIN® 777
PANCURONII BROMIDUM 467
PAN-GENTAMICINE 306
PAN-KANAMYCINE 359
PANSORAL 777
PANTHENOL 217
PANTOPRAZOLUM 467
PANZCEBIL 777
PANZYTRAT® 778
PAPAVERINĂ 468
PAPAVERINĂ 100 mg 468
PAPAVERINĂ CLORHIDRAT 469
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM 468, 469
PARACETAMOL 470
PARACETAMOL 125 supoz. 470
PARACETAMOL 250 mg 470
PARACETAMOL 250 supoz. 470
PARACETAMOL LPH® 500 mg 471
PARACETAMOL PLUS 778
PARACETAMOL PT. COPII 471
PARACETAMOL SINUS 778
PARACETAMOLUM 469
PARACETOL 471
PARACOF® 779
PARAGRIPPE 879
PARAMIDOL 471
PARAMOL 471
PARASIDOSE 852
PARECOXIBUM 471
PARIET 513
PARODONTAX C 779
PARODONTAX F 779
PAROXAT 472
PAROXETINUM 472
PAVULON 467
PAXELADINE 462
PAXENE 466
PECTOLYN ANTITUSSIVE 779
PECTONIT 475
PEDI-DENT 435
PEDILIN 388
PEDILIN 780
PEFLACINE 472
PEFLOXACINUM 472
PEGASYS® 135 μg 473
PEGASYS® 180 μg 473
PEGINTERFERON ALFA-2a 473
PEGINTERFERON ALFA-2b 474
PEGINTRON 474
PENCICLOVIRUM 475
PENHEXAL SAFT 479
PENICILINĂ G POTASICĂ 116
PENICILINĂ G SODICĂ 117
PENICILINĂ V 479
PENICILINĂ V 400000 479
PENICILINĂ V 1000000 479
PENTACARD 10 356
PENTACARD 20 356
PENTACARD 40 356
PENTACT-HIB 923
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS 475
PENTALONG 475
PENTASA 398
PENTAZOCINUM 475
PENTILIN 73
PENTOXI RETARD 400 mg 476
PENTOXIFILIN 476
PENTOXIFYLLINUM 476
PENTREXYL 99
PERCUTALGINE 780
PERINDOPRILUM 477
PERITOL 206
PERMETHRINUM 477
PERMINOX 870
PETHIDINUM 477
PETINIMID 268
PETNIDAN 268
PHARMA FERRUM sol. 5% 201
PHARMAPIRIN 55
PHARMAPIRIN T 55
PHARMARUBICIN C.S. 256
PHARMATEX® 1,2% 115
PHARMATEX® 18,9 mg 115
PHARMATON® capsule 780
PHENIDEX 781
PHENOBARBITALUM 478
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM 478
PHENYDAN 481
PHENYLBUTAZONUM 479
PHENYLEPHRINUM 480
PHENYLHYDRARGYRI BORAS 481
PHENYTOINUM 481
PHLOGENZYM® 781
PHOSPHON – KIT IN VIVO TC99M 781
PHYSIOTENS 0,2 422
PHYSIOTENS 0,3 422
PHYSIOTENS 0,4 422
PHYTOMENADIONUM 481
PIAFEN 782

PIASCLEDINE® 300 782
PIERAMI 90
PIKOVIT® 783
PIKOVIT® D 783
PIKOVIT® FORTE 783
PILOCARPIN 482
PILOCARPINUM 482
PILOGEL HS 482
PIMAFUCIN 430
PIMAFUCORT® 783
PIMOZIDUM 482
PINK BISMUTH STRES LIQUID 123
PINK TABLETES 123
PINOSOL 783
PIOGLITAZONUM 483
PIPECURONII BROMIDUM 483
PIPERACILINUM 484
PIPERAZINUM 485
PIPRIL 484
PIRACETAM 486
PIRACETAM 400 mg 486
PIRACETAM 800 mg 486
PIRACETAMUM 485
PIRAZINAMIDĂ 510
PIREHEXAL 25 487
PIREHEXAL 50 487
PIRENZEPINUM 487
PIRIBEDILUM 487
PIRITINOL 511
PIRIVIN-C 784
PIROXICAM 488
PIROXICAM 20 mg 488
PIROXICAMUM 488
PIROXICAMUM – BETA - CYCLODEXTRINUM 490
PIROXIGEL 488
PIROXSAL® 488
PIROXSAL® GEL 0,5% 489
PIVALAT DE FLUMETAZON 285
PIVALAT DE FLUMETAZON N 285
PIVALONE 580
PIVALONE 1% 580
PIVALONE NEOMYCINE 784
PLAK OUT 173
PLANTAGINOL 784
PLAQUENIL 326
PLATAMINE 185
PLATIDIAM 10 185
PLATIDIAM 25 185
PLATIDIAM 50 185
PLATINEX 185
PLAVIX® 194
PLEGOMAZIN® 175
PLENDIL 276
PLESID 2,5 mg 276
PLESID 5 mg 276
PLESID 10 mg 276
PLOPISAN 870
PNEUMO 23 923
POBILAN 76
PODOPHYLLOTOXINUM 491
POLCORTOLONE 589
POLIDIN 945
POLIO SABIN ORAL 924
POLIORAL 924
POLIVITAMINIZANT S 785
POLYGYNAX 785
PORPHYROCIN 262
PORTAL 289
POSTINOR® 2 375
POVIDON - IODINE 491
PRALIP 493
PRAMIDIN 10 408
PRAMIDIN 20 408
PRAMIPEXOLUM 493
PRAMIRACETAMUM 493
PRAMISTAR® 493
PRAVASTATINUM 493
PRAZIQUANTELUM 494
PRAZOSINUM 494
PREDNICABATUM 495
PREDNISOLONUM 495
PREDNISON 496
PREDNISON 5 mg 496, 497
PREDNISON ARMEDICA 497
PREDNISONUM 496
PREDUCTAL® 592
PREDUCTAL® MR 592
PREGNYL 314, 315
PREGVIT ZINC 785
PREMARIN 0,625 mg 266
PREMARIN 1,25 mg 266
PREMELLA 2,5 786
PREMELLA 5 786
PRENACID 214
PRESSICAINE FLUID 377
PRESTARIUM 477
PREVENAR 924
PRIMALAN 396
PRIMALAN 5 mg 396
PRIMALAN 10 mg 396
PRIMASEPT MED 786
PRIMIDON 498
PRIMIDONUM 498
PRINZIDE 786
PRIORIX 925
PRISNAMICINUM 499
PRITOR 560
PRITORPLUS® 787
PROCAINUM 499
PROCARBAZINUM 499
PROCHLORPERAZINUM 500
PROCTO-GLYVENOL 787
PROCTOLOG 787
PROCULIN 428
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI) 500
PROFENID 362
PROFENID 100 mg 362
PROFENID LP 363
PROFILAR 364
PROFINAL 328
PROFLOX 472
PROGESTERON 501
PROGESTERONUM 501
PROGESTOGEL 501
PROGRAF® 556
PROGRAF® 1 mg 556
PROGRAF® 5 mg 556
PROMEBUTIN 592
PROMESTRIENUM 502
PROMETHAZINUM 502
PROMID 508
PRONORAN® 50 mg 487
PRONTOKET® 363
PROPAFENON AL 150 502

PROPAFENONĂ 502
PROPAFENONUM 502
PROPARACAINUM 503
PROPECIA 282
PROPIFENAZONA 507
PROPIONAT DE ERITROMICINĂ 262
PROPIVERINUM 504
PROPOFOL 1% "FRESINIUS" 504
PROPOFOL 2% "FRESINIUS" 504
PROPOFOL ABBOTT 504
PROPOFOLUM 504
PROPOLIS C 787
PROPOLIS PLUS-DIGESTIV 787
PROPOLIS PLUS-ECHINACEA 787
PROPOLIS PLUS-MARKOSEPT 788
PROPOLIS PLUS-SPIRULINĂ 788
PROPOSEPT 870
PROPRANOLOL 505, 506
PROPRANOLOL 10 mg 505
PROPRANOLOL 40 mg 505
PROPRANOLOLUM 505
PROPYPHENAZONUM 507
PROSCAR® 282
PROSPAN 788
PROSTAMOL UNO® 870
PROSTAPHLIN 461
PROSTIN E2 233
PROTAMIN SULFAT 507
PROTAMINE SULFATE 507
PROTAMINI SULFAS 507
PROTEIN SUCCINILAT DE FER 507
PROTIONAMIDUM 508
PROTOPEN 400 328
PROTOXID DE AZOT 508
PROTOXID DE AZOT 508
PROZAC 289
PSEUDOEFEDRINUM 509
PSEUDOEPHEDRINE 509
PSORIANOL 0,5% 236
PSORIANOL 1% 236
PULMEX-BABY 788
PULMICORT TURBUHALER 129
PULMICORT® 0,125 mg/ml 129
PULMICORT® 0,25 mg/ml 129
PULMICORT® 0,5 mg/ml 129
PULMODEXANE 219
PULMOZYME® 240
PUREGON 50 UI 296
PUREGON 100 UI 296
PUREGON 150 UI 296
PURI-NETHOL 397
PYCNOGENOL 870
PYGEUM AFRICANUM 509
PYLORID 516
PYOSTACINE 250 mg 499
PYOSTACINE 500 mg 499
PYRANTELUM 509
PYRAZINAMIDUM 510
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM 510
PYRIDOXINUM 510
PYRITHIONUM ZINCICUM 511
PYRITINOLUM 511
PYRVINII CHLORIDUM 512

Q
QUAMATEL 20 mg 275
QUAMATEL 40 mg 275
QUARELIN 789
QUETIAPINUM 512
QUINAPRILUM 513
QUINAX 108
QUINTOR 183

R
RABEPRAZOLUM 513
RABIPUR 925
RACECADOTRILUM 514
RACEXON 1 g 165
RALOXIFENUM 514
RAMIPRILUM 515
RANIBERL 516
RANIL 602
RANITAL® 516
RANITIDIN 516
RANITIDIN 150 mg 516
RANITIDIN 300 mg 516
RANITIDINĂ 516
RANITIDINUM 515
RANITIN 150 mg, 300 mg 516
RANITIN 150, 300 516
RANOLIP 379
RANTUDIL FORTE 49
RANTUDIL RETARD 49
RAPAMUNE 541
RAPILYSIN® 10 U 518
RAUNERVIL 518
R-CIN 522
REBETOL 521
REBETRON 346
REBETRON® 789
REBIF 22 micrograme 346
REBIF 3 micrograme 346
REBIF 3000000 346
REBIF 44 micrograme 346
REBOXETINUM 517
RECOFOL 504
RECORMON NEU 1000 ie 257
RECORMON NEU 2000 ie 257
RECORMON NEU 5000 ie 257
RECORMON NEU 10000 ie 257
REDERGIN 198
REDOXON 58
REDUCTIL® 10 MG 537
REDUCTIL® 15 MG 537
REFEN RETARD 223
REFEN® 223
REFORTAN® 789
REGADRIN-B 121
REGAINE 414
REGENON 87
REGULAX® 871
RELAXAM 570
RELENZA® 608
RELIFEX 424
REMALGIN 500 mg 400
REMERON 414
REMESTYP 566
REMICADE 336
REMICYN 245
REMNEVRAL 790
REMOTIV 871
RENAGEL® 536
RENALEX 790
RENITEC 251
RENNIE 791
REOPRO 47

REPAGLINIDUM 517
REPARIL 791
REPLAGAL 76
REQUIP 528
RESERPINUM 518
RESOVIST 280
RETARPEN 1,2 115
RETARPEN 2,4 115
RETEPLASUM 518
RETIN-A® 588
RETINOLUM 519
RETROVIR 608
REUMADOR® 489
REUPROFEN 200 mg 328
REUPROFEN 400 mg 328
REUXEN 250 mg 429
REUXEN 500 mg 429
REVALID 791
REVASC® 213
REVIPARINUM 520
REVULSIN 792
REWODINA® 100 RETARD 223
REWODINA® -75 SF 223
REYATAZ 104
RHAMNOLAX 872
RHESOGAM 901
RHEUMAVEK 223
RHEUMAVEK EMULGEL 223
RHEUMON 269
RHINATHIOL 148
RHINOCORT AQUA 129
RHINOCORT® AQUA 129
RHINOIL 792
RHINXYL 607
RIBAVIRINUM 521
RIBOFLAVIN FOSFAT 521
RIBOFLAVINUM 521
RIBOMUNYL 926
RIFABUTINUM 521
RIFAMPICIN 522
RIFAMPICINĂ 522
RIFAMPICINA CU IZONIAZIDA 792
RIFAMPICINUM 522
RIFAN® 150 mg 522
RIFATER 792
RifaximINum 523
RIFINAH 150 793
RIFINAH 300 793
RIGEVIDON 793
RIGEVIDON® 21+7 793
RILCAPTON-25 143
RILMENIDINUM 523
RILUTEK 524
RILUZOLUM 524
RINGER'S 794
RINOALERSIN 794
RINOALERSIN FORTE 794
RINOFUG 428
RINOGUT 428
RINONEF-T 795
RINOSIN 795
RINOXIN 465
RISEK 456
RISELLE 264
RISPERIDONUM 524
RISPOLEPT 524
RITONAVIR 525
RITUXIMABUM 525
RIVASTIGMINUM 526
RIVOTRIL 193
RIXATIVE 872
RIZATRIPTANUM 526
ROACCUTANE® 357
ROBITUSSIN ANTITUSSICUM 219
ROBITUSSIN EXPECTORANS 317
ROBITUSSIN JUNIOR 219
ROCALTROL® 141
ROCEPHIN 165
ROCKLE'S 795
ROCURONIUM BROMIDE 527
RODILEMID 795
ROFEDEX 219
ROFERON A-PEN 344
ROFERON® A 343, 344
ROGLUTEN 90
ROHYPNOL 286
ROHYPNOL 1 mg 286
ROKSOLIT 530
ROLETRA 383
ROMATIDINE® 150 mg 516
ROMAZULAN 872
ROMENER 390
ROMERGAN 502
ROMERGAN 30 mg 502
ROMISODIN 355
ROMPARKIN 591
ROMPARKIN® 2 mg 591
ROMPIRIN 55
ROMPIRIN PLUS 796
ROPINIROLUM 528
ROPIVACAINUM 528
ROSIGLITAZONUM 528
ROSUVASTATINUM 529
ROUVAX 926
ROVAMYCINE 546
ROVITAL C 796
ROWACHOL 797
ROWATINEX 797
ROXITHROMYCINUM 530
ROYAL JELLY 797
RUBIFEN® 363
RUBJOVIT 797
RUBRIMENT 798
RUBRIMENT - N 798
RUDI-ROUVAX 927
RUDIVAX™ 927
RUDOTEL 391
RULID 530
RULID 150 530
RULID 300 530
RUMEYN 872
RUPAN 328
RUSEDAL 391
RUTACID 325
RUTINOSCORBIN® 798
RUVOMINOX 223
RYTMONORM® 503

S

SAB SIMPLEX 539
SABRIL 603
SACCHARINUM 531
SADAMIN® 606
SAFORELLE 798
SALAMOL® EASI-BRETHE 531
SALAMOL® INHALER 531

SALAZIDIN 500 mg 553
SALAZOPYRIN 553
SALAZOPYRIN-EN 553
SALBUTAMOL 531
SALBUTAMOL T 531
SALBUTAMOLUM 531
SALDOREN® 475
SALMET - T 798
SALMETER 532
SALMETEROLUM 532
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM 533
SALOFALK 4 g ENEMAS 398
SALOFALK-250 398
SALOFALK-500 398
SALOZINAL 398
SAMIXON 165
SANADOR 471
SANADOR EXTRA 799
SANA-SOL 799
SANDIMMUN NEORAL 177
SANDOSTATIN 453
SANFICINATE 138
SANFICINATE® 100 138
SANFICINATE® 200 138
SANFICINATE® 350 138
SANFINAC 223
SANTADERM 799
SANTAMIN 198
SANTAPIRIN 56
SANVAL 5 mg, 10 mg 609
SAPROMED 176
SAPROSAN® 100 mg 176
SAQUINAVIRUM 533
SARE FĂRĂ SODIU 799
SARGENOR 1 g 103
SARGENOR 200 mg/ml 103
SARIDON 800
SCANDONEST 2% SPECIAL 800
SCANDONEST 3% PLAINE 395
SCOBUNORD 135
SCOBUSAL 10 mg 135
SCOBUTIL 135
SCOBUTIL-COMPUS 800
SCOPANTIL 135
SECATOXIN 198
SEDACORON 92
SEDATIF PC 879
SEDOCALM 873
SEFOTAK 0,5 g 161
SEFOTAK 1 g 161
SELECIM® 5 mg 534
SELEGILINE TEVA 534
SELEGILINUM 534
SELEGOS 534
SELENIUM 535
SELSUN® 535
SENSODYNE BARBIE GEL 435
SENSODYNE F 800
SENSODYNE F GEL 800
SEPTANEST CU ADRENALINĂ 1/100.000; 1/200.000 800
SEPTOFORT 173
SEPTOGAL 801
SEPTOLETE 801
SEPTOLETE D 801
SEPTRIN 552
SER ANTICĂRBUNOS NATIV 939
SER ANTIDIFTERIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT 940
SER ANTIGANGRENOS POLIVALENT PURIFICAT ŞI CONCENTRAT 940
SER ANTIPERFRINGENS PURIFICAT ŞI CONCENTRAT 940
SER ANTIRABIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT 941
SER ANTITETANIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT 941
SER ANTITETANIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT 941
SER FIZIOLOGIC 434
SERETIDE DISKUS 50/100, 50/250, 50/500 533
SERETIDE DISKUS 50/100; 50/250; 50/500 801
SERETIDE INHALER CFC FREE® 25/250 μg; 25/125 μg; 25/50 μg 801
SERETIDE® 25/50 ?G, 25/125 ?G, 25/250 ?G INHALER CFC FREE 533
SEREVENT 532
SERLIFT 535
SERMION® 440
SEROCRYPTIN 128
SEROQUEL® 512
SEROQUEL® "4 DAY STARTER PACK" 512
SEROXAT 472
SEROXAT LIQUID 472
SERTACONAZOLUM 535
SERTRALINUM 535
SERVIFLOX 183
SEVELAMER 536
SEVOFLURANUM 536
SEVORANE® 536
SEVREDOL 421
SIBUTRAMINUM 537
SICALGIN 802
SICOLAX 386
SICOSEPT® 492
SICOVIT A + D_2 802
SICOVIT E 100 mg 581
SICOVIT® A 10000 UI 519
SICOVIT® A 300000 UI 519
SICOVIT® B_1 10 mg 573
SICOVIT® B_1 100 mg/2 ml 573
SICOVIT® B_6 50 mg/2 ml 510
SICOVIT® B_6 250 mg 510
SICOVIT® B_6 250 mg/5 ml 510
SICOVIT® D2 400000 UI/1 ml 259
SICOVIT® D2 600000 UI/1 ml 259
SICOVIT® D_3 200
SIFICETINA 172
SIFLOKS® 184
SILDENAFILUM 538
SILIBINUM 539
SILIBINUM 539
SILIMARINĂ 539
SILMARINA 539
SILUBIN RETARD 130
SILYMARIN INSTANT 539
SILYMARIN LFM 539
SIMETHICONUM 539
SIMULECT 112
SIMVASTATIN 10 mg 540
SIMVASTATIN 20 mg 540
SIMVASTATINUM 540
SIMVOR 10 mg 540
SIMVOR 20 mg 540
SIMVOR 40 mg 540
SIMVOR 5 mg 540
SINDAXEL® 100 mg/16,67 ml 466

SINDAXEL® 260 mg/43,33 ml 466
SINDAXEL® 30 mg/ml 466
SINDOVIN 604
SINDRONAT 400 mg 59
SINDROXOCIN® 10 mg 243
SINDROXOCIN® 50 mg 243
SINECOD 134
SINEMET CR® 25/100 373
SINEMET CR® 50/200 373
SINERDOL 522
SINERGOLIN 10 440
SINFOSFAMIDA 204
SINGULAIR 419
SINGULAIR® 419
SINOPRYL 379
SINPLATIN 10 185
SINPLATIN 50 185
SINTALGON 402
SINTOCALMIN 400
SINTOFOLIN 320
SINTOPOZID 100 mg/5 ml 271
SINTROM 49
SINUPRET 873
SIOFOR 500 402
SIOFOR 850 402
SIPROTILIN® 389
SIRAN 200 BRAUSE 51
SIRAN LONG 51
SIRAN® 200 51
SIROFER 802
SIROGAL 803
SIROLIMUS 541
SIROP DE PĂTLAGINĂ 803
SIROP EXPECTORANT 803
SKENAN LP 421
SKIN CAP 511
SKINOREN 59
SMECTA 233
SMOODERM 588
SOD NATURAL 873
SODIO CLORURO 434
SODIUM CHLORIDE 434
SODIUM DICARBONICUM 541
SODIUM HYALURONATE 542
SODIUM PICOSULFAT 542
SOL. PT. HEMOFILTRARE HF 23 956
SOLIAN 50 mg 92
SOLIAN 200 mg 92
SOLIAN 400 mg 92
SOLPADEINE 803
SOLPADEINE SOLUBLE 804
SOLPAFLEX GEL 328
SOLTRAN 804
SOLU-DECORTIN H50; H250 495
SOLUDIAL BICARBONATE 750 g 542
SOLU-MEDROL™ 405
SOLU-MEDROL™ ACT-O-VIAL™ 405
SOLUŢIE AURICULARĂ CU CLORAMFENICOL ŞI FLUOCINOLON 804
SOLUŢIE HARTMAN 805
SOLUŢIE PERFUZABILĂ RINGER 805
SOLUŢIE RINGER 805
SOLUŢIE RINGER FRESENIUS 805
SOLUŢIE RINGER LACTAT 806
SOLUTIO RINGER 806
SOMATROPINUM 543
SOMATULINE® PR 30 mg 367
SORBIFER DURULES 806
SORBITOL 50 g/l 544
SORBITOLUM 544
SOREL 0,005% 140
SORTIS 10 mg 106
SORTIS 20 mg 106
SORTIS 40 mg 106
SORTIS 80 mg 106
SOSTATIN 361
SOTAGAMA 160 544
SOTAGAMA 80 544
SOTALOL 544
SOTALOL AL 80 544
SOTALOL AL 160 544
SOTALOLUM 544
SOTILEN 20 489
SOTRET 357
SPARFLOXACINUM 545
SPARTEINUM 545
SPASMOMEN 460
SPECICEF-N 157
SPECTINOMYCINUM 545
SPERSADEX COMP® 807
SPERSALLERG 807
SPIRAMICINUM 546
SPIRIVA® 18 μg 579
SPIRONOLACTONĂ 25 mg 546
SPIRONOLACTONUM 546
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMID 547
SPIROSINE 161
SPITOMIN 5 mg 133
SPITOMIN 10 mg 133
SPITOMIN 5 mg 133
SPORANOX 357
SPORANOX 357
STADAGLICIN® 60
STADALAX® 123
STAMICIN ® 500000 UI 452
STAMIN 486
STANDACILLIN 99
STAVUDINUM 548
STAZEPINE 145
STILNOX® 10 mg 610
STIMUVEN 873
STOCRIN 249
STOCRIN 30 mg/ml 249
STOCRIN™ 249
STODAL 880
STOPTUSSIN 134
STOPTUSSIN 808
STREPFEN® 291
STREPSILS + VITAMINA C 808
STREPSILS CLASIC® 808
STREPSILS MENTOL ŞI EUCALIPTOL® 808
STREPSILS MIERE ŞI LĂMÂIE® 808
STREPSILS PLUS 808
STREPTASE® 548
STREPTOKINASUM 548
STREPTOMICINĂ SULFAT 549
STREPTOMYCINUM 549
STRESSIGAL 133
STREVITAL 549
STRONTIUM CLORIDE 549
STRUCTOLIPID® 20% 808
STUGERON 180
STUGERON 25 mg 180
STUGERON FORTE 180
SUCRALAN 550

SUCRALFATUM 550
SUCRAPHIL-1000 550
SUDAFED 509
SULBUTIAMINUM 550
SULFADIAZINUM 550
SULFAFURAZOL 551
SULFAFURAZOLUM 551
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM 551
SULFASALAZIN-EN 553
SULFASALAZINUM 553
SULFAT DE ATROPINĂ 108
SULFAT DE BARIU PRO RÖNTGEN 112
SULFAT DE MAGNEZIU 388
SULFAT DE SPARTEINĂ 545
SULODEXIDUM 553
SULOTRIM 552
SULPERAZON 2 g 808
SULPIRIDUM 554
SULTAMICILLINUM 554
SUMAMED 110
SUMAMED FORTE 110
SUMATRIPTANUM 555
SUMETROLIM 552
SUPER BIO-QUINONA Q 10 809
SUPERCORTIZOL 495
SUPERPREDNOL 215
SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU ADULŢI 314
SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU COPII 314
SUPPORTAN DRINK 810
SUPPORTAN® 809
SUPRADYN 810
SUPRADYN FORTE 810
SUPRAVIRAN 53
SUPRAVIRAN 200 53
SUPRAVIRAN 400 53
SUPRAVIRAN 800 53
SUPRECUR 132
SURVANTA® 852
SURVIMED OPD 810
SURVIMED RENAL 811
SUXAMETHONII CHLORIDUM 555
SUXILEP 268
SYMPHORAL 10 mg 383
SYNACHTEN DEPOT 568
SYNAROME 106
SYNTOMEN 400 268
SYSCAN 100 283
SYSTANE® 812

T
TACHOCOMB 812
TACHYSTIN 230
TACROLIMUS 556
TADALAFILUM 557
TADENAN 50 mg 509
TADOR 216
TAFEN® NASAL 129
TAFEN® NASAL 1 mg/ml 129
TAFEN® NOVOLIZER 200 µg 129
TAGREMIN 552
TAGREMIN® 480 552
TAGREMIN® FORTE 552
TALCID 325
TALEUM 60
TALINOLOLUM 557
TAMBOCOR 50 282
TAMBOCOR 100 282
TAMIFLU 12 mg/ml 459
TAMIFLU 75 mg 459
TAMONEPRIN 557
TAMOXIFEN 557
TAMOXIFENUM 557
TAMSULOSINUM 558
TANAKAN (EGB 761) 307
TANATRIL 331
TANTUM CREMĂ FORTE 5% 116
TANTUM GEL 5% 116
TANTUM ROSA 116
TANTUM VERDE 0,15% 116
TANTUM VERDE 0,5% 116
TANTUM VERDE P 116
TARDYFERON 812
TARDYFERON FOL 812
TARGOCID 558
TARIVID 453, 454
TARKA 812
TAROSIN 812
TAUREDON 10 432
TAUREDON 20 432
TAUREDON 50 432
TAVANIC® 374
TAVEGYL 188
TAVER 145
TAXOL® 466
TAXOTERE 237, 238
TAZIDIL® 20 mg 592
TAZOCIN 813
TEARS NATURALE FREE 814
TEARS NATURALE® II 814
TEGRETOL 145
TEGRETOL CR 200 145
TEGRETOL CR 400 145
TEICOPLANINUM 558
TELFAST 120 281
TELFAST 180 281
TELITRAMICINUM 559
TELMISARTANUM 560
TEMODAL 560
TEMOZOLOMIDUM 560
TENAXUM 523
TENECTEPLASUM 561
TENONITROZOLUM 562
TENORMIN 106
TENOXICAM 562
TENOXICAM 20 mg 562
TENOXICAMUM 562
TENSAPRIL 251
TENSAPRIL TENSAPRIL® H 814
TENSAPRIL® H 814
TEOFILINĂ SR 100 mg 571
TEOFILINĂ SR 200 mg 571
TEOFILINĂ SR 300 mg 571
TEOFILINĂ SR 50 mg 571
TEOTARD®-200 571
TEOTARD-350 571
TERAZOSIN 563
TERAZOSINUM 563
TERBINAFINUM 564
TERBISIL® KID 564
TERBISIL® 250 mg 564
TERBUTALINUM 565
TERFENADINUM 565
TERGYNAN 815
TERIDIN 565
TERIDIN FORTE 565
TERIPARATIDUM 566

TERLIPRESSINUM 566
TERTATOLOLUM 567
TERTENSIF 334
TERTENSIF SR 334
TESLASCAN 388
TESOPALMED F. CUM YOHIMBIN 815
TESTOLENT 567
TESTOSTERON 567
TESTOSTERONUM 567
TETAGAM 902
TETAVAX 928
TETRACICLINĂ 569
TETRACICLINĂ 250 mg 569
TETRACICLINĂ CLORHIDRAT 569
TETRACOQ 928
TETRACOSACTIDUM 568
TETRACYCLINUM 569
TETRAZEPAMUM 570
TETROFOSMINUM 570
TETRYZOLINUM 571
TEVETEN 258
TEVETEN 600 258
THEINOL 815
THELMOX 389
THELMOX 100 389
THEO SR 100 571
THEO SR 200 571
THEO SR 300 571
THEOPHYLLINUM 571
THERMO - RHEUMON 816
THIAMAZOLUM 572
THIAMINUM 573
THIETHYLPERAZINUM 573
THIOCTACID 100 T 57
THIOCTACID 200 57
THIOCTACID 600 57
THIOCTACID 600 T 57
THIOGAMMA 600 57
THIOGAMMA 600 INJEKT 57
THIOGAMMA TURBO-SET 57
THIOGAMMA® TURBO-SET 57
THIOPENTAL 573
THIOPENTAL SODIUM 573
THIOPENTALUM 573
THIORIDAZINUM 574
THOMASIN 269
THOMASIN RETARD 269
THROMBO ASS 56
THYREOTOM 816
THYRO-4 376
THYROZOL® 10 572
THYROZOL® 20 572
THYROZOL® 5 572
TIANEPTINUM 575
TIAPRIDAL 100 mg 575
TIAPRIDAL 100 mg/2 ml 575
TIAPRIDUM 575
TIBERAL 459
TICARCILLINUM 575
TICLID 250 mg 576
TICLODIN 576
TICLOPIDINE POLI 576
TICLOPIDINUM 576
TIENAM® 333
TILADE® 436
TILADE® MINT 436
TILCOTIL 562
TIMENTIN 575
TIMO-GAL 577
TIMOLOL 577
TIMOLOL CHAUVIN 0,25% 577
TIMOLOL CHAUVIN 0,5% 577
TIMOLOL MALEATE 577
TIMOLOLUM 577
TIMONIL 145
TIMONIL 150, 300, 600 RETARD 145
TIMOPTIC 577
TINIDAZOLUM 577
TINIZOL® 578
TINIZOL® 500 mg 578
TINZAPARINUM 578
TIOGUANINUM 579
TIORIDAZIN 5 mg 574
TIORIDAZIN 50 mg 574
TIOSULFAT DE SODIU 435
TIOTROPIUM 579
TIPROGYN 500 mg 578
TIROFIBANUM 581
TISASEN 874
TISSUCHOL KIT 903
TIXOCORTOLUM 580
TOBRADEX 816
TOBRAMYCINUM 580
TOBREX® 580
TOBRIN 580
TOCOPHEROLUM 581
TOFISOPAMUM 581
TOLBUTAMID 581
TOLBUTAMID 500 581
TOLBUTAMIDUM 581
TOLNAFTATUM 582
TOLPERISON 50 mg 582
TOLPERISONUM 582
TOLTERODINUM 583
TONOCALCIN 140
TONOLYSIN 2,5 mg 379
TONOLYSIN 5 mg 379
TONOLYSIN 10 mg 379
TONOLYSIN 20 mg 379
TONOTIL - N 817
TOPAMAX 583
TOPAMAX 25 583
TOPAMAX 50 583
TOPAMAX 100 583
TOPAMAX 200 583
TOPICORTEN - TAR 817
TOPIRAMATUM 583
TOPOTECAMUM 584
TORADOL 363
TORECAN 573
TOREMIFENUM 584
TOT'HEMA 817
TOXOGONIN® 452
TRACHISAN 818
TRACHISAN - LOZENGES 818
TRACRIUM® 107
TRACUTIL® 818
TRADOLAN® 585
TRAMADOL 585
TRAMADOL 50 SLOVAKOFARMA® 585
TRAMADOL AL 585
TRAMADOL AL 50 585
TRAMADOL AL 100 585
TRAMADOL EEL 585
TRAMADOL LPH® 50 mg 585
TRAMADOLUM 584

TRAMAGIT 585
TRAMAL 585
TRAMAL RETARD 100 mg 585
TRAMAL RETARD 150 mg 585
TRAMAL RETARD 200 mg 585
TRAMAZOLINUM 586
TRANDOLAPRILUM 586
TRANSULOSE 818
TRANXENE® 5 mg 194
TRANXENE® 10 mg 194
TRASTUZUMABUM 587
TRASYLOL 102
TRATUL 224
TRATUL 50 224
TRATUL 60 224
TRATUL 120 224
TRAVATAN® 587
TRAVOCORT® 819
TRAVOGEN 353
TRAVOPROSTUM 587
TRAZODONUM 588
TRECID 317
TRECID® 317
TRENTAL 476
TRETINOINUM 588
TRI - REGOL 819
TRIAMCINOLON ACETONID 589
TRIAMCINOLON S 820
TRIAMCINOLONUM 589
TRICOMICON 820
TRIDERM 821
TRIDIN 821
TRIETANOLAMINUM 590
TRIFERMENT 822
TRIFLUOPERAZIN 591
TRIFLUOPERAZINUM 591
TRIFLUSALUM 591
TRIHEXYPHENIDYLUM 591
TRIMEBUTINUM 592
TRIMEPRANOL 407
TRIMETAZIDINĂ 35 mg 592
TRIMETAZIDINUM 592
TRIMIDAR M 552
TRIMIDAR® M 552
TRIMOVAX 928
TRINITROSAN 447
TRIOVIT® 822
TRIPHOSPHADENINUM 593
TRIPTORELINUM 593
TRIQUILAR 822
TRISEQUENS 822
TRISILICALM 823
TRITACE 2,5 515
TRITACE 5 515
TRITACE® 10 mg 515
TRITANRIX-HB 929
TRITTICO AC 150 mg 588
TRITTICO AC 75 mg 588
TRIZIVIR 823
TROMBOSTOP 49
TROMETAMOL N 594
TROMETAMOLUM (THAM) 594
TROPICAMIDĂ 594
TROPICAMIDUM 594
TROPIXAL 594
TROXERUTIN 594
TROXERUTINUM 594
TROXERUTON 300 595
TROXEVASIN 595
TROXSAL® GEL 2% 595
TRUSOPT 241
TURFA 824
TUSIMUN 824
TUSINOGAL – A 824
TUSINOGAL – C 824
TUSOGAL 874
TUSOSEDAL 134
TUSSAMED sirop 190
TUSSEFAR 87
TUSSIN 219
TUSSIN FORTE 219
TUSSIN SIROP 219
TWINRIX ADULT 929
TWINRIX PEDIATRIC 930
TYLENOL EXTRA STRENGHT 471
TYPHERIX 930
TYZINE® 571

U
UBIDECARENONUM 595
UBISTESIN 824
UBISTESIN FORTE 825
UBRETID® 0,5 mg 235
UBRETID® 5 mg 235
UFEXIL 184
UFT 825
ULCERAN – 40 275
ULCEROTRAT 826
ULCORAN 516
ULCORAN FORTE 516
ULEI DE PEŞTE CU VITAMINA D 826
ULEI DE PEŞTE CU VITAMINELE A Ş D_2 826
ULFAMID 275
ULTOP 456
ULTRACORTENOL 495
ULTRALAN 287
ULTRAPROCT 826, 827
ULTRATARD HM 340
ULTRAVIST 240 350
ULTRAVIST 300 350
ULTRAVIST 370 350
UNASYN i.m./i.v. 100
UNASYN ORAL 554
UNDESTOR (ANDRIOL) 567
UNGUENT ANTIALGIC 224
UNGUENT CU ACICLOVIR 53
UNGUENT CU ACICLOVIR 5% 53
UNGUENT CU NICOTINAT DE METIL 404
UNGUENT CU SULF 8% 827
UNGUENT OFTALMIC CU KANAMICINĂ Ş HIDROCORTIZON 827
UNIDOX SOLUTAB 245
UNI-DUR 571
UNIPRES® 10 447
UNIPRES® 20 447
UNIRYLE 298
UPFEN 328
UPRIMA 2 mg 102
UPRIMA 3 mg 102
UPSARIN VITAMINE C 828
UPSAVIT VITAMIN C 1000 58
URALYT-U 828
URGENDOL 585
URGO IBUPROFEN 5% GEL 328
URGOCOR CORICIDE 71
URICOL 829
URINEX 829
URO – VAXOM 931
UROFOLLITROPINUM 596
UROGRAFIN 76% 431
UROGRAFIN® 76% 829
UROMITEXAN 200 mg 399
UROMITEXAN 400 mg 399
UROMITEXAN 600 mg 399
URSOFALK 71
URSOFALK® 71

URSOGAL 71
URSOSAN 71
USCOSIN 135
UTIBID 451
UTROGESTAN 501
UVOFED 830

V
V2 PLUS 830
VACCIN DIFTERIC ADSORBIT (VDA) 933
VACCIN BCG LIOFILIZAT PENTRU INOCULARE INTRADERMICĂ 932
VACCIN COMBINAT DIFTERO-TETANIC ADSORBIT (VCDT) 932
VACCIN COMBINAT DIFTERO-TETANO-PERTUSSIS ADSORBIT (VCDTP) 933
VACCIN DIFTERO-TETANIC PENTRU ADULŢI 931
VACCIN DIZENTERIC VIU ORAL VADIZEN 934
VACCIN GRIPAL TRIVALENT, PURIFICAT ŞI INACTIVAT 934
VACCIN POLIMICROBIAN 935
VACCIN STAFILOCOCIC 935
VACCIN STAFILOCOCIC PENTRU TRATAMENTUL ACNEEI ŞI FOLICULITEI STAFILOCOCICE 935
VACCIN STREPTOCOCIC 936
VACCIN TETANIC ADSORBIT (VTA) 936
VACCIN TIFOIDIC SUBCUTANAT 936
VAGIFEM 264
VAGOSTABYL 831
VALACYCLOVIRUM 596
VALCYTE 598
VALDECOXIBUM 596
VALEPIL 73
VALGANCICLOVIRUM 598
VALSARTANUM 599
VALTREX 596
VANCOCIN 599
VANCOMYCINUM (HYDROCHLORIDUM) 599
VANCO-TEVA 599
VAQTA (ADULT/PEDIATRIC) 937
vardenafilum 600
VARDOLIN® 130
VARILRIX 937
VASCOTEN 106
VASILIP 10 mg 540
VASILIP 20 mg 540
VASOCARDIN 409
VASOCARDIN 50 409
VASOCARDIN 100 409
VASONIT RETARD 600 476
VAXIGRIP 938
VECTAVIR 475
VECURONIUM 601
VEINAMITOLV 3500 mg 595
VEKFANOL 60
VEKFAZOLIN 166
VELBE 604
VENDAL RETARD 421
VENEN GEL 874
VENIMMUN N 904
VENLAFAXINUM 601
VENOFER 203
VENORUTON 595
VENORUTON 831
VENORUTON GEL 831
VENOTON 595
VENOTON 831
VENTER 550
VENTOLIN 531
VENTOLIN ACCUHALER 531
VENTOLIN® 532
VENTOLIN® INHALER CFC-FREE 532
VEPESID 271
VERAL® 224
VERAPAMIL 602
VERAPAMIL 40 602
VERAPAMIL 80 602
VERAPAMIL AL 40 602
VERAPAMIL AL 80 602
VERAPAMILUM 601
VERBITAL 121
VERCEF 250 mg 153
VERCEF 500 mg 153
VERMACARE 389
VERMIGAL 512
VERMOX 389
VEROGALID® ER 240 mg 602
VERORAB 938
VEROSPIRON 546
VERTEPORFINUM 603
VESANOID 588
VESSEL DUE F 553, 544
VFEND® 606
VIAGRA 538
VIATROMB 319
VIBRAMYCIN® 245
VIBROCIL 832
VIDAN 67
VIDEX 225, 226
VIDEX EC 125 mg 226
VIDEX EC 200 mg 226
VIDEX EC 250 mg 226
VIDEX EC 400 mg 226
VIGABATRINUM 603
VIGANTOL® OIL 200
VIGANTOLETTEN 500 200
VIGANTOLETTEN 1000 200
VIMAPRIL 251
VIMPOCETIN 5 mg 605
VINBLASTINUM 604
VINCAMINĂ 604
VINCAMINUM 604
VINCRISTINUM 604
VINORELBINUM 605
VINPOCETIN 5 mg 605
VINPOCETINE 605
VINPOCETINUM 605
VIPLEX 832
VIRACEPT 437
VIRACEPT® 250 mg 437
VIRAMUNE® 439
VIREGYT-K 85
VIROLEX 53
VISINE® 571
VISIPAQUE 348
VI-SOL CALCIUM 832
VISUDYNE 603
VITA-DAY 833
VITAM 833
VITAMAX 833
VITAMIN B COMPLEX 834
VITAMIN C EFF. INSTANT 58
VITAMIN E 100 581
VITAMIN E 200 581
VITAMIN E 400 581
VITAMINA A 519
VITAMINA A 50000 UI 519
VITAMINA A + D_2 834
VITAMINA A FORTE 519
VITAMINA A HIDROSOLUBILĂ 519
VITAMINA A inj. 300000 UI 519
VITAMINA B_{12} (SICOVIT B12) 203
VITAMINA B_6 510
VITAMINA B_6 50 mg 510
VITAMINA C 58
VITAMINA C 200 mg 58

VITAMINA C 250 mg 58
VITAMINA C 500 mg 58
VITAMINA C 60 mg 58
VITAMINA C+ 58
VITAMINA D_2 259
VITAMINA D_3 HIDROSOLUBILĂ 200
VITAMINA E 581
VITAMINA E FORTE 581
VITAMINA F 606
VITAMINA F 606
VITAMINAT 834
VITREOLENT 835
VOLTAREN 224
VOLTAREN EMULGEL 224
VOLTAREN RAPID 224
VOLTAREN RETARD 224
VOLUVEN® 835
VORICONAZOLUM 606
VORIHEP 874
VOSEPTOL 875
VURDON® 224
VVR 939

W
WARTEC 0,15% 491
WARTNER 836
WATER FOR INJECTION 853
WELLBUTRIN SR 132
WICK FORMEL 44 + HUSTEN 219
WICK INHALER 836
WICK KINDER FORMEL 44 219
WICK SINEX 465
WICK VAPORUB 836
WILPRAFEN 358
WOBE-MUGOS® E 853
WOBENZYM® 836

X
XALATAN 368
XALCOM 837
XALINAT 232
XALINAT® 100 mg 232
XALINAT® 16,5 mg/5 ml 232
XALINAT® 25 mg 232
XALINAT® 50 mg 232
XANAX 82
XANAX XR 82
XANTINOLI NICOTINAS 606
XATRAL LP 5 mg 80
XATRAL SR 10 mg 80
XEFO 383
XEFO 8 mg 383
XELODA 150 mg 142
XELODA 500 mg 142
XENICAL 458
XIGRIS® 246
XILINĂ 377
XILINĂ 4% 377
XILINĂ CU ADRENALINĂ 837
XILINĂ UZ CARDIOLOGIC 377
XOROX 53
XOROX® 200 mg 53
XOROX® 250 mg 53
XOROX® 400 mg 53
XOTIC 838
XYLESTESIN A 838
XYLESTESIN PUMPSPRAY 377
XYLO AL 0,05% 607
XYLO AL 0,1% 607
XYLOCAINE 2% 377
XYLOCAINE 5% HEAVY 377
XYLOCAINE 0,5% 377
XYLOCAINE 1% 377
XYLOCAINE 10% SPRAY 378
XYLOCAINE ADRENALINE 838
XYLOCAINE ADRENALINE 0,5% 838
XYLOCAINE ADRENALINE 1% 838
XYLOCAINE ADRENALINE 2% 838
XYLOCAINE JELLY 378
XYLOCONTACT 378
XYLOMETAZOLINUM 607
XYLONOR 378
XYZAL 372

Y
YASMIN 839

Z
ZADITEN 364
ZAGAM 545
ZAHARINĂ 531
ZALAIN 535
ZALCITABINUM 607
ZANAMIVIRUM 608
ZANOCIN 454
ZANOCIN OD 454
ZANTAC 516
ZANTAC-75 516
ZAVEDOS 329
ZEFFIX 366
ZELDOX® 80 mg, 60 mg, 40 mg, 20 mg 609
ZELDOX® 20 mg/ml 609
ZENAPAX® 208
ZENTEL 77
ZEPLAN® 10 mg 540
ZEPLAN® 20 mg 540
ZERIT™ 548
ZIAGEN 47
ZIDOVUDINUM 608
ZILISTEN 166
ZIMAFLUOR 435
ZIMOX 374
ZINACEF 166
ZINCOMETIL 839
ZINERYT 840
ZINNAT 167
ZIPRASIDONUM 609
ZITAZONIUM 557
ZOCOR 540
ZOCOR FORTE 40 mg 540
ZODAC 169
ZOFRAN® 457
ZOLADEX 315
ZOLADEX DEPOT 315
ZOLADEX® LA 315
ZOLAREM 0,5 82
ZOLOFT 50 mg 535
ZOLOFT 100 mg 535
ZOLPIDEM 10 mg 610
ZOLPIDEMUM 609
ZOMACTON 543
ZOMETA 73
ZOPICLON 7,5 SL 610
ZOPICLONUM 610
ZOVIRAX 53
ZOXON 1 241
ZOXON 2 242
ZOXON 4 242
ZUCKLI 840
ZUCLOPENTHIXOLUM 610
ZYBAN® 132
ZYLORIC 81
ZYMOGEN 840
ZYMOGEN FORTE 840
ZYPREXA 454, 455
ZYRTEC 169
ZYVOXID® 379

MONOGRAFII ALE MEDICAMENTELOR

ORDONATE ALFABETIC DUPĂ DENUMIREA COMUNĂ INTERNAȚIONALĂ

A

ABACAVIRUM

COD ATC: J05AF06

ZIAGEN *GLAXO SMITHKLINE;* Sol. orală 20 mg/ml; Cpr. film. 300 mg *(S/P-RF)*

Ind: Terapia combinată antiretrovirală, tratamentul adulților infectați cu Virusul Imunodeficienței Umane (HIV).
Dz: Oral, 300 mg de două ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre componente, IH severă.
A!: Pacienții trebuie monitorizați în timpul primelor două luni de trat. cu abacavir. Atenție la reacțiile de hipersensibilitate. Atenție în cazul trat. simultan cu abacavir și alte medicamente cunoscute cu risc de toxicitate cutanat. Trebuie evitat la cei cu afecțiuni renale în stadiul terminal, IH moderată, copii. Poate determina acidoză lactică, uneori fatală, de obicei asociată cu hepatomegalie și steatoză hepatică. Trat. cu analogi nucleozidici trebuie întrerupt în cazul creșterii rapide a concentrației aminotransferazelor, hepatomegaliei progresive sau acidozei metabolice/lactice de etiologie necunoscută. Soluția orală nu este recomandată pacienților cu intoleranță ereditară la fructoză deoarece conține sorbitol. Nu este recomandat femeilor gravide sau în perioada de alăptare.
RA: Greață, vărsături, letargie și astenie, febră, cefalee, diaree și anorexie. Acidoză lactică, uneori fatală. Hipersensibilitate: febră și/sau erupție; simptome gastrointestinale; letargie și indispoziție; simptome respiratorii; simptome musculoscheletice, cefalee, parestezii și edeme, limfadenopatie, leziuni ale mucoaselor și hTA. Creșterea valorilor testelor funcționale hepatice, creatinfosfokinazei, creatininei sau limfopenie. IR. Anafilaxie în asociere cu reacțiile de hipersensibilitate.

ABCIXIMABUM

COD ATC: B01AC13

REOPRO *ELI LILLY;* Sol. inj., 2 mg/ml; f. 5 ml ***(S)***

Ind: Adjuvant al heparinei și acidului acetilsalicilic: la pacienții supuși intervențiilor coronariene percutanate (PTCA), la pacienții cu angină instabilă.
Dz: *Adulți:* inj. i.v. 0,25 mg/kg în bolus, urmată imediat de perfuzie i.v. continuă 0,125 µg/kg și min (până la cel mult 10 µg/min.). Pentru stabilizarea pacienților cu angină instabilă, adm. trebuie începută cu până la 24 de ore înaintea posibilei intervenții și trebuie oprită la 12 ore după aceasta. Pentru prevenirea complicațiilor ischemice cardiace, la pacienții la care se practică o intervenție coronariană percutanată și care nu sunt sub trat. cu abciximab, în perfuzie, bolusul trebuie adm. cu 10 până la 60 de min înaintea intervenției, urmat de perfuzie timp de 12 ore.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la oricare din componentele produsului sau la anticorpii monoclonali murini, hemoragie internă activă; antecedente de accident vascular cerebral în ultimii 2 ani; intervenție chirurgicală sau traumatism la nivelul creierului sau măduvei spinării; intervenție chirurgicală majoră; neoplasm intracranian; malformație arteriovenoasă sau anevrism; diateză hemo-

ragică cunoscută sau HTA severă necontrolată; trombocitopenie preexistentă; vasculită; retinopatie diabetică sau hipertensivă; IH sau IR severă. Nu trebuie adm. la femeile gravide. Alăptarea în timpul trat. trebuie întreruptă.
A!: Trebuie folosit ca adjuvant al trat. cu acid acetilsalicilic și heparină. Se asociază cu o creștere a frecvenței sângerării în special la locul de acces al cateterului în artera femurală. Trebuie evitate puncțiile arteriale și venoase, inj. i.m., folosirea de rutină a cateterelor urinare, intubația naso-traheală, sondele naso-gastrice și manșetele pentru măsurarea automată a TA, dacă nu sunt necesare. Înaintea adm. trebuie măsurate numărul de plachete, ACT, timpul de protrombină și APTT, pentru a identifica eventualele tulburări de coagulare preexistente. Valorile Hb și Ht trebuie verificate înaintea adm. de abciximab, la 12 ore după injectarea bolusului și din nou la 24 de ore după aceasta. Trebuie efectuate înregistrări ECG pe durata trat. Semnele vitale se vor controla la fiecare oră în primele 4 ore după injectarea bolusului de abciximab, apoi la 6, 12, 18 și 24 de ore după aceasta. Abciximab trebuie întrerupt în cazul hemoragiilor severe necontrolate sau în cazul necesității interv. chir. TS trebuie determinat prin metoda Ivy. Dacă TS rămâne mai lung de 12 minute, se pot adm. 10 unități de plachete. Prudență când se asociază cu alte medicamente care afectează hemostaza. Risc de reacții alergice sau de hipersensibilitate ori dim. beneficiilor dacă se adm. la pacienți tratați anterior cu anticorpi monoclonali. Beneficiile pot fi reduse la pacienții cu boli renale sau patologie vasculară periferică.
RA: Hemoragii, dureri lombare, hipotensiune, grețuri, dureri precordiale, vărsături, cefalee, bradicardie, febră, durere la locul de injectare și trombocitopenie. Rar tamponadă cardiacă și sindrom de detresă respiratorie a adultului. Rareori reacții de hipersensibilitate sau alergice.

ACARBOSUM *COD ATC: A10BF01*

GLUCOBAY 50 mg, GLUCOBAY 100 mg *BAYER AG;* Cpr. 50 mg, Cpr. 100 mg; ct. × 2 blist. × 15 cpr. ***(P-6L)***

GLUCOBAY 50 mg, GLUCOBAY 100 mg *BAYER AG;* Cpr. 50 mg, cpr. 100 mg; ct. × 120 cpr. ***(S)***

Ind: Terapie adjuvantă la pacienții diabetici.
Dz: Oral, 150-300 mg/zi, maxim 600 mg/zi, împărțit în 3 prize.
Cind: Hipersensibilitate la componentele produsului, pacienți sub 18 ani, tulburări intestinale cronice asociate cu tulburări specifice de digestie sau malabsorbție, stări patologice care se pot agrava ca urmare a formării de gaz în cantități crescute în intestin (de ex.: sindrom Roemheld, hernii mari, obstrucții intestinale și ulcere intestinale), pacienți cu afectare renală severă (clearance la creatinină < 25 ml/min).
A!: Poate să determine creșteri asimptomatice ale enzimelor hepatice.
Dacă acarboza este prescrisă împreună cu sulfoniluree sau metformin, sau împreună cu insulină poate necesita o scădere adecvată a dozei acestora. Dacă apare hipoglicemie acută trebuie avut în vedere că zaharoza (zahărul) este descompusă în fructoză și glucoză mult mai lent; pentru acest motiv pentru înlăturarea hipoglicemiei trebuie folosită glucoza. Adm. simultană de antiacide, colestiramină, absorbanți intestinali, enzime digestive trebuie evitată.
Trebuie evitat în timpul sarcinii și nu se recomandă în timpul alăptării.

RA: Flatulență și garguimente, diaree, distensie abdominală, dureri abdominale. Reacții de hipersensibilitate cutanate, de ex.: eritem, exantem și urticarie. Hepatită și/sau icter.

ACEMETACINUM *COD ATC: M01AB11*

RANTUDIL FORTE *TROPON GmbH;* Cps. 60 mg ***(P-RF)***

RANTUDIL RETARD *TROPON GmbH;* Cps. ret. 90 mg (P-RF)

Ind: Antiinflamator AINS din grupa indometacinului.
Dz: 1 cps. de 1-2 ori pe zi.
Cind:, A!:, RA: vezi Indometacin.

ACENOCUMAROLUM *COD ATC: B01AA07*

ACENOCUMAROL *LAROPHARM SRL;* Cpr. 2 mg ***(P-RF)***

SINTROM *NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG;* Cpr. div. 4 mg ***(P-RF)***

TROMBOSTOP *TERAPIA SA;* Cpr. 2 mg ***(S/P-RF)***

Ind: *Profilactic:* prevenirea trombozelor postoperatorii; postpartum și la cardiaci: IMA, FA. *Curativ:* tromboflebite, flebotromboze, trombangeită obliterantă, arterioscleroză obliterantă, tromboză coronariană, IM, embolii pulmonare, retinopatii (vasculare).
Dz: Inițial: în prima zi 8-12 mg și în a doua zi 4-8 mg. Doza de întreținere: 1-8 mg pe zi, în funcție de valorile timpului Quick sau INR. Este necesară efectuarea regulată a testelor de coagulare și adaptarea dozelor în funcție de rezultate. Doza zilnică trebuie prescrisă ca doză unică și adm. la aceeași oră a zilei.
Cind: Alergie cunoscută la derivați cumarinici, sarcină, lipsă de cooperare a pacientului. În situațiile în care riscul hemoragic este mai mare decât beneficiul probabil. Ulcere peptice sau hemoragii ale tractului gastrointestinal, urogenital, aparatului respirator, precum și hemoragii cerebrale, pericardite uscate și lichidiene, endocardite bacteriene subacute. HTA severă, leziuni parenchimatoase severe hepatice și renale. Activitate fibrinolitică crescută. În sarcină.
A!: Se adm. cu grijă în: tireotoxicoză, tumori, boli renale, infecții, inflamații, disfuncții hepatice sau renale, în bolile ce afectează absorbția gastrointestinală, în IC severă, la vârstnici. Scurtarea timpului de protrombină impusă de intervenții diagnostice sau terapeutice trebuie realizată cu mare atenție. Efectul poate fi potențat de trat. concomitent cu: allopurinol, steroizi anabolizanți, androgeni, antiaritmice (amiodaronă, chinidină), antibiotice (eritromicină, tetraciclină, neomicină, cloramfenicol), acid clofibric și derivații săi, disulfiram, acid etacrinic, glucagon, antagoniști ai receptorilor H, derivați imidazolici; sulfamide cu durată lungă de acțiune, antidiabetice orale, hormoni tiroidieni, sulfinpirazonă. Efectul poate fi potențat de: heparină, inhibitorii agregării plachetare, fenilbutazonă sau alți derivați pirazolonici. Utilizarea împreună cu alte AINS impune repetarea mai frecventă a testelor de coagulare. Efectul anticoagulant

poate fi diminuat prin adm. concomitentă a barbituricelor, aminoglutetimidei, carbamazepinei, colestiraminei, griseofulvinei, contraceptivelor orale, rifampicinei, diureticelor tiazidice. Crește concentrația serică a derivaților de hidantoină. Potențează efectul hipoglicemiant al derivaților de sulfoniluree. Pacienții nu trebuie să consume alcool. Pacienții nespitalizați trebuie să poarte asupra lor o adeverință care certifică trat. cu anticoagulante, în eventualitatea unui accident.
RA: Hemoragii, tulburări gastrointestinale, reacții alergice. Cazuri izolate: necroză hemoragică cutanată, asociată de obicei unui deficit congenital de proteină C sau leziunilor hepatice.

ACETAZOLAMIDUM

COD ATC: S01EC01

DIAMOX *WYETH LEDERLE PHARMA;* Pulb. sol. inj. 500 mg *(P-RF)*

DIAMOX SR *WYETH LEDERLE PHARMA;* Cps. ret. 250 mg *(P-RF)*

EDEREN 250 mg *TERAPIA SA;* Cpr. 250 mg; ct. × 2 blist × 10 cpr. *(P-RF)*

Ind: Glaucom cronic simplu și preoperator, glaucom acut congestiv; uveite hipertensive; epilepsie, ca trat. adjuvant; retenție de fluide: tensiune premenstruală, edeme medicamentoase, obezitate și IC congestivă; sindrom Ménière.
Dz: *Glaucom: adulți* 250-1000 mg/zi în 4 doze; *copii mai mari de 5 ani* 125-750 mg/zi (5-10 mg/kg și zi). *Retenție de fluide: – numai pentru adulți:* IC: 250-375 mg/zi timp de 2 zile, urmate de o zi pauză; apoi se va repeta; tensiune premenstruală: o doză unică de 125-375 mg/zi începând cu 5-10 zile înainte de debutul menstruației, sau la debutul simptomelor; *obezitate:* 250-375 mg/zi. *Epilepsie: adulți:* 250-1000 mg/zi în mai multe doze; *copii:* 125-750 mg/zi în mai multe doze.
Cind: Acidoză, precomă și comă hepatică, IR cu anurie, stări de hiponatremie și hipokaliemie, boala Addison, comă sau precomă diabetică, litiază renală, alergie sau intoleranță la acetazolamidă și sulfamide. În primul trimestru de sarcină.
A!: Prudență la cirotici, alte condiții de dezechilibru electrolitic sever, la diabetici și la gutoși; nu se adm. timp îndelungat în glaucomul cronic congestiv cu unghi închis. Figurează pe lista substanțelor dopante. Scade eficacitatea antidiabeticelor orale și a litiului; mărește riscul toxic al salicilaților; asociația cu digitalice, glucocorticoizi, alte diuretice, laxative iritante crește riscul de hipokaliemie; asocierea cu antiaritmice chinidinice, amiodaronă, prenilamină, vincamină în prezența hipokaliemiei favorizează aritmiile; nu se asociază cu metenamina.
RA: Hipokaliemie, somnolență, parestezii ale feței și extremităților, mai rar oboseală, nervozitate, tremor, depresie, dezorientare, ataxie, sete, tulburări digestive, uneori erupții cutanate alergice; foarte rar agranulocitoză, trombocitopenie, leziuni renale, surditate și miopie trecătoare; poate determina acidoză hipokaliemică, calculoză renală, hiperglicemie, hiperuricemie.

ACETYLCHOLINII CHLORIDUM

COD ATC: S01EB09

MIOCHOL - E *CIBA VISION;* Pulb. liof. 10 mg (ct. × 1 blist. × 1 fl. cu 2 compartimente: 10 mg publ. respectiv 2 ml solv.) *(S)*

Ind: Obținerea rapidă și completă a miozei în chirurgia oculară (extracția cristalinului în operația de cataractă, iridectomie, keratoplastie).
Dz: Adm. intraoculară.
A!: Afectează capacitatea de a conduce mașina sau de a efectua activități de precizie.
RA: Bradicardie, hTA, roșeață, transpirație, dificultăți respiratorii (toate aceste efecte sunt reversibile sub atropină).

ACETYLCYSTEINUM *COD ATC: R05CB01*

ACC® 100 *HEXAL AG;* Pulb. sol. orală; 100 mg/plic ***(P-6L)***

ACC® 200 *HEXAL AG;* Cps. 200 mg; Cpr. eferv. 200 mg; Pulb. sol. orală 200 mg/plic ***(P-6L)***

ACC INJECT *HEXAL AG;* Sol. inj.; 100 mg/ml; f. 3 ml ***(P-RF)***

ACETILCISTEINĂ 200 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cps. 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. ***(S/ P-6L)***

FLUIMUCIL *INPHARZAM SA ZAMBON;* Sol. inj. 100 mg/ml (f. 3 ml); Sol. inj. 200 mg/ml (f. 3 ml) ***(S/P-RF)*** *COD ATC V03AB23*

FLUIMUCIL® 100 *ZAMBON GROUP SpA;* Granule sol. orală; 100 mg/plic ***(P-6L)***

FLUIMUCIL® 200 *ZAMBON GROUP SpA;* Granule sol. orală; 200 mg/plic ***(P-6L)***

FLUIMUCIL® 600 *ZAMBON GROUP SpA;* Cpr. eferv. 600 mg ***(P-6L)***

GENAC *LAB. GENEVRIER SA;* Colir, 5 g/100 ml ***(P-6L)*** *COD ATC S01XA08*

HIDONAC *INPHARZAM SA ZAMBON;* Sol. perf.; 200 mg/ml; f. 25 ml ***(S)*** *COD ATC V03AB23*

MUCOVIM 100 *VIM SPECTRUM SRL;* Cps. 100 mg ***(P-6L)***

MUCOVIM 200 *VIM SPECTRUM SRL;* Cps. 200 mg ***(P-6L)***

SIRAN 200 BRAUSE *TEMMLER-PHARMA & Co. KG;* Cpr. eferv. 200 mg ***(P-6L)***

SIRAN LONG *TEMMLER-PHARMA & Co. KG;* Cpr. eferv. 600 mg ***(P-6L)***

SIRAN® 200 *TEMMLER-PHARMA & Co. KG;* Pulb. susp. 200 mg/plic; Cpr. eferv. 200 mg ***(P-6L)***

Ind: Bronșite acute, bronșite cronice și reacutizările lor, emfizem pulmonar, mucoviscidoză și bronșiectazii. Intoxicația accidentală sau voluntară cu paracetamol, uropatie la iso- și ciclofosfamidă. În toate formele de leziuni corneene.

Dz: *Oral:* maladii acute: *copii până la 2 ani:* 50 mg × 3/zi; *copii de la 2 la 12 ani:* 100 mg × 3/zi; *copii* după vârsta *de 12 ani* și *adulți:* 600 mg pe zi, în doză unică (de preferință seara) sau mai multe doze. *Trat. de lungă durată:* 400 mg pe zi, în 2 doze, cel mult 3-6 luni. *Mucoviscidoză:* Dozaj identic, cu excepția copiilor mai mari de 6 ani cărora li se vor adm. 200 mg × 3/zi sau o dată pe zi 600 mg. *Inj. i.m.* profund 300 mg o dată, de 1-2 ori pe zi. La copii mai mici dozele trebuie înjumătățite. *Inj. i.v.* (în intoxicația cu paracetamol): inițial 150 mg/kg într-un volum egal de soluție de glucoză 5% în decurs de 15 min. Doze de întreținere: 50 mg/kg se adm. la fiecare 4 ore, i.v., timp de 72 ore împreună cu o soluție de glucoză 5%. *Aerosoli:* se nebulizează 300 mg o dată de 1-2 ori pe zi timp de 5-10 zile. Instilare endobronșică: 300 mg o dată, de 1-2 ori pe zi. Instilarea și lavajul endoauricular sau al altor cavități: 150-300 mg o dată.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la acetilcisteină.

AI: La pacienții incapabili să expectoreze, pentru a evita retenția secrețiilor este nevoie de a se recurge la drenaj postural sau la aspirație bronșică. Pacienții cu astm bronșic trebuie să fie supravegheați cu atenție în timpul trat.; dacă apare bronhospasmul trat. trebuie întrerupt imediat.

RA: Reacții de hipersensibilitate: urticarie și, rar, bronhospasm. În cazul adm. sub formă de aerosoli pot apărea ocazional iritații nazofaringiene și gastro-intestinale cum sunt: rinoree, stomatită, greață și vărsături.

ACICLOVIRUM *COD ATC: J05AB01*

ACICLOVIR *ARMEDICA SA;* Cpr. 200 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***; ct. × 200 blist. × 10 cpr. ***(S)***

ACICLOVIR *ARENA GROUP SA;* Cps. 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps; ct. × 1 fl. × 20 cps. ***(P-RF)***

ACICLOVIR 200 mg *TERAPIA SA;* Cpr. 200 mg ***(P-RF)***

ACICLOVIR 200 mg *OZONE LABORATORIES Ltd.;* Cpr. disp. 200 mg ***(P-RF)***

ACICLOVIR 200 mg *LAROPHARM SRL;* Cpr. 200 mg ***(P-RF)***

ACICLOVIR 200 mg, ACICLOVIR 400 mg *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Cpr. 200 mg, 400 mg ***(P-RF)***

ACICLOVIR 5% *ARMEDICA SA;* Cremă 5%, ct. × 1 tub × 5 g sau 15 g ***(P-RF)*** *COD ATC: D06BB03*

ACICLOVIR 5% *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Cremă 5%, ct. × 1 tub × 10 g ***(P-RF)*** sau 2 g ***(OTC)***

CARGOSIL *GENEPHARM SA;* Cremă 5%; ct. × 1 tub × 10 g ***(P-RF)*** sau 2 g ***(OTC)*** *COD ATC: D06BB03*

CARGOSIL *GENEPHARM SA;* Ung. oft. 3% ***(P-6L)*** *COD ATC: S01AD03*

CEVINOLON *BROS Ltd.;* Cpr. 200 mg *COD ATC: J0 5AB01* ***(P-RF)***; cremă 5% *COD ATC: D06BB03* ***(P-RF)***

CLOVIRAL® **compr.** *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cpr. 200 mg ***(P-RF)***

EUVIROX *EUROPHARM SA;* Cremă 5% ***(P-RF)*** *COD ATC: D06BB03;* **EUVIROX 200 mg**; Cps. 200 mg; ct. × 50 blist. × 10 cps. ***(S)*** și ct. × 2 blist. × 10 cps. ***(P-RF)***

HERNOVIR *NOBEL ILAC SANAY;* Cremă 5% ***(P-RF)*** *COD ATC: D06BB03*

HERPESIN 250 *LACHEMA;* Pulb. liof. 250 mg ***(S)*** *COD ATC: J05AB01*

HERPIN *TIS FARMACUTIC SA;* Ung. 5% ***(P-RF)***

LOVIR 200 mg, LOVIR 400 mg, LOVIR 800 mg *RANBAXY LABORATORIES Ltd.;* Cpr. disp. 200 mg, 400 mg, 800 mg; ct. × 2 sau 10 blist. × 5 cpr. ***(P-RF)***

MEDOVIR *MEDOCHEMIE Ltd.;* Pulb. pt. sol. perf., conține aciclovir sodic 274 mg echivalent la 250 mg aciclovir pe fl. ***(S)***

SUPRAVIRAN *GRÜNENTHAL GmbH;* Cremă 5%; ct. × 1 tub × 5 g sau 20 g ***(P-RF)***; Pulb. pt. sol. perf. 250 mg/fl. ***(S)***

SUPRAVIRAN 200, SUPRAVIRAN 400, SUPRAVIRAN 800 *GRÜNENTHAL GmbH:* Cpr. 200 mg (ct. × 5 blist. × 5 cpr.), 400 mg (ct. × 7 blist. × 5 sau 10 cpr.), 800 mg (ct. × 7 blist. × 5 cpr.) ***(P-RF)***

UNGUENT CU ACICLOVIR *TIS FARMACEUTIC;* Ung. 3% ***(P-RF)***

UNGUENT CU ACICLOVIR 5% *INCDCF BUCUREȘTI;* Ung. 5% ***(P-RF)***

VIROLEX *KRKA d.d.;* Cremă 5% ***(P-RF)***; *COD ATC: D06BB03;* Cpr. 200 mg ***(P-RF)***; *COD ATC: J05AB01;* Pulb. pt. sol. inj. 250 mg/fl. ***(S)***; Ung. oft. 3% ***(P-6L)*** *COD ATC: S01AD03*

XOROX *F. JOH KWIZDA GmbH;* Ung. oft. 3% ***(P-6L)*** *COD ATC: S01AD03;* Cremă 5% ***(OTC)*** *COD ATC: D06BB03*

XOROX® 200 mg, XOROX® 400 mg *F. JOH KWIZDA GmbH;* Cpr. 200 mg, 400 mg ***(P-RF)***

XOROX® 250 mg *F. JOH KWIZDA GmbH;* Pulb. liof. pt. sol. perf. 250 mg/fl. ***(S)***

ZOVIRAX *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. 200 mg (ct. × 20 sau 25 cpr.), 800 mg (ct. × 7 blist. × 5 cpr.) ***(P-RF)*** *COD ATC: J05AB01;* cremă 5%, tub × 2 g sau tub cu pompă asamblată × 2 g ***(OTC)*** sau tub × 5 g ***(P-RF)***; *COD ATC: D06BB03;* Ung. oft. 3% ***(P-6L)*** *COD ATC: S01AD03*

Ind: Trat. și profilaxia infecțiilor cu herpes simplex tip I și II; trat. și profilaxia infecției cu herpes zoster; trat. encefalitei herpetice; trat. varicelei adultului sau a copilului imunodeprimat. Indicații de perspectivă: trat. aftelor bucale și/sau genitale; prevenirea apariției bolii Kaposi la bolnavi cu SIDA și eventual ca mijloc terapeutic al ei; scurtarea evoluției hepatitei cu virus B.
Dz: *Adm. sistemică:* infecții cu herpes simplex: *adulți:* oral, 200 mg de 2-5 ori/zi. Profilaxia infecțiilor cu herpes simplex la *adulți:* oral, 200 mg aciclovir

de 4 ori/zi. Infecții cu herpes zoster: oral, 800 mg aciclovir de 5 ori pe zi, 7 zile. La pacienții cu imunodeficiență severă sau în deficit de absorbție intestinală doza poate fi dublată sau se poate recurge la trat. i.v. Adm. trebuie să înceapă cât mai curând după debutul infecției. *Copii:* trat. și profilaxia infecțiilor cu herpes simplex la pacienți imunodeprimați, *copii* în vârstă de *peste 2 ani:* doze identice cu cele pentru adulți, *copiii sub* vârsta de *2 ani:* jumătate din dozele de adulți. La vârstnici și la cei cu afectare renală severă se recomandă reducerea dozelor. *Adm. topică: Adulți și copii:* aplicare pe leziuni de 5 ori/zi, timp de 5-10 zile. Trat. trebuie început cât mai precoce.

Cind: La pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă și la propilenglicol (pentru cremă).

A!: În cazul trat. inj., trebuie evaluat riscul și beneficiul terapeutic în caz de deshidratare, tulburări hematologice și IR. În IR este necesară modificarea dozei pentru a preveni acumularea aciclovirului. Concentrațiile mai mari de 5 mg/ml produc flebită. Nu se recomandă aplicarea cremei pe mucoasa orală, vaginală sau conjunctivală. A se evita introducerea accidentală în ochi. Probenecidul potențează efectul aciclovirului. Alte medicamente ce afectează fiziologia renală pot eventual influența farmacocinetica aciclovirului.

RA: Excepțional se poate ajunge la IRA. Perfuzia extravasculară produce reacții inflamatorii locale grave. S-au raportat greață și vărsături. Ocazional reacții neurologice, în special agitație, stări de confuzie, convulsii, comă, amețeală, halucinații, psihoze și somnolență. Pot să apară rash și febră. Rar s-au semnalat: creșteri tranzitorii și ușoare ale bilirubinei și enzimelor hepatice, ale creatininei și ale ureei sanguine, scăderea elementelor sanguine cu anemie, leucopenie, trombocitopenie, alopecie difuză. După aplicarea cremei pot apărea senzații de arsură sau înțepături, uscarea și descuamarea pielii, eritem și prurit. După aplicarea de unguent oftalmic pot apărea senzații de înțepături ușoare, tranzitorii, la un procent mic din pacienți. S-a menționat apariția de keratopatie superficială punctiformă, iritații și inflamații locale, cum ar fi blefarită și conjunctivită.

ACIDUM ACETYLSALYCILICUM *COD ATC: N02BA01*

ACESIL *FARMACOM SA;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

ACESIL T *FARMACOM SA;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

ACID ACETILSALICILIC *SICOMED SA;* Cpr. 500 mg ***(S/OTC)***

ACID ACETILSALICILIC 100 mg *FLORILEX PHARMAMIT SRL;* Cpr. 100 mg ***(OTC)*** *COD ATC B01AC06*

ACID ACETILSALICILIC 500 mg *FLORILEX PHARMAMIT SRL;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

ACID ACETILSALICILIC 500 mg *MAGISTRA C & C;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

ACID ACETILSALICILIC TAMPONAT *ARMEDICA SA;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

ACID ACETILSALICILIC TAMPONAT *SANTA SA BRAȘOV;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

ALKA-SELTZER® **cpr. eferv.;** *BAYER AG;* Cpr. eferv. 324 mg ***(OTC)***

ASALINE 500 *OMEGA PHARMA SA;* Cpr. 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(S/OTC)***

ASAprin 160® *HELCOR SRL;* Cpr. 160 mg ***(OTC)***
COD ATC: B01AC06

ASAprin 500® *HELCOR SRL;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

ASAprin T® *HELCOR SRL;* Cpr. 500 mg ***(S/OTC)***

ASPENTER 325 mg *TERAPIA SA;* Cpr. film. gastrorez; 325 mg ***(OTC)***
COD ATC: B01AC06

ASPENTER 75 mg *TERAPIA SA;* Cpr. film. gastrorez; 75 mg ***(OTC)***
COD ATC: B01AC06

ASPICALCIC *LAROPHARM SRL;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

ASPIKAM *GAMA FARM SRL;* Cpr. disp. 300 mg ***(OTC)***
COD ATC: B01AC06

ASPIKAM *GAMA FARM SRL;* Cpr. disp. 300 mg ***(OTC)***
COD ATC: N02BA01

ASPIMAX *LAROPHARM SRL;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

ASPIRIN 100 mg *BAYER AG;* Cpr. 100 mg ***(OTC)***
COD ATC B01AC06

ASPIRIN® 100 cpr. *BAYER AG;* Cpr. 100 mg ***(OTC)***

ASPIRIN® 500 cpr. *BAYER AG;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

ASPIRIN DIREKT *BAYER AG;* Cpr. mast. 500 mg ***(OTC)***

ASPIRIN® PROTECT 100 cpr. gastrorez. *BAYER AG;* Cpr. gastrorez. 100 mg ***(OTC)***

ASPIRIN® PROTECT 300 cpr. gastrorez. *BAYER AG;* Cpr. gastrorez. 300 mg ***(OTC)***

EUROPIRIN *EUROPHARM SA;* Cpr. 500 mg ***(S/OTC)***

PHARMAPIRIN *PHARMEX ROM IND.;* Cpr. 80 mg ***(OTC)***
COD ATC B01AC06

PHARMAPIRIN T *PHARMEX ROM IND.;* Cpr. 325 mg ***(OTC)***
COD ATC B01AC06

ROMPIRIN® *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cpr. 100 mg ***(OTC)***
COD ATC B01AC06

ROMPIRIN® *ANTIBIOTICE IAȘI; Cpr. 500 mg* ***(OTC)***
COD ATC N02BA51

SANTAPIRIN *SANTA SA;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

THROMBO ASS *LANNACHER;* Cpr. film. 50 mg sau 100 mg ***(OTC)***
COD ATC B01AC06

Ind: Trat. durerilor de intensitate slabă sau moderată, febrei, în boli cardiovasculare sau cerebrovasculare, ca agent antiplachetar în profilaxia IMA, al anginei pectorale instabile, ischemiei acute tranzitorii și accidentelor cerebrovasculare ischemice.
Dz: Ca analgezic, antipiretic și antiinflamator: *Oral: Adulți:* 250-1000 mg în priză unică, repetându-se la nevoie la intervale de 4-8 ore, maxim 4 g/zi. *Copii: 5-9 ani* - 250 mg o dată, repetându-se la intervale de 4-8 ore, maxim 750 mg/zi. *Ca antiagregant plachetar: Adulți:* 100 mg pe zi sau 500 mg la 2-3 zile, adm. int.
Cind: Alergie cunoscută la acidul acetilsalicilic sau la alte componente ale produsului, intoleranță la alte AINS, diateză hemoragică, ulcer gastric sau duodenal, ultimul trimestru de sarcină.
A!: În sarcină. În caz de hipersensibilitate la AINS, teren alergic, trat. concomitent cu anticoagulante, tulburări grave ale funcțiilor hepatice sau renale, tulburări gastrointestinale cronice, deficit de glucozo-6-fosfat-dehidrogenază, primul și al doilea trimestru de sarcină, perioada de alăptare. Atenție dacă se adm. copiilor și adolescenților cu boli febrile, datorită posibilității apariției sindromului Reye. În caz de astm bronșic, alergie la polen, rinită alergică, polipi nazali, afecțiuni respiratorii bronhoobstructive cronice, hipersensibilitate la analgezice și antireumatice pot să apară crize de astm, erupții cutanate, edem Quincke.
Crește: efectul medicamentelor anticoagulante, riscul hemoragiilor intestinale în cazul trat. concomitent cu glucocorticoizi, efectul AINS, efectul derivaților de sulfoniluree, toxicitatea metotrexatului, concentrațiile plasmatice ale digoxinei, barbituricelor și litiului, efectul sulfonamidelor și combinațiilor lor și scade efectele următoarelor medicamente: antagoniști ai aldosteronului și diuretice de ansă, antihipertensive, uricozurice. Reduce excreția de acid uric, putând declanșa criza de gută.
RA: Tulburări gastrointestinale: greață, vărsături, diaree precum și microhemoragii gastrointestinale, care în cazuri excepționale pot duce la anemie feriprivă. Ocazional, ulcere gastrointestinale complicate cu hemoragii și perforații. Reacții de hipersensibilitate. Tulburări ale funcțiilor hepatice și renale, hipoglicemie, reacții cutanate severe. În caz de supradozare, în special la copii și vârstnici, pot să apară vertij și tinitus. În intoxicația acută apare tulburarea echilibrului acido-bazic și electrolitic, hipoglicemie, erupții cutanate, hemoragii gastrointestinale, simptomatologia poate include hiperventilație, tinitus, greață, vărsături, tulburări de vedere și auz, cefalee, vertij, confuzie. În intoxicațiile grave pot să apară delir, tremor, dispnee, transpirații, hipertermie și comă.

ACIDUM ALENDRONICUM

COD ATC: M05BA04

FOSAMAX *MERCK SHARP & DOHME;* Cpr. 5 mg ***(P-6L)***

FOSAMAX 10 mg *MERCK SHARP & DOHME;* Cpr. 10 mg ***(P-6L)***

FOSAMAX 70 mg *MERCK SHARP & DOHME;* Cpr. 70 mg ***(P-6L)***

Ind: Trat. osteoporozei la femeile în postmenopauză.
Dz: Oral, 10 mg o dată/zi.
Cind: Anomalii ale esofagului (stricturile sau acalazia). Incapacitate de a sta în poziție ridicată timp de cel puțin 30 de minute. Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului. Hipocalcemie. Alendronatul sodic nu trebuie adm. în sarcină sau la mame care alăptează.
A!: Posibile reacții esofagiene, disfagie, odinofagie sau durere retrosternală. Paciente cu afecțiuni active ale tractului gastrointestinal superior. Pacientele trebuie să înghită produsul cu un pahar plin cu apă și să nu stea în poziție culcată timp de cel puțin 30 de minute și până după prima masă a zilei. Pacientele nu trebuie să mestece sau să sugă tableta. Pacientele trebuie informate în mod special să nu ia comprimatul la culcare sau înainte de a se ridica din pat. Clearance al creatininei < 35 ml/min. Hipocalcemia și alte tulburări ale metabolismului mineral (hipovitaminoza D) trebuie tratate înaintea inițierii terapiei. Între adm. alendronatului și cea a oricărui alt medicament oral, pacientele trebuie să respecte un interval liber de cel puțin o jumătate de oră.
RA: Durere abdominală, dispepsie, esofagită, ulcer esofagian, disfagie și distensie abdominală. Rash și eritem. Dureri ale musculaturii scheletice, constipație, diaree, flatulență și cefalee. Scăderile asimptomatice, moderate și tranzitorii ale calciului și fosfatului seric.

ACIDUMALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)

COD ATC: N07XN03
A16AX

THIOCTACID 100 T *ASTA MEDICA;* Sol. inj. 25 mg /ml; f. 4 ml ***(P-RF)***

THIOCTACID 200 *ASTA MEDICA;* Cpr. film. 200 mg ***(P-6L)***

THIOCTACID 600 *ASTA MEDICA;* Cpr. film. 600 mg ***(P-6L)***

THIOCTACID 600 T *ASTA MEDICA;* Sol. inj. 25 mg/ml; f. 24 ml ***(P-RF)***

THIOGAMMA 600 *WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.;* Cpr. film. 600 mg ***(P-6L)***

THIOGAMMA 600 INJEKT *WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.;* Sol. inj. 30 mg/ml (f. × 20 ml) ***(P-RF)***

THIOGAMMA® TURBO-SET *WÖRWAG PHARMA GmbH & Co;* Sol. perf. 12 mg/ml-50 ml ***(S/P-RF)***

THIOGAMMA TURBO-SET *WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.;* Sol. perf. 12 mg/ml ***(S/P-RF)***

Ind: Tulburări de sensibilitate în polineuropatia diabetică.
Dz: I.v. lent 600 mg acid α-lipoic/zi timp de 2-4 săpt. F. și sol. perf. trebuie protejate de lumină. Pt. adm. de acid α-lipoic în perf. se folosește exclusiv serul fiziologic. Se recomandă continuarea trat. oral cu 600 mg acid α-lipoic pe zi, ca trat. de întreținere.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la acidul α-lipoic.

AI: Se va evita consumul de alcool etilic. Diminuă acțiunea cisplatinei. Efectul hipoglicemiant al insulinei și al medicamentelor antidiabetice orale poate fi potențat. Nu se va adm. în perioada de alăptare.
RA: Creșterea presiunii intracraniene și senzație de sufocare. Reacții alergice la locul injectării însoțite de urticarie și eczeme, ca și manifestări sistemice, până la șoc. Spasme, diplopie, peteșii și predispoziție la diateze hemoragice. Scăderea nivelului glicemiei.

ACIDUM ASCORBICUM

COD ATC: A11GA01

ASCOVIT 100; 200 *EUROPHARM SA;* Cpr. 100; 200 mg ***(OTC)***

CEBION 1 g BLUTORANGE *MERCK KGaA;* Cpr. eferv. 1 g ***(OTC)***

CEBION 1 g CITRUS *MERCK KGaA;* Cpr. eferv. 1 g ***(OTC)***

CETEBE® *GLAXO SMITHKLINE;* Cps. elib. prel. 500 mg ***(OTC)***

CEVITIL *E.I.P.I.C.O.;* Cpr. eferv. 1 g ***(OTC)***

HERMES CEVITT® *HERMES ARZNEIMITTEL GmbH;* Cpr. eferv. 1 g ***(OTC)***

REDOXON *HOFFMANN LA ROCHE;* Cpr. eferv. 1 g ***(OTC)***

SICOVIT® C 100 mg *SICOMED SA;* Cpr. mastic. 100 mg

SICOVIT® C 200 mg/2 ml *SICOMED SA;* Sol inj. 100 mg/ml - 2 ml ***(P-RF)***

SICOVIT® C 500 mg/5 ml *SICOMED SA;* Sol inj. 100 mg/ml - 5 ml ***(P-RF)***

SICOVIT® C 200 mg *SICOMED SA;* Cpr. 200 mg ***(OTC)***

UPSAVIT VITAMIN C 1000 *UPSA CONSEIL;* Cpr. eferv. 1 g ***(OTC)***

VITAMIN C EFF. INSTANT *SEDICO;* Pulb. eferv. 1 g/plic ***(OTC)***

VITAMINA C 60 mg *VITAHELP în colaborare cu LABORMED PHARMA;* Cpr. 60 mg acid ascorbic, cu 5 arome diferite ***(OTC)***

VITAMINA C 200 mg *AESCULAP SRL;* Cpr. 200 mg ***(OTC)***

VITAMINA C *SICOMED SA;* Sol. Inj. 100 mg/ml (f. × 2 ml sau f. × 5 ml) ***(S/P-RF)***

VITAMINA C *LAROPHARM SRL;* Cpr. 100 mg acid ascorbic ***(OTC)***

VITAMINA C+ *LAROPHARM SRL;* Cpr 180 mg acid ascorbic ***(OTC)***

VITAMINA C 200 *SICOMED SA;* Cpr. 200 mg ***(OTC)***

VITAMINA C 200 mg *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cpr. mast. 200 mg ***(S/OTC)***

VITAMINA C 250 mg, VITAMINA C 500 mg *PHARMEX ROM IND.;* Cpr. mast. 250 mg sau 500 mg ***(OTC)***

Ind: Profilaxia și trat. scorbutului și altor forme de hipovitaminoză C: boli grave, stări febrile prelungite, infecții, intervenții chirurgicale. Plăgi atone, paro-

dontoză, gingivite, stomatite, osteoporoză, fracturi, hemoragii prin fragilitate capilară, anumite forme de anemie (în asociere cu fierul sau cu acidul folic), methemoglobinemie. Surmenaj, efort fizic prelungit, astenie de primăvară. Profilaxia virozei și a gripei.
Dz: *Adulți:* 0,1-1 g/zi. *Copii:* 0,05-0,30 g/zi.
Cind: Litiază renală, stări de supraîncărcare cu fier, la bolnavii cu hemocromatoză, talasemie, deficit de acid folic sau la cei care primesc transfuzii de sânge frecvent.
AI: Acidul ascorbic poate favoriza precipitarea sulfamidelor în urină. Scade efectele anticoagulantelor orale, fenotiazinelor. Accentuează efectele adverse ale contraceptivelor orale și estrogenilor.
RA: Diaree, precipitarea oxalaților și uraților în urina acidă. Inj. rapidă i.v. poate provoca amețeli sau chiar lipotimie.

ACIDUM AZELAICUM *COD ATC: D10AX03*

SKINOREN *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Cremă 20% ***(P-RF)***

Ind: Acnee vulgară, acnee rozacee. Secundar, în afecțiuni însoțite de hiperpigmentare, cum ar fi melanomul malign, lentigo-ul malign, melasma, melanodermiile postinflamatorii.
Dz: Local (tegumentul feței, gâtului, brațelor) de 2 ori/zi (dimineața și seara), pe perioade lungi, în funcție de evoluția bolii.
RA: Senzație de arsură, de înțepătură sau roșeață tegumentară. Reacții tardive: dermatită iritativă, cu mâncărime, descuamare și eritem.

ACIDUM CLODRONICUM *COD ATC: M05BA02*

BONEFOS *LEIRAS OY;* Cps. 400 mg ***(P-RF)***

BONEFOS *60 mg/ml* *LEIRAS OY;* Conc. pentru sol. perf. 60 mg/ml (f. × 5 ml) ***(S/P-RF)***

BONEFOS 800 *LEIRAS OY;* Cpr. film. 800 mg ***(P-RF)***

LODRONAT *HOFFMANN LA ROCHE GmbH;* Cpr. film. 520 mg ***(P-RF);*** Sol. perf. 30 mg/ml (f. × 10 ml) ***(S)***

SINDRONAT 400 mg *SINDAN SRL;* Cps. 400 mg ***(P-RF)***

Ind: Osteoliza produsă de metastazele osoase ale tumorilor solide sau de către neoplaziile hematologice. Hipercalcemia produsă de metastaze osoase sau de tumori maligne care induc distrucție osoasă în afara metastazelor osoase.
Dz: *Oral:* 1040 mg acid clodronic zilnic, adm. în priză unică. În cazuri individuale, pot fi necesare 2080 mg pe zi. La pacienții cu IR, la care clearance-ul creatininic variază între 10 și 30 ml/min, doza zilnică trebuie redusă la jumătate. Trat. este de obicei de lungă durată, depinzând de evoluția bolii.
Inj.: 300 mg ca o doză unică zilnică prin perf. i.v. lentă. Conținutul unei fiole trebuie dizolvat în minimum 500 ml de soluție izotonă de clorură de sodiu

sau de glucoză 5%. Trat. nu trebuie să depășească 10 zile consecutive, după care se trece la terapie per os. În hipercalcemie trat. trebuie ajustat în funcție de răspunsul la terapie. Ca urmare, trebuie monitorizat zilnic nivelul calciului seric.
Cind: Hipersensibilitate la medicament, IR cu un clearance creatininic < 10 ml/min, boli inflamatorii acute severe ale tractului gastrointestinal. La copii. În timpul sarcinii.
AI: Acțiunea hipocalcemică este crescută de aminoglicozide. Trebuie monitorizată funcția renală. Trat. trebuie oprit în eventualitatea unei deteriorări a funcției renale. Nivelul calciului seric trebuie monitorizat. În cazul apariției hipocalcemiei, trat. i.v. trebuie oprit. Înaintea terapiei trebuie stimulată eliminarea renală a calciului seric în exces și restaurat echilibrul hidroelectrolitic și producția normală de urină. Se evitată suprahidratarea la pacienții cu risc de IC. Mâncărurile cu un conținut ridicat de calciu, precum și medicamentele care conțin fier, calciu sau magneziu reduc absorbția acidului clodronic adm. oral. Perf. sau inj. i.v. rapide pot induce IRA.
RA: Simptome gastrointestinale (greața și diareea). IRA după perf. i.v. Deteriorări ale funcției renale și proteinurie tranzitorie imediat după perf. Reacții adverse cutanate. Hipocalcemie. Modificări ale fosfatului seric, albuminelor serice, LDH și transaminazelor.

ACIDUM CROMOGLICICUM

COD ATC: R01AC01

CROMOHEXAL® *HEXAL AG;* Aerosol nazal; 2,8 mg/doză; 0,14 ml ***(P-6L)***

CROMOHEXAL® *HEXAL AG;* Sol. oft. 2% ***(P-RF)*** *COD ATC: S01GX01*

DADCROME® *DAR AL DAWA;* Sol. nazală 2% ***(P-6L)***

STADAGLICIN® *STADA ARZNEIMITTEL AG;* Aerosol nazal 20 mg/ml ***(P-6L)***

STADAGLICIN® *STADA ARZNEIMITTEL AG;* Sol. oft. 2% ***(P-6L)*** *COD ATC S01GX01*

TALEUM *EGIS PAHRMACEUTICALS Ltd.;* Aerosol 1 mg/doză ***(P-6L)***

VEKFANOL *FARAN LABORATORIES SA;* Sol. oft. 2% ***(P-6L)***

Ind: *Adm. naz.:* rinită alergică perenă; rinită alergică sezonieră (de exemplu febra fânului). *Adm. oft.:* trat. simptomatic al afecțiunilor oftalmice de etiologie alergică.
Dz: *Adm. naz.: Adulți și copii:* o doză (puf) de 4 ori pe zi, în fiecare nară. Dacă este necesar, doza zilnică poate fi crescută, dar nu trebuie depășită doza de un puf de 6 ori pe zi. După ameliorarea simptomelor, trat. trebuie continuat până la îndepărtarea factorilor declanșatori (polen, praf de casă, spori de ciuperci, alergeni alimentari). După stabilizarea simptomatologiei trebuie încercată scăderea dozei.
Adm. oft.: Adulți și copii: Se instilează în sacul conjunctival o picătură soluție oftalmică de 4 ori pe zi, în fiecare ochi. Doza zilnică poate fi crescută la o picătură de 6 ori pe zi. După ameliorarea simptomelor trat. trebuie continuat până la îndepărtarea factorilor alergeni (polen, praf de casă, spori de ciu-

perci, alergeni alimentari etc.). După stabilizarea simptomatologiei clinice trebuie încercată scăderea dozei.
Cind: Hipersensibilitate la componentele produsului.
A!: În caz de reacție alergică la aerosol nazal. Nu se vor folosi lentilele de contact moi în timpul trat. cu soluție oftalmică. Lentilele de contact tari trebuie îndepărtate înaintea adm. picăturilor și nu trebuie reaplicate mai devreme de 15 minute. În cazul trat. concomitent cu alte soluții oftalmice, se recomandă adm. acestora la intervale de minim 15 minute. În timpul sarcinii trebuie evitat. Sol. oft. afectează vederea, după adm., pt. câteva min. Pacientul trebuie să aștepte până când tulburările de vedere dispar, înainte de a participa la traficul rutier sau de a folosi utilaje.
RA: *Adm. naz.:* prurit ușor la nivelul nasului, rareori cefalee sau modificări ale gustului. Rar: epistaxis, ulcerații ale mucoasei nazale, inflamația limbii, tuse sau insuficiență respiratorie, edem laringian sau edem Quincke, reacții anafilactice generalizate grave, însoțite de bronhospasm. *Adm. oft.:* senzații de arsuri oculare sau de corp străin, chemozis și hiperemie conjunctivală. Rar, reacții de hipersensibilitate după adm. oft.

ACIDUM DEHYDROCHOLICUM

COD ATC: A05AAN1

FIOBILIN *TERAPIA SA;* Cpr. 250 mg ***(OTC)***

Ind: Dispepsii diverse: flatulență, eructații, grețuri, digestie dificilă; litiază biliară recurentă, angiocolită recurentă, diskinezie biliară, obstrucție parțială cronică a coledocului; după interv. chir. recente pe căile biliare și în caz de drenaj prelungit al coledocului infectat prin fistulă biliară sau tub T; hepatite epidemice, adjuvant în trat. cu diuretice mercuriale, migrene și algii de origine hepatică, constipație cronică, migrene și alergii de origine hepatică.
Dz: *Adulți:* 250-500 mg de 3 ori/zi după mese, timp de 15 zile. *Copii: 7-15 ani,* 250-500 mg/zi.
Cind: Afecțiuni hepato-biliare acute, IH gravă, ciroza avansată, icter mecanic, boala ulceroasă, esofagita de reflux, diaree, alergie specifică. Nu se va adm. în sarcină și perioada de alăptare.
A!: Prudență la vârstnici. Este incompatibil cu substanțele cu reacție acidă.
RA: Greață, vomă, gust amar, diaree.

ACIDUM FOLICUM

COD ATC: B03BB01

ACID FOLIC *SICOMED SA;* Dj. 5 mg ***(P-6L)***

ACIFOL® *SICOMED SA;* Cpr. film. 5 mg ***(P-6L)***

Ind: Anemie macrocitară, nutrițională, anemie macrocitară de sarcină, sprue, sindrom megaloblastic al copiilor mici, ciroză alcoolică (insuficiența formării și depozitării de folați activi), anemie hemolitică sau neoplasme rapid evolutive, hipertiroidieni.
Dz: Oral, 1-5 mg/zi în 1-2 prize. Trat. se face până la dispariția cauzei, sau indefinit dacă aceasta persistă. În scop profilactic (sarcină, lactație) sunt suficiente 0,2-0,5 mg acid folic/zi.

Cind: Ca trat. unic în anemiile prin deficit de vit. B. Nu trebuie utilizat singur în anemia pernicioasă. Nu se adm. la persoanele peste 60 de ani, la care ar putea stimula evoluția unui eventual proces neoplazic latent.
A!: Poate întârzia stabilirea diagnosticului și instituirea trat. corect în anemiile megaloblastice. Nu se asociază cu sulfamidele. Dozele mari interferă efectul anticonvulsivant al fenobarbitalului, fenitoinei, primidonei.
RA: Manifestări alergice.

ACIDUM FUSIDICUM

COD ATC: D06AX01

FUCIDIN® *LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS;* Ung. 2%; Cremă 2% *(P-RF)*

FUCIDIN® *LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS;* Cpr. film. 250 mg *(P-RF)* *COD ATC: J01XC01*

FUCITHALMIC® *LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS;* Gel. oft. 1% *(P-RF)* *COD ATC: S01AA13*

Ind: Trat. infecțiilor cutanate determinate de microorganisme sensibile la acidul fusidic: impetigo, plăgi infectate, hidrosadenită, foliculite, furuncule, abcese, eritrasmă. Fucithalmic-gel oftalmic este indicat pentru tratamentul infecțiilor oculare determinate de microorganisme sensibile la acisul fusidic (conjunctivite, blefarite, keratite, dacriocistite).
Dz: Fucidin cremă/unguent se aplică local de 2-3 ori/zi, după spălarea și uscarea zonei afectate, cu sau fără pansament ocluziv, timp de 7 zile. Fucidin comprimate se administrează la *adulți* și *copii peste 12 ani* câte 1 cpr. de 2 ori pe zi. În infecțiile oculare se instilează în sacul conjunctival o picătură de Fucithalmic de 2 ori pe zi. Tratamentul se va continua cel puțin 2 zile după ce ochiul revine la aspectul normal.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componente. Infecții cutanate la nivelul zonei mamare la femeile care alăptează.
A!: Indicat numai pentru aplicații cutanate. Nu se aplică pe mucoase sau pe plăgi. Trebuie evitat contactul cu ochii, în tratamentul cu Fucidin cremă/unguent. În timpul tratamentului cu Fucithalmic nu se vor aplica lentile de contact.
RA: Fenomene de iritație sau hipersensibilizare (eritem, prurit, senzație de arsură), usturime locală oculară. Puțin probabil reacții adverse sistemice (toxicitate hepatică).

ACIDUM GADOBENICUM

COD ATC: V08CA08

MULTIHANCE *EWOPHARMA/BRACCO;* Sol. inj. 529 mg/ml (fl. × 5 ml, 10 ml, 15 ml sau 20 ml) ***(S)***

Ind: Acidul gadobenic este o substanță de contrast paramagnetică utilizată în diagnosticul ficatului și a sistemului nervos central (SNC) prin rezonanță magnetică (MRI). Acidul gadobenic este indicat pentru decelarea leziunilor focali-

zate hepatice la pacienții cunoscuți sau suspecți de cancer hepatic primar (ex. carcinom hepatocelular) sau cu metastaze. Acidul gadobenic este, de asemenea, indicat pentru examen MR al SNC sau a coloanei vertebrale unde înbunătățește decelarea leziunilor și furnizează informații suplimentare față de cele obținute prin examen MR fără substanță de contrast.
Dz: *Ficat:* Doza recomandată pentru administrarea injectabilă de acid gadobenic la pacienții adulți este de 0,05 mmol/kgcorp. Aceasta corespunde la 0,1 ml/kg din soluția 0,5 M. *SNC:* doza recomandată de acid gadobenic pentru administrare injectabilă la pacienții adulți este de 0,1 mmol/kgcorp. Aceasta corespunde la 0,2 ml/kg din soluția 0,5 M. Produsul trebuie administrat intravenos, fie în bolus, fie prin injecție lentă (10 ml/min) fără diluție. Examinarea poate fi făcută imediat după administrarea în bolus (MRI dinamic) sau între 40-120 minute după injectarea lentă (MRI întârziată), modul de examinare depinzând de nevoile individuale. În examinarea SNC, aceasta trebuie făcută după 60 de minute de la administrare pentru a obține o imagine clară.
Cind: Nu se adm. la pacienții cu hipersensibilitate la oricare din substanțele conținute sau la unul din compușii chelatați ai gadolinium-ului. Nu se adm. la pacienții cu disfuncție renală (clearence-ul creatininei < 30 ml/min). Nu este recomandată adm. la femeile însărcinate.
A!: Nu este recomandată adm. la pacienți sub 18 ani. Pacienții recunoscuți cu reacții alergice sau cu hipersensibilitate trebuie ținuți sub observație strictă în timpul și după examinare. Precauție la pacienții cu afecțiuni cardiovasculare. În timpul examenului, după administrare, pot fi eliberate mici cantități de alcool benzilic (< 0,2%) de către substanța activă – gadobenat de dimeglumină. De aceea, acidul gadobenic nu trebuie administrat la pacienții cu sensibilitate cunoscută la alcool benzilic.
RA: În mai mult de 1% din cazuri – hipertensiune; în 0,5-1% din cazuri – alterarea sensibilității la locul injectării, tahicardie, cefalee, greață, vomă; la mai puțin de 0,5% din cazuri – prurit, diaree, uscăciunea gurii, vasodilatație, erupții cutanate, amețeli, dureri abdominale, tremor, hipotensiune, dureri abdominale, aritmie, alterări ale gustului, edeme locale. Majoritatea efectelor secundare semnalate sunt ușoare, tranzitorii și nu au necesitat nici o formă de tratament. Posibile reacții anafilactice (dispnee sau spasm laringeal) dar de intensitate moderată. Foarte rar cazuri la care au apărut: mialgie, convulsii, incontinență urinară sau fecală. Valori anormale ale probelor de laborator cum ar fi albuminurie, leucocitoză, glicozurie, reducerea concentrației fierului total din sânge și o creștere a nivelului transaminazelor, fosfatazei alcaline, creatininei serice și fierului seric au fost semnalate după administrarea de acid gadobenic, la mai puțin de 1% din cazuri, mai ales la pacienții cu disfuncție hepatică anterioară.

ACIDUM GADOPENTETICUM *COD ATC: V08CA01*

MAGNEVIST *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Sol. inj. 78,63 mg/ml (fl. × 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml sau 100 ml) ***(S/P-RF)***

MAGNEVIST *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Sol. inj. 78,63 mg/ml (ct. × 1 fiolă seringă × 5 ml, 10 ml, 15 ml sau 20 ml) ***(S/P-RF)***

Ind: *Examen de rezonanță magnetică (RMN) craniană și spinală.* Utilizat în special pentru depistarea tumorilor cât și pentru clarificarea problemelor de diagnostic diferențial în suspiciunea de meningiom, neurinom (acustic), tumori invazive (de ex. gliom) și metastaze; pentru a demonstra tumorile mici și/sau izointense; în suspiciunea de recidivă după intervenția chirurgicală sau radioterapie; pentru diagnosticul diferențial în forme rare de neoplasm ca: hemangioblastom, ependimom și adenoame hipofizare mici; pentru o mai bună delimitare a tumorilor de origine necerebrală. Suplimentar în RMN spinal, utilizat pentru diferențierea tumorilor intra și extramedulare, diagnosticarea zonelor tumorale solide în fistule cunoscute, determinarea extinderii tumorale intramedulare. *Examen de rezonanță magnetică (RMN) al întregului corp*, incluzând craniul facial, regiunea gâtului, spațiul toracic și abdominal, sânii, pelvisul și aparatul locomotor activ și pasiv.

Dz: Pacientul nu trebuie să mănânce cu 2 ore înainte de examinare. Doza recomandată este administrată intravenos sau în bolus. Examenul RMN poate începe imediat după injectare.

Principiile de dozare se aplică la adulți și copii: RMN cranian și spinal: în general, administrarea de 0,2 ml/kg corp este suficientă pentru o bună opacifiere și răspunde necesităților clinice. Dacă persistă o suspiciune clinică a leziunii în ciuda unui RMN normal, o injecție suplimentară a dozei totale inițiale în decursul a 30 minute urmată imediat de RMN poate crește eficiența diagnosticului. RMN-ul întregului corp: în general, administrarea de 0,2 ml/kg corp este suficientă pentru o bună opacifiere și pentru a răspunde necesităților clinice. În cazuri speciale, de ex. leziunile slab vascularizate și/sau un spațiu extracelular mic, pot fi necesari 0,4 ml/kg corp pentru un efect de contrast adecvat, în special în timpul T_1 al secvenței de scanare.

Cind: Nu se cunosc.

RA: Ocazional, după administrare de acid gadopentetic au fost observate greață, vărsături precum și reacții alergice ale tegumentului și mucoasei. Pacienții cu predispoziție alergică prezintă mai des decât ceilalți reacții de hipersensibilitate. În cazuri foarte rare pot fi întâlnite reacții anafilactice până la șoc.

Foarte rar, sunt posibile senzații discrete de căldură și durere la locul injectării, asociate puncției venoase sau injectării substanței de contrast. În cazuri rare au fost observate convulsii după administrarea de acid gadopentetic, totuși este greu de făcut o legătură cauzală între cele două evenimente.

Dureri de cap tranzitorii, vasodilatație, amețeli, frisoane și sincope, urmate administrării substanței de contrast au fost raportate ocazional, fără a se putea stabili o legătură cauzală.

Senzații gustative tranzitorii pot apărea după administrarea în bolus a substanței. Soluția injectabilă hiperosmolară poate cauza dureri tisulare care durează până la 20 minute de la injectarea paravasculară. Nici o altă reacție tisulară nu a fost observată.

ACIDUM GLICIRIZINICUM *COD ATC: G01AXN1*

EPIGEN „INTIME" *CHEMINOVA INT.;* Sol. ext. 0,1%; ct. × 1 fl.; Spray × 125 ml ***(P-RF)***

Ind: Tratamentul și profilaxia erupțiilor herpetice (HSV I și II), adjuvant topic în terapia herpes-zoster (VZV), tratamentul leziunilor genitale produse de virusul papilloma atât în cazurile ușoare cât și în cele care necesită și alte tipuri de intervenție. Se poate administra profilactic după fiecare contact se-

xual la persoanele cunoscute cu recidive herpetice genitale. Reduce puternic pruritul genital, leucoreea și alte senzații de disconfort genital produse de diverse afecțiuni sau activități.
Dz: În erupțiile herpetice genitale și în zona-zoster se fac 5-6 nebulizări pe zi timp de 6 zile, iar în cazurile rebele se poate prelungi încă 3-4 zile. Eficacitatea medicamentului este mult crescută dacă aplicările precedă apariția erupției și survin în timpul simptomatologiei prevestitoare. În erupțiile herpetice recidivante în legătură cu ciclul menstrual se poate aplica profilactic în 2-3 nebulizări pe zi atâta timp cât este nevoie (în zilele de maximă probabilitate a apariției erupției, înainte și după acestea) iar dacă erupția totuși apare se aplică posologia prezentată anterior. Leziunile papilomatoase ușoare dispar după 5-6 nebulizări pe zi timp de 7-10 zile, iar în leziunile mari, eficacitatea maximă se obține prin tratamentul combinat (ex. Epigen Intim 7-10 zile – disrupție laser -- Epigen „Intime” 7 zile).
Cind: Hipersensibilitatea la acid glicirizinic sau propilenglicol.
A!: Nu necesită. Se poate folosi și la gravide.
RA: În dozele uzuale folosite pe perioade oricât de lungi, nu s-au evidențiat.

ACIDUM HIALURONICUM *COD ATC: M09AX01*

HYALGAN® *CSC PHARMACEUTICALS;* Sol. inj. 2 ml în seringă pre-umplută; 20 mg; ct. × o seringă × 2 ml sol. inj.; ct. × 5 seringi × 2 ml sol. inj.; ct. × un flac. × 2 ml sol. inj..

Ind: Osteoartritele genunchiului, pentru ameliorarea de durată a durerii.
Dz: *Adulți (inclusiv vârstnici):* Conținutul unei fiole (20 mg/2 ml) sau al unei seringi pre-umplute (20 mg/2 ml) trebuie injectat în articulația afectată o dată pe săptămână, 5 săptămâni consecutiv, utilizându-se o tehnică standard de injectare. Tratamentul poate fi repetat la intervale de cel puțin 6 luni.
Cind: Hipersensibilitate la hialuronatul de sodiu, proteinele de origine aviară sau la oricare dintre excipienții produsului (hialuronatul de sodiu - Hyalectin - este de origine aviară). Infecții sau alte afecțiuni cutanate la locul de injectare.
A!: Înainte de administrarea Hyalgan se îndepărtează lichidul articular, dacă există. Precauție pentru a nu suprasolicita articulația imediat după injecția intraarticulară. Produsul se utilizează numai dacă soluția este clară. Nu se adm. concomitent sau în amestec cu alte preparate injectabile intraarticulare, datorită experienței limitate. Nu se utilizează concomitent cu dezinfectante care conțin săruri cuaternare de amoniu. Prudență la gravide, femei care alăptează.
RA: Foarte rar, la locul injectării pot să apară durere, tumefacție, căldură, roșeață (dispar spontan în 1-4 zile). Dacă manifestările apar, articulația afectată se pune în repaus și se aplică local gheață. Cazuri izolate de reacții de tip anafilactic. Rareori, pot apărea reacții alergice, atât sistemice, cât și locale.

ACIDUM IBANDRONICUM *COD ATC: M05BA06*

BONDRONAT *HOFFMANN LA ROCHE;* Cpr. film. × 50 mg acid ibadronic; Conc. pt. sol. perf. 6 mg/6 ml; ct. × 1, 5, 10 fl.

Ind: Creșteri patologice (anormale) ale valorilor calcemiei (hipercalcemie) ca rezultat al tumorilor. Prevenția afectărilor osoase (fracturi patologice, complicații osoase care necesită radioterapie sau intervenții chirurgicale) la pacienții cu cancer de sân și metastaze osoase. Se recomandă ca funcția renală, calcemia, fosfatemia și magneziemia să fie monitorizate în conformitate cu practica clinică. La pacienții cu risc de insuficiență cardiacă, trebuie evitată hiperhidratarea.

Dz: *Cpr.:* Doza uzuală este de un comprimat pe zi. În afecțiuni renale severe, medicul poate reduce doza la un comprimat pe săptămână. Comprimatele se administrează după un post nocturn de cel puțin 6 ore. Se evita alimentele sau medicamentele care conțin calciu înainte de administrare. După administrare se așteaptă cel puțin 30 minute înainte de administrarea oricăror altor medicamente, inclusiv a celor pentru indigestie, a suplimentelor cu calciu și a vitaminelor.

Sol. perf.: Prevenția afectării osoase la pacienții cu cancer de sân și metastaze osoase: doza recomandată este de 6 mg intravenos, administrată la fiecare 3-4 săptămâni. Doza trebuie administrată perfuzabil în 1 oră. La pacienții cu insuficiență renală severă (CLcr < 30 ml/min), doza recomandată este de 2 mg, administrată la fiecare 3-4 săptămâni, în perfuzie cu durata de 1 oră. Hipercalcemia determinată de tumori: înainte de tratament, pacientul trebuie rehidratat adecvat cu clorură de sodiu 0,9%. Se ține cont de severitatea hipercalcemiei și tipul de tumoră. La majoritatea pacienților cu hipercalcemie severă (calcemia corectată cu albumină ≤ 3 mmol/l sau ≥ 12 mg/dl), doza unică adecvată este de 4 mg. La pacienții cu hipercalcemie moderată (calcemia corectată cu albumină < 3 mmol/l sau < 12 mg/dl), doza eficace este de 2 mg. Cea mai mare doză utilizată în studiile clinice a fost de 6 mg, dar această doză nu a adus nici un beneficiu suplimentar în termeni de eficacitate.

Calcemia corectată cu albumină este calculată după cum urmează:

- calcemia corectată cu albumină (mmol/l) = calcemia (mmol/l) - [0,02 x albumină (g/l)] + 0,8

sau

- calcemia corectată cu albumină (mg/dl) = calcemia (mg/dl) + 0,8 x [4 - albumină (g/dl)].

Pentru a converti calcemia corectată cu albumina din mmol/l la mg/dl, se înmulțește cu 4. Trebuie amestecat doar cu soluție izotonă de clorură de sodiu sau cu soluție de glucoză 5%.

Cind: Hipersensibilitate (alergie) la substanța activă sau la excipienți. Nu se utilizează la copii, în sarcină și alăptare.

RA: Creșterea temperaturii corpului, ocazional. Sindrom pseudogripal cu febră, frisoane, dureri osoase sau musculare. La pacienții cu astm bronșic sensibil la acid acetilsalicilic, administrarea altor bifosfonați a fost asociată cu bronhoconstricție (wheezing, lipsa aerului). La pacienții cu cancer de sân și metastaze osoase, administrarea intravenoasă a Bondronat a fost cel mai frecvent asociată cu oboseală, dureri de cap, sindrom pseudogripal, diaree și dureri musculare (mialgii). Alte reacții adverse frecvente includ: indigestie (dispepsie), vărsături, amețeli, dureri gastrointestinale, valori crescute ale enzimelor hepatice, valori crescute ale creatininemiei, dureri în gât, umflare (edem) ale membrelor inferioare. Nu au fost investigate efectele asupra reacțiilor, vigilenței sau atenției.

A!: Hipersensibilitate la alți bifosfonați, hipocalcemie, tulburări ale metabolismului mineral (cum este carența de vitamina D), afecțiune renală severă (insuficiența renală cu clearance-ul creatininei < 30ml/min), tulburări esofagiene, intoleranță la galactoză, deficit de lactază Lapp, tulburări de absorbție galactoză-glucoză. Se va informa medicul asupra consumului de antiinflamatorii nesteroidiene (AINS) sau asupra utilizării altor medicamente sau suplimente care conțin calciu, magneziu, fier sau aluminiu, aminoglicozide. Prudență la asocierea cu aminoglicozide.

ACIDUM MEFENAMICUM *COD ATC: M01AG01*

VIDAN *VIANEX SA;* Cpr. film. 500 mg ***(P-RF)***

Ind: Terapia simptomatică în: artrita reumatoidă; spondilite anchilozante; artrite psoriazice. În dismenoree primară; migrene, dureri dentare, dureri postoperatorii; metroragii datorate unor disfuncții hormonale.
Dz: *Adulți și copii mai mari de 14 ani:* 500 mg la 8 ore.
Cind: Hipersensibilitate la componentele medicamentului; simptomatogie alergică la alte AINS (aspirina); persoane cu antecedente gastrice. Se evită asocierea cu alte medicamente AINS.
A!: La cei cu disfuncții hepatice sau renale. Acidum mefenamicum poate potența efectul altor medicamente. Prudență la pacienții tratați concomitent cu anticoagulante cumarinice, sulfoniluree, hidantoine sau sulfamide. Poate determina o falsă reacție pozitivă pentru biliurie.
RA: Dispepsii, dureri de cap, diaree, dureri abdominale, vertij. Ulcer peptic, hemoragii la nivelul tractului gastro-intestinal, tulburări vizuale și nervoase, creșteri ale uremiei, nefrite interstițiale; disfuncții hematologice; pancreatite, convulsii epileptice, tulburări psihice, biliurie.

ACIDUM NALIDIXICUM *COD ATC: J01MB02*

ACID NALIDIXIC *SICOMED SA;* Cps. 500 mg ***(P-RF)***

NALIDIXIC ACID *REMEDICA;* Cpr. 500 mg ***(P-RF)***

NALIXID® 500 mg *SICOMED SA;* Cps. 500 mg ***(P-RF)***

Ind: Infecții urinare. Profilactic, înainte și după intervenții în sfera urogenitală.
Dz: *Adulți:* 4 g/zi în primele 1-2 săpt., apoi, dacă este nevoie, câte 2 g/zi. *Copii:* 0,055 g/kg/zi în 4 prize egale. În caz de terapie prelungită 0,033 g/kg/zi.
Cind: Infecții cu germeni rezistenți la acid nalidixic. În primul trimestru al sarcinii și în prima lună de viață.
A!: Evitarea expunerii la soare. Se impune testarea periodică a sensibilității germenilor. Metaboliții săi pot determina, în anumite teste, valori incorecte pentru glucoză, 17-cetosteroizilor urinari. Dacă trat. se continuă peste 14 zile, se impune efectuarea periodică a examenului hematologic și a probelor funcționale hepatice și renale. Asocierea cu nitrofurantoina, cloramfenicolul și tetraciclinele nu este indicată. Prudență în timpul trat. cu anticoagulante cumarinice.
RA: Tulburări gastrointestinale, fenomene alergice, reacții cutanate de fotosensibilizare. Mai rar somnolență, cefalee, amețeli, colestază, parestezii, trombopenie sau anemie hemolitică. Uneori tulburări de vedere. Psihoze toxice sau convulsive la persoane predispuse. La sugari și la copii, rar, semne de hipertensiune intracraniană.

ACIDUM NICOTINICUM

COD ATC: C10AD02

ACID NICOTINIC *SICOMED SA;* Cpr. 100 mg ***(P-6L)***

ACID NICOTINIC *SICOMED SA;* Cpr. 100 mg ***(P-6L)*** *COD ATC: A11HA01*

Ind: Tulburări circulatorii cerebrale, ateroscleroză cerebrală, ramolisment, tulburări circulatorii la hipertensivi, tulburări circulatorii retiniene, tulburări circulatorii în sfera ORL, tulburări circulatorii periferice. Hiperlipoproteinemii de tip II a și b, III, IV, V.

Dz: Oral, 50-500 mg de 2-3 ori/zi la mese, dizolvate în apă, pt. acțiune vasodilatatoare. 3 g/zi, la mese, în 3-4 prize, pt. acțiune hipolipemiantă.

Cind: Hemoragii recente, IC, IM, ulcer gastroduodenal.

A!: Risc de scădere tensională marcată la asocierea cu vasodilatatoare și hipotensive. Poate inhiba efectul uricozuric al probenecidului și sulfinpirazonei. Se adm. cu prudență sau se evită în primul trimestru de sarcină.

ACIDUM NIFLUMICUM

COD ATC: M02AA17

NIFLUGEL – GEL PERCUTANE *LAB. UPSA;* Gel 2,5% ***(OTC)***

NIFLURIL *LAB. UPSA;* Cps. 250 mg ***(P-RF)*** *COD ATC: M01AX02*

NIFLURIL *LAB. UPSA;* Cremă 3% ***(OTC)***

NOVOPONE *SANTA N. BALANOS;* Cps. 250 mg ***(P-RF)***
COD ATC: M01AX02

Ind: Adulți și copii cu vârste peste 12 ani: ca trat. de durată în: reumatism inflamator cronic, artroze; ca trat. pe termen scurt în dureri acute; dureri datorate inflamației gâtului, urechilor sau gurii. Percutan: luxații, entorse.

Dz: *Oral,* la *adulți* și *copii* cu vârsta *peste 12 ani,* 250-750 mg pe zi. *Local* se aplică de 2-3 ori pe zi.

Cind: După luna a 6-a de sarcină, alergie cunoscută la acid niflumic sau la alte medicamente înrudite, ulcer gastric sau duodenal activ, afecțiune hepatică severă, afecțiune renală severă, copii cu vârsta sub 12 ani. Nu trebuie asociat cu: anticoagulante orale, alte AINS, heparină, litiu, metotrexat în doze mari, ticlopidină.

A!: Trebuie adaptată doza în caz de: afecțiuni digestive; afecțiuni cardiace, hepatice și renale; utilizarea unui dispozitiv intrauterin în scop contraceptiv. Atenție pe parcursul primelor 5 luni de sarcină și în perioada lactației.

RA: Reacții alergice cutanate, de exemplu urticarie, prurit, reacții cutanate severe prin expunere la lumina solară sau la radiații ultraviolete; rar dermatită buloasă pe mucoase sau piele; crize de astm; șoc alergic; sângerare gastro-intestinală. Ulcerație duodenală și perforație. Tulburări digestive ca durere abdominală, vomă sau greață. Modificări osoase (fluoroze). Modificări ale rezultatelor testelor de laborator (hemogramă, teste funcționale hepatice și renale).

ACIDUM PAMIDRONICUM COD ATC: M05BA03

AREDIA *NOVARTIS;* Liof. pentru sol. inj.; 3 mg/ml; f. 5 ml ***(S/P-RF)***

Ind: Metastaze osoase, predominant osteolitice, mielom multiplu, tumori care induc hipercalcemie, boala Paget osoasă.

Dz: Soluția concentrată din fiole sau substanța activă din flacoane trebuie diluată cu soluții de clorură de sodiu 0,9% sau glucoză 5% și apoi perfuzată lent. Tumori care induc hipercalcemie: se recomandă ca pacienții să fie rehidratați cu soluție salină normală înaintea sau în timpul tratamentului. Doza totală de pamidronat disodic care trebuie utilizată în cursul unei cure de tratament depinde de nivelul calciului seric inițial al pacienților. Doza totală poate fi administrată fie într-o singură perfuzie sau în perfuzii multiple de-a lungul a 2-4 zile consecutive. Doza maximă admisă pentru o cură de tratament (la adulți și persoane vârstnice) este de 90 mg. În cazul tumorilor care induc hipercalcemie, se recomandă o rată a perfuziei între 15-30 mg/2 ore. Concentrația pamidronatului disodic în soluția pentru perfuzie nu trebuie să depășească 15 mg/125 ml.

În cazul tumorilor osteolitice fără hipercalcemie, doza totală recomandată este de 30 mg o dată pe săptămână timp de 4 săptămâni consecutiv, după care o dată la 2 săptămâni. Durata tratamentului trebuie să fie de 6 luni, doza va fi diluată în cel puțin 250 ml soluție salină sau glucoză, iar rata perfuziei de 2 ore. În boala Paget osoasă, doza totală recomandată este de 180-210 mg care poate fi administrată astfel: fie 30 mg o dată pe săptămână, timp de 6 săptămâni (doza totală de 180 mg), fie 60 mg o dată pe săptămână, timp de 3 săptămâni, la care se adaugă o doză inițială de 30 mg (doza totală de 210 mg). Doza de 30 mg se va dilua în 250 ml soluție salină, iar cea de 60 mg în 500 ml. Se recomandă o rată a perfuziei de 15 mg/oră.

Cind: Hipersensibilitate la pamidronat disodic sau alți bifosfonați.

A!: Pamidronatul disodic nu trebuie administrat în bolus (poate determina tulburări locale importante), ci diluat și perfuzat lent intravenos. Pamidronatul disodic nu trebuie asociat altui bifosfonat, întrucât nu există studii clinice asupra compatibilității acestuia. Se impune monitorizarea electroliților serici (calciu, fosfat) înaintea începerii tratamentului cu pamidronat disodic. Pacienților cu hipocalcemie cărora li se administrează pamidronat disodic în perfuzie i.v. trebuie să li se evalueze periodic funcția renală (prin teste de laborator și parametri clinici). În studiile clinice, pamidronatul disodic a fost utilizat fără a se demonstra efecte adverse la pacienții cu insuficiență renală moderată (nivelul creatininei serice de două ori mai mare decât valoarea normală), dar nu și la pacienții cu insuficiență renală severă. În cazul acestora, clinicianul trebuie să evalueze beneficiile administrării comparativ cu riscurile. Pacienților cu boală Paget osoasă aflați sub tratament cu pamidronat disodic trebuie să li se administreze calciu oral sau vitamină D pentru diminuarea riscului hipocalcemiei. Nu există date clinice privind administrarea pamidronatului disodic la copii.
Sarcină și alăptare: Nu se adm. în sarcină și nici pacientelor care alăptează.
Efecte asupra capacității de a conduce autovehicule și de a folosi utilaje: Existând posibilitatea apariției somnolenței și/sau amețelii la pacienții tratați cu pamidronat disodic, aceștia trebuie preveniți în privința conducerii autovehiculelor sau angrenării în activități care necesită o atenție crescută.

RA: Frecvent hipocalcemie asimptomatică, febră (o creștere cu 1-2°C), întâlnite în primele 48 de ore de la administrare. Febra dispare spontan și nu necesită tratament, iar hipocalcemia simptomatică este foarte rară. *Reacții locale:* Ocazional durere, indurare, flebită, tromboflebită, la locul de administrare. *Sistem musculoscheletal:* Ocazional durere osoasă tranzitorie, artralgii, mialgii, durere generalizată. Rar crampe musculare. *Tract gastrointestinal:* Ocazional greață, vărsături. Rar anorexie, durere abdominală, diaree, constipație, dispepsie. Cazuri izolate de gastrită. *Sistem nervos central:* Ocazional cefalee. Rar agitație, confuzie, amețeală, insomnie, somnolență, letargie. Cazuri izolate de hipocalcemie simptomatică (parestezii, tetanie), halucinații vizuale (un singur caz citat). *Circulator:* Ocazional limfocitopenie. Rar leucopenie. Cazuri izolate de trombocitopenie. *Cardiovascular:* Rar hipotensiune, hipertensiune. Cazuri izolate de insuficiență ventriculară stângă (dispnee, edem pulmonar), insuficiență cardiacă congestivă (edem). *Renal:* Cazuri izolate de insuficiență renală acută, agravarea unei maladii renale preexistente. *Piele:* Rar urticarie, prurit. *Organe de simț:* Cazuri izolate de conjunctivite, uveite, sclerită, episclerită, xantopsie. *Modificări biochimice:* Frecvent hipocalcemie, hipofosfatemie. Ocazional hipomagneziemie. Rar hiperkaliemie, hipokaliemie, hipernatremie. Cazuri izolate de teste hepatice anormale.

ACIDUM RISEDRONICUM *COD ATC: M05BA07*

ACTONEL® 5 mg; ACTONEL® 30 mg *LAB. AVENTIS PHARMA;* Cpr. film. 30 mg ***(P-6L)***

Ind: *Cpr. de 5 mg*: pentru tratamentul osteoporozei postmenopauză, pentru reducerea riscului de fracturi vertebrale, a riscului de fracturi de șold. Profilaxia osteoporozei la femeile în postmenopauză care prezintă risc crescut de osteoporoză. Menținerea sau creșterea masei osoase la femeile în postmenopauză aflate sub tratament de lungă durată (peste 3 luni) cu glucocorticoizi, la doze de > 7,5 mg prednison pe zi sau echivalente. *Cpr. de 30 mg:* Tratamentul bolii Paget osoase.
Dz: Pentru profilaxia și tratamentul osteoporozei: *Adulți*: Doza zilnică recomandată pentru adulți este de 5 mg risedronat sodic administrat oral. Pentru tratamentul bolii Paget osoase: doza zilnică recomandată pentru adulți este de 30 mg risedronat sodic administrat oral timp de 2 luni. Dacă se consideră necesar ca tratamentul să se repete (la cel puțin 2 luni post-tratament), terapia se poate relua cu aceeași doză pentru aceeași perioadă de timp. Deoarece absorbția risedronatului sodic este influențată de alimentație, pentru a asigura o absorbție adecvată, pacienta își va administra comprimatul filmat fie cu cel puțin 30 minute înaintea primului aliment/băutură (exceptând apa) din ziua respectivă, fie la cel puțin două ore după ingestia de alimente/băuturi, în orice alt moment al zilei, cu cel puțin 30 minute înainte de culcare. Comprimatele filmate se vor înghiți întregi. Pentru a facilita ajungerea comprimatului filmat în stomac, acesta se va administra cu un pahar de apă (120 ml), în ortostatism. Pacienta nu se va întinde la orizontală cel puțin 30 minute după administrarea produsului. Administrarea suplimentară de calciu și vitamina D poate fi luată în considerare dacă aportul alimentar este inadecvat. *Copii:* siguranța și eficiența risedronatului sodic nu au fost stabilite în cazul copiilor sub 18 ani.
Cind: Hipersensibilitate la risedronat sodic sau la oricare dintre excipienții produsului. Hipocalcemie. Sarcină și alăptare. Insuficiență renală severă (clearance al creatininei < 30 ml/min).
A!: Alimentele, băuturile (altele decât apa) și medicamentele care conțin cationi polivalenți (calciu, magneziu, fier și aluminiu) pot interfera cu absorbția rise-

Dulcolax

dronatului sodic și nu trebuie administrate concomitent. De aceea, risedronatul sodic se va administra fie cu 30 de minute înainte de ingerarea primului aliment/băutură din ziua respectivă sau la cel puțin 2 ore după masă/ingestia băuturilor, în orice alt moment al zilei. Hipocalcemia trebuie tratată înainte de începerea tratamentului cu risedronat sodic. Alte tulburări ale metabolismului osos sau mineral (disfuncție paratiroidiană, hipovitaminoză D) trebuie tratate în momentul în care se începe terapia cu risedronat sodic. Este contraindicată administrarea risedronatului sodic femeilor însărcinate sau care alăptează.
RA: Reacții adverse frecvente: *Aparat digestiv:* constipație, dispepsie, greață, dureri abdominale, diaree, esofagite, gastrite, disfagie, duodenite, ulcer esofagian, stricturi esofagiene, glosite. *Sistem musculoscheletal:* dureri musculoscheletale. *Sistem nervos:* cefalee.

ACIDUM SALICYLICUM *COD ATC: D11AFN1*

CLAVUSIN *MEDUMAN SA;* Sol. ext. 19,3% g/g ***(OTC)***

URGOCOR CORICIDE *LAB. URGO Soin et Santé;* Pansament ***(OTC)***

Ind: Keratolitic utilizat în clavus, veruci vulgare, ihtioza formă gravă etc.
Dz: Ext. se aplică solutia, prin pensulare locală pe zonele afectate de hiperkeratoză o dată pe zi și apoi se pune un pansament ocluziv ce se ține minim 24 de ore.
Cind: Nu se aplică pe tegumente lezate, inflamate, infectate sau în vecinătatea ochilor și mucoaselor.
A!: Prudență când se aplică pe pielea membrelor inferioare la bolnavii cu arterită obliterantă sau la diabetici. Se va evita contactul cu ochii sau gura. Aplicațiile soluției se vor face cu un aplicator, nu direct cu mâna, deoarece prezintă pericol de arsuri tegumentare.
RA: Iritații locale, cu arsuri, inflamații, chiar ulcerații, mai ales când se aplică și pe tegumentul normal perilezional. În caz de alergie la salicilați pot apărea erupții urticariene, reacții de tip eritem multiform, fenomene anafilactice sistemice.

ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM *COD ATC: A05AA02*

URSOFALK® *DR. FALK GmbH;* Cps. 250 mg ***(P-6L)***

URSOGAL *SICOMED SA;* Cps. 250 mg ***(P-6L)***

URSOSAN *PRO. MED. CS PRAHA;* Cps. 250 mg ***(P-6L)***

URSOFALK *EWOPHARMA/DR. FALK GmbH;* Cps. 250 g ***(P-6L)***

Ind: Dizolvarea calculilor biliari radiotransparenți colesterolici din colecist. Gastrită de reflux biliar. Colestaze hepatice.
Dz: Oral, seara înainte de culcare. Pentru dizolvarea calculilor biliari colesterolici și în colestazele hepatice, 10 mg/kg/zi. Pt. trat. gastritei de reflux biliar se adm. 250 mg pe zi. Trat. pt. dizolvarea calculilor biliari poate dura între 6 și 24 luni. Rezultatele terapiei trebuie monitorizate prin ecografie sau colecistogra-

fie la fiecare 6 luni. Pt. trat. gastritei de reflux biliar se adm. timp de 10-14 zile.
Cind: Inflamații acute ale colecistului, căilor biliare și pancreasului. Obstrucția tractului biliar. Afecțiuni inflamatorii ale intestinului gros sau subțire. Sarcină și alăptare. În caz de calculi calcificați, veziculă biliară ce nu poate fi vizualizată radiologic, tulburări de contractilitate a colecistului sau frecvente colici biliare. Nu se asociază cu cholestyramin, colestipol sau preparate antiacide ce conțin hidroxid de aluminiu.
AI: Este necesar controlul ecografic al calculilor biliari înainte de începutul trat. și la interval de 6 luni în cursul acestuia. Trat. va fi monitorizat și prin controlul inițial și periodic al transaminazelor SGOT și SGPT.
RA: Calcificarea calculilor biliari în timpul trat. Fecalele pot deveni păstoase.

ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)

Epilepsii

COD ATC: N03AG01

CONVULEX® *GEROT;* Cps. 150 mg, 300 mg, 500 mg; Sirop 50 mg/ml ***(P-6L)***

DEPAKINE® sirop *SANOFI~SYNTHELABO;* Sirop 5,74%; fl. × 150 ml ***(P-6L)***

DEPAKINE® 200 mg *SANOFI~SYNTHELABO;* Cpr. film. gastro-rez. 200 mg ***(P-6L)***

DEPAKINE® CHRONO 300 *SANOFI~SYNTHELABO;* Cpr. film. elib. prel. 300 mg ***(P-6L)***

DEPAKINE® CHRONO 500 *SANOFI~SYNTHELABO;* Cpr. film. elib. prel. 500 mg ***(P-6L)***

ORFIRIL *DESITIN;* Sirop 300 mg/5 ml; fl. × 250 ml ***(P-6L)***

ORFIRIL-150 *DESITIN;* Cpr. gastrorez. 150 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. și × 100 cpr. ***(P-6L)***

ORFIRIL-300 *DESITIN;* Cpr. film. gastrorez. 300 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. film. și × 100 cpr. film. ***(P-6L)***

ORFIRIL-300 RETARD *DESITIN;* Cpr. film. ret. 300 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. film. ret. ***(P-6L)***

ORFIRIL-600 RETARD *DESITIN;* Cpr. film. ret. 600 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. film. ret. ***(P-6L)***

ORFIRIL® LONG 1000 mg *DESITIN;* Minicpr. elib. prel. 1000 mg; ct. × 50, 100, 200 miniplicuri cu minicpr. elib. prel. ***(P-6L)***

ORFIRIL® LONG 150 mg *DESITIN;* Cps. elib. prel. 150 mg; ct. × 1 fl. × 50, 100, 200 cps. ***(P-6L)***

ORFIRIL® LONG 300 mg *DESITIN;* Cps. elib. prel. 300 mg; ct. × 1 fl. × 50, 100, 200 cps. ***(P-6L)***

ORFIRIL® LONG 500 mg *DESITIN;* Minicpr. elib. prel. 500 mg; ct. × 50, 100, 200 miniplicuri cu minicpr. elib. prel. ***(P-6L)***

PENTILIN *REMEDICA;* Cpr. film. 200 mg; ct. × 10 blist. × 10 cpr. film., 40 cpr. film. ***(P-6L)***

VALEPIL *PHARMAPLANT BIOGALENICA SRL;* Sol. orală 200 mg/5 ml; fl. × 100 ml ***(P-6L)***

Ind: Adm. oral: în diferite forme de epilepsie ale adulților și copiilor cu greutatea peste 17 kg și în trat. unor tulburări de comportament observate în timpul convulsiilor. Adm. i.v.: Trat. epilepsiei, pe o perioadă mai scurtă de 3 zile, în locul adm. orale, dacă aceasta este temporar inutilizabilă.
Dz: Adm. oral: 20-30 mg/kg și zi; divizat în 2-3 prize, sau în 1-2 prize pentru formele orale retard. Adm. i.v.: Injecție i.v. directă: pentru un adult: 400-800 mg. În perf.: 25 mg/kg/24 ore, într-o soluție injectabilă de clorură de sodiu 9‰, timp de 24, 36 sau 48 ore.
Cind: Hepatită acută. Hepatită cronică. Antecedente familiale de hepatită severă. Hipersensibilitate la valproat.
A!: În caz de afecțiuni hepatice, IR. În timpul primelor 6 luni de trat., se vor supraveghea periodic funcțiile hepatice. Adm. inj. trebuie efectuată strict i.v. Sunt necesare examene hematologice periodice. În caz de sindrom abdominal dureros acut, este recomandat să se dozeze amilazemia. La copil, evitați adm. simultană cu salicilați. Atenție la asocierea cu: neuroleptice, antidepresive, fenobarbital, primidonă, alte antiepileptice cu efect inductor enzimatic (mai ales fenitoină, fenobarbital, carbamazepină). În timpul sarcinii trat. nu trebuie întrerupt. Monoterapia este recomandabilă. Se adm. doza zilnică minimă eficace repartizată în mai multe prize.
RA: Afecțiuni hepatice. Risc teratogen. Stări confuzionale sau convulsive. Tulburări digestive. Căderea părului, ușoare tremurături, hiperamoniemie izolată. După inj. pot să apară senzații de greață sau de vertij. Rar, scădere a fibrinogenului, trombopenie sau alungirea timpului de sângerare, anemie și de leucopenie. Creșteri în greutate, amenoree și iregularități menstruale. Risc de necroză tisulară locală în caz de injecții repetate.

ACIDUM ZOLEDRONICUM

COD ATC: M05BA08

ZOMETA *NOVARTIS PHARMA;* Pulb. 4 mg/fl. + 1 f. × 5 ml solvent; ct. × 1, 4, 10, 20 fl. pulb. + 1, 4, 10, 20 f. × 5 ml solvent ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. hipercalcemiei induse de tumori (HIT).
Dz: *Adulți și vârstnici:* 4 mg într-o singură perf. i.v. cu durata de 15 minute.
Cind: În timpul sarcinii, la femeile care alăptează, la pacienții cu hipersensibilitate la oricare dintre componente.
A!: Calcemia, fosfatemia și magnezemia, trebuie supravegheate după începerea trat. Funcția renală trebuie supravegheată. Nu este recomandat la pacienți cu IR severă (creatininemie ≥ 400 μmol/l sau 4,5 mg/dl). Trebuie evitată hiperhidratarea la pacienți cu risc de IC. Prudență în cazul asocierii cu aminoglicozide. Este posibilă apariția hipomagneziemiei.
RA: Creșterea temperaturii corporale. Sindrom pseudo-gripal (febră și dureri osoase). Artralgii, oboseală, confuzie, sete, pancitopenie și bradicardie. Scăde-

rea fosfatemiei. Reacții gastrointestinale (greață și vărsături). Reacții locale la nivelul locului de perfuzare, cum sunt eritem și edem. Eupții cutanate, prurit și dureri toracice. Conjunctivită. Hipomagneziemie. IR.

ACIPIMOXUM *COD ATC: C10AD06*

OLBETAM *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Cps. 250 mg *(P-6L)*

Ind: Trat. tulburărilor lipidice cu nivele plasmatice crescute ale trigliceridelor (hiperlipoproteinemie tip IV), ale colesterolului (hiperlipoproteinemia tip IIa) și ale trigliceridelor și colesterolului (hiperlipoproteinemia tip IIb, III și IV).
Dz: Oral, 250 mg de 2 sau 3 ori pe zi, după mese. La pacienții cu IR este recomandabilă reducerea dozei în funcție de valorile clearance-ului creatininei.
Cind: Hipersensibilitatea la medicament. Ulcerul peptic.
A!: Se recomandă regim hipolipidic și hipocolesterolemiant. În timpul trat. prelungite, sunt necesare determinări periodice ale nivelelor lipidice și lipoproteice precum și ale funcțiilor hepatice și renale. A se evita în sarcină și alăptare.
RA: Vasodilatație tegumentară cu senzație de căldură, roșeață și prurit. Tulburări gastrice moderate, cefalee și astenie. Reacții imunoalergice (urticarie, edem palpebral și/sau labial, erupție cutanată, dispnee, hipotensiune).

ACITRETINUM *COD ATC: D05BB02*

NEOTIGASON *HOFFMANN LA ROCHE;* Cps. 10 mg ***(P-RF)***

Ind: Tulburări severe de keratinizare, ca: psoriazis eritrodermic; psoriazis pustular localizat sau generalizat; ihtioză congenitală; pitiriazis rubra pilaris; boala Darier.
Dz: *Oral,* o dată pe zi, cu alimente (la masă) sau cu lapte. *Adulți:* inițial de 25-30 mg/zi, timp de două, până la patru săpt. Doza de întreținere 25-50 mg/zi, timp de alte șase sau opt săpt. Maxim 75 mg/zi. *Copii:* 0,5-1 mg/kg/zi maxim 35 mg/zi.
Cind: Este teratogen, nu trebuie folosit de femeile gravide, în perioadă fertilă sau care alăptează. Donarea de sânge este interzisă în timpul și un an după trat. cu acitretin. La pacienți cu funcție renală sau hepatică sever alterată și la cei cu valori cronic crescute ale lipidelor serice. Nu se utilizează concomitent cu tetracicline, metotrexat, vit. A sau alți retinoizi. În caz de sensibilitate la preparat sau la alți retinoizi.
A!: Funcția hepatică trebuie controlată înaintea începerii trat. și periodic în cursul trat. Colesterolul și trigliceridele serice trebuie monitorizate. La diabetici, retinoizii pot fie să amelioreze, fie să scadă toleranța la glucoză. Nivelele glicemiei trebuie controlate mai frecvent. Poate produce anomalii de osificare. La copii este necesară monitorizarea strictă a parametrilor de creștere și a dezvoltării osoase.
RA: Agravarea simptomatologiei bolii. Simptome de hipervitaminoză A. Uscăciunea gurii și sete. Subțierea pielii și cruste, mai ales la nivelul palmelor și suprafețelor plantare. Reacții de fotosensibilitate. Ocazional, cefalee, alterarea vederii nocturne și dureri musculare, articulare și osoase. Căderea părului, fragilitate unghială și paronichie. Pot apărea hiperostoză și calcificări extra-

scheletale. Creșteri tranzitorii ale transaminazelor și fosfatazei alcaline. Creșteri reversibile ale trigliceridelor serice și colesterolului seric. Nu poate fi exclus riscul aterogenezei asociate.

ADENOSINUM *ATC: C01EB10*

ADENOCOR *SANOFI WINTHROP;* Sol. inj. 6 mg/2 ml ***(S)***

Ind: Conversia rapidă la ritm sinusal normal a tahicardiilor paroxistice supraventriculare, inclusiv a celor asociate cu fascicule de conducere accesorii (sindrom Wolff-Parkinson-White). Indicații diagnostice: diagnosticul tahicardiilor supraventriculare cu complexe QRS largi sau înguste. Cu toate că nu convertește flutter-ul atrial, fibrilația atrială sau tahicardia ventriculară la ritm sinusal, încetinirea conducerii atrio-ventriculare ajută la diagnosticul activității atriale. Sensibilizarea investigațiilor elecrofiziologice intracavitare.
Dz: Exclusiv în spital, sub monitorizare și cu echipament de resuscitare cardio-respiratorie disponibil pentru utilizare imediată. Se adm. i.v, în bolus, rapid. Doze în indicația terapeutică: *Adulți,* doza inițială: 3 mg, sub formă de bolus intravenos rapid (injectat în 2 secunde); a doua doză: dacă prima doză nu a condus la dispariția tahicardiei supraventriculare în 1-2 minute, trebuie să se administreze încă 6 mg, tot sub formă de bolus intravenos rapid. A treia doză: dacă a doua doză nu a condus la dispariția tahicardiei supraventriculare în 1-2 minute, trebuie să se administreze încă 12 mg, tot sub formă de bolus intravenos rapid. Nu sunt recomandate doze suplimentare sau doze mai mari. *Copii:* dozele eficace pentru copii au fost cuprinse între 0,0375-0,25 mg/kg. Doze în indicația diagnostică: Schema de dozare crescătoare de mai sus, trebuie utilizată până când se obțin informații diagnostice suficiente.
Cind: La pacienții care suferă de: bloc atrio-ventricular de gradul II și III (cu excepția pacienților cu pacemaker artificial în stare de funcționare), boala nodului sinusal cu excepția pacienților cu pacemaker artificial în stare de funcționare, astm, hipersensibilitate la adenozină.
A!: Administrarea se face în spital, sub monitorizare electrocardiografică. La pacienții cu fibrilație/flutter atrial și o cale de conducere accesorie poate apărea creșterea conducerii pe calea anormală. Precauție la pacienții cu interval QT alungit, indiferent dacă acesta este congenital sau dobândit prin inducție medicamentoasă sau sechele metabolice, boală pulmonară obstructivă cronică, severă. Interacțiuni cu: dipiridamol (nu este recomandat în asociere), teofilină, cafeină. În sarcină și alăptare se poate administra numai dacă este esențial.
RA: După injectare apar, de obicei, flush facial, dispnee, bronhospasm, senzație de constricție toracică, greață și senzație de cap gol. Mai rar, au fost observate următoarele efecte adverse: senzație de disconfort, transpirații, palpitații, hiperventilație, presiune intracraniană, senzație de teamă, încețoșarea vederii, senzații de arsură, bradicardie, asistolie, dureri toracice, cefalee, vertij, greutate în brațe, dureri de brațe, gât și spate, gust metalic. Aceste efecte adverse au fost ușoare, de scurtă durată (de obicei mai puțin de 1 minut), și în general bine tolerate de pacient. A fost raportat un singur caz de agravare a presiunii intracraniene (trecător și reversibil). În momentul conversiei la ritmul sinusal normal, electrocardiograma poate înregistra contracții ventriculare premature, contracții atriale premature, fibrilație atrială, bradicardie sinusală, tahicardie sinusală, pauză sinusală și/sau bloc atrioventricular. A fost raportată, de asemenea, bradicardie severă și unii pacienți au necesitat pace-ing temporar. Efectele nu sunt blocate de atropină.

ADIPIODONUM MEGLUMINUM

COD ATC: V08AC04

POBILAN *SICOMED SA;* Sol. inj. 50%; f. × 20 ml ***(S/P-RF)***

Ind: Substanță de contrast radiologic pentru colangiocolecistografii, colangiografii după colecistectomie, după colecistografii perorale negative și colangiografii intraoperatorii.
Dz: *Adulți sub 50 kg:* 1 f. sol. 50%, iar la cei *peste 50 kg:* 2 f.
Cind: Hipersensibilitate la iod în antecedente. Hepato- și nefropatiile cronice grave. Tetania. Boala Basedow.
A!: Este necesară testarea hipersensibilității la iod a pacientului avînd la îndemână hidrocortizon hemisuccinat, oxigen, acid epsilon-aminocaproic și alte mijloace de reanimare.
RA: Stări de neliniște, senzația de căldură și opresiune toracică, greață sau vărsături.

AETHEROLEA

COD ATC: M02AX10

FRECȚIE GALENICĂ *PROGRESUL PLOIEȘTI;* Sol. ext.; mentol 0,35 g, eter acetic 4,06 g, alcool 39,66 g, apă distilată până la 100 ml; fl. × 50 ml sau 100 ml ***(OTC)***

FRECȚIE GALENICĂ FORTE PP *PROGRESUL PLOIEȘTI;* Sol. ext. ***(OTC)***

Ind.: Revulsiv și analgezic local.
Dz: Extern, fricțiuni locale
Cind: La copii sub 3 ani.

AGALSIDASUM ALFA

COD ATC: A16AB03

REPLAGAL *TKT EUROPE 5S AB;* Conc. pt. sol. perf. 3,5 mg/fl. (fl. × 5 ml) ***(S)***

Ind: Agalsidasa este indicată pentru terapia de substituție enzimatică pe termen lung la pacienți cu diagnostic confirmat de boală Fabry (deficiență de alfa-galactozidază A).
Dz: Tratamentul cu agalsidasă trebuie supravegheat de un medic cu experiență în terapia bolnavilor cu boala Fabry sau alte boli metabolice ereditare. Agalsidasa se administrează în doză de 0,2 mg/kg, la fiecare două săptămâni, prin perfuzie intravenoasă în interval de 40 min (se diluează volumul total de concentrat Replagal necesar în 100 ml soluție perfuzabilă de clorură de sodiu 0,9%). Nu s-au efectuat studii la copii și adolescenți (0-17 ani) sau pacienți cu vârsta peste 65 ani și de aceea nu se pot face recomandări privind doza la acești pacienți, deoarece nu s-au stabilit siguranța și eficacitatea produsului. Nu s-au efectuat studii la pacienții cu insuficiență hepatică. Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții cu insuficiență renală.
Cind: Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.
A!: *Interacțiuni medicamentoase:* Agalsidasa nu trebuie administrată împreună cu clorochină, amiodaronă, benochin sau gentamicină, întrucât aceste substanțe

prezintă potențialul de a inhiba activitatea alfa-galactozidazei intracelulare. *Sarcină și alăptare:* Nu s-a stabilit dacă agalsidasa este excretată în laptele matern. Este necesară prudență atunci când produsul este prescris gravidelor sau femeilor care alăptează.
RA: Cele mai frecvente reacții adverse raportate au fost asociate cu reacțiile la perfuzie, care au apărut la aproximativ 10% dintre pacienții tratați în cadrul studiilor clinice. Majoritatea reacțiilor adverse au fost ușoare până la moderate și cele mai multe au urmat cursul natural al bolii Fabry. Simptomele au cuprins în special frisoane și înroșirea feței, iar câțiva pacienți au prezentat cefalee, dispnee, dureri abdominale, greață sau dureri toracice. Aceste reacții nu au fost însoțite de modificări ale semnelor vitale sau de urticarie. Toate simptomele au dispărut după acordarea îngrijirilor medicale adecvate, cum ar fi oprirea perfuziei după care aceasta a fost reluată, sau terapia medicamentoasă cu antihistaminice sau glucocorticoizi.

ALBENDAZOLUM *COD ATC: P02CA03*

ALBENDOL *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. 200 mg

ALBENDOL *GLAXO SMITHKLINE;* Susp. orală 200 mg/5 ml

DUADOR 200 mg *ARMEDICA SA;* Cpr. film. 200 mg ***(P-RF)***

ESKAZOLE *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. 400 mg ***(P-RF)***

ZENTEL *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. 200 mg și 400 mg; Susp. orală 100 mg/5 ml (fl. × 20 ml); 200 mg/5 ml (fl. unidoză × 10 ml) ***(P-RF)***

ZENTEL *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. 200 mg ***(P-RF)***

ZENTEL *GLAXO SMITHKLINE;* Susp. orală, 200 mg/5ml ***(P-RF)***

Ind: Helmintiazele intestinale și giardoză: Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides, Ankylostoma duodenale, Necator americanus, Strongyloides stercoralis, Taenia sp. Helmintiaze sistemice: Echinococoză, Neurocisticercoză, Trichineloză, Toxocarioză, Capilarioză, Gnatostomiază.
Dz: *Helmintiaze intestinale și giardoză:* Adulți și copii în vârstă de peste 2 ani: 400 mg în priză unică în cazul parazitozelor cu: Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides, Ankylostoma duodenale și Necator americanus. În caz de strongiloidoză sau teniază, se adm. 400 mg în prize unice, 3 zile consecutiv. *Helmintiaze sistemice:* Posologia depinde de parazitul implicat, greutatea corporală a pacientului și severitatea infecției. Dozele uzuale sunt cuprinse între 400 și 800 mg/zi timp de 5-30 zile. Ciclul terapeutic se poate repeta după o pauză de 14 zile.
Cind: În sarcină sau la femeile presupuse a fi însărcinate. În caz de hipersensibilitate la constituenții produsului.
A!: Poate produce creșterea nivelului enzimelor hepatice. Dacă nivelul enzimelor hepatice crește semnificativ trat. trebuie întrerupt. Înaintea fiecărui ciclu de trat. și cel puțin din 2 în 2 săpt. în cursul trat. trebuie efectuate testele funcționale hepatice. Poate induce reduceri ale numărului total de elemente

albe. Înaintea debutului și la fiecare două săpt. În cursul fiecărui ciclu de trat., trebuie efectuată numărătoarea elementelor sanguine. Femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să înceapă trat. numai după obținerea rezultatului negativ al testului de sarcină.
RA: Creșterea nivelului enzimelor hepatice, tulburări digestive, leucopenie, vertij și cefalee, alopecie reversibilă și febră. Rar, pancitopenie și reacții de hipersensibilitate (rash, prurit, urticarie).

ALEMTUZUMABUM *COD ATC: L01XC04*

MAB CAMPATH *ILEX PHARMACEUTICALS Ltd. în colaborare cu SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Conc. pt sol. perf. 10 mg/ml - 3 ml *(S)*

Ind: Tratamentul pacienților cu leucemie limfocitară cronică (LLC), refractară la alte tratamente, cum ar fi cu agenți alchilanți și fosfat de fludarabină.
Dz: În prima săptămână, se administrează 3 mg alemtuzumab în soluție în prima zi, apoi 10 mg în ziua a doua și 30 mg în ziua a treia. Se va continua administrarea cu 30 mg 3 zile alternativ în fiecare săptămână. Tratamentul poate continua până la 12 săptămâni, în funcție de eficacitate.
Cind: Alergie la alemtuzumab, proteine de origine similară sau la oricare dintre componenții conținuți în fiolă. Infecție, HIV, afecțiuni maligne secundare. Sarcină, alăptare.
A!: Pot apărea reacții adverse după administrarea primei doze de alemtuzumab (acestea se reduc pe măsură ce se continuă tratamentul). Dacă reacțiile adverse sunt severe, se pot administra antihistaminice și analgezice. Tratamentul cu alemtuzumab poate duce la scăderea rezistenței naturale la infecții și necesitatea introducerii unui tratament cu antibiotic. Prudență la pacienți cu vârstă peste 65 ani, afecțiuni cardiace, dureri de piept și/sau tratament pentru reducerea tensiunii arteriale. Se supraveghează constantele sanguine. Femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să utilizeze o metodă contraceptivă sigură în timpul tratamentului și cel puțin 6 luni după încetarea acestuia. Siguranța și eficacitatea alemtuzumab nu au fost stabilite la copii sub 17 ani sau la pacienți cu insuficiență hepatică sau renală. Se oprește alăptarea la începutul tratamentului. Reluarea alăptatului nu trebuie făcută timp de cel puțin 4 săptămâni de la terminarea tratamentului. Trebuie informat medicul asupra altor medicamente administrate concomitent, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală. Nu se administrează timp de 3 săptămâni de la administrarea altor antineoplazice. Nu se face vaccinare în timpul tratamentului și timp de cel puțin 12 luni după terminarea tratamentului.
RA: Reacțiile adverse foarte frecvente: febră, tremurături/frisoane, transpirații, greață (senzația de vomă), vărsături, scăderea tensiunii arteriale, oboseală, erupții cutanate, prurit, dificultate în respirație, dureri de cap, diaree și pierderea apetitului (pot apărea în timpul primei săptămâni de la începerea tratamentului). Pneumonie.
Reacțiile adverse frecvente: hipertensiune arterială, creșterea frecvenței cardiace, palpitații, spasme vasculare, înroșirea feței, scăderea leucocitelor și trombocitelor, vânătăi la locul perfuziei; pierderea gustului, scăderea simțului pipăitului, amețeli, tremurături, agitație, inflamarea ochilor, senzație de înțepături sau de arsuri la nivelul pielii; dureri abdominale, sângerări la nivelul stomacului și intestinului, balonare, iritații și/sau ulcerații în regiunea bucală, disfuncții hepatice, constipație, indigestie, flatulență; inflamare și/sau constricție pulmonară, a

gâtului și/sau sinusurilor, slabă oxigenare a organelor, tuse, hemoptizie. Tulburări generale: durere, înroșire sau inflamare la locul perfuzării, stare de rău general, slăbiciune, dureri în diferite părți ale corpului (mușchi, spate, piept, oase, articulații), scădere în greutate, deshidratare, sete, exces de lichid în corp, valori scăzute ale calciului sau sodiului, modificări ale temperaturii, simptome asemănătoare răcelii, abcese, erupții cutanate, vezicule la nivelul pielii, confuzie, stare de teamă nejustificată, depresie, somnolență, insomnie. Infecțiile frecvente includ: pneumonie (bacteriană), candidoză (fungică), herpes și zona zoster (virale) și infecții respiratorii, urinare, gastrointestinale și alte infecții bacteriene generale.
Reacții adverse mai puțin frecvente: tulburări la nivelul măduvei osoase; tulburări cardiace (stop cardiac, atac de cord, creșterea frecvenței cardiace); tulburări sanguine (tulburări de coagulare, scăderea proteinelor); lichid în plămâni, dificultate în respirație, tulburări pulmonare; nervozitate; tulburări de gândire, disfuncții renale; sincopă.

ALFACALCIDOLUM

COD ATC: A11CC03

ALPHA D_3 *TEVA PHARM. IND. Ltd.;* Cps. moi 0,25 µg; 0,50 µg și 1 µg *(P-RF)*

Ind: Tratament curativ al osteodistrofiei renale la pacienți cu insuficiență renală în stadiu de uremie, adulți și copii, înainte de începerea dializei – clearance al creatininei mai mic de 30 ml/min și 1,73 m^2. Osteodistrofia renală trebuie diagnosticată înainte de începerea tratamentului – prin examen radiologic și/sau creșterea fosfatazei alcaline și scăderea calcemiei sub 95 mg/l. Tratament preventiv al osteodistrofiei renale la copii și adulți cu insuficiență renală, nedializați, numai în caz de hiperparatiroidism diagnosticat și doar după corectarea hiperfosfatemiei. Rahitism pseudocarențial. Rahitism și osteomalacie prin hipofosfatemie vitamino-rezistente, în asociere cu fosfați și vitamina D. Hipoparatiroidism și pseudohipoparatiroidism. Prevenirea hipocalcemiei post-paratiroidectomie în cazul hiperparatiroidismului primar sau terțiar. Osteoporoză.
Dz: Nu este recomadat copiilor cu greutatea sub 20 kg.
Osteodistrofie renală: Doza recomandată pentru tratamentul curativ la adult este de 1-2 µg alfacalcidol pe zi. Se recomandă începerea tratamentului cu 0,5-1 µg alfacalcidol pe zi la adulți și copii cu greutate peste 20 kg. Ulterior, doza se va ajusta pentru a menține un raport fosfo-calcic normal. Doza recomandată pentru tratamentul preventiv este de 0,5-1 µg alfacalcidol pe zi la adult și copii cu greutate mai mare de 20 kg. *Rahitism pseudocarențial:* Se recomandă inițierea tratamentului cu doze de 2-4 µg alfacalcidol pe zi; pentru tratamentul de întreținere se administrează 0,75-2 µg alfacalcidol pe zi. În formele cu alopecie se adminstrează 5-8 µg alfacalcidol pe zi, în asociere cu fosfați. *Rahitism și osteomalacie prin hipofosfatemie vitamino-rezistente:* Doza recomandată este de 1-6 µg alfacalcidol pe zi, în asociere cu fosfați. *Hipoparatiroidism și pseudohipoparatiroidism:* Doza recomandată la adulți și la copii cu greutate peste 20 kg este de 1-3 µg alfacalcidol pe zi. *Osteoporoză:* Doza recomandată este de 0,5 µg alfacalcidol pe zi. În funcție de răspunsul biochimic, doza inițială va fi ajustată pentru a evita hipercalcemia. Calciul plasmatic va fi determinat inițial săptămânal. Doza de alfacalcidol poate fi mărită

la nevoie, prin creșteri de 0,25-0,50 µg pe zi. Cei mai mulți pacienți răspund la doze de 1-3 µg alfacalcidol zi. După stabilirea dozei, calcemia poate fi măsurată o dată la 2-4 săptămâni. Capsulele se vor înghiți cu puțină apă, fără a le mesteca, suge sau sfărâma.

Cind: Hipercalcemie (mai mare de 2,6 mmol/l); hiperfosfatemie (cu excepția celei din hipoparatiroidism); hipermagneziemie; hipersensibilitate la vitamine D sau la oricare dintre componentele produsului.

AI: Hiperparatiroidismul autonom (primar sau terțiar) și osteomalacia prin intoxicație cu aluminiu nu sunt indicații ale tratamentului cu alfacalcidol. Tratamentul trebuie supravegheat prin urmărirea calcemiei și fosfatemiei, precum și a calciuriei, cel puțin o dată la 3 luni. Se va prescrie alfacalcidol numai atunci când există facilități pentru monitorizarea calcemiei și a altor parametri biochimici. Se urmăresc creatinina, magneziul, fosfataza alcalină și calciuria la pacienții care nu fac dializă. Trebuie evitată apariția hipercalcemiei, hiperfosfatemiei și hipercalciuriei. Produsul se va administra cu prudență la pacienții cu litiază renală.

Sarcină și alăptare: Produsul se va administra în timpul sarcinii numai dacă este necesar, după evaluarea raportului beneficiu matern/risc potențial fetal. În funcție de importanța tratamentului pentru mamă, se vor lua în considerare fie întreruperea alăptării, fie oprirea administrării produsului.

RA: În cazul insuficienței renale, riscurile majore ale alfacalcidolului sunt hipercalcemia și hiperfosfatemia, putând să apară calcificări ale țesuturilor moi – cornee, conjunctivă, piele, vase, rinichi. În cazul hipoparatiroidismului și hipofosfatemiei vitamino-rezistente, riscul este reprezentat de hipercalcemie cu hipercalciurie; acest fenomen poate fi prevenit prin întreruperea administrării alfacalcidolului atunci când calciuria depășește 6 mg/kg și zi. Au fost raportate reacții de hipersensibilitate la excipienții 4-hidroxibenzoat de etil și propil.

ALFUZOSINUM

COD ATC: G04CA01

XATRAL LP 5 mg *SANOFI~SYNTHELABO;* Cpr. film. elib. prel. 5 mg; ct. × 2 sau 4 blist. × 14 cpr. ***(P-6L)***

XATRAL SR 10 mg *SANOFI~SYNTHELABO;* Cpr. elib. prel. 10 mg; ct. × 1 sau 3 blist. × 10 cpr. elib. prel. ***(P-6L)***

Ind: Manifestările hipertrofiei benigne de prostată.

Dz: Oral, uzual 2,5 mg de 3 ori/zi, maxim 10 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la produs, antecedente de hTA ortostatică, asociere cu alte α1-blocante sau inhibitori de calciu.

AI: La unii subiecți poate apărea hTA ortostatică. La bolnavii cu hipersensibilitate la α1-blocante. Prudență la subiecții tratați cu antihipertensive. În caz de angor trat. va fi întrerupt.

RA: Tulburări digestive, tendințe lipotimice. Senzație de uscăciune a gurii, tahicardie, dureri toracice, astenie, somnolență, erupții cutanate, prurit, înroșirea pielii. La bolnavii cu HTA tratați cu alfuzosin s-au observat uneori: palpitații, hTA ortostatică, edeme.

la nevoie, prin creșteri de 0,25-0,50 µg pe zi. Cei mai mulți pacienți răspund la doze de 1-3 µg alfacalcidol zi. După stabilirea dozei, calcemia poate fi măsurată o dată la 2-4 săptămâni. Capsulele se vor înghiți cu puțină apă, fără a le mesteca, suge sau sfărâma.

Cind: Hipercalcemie (mai mare de 2,6 mmol/l); hiperfosfatemie (cu excepția celei din hipoparatiroidism); hipermagneziemie; hipersensibilitate la vitamine D sau la oricare dintre componentele produsului.

A!: Hiperparatiroidismul autonom (primar sau terțiar) și osteomalacia prin intoxicație cu aluminiu nu sunt indicații ale tratamentului cu alfacalcidol. Tratamentul trebuie supravegheat prin urmărirea calcemiei și fosfatemiei, precum și a calciuriei, cel puțin o dată la 3 luni. Se va prescrie alfacalcidol numai atunci când există facilități pentru monitorizarea calcemiei și a altor parametri biochimici. Se urmăresc creatinina, magneziul, fosfataza alcalină și calciuria la pacienții care nu fac dializă. Trebuie evitată apariția hipercalcemiei, hiperfosfatemiei și hipercalciuriei. Produsul se va administra cu prudență la pacienții cu litiază renală.

Sarcină și alăptare: Produsul se va administra în timpul sarcinii numai dacă este necesar, după evaluarea raportului beneficiu matern/risc potențial fetal. În funcție de importanța tratamentului pentru mamă, se vor lua în considerare fie întreruperea alăptării, fie oprirea administrării produsului.

RA: În cazul insuficienței renale, riscurile majore ale alfacalcidolului sunt hipercalcemia și hiperfosfatemia, putând să apară calcificări ale țesuturilor moi – cornee, conjunctivă, piele, vase, rinichi. În cazul hipoparatiroidismului și hipofosfatemiei vitamino-rezistente, riscul este reprezentat de hipercalcemie cu hipercalciurie; acest fenomen poate fi prevenit prin întreruperea administrării alfacalcidolului atunci când calciuria depășește 6 mg/kg și zi. Au fost raportate reacții de hipersensibilitate la excipienții 4-hidroxibenzoat de etil și propil.

ALFUZOSINUM *COD ATC: G04CA01*

XATRAL LP 5 mg *SANOFI~SYNTHELABO;* Cpr. film. elib. prel. 5 mg; ct. × 2 sau 4 blist. × 14 cpr. ***(P-6L)***

XATRAL SR 10 mg *SANOFI~SYNTHELABO;* Cpr. elib. prel. 10 mg; ct. × 1 sau 3 blist. × 10 cpr. elib. prel. ***(P-6L)***

Ind: Manifestările hipertrofiei benigne de prostată.

Dz: Oral, uzual 2,5 mg de 3 ori/zi, maxim 10 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la produs, antecedente de hTA ortostatică, asociere cu alte α1-blocante sau inhibitori de calciu.

A!: La unii subiecți poate apărea hTA ortostatică. La bolnavii cu hipersensibilitate la α1-blocante. Prudență la subiecții tratați cu antihipertensive. În caz de angor trat. va fi întrerupt.

RA: Tulburări digestive, tendințe lipotimice. Senzație de uscăciune a gurii, tahicardie, dureri toracice, astenie, somnolență, erupții cutanate, prurit, înroșirea pielii. La bolnavii cu HTA tratați cu alfuzosin s-au observat uneori: palpitații, hTA ortostatică, edeme.

ALLOPURINOLUM *COD ATC: M04AA01*

ALLOPURINOL *TEVA;* Cpr. 100 mg și 300 mg ***(P-6L)***

ALLOPURINOL *ARENA GROUP SA;* Cpr.100 mg ***(P-6L)***

MILURIT *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Cpr. 100 mg și 300 mg ***(P-6L)***

ZYLORIC *GLAXO WELLCOME;* Cpr. 100 mg ***(P-6L)***

Ind: Reducerea concentrației de urați din fluidele organismului și/sau din urină și pt. a preveni sau opri depunerea de urați/acid uric. Guta idiopatică, litiaza urică, nefropatia urică acută, afecțiuni neoplazice și mieloproliferative cu rată mare de creștere celulară, probleme enzimatice care duc la o producere prea mare de urați și implică: hipoxantin-guanin-fosforibozil-transferaze, inclusiv sindrom Lesch-Nyhan, glucozo-6-fosfataza, incluzând afecțiuni în stocarea de glicogen, sinteza de fosfo-ribozil-pirofosfat, amidotransferaze fosforibozilfosfat, adenin-fosforibozil-transferaze, glutation reductază, glutamat-dehidrogenază. Este indicat și pt. tratarea calculilor renali și în caz de recurență a calculilor renali micști din oxalat de calciu, în prezența hiperuricozuriei.

Dz: Dozarea se reglează prin monitorizarea concentrației serice de urați și a nivelurilor de urați/acid uric în urină. *Adulți:* Afecțiuni ușoare: 2-10 mg/kg/zi sau 100-200 mg/zi. Afecțiuni moderate sau severe: 300-600 mg/zi. Afecțiuni grave: 700-900 mg/zi. *Copii sub 15 ani:* 10-20 mg/kg/zi. În IR dozele trebuie reduse.

Cind: Intoleranță la allopurinol.

A!: Trat. trebuie oprit imediat când apare o iritație a pielii sau orice alt semn sau hipersensibilitate. Trebuie redusă doza în caz de disfuncții renale sau hepatice grave. Hiperuricemia asimptomatică per se nu este o indicație pentru folosirea allopurinolului. Poate precipita atacurile de gută sau artrita gutoasă. Crește riscul de calculi urinari xantinici. Acest risc trebuie redus prin hidratare adecvată. Duce la dizolvarea calculilor renali mari de acid uric, existând apoi posibilitatea fixării lor în ureter. Medicamentele cu activitate uricozurică (probenecidul sau dozele mari de salicilați) pot scădea activitatea terapeutică a allopurinolului. Potențează activitatea hipoglicemică a clorpropamidei. A nu se folosi în sarcină decât atunci când nu există o alternativă sigură și când boala în sine comportă riscuri pt. mamă sau copil.

RA: Reacții cutanate (erupții pruriginoase, maculopapulare, uneori cu aspect solzos, alteori înroșit, rar ca exfolieri). Hipersensibilitate generalizată (Reacțiile la nivelul pielii: exfolieri, febră, limfadenopatie, artralgie și/sau eozinofilie, asemănătoare cu sindromul Stevens-Johnson și/sau Lyell apar rar. Reacții asociate la nivel vascular și al țesuturilor se pot manifesta în moduri diferite inclusiv hepatită, nefrită interstițială și, foarte rar, epilepsie). Limfadenopatie angioimunoblastică. Hepatită granulomatoasă. Disfuncții gastrointestinale (greață și vomă, foarte rar hematemeză și steatoree). Ocazional trombocitopenie, agranulocitoză și anemie aplastică. Febră, stare generală proastă, astenie, durere de cap, vertij, ataxie, somnolență, comă, depresie, paralizie, parestezie, neuropatie, probleme vizuale, cataractă, discromie; tulburări de gust, stomatită, modificarea tranzitului intestinal; infertilitate, impotență; diabet; hiperlipemie; furunculoză; alopecie; decolorarea părului; angină; hipertensiune; edem; uremie; hematurie; ginecomastie.

ALLYLESTRENOLUM

COD ATC: G03DC01

ALILESTRENOL *TERAPIA SA;* Cpr. 5 mg ***(P-6L)*** 2

Ind: Iminență de avort; avort habitual; amenințare de naștere prematură.
Dz: Iminență de avort: Oral, 5 mg de 3 ori/zi, 5-7 zile sau mai mult. Avort habitual când sarcina este în curs: 5-10 mg/zi, mai multe luni. Amenințare de naștere prematură: posologie variabilă până la 40 mg/zi (câteva zile).
Cind: Afecțiuni tromboembolice manifeste sau în antecedente, cancer mamar sau genital, sângerări vaginale neregulate nediagnosticate, IH, icter familial, antecedente de sarcină cu icter idiopatic, cu prurit marcat sau herpes.
A!: Prudență la diabetici. Poate interfera cu efectele bromocriptinei și poate crește concentrația plasmatică a ciclosporinelor. Adm. la femeile însărcinate poate provoca fenomene de virilizare a fătului feminin și malformații genitale la fătul masculin. Din această cauză adm. se va face cu precauție.
RA: Greață, vomă. Dureri pelvine, creșterea libidoului.

ALPRAZOLAMUM

COD ATC: N05BA12

ALPRAZOLAM 0,25 mg; 0,5 mg; 1 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. 0,25 mg, 0,5 mg și 1 mg; ct. × 2 blist × 10 cpr. ***(P-RF)*** sau ct. × 100 blist. × 10 cpr. ***(S)***

ALPRAZOLAMUM LPH® 0,25 mg; ALPRAZOLAMUM LPH® 0,5 mg; ALPRAZOLAMUM LPH® 1 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. 0,25 mg; 0,5 mg și 1 mg ***(P-RF)***

FRONTIN *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Cpr. 0,25 mg, 0,5 mg și 1 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. ***(P-RF)*** sau ct. × 1 fl. × 100 cpr. ***(S)***

HELEX *KRKA d.d;* Cpr. 0,25 mg, 0,5 mg și 1 mg ***(P-RF)***

NEUROL 0,25; NEUROL 1,0 *LECIVA;* Cpr. 0,25 mg și 1 mg ***(P-RF)***

XANAX *PHARMACIA-membru al grupului PFIZER;* Cpr. 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg și 2 mg ***(P-RF)***

XANAX XR *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Cpr. elib. prel. 0,5 mg ***(P-RF)***

ZOLAREM 0,5 *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Cpr. 0,5 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. sau ct. × 3 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

Ind: Stări anxioase (nevroza anxioasă). Depresie anxioasă. Depresie nevrotică sau reactivă. Stări de panică care evoluează cu sau fără fobie. Blocarea sau atenuarea atacurilor de panică și a fobiei la pacienți care au agorafobie cu atacuri de panică.
Dz: Doza trebuie individualizată în funcție de severitatea simptomelor și de răspunsul fiecărui pacient în parte. Doza zilnică poate varia între 0,25 și 4,5 mg, adm. oral în priză unică sau fracționat. Oprirea trat. se face prin reducerea gradată a dozelor.
Cind: Pacienți cu sensibilitate cunoscută la benzodiazepine.

AI: Pot apărea obișnuință și dependență fizică/psihică. Trebuie acordată atenție pacienților cu predispoziție la abuzul de medicamente. Scăderea rapidă sau întreruperea bruscă a trat. determină simptome de abstinență. Adm. la pacienții cu depresie severă sau cu tendință la suicid se face cu precauții. Precauții în cazul folosirii pt. trat. stărilor de panică. Precauție la pacienții cu afectare renală sau hepatică. Precauții la copii sub 18 ani. Atenție când este adm. concomitent cu: alte psihotrope, anticonvulsivante, antihistaminice, alcool, alte medicamente care deprimă SNC. Folosirea în primul trimestru de sarcină trebuie evitată. Mamele nu trebuie să alăpteze în timpul trat. cu alprazolam. Pacienții care primesc alprazolam trebuie sfătuiți să nu conducă mașini sau să opereze utilaje periculoase.

RA: Senzație de somnolență și de amețeală. Tulburări de vedere, cefalee, depresie, insomnie, nervozitate/anxietate, tremor, modificări de greutate, tulburări de memorie/amnezie, tulburări de coordonare, diferite simptome gastrointestinale și manifestări vegetative. Distonie, iritabilitate, anorexie, oboseală, vorbire neclară, icter, slăbiciune musculară, modificări ale libidoului, neregularități ale ciclului menstrual, incontinență, retenție de urină și afectarea funcției hepatice. Rar creșterea presiunii intraoculare. Mai puțin frecvente au fost modificarea afectului, dermatită. Dificultăți de concentrare, stări confuzionale, halucinații, excitații, precum și efecte de comportament advers ca iritabilitate, agitație, furie și agresivitate sau reacții de tip ostil.

ALPROSTADILUM *COD ATC: G04BE01*

CAVERJECT *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Liof. pt. sol. inj. 10 µg/ml și 20 µg/ml (fl. × 1 ml) + seringă preumplută × 1 ml solvent ***(P-6L)***

MUSE 125 µg; 250 µg; 500 µg; 1000 µg *ASTRAZENECA AB;* Sist. transuretral 125 µg; 250 µg; 500 µg; 1000 µg în ct. × 1 sau 6 plicuri × 1 sist. transuretral ***(P-RF)***

Ind.: Disfuncție erectilă de etiologie neurogenă, vasculară, psihogenă sau mixtă. Ca adjuvant în testele diagnostice ale insuficienței erecției.

Dz: Doza trebuie individualizată prin tatonare, cu prudență sub supravegherea unui medic. Se începe cu doza cea mai mică, care se crește progresiv în funcție de răspuns. Injectarea intracavernoasă se face obișnuit pe fața dorsală sau laterală a penisului, în treimea proximală, în condiții sterile. *Dozarea inițială în cabinetul medicului:* Tatonarea dozei trebuie începută de la 1,25-2,5 µg alprostadil. În lipsa unui efect satisfăcător urmează creșteri de 5-10 µg. *Terapia de întreținere:* auto-injectarea: Terapia de auto-injectare la domiciliu trebuie începută cu doza stabilită în cabinetul medicului. Frecvența recomandată a injectării este de 3 ori pe săpt., cu cel puțin 24 de ore între doze. Doza medie de întreținere este 5-20 µg. Nu se recomandă doze de întreținere mai mari de 60 µg. Alprostadilul ca adjuvant în diagnosticul insuficienței erecției: se va folosi doza care induce o erecție fermă.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la alprostadil; boli care predispun la priapism (anemie cu celule falciforme, mielom multiplu, leucemie); deformații anatomice ale penisului (angulație, fibroză cavernoasă, boala Peyronie); implanturi peniene; activitate sexuală contraindicată.

AI: Poate să apară priapismul. Poate să apară fibroza peniană, incluzând angulație, noduli fibroși și boală Peyronie. Trat. trebuie întrerupt la pacienții care dezvoltă fibroză peniană. Pacienții trebuie instruiți asupra măsurilor de protecție împotriva bolilor cu transmitere sexuală, inclusiv HIV și a bolilor transmise prin sânge. Este destinat exclusiv bărbaților în perioada de activitate sexuală. Pacienții aflați sub trat. cu anticoagulante prezintă risc crescut de sângerare după injectarea intracavernoasă.

RA: Durere peniană ușoară-moderată. Fibroza peniană, incluzând angulație, noduli fibroși și boala Peyronie. Hematom și echimoză la locul inj. Priapism. Rar s-au raportat următoarele reacții adverse locale: balanită, hemoragie, inflamație, prurit, edem la locul inj., sângerare uretrală, senzație de căldură, amorțeală, infecții micotice, iritație, sensibilizare, fimoză, eritem, mici hemoragii venoase, erecție dureroasă și ejaculare anormală. Rar s-au raportat următoarele evenimente sistemice: durere testiculară, afectare scrotală, hematurie, afectare testiculară, tulburări de micțiune, durere pelvină, hTA, vasodilatație, boli vasculare periferice, extrasistole supraventriculare, reacții vasovagale, hiperestezie, slăbiciune, diaforeză, rash, prurit la distanță de locul injectării, greață, uscăciunea gurii, creșterea creatininei serice, crampe musculare și midriază. Au fost observate modificări hemodinamice (scăderi ale TA și creșteri ale frecvenței pulsului).

ALTEPLASUM

COD ATC: B01AD02

ACTILYSE *BOEHRINGER INGELHEIM;* Pulb. pt. sol. inj. 50 mg ***(S)***

Ind: Tratamentul trombolitic în infarctul miocardic acut (poate reduce mortalitatea la 30 de zile pentru pacienții diagnosticați cu infarct miocardic acut). Tratamentul trombolitic în embolia pulmonară acută masivă cu instabilitate hemodinamică. Tratamentul trombolitic al accidentului vascular ischemic acut.

Dz: Conținutul flaconului de 50 mg substanță activă liofilizată se dizolvă cu apă distilată 50 ml, pentru a obține concentrația necesară de 1 mg/ml care se administrează i.v. Soluția reconstituită poate fi în continuare diluată cu ser fiziologic (0,9%) până la obținerea unei concentrații de minimum 0,2 mg/ml. *Infarctul de miocard:* 15 mg prin injectare i.v. în bolus, apoi 50 mg prin perfuzare, în cursul primelor 30 de minute, urmată de perfuzarea a 35 mg, timp de 60 de minute, până la atingerea dozei maxime de 100 mg sau 10 mg, prin injectare i.v. în bolus, 50 mg, prin perfuzare i.v. în cursul primei ore, urmată de perfuzare i.v. a 10 mg, în 30 de minute până la atingerea dozei maxime de 100 mg, în 3 ore. Doza maximă admisă este de 100 mg. *Embolia pulmonară:* O doză totală de 100 mg trebuie administrată timp de 2 ore. *Accident vascular ischemic:* Doza recomandată este de 0,9 mg/kg (maximum 90 mg) administrată în perfuzie timp de 60 minute, din care 10% din doza totală administrată inițial prin injectare i.v. în bolus.

Cind: Risc crescut de hemoragie prin diateză hemoragică cunoscută (diagnosticată), pacienți care beneficiază de tratament cu anticoagulante orale, ca de ex. warfarina sodică, sângerare periculoasă sau gravă, recentă sau manifestă, intervenții chirurgicale intracraniale sau intraspinale recente, traume cerebrale grave sau antecedente recente de atacuri cerebrale, neoplasm intracranian, malformații arterio-venoase sau anevrism, retinopatie hemoragică, de ex. în diabet (tulburările vizuale pot indica retinopatia hemoragică), masaj cardiac extern traumatizant (mai puțin de 10 zile), manevre obstetricale, puncții recente

ale unor vase de sânge necompresibile (de ex. puncție în vena jugulară sau subclaviculară), hipertensiune arterială gravă necontrolată, endocardită de origine bacteriană, pericardită, pancreatită acută, ulcer gastrointestinal depistat în cursul ultimelor 3 luni, varice esofagiene, anevrism arterial, malformații arteriale/venoase, neoplasm cu risc crescut de hemoragie, afecțiuni hepatice grave, inclusiv insuficiență hepatică, ciroză, hipertensiune portală (varice esofagiene) și hepatite active, intervenții chirurgicale majore sau traumatisme grave în decursul ultimelor 3 luni. În cazul acccidentului vascular cerebral ischemic, adițional se fac referințe la următoarele contraindicații: antecedente sau hemoragie intracraniană confirmată; suspiciune de hemoragie sub-arachnoidiană; acces de congestie cerebrală; administrarea de heparină în decursul celor 48 de ore ce depășesc atacul apoplectic manifestat-sesizabil prin creșterea valorilor timpului parțial de tromboplastină, determinarea trombocitelor sub 100 000/mm^3.
A!: Alteplase trebuie folosit numai de medici cu experiență în administrarea tratamentului trombolitic și împreună cu facilitățile oferite de folosirea monitorizării. Riscul de hemoragie intracerebrală este mai mare la pacienții vârstnici.
RA: Frecvent, sângerarea, care are ca rezultat o scădere a valorilor hematocritului și/sau ale hemoglobinei. Ocazional, pierderi importante de sânge la nivelul tractului gastrointestinal, urogenital sau sângerări retroperitoneale. Frecvent echimoze, epistaxis și sângerări gingivale dar, în general, acestea nu au necesitat aplicarea unui tratament specific. La pacienții tratați conform procedurilor clinice de rutină, adică fără cateterizarea inimii-cordului stâng, transfuzia de sânge a fost necesară numai ocazional. Hemoragia intracraniană a fost rareori semnalată (mai puțin de 1%). La pacienții tratați cu alteplase pentru infarctul de miocard, reperfuzarea, cu rezultate bune, este adesea însoțită de aritmii, în acest caz, se poate impune administrarea terapiei antiaritmice convenționale. Rareori s-au constatat greață, vărsături, scădere a tensiunii arteriale și creștere a temperaturii. De asemenea, aceste reacții pot să apară și ca simptome concomitente în infarctul de miocard. Rareori au fost raportate reacții anafilactoide (urticarie, bronhospasm, hipotensiune).

AMANTADINUM

COD ATC: N04BB01

A-PARKIN *DEXXON Ltd.;* Cpr. film. 100 mg ***(P-6L)***

VIREGYT-K *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Cps. 100 mg ***(P-6L)***

Ind: Afecțiuni idiopatice ale bolii Parkinson și sindroame de origini variate, cu excepția medicamentelor care provoacă parkinsonism.
Dz: Doza zilnică inițială: 100 mg pe o perioadă de 4-7 zile. Doza de întreținere: 200 mg zilnic, după mese. Doza zilnică maximă: 300 mg. Aceasta va trebui ajustată la un dozaj efectiv mai mic, în cazul în care se stabilizează simptomatic boala.
Cind: Hipersensibilitate la medicament, epilepsie, psihoze grave, afecțiuni renale sau hepatice, sarcină și alăptare. Nu se recomandă copiilor sub vârsta de 1 an. Nu se administrează în combinație cu stimulatori SNC. Administrarea amantadinei este contraindicată pe perioada sarcinii și alăptării.
A!: Se recomandă efectuarea terapiei de către un specialist în condiții de spitalizare. În cazul apariției efectelor secundare grave sau a intoleranței, poate fi necesară întreruperea tratamentului. Administrarea clorhidratului de amanta-

dină nu trebuie întreruptă brusc, deoarece la întreruperea bruscă a tratamentului pot să apară crize de tip Parkinson.
RA: Durere epigastrică, uscăciunea cavității bucale, anorexie, nicturie, piele marmorată. În cazuri rare: dereglări psihice (simptome paranoice-depresive). Simptomele dispar de regulă după câteva zile de tratament și nu necesită reducerea dozajului. În cazul dozelor de 300 respectiv 400 mg (sau mai mari) pot apărea stări de tensiune, insomnie, amețeală, vorbire necontrolată, ataxie, deconcentrare, stare depresivă, dereglări ale activității cardiace, edem.

AMBAZONUM *COD ATC: R02AA01*

FARINGOSEPT „L" 10 mg, FARINGOSEPT 10 mg *TERAPIA SA;* Cpr. de supt 10 mg ***(OTC)***

Ind: Profilactic și adjuvant în trat. infecțiilor acute buco-faringiene: gingivite, stomatite, faringite, după amigdalectomie și extracții dentare.
Dz: 30-50 mg ambazonă pe zi, timp de 3-4 zile. Cpr. se lasă să se dizolve lent în gură.
Cind: Copiii sub 2 ani. Alergie la ambazonă.
A!: Cpr. nu se înghit. Precauție în sarcină și alăptare.
RA: Iritație ușoară a mucoasei bucale.

AMBROXOLUM *COD ATC: R05CB06*

AMBOLAR *DAR AL DAWA;* Sirop. 0,3% (15 mg/5 ml sirop); fl. × 100 ml ***(OTC)***

AMBROHEXAL *HEXAL AG;* Sirop. 0,3% (15 mg/5 ml); fl. × 100 ml ***(OTC)***

AMBROXOL *GLAXO SMITHKLINE;* Sol. orală 750 mg/100 ml ***(OTC)***

AMBROXOL *PHARMAPLANT BIOGALENICA SRL;* Sol. orală 0,3% (fl. × 100 ml); Sol. orală 0,75% (fl. × 20 ml); Sol. orală 15 mg/ 5 ml (fl. × 100 ml) ***(OTC)***

AMBROXOL *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Cpr. 30 mg; Sirop 0,3% ***(OTC)***

AMBROXOL AL SIROP *ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG;* Sirop 0,3%

AMBROXOL AL PICĂTURI *ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG;* Sol. orală în picături 0,75%

AMBROXOL CLORHIDRAT 30 mg *ARENA GROUP SA;* Cpr. 30 mg ***(OTC)***

AMBROXOL Q *BIOGAL PHARMACEUTICAL WORKS Ltd.;* Cpr. 30 mg ***(OTC)***

AMLOHEXAL 5; AMBLOHEXAL 10 *HEXAL AG;* Cpr. 5 mg, 10 mg ***(OTC)***

DIGNOBROXOL *SANKYO;* Sol. orală 7,5 mg/ml (fl. × 50 ml) ***(OTC)***

MUCOSOLVAN *BOEHRINGER INGELHEIM;* Cpr. 30 mg ***(OTC)***

MUCOSOLVAN *BOEHRINGER INGELHEIM;* Sirop 30 mg/5 ml; fl. × 100 ml *(OTC)*

MUCOSOLVAN JUNIOR *BOEHRINGER INGELHEIM;* Sirop 15 mg/5 ml; fl. × 100 ml *(OTC)*

MUXOL comprimate *LAB. LEURQUIN MEDIOLANUM;* Cpr. 30 mg; cutii x 30 cpr. *(OTC)*

MUXOL soluţie orală *LAB. LEURQUIN MEDIOLANUM;* Sol. orală 3 mg/ml fl. x 180 ml *(OTC)*

TUSSEFAR *LAB. FARAN;* Sirop 15 mg/5 ml; 30 mg/5 ml 125 ml ***(OTC)***

Ind: Boli respiratorii acute și cronice, exacerbări acute în BPOC, prevenirea complicațiilor pulmonare postoperatorii.
Dz: Cpr. a 30 mg ambroxol clorhidrat: *Adulți:* 30 mg × 3/zi, uneori 60 mg × 2/zi. Sirop cu 30 mg/5 ml: *Adulți și copii peste 12 ani:* 10 ml (2 lingurițe) de 2 ori pe zi, aproximativ 14 zile. *La copiii mai mici de 12 ani* se recomandă doze mai mici, în funcție de vârstă.
Cind: Hipersensibilitate la ambroxol sau alți componenți ai produsului.
A!: Adm. concomitentă cu antibiotice (amoxicilină, cefuroxim, eritromicină, doxiciclină) duce la creșterea concentrației antibioticului în țesutul pulmonar. Adm. în primul trimestru de sarcină se va face numai la indicația medicului.
RA: Tulburări gastrointestinale. Reacții alergice mai ales la pacienții atopici.

AMFEPRAMONUM

COD ATC: A08AA03

REGENON *TEMMLER-PHARMA & Co. KG;* Cps. 25 mg clorhidrat de amfepramonă; ct. × 60 cps. și ct. × 1 blist. × 30 cps. ***(P-RF)***

Ind: Terapie de întreținere a pacienților cu obezitate și cu un indice al masei corporale de cel puțin 30 kg/m^2 care nu au obținut rezultate numai cu un regim corespunzător.
Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* de 3 ori pe zi câte 25 mg amfepramonă. Doza zilnică să nu depășească 75 mg. Ultima adm. să se facă cu cel puțin 4 ore înainte de culcare. Durata trat. este de 4-6 săpt. și nu va depăși trei luni.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la una dintre ingrediente; tahicardie paroxistică; tahiaritmie; feocromocitom; hipertiroidism; forme severe de angină pectorală; glaucom cu unghi închis; hipertensiune pulmonară; HTA severă; antecedente sau afecțiuni cardiovasculare sau cerebrovasculare; antecedente sau afecțiuni psihice incluzând anorexia nervoasă și depresia; tendință la abuz de medicamente, dependență de droguri sau alcool; ateroscleroză avansată; copii sub 12 ani. Este cind. asocierea cu orice alt produs anorexigen cu activitate centrală datorită riscului de hipertensiune pulmonară, potențial letală. Amfepramona va fi adm. cu prudență deosebită în: afecțiuni ale prostatei cu formare de reziduu urinar; în boli metabolice (de ex. diabetul zaharat); în boli cardiace.
A!: Risc de supradozare și dependență. Poate produce tulburări psihice. Întreruperea bruscă a trat. poate determina astenie psihică și stări depresive.

Intoxicația cronică se manifestă prin dermatoze severe, insomnie marcată, iritabilitate, hiperactivitate și tulburări de personalitate. Cea mai severă manifestare a intoxicației cronice este psihoza. Nu va fi prescris pacienților cu boli cardiovasculare, cerebrovasculare, epileptici. Au fost menționate cazuri grave de hipertensiune pulmonară. Atenție în cazul asocierii cu: amine adrenergice, antidepresivele, amantadina, IMAO, anestezice, antihipertensive (guanetidină, α-metildopa), neuroleptice. Nu se recomandă adm. în sarcină și în perioada de alăptare. Participarea la traficul rutier sau desfășurarea unor activități de precizie trebuie evitate.
RA: Hipertensiune pulmonară. Toleranță, dependență și sindrom de abstinență. La nivel SNC: reacții psihotice sau psihoze, stări depresive, nervozitate, agitație, tulburări de somn și vertij. Ocazional: stare tensională, iritabilitate, amețeli sau cefalee, diskinezii, tulburări de vedere, hiperexcitabilitate, anxietate, euforie, disforie, tremor, midriază, somnolență sau influențarea stării generale. S-au semnalat crize comițiale. La nivel CV: tahicardie, palpitații, HTA, durerile precordiale, accidente cardiovasculare sau cerebro-vasculare, angină pectorală, IM, IC și stop cardiac, aritmii și modificări ECG, foarte rar hTA. La nivel gastrointestinal: uscăciunea mucoasei bucale, constipație, greață, diaree, crampe abdominale, gust neplăcut. Sistem endocrin: impotență, modificări de libidou, ginecomastie sau tulburări de ciclu. Sistem hematopoietic: depresie medulară, agranulocitoză, leucopenie sau trombocitopenie. Reacții alergice sau pseudoalergice cutanate. Au fost menționate diverse cazuri de.: disurie, dispnee, alopecie, mialgie, transpirație și poliurie. Există riscul supradozării și dezvoltării fenomenului de dependență. Adm. în doze mari și o perioadă îndelungată poate duce la grave tulburări psihice (halucinații și psihoze).

AMIFOSTINUM

COD ATC: V03AF05

ETHYOL *SCHERING – PLOUGH EUROPE AG;* Liof. pt. sol. perf. 375 mg și 500 mg ***(S)***

Ind: În chimioterapie amifostina este indicată pentru scăderea riscului de infecție legat de neutropenie (ex. febră neutropenică), provocat de terapia asociată cu ciclofosfamidă și cisplatină la pacientele cu carcinom ovarian în stadiu avansat (stadiul III sau IV FIGO). Amifostina este indicată pentru a proteja pacienții cu tumori solide non-germinale, în stadiu avansat, de nefrotoxicitatea cumulativă a regimurilor care conțin cisplatină, în cazul în care dozele unice de cisplatină variază între 60-120 mg/m^2, în asociere cu măsuri adecvate de hidratare. Radioterapie: Amifostina este indicată la pacienții cu cancer la nivelul capului și gâtului, tratați cu radioterapia standard fracționată, pentru a proteja împotriva xerostomiei acute și tardive.
Dz: Înaintea administrării i.v., amifostina se reconstituie cu 7,3 ml soluție sterilă de clorură de sodiu 0,9%. Amifostina se utilizează exclusiv sub supravegherea medicilor cu experință în chimioterapie sau radioterapie antineoplazică. În chimioterapie, doza inițială recomandată de amifostină este de 910 mg/m^2, administrată o dată pe zi, sub forma unei perfuzii i.v. cu o durată de 15 minute, începând cu 30 de minute înaintea chimioterapiei cu agenți administrați prin perfuzie de scurtă durată. Pentru doze de cisplatină de 100-120 mg/m^2, doza inițială recomandată de amifostină este de 910 mg/m^2, administrată sub forma unei perfuzii cu o durată de 15 minute, începând cu 30 de minute

înaintea chimioterapiei. Dacă doza de cisplatină este între 60-100 mg/m^2, doza inițială recomandată de amifostină este de 740 mg/m^2, administrată sub forma unei perfuzii cu o durată de 15 minute, începând cu 30 de minute înaintea chimioterapiei. Dacă amifostina se folosește pentru a proteja împotriva manifestărilor toxice asociate *radioterapiei*, doza recomandată de amifostină este de 200 mg/m^2, administrată zilnic sub forma unei perfuzii i.v. cu o durată de 3 minute, începând cu 15-30 de minute înaintea radioterapiei standard fracționate.
Cind: Hipersensibilitate la amifostină, la alți aminotioli sau la celelalte componente ale produsului; hipotensiune arterială sau stare de deshidratare; intrucât amifostina se administrează în asociere cu medicamente cunoscute pentru efectul lor teratogen și mutagen, această terapie nu se va administra femeilor însărcinate sau celor care alăptează; la pacienții cu afectare renală sau hepatică, la copii sau la pacienții în vârstă de peste 70 de ani, amifostina este contraindicată acestor grupe de pacienți.
A!: Înaintea administrării perfuziei cu amifostină, pacienții trebuie să fie hidratați corespunzător, iar în timpul administrării perfuziei cu soluția reconstituită de amifostină, pacienții trebuie menținuți în clinostatism. Dacă tensiunea arterială scade, pacienții trebuie așezați în poziție Trendelenburg și li se va administra o perfuzie cu ser fiziologic. Hipotensiunea arterială poate să apară în cursul sau la puțin timp după administrarea perfuziei cu amifostină, chiar și în condițiile unei hidratări adecvate sau a unei poziții corecte a pacientului. Amifostina nu este indicată în cazul în care glandele parotide nu sunt cuprinse în zona de iradiere. Această terapie nu se va administra femeilor gravide. Dacă pacienta rămâne însărcinată în timpul administrării tratamentului, trebuie să se evalueze raportul beneficiu matern/risc potențial fetal. Se recomandă întreruperea alăptării înaintea începerii tratamentului cu amifostină.
RA: S-a semnalat hipotensiune arterială manifestată printr-o scădere temporară a tensiunii arteriale sistolice și, mai rar, printr-o scădere a tensiunii arteriale diastolice. Rar, s-a semnalat asocierea hipotensiunii arteriale cu dispnee, apnee, hipoxie, convulsii (precauție în timpul tratamentului la pacienții cărora li se administrează alte medicamente cu potențial convulsivant), pierderea conștienței și stop respirator. Hipotensiunea semnificativă clinic poate fi asociată cu insuficiența renală. Pierderile de conștiență de scurtă durată și rapid reversibile s-au semnalat foarte rar. Amifostina crește incidența grețurilor/vărsăturilor ușoare-moderate în prima zi de chimioterapie. Cu toate acestea, amifostina nu mărește incidența grețurilor și a vărsăturilor tardive provocate de chimioterapia cu cisplatină. Au fost semnalate reacții alergice și alte reacții la nivel cutanat, incluzând eritem multiform și, rar, sindrom Stevens-Johnson și necroliză epidermică toxică. Scăderea concentrațiilor plasmatice de calciu este un efect farmacologic al amifostinei, datorită inducerii hipoparatiroidismului.

AMIKACINUM

COD ATC: J01GB06

AMIKIN *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Sol. inj. i.m./i.v., 1 fl. conține 250 mg/ml (fl. × 2 ml sau 4 ml) sulfat de amikacină ***(P-RF)***

AMIKOZIT *ECZACIBASI ILAC;* Sol. inj., 1 fl. conține 250 mg/ml sau 50 mg/ ml; Sol. inj. 50 mg/ml (ct. × 10 f. × 2 ml) ***(P-RF)***

ORLOBIN *HELP PHARMACEUTICALS Ltd.;* Sol. inj. 250 mg/ml (fl. × 2 ml) ***(P-RF)***

PIERAMI *FOURNIER PHARMA SpA;* Sol. inj. 50 mg/ml; 125 mg/ml; 250 mg/ml sulfat de amikacină; ct. × 5 f. × 2 ml ***(P-RF)*** sau ct. × 20 blist. × 5 f. × 2 ml ***(S)***

Ind.: Infecții cauzate de tulpini microbiene sensibile la amikacină. În bacteriemie și septicemie; în infecții grave ale tractului respirator, ale oaselor și articulațiilor, ale SNC, ale pielii și ale țesuturilor moi; infecțiile intraabdominale; în infecțiile la arși și post-operatorii, în infecții grave, complicate și repetate ale tractului urinar.
Dz: I.m. sau i.v.. Este necesară evaluarea funcției renale prin testarea concentrației serice a creatininei și prin clearance-ul creatininei. Doza uzuală i.m. sau i.v. pentru adulți, copii și sugarii mari, cu funcția renală normală este de 15 mg/kg/zi, divizată în doză unică sau în două sau trei doze egale adm. la 8-12 ore. La nou-născuți doza folosită este mai mică. La pacienții cu afectare renală (clearance la creatinină < 50 ml/min) nu se recomandă adm. amikacinei într-o doză unică zilnică. Dozele trebuie să fie ajustate fie prin adm. de doze normale la intervale de timp prelungite, fie prin adm. unor doze reduse.
Cind: Hipersensibilitate la amikacină în antecedente.
A!: Risc de ototoxicitate și nefrotoxicitate. Pacienții trebuie să fie bine hidratați. Dacă apare hiperazotemia sau oliguria, trat. trebuie să fie imediat întrerupt. În cazul asocierii cu anestezice sau cu relaxante musculare, poate apărea blocaj neuromuscular cu paralizie a mușchilor respiratori. Trebuie să fie adm. cu atenție la pacienții cu miastenia gravis sau cu boala Parkinson. Poate provoca, la pacienții sensibili, reacții alergice și crize de astm bronșic. Asocierea cu alte medicamente ototoxice și/sau nefrotoxice trebuie evitată. Adm. concomitentă cu diuretice cu acțiune rapidă prezintă risc major de surditate ireversibilă. La femeia gravidă (ca și la nou-născut), trebuie utilizată numai când este absolut necesar.
RA: Ototoxicitate, nefrotoxicitate și blocaj neuromuscular. Erupție cutanată, febră, parestezii, eozinofilie, anemie, artralgii, hipomagneziemie, greață, vărsături și hTA.

AMINOGLUTETHIMIDUM *COD ATC: L02BG01*

ROGLUTEN *SINDAN SRL;* Cpr. 250 mg aminoglutetimidă ***(S/P-RF)***

Ind.: Cancer de sân; hipercorticism, unele cazuri de hiperaldosteronism.
Dz: Oral, 250-500 mg de 1-6 ori/zi în funcție de afecțiune. Ultima priză trebuie adm. seara, înainte de culcare.
Cind: În premenopauză; porfirie; hipersensibilitate la aminoglutetimidă, sarcină și alăptare.
A!: Crește metabolizarea unor glucocorticoizi și a anticoagulantelor cumarinice; nu se asociază diuretice și antitiroidiene; se vor evita băuturile alcoolice.
RA: Obnubilare, letargie, ataxie. În primele două săpt. apare un exantem însoțit uneori de febră, care poate să dispară după 7-10 zile; persistența acestuia impune întreruperea trat. Diminuări ale funcției tiroidiene și modificări ale formulei sanguine. Tulburări gastrointestinale (greață, diaree).

AMINOPHYLLINUM *COD ATC: R03DA05*

AMINOFILIN 100 mg *FARMACOM SA;* Cpr. 100 mg ***(P-6L)***

AMINOFILINA *OZONE LABORATORIES Ltd.;* Cpr. 100 mg ***(P-6L)***

AMINOFILINĂ 100 mg; AMINOFILINĂ 200 mg *GALENIC FARM SRL;* Cpr. 100 mg; 200 mg ***(P-6L)***

AMINOPHYLLINUM RETARD *LEK PHARMACEUTICALS;* Cpr. ret. 350 mg ***(P-6L)***

EUFILINĂ – EEL *BIO EEL SRL;* Cpr. 100 mg ***(P-6L)***

EUPHYLLIN QUICK 200 *BYK GULDEN;* Cpr. eferv. 200 mg ***(P-6L)***

MIOFILIN *SICOMED SA;* Cps. 100 mg ***(P-6L);*** Sol. inj. 24 mg/ml (f. × 2 ml sau 10 ml) ***(P-RF)***

MIOFILIN 25 mg UZ PEDIATRIC *SICOMED SA;* Cps. 25 mg ***(P-6L)***

MIOFILIN® 100 mg *SICOMED SA;* Cps.100 mg ***(P-6L)***; Sol. inj. 240 mg/10 ml ***(P-RF)***

Ind: Criza de astm bronșic, astm bronșic cronic și bronșite obstructive reversibile, bronhoconstricție de efort.
Dz: Inj. i.v. (10 ml timp de 5 minute) lent sau perf. i.v., numai în cazurile de urgență. Doza uzuală este de 4-6 mg/kg o dată până la 3 ori/zi. Inj. i.m. se va face în doze de 500-1000 mg pe zi. Oral, uzual 100-200 mg de 3-4 ori/zi. Cpr. ret.: 175-350 mg la fiecare 12 ore. Doza poate fi crescută gradat la 700 mg aminofilină. Intrarectal, prin supozitoare, în doze de 360-720 mg zilnic.
Cind: Epilepsie. Adm. inj. este cind. în IMA.
A!: Precauție, dozele vor fi scăzute, la pacienții cu IH și la pacienții cu IC acută. Eliminarea este redusă în cazul asocierii medicamentului cu antibiotice macrolidice. Inj. i.v. prea rapide pot fi fatale la pacienții cu IM recent. Precauție la pacienții hipersensibili la teofilină. Nu este recomandată pe timpul sarcinii. Nu va fi adm. împreună cu alte preparate xantinice (cafea, ceai). În trat. IC congestive trebuie avut în vedere că stimulează centrul respirator și de aceea trebuie asociată cu morfina.
RA: Efecte cardiovasculare: scăderea presiunii arteriale și dureri precordiale. Durere trecătoare la locul inj. i.m. Adm. oral: tulburări gastro-intestinale, stimularea SNC (cefalee, anxietate). Sup. pot cauza proctite.

AMIODARONUM *COD ATC: C01BD01*

AMIODARONĂ *PROMEDIC SRL;* Cpr. 200 mg ***(P-6L)***

AMIODARONĂ *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. 200 mg ***(P-6L)***

AMIODARONĂ *LAROPHARM SRL;* Cpr. 200 mg ***(P-6L)***

AMIODARONĂ LPH® 200 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. 200 mg ***(P-6L)***

AMIODARONĂ 200 mg *TERAPIA SA;* Cpr. 200 mg ***(P-6/L)***

AMIODARONE-RIVO 200 *RIVO PHARM;* Cpr. 200 mg ***(P-6L)***

AMIOKORDIN *KRKA d.d.;* Cpr. 200 mg; ct. × 60 cpr. sau ct. × 3 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

CORDARONE 150 mg/3 ml *SANOFI~SYNTHELABO;* Sol. inj. 50 mg/ml (f. × 3 ml) ***(S)***

CORDARONE 200 mg *SANOFI~SYNTHELABO;* Cpr. div. 200 mg ***(P-6L)***

MIORITMIN *HELCOR SRL;* Cpr. 200 mg ***(P-6L)***

SEDACORON *EBEWE PHARMA Ges. m.b.H.Nfg KG;* Cpr. 200 mg ***(P-6L)****;* Sol. inj. 50 mg/ml (f. × 3 ml) ***(S)***

Ind: Tulburări de ritm severe: tulburări de ritm supraventriculare, cu ritm ventricular rapid; tahicardie în cadrul sindromului WPW; tulburări de ritm ventricular confirmate, simptomatice și invalidante.
Dz: *Perf. i.v.:* Trat. inițial: doza uzuală este 5 mg/kg în soluție glucozată izotonă, adm. în timp de 20 de minute până la 2 ore. Trat. de întreținere: 10-20 mg/kg și zi (obișnuit 600-800 mg/zi cel mult 1,2 g/zi) în 250 ml soluție glucozată izotonă, timp de câteva zile. Treptat se înlocuiește cu trat. oral. *Adm. oral: Adulți:* Doza de atac: 600 mg, maxim 1000 mg/pe zi timp de 8-10 zile. Doza de întreținere: 200-400 mg/zi, timp de 5 zile pe săpt. (2 zile pauză, neconsecutiv). *Copii:* Doza de atac se calculează în funcție de suprafața corporală. Doza de întreținere este jumătate din cea de atac. Se adm. 5 zile/săpt.
Cind: Hipersensibilitate la iod, la amiodaronă sau la celelalte componente ale produsului. Bradicardie sinusală și bloc sinoatrial fără pacemaker. Boala nodului sinusal fără pacemaker. Tulburări de conducere de grad înalt fără pacemaker. Colaps cardiovascular, hTA severă. Hipertiroidism. Sarcină în trimestrele II și III. Alăptare. Copii sub 3 ani. Nu se asociază cu anumite medicamente care pot provoca "torsada vârfurilor".
A!: Nu trebuie adm. pe cale venoasă periferică. Perturbările electrolitice, în particular hipokaliemia, pot favoriza apariția efectelor proaritmice. Se recomandă monitorizarea regulată a testelor funcționale hepatice. Nu este recomandabilă asocierea cu: astemizol, terfenadină, halofantrină, pentamidină, laxative stimulante (iritante), diltiazem injectabil, beta-blocante, altele decât esmolol. Necesită precauție asocierea cu: anticoagulante orale, ciclosporină, diltiazem oral, digitalice, esmolol, medicamente hipokaliemiante (diuretice care provoacă pierdere de potasiu, corticosteroizi sistemici, tetracosactid; amfotericina B intravenos). Crește concentrația plasmatică a fenitoinei cu semne de supradozare. Asocierea cu tacrin prezintă risc de bradicardie excesivă. Asocierea cu anestezice generale are risc de complicații potențial severe.
RA: Bufeuri, transpirație, greață, alopecie; scăderea tensiunii arteriale, bradicardie, excepțional stop sinusal, efecte proaritmice. Hepatopatie; excepțional hepatopatie acută, rar hepatopatie cronică. Se recomandă monitorizarea funcției hepatice. După inj. i.v. directă: șoc anafilactic, hipertensiune intracraniană benignă, bronhospasm și/sau apnee în cazul insuficienței respiratorii severe, în special la astmatici.

AMISULPRIDUM *COD ATC: N05AL05*

SOLIAN 50 mg; SOLIAN 200 mg *SANOFI~SYNTHELABO;* Cpr. 50 mg sau 200 mg ***(P-RF)***

SOLIAN 400 mg *SANOFI~SYNTHELABO;* Cpr. film. 400 mg ***(P-RF)***

Ind: Psihoze. Stări productive: schizofrenie paranoică și productivă. Stări deficitare: schizofrenie, procese psihotice reziduale, stări de inhibiție cu retardare.
Dz: Oral, 50-250 mg pe zi.
Cind: Alergie la oricare dintre ingrediente. Sarcină sau alăptare. Tumoră prolactinică sau cancer mamar.
A!: Boli renale, boală Parkinson sau antecedente de crize epileptice. La copii. Poate altera capacitatea de a conduce vehicule sau de a utiliza mașini.
RA: Insomnie, agitație, somnolență, amețeală, tulburări gastrointestinale, neliniște, galactoree, amenoree sau tulburări de menstruație, ginecomastie, dureri de sâni, disfuncții de orgasm și potență, creștere în greutate. Rar: rigiditate musculară, spasm sau hipersalivație. Extrem de rar: febră inexplicabilă, tulburări de cunoștință.

AMITRIPTYLINUM *COD ATC: N06AA09*

AMITRIPTILIN 25 R. DESITIN; AMITRIPTILIN 50 R. DESITIN; AMITRIPTILIN 75 R. DESITIN *DESITIN;* Cps. ret. 25 mg; 50 mg; 75 mg ***(P-RF)***

AMITRIPTILINĂ *TERAPIA SA;* Cpr. film. 25 mg ***(P-RF);*** Dj. 25 mg (ct. × 1 blist. × 10 dj. sau ct. × 5 blist. × 10 dj.) ***(P-RF);*** ct. × 100 blist. × 10 dj. ***(S)***

Ind: Sindroame depresive cu componentă anxioasă. Psihoze sau nevroze. Enurezis nocturn. Algii rebele, migrenă.
Dz: Stări depresive: oral 75-150 mg/ zi, în 2-3 prize (seara o doză mai mare); la bolnavii spitalizați 100-300 mg/zi; la tineri și bătrâni 50 mg/zi. Doza de întreținere la *adulți* este de 50-100 mg/zi. După obținerea efectului scontat se scade posologia până la stabilirea dozei minime eficace, care se administrează timp de 3 luni (sau mai mult), pentru prevenirea recăderilor. Enurezis nocturn: *copii sub 6 ani,* 10 mg la culcare; *copii 6-10 ani,* 10-20 mg/zi; *copii 11-16 ani,* 25-50 mg/ zi. Migrene și alte algii rebele: oral, 12,5-25 mg de 3 ori/zi.
Cind: Copii sub 6 ani; alergie la amitriptilină; IM; aritmii, BAV; IH; glaucom cu unghi îngust; adenom de prostată; psihoză maniacală. Asocierea cu IMAO.
A!: A nu se consuma băuturi alcoolice! Prudență la: epileptici, cardiaci, hepatici, hipertiroidieni. Hipnoticele, tranchilizantele și alte deprimante centrale, potențează acțiunea amitriptilinei. Crește efectul altor antidepresive, anticolinergice, simpatomimetice directe, hormoni tiroidieni. Antagonizează efectul antihipertensiv al guanetidinei și clonidinei. A se evita adm. în primul trimestru de sarcină și în timpul alăptării. Diminuează performanțele psihomotorii ale bolnavului. Atenție la șoferi și persoane cu activități de precizie.
RA: Sedare, uscăciune a gurii, constipație, micțiune dificilă, tahicardie, tulburări de acomodare și tremor; la psihotici favorizează apariția delirului; rareori: hTA, sudorație; foarte rar: tulburări extrapiramidale, discrazii sanguine, convulsii. În stările depresive poate crește riscul suicidar.

AMLODIPINUM

COD ATC: C08CA01

CRISTACOR *LEK PHARMACEUTICALS;* Cpr. 5 mg sau 10 mg ***(P-6L)***

NORVASC *PFIZER H.C.P. CORPORATION;* Cpr. 5 mg sau 10 mg ***(P-6L)***

Ind: HTA. Angina stabilă și angina Prinzmetal (sau angina variabilă). IC cronică severă (Clasa NYHA III-IV) fără semne clinice sau simptome de ischemie majoră.
Dz: Oral, 5-10 mg o dată pe zi.
Cind: Sensibilitate cunoscută la dihidropiridine.
A!: Precauție la pacienți cu IH. Prudență la gravide sau femei care alăptează.
RA: Cefalee, edeme, fatigabilitate, somnolență, greață, dureri abdominale, roșeață, palpitații și amețeli. Mai puțin frecvente: modificări ale dinamicii intestinale, artralgii, astenie, dispepsie, dispnee, hiperplazie gingivală, ginecomastie, impotență, polachiurie, modificări de dispoziție, crampe musculare, mialgii, prurit, rash, tulburări de vedere și rar eritem polimorf. Foarte rar, icter și creșteri ale enzimelor hepatice. Următoarele efecte adverse au fost raportate rar și nu se poate face distincția de istoria bolii de bază; IM, aritmie (incluzând tahicardia ventriculară și fibrilația atrială) și precordialgii.

AMOBARBITALUM

COD ATC: N05CA

AMITAL 200 *GALENIC FARM SRL;* Cpr. amobarbital sodic 200 mg ***(P-RF)***

AMOBARBITAL *NORDFARM PRODUCT;* Cpr. 100 mg ***(P-RF)***

Ind: Insomnie, stări anxioase, hiperexcitație nervoasă; pregătirea intervențiilor chirurgicale și a anesteziei generale.
Dz: Oral, 100 mg seara la culcare ca hipnotic, 25-50 mg de 2-3 ori/zi ca sedativ.
Cind: Alergie sau intoleranță la barbiturice, porfirie hepatică acută, insuficiență respiratorie, IH și IR avansată, leziuni miocardice grave, dureri rebele, alcoolism sau dependență medicamentoasă în antecedente.
A!: Prudență la bătrâni și la copii. Prudență la asocierea cu alte deprimante centrale, inclusiv băuturile alcoolice; poate scădea eficacitatea anticoagulantelor cumarinice, griseofulvinei, rifampicinei, a medicamentelor steroidice, inclusiv asociațiile estro-progestative, a fenitoinei, fenotiazinelor, antidepresivelor triciclice. Prudență la femeile însărcinate și în perioada de alăptare. Se evită adm. la șoferi și la cei cu activități de precizie.
RA: Oboseală, diminuarea performanțelor psihomotorii, amețeli, rar agitație și stare confuzivă, erupții cutanate alergice; dozele mari și folosirea timp îndelungat pot determina toleranță și dependență, tulburări de somn și tulburări psihice.

AMOXICILLINUM

COD ATC: J01CA04

AMOXICILINĂ *ARENA GROUP SA;* Cps. 250 mg ***(P-RF)***

AMOXICILINĂ *LEK PHARMATECH;* Cps. 250 mg; Pulb. susp. 125 mg/5 ml și 375 mg/5 ml ***(P-RF)***

AMOXICILINĂ 125; AMOXICILINĂ 250 *LEK PHARMATECH;* Pulb. susp. orală 125 mg/5 ml; 250 mg/5 ml ***(P-RF)***

AMOXICILINĂ FORTE 500 mg *LEK PHARMATECH;* Cps. 500 mg (ct. × 2 blist. × 10 cps. sau ct. × 1 blist. × 10 cps.) ***(P-RF)*** sau ct. × 100 blist. × 10 cps. ***(S)***

AMOXICILINĂ *OZONE LABORATORIES Ltd.;* Cps. 250 mg ***(P-RF)***

AMOXICILINĂ *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cps. 250 mg sau Cps. 500 mg; ct. × 100 blist. × 10 cps. ***(S)***; ct. × 1 blist. sau 2 blist. × 10 cps. ***(P-RF)***

AMOXICILINĂ 250 *EUROPHARM SA;* Cps. 250 mg; ct. × 1 lsit. × 12 cps. ***(P-RF)*** sau ct. × 100 blist. × 12 cps. ***(S)***

AMOXICILINĂ FORTE 500 mg *FARMEX COMPANY;* Cps. 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. ***(P-RF)*** sau ct. × 50 blist. × 10 cps. ***(S)***

AMOXICILINĂ 250 mg; AMOXICILINĂ 500 mg *PHARMEX ROM IND.;* Cps. 250 mg sau 500 mg ***(P-RF)***

AMOXIFARM *FARMACOM SA;* Cps. 250 mg ***(P-RF)***

DISPAMOX *LEK PHARMATECH;* Cpr. disp. 1 g ***(P-RF)***

DUOMOX *YAMANOUCHI EUROPE BV;* Cpr. 125, 250, 500, 750, 1000 mg ***(P-RF)***

E-MOX® *E.I.P.I.C.O.;* Cps. 500 mg; Pulb. susp. 250 mg/5 ml ***(P-RF)***

EPHAMOX *EUROPHARM SA;* Cps. 500 mg; ct. × 2 blist. × 6 cps. ***(P-RF)*** sau ct. × 50 blist. × 6 cps. ***(S)***

FARCONCIL *PHARCO PHARM.;* Pulb. susp. 100 mg/ ml ***(P-RF)***

IZOLTIL *HELP PHARMACEUTICALS Ltd.;* Pulb. susp. 125 mg/5 ml ***(P-RF)***

JULPHAMOX *GULF PHARMACEUTICAL IND. (JUPHAR);* Pulb. susp. 125 mg/5 ml sau 250 mg/5 ml ***(P-RF)***

MOXILEN *MEDOCHEMIE Ltd.;* Cps. 500 mg; ct. × 2 blist. × 8 cps. ***(P-RF)***, sau ct. × 100 blist. × 10 cps. ***(S);*** Pulb. susp. 125 mg/5 ml ***(P-RF)***

MOXILEN FORTE *MEDOCHEMIE Ltd.;* Pulb. susp. 250 mg/ml ***(P-RF)***

OSPAMOX 125 mg/5 ml; OSPAMOX 250 mg/5 ml; OSPAMOX 250 mg; OSPAMOX 500 mg; OSPAMOX 1000 mg *SANDOZ GmbH;* Gran. susp. orală 125 mg/5 ml și 250 mg/5 ml; Cps. 250 mg; Cpr. film. 500 mg și 1000 mg ***(P-RF)***

Ind: Trat. infecțiilor produse de microorganisme sensibile la amoxicilină: Bronșită acută și acutizări ale bronșitei cronice; pneumopatii acute; infecții ORL; infecții ale aparatului urinar; infecții gonococice endocervicale și uretrale necomplicate; infecții abdominale; profilaxia endocarditei bacteriene; infecții cutanate și ale țesuturilor moi; infecții stomatologice; febră tifoidă; infecții digestive și biliare; boala Lyme; adjuvant în trat. gastritei și ulcerului gastric sau duodenal provocate de *Helicobacter pylori*; infecții cu *Chlamydia sp.* la gravide. **Dz:** Oral sau inj. i.m. *Adulți și adolescenți:* doza uzală este de 250-500 mg la intervale de 6-8 ore. Durata trat. este determinată de răspunsul clinic. Nu

trebuie depășită doza zilnică maximă de 4,5 g. *Copii* cu greutatea corporală *peste 20 kg:* 6,7-50 mg/kg la intervale de 8 ore, timp de 10-30 zile.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului sau la alte antibiotice din grupa penicilinelor; mononucleoză infecțioasă.
A!: Apariția manifestărilor alergice impune oprirea trat. La pacienții cu alergie cunoscută la cefalosporine se impune prudență. Există posibilitatea producerii suprainfecțiilor. În caz de IR doza de amoxicilină trebuie adaptată în funcție de gradul insuficienței (clearance-ul creatininei). Crește toxicitatea metotrexatului. Nu se asociază cu antibiotice bacteriostatice (de ex. cloramfenicol).
RA: Manifestări alergice: urticarie, eozinofilie, edem Quincke, dispnee, excepțional șoc anafilactic; erupții cutanate maculopapulare de origine alergică sau nu; stări patologice digestive: greață, vărsături, diaree, candidoză; rar, alte manifestări alergoimune: creșterea moderată și tranzitorie a transaminazelor, nefrită interstițială acută; anemie, leucopenie, trombocitopenie reversibile; rareori, colită pseudomembranoasă.

AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM

COD ATC: J01CR02

AMOKLAVIN *DEVA HOLDING;* Cpr. film. 625 mg (500 mg amoxicilină și 125 mg acid clavulanic); Pulb. susp. 156, 25 mg/5 ml; 312 mg/5 ml ***(P-RF)***

AMOKSIKLAV *LEK PHARMACEUTICALS;* Cpr. film. 625 mg (500 mg amoxicilină și 125 mg acid clavulanic); Pulb. pt. sol. inj. 600 mg sau 1,2 g ***(P-RF)***

AMOKSIKLAV 2x *LEK PHARMACEUTICALS;* Cpr. film. 1 g (875 mg amoxicilină și 125 mg acid clavulanic); Cpr. film. 625 mg; Pulb. susp. 457 mg/5 ml; 1 000 mg ***(P-RF)***

AMOKSIKLAV *LEK PHARMACEUTICALS;* Pulb. susp. orală 156, 25 mg/5 ml ***(P-RF)***

AMOKSIKLAV FORTE *LEK PHARMACEUTICALS;* Pulb. susp. 312,5 mg/5 ml ***(P-RF)***

AUGMENTIN *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. 375 mg; Pulb. susp. 312,5 mg/5 ml sau 457 mg/5 ml (fl. cu pulb. pt. 35 ml, 70 ml sau 140 ml susp. orală) ***(P-RF)***

AUGMENTIN 1 g, AUGMENTIN 375, AUGMENTIN 625 *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. 1 g, Cpr. film. 375 mg, Cpr. film. 625 mg ***(P-RF)***

AUGMENTIN INTRAVENOS 600 mg, AUGMENTIN INTRAVENOS 1,2 g, AUGMENTIN INTRAVENOS 2,2 g *GLAXO SMITHKLINE;* Pulb. pt. sol. perf. 600 mg, 1,2 g sau 2,2 g ***(S)***

AUGMENTIN BIS *GLAXO SMITHKLINE,* Cpr. film. 1 g ***(P-RF)***

BIOCLAVID 625 mg; BIOCLAVID 1 000 mg; BIOCLAVID 156,25 mg/5 ml; BIOCLAVID 312,5 mg/5 ml *SANDOZ GmbH;* Cpr. film. 625 mg și 1 000 mg; Pulb. susp. orală 156,25 mg/5 ml și 312,5 mg/5 ml ***(P-RF)***

CLAVUMOX DUO 625 mg; CLAVUMOX DUO 1 g; CLAVUMOX DUO susp. *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. 625 mg și 1 g, Pulb. susp. 457 mg/5 ml

MEDOCLAV *MEDOCHEMIE Ltd;* Pulb. susp. 156,25 mg/5 ml (125 mg amoxicilină și 31,25 mg acid clavulanic/5 ml) ***(P-RF)***

MEDOCLAV 375 mg *MEDOCHEMIE Ltd;* Cpr. film. 375 mg (250 mg amoxicilină și 125 mg acid clavulanic) ***(P-RF)***

MEDOCLAV 625 mg *MEDOCHEMIE Ltd;* Cpr. film. 625 mg (500 mg amoxicilină și 125 mg acid clavulanic) ***(P-RF)***

MEDOCLAV FORTE *MEDOCHEMIE Ltd;* Pulb. susp. 312,5 mg/5 ml (250 mg amoxicilină și 62,5 mg acid clavulanic/5 ml) ***(P-RF)***

Ind: Infecții ale tractului respirator superior și inferior; ale tractului genito-urinar; ale pielii și țesuturilor moi; osteo-articulare; dentare; alte infecții (avort septic, infecții puerperale, infecții intraabdominale). Profilaxia infecțiilor asociate cu int. chir. Spectru: Germeni grampozitivi aerobi: Bacillus anthracis, Corynebacterium spp., Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Listeria monocytogenes, Nocardia asteroides, Staphylococcus aureus, Stafilococi coagulazo-negativi: Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Streptococcus pyogenes, Streptococcus spp., Streptococcus viridans. Germeni grampozitivi anaerobi: Clostridium spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp. Germeni gramnegativi aerobi: Bordetella pertussis, Brucella spp., Escherichia coli, Gardnerella vaginalis, Haemophilus influenzae, Helicobacter pylori, Klebsiella spp., Legionella spp., Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Pasteurella multocida, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica. Germeni gramnegativi anaerobi: Bacteroides species, Fusobacterium spp. Alții: Borrelia burgdorferi, Chlamidiae, Leptospira icterohaemorrhagiae, Treponema pallidum.
Dz: *Int: Copii:* susp. orală 457 mg/5 ml: *2 luni-2 ani:* 0,15 ml/kg de două ori/zi, *2-6 ani:* 2,5 ml de două ori/zi, *7-12 ani:* 5 ml de două ori/zi. Dozele se dublează în infecții severe. *Adulți și copii peste 12 ani:* 625 mg - 1 g de două ori/zi. *Inj: Adulți și copii peste 12 ani:* 1,2 g i.v. la fiecare 6-12 ore. *Copii 3 luni - 12 ani:* 30 mg/kg i.v. la fiecare 6-8 ore. *Copii 0-3 luni:* 30 mg/kg i.v. la fiecare 8-12 ore. *Profilaxia chirurgicală* la *adulți:* 1,2 g, i.v., 3-4 doze în 24 de ore, adm. la inducerea anesteziei. Adm. poate fi menținută câteva zile. În IH se adm. cu precauție. În cazul afectării funcției renale doza se reduce în funcție de clearance-ul la creatinină.
Cind: Hipersensibilitate la β-lactamine (peniciline și cefalosporine). Antecedente de disfuncții hepatice/icter asociate cu adm. de peniciline.
A!: Pacienți cu disfuncții hepatice, IR, mononucleoza infecțioasă, fenilcetonurie. Adm. concomitentă de probenecid, alopurinol, contraceptive orale. Sarcină și alăptare.
RA: Reacții de hipersensibilitate (edem angioneurotic, anafilaxie, sindrom similar bolii serului, vasculite de hipersensibilitate, rash cutanat, urticarie, eritem multiform, sindrom Stevens-Johnson, necroză epidermică toxică, dermatită buloasă exfoliativă, nefrită interstițială). Reacții gastro-intestinale (diaree, greață, vărsături, indigestie, candidoză mucocutanată, colite asociate antibioterapiei orale - inclusiv colită pseudomembranoasă și colită hemoragică). Efecte hepatice (creșterea AST și/sau ALT, hepatite și ictere colestatice). Efecte hemato-

logice (leucopenie reversibilă, trombocitopenie sau anemie hemolitică, prelungirea TS și de protrombină). Reacții uro-genitale (prurit, iritație, secreții vaginale). Efecte SNC (agitatie, amețeli, cefalee, convulsii). Diverse (decolorarea danturii, tromboflebite la locul injectării).

AMPICILLINUM *COD ATC: J01CA01*

AMPEN *TEVA;* Pulb. pt. sol. inj. 500 mg ***(S/P-RF)***

AMPICILINĂ *ANTIBIOTICE IAȘI;* ***(P-RF)***

AMPICILINĂ *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cps. 250 mg, 500 mg; Pulb. pt. sol. inj. 250 mg, 500 mg, 1 g ***(S/P-RF)***

AMPICILINĂ *FARMACOM SA;* Cps. 250 mg ***(P-RF)***

AMPICILINĂ *ARENA GROUP SA;* Cps. 250 mg și 500 mg ***(S/P-RF)***

AMPICILINĂ *OZONE LABORATORIES Ltd.;* Cps. 250 mg ***(P-RF)***

AMPICILINĂ *SICOMED SA;* Cps. 250 mg, 500 mg ***(P-RF)***

AMPICILINĂ *EUROPHARM SA;* Pulb. pt. sol. inj. 250 mg sau 500 mg ***(S/P-RF)***

AMPICILINĂ 1 g *EUROPHARM SA;* Pulb. pt. sol. inj. 1 g ***(S/P-RF)***

AMPICILINĂ 250 mg *EUROPHARM SA;* Cps. 250 mg ***(S/P-RF)***

AMPICILINĂ *LEK PHARMATECH;* Pulb. susp. 125 mg/5 ml, pulb. pt. sol. inj. 500 mg sau 1 g ***(S/P-RF)***

AMPICILINĂ 250 *LEK PHARMATECH;* Pulb. pt. susp. orală 250 mg/ 5 ml ***(P-RF)***

AMPICILINĂ 250 mg *LEK PHARMATECH;* Cps. 250 mg ***(S/P-RF)***

AMPICILINĂ FORTE *LEK PHARMATECH;* Cps. 500 mg ***(S/P-RF)***

AMPICILINĂ 1 g *ROPHARMA SRL;* Pulb. pt. sol. inj. 1 g ***(S/P-RF)***

AMPICILINĂ 250 mg *ROPHARMA SRL;* Pulb. pt. sol. inj. 250 mg ***(S/P-RF)***

AMPICILINĂ 500 mg *ROPHARMA SRL;* Pulb. pt. sol. inj. 500 mg ***(S/P-RF)***

AMPICILINĂ FORTE *FARMEX COMPANY;* Cps. 500 mg ***(S/P-RF)***

AMPIDAR *DAR AL DAWA;* Cps. 250 mg ***(P-RF)***

EPHICILIN *EUROPHARM SA;* Cps. 500 mg ***(S/P-RF)***

EPICOCILLIN *E.I.P.I.C.O.;* Pulb. pt. sol. inj. 500 mg; Cps. 250 mg ***(S/P-RF)***

PAMECIL *MEDOCHEMIE Ltd.;* Pulb. pt. inj. 250 mg, 500 mg sau 1 g ***(S/P-RF)***

PENTREXYL *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Pulb. pt. sol. inj. 500 mg sau 1 g *(S/P-RF)*

STANDACILLIN *SANDOZ GmbH;* Gran. pt. susp. orală 125 mg/5 ml sau 250 mg/5 ml, Cps. 250 mg, 500 mg; Pulb. pt. sol. inj., 0,5 g, 1 g sau 2 g; *(S/P-RF)*

Ind: *Adm. intern:* În infecții ușoare - moderate produse de microorganisme sensibile la ampicilină: infecții ale aparatului respirator; infecții ale pielii și țesuturilor moi; infecții ale aparatului urogenital; infecții ale aparatului digestiv; infecții biliare; leptospiroză, listerioză; profilaxia infecțiilor chirurgicale la pacienții cu risc; pt. prevenirea endocarditei; pt. continuarea unui trat. cu ampicilină adm. parenteral la pacienții cu endocardită, meningită bacteriană, septicemii produse de agenți patogeni sensibili la ampicilină, listerioză; la pacienții cu encefalopatie hepatică.
Adm. inj.: Infecții ale tractului respirator; meningite bacteriene; septicemie și endocardită; infecții ale tractului urinar, infecții biliare, produse de tulpini sensibile ale unor bacterii grampozitiv și gramnegativ.
Dz: *Adm. oral: Adulți:* Doza uzuală 500 mg la intervale de 6 ore, maxim 4 g/zi. Dacă sunt necesare doze mai mari (6-12 g/zi) se recomandă folosirea altor forme farmaceutice și adm. parenterală. *Copii:* Doza uzuală este de 50-100 mg/kg și zi, fracționat la 6-12 ore. În IR doza se adaptează în funcție de clearance-ul creatininei sau de nivelul plasmatic al creatininei.
Adm. inj.: Pacienți cu greutatea *de 40 kg sau mai mult:* 250-500 mg la fiecare 6 ore. *Pacienții* cu greutatea *sub 40 kg:* 25-50 mg/kg pe zi în prize egale la 6-8 ore. Uretrite la bărbați: *Adulți:* două doze a 500 mg fiecare la interval de 8-12 ore. Meningite bacteriene: *Adulți și copii:* 150-200 mg/kg pe zi divizat în prize egale la 3-4 ore. Septicemie: *Adulți și copii:* 150-200 mg/kg pe zi divizat în prize egale la 3-4 ore.
Cind: Alergie la peniciline sau la oricare dintre componenții produsului. Mononucleoza infecțioasă.
AI: Apariția manifestărilor alergice impune întreruperea trat. Prudență la pacienții cu teren atopic. La bolnavii cu IR, doza se adaptează în funcție de clearance-ul creatininei. Există riscul suprainfecțiilor bacteriene sau fungice cu germeni rezistenți. Dacă în timpul trat. apare diaree severă și persistentă, trebuie suspectată apariția colitei pseudomembranoase. Datorită conținutului în zahăr al granulelor, se recomandă prudență la pacienții diabetici. Nu trebuie asociată cu antibiotice bacteriostatice. Nu se recomandă adm. concomitentă cu alopurinol. Probenecidul determină concentrații plasmatice crescute și prelungite de antibiotic, prin reducerea eliminării renale. Se va adm. în perioada sarcinii numai dacă este absolut necesar. Este recomandată întreruperea alăptării.
RA: *Adm. int.:* manifestări alergice, manifestări cutanate, tulburări digestive, creșterea nivelului transaminazelor serice, tulburări hematologice reversibile, nefrită interstițială acută, colită pseudomembranoasă. Adm. de doze mari de β-lactamine poate determina tulburări nervos centrale. La pacienții cu febră tifoidă, leptospiroză sau sifilis poate să apară reacția Jarish-Herxheimer. *Adm. inj.:* fenomene de hipersensibilitate, tulburări gastrointestinale, creșterea moderată a activității transaminazei oxalaceto-glutamice (GOT, ASAT) în ser (mai ales la sugari), tulburări hematologice (anemie, trombocitopenie, purpură trombocitopenică, eozinofilie, leucopenie și agranulocitoză).

AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMĂ *COD ATC: J01CR01*

AMPICILINĂ PLUS 1,5 g *ANTIBIOTICE IAȘI;* Pulb. pt. sol. inj. 1 g ampicilină + 500 mg sulbactam ***(S/P-RF)***

AMPICILINĂ PLUS 750 mg *ANTIBIOTICE IAȘI;* Pulb. pt. sol. inj. 500 mg ampicilină + 250 mg sulbactam ***(S/P-RF)***

AMPIPLUS® *ANTIBIOTICE IAȘI;* Pulb. pt. sol. inj. 750 mg și 1,5 g (1 g + 0,5) ***(P-RF/S)***

AMPISID *MUSTAFA NEVZAT ILAC;* Pulb. pt. sol. inj. 250 mg ampicilină + 125 mg sulbactam; 500 mg ampicilină + 250 mg sulbactam; 1 g ampicilină + 500 mg sulbactam ***(P-RF)***

UNASYN i.m./i.v. *PFIZER H.C.P. CORPORATION;* Pulb. pt. sol. inj. 1 g ampicilină + 500 mg sulbactam ***(P-RF)***

Ind: Infecții produse de microorganisme sensibile. Infecții ale căilor respiratorii superioare: sinuzite, otite medii și tonsilite; infecții ale căilor respiratorii inferioare: pneumonii bacteriene și bronșite; infecții ale tractului urinar și pielonefrite; infecțiii intraabdominale inclusv peritonite; colecistite; endometrite și celulite pelviene; septicemii bacteriene; infecții ale pielii țesuturilor moi, oaselor și articulațiilor și infecții gonococice. Preoperator pentru a reduce frecvența infecțiilor postoperator la pacienții supuși operațiilor abdominale sau pelviene. În cazul nașterilor normale sau prin cezariană se poate folosi profilactic pentru a reduce infecțiile postoperatorii.

Dz: *Adulți:* 1,5-12 g/zi i.m./i.v. la 6-8 ore până la o doză maximă de sulbactam de 4 g/zi. În infecțiile mai puțin severe - 1 adm. la 12 ore. Severitatea infecției: ușoară 1,5-3 g/zi (0,5+1 la 1+2); moderată până la 6 g/zi (2+4); severă până la 12 g/zi (4+8). *Copii* și *nou-născuți:* 150 mg/kg pe zi (50 mg/kg sulbactam și 100 mg/kg ampicilină), adm. de obicei la 6-8 ore. La nou-născuții în prima săpt. de viață (în special la prematuri) dozele se adm. uzual la 12 ore. Doza și frecvența adm. se modifică în relație cu funcția renală a pacientului. Pentru profilaxia infecțiilor chirurgicale se vor adm. 1,5-3 g sultamicilină i.m./i.v. în timpul inducerii anesteziei. În trat. gonoreei necomplicate sultamicilina i.m./i.v. poate fi adm. ca o doză unică de 1,5 g.

Cind: Reacții alergice la peniciline în antecedente. Sarcină și alăptare.

A!: Ca și în cazul altor antibiotice este importantă observarea permanentă pentru a descoperi semne de înmulțire a unor germeni insensibili la trat., inclusiv a fungilor. În cazul trat. prelungite, se recomandă să se verifice periodic funcțiile sistemelor: renal, hepatic și hematopoietic.

RA: *Gastrointestinale:* diaree, greață, vărsături, dureri/crampe abdominale. Rar, enterocolită și colită pseudomembranoasă. *Cutanate:* rash și prurit. *Diverse:* somnolență/sedare, oboseală, indispoziție și cefalee. Durere la locul inj. i.m. Flebite după adm. i.v. *Hematologice:* anemie, trombocitopenie, eozinofilie, leucopenie. *Hepatice:* creșteri tranzitorii ale transaminazelor.

AMPRENAVIRUM

COD ATC: J05AE05

AGENERASE® *GLAXO SMITHKLINE;* Cps. moi 50 mg; Sol. orală 15 mg/ml *(S/P-RF)*

Ind: La adulți și copii mai mari de 4 ani infectați cu Virusul Imunodeficienței Umane (HIV), tratați anterior cu alți inhibitori de protează.
Dz: Oral. *Adulți și adolescenți peste 12 ani:* 1200 mg de 2 ori pe zi. În asociere cu ritonavir se recomandă doze mai mici. *Copii (4-12 ani) și pacienți în greutate mai mică de 50 kg:* 20 mg/kg de 2 ori pe zi, în asociere cu alte antiretrovirale, fără a depăși o doza zilnică totală de 2400 mg. Dozele trebuie micșorate în IH.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la oricare din componente. Nu trebuie adm. concomitent cu produse medicamentoase cu fereastră terapeutică îngustă care sunt substraturi ale citocromului P450 3A4 (CYP3A4), cu rifampicină sau cu produse care conțin sunătoare (Hypericum perforatum). Soluția orală este CI la copii sub 4 ani.
A!: Trebuie utilizat în asociere cu cel puțin alte două antiretrovirale. Precauție la pacienții cu IH. Nu se recomandă suplimentarea de vitamina E. Trat. trebuie întrerupt când rash-ul este însoțit de simptome sistemice, simptome alergice sau interesează mucoasele. La pacienții tratați cu antivirale s-au raportat cazuri noi de diabet zaharat, hiperglicemie sau agravări ale diabetului zaharat preexistent. Pacienții hemofilici trebuie avertizați asupra posibilității de sângerare crescută.
Atenție în cazul asocierii cu: inhibitori de protează (IP), analogi nucleozidici inhibitori ai revers transcriptazei (NIRT), compuși non-nucleozidici inhibitori ai revers transcriptazei (NNIRT), antibiotice/antifungice, antiacide, benzodiazepine, blocante ale canalelor calciului, medicamente pentru trat. erecției insuficiente, medicamente hipolipidemiante, metadonă și derivați opioizi, steroizi, contraceptivelor hormonale, sunătoare. Atenție în cazul folosirii în sarcină. Se recomandă ca mamele tratate să nu alăpteze.
RA: Simptome gastro-intestinale. Erupții cutanate eritematoase sau maculopapulare, cu sau fără prurit. Rar reacții cutanate grave sau cu potențial letal, incluzând sindrom Stevens-Johnson. Redistribuire a țesutului adipos. Modificări ale parametrilor de laborator: creșterea transaminazelor, hipertrigliceridemie, creșterea amilazei, hiperbilirubinemie și hiperglicemie. Creșterea CPK, mialgii, miozită și rareori rabdomioliză.

ANASTROZOLUM

COD ATC: L02BG03

ARIMIDEX *ASTRAZENECA;* Cpr. film. 1 mg *(S/P-RF)*

Ind: Carcinomul mamar în stadiu avansat la femei la care s-a instalat menopauza, a căror boală a evoluat după trat. cu tamoxifen sau alte antiestrogenice.
Dz: *Adulți,* inclusiv *vârstnici:* oral, 1 mg/zi.
Cind: Femei în premenopauză; femei gravide sau care alăptează; paciente cu afectare severă a funcției renale (clearance-ul creatininei < 20 ml/min); pa-

ciente cu afectare hepatică moderată sau severă; antecedente de hipersensibilitate la anastrozol sau oricare dintre excipienţi. Nu se asociază cu preparate care conţin hormoni estrogeni. La copii.
A!: Şoferi şi activităţi de precizie.
RA: Valuri de căldură, uscăciunea mucoasei vaginale şi subţierea firului de păr. Tulburări gastrointestinale (anorexie, greaţă, vărsături şi diaree); astenie, somnolenţă, cefalee. Rash cutanat. Sângerare vaginală. Modificări hepatice. Creşterea nivelului colesterolului total.

APOMORFINUM *COD ATC: G04BE*

UPRIMA 2 mg, UPRIMA 3 mg *ABBOTT LABORATORIES Ltd;* Cpr. sl. 2 mg; Cpr. sl. 3 mg ***(P-RF)***

Ind: Trat. disfuncţiei erectile.
Dz: *Adm. s.l. Adulţi:* Un cpr. cu aproximativ 20 de min înaintea activităţii sexuale. Doza poate fi crescută la 3 mg pentru atingerea efectul clinic dorit. O nouă doză se poate adm. după o perioadă minimă de 8 ore. La pacienţii cu alterare severă a funcţiei renale, doza maximă nu trebuie să depăşească 2 mg. Doza iniţială pentru pacienţii cu IH este de 2 mg şi orice creştere a dozei trebuie făcută cu prudenţă.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. La pacienţii cu angină instabilă severă, IM recent, IC severă sau hTA şi alte condiţii în care activitatea sexuală nu este recomandată.
A!: Precauţie la pacienţii cu deformări anatomice ale penisului (angularea, fibroza cavernoasă sau boala Peyronie). Poate determina rar sindrom tranzitoriu vasovagal, care se poate manifesta ca o senzaţie de leşin autolimitată/sincopă. Precauţie la pacienţii cu HTA necontrolată, hTA sau la cei care au antecedente de hTA ortostatică. Precauţie la pacienţii cu afectarea funcţiei renale sau hepatice.
Precauţie la pacienţii trataţi concomitent cu: nitraţi, antihipertensive, antiemetice (exceptând: ondansetron, proclorperazină, domperidonă), alţi agonişti sau antagonişti dopaminergici cu acţiune centrală, alţi agenţi pentru disfuncţia erectilă, antidepresive, anticonvulsivante sau alţi agenţi cu acţiune asupra SNC, alcool. Precauţie la şoferi sau persoane cu activităţi de precizie.
RA: Greaţă, dureri de cap, ameţeli, căscat, rinită, faringită, somnolenţă, infecţii, durere, tuse accentuată, înroşirea feţei, modificări ale gustului şi transpiraţii. Rar, sindrom vasovagal tranzitoriu care poate conduce la senzaţie de leşin autolimitată/sincopă.

APROTININUM *COD ATC: B02AB01*

GORDOX *GEDEON RICHTER Ltd.;* Sol. inj. 10 000 ui/ml (f. × 10 ml) ***(S)***

GORDOX *GEDEON RICHTER Ltd.;* Sol. perf. 500 000 UKI (fl. × 50 ml) ***(S)***

TRASYLOL® sol. perf. *BAYER AG;* Sol perf. 500 000 UIK aprotinină (ct. × 1 fl. × 50 ml) ***(S)***

Ind: Hemoragia prin hiperfibrinoliză apărută posttraumatic, postoperator sau în timpul circulației extracorporeale la adulți. Complicații în terapia trombolitică.
Dz: Inj. i.v. sau perf. Testarea hipersensibilității: o doză de 10 000 KIU cu cel puțin 10 min. înaintea restului dozei. Doza terapeutică: Hemoragia hiperfibrinolitică: Inițial 500 000 KIU; apoi 200 000 KIU la fiecare 4 ore. *Copii:* 20 000. KIU/ kg/zi. Tulburări hemostatice în obstetrică și ginecologie: Inițial 1 000 000 KIU, apoi 200 000 KIU/oră. Chirurgia cardiovasculară cu circulație extracorporală: 1-2 milioane KIU prin inj./perf. lentă i.v. pe o durată de 15-20 min, după inducerea anesteziei și înaintea sternotomiei. Alte 1-2 milioane KIU trebuie adăugate pompei mașinii plămân-inimă. Perfuzarea bolusului inițial este urmată de adm. unei perf. continue de 250 000-500 000 KIU/oră până la sfârșitul operației. Cantitatea totală nu trebuie să depășească 7 milioane KIU.
Cind: Hipersensibilitate la aprotinină.
A!: Risc de reacții alergice. S-a raportat o creștere a IR și mortalității. Trat. anticoagulant adecvat cu heparină trebuie să fie asigurat. Metoda *in vitro* pentru a determina gradul anticoagulării în sângele heparinizat poate fi denaturată în prezența aprotininei. Inhibă activitatea agenților trombolitici (streptokinaza, urokinaza, alteptaza (r-tPA)). Atenție la utilizarea în sarcină.
RA: Posibile reacții anafilactice și anafilactoide (eritem facial, urticarie, prurit, greață, scăderea bruscă a tensiunii, tahicardie sau bradicardie, obstrucția căilor respiratorii, hipertensiune gravă, șoc anafilactic). Creșteri tranzitorii ale creatininei serice. IR. Creștere a incidenței perioperatorii a IM. Reacții locale tromboflebitice.

ARGININUM *COD ATC: A05BA01*

SARGENOR *LAB. VIATRIS PHARMA;* Sol. buv. 200 mg/ml (f. × 5 ml) Cpr. mast. 1 g ***(OTC)***

SARGENOR *LAB. VIATRIS PHARMA;* Sol. orală 1 g/5 ml (ct. x 20 fiole) ***(OTC)***

Ind: Hepatită cronică, ictere severe, comă posthemoragică, hiperamoniemie, astenie funcțională.
Dz: *Sol. buv., adulți:* 2-3 f./zi; *copii peste 12 ani:* 1-2 f./zi. Trat. maxim 15 zile. Conținutul fiolelor se dizolvă în puțină apă și se adm. de preferință înainte de repaus. *Cpr. eferv., adulți:* 2-3 cpr. eferv./zi, *copii peste 12 ani:* 1-2 cpr. eferv./zi., în cure de 8-15 zile. *Cpr. mast., adulți:* 2-3 cpr. mast./zi; *copii peste 12 ani:* 1-2 crp. mast./zi, maxim 4 săptămâni.
Cind: Acidoză hipercloremică, anurie. Sarcină și alăptare.
A!: Adm. la copii sub 12 ani se face numai cu avizul medicului.

ASPARAGINAZUM *COD ATC: L01XX02*

ASPARAGINASE 5 000 MEDAC *MEDAC GESELLSCHAFT FÜR KLINISCHE SPEZIALPRÄPARATE;* Pulb. pt. sol. inj. 5 000 ui ***(S)***

ASPARAGINASE 10 000 MEDAC *MEDAC GESELLSCHAFT FÜR KLINISCHE SPEZIALPRÄPARATE;* Pulb. pt. sol. inj. 10 000 ui ***(S)***

Ind: Leucemii acute mieloblastice și leucemii acute limfoblastice, meningite leucemice, limfoame non-Hodgkiniene.
Dz: Se adm. numai în mediu spitalicesc.
Cind: IH, pancreatită. Hipersensibilitate la asparaginază, sarcină, alăptare.
A!: În caz de diabet zaharat, avertizați medicul.
RA: Tulburări digestive, fenomene alergice, edem Quincke, reacții febrile, rash, prurit cutanat, amenoree, azoospermie, modificări ale probelor biochimice hepatice și pancreatice.

ASTEMIZOLUM

COD ATC: R06AX11

ASTEMIZOL *SLAVIA PHARM SRL;* Cpr. 10 mg ***(P-6L)***

Ind: Rinite alergice sezoniere și perene, conjunctivite alergice, urticarie cronică și a altor afecțiuni alergice.
Dz: *Adulți și copii mai mari de 12 ani:* 10 mg o dată pe zi. *Copii între 6 și 12 ani:* 5 mg o dată pe zi. *Copii sub 6 ani:* 2 mg/10 kg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din ingrediente. Disfuncții hepatice grave.
A!: Pot apărea creșteri ale intervalului QT și/sau aritmii ventriculare. A se evita la bolnavi cu sindrom congenital QT, pacienților aflați sub medicație care prelungește intervalul QT și la cei cu hipopotasemie necorectată. A nu se asocia cu substanțe care inhibă activitatea CYP3A4.
RA: Ușoare creșteri ponderale. Reacții de hipersensibilitate (angioedem, bronhospasm, fotosensibilitate, prurit, rash, reacții anafilactice). Convulsii, parestezii benigne, mialgii/artralgii, edem, tulburări de dispoziție, insomnii, coșmaruri, creșteri ale transaminazelor și hepatită.

ATAZANAVIRUM

COD ATC: J05AE

REYATAZ *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Cps. 100 mg, 150 mg, 200 mg atazanavir; ct. x 60 cps.; Pudră pt. sol. orală 50 mg/1,5 g

Ind: Tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane dobândite (HIV-1), la adulți experimentați în tratamentul antiretroviral, în combinație cu alte medicamente antiretrovirale.
La pacienții experimentați în tratamentul antiretroviral, demonstrarea eficacității este bazată pe un studiu comparativ între atazanavir, 300 mg o dată pe zi în combinație cu ritonavir 100 mg o dată pe zi și lopinavir/ritonavir, fiecare regim terapeutic în combinație cu tenofovir. Bazat pe date disponibile virusologice și clinice, nu se așteaptă nici un beneficiu la pacienții cu tendință la rezistență multiplă la inhibitorii de proteaze (> 4 PI mutații).
Dz: Terapia trebuie inițiată de către un medic cu experiență în tratamentul infecției HIV. *Adulți:* oral, 300 mg atazanavir o dată pe zi administrat cu ritonavir 100 mg o dată pe zi, cu alimente. Dacă atazanavir și ritonavir sunt administrate concomitent cu didanosine, se recomandă ca didanosina să fie luată la 2 ore după ce atazanavir cu ritonavir au fost înghițite cu alimente. Capsulele se înghit întregi. Pulberea orală este disponibilă pentru pacienții care sunt incapabili să înghită capsule. *Sugari, copii mici și adolescenți:* nu a fost stabilită eficacitatea și siguranța atazanavir.

Cind: Hipersensibilitate la atazanavir sau la oricare dintre excipienți. Pacienți cu insuficiență hepatică moderată - severă. La femei însărcinate se utilizează numai dacă beneficial justifică riscul. Asocierea atazanavir cu ritonavir nu trebuie folosit în combinație cu rifampicină, astemizol, terfenadină, cisapridă, pimozidă, chinidină, bepridil, și alcaloizi din ergot, în special ergotamină, dihidroergotamină, ergonovină, metilergonovină, simvastatină.
Nu se utilizează în combinație cu produse conținând sunătoare (Hypericum perforatum).

AI: În timpul tratamentului se vor lua măsuri de precauție pentru prevenirea riscului de transmitere a HIV prin sânge sau contact sexual. Administrarea atazanavir cu ritonavir trebuie utilizată cu precauție la pacienții cu insuficiență hepatică ușoară. Precauții la pacienții cu probleme de conducere atrioventriculară (utilizarea se va face numai dacă beneficiile depășesc riscurile), pacienți cu hemofilie A și B (crește riscul sângerărilor). S-au raportat în urma tratamentului apariția diabetului zaharat, exacerbarea diabetului zaharat existent, creșteri reversibile ale bilirubinei indirecte. Se evită utilizarea concomitentă a atazanavir cu contraceptive orale. Prudență la conducători auto.

RA: Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând convenția: foarte frecvente: = 1/10; frecvente: = 1/100, < 1/10; neobișnuite = 1/1000,< 1/100; rare: = 1/100000, < 1/1000; foarte rare: = 1/10000. Reacții adverse la utilizarea atazanavir și unul sau mai mulți inhibitori de revers transcriptază (INTR):
Foarte frecvente: icter. *Frecvente:* lipodistrofie, cefalee, insomnie, simptome neurologice periferice, icter scleral, durere abdominală, diaree, dispepsie, greață, vărsături, astenie, rash. Neobișnuite: disgeuzie, flatulență, gastrită, pancreatită, stomatită aftoasă; durere la nivelul toracelui, oboseală, febră, indispoziție; reacții alergice; anorexie, apetit crescut, scăderea greutății corporale, creșterea greutății corporale; anxietate, depresie, tulburări ale somnului, tulburări ale viselor, amnezie, confuzie, amețeală, somnolență; sincopă; dispnee; alopecie, prurit, urticarie; hematurie, nefrolitiază, polakiurie; artralgie, atrofie musculară, mialgie; ginecomastie. Rare: mers anormal, distensie abdominală,. hipertensiune, palpitații, hepatosplenomegalie, eczemă, vasodilatație, rash vesiculobulos, miopatie, durere în loja renală, proteinurie.

ATENOLOLUM

COD ATC: C07AB03

ATECOR *WIN-MEDICARE Ltd;* Cpr. 100 mg ***(P-6L)***

ATENOCOR 50, ATENOCOR 100 *HELCOR SRL;* Cpr. 50 mg, 100 mg ***(P-6L)***

ATENOLOL *LAROPHARM SRL;* Cpr. 50 mg ***(P-6L)***

ATENOLOL 50 mg, ATENOLOL 100 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. 50 mg, 100 mg ***(S/P-6L)***

ATENOLOL 50 mg, ATENOLOL 100 mg *ARMEDICA SA;* Cpr. film. 50 mg, 100 mg ***(P-6L)***

ATENOLOL 50 mg, ATENOLOL 100 mg *TERAPIA SA;* Cpr. film. 50 mg, 100 mg ***(P-6L)***

ATENOVA *LAB. LUPIN;* Cps. 50 mg sau 100 mg ***(P-6L)***

AZECTOL *HELP PHARMACEUTICALS;* Cpr. 100 mg ***(P-6L)***

BLOCOTENOL 50 mg; BLOCOTENOL 100 mg *SANDOZ GmbH;* Cpr. 50 mg și 100 mg ***(P-6L)***

EPHITENSIN 100 mg *EUROPHARM SA;* Cpr. 100 mg ***(S/P-6L)***

HYPOTEN *HIKMA PH;* Cpr. film. 50 mg sau 100 mg ***(P-6L)***

NOVO-ATENOL *NOVOPHARM Ltd;* Cpr. 50 mg sau 100 mg ***(P-6L)***

SYNAROME *FARAN LABORATORIES SA;* Cpr. 100 mg ***(P-6L)***

TENORMIN *ASTRAZENECA;* Cpr. film. 50 mg sau 100 mg ***(P-6L)***

VASCOTEN *MEDOCHEMIE Ltd;* Cpr. film. 100 mg ***(S/P-6L)***

Ind: HTA; angină pectorală; aritmii cardiace; IM.
Dz: *Adulți:* Hipertensiune: 50-100 mg/zi, oral, în priză unică. Angină: 100 mg/zi, oral, în priză unică sau fracționat. Aritmii: Doza de întreținere 50-100 mg/zi, oral, în priză unică. IM: 50-100 mg/zi, oral, în priză unică. Adm. tardivă: 100 mg/zi, în priză unică. În IR dozele trebuie reduse.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la substanță; bradicardie; șoc cardiogen; hTA; acidoză metabolică; afecțiuni circulatorii arteriale periferice severe; bloc de gradul doi sau trei; sindrom de sinus bolnav; feocromocitom netratat; IC necontrolată medicamentos.
A!: La pacienți cu rezervă cardiacă redusă; angină tip Prinzmetal; cu bloc de gradul întâi. Poate masca semnele tireotoxicozei. Nu trebuie întrerupt brusc la pacienții care prezintă boală ischemică coronariană. Pacienți cu istoric de reacții anafilactice. Poate determina o creștere a rezistenței căilor aeriene la pacienții astmatici. Atenție la asocierea cu: blocantele canalelor de calciu, dihidropiridine, glicozizii digitalici, clonidină, agenți antiaritmici din clasa I, agenți simpatomimetici, inhibitoare ale prostaglandin-sintetazei, agenți anestezici. Atenție când se adm. la femeile care sunt, sau pot rămâne gravide, sau celor care alăptează la sân.
RA: Cardiovasculare: bradicardie; agravarea IC; hTA asociată uneori cu sincope; extremități reci. La pacienții susceptibili: precipitarea unui bloc de conducere; claudicație intermitentă, fenomen Raynaud. SNC: confuzie; amețeli; cefalee; modificări ale afectivității; coșmaruri; psihoze și halucinații; tulburări ale somnului. Gastrointestinale: uscăciunea mucoasei bucale, tulburări gastrointestinale. Hematologice: purpură, trombocitopenie. Tegumentare: alopecie; uscăciunea conjunctivelor; reacții cutanate psoriaziforme; exacerbarea psoriazisului; rash cutanat. Respiratorii: bronhospasm. Sensibilitatea vizuală: tulburarea acuității vizuale. Altele: oboseală; creștere a ANA (anticorpi antinucleari).

ATORVASTATINUM *COD ATC: C10AA05*

SORTIS 10 mg, SORTIS 20 mg *PFIZER H.C.P. CORPORATION;* Cpr. film. 10 mg sau 20 mg ***(P-6L)***

SORTIS 40 mg, SORTIS 80 mg *PFIZER H.C.P. CORPORATION;* Cpr. film. 40 mg sau 80 mg ***(P-6L)***

Ind: Hipercolesterolemie primară, inclusiv hipercolesterolemia familială, hipercolesterolemie mixtă, hipercolesterolemie familială homozigotă, ca terapie suplimentară altor trat. hipolipemiante sau atunci când aceste trat. nu sunt indicate.
Dz: Doza inițială uzuală este de 10 mg atorvastatin o dată pe zi. Dozajul este individualizat, corespunzător valorilor LDL-colesterol, scopului terapiei și răspunsului terapeutic al fiecărui pacient în parte. Doza maximă este de 80 mg o dată pe zi.
Cind: La pacienți cu hipersensibilitate la oricare din componentele medicamentului, afecțiuni hepatice active, miopatie, în timpul sarcinii sau alăptării și la femei la vârsta procreării și care nu utilizează mijloace contraceptive adecvate.
A!: Dozele trebuie reduse sau se întrerupe trat. dacă: valorile TGP sau TGO cresc de peste 3 ori față de normal și se mențin crescute, valorile creatinfosfokinazei (CPK) sunt crescute sau dacă este diagnosticată sau suspectată o miopatie. Trebuie adm. cu precauție la pacienții ce consumă cantități considerabile de alcool și/sau la cei cu afecțiuni hepatice în antecedente. Prudență la adm. concomitentă de atorvastatin și inhibitori ai citocromului P450 3A 4 (ciclosporina, antibiotice macrolidice, inclusiv eritromicina, și antimicotice de tip azol, inclusiv itraconazol), digoxin, contraceptive orale, colestipol, antiacide, warfarină, fenazonă, cimetidină.
RA: Constipație, flatulență, dispepsie, dureri abdominale, cefalee, greață, mialgie, astenie, diaree și insomnie. Creșterea transaminazelor serice. Valori crescute ale creatinfosfokinazei serice (CPK). Rar: miozită, miopatii, rabdomioliză, parestezii, neuropatie periferică, pancreatită, hepatită, icter colestatic, anorexie, vărsături, alopecie, prurit, rash, impotență, hiperglicemie, hipoglicemie, dureri pectorale, amețeli, trombocitopenie și reacții alergice, inclusiv edem angioneurotic.

ATRACURIUM

COD ATC: M03AC04

TRACRIUM *GLAXO SMITHKLINE;* Sol. inj. 10 mg/ml - 2,5 ml și 10 mg/ml - 5 ml *(S)*

Ind: Realizarea intubației endotraheale și relaxarea musculaturii striate în timpul intervențiilor chirurgicale și a ventilației asistate, sub anestezie generală.
Dz: *Adm. inj. i.v.:* inițial 0,3-0,6 mg/kg, la nevoie doze suplimentare de 0,1-0,2 mg/kg. *Adm. în perf.:* bolus inițial de 0,3-0,6 mg/kg, apoi, dacă este necesar, perfuzii continue cu un ritm de 0,3-0,6 mg/kg/oră. Se recomandă monitorizarea funcției neuromusculare în timpul adm. de atracurium, pentru a se determina dozele individuale necesare.
Cind: La pacienți cunoscuți cu hipersensibilitate la medicament.
A!: Trebuie adm. doar cu anestezie generală adecvată și numai de către sau sub supravegherea atentă a unui anestezist. Nu trebuie adm. în linia de transfuzie de sânge. Atenție la pacienții ce prezintă antecedente sugestive de sensibilitate crescută la efectele histaminei. Atenție în cazul pacienților cu miastenia gravis, alte boli neuromusculare și tulburări electrolitice severe. Nu trebuie amestecat în aceeași seringă cu thiopental sau orice alt agent alcalin. La pacienții arși poate apărea rezistență. Atenție când se asociază cu: anestezice inhalatorii precum halotan, izofluran și enfluran; antibiotice precum: aminoglicozide, polimixine, spectinomicină, tetracicline, lincomicină și clindamicină; antiaritmice: propranolol, blocanți ai canalelor de calciu, lignocaină, procain-

amidă și chinidină; diuretice: furosemid, și posibil manitol, diuretice tiazidice și acetazolamidă; sulfat de magneziu; ketamină; săruri de litiu; blocanți ganglionari: trimetafan, hexametoniu. Anumite medicamente pot agrava sau demasca miastenia gravis latentă, sau pot induce un sindrom miastenic; acestea pot crește sensibilitatea la atracurium (diverse antibiotice, β-blocanți, antiaritmice, antireumatice (clorochină, D-penicilamină), trimetafan, clorpromazină, steroizi, fenitoin și litiu). Atenție la asocierea cu alți blocanți neuromusculari nedepolarizanți. Nu trebuie să se asocieze cu relaxanți musculari depolarizanți. Trebuie folosit cu atenție în sarcină.

RA: Erupții tegumentare, hTA ușoară tranzitorie sau bronhospasm, atribuite eliberării de histamină. Rar, reacții anafilactoide severe, slăbiciune musculară și/sau miopatie.

ATROPINUM

COD ATC: A03BA01
S01FA01

APITROPIN *AMMAN PHARM. IND.;* Sol. oft. 1% ***(S/P-RF)***

SULFAT DE ATROPINĂ *BIOFARM SA;* Sol. inj. 1 mg/ml sulfat de atropină (f. × 1 ml) ***(S)***

Ind: Bronșite cu hipersecreție, colici biliare, colici nefretice, hipersecreție gastrică, spasm piloric, constipație spastică, tenesme vezicale, hiperhidroză. Adjuvant în preanestezie și analgezie. Traumatisme craniene închise. În trat. crizelor de râs și plâns din sindroamele pseudobulbare. În unele tulburări de conducere (BAV complet cu crize Adam-Stockes), sindromul sinusului carotidian cu crize sincopale. Colită ulceroasă cronică nespecifică. Trat. profilactic al grețurilor și vărsăturilor din răul de mare și de avion. Pentru punerea irisului și a corpilor ciliari în poziție de repaus în cursul inflamațiilor acute și cronice ale acestora, ale corneei cât și ale țesutului vascularizat (Uvea); în leziuni și la reducerea unor cicatrice ale irisului (Synechien); pentru scopuri diagnostice (determinarea refracției) și în tratamentul strabismului.

Dz: *Adulți:* Inj. s.c. 0,25-1 mg/zi. Sol. oft.: dacă nu este altfel indicat, se recomandă astfel: În tratamentul strabismului o dată pe zi 1 picătură în sacul conjunctival. În inflamații ale irisului și corpului ciliar 1-2 ori pe zi câte 1 picătură. Pentru combaterea sinechiilor de 3 ori pe zi câte 1 picătură. Înaintea determinării refracției, timp de 3 zile se administrează de 3 ori pe zi câte o picătură în sacul conjunctival.

Cind: Fibrilație atrială, glaucom, tbc pulmonară evolutivă.

AZAPENTACEN POLISULFONAT DE SODIU

COD ATC: S01XAN1

QUINAX *ALCON SRL;* Sol. oft. 0,15 mg/ml (fl. × 15 ml) ***(P-6L)***

Ind: Cataractă senilă, cataractă traumatică, cataractă congenitală și cataractă secundară.

Dz: Instilații oft. 2 pic., de 3 până la 5 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate față de oricare din componente.

AZATHIOPRINUM

COD ATC: L04AX01

IMURAN *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. 50 mg azatioprină ***(S/P-RF)***

Ind: Antimetabolit imunosupresiv, la pacienții cu transplant de organe, la pacienți afectați de: artrită reumatoidă severă; LES; dermatomiozită și polimiozită; hepatită cronică activă autoimună; pemfigus vulgar; poliarterită nodoasă; anemie hemolitică autoimună; purpură trombocitopenică idiopatică cronică, refractară.
Dz: *Dozarea în transplante: adulți și copii:* doza de încărcare max. 5 mg/kg corp/zi, oral. Doza de întreținere 1-4 mg/kg corp/zi și trebuie ajustată în funcție de necesitățile clinice și toleranța hematologică.
Dozarea în alte situații: adulți și copii: doza inițială este de 1-3 mg/kg corp/zi și trebuie ajustată. Doza de întreținere poate varia între mai puțin de 1 mg/kg corp/zi și 3 mg/kg corp/zi, în funcție de afecțiunea tratată și de răspunsul individual, inclusiv toleranța hematologică. La pacienții cu IR și/sau hepatică, dozele adm. trebuie să fie la cel mai scăzut nivel al regimului terapeutic.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la azathioprină. Gravide sau la femei care pot să rămână gravide într-un viitor apropiat.
A!: Este necesară monitorizarea hematologică pe parcursul trat. Pacienții trebuie să raporteze imediat orice infecție, echimoze sau sângerări neașteptate, sau alte manifestări de depresie medulară. Atenție la cei cu un deficit de tiopurinmetiltransferaza (TPMT). Toxicitatea azatioprinei poate fi crescută în prezența IR. La pacienții cu disfuncții hepatice hemoleucograma completă și testele de funcție a ficatului trebuie efectuate periodic și dozajul trebuie redus la minim. Nu este benefică la pacienții cu deficit de hipoxantin-guanin-fosforibosiltransferază (sindromul Lesch-Nyhan). Au fost întâlnite anomalii cromozomiale la pacienți de ambele sexe tratați cu azatioprină. Se recomandă precauții contraceptive adecvate la oricare din partenerii care primesc azatioprină. Riscul dezvoltării limfoamelor post-transplant este crescut la pacienții care primesc trat. agresiv cu imunosupresive. S-a raportat creșterea frecvenței cancerului de piele la pacienții cu transplant renal care poate fi asociată cu terapia imunosupresivă. Atenție în cazul asocierii cu: allopurinol, oxipurinol și/sau thiopurinol, blocanți neuromusculari, warfarină, agenți citostatici/ mielosupresivi, co-trimoxazol, captopril, cimetidină, indometacin, furosemid. Atenție la adm. în timpul sarcinii.
RA: Reacții de hipersensibilitate (manifestările clinice includ stare de rău, amețeli, vărsături, diaree, febră, rigiditate, exantem, rash, dureri musculare, artralgii, disfuncții renale și hipotensiune). Depresia funcției măduvei osoase exprimată prin leucopenie, câteodată și prin anemie și trombocitopenie. Susceptibilitate crescută la infecții virale, fungice și bacteriene, la nivelul tegumentului și al altor sisteme. Reacții gastrointestinale (greață, colită, diverticulită și perforații intestinale, diaree severă). Pancreatită. Colestază și deteriorarea funcției ficatului. A fost descrisă o afecțiune rară, hepatică, veno-ocluzivă, cu risc letal. Pneumonie reversibilă. Alopecie.

AZELASTINUM

COD ATC: S01GX07
R01AC03
R06AX19

ALLERGODIL SOLUȚIE® *ASTA MEDICA;* Sol. oft. 0,05 g azelastină hidroclorică/100 ml sol. ***(P-6L)***

ALLERGODIL NASEN SPRAY *ASTA MEDICA;* Aerosol 0,14 mg azelastină hidroclorică/doză ***(P-6L)***

ALLERGODIL TABS *ASTA MEDICA;* Cpr. film. 2 mg ***(P-6L)***

Ind: Conjunctivite alergice și rino-conjunctivite, rinite alergice sezoniere și permanente.
Dz: *Adm. oft.: Adulți și copii peste 4 ani:* o pic. de 2-4 ori/zi, în fiecare sac conjunctival inferior. *Adm. nazală:* în fiecare nară de două ori/zi câte un puf (0,14 mg). *Adm. int.* - numai *peste* vârsta de *6 ani* - 2 mg azelastină de 2 ori/zi (dimineața și seara). La pacienții *peste 65 de ani,* la cei cu IR sau IH se recomandă începerea trat. cu 2 mg o dată/zi.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului. La copii sub 6 ani.
A!: Nu se recomandă adm. de sol. oft. pt. trat. infecțiilor oculare și celor care poartă lentile de contact.
Atenție, în cazul adm. int. la asocierea cu produse cu acțiune sedativă, alcool, cimetidină. Se va adm. cu prudență în timpul sarcinii și alăptării. Atenție, când se adm. int. la șoferi sau la cei cu activități de precizie.
RA: *Adm. oft.:* Iritație oculară. Gust amar, greață. *Adm. nazal:* Iritarea mucoasei nazale, manifestată ca arsură, prurit, strănut, izolat epistaxis. *Adm. int.:* oboseală, somnolență, uscăciunea gurii, gust amar, rar creșterea valorilor enzimelor hepatice, izolat reacții de hipersensibilitate (de exemplu reacții cutanate).

AZITROMYCINUM *COD ATC: J01FA10*

AZITROMOCINĂ 250 mg; AZITROMICINĂ 500 mg *LEK PHARMATECH;* Cpr. film. 250 mg și 500 mg ***(P-RF)***

AZITROX 250; AZITROX 500 *ZENTIVA;* Cpr. film. 250 mg, 500 mg

SUMAMED *PLIVA;* Cps. 250 mg; Cpr. film. 125 mg sau 500 mg ***(P-RF)***

SUMAMED *PLIVA;* Pulb. susp. 100 mg/5 ml (fl. × 20 ml susp.) ***(P-RF)***

SUMAMED FORTE *PLIVA;* Pulb. susp. 200 mg/5 ml (fl. × 20 ml susp. sau fl. × 30 ml susp.) ***(P-RF)***

Ind: Infecții cu microorganisme sensibile la azitromicină: infecții ORL, infecții ale căilor respiratorii superioare și inferioare, infecții ale pielii și țesuturilor moi, infecții cu transmitere sexuală, infecții gastrice și duodenale provocate de *Helicobacter pylori.*
Dz: O singură dată pe zi, cu cel puțin 1 oră înainte sau cu 2 ore după masă. Infecții ale căilor respiratorii superioare și inferioare, ORL, ale pielii și țesuturilor moi (cu excepția eritemului cronic migrator) doza este de 500 mg, timp de 3 zile. În eritemul cronic migrator: 1 g în prima zi, apoi 500 mg în zilele 2-5. Doza totală este de 3 g. În infecții cu transmitere sexuală doza este de: 1 g în priză unică. În infecții gastrice și duodenale cu *Helicobacter pylori*: 1 g zilnic.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componente.
A!: Prudență în IH. Atenție în cazul asocierii cu: antiacide, alcaloizi ergotaminici, digoxină, ciclosporină, teofilină, terfenadină, warfarină, carbamazepină, metilprednisolon, cimetidină și cu medicamentele metabolizate prin sistemul

citocromului P 450 (astemizol, triazolam, midazolam și alfentanil). Atenție în cazul utilizării în timpul sarcinii și al alăptării. Atenție la șoferi și la cei cu activități de precizie.
RA: Reacțiile gastrointestinale (greață, vărsături, diaree, dureri epigastrice și flatulență). Creșteri reversibile ale valorilor serice ale transaminazelor hepatice și bilirubinemiei. Rar, edem angioneurotic și icter colestatic. Semne și simptome reversibile nervos-centrale (cefalee, vertij, parestezii, agitație, nervozitate). Episoade tranzitorii de neutropenie ușoară. Alte RA: artralgii, edeme, urticarie, aritmii, anorexie, constipație, astenie, nefrită interstițială, IRA, convulsii, tulburări ale auzului.

B

BACLOFENUM

COD ATC: M03BX01

BACLOFEN AWD 10, 25 *AWD Pharma GmbH & Co.KG;* Cpr. 10 mg, 25 mg baclofen ***(P-6L)***

LIORESAL® *NOVARTIS;* Cpr. 10 mg, 25 mg ***(P-6L)***

Ind: Spasticitatea mușchilor scheletici în scleroza multiplă, tulburări spastice care apar în boli ale măduvei spinării sau de origine cerebrală.
Dz: *Adulți,* inițial 5 mg de 3 ori/zi, apoi se mărește din 3 în 3 zile cu 5 mg de 3 ori/zi, până se atinge doza zilnică necesară. Doza optimă este între 30 mg și 75 mg/zi, uneori poate fi necesară o doză zilnică de 100-200 mg. În IR se adm. doze mai mici. În pediatrie, doza este de 0,75-2 mg/kg, fracționată în 4 prize.
Cind: Hipersensibilitate la baclofen.
A!: Bolnavii cu tulburări psihotice, schizofrenie, stări confuzionale, epilepsie trebuie supravegheați. Aceeași atenție se recomandă bolnavilor cu ulcer peptic, maladii cerebrovasculare, alterări renale, hepatice, respiratorii. Precauție la bolnavii cu hipertonie preexistentă a sfincterului vezical. Trat. trebuie oprit prin reducerea gradată a dozei. Pacienții cu boli hepatice sau cu diabet zaharat trebuie supravegheați prin teste de laborator. A nu se lăsa la îndemâna copiilor! Atenție în cazul asocierii cu: preparate care acționează asupra SNC sau alcool, antidepresive triciclice, antiHTA, L-dopa sau carbidopa. Prudență la femei însărcinate.
RA: SNC: somnolență, uscăciune a gurii, scăderea capacității respiratorii, oboseală, confuzie mintală, amețeală, greață, vomă, dureri de cap și insomnie, euforie, stări depresive, parestezii, mialgii, atonie musculară, ataxie, tremor, nistagmus, tulburări de acomodare, halucinații, coșmaruri, scăderea pragului de convulsie și crize convulsive. Gastrointestinal: constipație, diaree. Cardiovascular: hTA. Urogenital: disurie, micțiuni frecvente, enurezis. Alte RA: tulburări vizuale, hiperhidroză, erupții cutanate, tulburări ale funcției hepatice, spasticitate crescută, ca o reacție paradoxală la medicație; mai poate apărea hipotonia musculară.

BAMBUTEROLUM
COD ATC: R03CC12

BAMBEC *ASTRAZENECA;* Sol. orală 1 mg/ml (fl. × 100 ml); Cpr. 10 mg, 20 mg bambuterol ***(P-6L)***

Ind: Astm bronșic. Bronșită cronică, emfizem și alte afecțiuni pulmonare în care bronhospasmul constituie un factor agravant.
Dz: Oral, o dată pe zi, înainte de culcare. *Adulți:* inițial 10 mg, doza poate fi crescută la 20 mg. În IR se folosesc doze mai mici. *Copii 2-5 ani:* 10 mg. *Copii 6-12 ani:* 10-20 mg.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre ingrediente sau la terbutalină.
A!: Atenție în cazul pacienților cu IR, IH, tireotoxicoză, tulburări cardiovasculare severe, astm acut sever, la pacienții diabetici. Poate induce hipokaliemie severă, potențată de trat. concomitent cu derivați xantinici, preparate steroidiene și diuretice; se recomandă monitorizarea nivelului seric de potasiu. Atenție în cazul asocierii cu: suxametoniu, blocante ale receptorilor beta. Atenție în primul trimestru de sarcină.
RA: Tremor, cefalee, crampe musculo-tonice, palpitații, urticarie și exantem, tulburări de somn și comportamentale (agitație, hiperreactivitate, stare de neliniște).

BARII SULFAS
COD ATC: V08BA02

GASTROPAC *HIPOCRATE 2000;* Pulb. susp. pro Röntgen; pungi din ABCBA × 90 g pulb. ***(S/P-RF)***

SULFAT DE BARIU PRO RÖNTGEN *MEDUMAN SA;* Pulb. susp.; pungă × 1 kg; 5 kg; 95 g; 135 g ***(S/P-RF)***

SULFAT DE BARIU PRO RÖNTGEN *DIOMSANA;* Pulb. susp. (fl. × 90 g) ***(S/P-RF)***

Ind: Examenul radiologic al tractului gastrointestinal.
Dz: Susp. poate fi adm. oral sau rectal. 200-250 ml suspensie de sulfat de bariu este suficientă pentru examinarea stomacului; pentru examinarea intestinului subțire – 500 ml suspensie; pentru examinarea colonului (clismă) – 600-1500 ml. La copii posologia se va stabili în funcție de vârstă, greutate corporală și diagnosticul urmărit.
Cind: În cazul suspiciunii de perforații sau obstrucții la nivelul tractului gastrointestinal. Hipersensibilitate cunoscută la sulfat de bariu.
A!: Investigațiile radiologice pot dăuna fătului în faza organogenezei.

BASILIXIMABUM
COD ATC: L04AA09

SIMULECT *NOVARTIS;* Pulb. pt. sol. perf. 20 mg basiliximab ***(S)***

Ind: Profilaxia rejecției acute de organ în transplantul renal alogen de novo; se administrează concomitent cu ciclosporină microemulsionată și corticosteroizi, ca tratament imunosupresor la pacienții cu mai puțin de 80% anticorpi reactivi.

Dz: Basiliximabul trebuie prescris doar de medici cu experiență în terapia imunosupresoare după transplant de organe. El trebuie administrat numai sub supraveghere medicală calificată. Doza totală standard este de 40 mg, administrată în două prize a 20 mg fiecare. Prima priză se adm. cu 2 ore înaintea intervenției chirurgicale pentru transplant. Următoarea se adm. la 4 zile după transplant. Nu se administrează a doua priză dacă apar complicații postoperatorii cum ar fi respingerea grefei.

Mod de adm.: Sol. de basiliximab trebuie adm. sub formă de perfuzie i.v. într-un interval de 20-30 minute. *Copii:* Siguranța și eficacitatea folosirii basiliximabului la copii nu au fost stabilite. Datele farmacocinetice disponibile sunt foarte limitate. *Vârstnici:* Datele privind administrarea basiliximabului la bătrâni sunt limitate; dar nu există date că persoanele vârstnice necesită alt dozaj decât pacienții adulți.

Cind: Pacienți cu hipersensibilitate cunoscută la compus sau oricare alt component al produsului. În timpul sarcinii și alăptării.

A!: Experiența în folosirea basiliximabului împreună cu alți agenți imunosupresori decât ciclosporina microemulsionată și corticoizi este limitată. Nu s-au efectuat studii folosind azatioprina sau micofenolat mofetil ca parte a triplei medicații imunosupresoare. Medicația pentru tratamentul reacțiilor alergice severe, care pot să apară după administrarea de proteine trebuie să fie disponibilă pentru uz imediat. În general, pacienții sub terapie imunosupresoare după transplant prezintă un risc crescut de apariție a proceselor limfoproliferative și infecțiilor oportuniste. Nu au fost observate creșteri ale incidenței proceselor limfoproliferative sau ale infecțiilor oportuniste la pacienții tratați cu basiliximab.

RA: Constipație, infecții ale tractului urinar, durere, greață, edeme periferice, hipertensiune arterială, anemie, cefalee și hiperkaliemie.

BECLOMETASONUM

COD ATC: R03BA01
R01AD01

ALDECIN INHALER *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Aerosol, 1 puf furnizează 50 µg beclometazonă dipropionat; fl. × 200 doze ***(P-6L)***

BECLOCORT FORTE *GLAXO SMITHKLINE;* Aerosol 250 µg/ doză (fl. × 10 ml) ***(P-6L)***

BECLOCORT MITE *GLAXO SMITHKLINE;* Aerosol 50 µg/ doză (fl. × 10 ml) ***(P-6L)***

BECLOFORTE INHALER *GLAXO SMITHKLINE;* Aerosol 250 µg/doză ***(P-6L)***

BECLOMET EASYHALER *ORION;* Pulb. inhal. 50 µg/doză ***(P-RF)***

BECONASE NASAL SPRAY *GLAXO SMITHKLINE;* Aerosol nazal, 1 puf conține 50 µg (fl. × 30 ml susp. × 200 doze) ***(P-RF)***

BECOTIDE 50 INHALER *GLAXO SMITHKLINE;* Aerosoli, 1 puf conține 50 µg (fl. × 200 doze) ***(P-6L)***

ECOBEC 100 µg CFC FREE *IVAX PHARMACEUTICALS;* Aerosol 100 µg ***(P-6L)***

ECOBEC 250 µg CFC FREE *IVAX PHARMACEUTICALS;* Aerosol 250 µg ***(P-6L)***

ECOBEC EASI-BREATHE 100 µg CFC FREE *IVAX-PHARMA C.S.R.O.;* Aerosol sol. inhal. 100 µg/doză ***(P-6L)***

ECOBEC EASI-BREATHE 250 µg CFC FREE *IVAX-PHARMA C.S.R.O.;* Aerosol sol. inhal. 250 µg/doză ***(P-6L)***

Ind: *Adm. inhal.:* pacienți astmatici care necesită terapie de întreținere de lungă durată; pacienți cu astm bronțic sever, care sunt dependenți de corticosteroizi activi sistemic sau de ACTH. Când este necesară utilizarea corticosteroizilor activi sistemic în trat. bronșitei cronice obstructive.
Adm. nazală: În situații ce necesită un potent efect antiinflamator la nivelul tractului respirator.
Dz: *Adm. inhal.: Adulți:* Două inhalații (fiecare 50 µg), de 3-4 ori pe zi. În cazurile severe dozele pot fi dublate (600-800 µg/zi). Când apare ameliorarea, dozele trebuie ajustate în funcție de răspuns. *Copii de 6-12 ani:* Una sau două inhalații (50 sau 100 µg), 2-4 ori pe zi. Doza zilnică maximă: 20 de inhalații (1 mg) la adulți și 10 inhalații (0,5 mg) la copiii între 6-12 ani.
Adm. nazală: Adulți și *copii peste 6 ani:* Două pulverizări în fiecare nară, de două ori pe zi. Doza totală maximă 8 pulverizări (400 mg).
Cind: Trat. primar al stării astmatice; episoade acute de astm unde sunt necesare măsuri de terapie intensivă; la pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la oricare din ingredientele preparatului.
A!: *Adm. inhal.:* Atenție în cazul pacienților corticodependenți și ACTH - dependenți. În timpul perioadelor de stres sau a atacurilor severe de astm, pacienții transferați pe beclometazonă pot necesita cure scurte de corticosteroizi activi sistemic. Este necesară testarea periodică a funcției CSR. Poate fi utilizată concomitent cu spray-ul nazal conținând beclometazonă dipropionat, într-o doză totală combinată de până la 1000 mg la adulți și 500 mg la copii. *Adm. nazală:* Infecțiile pasajului nazal și a sinusurilor paranazale trebuie tratate corespunzător. Atenție în cazul unei funcții adrenale afectate.
Atenție în cazul utilizării la femeile fertile, la cele însărcinate și la mamele care alăptează.
RA: *Adm. inhal.:* La pacienți astmatici transferați de pe corticoterapie sistemică pe aerosoli cu beclometazonă dipropionat, au fost semnalate decese datorate insuficienței CSR. Reducerea nivelului cortizolului plasmatic. Simptome ale hipercorticismului. Răgușeala și uscăciunea mucoasei bucale. Reacții de hipersensibilizare imediată și întârziată, incluzând bronhospasm, urticarie, angioedem precum și infecții cu Candida albicans sau Aspergillus niger, localizate la nivelul cavității bucale, faringelui, laringelui, bronhiilor și esofagului. Rare cazuri de glaucom. *Adm. nazală:* Perforație a septului nazal. Crize de strănut. Uscăciunea și iritația nasului și gâtului, gust și miros neplăcute, epistaxis. Rar, creșterea presiunii intraoculare. Reacții de hipersensibilitate: erupții cutanate, urticarie, prurit, eritem și edem al ochilor, feței, buzelor și gâtului.

BENAZEPRILUM

COD ATC: C09AA07

CIBACEN® 5 mg *NOVARTIS;* Cpr. 5 mg benazepril ***(P-6L)***

Ind: HTA; IC (clasa II-IV NYHA).
Dz: *HTA:* 10 mg/ zi; se poate crește după 1,2 săpt. de trat. la 20 mg/zi; doza max. 40 mg/zi; în IR scad doza. *IC congestivă:* 2,5 mg/zi (se poate crește la 10-20 mg/zi, adm. în 1-2 doze).

Cind: Obezitate, edem Quincke, hipersensibilitate le produs.
AI: Manifest. anafilactice, IR, hiperkaliemie, stenoză aortică sau mitrală; vârstnici și copii.
RA: hTA, dureri toracice, angină, aritmii; tulburări gastro-intestinale nespecifice, erupții cutanate, prurit, fotosensibilizare, poliakiurie, tuse.

BENCYCLANUM *COD ATC: C04AX11*

HALIDOR® *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Sol. inj. 25 mg/ml (f. × 2 ml) ***(P-RF)***

Ind.: Afecțiuni vasculare, obliterație arterială periferică, cefalalgie, migrenă, angiopatie cerebrală.
Dz: În urgențe se adm. inj. i.v., i.a. sau i.m. 250-500 mg.
AI: Precauție în tendințe la colaps, tulburări circulatorii și respiratorii.
RA: Locale: reacții inflamatorii și infiltrative ale peretelui venos; uneori amețeli, grețuri, tulburări digestive.

BENZALKONII CHLORIDUM *COD ATC: G02BBN2*

PHARMATEX® 1,2% *LAB. INNOTHERA;* Cremă vag. 1,2% clorură de benzalconiu; tub × 72 g cremă vag. + applicator ***(OTC)***

PHARMATEX® 18,9 mg *LAB. INNOTHERA;* Ovule 20 mg clorură de benzalconiu ***(OTC)***

Ind: Anticoncepțional local cu acțiune spermicidă.

BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM *COD ATC: J01C08E*

MOLDAMIN® *ANTIBIOTICE IAȘI;* Pulb. pt. susp. inj. benzatin benzilpenicilină 600 000 UI/fl.; 1 200 000 UI/fl.; 2 400 000 UI/fl ***(S/P-RF)***

RETARPEN 1,2; RETARPEN 2,4 *SANDOZ GmbH;* Pulb. pt. susp. inj. benzatin benzipenicilină 1 200 000 UI; 2 400 000 UI ***(S/P-RF)***

Ind.: În infecții cu germeni sensibili la benzilpenicilină, localizate: respirator, în sfera ORL și stomatologică, cutanat, uro-genital, digestiv; în profilaxia infecției streptococice la bolnavii cu reumatism poliarticular acut și în infecția sifilitică.
Dz: *Adulți:* I.m.: în faringita streptococică și în scarlatină: 1 200 000 UI într-o singură inj./zi, profilaxia infecției streptococice la bolnavii cu reumatism articular acut: 1 200 000 UI o dată pe săpt. timp îndelungat, în infecția sifilitică: 2 400 000 UI la intervale de 4-5 zile; 2 doze pentru profilaxie (la contacți) și în sifilisul primar seronegativ; 3 doze în sifilisul primar seropozitiv; 5 doze în sifilisul secundar recent și în sifilisul tardiv fără afectare neurologică sau cardiovasculară. *Copii:* dozele uzuale sunt de 600 000-1 200 000 UI.
Cind: Hipersensibilitate la benzilpenicilină.

A!: Inj. i.v. poate produce accidente embolice sau reacții toxice; inj. intraarterială poate produce necroză extinsă. Prudență la pacienții cu tendință la retenție hidrosalină. Atenție în cazul asocierii cu: metotrexat, probenecid. Poate modifica rezultatele dozării glucozei prin metode care folosesc substanțe reducătoare. Atenție în cazul utilizării în sarcină sau în perioada de alăptare.
RA: Manifestări alergice: urticarie, febră, eozinofilie, edem Quincke, excepțional șoc anafilactic. Tulburări digestive: greață, vărsături, diaree. Creșterea nivelului transaminazelor serice și tulburări hematologice reversibile (anemie, trombocitopenie, leucopenie). La pacienții cu IR poate determina tulburări nervos centrale (tulburări ale stării de conștiență, mișcări anormale, crize convulsive).

BENZYDAMINUM*

COD ATC: M02AA05

TANTUM CREMĂ FORTE 5% *CSC PHARMACEUTICALS GmbH;* Cremă cu 5% benzidamină; tub × 50 g ***(OTC)***

TANTUM GEL 5% *CSC PHARMACEUTICALS GmbH;* Gel 5%; tub × 50 g ***(OTC)***

TANTUM ROSA *CSC PHARMACEUTICALS GmbH;* Pulb. pt. sol. ext. 500 mg benzidamină/plic; ct. × 10 plicuri ***(OTC)***

TANTUM VERDE 0,15% *CSC PHARMACEUTICALS GmbH;* Sol. ext. 0,15% (fl. × 120 ml) ***(OTC)***

TANTUM VERDE 0,5% *CSC PHARMACEUTICALS GmbH;* Pastă de dinți 0,5%; tub × 10 g; 30 g; 60 g ***(OTC)***

TANTUM VERDE P *CSC PHARMACEUTICALS GmbH;* Cpr. de supt 3 mg ***(OTC)***

Ind: Adjuvant în trat. gingivitei, stomatitei, glositei, parodontopatiilor și după extracții dentare. Inflamații oro-faringiene: faringită, amigdalită, gingivită, stomatită, parodontopatii, leziuni ale mucoasei bucale de diferite etiologii (proteze, iradieri, manevre stomatologice).
Dz: *Pastă:* Se periază dinții și gingiile 2-3 ori pe zi. *Cpr.:* Un cpr. de 3-4 ori/zi; cpr. se păstrează cât mai mult timp în cavitatea bucală pentru o dizolvare lentă.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului.
A!: Pasta de dinți nu trebuie utilizată timp îndelungat. Atenție în cazul utilizării în timpul sarcinii. Se recomandă întreruperea alăptării. În cazul înghițirii unei cantități mari de pastă de dinți medicinală pot să apară halucinații vizuale, care pot afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
RA: Senzație de amorțeală în cavitatea bucală și faringe. Senzații ușoare de arsură la nivelul cavității bucale, greață sau vărsături. În cazul înghițirii în cantități mari, pot să apară: tulburări de somn, agitație, halucinații vizuale, urticarie, exantem, fotosensibilizare.

BENZYLPENICILLINUM

COD ATC: J01CE01

PENICILINĂ G POTASICĂ *ANTIBIOTICE IAȘI;* Pulb. pt. sol. inj. 400 000 UI, 1 000 000 UI, 5 000 000 UI/fl benzilpenicilină potasică ***(S/P-RF)***

PENICILINĂ G SODICĂ *ANTIBIOTICE IAȘI;* Pulb. pt. sol. inj., 1 fl. conține 400 000 UI, 1 000 000 UI, 5 000 000 UI benzilpenicilină sodică ***(S/P-RF)***

Ind: Infecții cu germeni sensibili: pneumonie, meningită cu pneumococ, endocardită cu streptococ viridans, meningococemie, meningită cu meningococ, infecții severe cu anaerobi, sifilis, actinomicoză, antrax, gangrenă gazoasă, tetanos, infecții cu Listeria, sterilizarea purtătorilor de bacili difterici; profilactic, la bolnavii cu valvulopatii care suferă intervenții dentare și cu ocazia intervențiilor pe intestin sau tractul genito-urinar.
Dz: Inj. i.m., i.v. sau perf. i.v., obișnuit 1 200 000-6 000 000 u./zi la adulți și 400 000-1 200 000 u./zi la copii, fracționat, la 4-8 ore interval; în infecțiile grave, inj. sau perf. i.v. cu 10-50 milioane u.i./zi.
Cind: Alergie la penicilină.
AI: Folosirea în aplicații locale trebuie evitată. Prudență în IC, IR. Poate interfera cu determinarea urobilinogenului și a glucozei urinare.
RA: Reacții alergice: urticarie, edem angioneurotic, febră, inflamații articulare, dermatită exfoliativă, șoc anafilactic. Suprainfecții cu Proteus, Pseudomonas, Candida; convulsii, anemie hemolitică, leucopenie, trombocitopenie, nefropatii; reacție Herxheimer, durere la locul inj. i.m.

BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM ✓ *COD ATC: J01CE09*

EFITARD *ANTIBIOTICE IAȘI;* Pulb. pt. susp. inj. 600 000 UI procain benzilpenicilină + 200 000 UI benzilpenicilină potasică ***(S/P-RF)***

EFITARD *ANTIBIOTICE IAȘI;* pulb. pt. susp. inj. 300 000 UI procain benzilpenicilină + 100 000 UI benzilpenicilină potasică ***(S/P-RF)***

EFITARD® *ANTIBIOTICE IAȘI;* Pulb. pt. susp. inj. 4 000 000 UI și 800 000 UI **(S/P-RF)**

FORTIFIED PROCAINE PENICILLIN *ANTIBIOTICE IAȘI;* Pulb. pt. susp. inj. 3 000 000 UI, 4 000 000 UI ***(S/P-RF)***

Ind: Indicată în forme ușoare sau de gravitate medie ale infecțiilor sistemice sau localizate, generate de germeni sensibili la Penicilină G, în care sunt suficiente titrurile ce se obțin prin injectarea preparatului: unele infecții bronhopulmonare, scarlatină, angine, celulite, erizipel, infecții după intervenții ca amigdalectomia, extracția dentară ș.a.
Dz: Strict i.m., cât mai profund (se controlează, aspirând cu seringa, dacă acul nu a pătruns într-un vas sanguin). Posologia este în funcție de boală și de bolnav și de asemenea intervalele. Dozele uzuale sunt: *Adulți:* 400 000-800 000 UI la 12-14 ore. *Copii peste 2 1/2 ani:* 200 000-400 000 UI la 12-14 ore. În tratamentul sifilisului se recomandă administrarea unei doze totale de 6 000 000-12 000 000 UI în decurs de 10-15 zile.
Cind: Persoane sensibilizate la penicilină sau la procaină; în formele grave ale infecțiilor cu germeni sensibili (în care este necesară o penicilinemie de start ridicată, ce nu se poate obține cu procainbenzilpenicilină, ci numai cu

o penicilină „acută"); în infecții cu germeni rezistenți la Penicilină G sau cu o sensibilitate moderată la aceasta. Nu se recomandă administrarea preparatului la copii sub 2 1/2 ani.
A!: Efectuarea antibiogramei înainte de instituirea tratamentului cu procainbenzilpenicilină, iar în infecțiile determinate de stafilococ, testarea repetată a sensibilității acestuia (rezistența se poate instala foarte rapid).
RA: Cele mai importante sunt de tip alergic (erupții cutanate, fenomene asemănătoare celor din boala serului, mai rar șoc anafilactic, modificări sanguine – anemie, leucopenie, eozinofilie peste 25%, trombocitopenie).

BETAHISTINUM

COD ATC: N07CA01

AVERTIN® 6 mg *SICOMED SA;* Cpr. 6 mg betahistin ***(P-6L)***

BETASERC® 8 mg; BETASERC® 16 mg; BETASERC® 24 mg; *SOLVAY PHARMACEUTICALS;* Cpr. 8 mg, 16 mg și 24 mg diclorhidrat de betahistină ***(P-6L)***

BETASTIN *PHARMACARE;* Cpr. 8 mg ***(P-6L)***

MICROSER *CSC PHARMACEUTICALS/FORMENTI;* Cpr. 8 mg clorhidrat de betahistin; sol. uz int. 1,25 g/100 ml (fl. × 30 ml) ***(P-6L)***

Ind.: Deficit microcirculator la nivelul labirintului, sindroamele vertiginoase, sindrom Ménière, insuficiență circulatorie vertebro-bazilară. Profilactic sau curativ în trat. tinitusului sau pierderii auzului din sindromul Ménière.
Dz: Oral, 8-16 mg de 2-3 ori pe zi, preferabil în timpul meselor.
Cind: Hipersensibilitate. Ulcer gastric. Feocromocitom. Copii. Perioadă de alăptare.
A!: La pacienții cu antecedente de ulcer peptic, la pacienții cu astm bronșic. Nu se asociază cu antihistaminice. Prudență la femeile gravide.
RA: Greață, cefalee și manifestări de idiosincrazie.

BETAMETHASONUM

COD ATC: H02AB01
D07AC01

BETACORTEN SCALP APPLICAT *TRIMA;* Loțiune 0,1% betametazonă (fl. × 30 ml) ***(P-RF)***

BETADERM *E.I.P.I.C.O.;* Unguent 100 mg/100 g valerat de betametazonă (tub × 20 g); cremă 100 mg/100 g (tub × 20 g) ***(P-RF)***

CELESTONE *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Sol. inj. 4 mg/ml betametazonă (f. × 4 ml) ***(P-RF)***

DIPROPHOS *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Susp. inj. 7 mg/ ml (f. × 1 ml) ***(P-RF)***

FLOSTERON *KRKA d.d.;* Sol. inj. 7 mg beclometazonă fosfat disodică/ml (f. × 1 ml) ***(P-RF)***

HELPODERM *HELP PHARMA. Ltd.;* Cremă 0,05% betametazonă (tub × 15 g) ***(P-RF)***

OPHTAMESONE *DAR AL DAWA;* Sol. oft. 0,1% betamezonă fostat disodică (fl. × 10 ml) ***(P-RF)***

Ind: *Sol. inj.:* trat. bolilor endocrine, șoc hemodinamic, șoc endotoxic, edem cerebral, episoade de rejet în transplantul renal, antepartum în prevenirea sindromului detresei respiratorii la prematuri, afecțiuni musculo-scheletice, boli de colagen, afecțiuni dermatologice, stări alergice, afecțiuni oftalmologice, afecțiuni respiratorii, tulburări hematologice, afecțiuni gastrointestinale, neoplazii, stări edematoase, alte afecțiuni. *Adm. percutan:* trat. diferitelor tipuri de eczeme inclusiv: eczema atopică, eczema infantilă; eczema Besnier și eczema de stază; neurodermatoze incluzând lichen plan; dermatite seboreice; sensibilizare și alergie de contact; psoriasis; înțepături ale insectelor.
Dz: Adm. inj. i.v., i.m., intraarticulară, intralezională sau în țesuturile moi. Doza inițială sol. inj. la adulți poate varia până la 8,0 mg pe zi depinzând de specificul afecțiunii tratate. Doza inițială, uzuală adm. i.m., la *copii:* 0,02-0,125 mg/kg/zi. După obținerea răspunsului terapeutic dozele se scad treptat pînă la doza minimă posibilă. Adm. topică: O cantitate mică se va aplica pe zona bolnavă 1-2 ori pe zi până se va produce ameliorarea. După aceasta este necesară o singură aplicare zilnică sau chiar mai rar.
Cind: Pacienții cu infecții fungice sau bacteriene. Acneea Rosacee, Acneea Vulgaris și dermatite periorale; infecții virale cutanate; hipersensibilitate la preparat. În caz de prurit perianal și genital și în dermatoze cu suprafață mai mare de 15 cm la copii sub 1 an.
A!: Pt. adm. inj.: Precauție la pacienții cu purpură trombocitopenică idiopatică. A se evita inj. într-o articulație anterior infectată. Nu trebuie inj. în articulații instabile, zone infectate sau spații intervertebrale. Evitați inj. direct în masa tendinoasă. Precauție la pacienții cu istoric de alergie. Poate masca unele semne de infecție. Intensifică eliminarea de potasiu. În timpul trat. pacienții nu trebuie vaccinați împotriva variolei. În tbc active corticoterapia trebuie limitată numai la cazurile de tbc fulminantă sau diseminată. Trebuie folosită cea mai mică doză posibilă; când este posibilă reducerea dozei, aceasta se va face treptat. Efectul este amplificat la pacienții cu hipotiroidism și la cei cu ciroză hepatică. Precauție la pacienții cu herpes simplex ocular. În timpul terapiei pot apărea probleme psihice. Precauție în: colitele ulcerative nespecifice, abces sau alte infecții piogenice; diverticulite; anastomoze intestinale noi; ulcer peptic activ sau latent; IR; HTA; osteoporoză; miastenia gravis. Atenție în cazul folosirii la copii și sugari. Adm. topică excesivă poate determina efecte sistemice. Atenție în cazul asocierii cu: fenobarbital, rifampicină, fenitoină, efedrină, estrogeni, diuretice care elimină potasiul, glicozizi cardiotonici, amfotericină B, anticoagulante cumarinice, AINS, alcool, antidiabetice. Corticosteroizii pot afecta testul „nitroblue tetrazolium" pentru infecția bacteriană și produc rezultate fals negative. Folosirea în timpul sarcinii și în perioada de alăptare necesită precauție.
RA: Tulburări hidroelectrolitice: retenție de sodiu, pierderi de potasiu, alcaloza hipokaliemică; retenție de lichide; IC congestivă; HTA. Musculoscheletale: slăbiciune musculară, miopatie corticosteroidică, scăderea masei musculare; agravarea simptomelor miastenice în miastenia gravis; osteoporoze; fracturi verte-

brale; necroze aseptice ale capului femural și humeral; fracturi patologice ale oaselor lungi; ruptură de tendon; instabilitate articulară. Gastrointestinale: ulcer peptic cu posibile perforații și hemoragii ulterioare; pancreatită; distensie abdominală; esofagită ulcerativă. Dermatologice: întârzierea vindecării plăgilor; atrofia pielii; subțierea pielii; peteșii și echimoze; eritem facial; hipersudorație; scăderea reactivității la testele cutanate; reacții precum dermatitele alergice, urticaria, edemul angioneurotic. Neurologice: convulsii; creșterea presiunii intracraniene; vertij; cefalee. Endocrine: tulburări menstruale; status cushingoid; întârzierea creșterii; supresie secundară suprarenaliană și hipofizară; scăderea toleranței la carbohidrați, diabet zaharat latent. Oftalmice: cataracte posterioare subcapsulare; creșterea presiunii intraoculare, glaucom; exoftalmie. Metabolice: balanță azotată negativă. Psihiatrice; euforie, schimbări de dispoziție; depresii severe până la manifestări psihotice; schimbări de personalitate; insomnie. Altele: reacții anafilactice sau de hipersensibilitate; reacții hipotensive sau de tip șoc; orbire în cazul adm. intralezionale în regiunea facială sau cervicală, hiperpigmentare sau hipopigmentare, atrofie cutanată sau subcutanată, abces steril, roșeață postinjecțională; artropatie de tip Charcot.

BETAXOLOLUM

COD ATC: S01ED02
C07AB05

BETAXOLOL *PHARMAPLANT BIOGALENICA;* Sol. oft. 0,5% betaxol (fl. × 10 g) ***(P-6L)***

BETOPTIC *ALCON SRL;* Sol. oft. 0,5% (fl. × 5 ml) ***(P-RF)***

BETOPTIC-S *ALCON SRL;* Susp. oft. 0,25% (fl. × 5 ml) ***(P-RF)***

LOKREN® *SANOFI ~ SYNTHELABO;* Cpr. film. 20 mg clorhidrat de betaxolol ***(P-6L)***

OPTIPRES *CIPLA;* Sol. oft. 0,5% (fl. × 5 ml) ***(P-RF)***

Ind: *Adm. int.:* HTA. Profilaxia crizelor de angină pectorală de efort. *Adm. local conjunctival:* Glaucom cronic cu unghi deschis și al hipertensiunii intraoculare.
Dz: Adm. int.: 10-40 mg o dată pe zi. În IR dozele trebuie adaptate. Adm. local conj.: o picătură betaxolol 5 mg/ml instilată în ochiul afectat, de două ori pe zi. Presiunea intraoculară va fi determinată periodic.
Cind: În cazul adm. int.: hipersensibilitate la componentele produsului; forme severe de astm bronșic și BPOC; IC; șoc cardiogen; BAV gradul II și III, la pacienții fără un pacemaker implantat; angină Prinzmetal; boală sinusală; bradicardie; forme severe de sindrom Raynaud și boli arteriale periferice; feocromocitom netratat; hTA; reacții anafilactice în antecedente. În cazul adm. locale: Hipersensibilitate la oricare din componentele produsului. Bradicardie sinusală severă, BAV gradul II-III, șoc cardiogen, IC manifestă. Este CI asocierea cu: floctafenină și cu sultopridă.
A!: În cazul adm. int.: Trat. nu trebuie niciodată întrerupt brusc. Atenție în cazul pacienților cu: astm bronșic și BPOC, IC, bradicardie, BAV gradul I, angină Prinzmetal, afecțiuni arteriale periferice, feocromocitom; la vârstnici, în IR, la pacienți cu diabet zaharat, la cei cu psoriazis, la pacienții predispuși să dezvolte o reacție anafilactică severă, în caz de anestezie generală. În cazul adm. oft.: Poate interfera cu testele diagnostice pentru glaucom. Poate

masca semnele CV ale tireotoxicozei. Prudență la pacienții cu glaucom cu unghi închis. Atenție, în cazul adm. sistemice, la asocierea cu: digitalice, anestezice inhalatorii halogenate, blocante ale canalelor de calciu, antiaritmice, baclofen, insulină și antidiabetice orale, lidocaină, substanțele de contrast care conțin iod, AINS, antidepresive triciclice, glucocorticoizi și tetracosactid, meflochină, simpatomimetice. În cazul adm. locale, atenție în cazul asocierii cu: epinefrină, rezerpină, medicamente psihotrope. Se recomandă supravegherea atentă a nou-născutului în primele 3-5 zile de viață, într-o unitate specializată. Alăptarea nu este recomandată pe durata trat. Atenție în cazul utilizării la șoferi sau la cei cu activități de precizie.
RA: În cazul adm. int.: astenie, extremități reci, bradicardie, tulburări gastrointestinale, impotență, amețeli și cefalee, insomnie, încetinirea conducerii atrioventriculare sau accentuarea unui BAV, IC, hTA, bronhospasm, hipoglicemie, sindrom Raynaud, agravarea claudicației intermitente, diferite reacții cutanate, inclusiv erupții psoriaziforme sau exacerbarea psoriazisului, depresie. Apariția anticorpilor antinucleari; însoțiți excepțional de LES. În cazul adm. locale: disconfort ocular, lăcrimare, scăderea sensibilității corneene, eritem, prurit, pigmentare punctiformă a corneei, keratită, anizocorie și fotofobie.

BEZAFIBRATUM

COD ATC: C10AB02

BEZALIP RETARD *HOFFMANN LA ROCHE;* Cpr. ret. 400 mg bezafibrat ***(P-6L)***

REGADRIN-B *BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP;* Dj. 200 mg bezafibrat ***(P-6L)***

VERBITAL *FARAN LAB.;* Cpr. film. 200 mg bezafibrat ***(P-6L)***

Ind: Tulburări de metabolism lipidic care nu pot fi corectate suficient prin dietă; tulburări ale metabolismului lipidic care însoțesc maladii de bază ca diabetul zaharat, guta și altele.
Dz: Oral, 200 mg de 2-3 ori/zi.
Cind: Boli hepatice, ale vezicii biliare, tulburări severe ale funcției renale, sarcină și alăptare.
A!: Precauții în tulburări ușoare ale funcției renale; în perioada de creștere. Atenție în cazul asocierii cu: hipoglicemiante, anticoagulante, IMAO, colestiramina.
RA: Tulburări gastro-intestinale (anorexie, greață, meteorism și diaree), cefalee, amețeli, slăbiciune, oboseală, reacții alergice cutanate (prurit, exantem), tulburări de potență, căderea părului, slăbiciune musculară și contractură, scăderi ale numărului de eritrocite, leucocite și trombocite, modificarea parametrilor de laborator, indicatori ai funcției hepatice și renale. Rar apare rabdomioliza. Formarea de calculi biliari.

BICALUTAMIDUM

COD ATC: L02BB03

CASODEX *ASTRAZENECA;* Cpr. film. 50 mg bicalutamidă ***(P-6L)***

Ind: Trat. carcinomului de prostată în stadiu avansat.
Dz: *Adulți:* 50 mg o dată pe zi. Trat. trebuie început în același timp cu trat.

cu un analog LH-RH sau cu castrarea chirurgicală.
Cind: Femei și copii. Gravide sau mame care alăptează. Hipersensibilitate la componentele produsului.
A!: La subiecții cu afectarea severă a funcției hepatice. Atenție în cazul asocierii cu anticoagulante cumarinice.
RA: Valuri de căldură, prurit, mastodinie și ginecomastie. Diaree, grețuri, astenie, tegumente uscate. Modificări ale funcției hepatice. Au mai fost raportate: IC, anorexie, uscăciunea mucosei bucale, dispepsie, constipație, flatulență, amețeli, insomnie, somnolență, scăderea libidoului, dispnee, impotență, nicturie, anemie, alopecie, rash, transpirații, hirsutism, diabet zaharat, hiperglicemie, edem, creștere sau scădere în greutate, dureri abdominale, dureri toracice, cefalee, dureri pelvine, frisoane.

BIFONAZOLUM *COD ATC: DO1AC10*

BIAZOL 1% *ARMEDICA-CHEMO IBERICA;* Cremă, 1%; tub × 35 g, 15 g ***(P-RF)***

MYCOSPOR® *BAYER AG;* Șampon gel, 1% (fl. × 100 g) ***(OTC)***; Cremă 1% (tub × 20 g) ***(P-RF)***; Sol. ext. 1% (fl. × 20 ml) ***(P-RF)***

MYCO-FLUSEMIDON *ANFARM HELLAS;* Cremă, 1%; tub × 15 g ***(P-RF)***

Ind: Trat. dermatitei seboreice a scalpului; micozelor cutanate produse de dermatofiți, levuri, îndepărtarea atraumatică a unghiei pentru trat. onicomicozelor.
Dz: Trat. dermatitei seboreice a scalpului: aplicații locale, câte 2 aplicații, de 3 ori/săpt. Trat. micozelor cutanate: aplicații locale, o dată pe zi, timp de 2-4 săpt.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului.
A!: A se evita contactul cu ochii. Atenție în timpul sarcinii.
RA: Reacții alergice, dermatită de contact, prurit, rash veziculobulos.

BIPERIDENUM *COD ATC: N04AA02*

AKINETON *ABBOTT GmbH & Co.;* Cpr. 2 mg biperidină ***(P-6L)***

Ind: Trat. simptomelor extrapiramidale provocate de neuroleptice și medicamente cu acțiune similară, cât și a tulburărilor similare parkinsonului; alte tulburări de motilitate extrapiramidale, generalizate sau localizate, sindromul Meige, blefarospasm sau torticolis spasmodicus, intoxicații cu nicotină sau cu derivați organofosforici.
Dz: *Adm. oral.: adulți:* 1-2 mg de 1-4 ori/zi. Doza max. 16 mg/zi. *Copii* în vârstă de *3-15 ani:* 1-2 mg de 1-3 ori/zi. La *vârstnici* dozele trebuie evaluate atent.
Cind: Glaucom cu unghi închis, stenoze mecanice ale tractului digestiv, megacolon.
A!: Atenție în cazul adenomului de prostată și al bolilor cardiace însoțite de

tahicardie. Atenție în cazul adm. concomitente cu: alte medicamente psihotrope, anticolinergice, antihistaminice, antiparkinsoniene, spasmolitice, chinidină, levodopa, neuroleptice, metoclopramid, alcool. Precauție în timpul sarcinii, în special în primele 3 luni. Se recomandă întreruperea lactației în timpul trat. Atenție în cazul șoferilor și a celor care desfășoară activități de precizie.
RA: Oboseală, amețeli, uscăciunea gurii, neliniște, vertij, delir, iritare, slăbire a memoriei, halucinații, tulburări de acomodare vizuală, hipohidroză, constipație, simptome gastrice, creșterea frecvenței cardiace și, foarte rar, scăderea acesteia.

BISACODYLUM

COD ATC: A06AB02

BICOLAX *EUROPHARM SA;* Supoz. 10 mg ***(OTC)***

BISACODIL *PROMEDIC SRL;* Dj. gastrorez. 5 mg bisacodil ***(OTC)***

DULCOLAX *BOEHRINGER INGELHEIM;* Dj. 5 mg bisacodil ***(OTC)***

LAXATOL® *SICOMED;* Cpr. film. gastrorezist. 5 mg bisacodil ***(OTC)***

STADALAX® *STADA ARZNEIMITTEL AG;* Dj. gastrorezist. 5 mg bisacodil ***(OTC)***

Ind: Constipație; favorizarea evacuării (în cazul hemoroizilor; pre- și postoperator; pregătirea colonului pentru examene endoscopice).
Dz: *Adulți:* 10 mg seara la culcare. *Copii* în vârstă *de 4 ani și peste:* 5 mg.
Cind: Abdomenul acut chirurgical.
A!: Adm. concomitentă a antiacidelor (de exemplu, bicarbonat de sodiu) trebuie evitată. Precauție în timpul primelor trei luni de sarcină și la copii sub 4 ani.
RA: Disconfort abdominal. Rar, leziuni anale.

BISMUTH SUBSALICYLATE

COD ATC: A07BBN1

PINK BISMUTH STRES LIQUID *PERRIGO;* Susp. orală 262 mg/15 ml susp. (fl. × 237 ml) ***(P-6L)***

PINK TABLETES *PERRIGO;* Cpr. mast. 262 mg subsalicilat de bismut ***(P-6L)***

Ind: Asociat cu antibiotice în trat. ulcerul gastric și duodenal (eradicarea Helicobacter pylori). Trat. diareea călătorului.
Dz: 1 cpr. de 2 ori/zi pe stomacul gol, cu 1/2 de oră înainte de micul dejun și cu 1/2 de oră înainte de cină sau înainte de culcare sau 480 mg o dată pe zi pe stomacul gol, timp de 1-2 luni.
Cind: IR gravă.
A!: Poate conduce ocazional la encefalopatie reversibilă. Nu se recomandată utilizarea concomitentă și a altor medicamente conținând bismut, antiacide, lapte, fructe sau sucuri de fructe. Absorbția tetraciclinelor poate fi redusă de adm. concomitentă de subcitrat de bismut.
RA: Înnegrirea scaunului, grețuri, vărsături, reacții alergice la nivelul pielii.

BISMUTHI SUBCITRAS COLLOIDAL *COD ATC: A02BX05*

CITRAT BAZIC DE BISMUT *INCDCF București;* Dj. 120 mg oxid de bismut *(P-6L)*

DE-NOL *YAMANOUCHI EUROPE BV;* Cpr.,1 cpr. conține soluție uscată de subcitrat de bismut coloidal (CBS), corespunzător la 120 mg trioxid de bismut *(P-6L)*

Ind: Ulcerul gastric și duodenal, gastrite, eradicarea Helicobacter pylori.
Dz: Oral: 240 mg de 2 ori pe zi pe stomacul gol, cu 1/2 de oră înainte de micul dejun și cu 1/2 de oră înainte de cină sau înainte de culcare sau 480 mg o dată pe zi pe stomacul gol. Trat. se continuă 1-2 luni.
Cind: IR gravă.
A!: Poate conduce ocazional la encefalopatie reversibilă. Nu se recomandată utilizarea concomitentă a altor medicamente conținând bismut, antiacide, lapte, fructe sau sucuri de fructe. Absorbția tetraciclinelor poate fi redusă de adm. concomitentă de subcitrat de bismut.
RA: Înnegrirea scaunului, grețuri, vărsături, constipație, diaree, reacții alergice la nivelul pielii.

BISOPROLOLUM *COD ATC: C07AB07*

BISOGAMMA® 5; BISOGAMMA®10 *WÖRWAG PHARMA GmbH&Co;* Cpr. film. 5 și 10 mg *(P-6L)*

BYOL 5 mg; 10 mg *LEK PHARMACEUTICALS;* Cpr. film. 5 mg; 10 mg *(P-6L)*

CONCOR 10 *MERCK KGaA;* Cpr. film. 10 mg bisoprolol fumarat *(P-6L)*

CONCOR 5 *MERCK KGaA;* Cpr. film. 5 mg bisoprolol fumarat *(P-6L)*

CONCOR® COR 10 mg *MERCK KGaA;* Cpr. film. 10 mg bisoprolol fumarat *(P-6L)*

CONCOR® COR 2,5 mg *MERCK KGaA;* Cpr. film. 2,5 mg bisoprolol fumarat *(P-6L)*

CONCOR® COR 5 mg *MERCK KGaA;* Cpr. film. 5 mg bisoprolol fumarat *(P-6L)*

Ind: HTA, angină pectorală, IC congestivă.
Dz: Trat. cu bisoprolol se face pe o perioadă lungă. Oral: 5-10 mg de 1-2 ori/zi. În IR și IH, max. 10 mg.
Cind: IC decompensată; BAV de gradul II sau III, boală de nod sinusal; astm bronșic; bradicardie < 50/min; hTA marcată; șoc cardiogen; stadii avansate ale tulburărilor circulatorii periferice.
A!: Nu se va opri brusc adm. de bisoprolol. Se adm. cu atenție în: acidoză metabolică; diabet zaharat; în feocromocitom. Atenție în cazul asocierii cu:

anestezice, antiaritmice și verapamil, insulină, sulfoniluree, antiHTA, glicozide cardiotonice, derivați ergotaminici nehidrogenați. Se indică oprirea trat. cu 72 de ore înainte de data presupusă a nașterii. Poate modifica reacțiile din timpul șofatului.
RA: Greață, diaree, constipație; oboseală; agravarea IC, bradicardie, BAV, scăderea TA; spasm bronșic; furnicături și senzație de rece la nivelul membrelor, agravarea tulburărilor circulatorii periferice; scăderea fluxului lacrimal; reacții cutanate; crampe musculare, slăbiciune musculară; tulburări de somn; halucinații; psihoze depresive; dezechilibrul stării de prediabet sau de diabet metabolic; rar, tulburări de dinamică sexuală. Mai pot apărea: amețeli, cefalee ușoară, transpirații, scăderea toleranței la glucoză mai ales la diabeticii vârstnici.

BLEOMYCINUM SULFAS *COD ATC: L01DC01*

BLEOCIN *NIPPON KAYAKU Co.;* Pulb. inhal. 15 mg sulfat de bleomicină *(S)*

Ind: Cancere cu celule scuamoase, boală Hodgkin și alte limfoame maligne, teratom testicular, revărsări maligne ale cavităților seroase.
Dz: Inj. i.m. sau i.v. (în bolus sau perfuzie), în funcție de afecțiunea tratată: câte 15 mg de 1-3 ori pe săpt. sau 30 mg o dată/săpt., până la doza totală de 225-500 mg pentru vârste sub 60 de ani, mai puțin pentru vârstele înaintate.
Cind: Sarcină și perioada de alăptare, infecții pulmonare acute, insuficiență pulmonară marcată; prudență și doze mici la bolnavii cu IR.
RA: Reacții imediate: febră, oboseală, anorexie, greață, rar hTA, tromboflebită locală. Reacții tardive: stomatită, leziuni cutanate, alopecia trecătoare, pneumonie interstițială, care poate evolua către fibroză pulmonară gravă; rar: hiperpirexie, chiar moarte, după injectarea intracavitară.

BRINZOLAMIDUM *COD ATC: S01EC04*

AZOPT *ALCON SRL;* Susp. oft., picături oculare 1%; fl. × 5 ml, 10 ml *(P-RF/ P-6L)*

Ind: Scăderea presiunii intraoculare crescute în: hipertensiune intraoculară, glaucom cu unghi deschis.
Dz: 1 picicătură sol. de 1-3 ori/zi, în sacul conjunctival al ochiului/ochilor afectat/ afectați de două ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componente sau la sulfonamide. IR severă. Acidoză hipercloremică. Perioada de alăptare.
A!: Nu se recomandă utilizarea produsului la pacienți sub 18 ani sau la pacienți cu IH. Atenție în cazul pacienților care poartă lentile de contact. Se recomandă monitorizarea atentă în alte cazuri de cornee compromisă (ex: la pacienți cu diabet zaharat). Atenție în cazul asocierii cu: ketoconazolul, itraconazolul, clotrimazolul, ritonavirul și troleandomicina. Prudență în timpul sarcinii. Poate afecta capacitatea de a conduce mașina sau de a manipula utilaje.

RA: Efecte oculare: încețoșarea vederii, disconfort ocular, senzație de corp străin, hiperemie oculară, uscăciunea ochiului, durere oculară, hipersecreții oculare, prurit ocular, keratită, blefarită, conjunctivită, cruste ale marginii pleoapelor, senzație de vâscozitate, keratopatie, foliculi conjunctivali, vedere anormală, eroziune corneană. Efecte sistemice: tulburarea percepției gustative, uscăciunea gurii, grețuri, dispepsie, dureri toracice, alopecie, reacții de hipersensibilitate (dermatită), cefalee, parestezii caracterizate prin amorțirea extremităților și furnicături, depresie, amețeli, rinită, dispnee, faringită, bronșită, epistaxis, hemoptizie.

BROMAZEPAMUM

COD ATC: N05BA08

BROMAZEPAM LPH® 1,5 mg; BROMAZEPAM LPH® 3 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. 1,5 mg, 3 mg bromazepam ***(S/P-RF)***

BROMAZEPAM 1,5 mg *PROMEDIC SRL;* Cpr. 1,5 mg ***(P-RF)***

BROMAZEPAM 3 mg *PROMEDIC SRL;* Cpr. 3 mg ***(P-RF)***

BROMAZEPAM 3 mg *SLAVIA PHARM SRL;* Cpr. 3 mg bromazepam ***(P-RF)***

CALMEPAM® *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. 1,5 mg, 3 mg bromazepam ***(P-RF)***

LEXOTANIL *HOFFMANN LA ROCHE* ambalat de *TERAPIA SA;* Cpr. 3 mg bromazepam ***(P-RF)***

LEXOTANIL® (LEXOTAN) *HOFFMANN LA ROCHE;* Cpr. 3 mg bromazepam ***(P-RF)***

Ind: Anxietate și stări tensionale, dispoziție depresivă, tensiune nervoasă, agitație și insomnie.
Dz: *Adulți: oral:* 1,5-3 mg, de până la trei ori pe zi. Cazuri severe: 6-12 mg, de două sau trei ori pe zi. La *copii* se ajustează dozele în funcție de greutatea corporală. Pacienții *vârstnici* necesită doze scăzute.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la benzodiazepine. Pacienții cu dependență cunoscută sau presupusă față de alcool, medicamente sau droguri. În perioada de alăptare.
A!: Precauții la pacienții cu miastenia gravis. Poate produce dependență fizică și psihică. Dacă dependența fizică s-a creat deja, întreruperea bruscă a trat. va fi însoțită de simptome de sevraj. Atenție în cazul asocierii cu: alcool, neuroleptice, tranchilizante, antidepresive, hipnotice, analgezice și anestezice. Atenție în caz de: sarcină, șoferi, activități de precizie. Se recomandă controlarea nr. elementelor figurate sanguine și a funcției hepatice.
RA: Oboseală, somnolență, slăbiciune musculară. Unii pacienți pot dezvolta dependență. Reacții paradoxale: anxietate acută, halucinații, insomnie sau excitație.

BROMHEXINUM

COD ATC: R05CB02

BISOLVON® *BOEHRINGER INGELHEIM;* Cpr. 8 mg bromhexină *(OTC);* sol. uz int. 0,2% bromhexină (fl. × 40 ml) + măsură dozatoare *(OTC);* sirop 8 mg/5 ml sau 4 mg/5 ml (fl. × 100 ml + măsură dozatoare) *(OTC)*

BROMHEXIN *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cpr. 8 mg bromhexină; sol. orală 0,2% (fl. × 50 ml) *(OTC)*

BROMHEXIN 8 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. 8 mg *(S/OTC)*

BROMHEXIN *LAROPHARM SRL;* Cpr. 8 mg *(OTC)*

BROMHEXIN *TIS FARMACEUTIC;* Sol. orală 0,2% (fl. × 30 ml) *(OTC)*

BROMHEXIN *SLAVIA PHARM SRL;* Cpr. 8 mg *(OTC)*

BROMHEXIN 12 *FAHLBERG LIST;* Dj. 12 mg *(OTC)*

BROMHEXIN 12 mg *LAROPHARM SRL;* Cpr. 12 mg clorhidrat de bromhexină *(OTC)*

BROMHEXIN 8 *JENAPHARM;* Sol. orală 0,8% clorhidrat de bromhexină (fl. × 20 ml) *(OTC)*

BROMHEXIN 8 *MAGISTRA C&C;* Cpr. 8 mg clorhidrat de bromhexină *(OTC)*

BROMHEXIN 8 mg *HELCOR;* Cpr. 8 mg clorhidrat de bromhexină *(OTC)*

BROMHEXIN 8 mg *ARENA GROUP SA;* Cpr. 8 mg clorhidrat de bromhexină *(OTC)*

BROMHEXIN 10 BC *BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP;* Sol. orală. 0,2% clorhidrat de bromhexină (fl. × 100 ml) *(OTC)*

BROMHEXIN CLORHIDRAT *PHARMAPLANT BIOGALENICA;* Sol. orală 0,2% clorhidrat de bromhexină (fl. × 50 g) *(OTC)*

BROMHEXIN EEL *BIO EEL SRL;* Cpr. 12 mg clorhidrat de bromhexină *(OTC)*

BROMHEXIN 12 BC *BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP;* Sol. orală 1,2% clorhidrat de bromhexină (fl. × 50 ml; fl. × 30 ml) *(OTC)*

BRONHOSOLVIN 0,2% *INCDCF;* Sol. orală 0,2% (fl. × 50 ml) *(OTC)*

CLORHIDRAT DE BROMHEXIN *PHARMA GAL SRL;* Sol. buv. 0,2% clorhidrat de bromhexină (fl. × 50 g) *(OTC)*

Ind: Fluidifiant al secrețiilor bronșice în cursul afecțiunilor bronho-pulmonare acute și cronice.

Dz: Oral. *Copii sub 2 ani:* 1 mg de 3 ori pe zi. *Copii 2-6 ani:* 2-4 mg de 3 ori pe zi. *Copii între 6 și 14 ani,* precum și pacienții care au greutatea sub 50 kg: 8 mg de 3 ori pe zi. *Adulți și tineri peste 14 ani:* 8-16 mg de 3 ori pe zi. În caz de IR sau IH doza trebuie redusă sau trebuie crescut intervalul dintre adm.

Cind: Hipersensibilitate la oricare din componente. Sarcină şi alăptare. Afecţiuni bronşice cu acumulare masivă de secreţii. Ulcer gastric acut.
A!: Preparatele cu dozaj mare nu sunt recomandate copiilor sub 14 ani sau pacienţilor cu o greutate sub 50 kg. Nu se asociază cu antitusive. Unele preparate conţin alcool etilic; prudenţă la bolnavii cu afecţiuni hepatice, epilepsie sau leziuni cerebrale, alcoolici, şoferi sau persoane cu activităţi de precizie. Prudenţă în IR, afecţiuni hepatice severe, copii sub 2 ani. Atenţie în cazul asocierii cu medicamente iritante gastric. Nu se recomandă adm. în timpul sarcinii şi pe durata alăptării.
RA: Tulburări gastrointestinale, reacţii alergice, rar şoc anafilactic.

BROMOCRIPTINUM

COD ATC: N04BC01
G02CB01

BROCRIPTIN *BIOFARM SA;* Dj. 2,5 mg bromocriptină ***(P-6L/P-RF)***

BROMCRIPTINA DOROM 5 mg, 10 mg *POLI IND. CHIMICA;* Cps. 5 mg, 10 mg bromocriptină ***(P-RF)***

MEDOCRIPTINE *MEDOCHEMIE Ltd.;* Cpr. 2,5 mg bromocriptină ***(P-6L/P-RF)***

SEROCRYPTIN *SERONO;* Cpr. 2,5 mg bromocriptină ***(P-6L/P-RF)***

Ind: Tulburări de ciclu menstrual şi infertilitate, induse de prolactină, la femei. Hiperprolactinemie la bărbaţi. Prolactinom. Acromegalie. Inhibiţia lactaţiei. Afecţiuni benigne ale sânului. Boală Parkinson idiopatică sau post-encefalitică.
Dz: Oral, în timpul mesei. În funcţie de afecţiunea tratată, se începe cu doze de 1,25-2,5 mg de 1-3 ori/zi. Dozele pot fi crescute treptat pînă la 5-40 mg/zi, în funcţie de afecţiune.
Cind: Hipersensibilitate la bromocriptină sau la alţi alcaloizi ai ergotului. HTA în timpul sarcinii sau perinatal.
A!: Nu trebuie adm. post-partum femeilor cu HTA, cardiopatie ischemică sau cu manifestări şi/sau antecedente de tulburare psihotică majoră. Nu se recomandă adm. concomitentă cu alţi alcaloizi din ergot. La bolnavele cu indicaţie de trat. pentru mastodinie sau modificări nodulare şi/sau chistice ale sânului, trebuie mai întâi să se excludă malignitatea. Prudenţă la bolnavii cu antecedente de tulburări psihotice, afecţiuni cardiovasc. severe, ulcer sau hemoragie digestivă. Modificările pleuropulmonare neexplicate trebuie investigate atent. Adm. Se întrerupe când s-au diagnosticat sau se suspectează modificări de fibroză retroperitoneală. Atenţie în cazul asocierii cu eritromicină sau josamicină. Atenţie în cazul: femeilor însărcinate, şoferi, persoane cu activităţi de precizie.
RA: Greaţă, ameţeală, astenie, vărsături, hTA ortostatică, constipaţie, tulburări de echilibru, cefalee, excitaţie psihomotorie, halucinaţii, tulburări diskinetice, uscăciunea gurii, crampe ale musculaturii gambelor, reacţii alergice cutanate, paloare reversibilă a degetelor indusă de frig. Rar, cazuri de fibroză pleuropulmonară sau retroperitoneală.

BUDESONIDUM *COD ATC: A07EA06*

BUDENOFALK® *EWOPHARMA/DR. FALK GmbH;* Cps. gastrorez. 3 mg budesonid *(P-RF)*

ENTOCORT *ASTRAZENECA;* Cps. 3 mg budesonid *(P-RF)*

ENTOCORT 2 mg clismă *ASTRAZENECA;* Cpr.+ sol. 2 mg budesonid; ct. × 7 cpr.+ fl. × 115 ml NaCl 0,9% *(P-RF)*

PULMICORT® 0,125 mg/ml *ASTRAZENECA;* Aerosol nazal, 0,125 mg/ml; fl. × 2 ml susp. pt. nebulizare *(P-RF)*

PULMICORT® 0,25 mg/ml *ASTRAZENECA;* Aerosol nazal, 0,25 mg/ml; fl. × 2 ml susp. pt. nebulizare *(P-RF)*

PULMICORT® 0,5 mg/ml *ASTRAZENECA;* Aerosol nazal, 0,5 mg/ml; fl. × 2 ml susp. pt. nebulizare *(P-RF)*

PULMICORT TURBUHALER *ASTRAZENECA;* Pulb. inhal. 100 mg/doză *(P-6L)*

PULMICORT TURBUHALER *ASTRAZENECA;* Pulb. inhal. 200 mg/doză; 400 mg/doză *(P-6L)*

RHINOCORT AQUA *ASTRAZENECA;* Spray nazal 50 µg/doză; fl. × 10 ml × 120 doze *(P-RF)*

RHINOCORT® AQUA *ASTRAZENECA;* Susp. nazală 32 µg/doză; fl. × 10 ml × 120 doze + pompă dozatoare *(P)*

TAFEN® NASAL *LEK PHARMACEUTICALS;* Susp. nazală 50 µg/doză; fl. × 200 doze *(P-RF)*

TAFEN® NASAL 1 mg/ml *LEK PHARMACEUTICALS;* Susp. nazală

TAFEN® NOVOLIZER 200 µg *LEK PHARMACEUTICALS;* Pulb. inhal.

Ind: *Adm. inhal.:* profilaxia crizelor de astm bronșic. *Oral:* Colită ulcerativă care afectează rectul, sigmoidul și colonul descendent. *Spray nazal:* Rinita alergică și non-alergică, prevenirea apariției polipilor nazali după polipectomie.
Dz: *Adm. inhalator: Adulți:* inițial, 400-1600 µg în 2-8 inhalații/zi; trat. întreținere, 200-400 µg repartizat în 1-4 inhalații/zi. *Copii:* 50-400 µg repartizat în 2-8 inhalații/zi. Se recomandă utilizarea de spacere. Oral: *Adulți:* curativ: 9 mg/zi timp de 8 săpt., profilactic: 6 mg/zi, înainte de micul dejun. *Spray nazal: Adulți și copii peste 6 ani:* inițial, 200-400 µg/zi, în 1-2 prize. Doza de întreținere trebuie redusă la doza minimă care controlează simptomele.
Cind: Afonie. Infecții bacteriene, fungice sau virale sistemice sau locale. Hipersensibilitate la oricare dintre ingrediente.
A!: Nu este recomandat în cazul crizelor terminale de astm. Poate duce la inhibarea axului hipofizo-suprarenalian și la apariția tulburărilor de creștere la copii. Trat. nu trebuie întrerupt brusc. Precauții în cazul pacienților cu tbc pulmonar, infecții pulmonare micotice și infecții virale ale tractului respirator,

în cazul pacienților care folosesc glucocorticoizi adm. sistemic din cauza atrofiei renale, pacienților cu HTA, diabet zaharat, osteoporoză, ulcer peptic, glaucom sau cataractă. În situațiile în care pacienții sunt supuși unei intervenții chirurgicale sau altor situații de stres, se recomandă suplimentarea pe cale sistemică cu un glucocorticoid. Varicela și pojarul pot avea o evoluție severă la pacienții tratați cu glucocorticosteroizi orali. Funcția hepatică redusă poate afecta eliminarea glucocorticosteroizilor. Atenție în cazul asocierii cu: ketoconazol sau cu cimetidină. Atenție în cazul adm. la femei însărcinate sau în perioada de alăptare.

RA: Adm. inhal. produce candidozele cavității bucale și faringelui, spasmul bronșic paradoxal. Adm. int. poate determina: efecte adverse tipice glucocorticosteroizilor sistemici, dispepsie, crampe musculare, tremor, palpitații, nervozitate, vedere tulbure, reacții cutanate, tulburări menstruale. După folosirea spray-ului pot apărea: uscăciunea mucoasei și strănut, secreție hemoragică ușoară și epistaxis; reacții cutanate, rar, ulcerație a mucoasei, perforarea septului nazal.

BUFLOMEDILUM

COD ATC: C04AX20

VARDOLIN® *HELP;* Cpr. film. 150 mg clorhidrat de buflomedil ***(P-6L)***

Ind: Tulburări vasculare periferice. Vasculopatii cronice ale membrelor inferioare. Necroze ale pielii, provocate de insuficiențe vasculare severe. Tulburări cerebrovasculare. Fenomenul Raynaud. Retinopatie diabetică. Degerături și algodistrofii.

Dz: Oral: 600 mg/zi, divizată în 3-4 prize.

Cind: IMA, hipertiroidism, tahicardie acută, tulburări coronariene, post-partum, pacienții cu sângerări arteriale severe. Hipersensibilitate cunoscută la buflomedil.

A!: Este recomandată reducerea dozei la pacienții cu tulburări hepatice. Folosirea în timpul sarcinii și alăptării nu este recomandată.

RA: Eritem tegumentar, vertij, amețeală, greață, anorexie, dispepsie, dureri epigastrice, efecte asupra SNC, rash, prurit, palpitații.

BUFORMINUM

COD ATC: A10BA03

SILUBIN RETARD *GRUNENTHAL;* Dj. ret. 100 mg buformin ***(P-6L)***

Ind: Diabetul zaharat de tip II.

Dz: Oral: 200-300 mg, în 2 prize, la pacienții cu glicemia de 200 mg/dl. Doza de întreținere: 100-200 mg/zi.

Cind: Comă și precomă diabetică, acidoză diabetică, IR și IH, insuficiență cardiovasculară gravă, sarcină, diabet zaharat tip I netratat corect cu insulină.

RA: Fenomene dispeptice, astenie, scădere în greutate.

BUPIVACAINUM

COD ATC: N01BB01

BUPIVACAINĂ 25 mg *TERAPIA SA;* Sol. inj. ***(S)***

BUPIVACAINĂ 50 mg *TERAPIA SA;* Sol. inj. ***(S)***

BUPIVACAINE SPINAL *ABBOTT LABORATORIES S.A.;* Sol. inj. 7,5 mg clorhidrat de bupivacaină/ml (f. × 2 ml) ***(S)***

MARCAINE *ASTRAZENECA;* Sol. inj. 5 mg/ml (fl. × 20 ml) ***(S)***

MARCAINE SPINAL 0,5% *ASTRAZENECA;* Sol. inj. 5 mg/ml (f. × 4 ml) ***(S)***

MARCAINE SPINAL HEAVY 0,5% *ASTRAZENECA;* Sol. inj. 5 mg/ml (f. × 4 ml) ***(S)***

Ind: Pentru realizarea blocului subarahnoidian (rahianestezie).
Dz: Doza variază cu procedeul anestezic, regiunea care trebuie anesteziată, vascularizația țesuturilor, numărul de segmente neuronale care trebuie blocate, profunzimea anesteziei și gradul de relaxare musculară necesar, durata anesteziei, toleranța individuală și starea fizică a pacientului. *La pacienții vârstnici* și debilitați și la pacienții cu afecțiuni cardiace și/sau hepatice dozele vor fi reduse. Dozele uzuale: 6-12 mg.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la bupivacaină sau la oricare alt anestezic local amidic. Hemoragie gravă, hTA marcată sau șoc, aritmii, bloc cardiac complet cu debit cardiac mult redus; infecție la nivelul locului propus pentru puncția lombară; septicemie.
A!: Se monitorizează: gradul anesteziei, semnele cardiovasculare, respiratorii și starea de conștiență a pacientului. Va fi utilizată doza cea mai mică de anestezic local care determină efectul dorit. Anestezicele spinale nu vor fi inj. în timpul contracțiilor uterine. Prudență la pacienții cu tulburări severe ale ritmului cardiac, șoc sau bloc cardiac, afectare hepatică, funcție cardiovasculară alterată. Dozele recomandate pentru rahianestezie sunt mult mai mici decât cele recomandate pentru alte blocuri majore. Prudență în caz de: afecțiuni preexistente ale SNC; afecțiuni hematologice care predispun la coagulopatii sau pacienți care primesc trat. anticoagulant; rahialgii cronice și cefalee preoperatorie; hTA și HTA; probleme ale inj.; artrite sau deformări ale coloanei vertebrale; vârste extreme; psihoze sau alte cauze de cooperare scăzută din partea pacientului. Atenție în cazul asocierii cu: anestezice locale care conțin adrenalină sau noradrenalină, cu IMAO, antidepresive triciclice, medicamente vasopresoare și medicamente ocitocice. Atenție în cazul utilizării la femei însărcinate (exclusiv utilizarea pentru anestezia gravidei la termen) și la femei care alăptează. Rahianestezia poate diminua contractilitatea uterină sau efortul de expulzie. Adm. bupivacainei la pacienții sub 18 ani nu se recomandă.
RA: Sistemul respirator: paralizie respiratorie sau hipoventilație. Sistemul cardiovascular: hTA, greața și voma sunt frecvent asociate, deprimare miocardică. SNC: excitație și/sau deprimare, agitație, anxietate, amețeală, tinitus, vedere încețoșată, tremor, convulsii. Excitația poate fi rapid urmată de somnolență până la pierderea stării de conștiență și stop respirator. Reacții neurologice: pierderea sensibilității perineale și a funcției sexuale, anestezie persistentă, parestezii, slăbiciune și paralizie a membrelor inferioare și pierderea controlului sfincterian, bloc spinal înalt sau total, retenție urinară, dureri de

spate, meningite septice, meningism, arahnoidite, prelungirea travaliului, tremor, paralizii ale nervilor cranieni. Reacții alergice: urticarie, prurit, eritem, edem angioneurotic, tahicardie, strănut, amețeală, reacții anafilactice.

BUPROPIONUM *COD ATC: N06AX12*

WELLBUTRIN SR *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. ret. 150 mg clorhidrat de bupropion ***(P-RF)***

ZYBAN® *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. elib. prel. 150 mg clorhidrat de bupropion ***(P-RF)***

Ind: Trat. bolilor depresive. Trat. dependenței de nicotină (ca suport al renunțării la fumat).
Dz: *Adulți:* Trat. inițial: 150 mg, în priză unică, maxim 300 mg/zi, fracționat în mai multe prize la un interval de minim 8 ore. Trat. de întreținere: doza minimă eficace.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componentele preparatului, pacienții cu crize convulsive, pacienții cu diagnostic anterior sau actual de bulimie sau anorexie nervoasă. Asocierea cu IMAO. Perioada de alăptare.
A!: Prezintă risc convulsivant în funcție de doză. Precauție la pacienții care prezintă condiții predispozante la praguri joase convulsivante sau circumstanțe clinice asociate unui risc crescut convulsivant. Trat. trebuie întrerupt la pacienții care prezintă reacții de hipersensibilitate sau anafilactice. La pacienți cu afecțiuni renale sau hepatice se adm. doze reduse. Există riscul să precipite episoadele maniacale la pacienții cu afectare bipolară și poate activa o psihoză latentă la pacienții susceptibili. Atenție la asocierea cu alte medicamente cu efect asupra izoenzimei CYP2B6, cu medicamente biotransformate cu implicarea CYP2D6, cu medicamente care induc sau inhibă metabolismul hepatic, cu levodopa, cu Nicotine Transdermal System (NTS). Atenție în cazul utilizării: în timpul sarcinii, la șoferi sau la persoane cu activități de precizie.
RA: Febră, dureri toracice, astenie, tahicardie, vasodilatație, hTA posturală, HTA, înroșirea feței, sincope, crize convulsive, insomnie, tremor, perturbarea concentrării, amețeală, depresie, confuzie, agitație, anxietate, acufene, afectarea vederii, afectarea gustului, anorexie, pierdere în greutate, uscăciunea gurii, greață și vărsături, durere abdominală, constipație. Artralgie, mialgie și febră în asociere cu rash-ul și alte simptome care sugerează hipersensibilitatea de tip IV. Rar: eritem multiform și sindromul Stevens-Johnson.

BUSERELINUM *COD ATC: L02AE01*

SUPRECUR *LAB. AVENTIS PHARMA;* Spray nazal 0,15 mg/doză; fl. × 10 g sol. + disp. pt. aerosol ***(S/P-RF)***

Ind: Endometrioză, pubertate precoce, cancer de prostată cu metastaze, pregătirea inducerii ovulației.
Dz: Endometrioză: 900 µg/doză de 3 ori/zi, timp de 6 luni. Pregătirea inducerii ovulației: 4 doze/zi, fiecare a 150 µg.

Cind: Sarcină, alaptare, hemoragii uterine nediagnosticate, neoplasme hormonal dependente, hipersensibilizare la produs.
A!: Pacienții depresivi, diabetici, HTA. La începutul trat. se va exclude posibilitatea sarcinii.
RA: Transpirații, uscăciunea mucoasei vaginale, scăderea libidoului, sângerări, creșterea fosfatazei alcaline, scăderea densității osoase; trat. îndelungat poate induce adenom pituitar.

BUSPIRONUM

COD ATC: N05BE01

BUSPAR *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Cpr. 5 mg, 10 mg buspironă ***(P-RF)***

SPITOMIN 5 mg *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd;* Cpr. 5 mg buspironă ***(P-RF)***

SPITOMIN 10 mg *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd;* Cpr. 10 mg buspironă ***(P-RF)***

STRESSIGAL *ANFARM HELLAS;* Cpr. 10 mg buspironă ***(P)***

Ind: Trat. tulburărilor de anxietate și a perioadelor scurte cu simptome de anxietate însoțite sau nu de depresie.
Dz: Oral. Doza inițială: 5 mg de 3 ori/zi. Doza se poate crește cu 5 mg/zi la fiecare 2-3 zile. Doza zilnică maximă nu trebuie să depășească 60 mg/zi. La pacienții cu IH sau IR trebuie folosite doze mai mici.
Cind: La pacienții hipersensibili față de acest medicament, la pacienții cu convulsii în antecedente, la pacienții epileptici, la cei tratați cu IMAO.
A!: Pacienții trebuie avertizați să nu conducă autovehicule sau să nu utilizeze aparatură complexă. A se evita utilizarea concomitentă cu alcool. Posibile reacții de sevraj la pacienții dependenți de medicamentele anxiolitice/hipnotice/sedative. Atenție în cazul asocierii cu: alte medicamente active asupra SNC, digoxină. Precauție în cazul utilizării la femei însărcinate sau în perioada de alăptare.
RA: Cefalee, amețeli, stare de nervozitate, stări de greață și somnolență datorate discontinuității trat.: amețeli, insomnie, nervozitate, somnolență, stări de greață, cefalee și oboseală. Tendință de abuz sau dependență.

BUSULFANUM

COD ATC: L01AB01

MYLERAN *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. 2 mg busulfan ***(S/P-RF)***

Ind: Paleativ în leucemia granulocitară cronică, în absența transformării blastice. În obținerea remisiunilor în policitemia vera, în special în cazurile cu trombocitoză marcată. În anumite cazuri de trombocitemie esențială și mielofibroză.
Dz: *Leucemia granulocitară cronică: Adulți:* Inducție: 0,06 mg/kg/zi, max. 4 mg/zi, obișnuit în priză unică, până ce numărul total de leucocite scade între 15-25 × 10^9/l. Întreținere: 0,5-2 mg/zi. *Policitemia vera:* inducție: uzual: 4-6 mg/zi; întreținere: se pot folosi jumătate din dozele de inducție *Mielofibroza:* Doza inițială: 2-4 mg/zi. *Trombocitemia esențială:* Doza uzuală: 2-4 mg/zi. Hemoleucograma trebuie efectuată periodic.

Cind: Pacienții care au prezentat rezistență. Pacienții cu hipersensibilitate.
A!: Adm. trebuie întreruptă dacă apar semne de toxicitate pulmonară. În general busulfanul nu se adm. concomitent cu sau imediat după radioterapie. Hiperuricemia și/sau hiperuricozuria trebuie corectate înaintea începerii trat. Atenție la potențialul carcinogenic al medicamentului. Pe durata trat., hemoleucograma trebuie monitorizată atent. Tabletele nu trebuie înjumătățite. Poate apărea supresie ovariană și amenoree cu simptome de menopauză. Atenție în cazul asocierii cu tioguanină sau cu alte medicamente citotoxice ce produc toxicitate pulmonară. Trebuie evitat în sarcină, în special în primul trimestru. În timpul trat. mamele nu trebuie să alăpteze.
RA: Depresia măduvei osoase. Reacții gastrointestinale (greață, vărsături și diaree). Efecte pulmonare: fibroză pulmonară interstițială difuză cu dispnee și tuse, osificări pulmonare și calcificări distrofice. Reacții cutanate: hiperpigmentare, urticarie, eritem multiform, eritem nodos, alopecie, porfirie cutanată, rash, uscăciune și fragilitate a pielii cu anhidroză completă, sindrom Sjögren. Reacții hepatice: icter colestatic, hiperbilirubinemie, ocluzia venei hepatice, fibroză centrolobulară sinusoidală cu atrofie hepatocelulară și necroză. Efecte oculare: modificări ale cristalinului și cataractă, deteriorarea corneei. Altele: convulsii, tamponadă cardiacă, ginecomastie, miastenia gravis, cistită hemoragică, displazie generalizată cu afectarea epiteliului colului uterin, bronhiolar și a altora.

BUTAMIRATUM *COD ATC: R05DB13*

SINECOD *ZYMA;* Sirop, 1 ml conține 1,5 mg butamirat; fl. × 200 ml ***(OTC)***; Sol. orală 5 mg/ml butamirat (fl. × 20 ml) ***(OTC)***

STOPTUSSIN *IVAX PHARMACEUTICALS;* Sol. orală în picături, 40 mg/1000 mg ***(OTC)***

TUSOSEDAL *PHARMAPLANT BIOGALENICA;* Sol. orală 0,15% (fl. × 100 ml) ***(OTC)***; sol. orală 0,45% (fl. × 20 ml) ***(OTC)***

Ind: Tuse acută. Tuse convulsivă.
Dz: *Picături: copii între 2 luni - 1 an:* 10 picături de 4 ori/zi; *copii 1-3 ani:* 15 picături de 4 ori/zi; *copii peste 3 ani:* 25 picături de 4 ori pe zi. *Sirop: copii 3-6 ani:* 5 ml de 3 ori/zi; *copii 6-12 ani:* 10 ml de 3 ori/zi; *copii peste 12 ani:* 15 ml de 3 ori/zi; *adulți:* 15 ml de 4 ori/zi. Adm. preferabil înaintea meselor.
Cind: Hipersensibilitate la butamirat.
A!: A se evita în sarcină și în perioada de alăptare.
RA: Greață, diaree, eritem cutanat, vertij.

BUTORPHANOLUM *COD ATC: N02AF01*

MORADOL *GALENIKA;* Sol. inj., 2 mg tartrat de butorfanol/ml (f. × 1 ml) ***(S)***

Ind: Analgezie postoperatorie, combaterea durerilor în afecțiuni maligne și dureri posttraumatice, premedicație pentru anestezia generală.

Dz: Inj. i.m.: 2-4 mg la 4 ore. Inj. i.v.: 0,5-2 mg la 1-3 ore.
Cind: Abdomen acut; hipersensibilitate la butorfanol.
A!: La pacienți cu dependență față de narcotice, la cei cu psihic instabil, la toxicomani. Nu se recomandă utilizarea la copii sub 18 ani. Atenție în cazurile cu leziuni cranio-cerebrale, în IM, insuficiențe coronariene, disfuncții ventriculare, disfuncție renală, hepatică ori deprimare respiratorie. Atenție în perioadele de sarcină și alăptare, în cazul șoferilor sau a persoanelor cu activități de precizie.
RA: Sedare, greață, transpirații, vertij, senzație de plutire, letargie, confuzie, vise neobișnuite, euforie, halucinații, deprimare respiratorie. Naloxona se poate folosi ca antidot.

BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM *COD ATC: A03BB01*

BUSCOPAN *BOEHRINGER INGELHEIM;* Dj. 10 mg bromură de butilscopolamină *(P-6L)*

BUSCOPAN *BOEHRINGER INGELHEIM;* Sol. inj. 20 mg/ml bromură de butilscopolamină (f. × 1 ml) *(P-RF)*

BUSCOREM *LAB. REMEDIA;* Cpr. 10 mg *(P-6L)*

FARCORELAXIN *PHARCO PHARMACEUTICALS;* Sol. inj. 20 mg/ml *(P-RF)*

SCOBUNORD *NORDFARM PRODUCT;* Cpr. 10 mg *(P-6L)*

SCOBUSAL 10 mg *SLAVIA PHARM SRL;* Cpr. 10 mg *(P-6L)*

SCOBUTIL *SICOMED SA;* Cpr., conțin 10 mg *(P-6L)*; Sol. inj. 10 mg/ml (f. × 1 ml) *(S/P-RF)*

SCOPANTIL *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cpr. 10 mg; sup. 10 mg *(P-6L)*

USCOSIN *SINTOFARM SA;* Cpr. 10 mg *(P-6L)*

Ind: Colici intestinale, biliare, ureterale, spasm piloric sau de cardia, ulcer gastro-duodenal, colită mucomembranoasă; dismenoree, retenție de lohii; pentru efectuarea duodenografiei hipotone și diagnosticul diferențial radiologic între spasmele funcționale și stenoza organică.
Dz: *Adulți,* oral: 10-20 mg sau i.r. 7,5-20 mg de 3-5 ori/zi; i.m. sau i.v. lent, 10-20 mg la nevoie. *Copii 6-12 ani:* 10 mg de 3 ori/zi.
Cind: Glaucom, adenom de prostată cu retenție urinară, ileus paralitic, megacolon, obstacol mecanic la nivelul tubului digestiv, hernie hiatală cu reflux esofagian, tahiaritmii supraventriculare.
A!: Prudență în cardiopatia ischemică gravă și la bolnavii cu hipertiroidism marcat (nu se injectează). Prudență la asocierea cu chinidină, amantadină, antidepresive triciclice.
RA: Uscăciunea gurii, tulburări de vedere, tahicardie, constipație, dificultate în urinare; inj. i.v. poate provoca sedare, tahicardie, hTA ortostatică.

C

CABERGOLINUM *COD ATC: N04BC06*

CABASER *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Cpr. 1 mg, 2 ml, 4 mg

DOSTINEX *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Cpr. 0,5 mg cabergolină ***(P-6L)***

Ind: Prevenirea sau suprimarea lactației. Tulburări determinate de hiperprolactinemie.
Dz: Oral. Prevenirea lactației: Doză unică, 1 mg în prima zi după naștere. Suprimarea lactației: 0,25 mg la fiecare 12 ore timp de 2 zile. Trat. hiperprolactinemiei: 0,25-0,5 mg/săpt. în 1-2 prize.
Cind: În caz de reacții alergice la cabergolină. IH. Sarcină toxică. Psihoză post-partum. A nu se asocia cu antipsihotice.
A!: În caz de boli cardiovasculare, sindrom Raynaud, IR, ulcer peptic, hemoragii gastrointestinale, boli psihice, HTA sau trat. cu antihipertensive. În sarcină și în perioada de alăptare. Pe durata trat. este recomandată evaluarea ginecologică regulată, incluzând citologia cervicală și endometrială. Atenție la asocierea cu: antiemetice, antihipertensive, psihotrope și antibiotice macrolide. Precauție în cazul șoferilor și a celor cu activități de precizie.
RA: Greață, cefalee, scăderea TA, amețeală, vertij, dureri abdominale, dispepsie, gastrită, slăbiciune/oboseală, constipație, vomă, dureri la nivelul sânilor, bufeuri, depresie sau agitație.

CALCII CARBONAS *COD ATC: A12AA04*

CALCICHEW ORANGE FLAVOUR *NYCOMED;* Cpr. mast. 500 mg carbonat de calciu ***(OTC)***

CALCIU *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cpr. mast. 250 mg ***(OTC)***

Ind: Antiacid: în gastroduodenite sau reflux gastroesofagian. Supliment oral de calciu: Prevenirea deficiențelor de calciu.
Dz: Antiacid: Oral, 500-1000 mg la nevoie, maxim 8 g în 24 h. Supliment oral de Ca: oral, 500-1000 mg calciu de 1-2 ori pe zi.
Cind: Hipercalcemie.
A!: Atenție în caz de: funcție renală afectată, nefrocalcinoză, hipercalciurie, hipofosfatemie. A se adm. lichide în cazul trat. îndelungate. Atenție în cazul asocierii cu: vitamina D, anumiți agenți diuretici, glicozide cardiace, săruri de aluminiu și bismut, antibiotice (tetracicline, ciprofloxacina, norfloxacina, cefpodoxin axetil, cefuroxim axetil), estramustină. Atenție în IR.
RA: Constipație. Hipercalcemie și alcaloză metabolică (grețuri, vărsături, oboseală). Sindrom Burnett.

CALCII CHLORIDUM

COD ATC: A12AA07

CLOROCALCIN *BIOFARM SA;* Sol. uz int. 0,18 g/ml (fl. × 50 ml) ***(OTC)***

CLORURĂ DE CALCIU *SICOMED SA;* Sol. inj. 10% (f. x 10 ml) ***(P-RF)***

Ind: Tetanie, spasmofilie, stări hemoragice, tuberculoză, sarcină, alăptare, pleurezii, hidrartroză, ascita cirozei hepatice, edem Quincke, urticarie, boala serului.
Dz: *Adulți:* inj. i.v. lent 10 ml; oral, 40-80 pic. de 3 ori pe zi. *Copii:* inj. i.v. lent 5-10 ml sau oral: 5-30 pic. pe zi (fracționat).
Cind: IR gravă, nefrolitiază, hiperparatiroidie, hipercalcemie, hipervitaminoză D, plasmocitom, metastaze osoase.
RA: Pentru sol. orală: gust neplăcut, iritație gastrică. Pentru sol. inj.: flebită.

CALCII DOBESILAS

COD ATC: C05CXN2

DOXILEK *LEK PHARMACEUTICALS;* Cps. 500 mg ***(P-6L)***

DOXIUM *OM PHARMA;* Cpr. 250 mg ***(P-6L)***

DOXIUM 500 *OM PHARMA;* Cps. 500 mg ***(P-6L)***

Ind: Microangiopatii, ca adjuvant în trat. tromboflebitelor superficiale, sindromului posttrombotic, edemelor, dermatozelor de stază, tulburărilor circulatorii de origine arterio-venoasă, în sindromul hemoroidal și în tulburările circulatorii datorate unei microcirculații perturbate.
Dz: Oral, 500-750 mg/zi, la mese.
Cind: Hipersensibilitate la dobesilatul de calciu.
AI: În timpul primului trimestru al sarcinii.
RA: Tulburări gastrice, greață, diaree, erupții cutanate.

CALCII FOLINAS

COD ATC: V03AF03

CALCIUM FOLINAT *EBEWE PHARMA;* Sol. inj., 10 mg/ml (f. × 3 ml; f. × 10 ml); sol. inj. 3 mg/ml (f. × 1 ml); cps. 15 mg ***(S/P-RF)***

FOLINAT DE CALCIU *SINDAN SRL;* Cpr. 15 mg ***(S/P-RF)***

FOLINAT DE CALCIU SINDAN 100 mg/10 ml *SINDAN SRL;* Sol. inj. 10 mg/ml (f. × 10 ml) ***(S/P-RF)***

FOLINAT DE CALCIU SINDAN 30 mg/10 ml *SINDAN SRL;* Sol. inj. 3 mg/ml (f. × 10 ml) ***(S/P-RF)***

FOLINAT DE CALCIU SINDAN 30 mg/3 ml *SINDAN SRL;* Sol. inj. 10 mg/ml (f. × 3 ml) ***(S/P-RF)***

LEUCOVORIN *WYETH LEDERLE PHARMA;* Sol. inj. acid folinic 10 mg/ml; f. × 1 ml, 3 ml, 5 ml sau 30 ml ***(S/P-RF)***

LEUCOVORIN, 15 mg *WYETH MEDICA IRELAND;* Cpr. 15 mg ***(S/P-RF)***

LEUCOVORIN CA-25 *LACHEMA;* pulb. pt. sol. inj. 25 mg folinat de calciu ***(S/P-RF)***

LEUCOVORIN-TEVA 100 mg/10 ml *TEVA;* Sol. inj., 10 mg acid folinic/ml (fl. × 10 ml) ***(S/P-RF)***

LEUCOVORIN-TEVA 50 mg/ 5 ml *TEVA;* Sol. inj., 10 mg/ml; (fl. × 5 ml, fl. × 10 ml) ***(S/P-RF)***

SANFICINATE *SANOFI WINTHROP*; Pulb. liof. pt. sol. inj. 50 mg acid folinic ***(S/P-RF)***

SANFICINATE *SANOFI WINTHROP*; Sol. inj. 2,5 mg/ml acid folinic (fl. × 2 ml, fl. × 10 ml) ***(S/P-RF)***

SANFICINATE® 100 *SANOFI WINTHROP;* Liof. pt. sol. inj. 100 mg ***(S/P-RF)***

SANFICINATE® 200 *SANOFI WINTHROP;* Liof. pt. sol. inj. 200 mg ***(S/P-RF)***

SANFICINATE® 350 *SANOFI WINTHROP;* Liof. pt. sol. inj. 350 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Carcinom colorectal, în asociere cu 5-fluorouracil.
Dz: 200 mg/m^2/zi, 5 zile consecutiv, la interval de 3-4 săptămâni. Sol. inj. se adm. i.v. lent în 10 min.
Cind: Sarcină și alăptare.
A!: Trebuie adm. înaintea 5-fluorouracilului, pe cale i.v. Atenție în cazul asocierii cu: metotrexat, fenobarbital, primidonă, fenitoină. Potențează efectele citostatice și reacțiile adverse ale 5-fluorouracilului.
RA: Diaree, stomatită, mucozită, uscăciunea pielii, eritem, conjunctivită, lăcrimare și toxicitate hematologică.

CALCII GLUBIONAS

COD ATC: A12AA02

CALCIUM PHARCO *PHARCO PHARMACEUTICALS;* Sirop; 5 ml sirop conțin 1,8 g calciu glubionat; flac. x 120 ml ***(OTC)***

CALCIUM FORTE 500 *NOVARTIS CONSUMER HEALTH* ***(OTC)***

Ind: Supliment nutritiv: în timpul perioadei de creștere a dinților, în copilărie, în adolescență, în sarcină și lactație, la femei în perioada de postmenopauză și la vârstnici. Tratamentul hipocalcemiei din: rahitism și osteomalacie, osteoporoză (senilă, postmenopauză, consecutiv gastrectomiilor, imobilizare prelungită sau utilizarea prelungită a corticosteroizilor), tetanie latentă, ca supliment al terapiei parenterale cu calciu în diferite stări hipocalcemice (ca tetania manifestă), consecutiv tiroidectomiei, paratiroidectomiei și în hipoparatiroidismul idiopatic.
Dz: Se administrează înainte sau în timpul meselor. Ca supliment nutritiv: la *sugari:* 1 linguriță de sirop de 3 ori pe zi; *copii sub 4 ani:* 2 lingurițe de sirop de 3 ori pe zi; *adulți și copii peste 4 ani:* 1 lingură de sirop de 3 ori pe zi; *gravide și în timpul lactației:* 1 lingură de sirop de 4 ori pe zi. Ca antihipocalcemic: (în rahitism, osteomalacie și osteoporoză):1-2 linguri de sirop de 3 ori pe zi.

CALCII GLUCONAS

COD ATC: A12AA03

GLUCONAT DE CALCIU *SICOMED SA;* Sol. inj. 1 mg/ml (f. × 5 ml, f. × 10 ml) ***(S/P-RF)***

Ind: Tetania hipocalcemică gravă; hipoparatiroidism postoperator, convulsii hipocalcemice la nou-născuți cu hipoparatiroidism.
Dz: I.v. lent, 10-20 ml soluție 10%; în continuare, în perf. i.v. 6-8 g/1 000 ml sol. de glucoză 5% sau inj. i.m. sol. 10%. În convulsii hipocalcemice la nou-născutul cu hipoparatiroidism, se introduce i.v. lent, în sol. 5% gluconat de calciu 300-500 mg/kg/zi.
Cind: Hipercalcemie, IR severă, hipercalciurie, nefrocalcinoză, litiază renală calcică, osteoporoză acută prin imobilizare. Nu se asociază cu digitalice sau în condiții de hiperexcitabilitate cardiacă.
A!: Nu se va inj. i.m. la copii. Inj. i.v. impune multă prudență. Prudență în caz de hemoragie cerebrală recentă.
RA: Abcese la locul inj. i.m.; inj. i.v. rapidă poate provoca: greață, vomă, senzație de căldură, sudorație, paloarea feței, hTA.

CALCII GLUCONOLACTAS

COD ATC: A12AA06

CALCIU EFERVESCENT 200 *SICOMED SA;* Cpr. eferv. 200 mg calciu ***(OTC)***

Ind: Osteoporoză. Prevenirea demineralizării osoase în pre- și postmenopauză. Rahitism și osteomalacie. Tetanie latentă. Stări cu nevoi crescute de calciu. Stări alergice.
Dz: 500-1 000 mg de calciu elementar, maxim 2 g în timpul primelor câteva săpt. de trat.
Cind: Hipersensibilitate la produs; hipercalcemie; hipercalciurie severă; IR severă.
A!: La pacienții cu hipercalciurie, cu IR sau cu istoric de calculi renali. Se recomandă o ingestie crescută de lichide. Se evită asocierea cu vitamină D în doze mari. Atenție în cazul asocierii cu: tetracicline, preparate cu fluor, blocante ale canalelor de calciu, digitalice.
RA: Tulburări gastrointestinale (balonare, constipație sau diaree).

CALCII LACTAS

COD ATC: A12AA05

CALCIU LACTIC *SICOMED SA;* Cpr. 500 mg lactat de calciu ***(OTC)***

Ind: Hipocalcemii; TBC; rahitism; tetanie; stări hemoragice; hemofilie. Afecțiuni alergice; sarcină, alăptare. Hipertiroidii. Diabet.
Dz: 0,5-1 g lactat de calciu, de 3-4 ori pe zi, după mesele principale.

CALCIPOTRIOLUM

COD ATC: D05AX02

DAIVONEX® *LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS;* Sol. capilară calcipotriol 50 µg/ml (fl. × 30 ml); unguent, 1 g conține 50 µg (tub × 30 g); cremă 50 µg/1 g (tub × 30 g) ***(P-RF)***

SOREL 0,005% *LEK PHARMACEUTICALS;* Sol. cut. 0,005%, Ung. 0,005% ***(P-RF)***

Ind: Psoriazis al scalpului, psoriazis vulgar, forme ușoare și moderate, interesând până la 40% din suprafața cutanată.
Dz: Se aplică pe zonele afectate de 2 ori pe zi (dimineața și seara). Maxim 5 mg pe săptămână.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului. Stări de hipercalcemie.
AI: Nu trebuie aplicat pe față. După utilizare se recomandă spălarea mâinilor.
RA: Iritație locală la nivelul pielii scalpului și feței, prurit, dermatită, inclusiv dermatită facială.

CALCITONINUM *COD ATC: H05BA01*

CALCITONINA HUBBER NASAL *ICN IBERICA;* Spray nazal 100 UI calcitonină/doză ***(P-RF)***

MIACALCIC *NOVARTIS;* Sol. inj. 50 UI/ml calcitonină (f. × 1 ml) ***(P-RF)***

MIACALCIC NASAL-200 *NOVARTIS;* Spray nazal 200 UI/doză ***(P-RF)***

MIADENIL *ANFARM HELLAS;* Sol. inj. 100 UI/ml (f. × 1 ml) ***(P-RF)***

NYLEX® *PROEL E. P. CORONIS;* Spray nazal 100 UI/ml; 200 UI (1 fl. × 2 ml); sol. inj. 100 UI/ml (f. × 1 ml) ***(P-RF)***

TONOCALCIN *SCHIAPPARELLI;* Seringi preumplute cu sol. inj. 50 UI sau 100 UI calcitonină; f. cu sol. inj. 50 UI sau 100 UI (f. × 1 ml); spray nazal, 16 doze a 50 UI sau 100 UI ***(P-RF)***

Ind: Osteoporoză. Dureri osoase asociate cu osteoliză sau osteopenie. Boala Paget osoasă. Hipercalcemie și crize de hipercalcemie. Tulburări neurodistrofice. Pancreatita acută.
Dz: *Osteoporoză:* Inj.: 50-100 UI zilnic sau la 2 zile, s.c. sau i.m. Spray nazal: 100-200 UI zilnic sau la 2 zile, în doză unică sau divizată. *Dureri osoase asociate cu osteoliză și/sau osteopenie:* Inj.: 100-200 UI/zi, perf. i.v. lentă sau inj. s.c. sau i.m. în doze divizate pe tot parcursul zilei. Spray nazal: 200-400 UI/zi (max. 200 UI/ doză). *Boala Paget:* Inj.: 100 UI zilnic sau la 2 zile, s.c. sau i.m. Spray nazal: 200 UI zilnic, în doză unică sau divizată (max. 400 UI/ zi în doze divizate). *Hipercalcemie:* Trat. de urgență: Inj.: 5-10 UI/kg/zi prin perf. i.v. în 500 ml ser fiziologic normal, timp de cel puțin 6 ore, sau prin inj. i.v. lentă, în 2-4 doze divizate. *Hipercalcemie cronică:* Inj.: 5-10 UI/kg/zi, inj. s.c. sau i.m. Spray nazal: 200-400 UI/zi (max. 200 UI/ doză). *Tulburări neurodistrofice:* Inj.: 100 UI/zi, s.c. sau i.m., 2-4 săpt., apoi 100 UI la 2 zile, 6 săptămâni. Spray nazal: 200 UI/zi în doză unică, 2-4 săpt., apoi 200 UI la 2 zile, timp de 6 săpt. *Pancreatita acută:* Inj.: 300 UI prin perf. i.v., max. 6 zile consecutiv.
Cind: Hipersensibilitate la calcitonină.
AI: La copii. Pacienți cu rinită cronică care primesc calcitonină intranazal. La pacienți predispuși la reacții alergice. Nu se recomandă alăptarea în timpul trat.

RA: Greață, vărsături, amețeală, eritem facial însoțit de senzație de căldură; poliurie și frisoane; reacții de tip anafilactic cu tahicardie, hTA și colaps.

CALCITRIOLUM

COD ATC: A11CC04

CALCIJEX 1 µg sau 2 µg/ml *ABBOTT;* Sol. inj., 1 µg sau 2 µg calcitriol (f. × 1 ml) ***(P-RF)***

OSTEO D *TEVA PHARM;* Cps. moi 0,25 µg, Cps. moi 0,50 µg ***(P-6L)***

ROCALTROL® *HOFFMANN LA ROCHE;* Cps. 0,25 µg sau 0,5 µg calcitriol sintetic ***(P-6L)***

Ind: Trat. hipocalcemiei la pacienții sub dializă cronică renală, în osteoporoza postmenopauzală stabilă; osteodistrofie de origine renală, hipoparatiroidism postchirurgical; hipoparatiroidism idiopatic; pseudohipoparatiroidism; rahitism dependent de vitamina D; rahitism hipofosfatemic vitamino-D-rezistent.
Dz: Doza trebuie stabilită în funcție de nivelul calciului seric: 0,5-3 µg (0,01-0,05 µg/kg de trei ori pe săpt.) adm. în bolus i.v. În cazul apariției hipercalcemiei se oprește imediat trat.
Cind: Hipercalcemie sau intoxicație cu vitamina D. Nu se vor mai adm. alte forme de vitamina D. Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului. Femei care alăptează.
A!: Dozele excesive induc hipercalcemia uneori asociată cu hipercalciurie. Prudență la pacienții digitalizați și la cei cu rahitism vitamino-D-rezistent. Atenție în cazul asocierii cu: preparate care conțin calciu, diuretice tiazidice, corticosteroizi, magneziu, agenți care chelatează fosfatul, inductori enzimatici, colestiramină. Precauție la femei însărcinate.
RA: Simptome precoce: slăbiciune, cefalee, somnolență, anorexie, grețuri, uscarea gurii, constipație, dureri musculare și osoase, gust metalic în gură. Simptome tardive: poliurie, polidipsie, deshidratare, pierdere în greutate, conjunctivite, pancreatită, fotofobie, rinoree, prurit, hipertermie, scăderea libidoului, creșterea uremiei, albuminurie, hipercolesterolemie, creșterea transaminazelor serice, apariția calcifierilor ectopice, aritmii cardiace. Rar: dureri osoase la locul injectării, distrofie, tulburări senzoriale, apatie, oprirea creșterii, infecții urinare.

CANDESARTANUM CILEXETIL

COD ATC: C09CA06

ATACAND *ASTRAZENECA;* Cpr. 4 mg, 8 mg sau 16 mg candesartan cilexetil ***(P-6L)***

Ind: HTA.
Dz: Oral, 8-16 mg candesartan o dată pe zi. La pacienții cu IR severă se începe cu doze mai mici.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului. Sarcină.
A!: În caz de: stenoză a arterei renale, depleția volumului intravascular, asociere cu diuretice care economisesc potasiul, perioadă de alăptare.

RA: Cefalee, infecții ale căilor respiratorii superioare, dureri de spate și vertij. Creșteri ale transaminazelor.

CAPECITABINUM *COD ATC: L01BC06*

XELODA 150 mg *HOFFMANN LA ROCHE;* Cpr. film. 150 mg capecitabină *(S/P-RF)*

XELODA 500 mg *HOFFMANN LA ROCHE;* Cpr. film. 500 mg capecitabină *(S/P-RF)*

Ind: Monoterapie de primă alegere în cancerul colorectal metastatic.
Dz: 1250 mg/m^2 de două ori pe zi (dimineața și seara) timp de 14 zile, urmată de o perioadă de 7 zile de pauză. La pacienții cu IR moderată se recomandă o reducere la 75% a dozei inițiale.
Cind: Antecedente de reacții adverse severe și neașteptate la trat. cu fluoropirimidine. Sensibilitate cunoscută la capecitabină, fluorouracil sau oricare dintre excipienți. Deficiență cunoscută de dihidropirimidin dehidrogenază. Sarcină și alăptare. La pacienții cu leucopenie, neutropenie sau trombocitopenie severe. IH sau IR severă. În caz de trat. cu sorivudina sau analogii structurali (brivudina).
A!: Toxicitatea limitativă pentru doză include diaree, dureri abdominale, greață, stomatită, sindromul mână - picior. Pacienții cu diaree severă trebuie supravegheați și li se adm. fluide și electroliți dacă sunt deshidratați. Sindromul mână-picior, dacă se manifestă gradul 2-3 trat. trebuie întrerupt până la dispariția simptomelor sau până ce acestea scad până la gradul 1. Prudență la pacienții cu antecedente de boli cardiace, aritmii și angină pectorală; în caz de hipo- sau hipercalcemie preexistentă; la pacienții cu afecțiuni ale SNC sau periferic; la pacienții cu diabet zaharat sau tulburări electrolitice; IH sau IR ușoară sau moderată. Precauție în cazul asocierii cu: anticoagulante cumarinice, fenitoină, acid folinic, sorivudină și analogi, antiacide, allopurinol, interferon alfa. Precauție la șoferi și persoane cu activități de precizie.
RA: *Gastrointestinale:* diaree, greață, vărsături, dureri abdominale, stomatită, constipație, dispepsie, gură uscată, flatulență, scaune moi, esofagită, gastrită, duodenită, colită, hemoragie gastro-intestinală. *Cutanate:* sindromul mână - picior sau eritrodisestezie palmo-plantară, dermatită, alopecie, uscăciune a pielii, erupții cutanate eritematoase, hiperpigmentare cutanată, prurit, modificări ale unghiilor, exfoliere locală, reacții de fotosensibilitate, recăderea sindromului de radiație, onicoliză. *RA generale:* oboseală, febră, slăbiciune, astenie, letargie, dureri ale membrelor. *Neurologice:* cefalee, parestezii, modificări de gust, amețeli, insomnie, hiperestezie, encefalopatie, confuzie, ataxie, disartrie, tulburări de echilibru și coordonare. *Cardiovasculare:* edeme, dureri toracice, angină pectorală, IM, IC, stop cardiac, cardiomiopatie, moarte subită, tahicardie, aritmii atriale inclusiv fibrilație atrială, extrasistole ventriculare. *Hepatobiliare:* teste funcționale hepatice anormale, icter, IH, hepatită colestatică. *Hematologice:* scăderea hemoglobinei, neutropenie, trombocitopenie, depresia măduvei osoase și pancitopenie. Evenimente legate de depresia măduvei osoase, compromiterea sistemului imun și/sau leziuni ale mucoaselor în cadrul unor infecții locale sau sistemice fatale (de etiologie bacteriană, virală sau fungică) și sepsis. Modificări ale testelor bio-

chimice de laborator: creșteri ale bilirubinei, fosfatazei alcaline, hiperglicemie. *Altele:* anorexie, deshidratare, dispnee, lăcrimare, conjunctivită, epistaxis, pierderea în greutate, dureri de spate, artralgii, mialgii, iritații ale ochilor și tuse.

CAPTOPRILUM

COD ATC: C09AA01

CAPOCARD® **Tablete** *DAR AL DAWA;* Tb. 25 mg Tb. 50 mg ***(P-6L)***

CAPTOPRIL *MAGISTRA C&C;* Cpr. 25 mg, 50 mg captopril ***(S/P-6L)***

CAPTOPRIL *TERAPIA SA;* Cpr. 25 mg, 50 mg ***(P-6L)***

CAPTOPRIL *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. 25 mg, 50 mg ***(P-6L)***

CAPTOPRIL 100 mg *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd;* Cpr. 100 mg ***(P-6L)***

CAPTOPRIL 12,5 mg *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd;* Cpr. 12,5 mg ***(P-6L)***

CAPTOPRIL 25 mg; CAPTOPRIL 50 mg *BIO EEL;* Cpr. 25 mg, 50 mg ***(P-6L)***

CAPTOPRIL 25 mg *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd;* Cpr. 25 mg ***(P-6L)***

CAPTOPRIL 25 mg *LAROPHARM SRL;* Cpr. 25 mg ***(P-6L)***

CAPTOPRIL 25 mg *ARENA GROUP SA;* Cpr. 25 mg ***(P-6L)***

CAPTOPRIL 50 mg *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd;* Cpr. 50 mg ***(P-6L)***

CAPTOPRIL LPH® 25 mg; CAPTOPRIL LPH® 50 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. 25 mg, 50 mg ***(S/P-6L)***

EUROPRIL *EUROPHARM SA;* Cps. 25 mg ***(S/P-6L)***

FARCOPRIL *PHARCO PHARMACEUTICALS;* Cpr. 25 mg, 50 mg ***(P-6L)***

HYPOTENSOR *FARAN;* Cpr. 25 mg, 50 mg ***(P-6L)***

MED-CAPTOPRIL *MEDIPHARMA SERV;* Cpr. 25 mg ***(P-6L)***

MINITEN 25; MINITEN 50 *THE UNITED PHARMACEUTICAL MFG. CO. Ltd.;* Cpr. 25 mg, 50 mg captopril ***(P-6L)***

RILCAPTON-25 *MEDOCHEMIE Ltd;* Cpr. 25 mg captopril ***(S/P-6L)***

Ind: HTA; IC congestivă; post-IMA; nefropatia diabetică.
Dz: 6,25-25 mg de 2-3 ori/zi, maxim 450 mg/zi, cu o oră înaintea meselor principale. Doza de întreținere se stabilește astfel încât TA sistolică în ortostatism să nu scadă sub 90 mmHg. În IR dozele se calculează în funcție de clearance-ul creatininei.
Cind: Hipersensibilitate la captopril. Antecedente alergice după adm. altor IEC. Sarcină și alăptare. Stenoza bilaterală de arteră renală sau pe rinichi unic funcțional. Hiperpotasemie. Nu se asociază cu săruri de litiu.

A!: În caz de asocieri medicamentoase multiple este necesară supravegherea funcției renale și hematopoieza. La pacienții imunodeprimați. Bolnavi dializați. Pacienți tratați cu diuretice. În IR. Bolnavii cu ateroscleroză cunoscută, cu cardiopatie ischemică și insuficiență circulatorie cerebrală. La copii. La vârstnici. Inițial se adm. medicamentului în doze mici. Prudență în cazul asocierii cu: diuretice antialdosteronice, săruri de potasiu, la pacienții diabetici tratați cu insulină sau sulfamide antidiabetice, AINS, antidepresive triciclice, neuroleptice, medicamente imunosupresoare, glucocorticoizi.
RA: hTA, tuse uscată, obstrucție nazală, disgeuzie, cefalee, astenie, gastralgii, anorexie, greață, dureri abdominale, reacții alergice (prurit, erupții cutanate, edem angioneurotic), IR funcțională, proteinurie, hiperpotasemie, neutropenie sau agranulocitoză, anemie aplastică, colagenoze.

CARBACHOLUM *COD ATC: S01EB02*

MIOSTAT® *ALCON LABORATORIES INC.;* Sol. oft. carbacol 0,1 mg/ml (fl. × 1,5 ml) ***(S)***

Ind: Inducerea miozei în timpul unor intervenții chirurgicale oftalmologice.
Dz: Se instilează 0,5 ml sol. în camera anterioară a globului ocular. Se adm. în doză unică.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului; irite acute.
A!: Exclusiv pt. adm. intraoculară. Prudență la pacienții cu IC acută, astm bronșic, ulcer gastro-duodenal activ, hipertiroidism, spasm al tractului gastrointestinal, obstrucție la nivelul tractului urinar, Parkinson. La copii. A nu se adm. concomitent cu alcaloizi de beladonă, ciclopentolat sau flurbiprofen. În timpul sarcinii și alăptării. Influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
RA: Oculare: opacifiere corneană, keratopatie buloasă persistentă, irită postoperatorie, dezlipire de retină. Sistemice: crize de astm, aritmie cardiacă, hiperemie, transpirație, disconfort epigastric, crampe abdominale, senzație de micțiune frecventă, hTA, sincopă, cefalee.

CARBAMAZEPINUM *COD ATC: N03AF01*

CARBAMAZEPIN *SC SLAVIA PHARM SRL;* Cpr. 200 mg carbamazepină ***(P-6L)***

CARBAMAZEPINĂ 200 *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. 200 mg ***(S/P-6L)***

CARBAMAZEPIN EEL *BIO EEL;* Cpr. 200 mg ***(P-6L)***

CARBAMAZEPINA *OZONE LABORATORIES;* Cpr. 200 mg ***(P-6L)***

CARBAMAZEPINA *ARENA GROUP SA;* Cpr. 200 mg ***(P-6L)***

CARBAMAZEPINA 200 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. 200 mg ***(S/P-6L)***

CARBAMAZEPINA 200 mg *LAROPHARM SRL;* Cpr. 200 mg ***(P-6L)***

CARBAMAZEPINE *TEVA;* Cpr. 200 mg ***(P-6L)***

CARBAVIM *VIM SPECTRUM;* Cpr. 200 mg ***(P-6L)***

CARBEPSIL 200, 400 *HELCOR SRL;* Cpr. 200 mg, 400 mg ***(P-6L)***

FINLEPSIN® *AWD PHARMA;* Cpr. 200 mg ***(P-6L)***

FINLEPSIN® 200 RETARD *AWD PHARMA;* Cpr. ret., 200 mg ***(P-6L)***

FINLEPSIN® 400 RETARD *AWD PHARMA;* Cpr. ret. 400 mg ***(P-6L)***

KARBAPIN *HEMOFARM VRASC;* Cpr. 200 mg ***(P-6L)***

NEUROTOP *GEROT;* Cpr. 200 mg; Cpr. ret. 200 sau 600 mg ***(P-6L)***

STAZEPINE *POLPHARMA;* Cpr. 200 mg carbamazepină ***(P-6L)***

TAVER *MEDOCHEMIE Ltd.;* Cpr. 200 mg ***(S/P-6L)***

TEGRETOL *NOVARTIS PHARMA SERVICES INC.;* Cpr. 200 mg; Cpr. 400 mg; Sirop 100 mg/5 ml (fl. × 250 ml); Sup. 125 mg, 250 mg ***(P-6L)***

TEGRETOL CR 200, CR 400 *NOVARTIS PHARMA SERVICES INC.;* Cpr. film. 200 mg, 400 mg ***(P-6L)***

TIMONIL *DESITIN;* Sirop 100 mg/5 ml (fl × 250 ml) ***(P-6L)***

TIMONIL 150, 300, 600 RETARD *DESITIN.;* Cpr. ret. 150 mg, 300 mg, 600 mg ***(P-6L)***

Ind: Epilepsie. Nevralgie de trigemen sau de glosofaringian. Psihoză maniaco-depresivă. Stări algice din neuropatia diabetică. Sindrom de abstinență la alcoolici. Scleroză multiplă.
Dz: Stabilirea dozei optime se va realiza prin monitorizarea conc. plasmatice a carbamazepinei care trebuie menținută la 4-12 μg/ml, ceea ce corespunde unei doze zilnice de 400-1200 mg, fracționată în 3-4 prize. Doza max. zilnică este de 1600 mg. Dozele se stabilesc în funcție de patologie. Trat. se începe cu doze mici. Doza inițială se crește lent, până la atingerea dozei eficace terapeutic și apoi se continuă cu doza de întreținere. Durata trat. se stabilește în funcție de natura afecțiunii și reactivitatea individuală. La pacienții cu afecțiuni cardio-circulatorii severe, afecțiuni hepatice și renale ca și la vârstnici se recomandă reducerea dozelor. La copii, dozele folosite se stabilesc în funcție de vîrstă și greutate corporală. Preparatele retard nu se adm. copiilor sub 6 ani.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componentele produsului sau la antidepresive triciclice. BAV. Antecedente de hipoplazie medulară. Porfirie acută intermitentă. Afecțiuni hepatice grave. Asocierea cu saquinavir.
A!: În caz de: afecțiuni hematologice; tulburări ale metabolismului sodic; IC, IH, IR; sarcină și alăptare. Nu se recomandă adm. la pacienții cu crize de absență. Se recomandă monitorizarea funcțiilor hematopoietică, hepatică și renală. La pacienții cu afecțiuni cardiovasculare severe, afecțiuni hepatice sau renale, ca și la vârstnici, se recomandă reducerea dozei. Adm. trebuie întreruptă dacă apar reacții alergice cutanate, simptome asemănătoare gripei, alterarea funcției hepatice și febră, angină și/sau modificări ale hemogramei. Prudență la pacienții cu glaucom și retenție de urină. Consumul băuturilor alcoolice trebuie evitat. Atenție în cazul asocierii cu: clozapină, eritromicină, izoniazidă, dextropropoxifen, progestative, litiu, tramadol, acetazolamidă, acid

valproic, blocante ale canalelor de calciu, antidepresive serotoninergice, cimetidină, macrolide, danazol, nicotinamidă, desipramină, primidonă, fenobarbital, fenitoină, teofilină, clonazepam, etosuximidă, tiagabin, alprazolam, glucocorticoizi, ciclosporină, digoxină, tetraciclină, felodipină, anticoagulante cumarinice, desmopresină, chinidină, itraconazol, metoclopramid, antidepresive triciclice, IMAO, diuretice, curarizante antidepolarizante, hormoni tiroidieni. Prudență în perioada de sarcină și alăptare; trat. trebuie menținut cu doze cât mai reduse posibil. Poate afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

RA: La începutul trat.: vertij, cefalee, ataxie, somnolență, fatigabilitate, diplopie, greață, vărsături, diaree sau constipație. În timpul trat. cronic: SNC: vertij, somnolență, sedare, oboseală, ataxie, stări depresive, comportament agresiv, dificultăți de gândire, halucinații și tinitus, mișcări involuntare, fasciculații musculare sau nistagmus, tulburări de vorbire, parestezii, astenie musculară, nevrite periferice, pareze ale membrelor inferioare și modificări ale gustului. Ochi: conjunctivită, tulburări de vedere tranzitorii, tulburări de acomodare, diplopie, opacifierea cristalinului. Aparat locomotor: artralgii, dureri sau contracturi musculare. Tegumente și mucoase: reacții alergice cutanate cu sau fără febră, urticarie, dermatită exfoliativă, sindromul Lyell, fotosensibilitate, eritem exsudativ multiform și nodos, sindromul Steven-Johnson, purpură, LED, alopecie, diaforeză și vasculite. Sistem circulator și limfatic: leucocitoză, eosinofilie, leucopenie, trombocitopenie, agranulocitoza, anemia aplastică, limfadenopatia, splenomegalia. Tract gastro-intestinal: inapetență, uscăciunea gurii, greață, vomă, diaree și constipație, dureri abdominale, stomatită, gingivită, glosită, pancreatită. Ficat și căi biliare: modificarea valorilor testelor hepatice, icter, hepatită. Metabolism și hormoni: hiponatremie, reducerea calcemiei, ginecomastie și galactoree, modificarea parametrilor funcționali tiroidieni. Aparat respirator: hipersensibilitate la nivel pulmonar cu febră, dispnee, congestii pulmonare și fibroze. Aparat uro-genital: proteinurie, hematurie, oligurie; izolat IR, disurie, polachiurie, retenție urinară, disfuncții sexuale. Aparat cardio-vascular: bradicardie, tulburări de ritm și agravarea cardiopatiei ischemice, BAV, uneori sincope și hipo- sau HTA, vasculită, tromboflebită și tromboembolie. Reacții de hipersensibilitate.

CARBAZOCHROMI SALICYLAS

COD ATC: B02BX02

ADRENOSTAZIN *TERAPIA SA;* Sol. apoasă 0,3 mg carbazocrom/ml (f. × 5 ml) Sol. inj. 1,5 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Prevenirea și trat. hemoragiilor chirurgicale sau medicale.

Dz: I.m., s.c. sau i.v. *Adulți:* 1,5 mg de 1-3 ori/zi. În caz de hemoragii intense se utilizează perfuzii a 50 mg adrenostazin în 500 ml sol. izotonică. *Copii sub 15 ani:* 1/2 din doza adultului.

Cind: Hemoragii masive prin ruptură de vase mari.

A!: Sol. i.v. se poate asocia cu sânge, plasmă, substituenți de plasmă. Este incompatibil cu vitamina C. Crește activitatea fibrinolitică a acidului nicotinic. Prudență în perioada de sarcină și alăptare.

RA: Durere la locul injectării.

CARBENICILLINUM

COD ATC: J01CA03

CARBENICILINĂ *ANTIBIOTICE IAȘI*; Pulb. pt. sol. inj., 1 g, 5 g carbenicilină ***(S)***

Ind: Trat. infecțiilor produse de Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, Escherichia coli, Proteus indol-pozitiv și Proteus mirabilis, Morganella.
Dz: Inj. i.m., i.v. lent sau perf. i.v. *Adulți:* 100-600 mg/kg/zi, la 4-6 ore. În IR se folosesc doze mai mici sau se crește intervalul dintre adm. *Copii:* în funcție de greutate, 16,7-75 mg/kg fracționat la 4-8 ore.
Cind: Hipersensibilitate la carbenicilină și alte peniciline.
A!: Poate provoca reacții alergice, inclusiv șoc anafilactic. Trat. îndelungat poate provoca suprainfecții cu germeni rezistenți. În IR se recomandă reducerea dozei și/sau mărirea intervalului dintre doze. Prudență la pacienții cu accidente hemoragice în antecedente. Prudență la pacienții cu tendință la retenție hidrosalină, IC, HTA și IR. A se evita asocierea cu: antibiotice/chimioterapice bacteriostatice, gentamicină și alte aminoglicozide, metotrexat, anticoagulante orale, heparină, trombolitice, antiagregante plachetare. Adm. concomitentă de probenecid determină concentrații plasmatice crescute și prelungite de antibiotic. Poate interfera dozarea glucozei în urină și testul Coombs. Prudență în timpul sarcinii și alăptării.
RA: Reacții alergice, prelungirea TS, neutropenie, creșterea transaminazelor, nefrită interstițială, convulsii, hipernatriemie, hipokaliemie.

CARBIMAZOLUM

COD ATC: H03BB01

CARBIMAZOLE 5 *REMEDICA*; Cpr. film. 5 mg ***(S/P-6L)***

Ind: Hipertiroidism; pregătirea tiroidectomiei în hipertiroidism; pregătirea/tratament concomitent iradierii cu iodo-radioactiv.
Dz: *Adulți:* 30-60 mg/zi, la 8 ore. Dacă apar îmbunătățiri ale stării (observate după 1-3 săpt.), doza este redusă treptat, la cea mai mică cantitate, care va controla boala. Dozele uzuale de întreținere: 5-15 mg/zi. *Copii:* Doza inițială 1,75-1 mg/kg/zi, în doze divizate.
Cind: La mamele care alăptează și la pacienții cu antecedente ale RA.
A!: Pacienții trebuie avertizați să raporteze apariția ulcerațiilor bucale, durerilor în gât, febrei sau înroșirii pielii, simptome care apar în timpul terapiei și care indică anormalități sanguine. În acest caz, tratamentul trebuie oprit și se cere imediat sfatul medicului. Prudență în timpul sarcini: doze ridicate pot cauza gușa fătului și hipertiroidism. Se recomandă întreruperea adm. cu 3-4 săptămâni înaintea nașterii. Dacă apar simptome care sugerează depresia măduvei osoase, adm. se întrerupe. Poate denatura unii parametri ai funcției tiroidiene; se recomandă stabilirea nivelului hormonilor liberi și TSH.
RA: Greață, vomă, dureri gastrice, cefalee, artralgie, înroșirea pielii și prurit. Depresia măduvei osoase, agranulocitoză.

CARBO MEDICINALIS

COD ATC: A07BA
V03AB

CARBO MEDICINALIS *SICOMED SA;* Cpr. carbo medicinalis 403 mg ***(OTC)***

NORIT *NORIT NV;* Cps. 200 mg ***(OTC)***

NORIT CARBOMIX *NORIT NV;* Gran. susp. 50 g/fl; fl. × 500 ml cu capac rotitor și adaptator la adm. ***(S/P-RF)***

Ind: Gastroenterite, dispepsii, flatulență, diarei fetide, intoxicații cu fosfor, arsen, cu alcaloizi și ciuperci, colite de fermentație.
Dz: Oral, 1-2 cpr. de 3-5 ori pe zi, după mese.

CARBOCISTEINUM

COD ATC: R05CB

CARBOCISTEINA *PHARMAPLANT BIOGALENICA;* Sirop 5 g/100 ml carbocisteină (fl. × 100 ml) ***(OTC)***

CONVENIL *DEMO SA;* Sirop 5% (fl. × 150 ml) ***(OTC)***

ESTIVAL *SPECIFAR;* Sirop 5% (fl. × 150 ml) ***(OTC)***

FENORIN *LEK PHARMACEUTICALS;* Sirop 5% (fl. × 120 ml); Sirop 2,5% (fl. × 120 ml) ***(OTC)***

FLUIDOL *TIS FARMACEUTIC;* Sol. orală 2% (fl. × 110 g) ***(P-RF)***; Sol. orală 5% (fl. × 110 g) ***(OTC)***

HUMEX EXPECTORANT, sirop pentru adulți *LABORATOIRES URGO SA;* Sirop 5 g/100 ml (fl. × 125 ml) ***(OTC)***

HUMEX EXPECTORANT, sirop pentru copii și sugari *LABORATOIRES URGO SA;* Sirop 2 g/100 ml (fl. × 125 ml) ***(P-RF)***

MUCOSOL *CTS CHEMICAL IND.;* Sirop 5% (fl. × 110 ml) ***(OTC)***; Cps. 375 mg ***(OTC)***

MUCOTREIS *ECOBI FARMACEUTICI;* Sirop 2 g/100 ml ***(P-RF)***; 5 g/100 ml (fl. × 150 ml) ***(OTC)***

RHINATHIOL 2% pentru copii; 5% pentru adulți *SANOFI~SYNTHELABO;* Sirop 2 g/100 ml, 5 g/100 ml (fl. × 125 ml) ***(P-RF);*** Cps. 375 mg ***(OTC)***

Ind: Trat. tulburărilor secreției bronșice, îndeosebi în afecțiuni bronho-pulmonare acute.
Dz: *Adulți:* 750 mg de 3 ori pe zi. *Copii:* în funcție de vârstă, max. 100 mg de 2-3 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului. Siropul 5% este Cind. la copii sub 15 ani.
A!: Prudență la pacienții cu ulcer gastric sau duodenal. Nu se asociază cu antitusive și/sau cu substanțe antisecretorii. La pacienții cu diabet zaharat se va ține cont de conținutul de zahăr din sirop. Prudență în timpul sarcinii.
RA: Intoleranță digestivă (epigastralgii, greață, diaree).

CARBOPLATINUM

COD ATC: L01XA0Z

CARBOPLATIN *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Sol. inj., 1 fl. conține 50 mg, 150 mg sau 450 mg carboplatină ***(S)***

CARBOPLATINE "EBEWE" *EBEWE PHARMA;* Conc. pt. sol. perf. 50 mg, 150 mg ***(S)***

CARBOPLATIN SINDAN 50 *SINDAN;* Conc. pt. sol. perf. 10 mg/ml (fl. × 15 ml) ***(S)***; Liof. pt. sol. perf. 150 mg ***(S)***

CARBOPLATIN SINDAN 450 *SINDAN;* Conc. pt. sol. perf. 10 mg/ml (fl. × 45 ml) ***(S)***; Liof. pt. sol. perf. 450 mg ***(S)***

CARBOPLATIN SINDAN 50 *SINDAN;* Conc. pt. sol. perf. 10 mg/ml (fl. × 5 ml) ***(S)***; Liof. pt. sol. perf. 50 mg ***(S)***

CICLOPLATIN *LACHEMA;* Sol. inj., 1 fl. conține 50, 150 sau 450 mg carboplatină ***(S)***

Ind: Cancer ovarian avansat, de origine epitelială.
Dz: *Adulți* cu funcție renală normală: 400 mg/m^2 în perf. i.v., 15-60 de minute. Terapia nu va fi repetată decât după patru săpt. La pacienții cu factori de risc doza inițială va fi redusă cu 20-25%. Se va efectua hemoleucograma săpt. La pacienții cu afectare renală dozele se stabilesc în funcție de clearance-ul de creatinină. *Copii:* Dozele se ajustează în funcție de regimul ales și de rezultatele monitorizării hematologice.
Cind: Afecțiuni renale severe. Mielosupresie severă. Hipersensibilitate la carboplatină sau la alți compuși de platină. Sarcină și lactație. Este Cind. folosirea de echipamente ce conțin aluminiu.
A!: Trat. se va face numai când pot fi luate toate măsurile adecvate controlului eventualelor complicații ca: mielosupresie (în particular trombocitopenia), nefrotoxicitate, neurotoxicitate, ototoxicitate, mutagenitate și carcinogenitate. În cazul contactului accidental al pielii sau mucoasei cu soluția deja preparată, zona va fi spălată imediat cu apă și săpun. Atenție în cazul asocierii cu antibiotice aminoglicozidice sau alte medicamente nefrotoxice.
RA: Mielosupresia (leucopenie, trombocitopenie și anemie). Nefrotoxicitatea (reducerea clearance-ului de creatinină, creatinină serică crescută, uree serică și acid uric urinar crescute). Efecte gastrointestinale (greață, vomă, diaree, constipație). Hepatotoxicitate (modificarea testelor hepatice). Ototoxicitate (tinitus și pierderea auzului în banda de frecvențe înalte). Reacții alergice (rash eritematos, febră și prurit). Neurotoxicitate (parestezii și scăderea reflexelor osteotendinoase). Tulburări electrolitice (scăderi de calciu, magneziu și potasiu). Altele: alopecie, sindrom pseudogripal, reacții la locul injectării.

CARNITINUM

COD ATC: A16AA01

CARNIL *ANFARM HELLAS*; Sol. orală 10% carnitină (fl. × 10 ml) ***(P-6L)***

CARNITENE *SIGMA TAU;* Cpr. mast. 1 g; Sol. uz int. 1 g/fl. ***(P-6L)***; Sol. inj. i.v. 1 g/f (f. × 5 ml) ***(P-RF)***; Sol. orală 20% sau 10% (fl. × 10 ml) ***(P-6L)***

EUCAR *SALUS RESEARCHES*; Sol. orală 10% (fl. × 10 ml) ***(P-6L)***

MIOCOR *ECOBI PHARMACEUTICI*; Sol. orală 10% (fl. × 10 ml) ***(P-6L)***

Ind: Deficiențe primare și secundare. Deficiențe nutriționale. Deficiențe secundare hemodializei cronice. Afecțiuni cardiovasculare. Supliment energetic la sportivi.
Dz: Dozele se stabilesc în funcție de afecțiune. *Adulți:* 2-6 g/zi, fracționat în 2 doze. *Copii,* în funcție de vîrstă: 75-150 mg/kg/zi. La adult se începe cu doza de 1 g/zi, iar la copii cu 50 mg/kg/zi. Doza se poate crește apoi lent.
Cind: Hipersensibilitate la produs.
A!: Atenție, în cazul adm. comprimatelor masticabile, la diabeticii tratați cu insulină. Precauție în sarcină.
RA: Tulburări gastrointestinale (grețuri, vărsături, crampe, diaree). Simptome ale miasteniei la pacienții uremici. Reacții alergice.

CARTEOLOLUM

COD ATC: S01ED05

CARTEOL *S.I.F.I. SpA.;* Sol. oft., 1 g/100 ml clorhidrat de carteolol (fl. × 5 ml) ***(P-6L)***; 2 g/100 ml clorhidrat de carteolol (fl. × 5 ml) ***(P-6L)***

Ind: Hipertensiune intraoculară; glaucom cronic cu unghi deschis.
Dz: Inițial o picătură sol. oft. 1% de 2 ori pe zi. Dacă nu se obține efectul terapeutic dorit, se trece la sol. 2%, câte o picătură de 2 ori pe zi. Când se înlocuiește un alt medicament antiglaucomatos, carteololul se adm. împreună cu acesta, timp de o zi, după care celălalt medicament se întrerupe.
Cind: Astm bronșic și BPOC; IC decompensată; șoc cardiogen; BAV de grad II sau III (fără pacemaker); angină pectorală vasospastică; boală sinusală; bradicardie marcată (frecvența < 50/min); afecțiuni vasospastice periferice; feocromocitom netratat; hTA. În caz de hipersensibilitate la oricare din componentele produsului. Perioadă de alăptare.
A!: La copii. La vârstnici. La pacienții tratați cu blocante beta-adrenergice sistemice. La cei cu diabet zaharat tratați cu antidiabetice. La hipertiroidieni. La pacienții cu glaucom cu unghi închis carteololul trebuie adm. în asociere cu miotice. Nu se recomandă utilizarea lentilelor de contact pe durata trat. Este inclus în lista medicamentelor dopante la sportivi. Atenție în cazul asocierii cu: α-blocante, anestezice generale, antiaritmice, antihipertensive, antidiabetice. Precauție la femei însărcinate, la șoferi și la persoane cu activități de precizie.
RA: Locale: Diminuarea secreției lacrimale; iritație oculară cu senzație de arsură și înțepături, fenomene de conjunctivită, blefarită și keratită; tulburări vizuale, diplopie, ptoză palpebrală. Sistemice: bradicardie, dispnee, cefalee, oboseală, greață, scăderea libidoului, erupții cutanate.

CARVEDILOLUM

COD ATC: C07AG02

DILATREND *HOFFMANN LA ROCHE;* Cpr. 6,25 mg; 12,5 mg; 25 mg carvedilol ***(P-6L)***

Ind: IC, asociat medicației de bază.
Dz: 25 mg dimineața și seara. Trat. se începe cu doze mici (3,125 mg dimineața și seara) care se cresc treptat. Trat. nu trebuie întrerupt brusc.

Cind: Hipersensibilitate la unul din componenții preparatului, tulburări de ritm cardiac cu excepția pacienților având pace-maker, tulburări cardiace severe cu insuficiență în stare de repaus, hTA, bradicardie, șoc cardio-vascular, angină instabilă, hipertensiune arterială pulmonară și hipertrofie atrio-ventriculară dreaptă consecutivă, tulburări pulmonare cu insuficiență respiratorie, tulburări funcționale hepatice grave, adm. simultană a IMAO, verapamil, diltiazem. La copii și tineri sub 18 ani.

A!: Atenție în caz de: deteriorare a funcției renale, bronhospasm, intervenții chirurgicale, diabet, purtători de lentile de contact. Atenție în cazul asocierii cu: glicozide digitalice, nitrați organici, antiaritmice, antagoniști de calciu, parasimpatomimetice, simpatomimetice, narcotice și tranchilizante, antidepresive, alcool, anestezice, antimigrenoase, aminofilină, teofilină, anumite antialgice și AINS, preparate hormonale (pe bază de estrogeni), insulină, hipoglicemiante orale, rifampicină, curarizante și cimetidină. Precauție la șoferi și la persoane cu activități de precizie.

RA: Sistem nervos (amețeală, dureri de cap, oboseală, stări depresive, tulburări de somn). Sistem cardiovascular (puls scăzut, hTA, edeme, tulburări ale ritmului cardiac, angină pectorală, tulburări de irigare a membrelor, agravarea IC). Sistem respirator (IR, crize astmatiforme, nas înfundat). Tract digestiv (grețuri, diaree, dureri abdominale, vărsături, constipație). Piele (reacții alergice, descuamare fină). Altele: tulburări de vedere, dureri articulare, scăderea secreției lacrimale, tulburări de sensibilitate, iritație oculară, uscăciune a gurii, tulburări de micțiune, tulburări de dinamică sexuală, scădere a greutății corporale, înrăutățire a funcțiilor renale. Creșterea glicemiei, valorilor colesterolului, scăderea nr. de plachete sanguine și leucocite, creșterea valorilor sanguine ale parametrilor hepatici.

CASPOFUNGINUM

COD ATC: J02AX04

CANCIDAS® 50 mg *MERCK SHARP & DOHME;* Pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 50 mg caspofungin ***(S)***

CANCIDAS® 50 mg *MERCK SHARP & DOHME;* Pulb. pt. sol. perf. 50 mg caspofungin + set transfer ***(S)***

CANCIDAS® 70 mg *MERCK SHARP & DOHME;* Pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 70 mg caspofungin ***(S)***

CASPOFUNGIN® MSD 50 mg *MERCK SHARP & DOHME;* Pulb. pt. sol. perf. 50 mg caspofungin ***(S)***

CASPOFUNGIN® MSD 70 mg *MERCK SHARP & DOHME;* Pulb. pt. sol. perf. 70 mg caspofungin ***(S)***

Ind: Trat. aspergilozei invazive la pacienți adulți refractari sau cu intoleranță la amfotericina B, formulări lipidice ale amfotericinei B și/sau itraconazol. Lipsa de răspuns la tratament a fost definită ca progresie a infecției sau lipsa ameliorării consecutive administrării anterioare timp de minimum 7 zile de dz. terap. dintr-o terapie antifungică eficace.

Dz: După reconstituire și diluare, se administrează în perfuzie i.v. cu ritm lent cu durată de aproximativ 1 oră. Caspofungin nu trebuie amestecat sau perfuzat

simultan cu alte medicamente. NU TREBUIE UTILIZAȚI DILUANȚI CARE CONȚIN GLUCOZĂ. O doză de încărcare unică de 70 mg trebuie administrată în ziua 1, urmată în continuare de 50 mg/zi. La pacienții cu greutate corporală peste 80 kg, după doza inițială de încărcare de 70 mg, se recomandă administrarea de Caspofungin 70 mg zilnic tratamentul trebuie continuat pentru încă 7 zile după dispariția simptomelor.
Cind: Hipersensibilitate la acetatul de caspofungină. Pacienții sub 18 ani.
A!: Administrarea asociată a Caspofungin cu ciclosporină trebuie limitată doar la acei pacienți pentru care beneficiul potențial depășește riscul potențial. În IH medie se scade dz. În IH severă trebuie folosit cu precauție la acești pacienți.
RA: Febră, cefalee, dureri abdominale, durere, greață, diaree, vărsături, valori crescute ale ALAT, ASAT, fosfatazei alcaline, anemie, flebită/tromboflebită, complicații la nivelul venei perfuzate, erupții cutanate, prurit.

CEFACLORUM *COD ATC: J01DA*

CEC *HEXAL AG;* Pulb. susp.; 125 mg/5 ml; fl. cu pulb. pt. 100 ml susp. ***(P-RF)***

CEC® FORTE *HEXAL AG;* Pulb. pt. susp. orală 250 mg/5 ml susp. cefaclor ***(P-RF)***

CEC® FORTE 63 g *HEXAL AG;* Pulb. pt. 60 ml susp. orală 250 mg/5 ml susp. cefaclor ***(P-RF)***

CECLODYNE® 250 mg *SANDOZ/LEK PHARMATECH;* Cps. 250 mg cefaclor; ct. × 1 blist. × 10 cps. sau ct. × 2 blist. × 8 cps. ***(P-RF)***

CECLODYNE® 500 mg *SANDOZ/LEK PHARMATECH;* Cps. 500 mg cefaclor; ct. × 1 blist. × 10 cps. sau ct. × 2 blist. × 8 cps. ***(P-RF)***

CECLODYNE® FORTE 500 mg *SANDOZ/LEK PHARMATECH;* Cps. 500 mg cefaclor

CECLODYNE® 125 mg/5 ml *SANDOZ/LEK PHARMATECH;* Gran. pt. susp., 5 ml susp. conțin 250 mg ***(P-RF)***

CECLODYNE® 250 mg/5 ml *SANDOZ/LEK PHARMATECH;* Gran. pt. susp., 5 ml susp. conțin 125 mg ***(P-RF)***

CECLODYNE® *SANDOZ/LEK PHARMATECH;* Pulb. susp. 5 ml susp. conțin 375 mg ***(P-RF)***

CECLOR® *ELI LILLY;* Pulb. susp. 125 mg/5 ml; Pulb. susp. 250 mg/5 ml ***(P-RF)***

CECLOR® MR *ELI LILLY;* Cpr. retard 375 mg, 500 mg, 750 mg cefaclor ***(P-RF)***

CEFACLOR *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cps. 250 mg, 500 mg ct. × 2 blist. ***(P-RF)***; ct. × 100 blist. ***(S)***

CEFACLOR *ARENA GROUP SA;* Cps. 250 mg fl. × 6 cps. ***(P-RF)*** fl. × 500 cpr. ***(S)***

CEFACLOR 250 mg *OZONE LABORATORIES;* Cps. 250 mg ***(P-RF)***

CEFACLOR 250 mg *EUROPHARM;* Cps. 250 mg; 2 blist. × 10 cps. ***(P-RF)*** 100 blist. × 10 cps. ***(S)***

CEFACLOR „BIOCHEMIE“ *BIOCHEMIE GmbH;* Gran. pt. susp. orală 125 mg/5 ml; 250 mg/ml ***(P-RF)***

CEFAKLOR *HEMOFARM;* Pulb. pt. susp. orală 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 2 blist. x 8 cps. ***(P-RF)***

CLORACEF® 125, 250 *DAR AL DAWA;* Pulb. pt. susp. orală, 5 ml susp. orală conțin 125 mg, 250 mg ***(P-RF)***

CLORACEF® 250 *DAR AL DAWA;* Cps. 250 mg ***(P-RF)***

CLORACEF® FORTE 500 *DAR AL DAWA;* Cps. 500 mg ***(P-RF)***

MEDOCLOR 250, 500 *MEDOCHEMIE Ltd;* Cps. 250 mg, 500 mg ***(P-RF)***

VERCEF 250 mg, 500 mg *RANBAXY LAB.;* Cps. 250 mg, 500 mg ***(P-RF)***

Ind: În trat. infecții ORL, infecții bronho-pulmonare, infecții ale tractului urinar, infecții cutanate și ale țesuturilor moi, infecții osteoarticulare, septicemii produse de germeni sensibili. Infecțiile respiratorii și otita medie supurată cu H. influenzae precum și în infecțiile urogenitale cu E. coli și Proteus mirabilis. **Dz:** *Adulți:* 250-500 mg la 8 ore. Doza poate fi crescută fără a depăși 4 g/zi. *Copii:* 20-40 mg/kg/zi, fracționat în 3 prize, fără a depăși 1 g/zi. În IR doza se adaptează în funcție de clearance-ul creatininei.
Cind: Alergie la cefalosporine sau la oricare dintre componenții produsului.
A!: Prudență la persoanele alergice la peniciline. La bolnavii cu IR, doza trebuie adaptată în funcție de clearance-ul creatininei. Prudență în cazul bolnavilor cu antecedente de colită pseudomembranoasă după trat. cu antibiotice cu spectru larg. Poate da o reacție fals pozitivă la dozarea glucozei în urină. Poate pozitiva testul Coombs. Probenecidul îi favorizează reținerea în organism. A se evita asocierea cefaclorului cu antibiotice aminoglicozidice sau cu diuretice cu acțiune intensă. Se va evita folosirea în timpul sarcinii și în perioada alăptării.
RA: Erupții cutanate, rar sindrom Stevens-Johnson, necroliză toxică a epidermei, anafilaxie. Tulburări digestive: diaree, greață, vărsături, colită pseudomembranoasă, rar hepatită tranzitorie, icter colestatic. Alte reacții adverse: eozinofilie, prurit genital sau vaginite, suprainfecții fungice, trombocitopenie, rareori nefrită interstițială reversibilă.

CEFADROXILUM

COD ATC: J01DA09

BIODROXIL-500 *BIOCHEMIE GmbH;* Cps. 500 mg cefadroxil ***(P-RF)***

CEDROX *HIKMA PH;* Pulb. susp. 250 mg/5 ml ***(P-RF)***

CEFADROXIL 250 mg *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cps. 250 mg ***(P-RF)***

CEFADROXIL 500 mg *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cps. 500 mg ***(P-RF)***

CEXYL 1 g *SANDOZ GmbH/LEK PHARMATECH;* Cpr. disp. 1000 mg *(P-RF)*

CEXYL *SANDOZ GmbH/LEK PHARMATECH;* Cps. 250 mg, 500 mg *(P-RF)*; Pulb. pt. susp. uz int. 125 mg cefadroxil/5 ml susp.; 250 mg/5 ml; 600 mg/5 ml susp. *(P-RF)*

DROXIL *THE UNITED PHARMA;* Pulb. pt. susp. uz int. 250 mg/5 ml *(P-RF)*

DROXIL 500 *THE UNITED PHARMA;* Cps. 500 mg *(P-RF)*

DURACEF *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Cpr. disp. 1 g cefadroxil *(S/P-RF)*; Susp. uz int., 125 mg/5 ml; 250 mg/5 ml (fl. pt. 60 ml susp.) *(S/P-RF)* Cps. 250 mg; 500 mg ct. × 2 blist.; ct. × 10 blist.; fl. × 100 cps. *(S/P-RF)*

ODOXIL *LAB. LUPIN;* Cpr. 250 mg cefadroxil; ct. × 40 cpr. *(P-RF)*; Pulb. susp. 125 mg/ml (fl. cu pulb. pt. 30 ml susp.) *(P-RF)*

Ind: Infecții ale tractului respirator superior și inferior, ale tractului urinar, ale pielii și țesuturilor moi, infecții osteo-articulare produse de microorganisme sensibile.
Dz: Oral. *Copii* cu funcție renală normală: 25-50 mg/kg/zi, max. 100 mg/kg/zi, în doză unică sau fracționată în două doze egale. *Adulți* și *adolescenți* cu funcție renală normală: 1-2 g/zi în doză unică sau fracționate în două adm. egale. În caz de infecții severe doza poate fi crescută sau chiar dublată. În IR dozele și intervalul dintre adm. se adaptează în funcție de clearance-ul la creatinină. Trat. trebuie adm. minim 7-10 zile sau încă 2-3 zile după regresia simptomelor acute.
Cind: Hipersensibilitate la cefalosporine.
A!: Precauție în cazul pacienților cu antecedente de alergie la peniciline, la pacienții cu IR gravă, la persoane cu antecedente de alergie severă sau astm. Se recomandă verificarea frecventă a valorilor hemoleucogramei, precum și efectuarea în mod regulat de teste funcționale renale și hepatice. În cazul prezenței de diaree severă și persistentă trebuie suspectată colita pseudomembranoasă. Pot apărea suprainfecții cu fungi, ca și simptome ale deficitului de vitamina K sau ale deficitului de vitamina B. Pacienții cu afectare gastrointestinală severă nu trebuie tratați cu cefadroxil. Atenție în cazul asocierii cu: antibiotice/chimioterapice bacteriostatice, probenecid, aminoglicozide, polimixina B, colistin, doze mari de diuretice de ansă, anticoagulante, inhibitori ai agregării plachetare. Este posibilă falsa pozitivare a rezultatelor testului Coombs și la determinarea glucozuriei. Prudență în timpul sarcinii și în perioada de alăptare.
RA: Tulburări gastrointestinale (greață, vărsături, diaree, durere abdominală), simptome dermatologice (prurit, exantem alergic sau eritem, urticarie, febră medicamentoasă, dureri articulare sau, rar, angioedem), glosită, vertij, nervozitate, somnolență, reacție alergică imediată, sindrom Stevens-Johnson, eritem multiform, modificări hematologice (eozinofilia, trombocitopenia, leucopenia și neutropenia), creșterea transaminazelor serice.

CEFALEXINUM

COD ATC: J01DA01

CEFALEXIN *SANDOZ GmbH/LEK PHARMATECH;* Cps. 250 mg; 500 mg cefalexină; ct. × 100 blist. *(S)* sau ct. × 1 blist.; 2 blist. *(P-RF);* Cpr. film. 500 mg, Cpr. film. 1000 mg, Pulb. susp. pt. susp. orală 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 375 mg/5 ml ***(P-RF)***, Gran. pt. susp. orală 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml ***(P-RF)***

CEFALEXINĂ *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cps. 250 mg; 500 mg cefalexină; ct. × 2 blist.; 1 blist. ***(P-RF)*** sau ct. × 100 blist. ***(S)***

CEFALEXINE *ARENA GROUP SA*; Cps. 250 mg, fl. × 20 cps. ***(P-RF)*** fl. × 1000 cps. ***(S)***; Cps. 500 mg; fl. × 10 cps. ***(P-RF)***; fl. × 1000 cps. ***(S)***

CEFALIN *EUROPHARM SA;* Cps. 500 mg; ct. × 2 blist. ***(P-RF)***; ct. × 50 blist. ***(S)***

CEPHALEXIN *EUROPHARM SA;* Cps. a 250 mg; ct. × 1 blist. ***(P-RF)***; ct. × 100 blist. ***(S)***

FARMALEXIN *FARMACOM;* Cps. 250 mg ***(P-RF)***

KEFLEX® *ELI LILLY;* Cps. 250 mg; 500 mg ***(P-RF)***; Gran. susp. orală 125 mg sau 250 mg/5 ml; Pulb. susp. 100 mg/ml cefalexină; Cpr. film. 1 g ***(P-RF)***

ORACEF *KRKA d.d.;* Cps. 250 mg; ct. × 16 cps. ***(P-RF);*** ct. × 100 cps. ***(S)***; Cps. 500 mg; ct. × 2 blist. × 8 cps. ***(P-RF)***

OSPEXIN® *SANDOZ GmbH;* Gran. pt. susp. orală 125 mg/5 ml; 250 mg/ 5 ml ***(P-RF)***; Cps. 250 mg; Cpr. film. 500 mg; 1000 mg, ct. × 12 cps. ***(P-RF)***; ct. × 100 blist. × 10 cps. ***(S)***

Ind: Infecții ale aparatului uro-genital, infecții cutanate și ale țesuturilor moi, infecții osteo-articulare, infecții respiratorii, infecții ORL, infecții stomatologice produse de microorganisme sensibile.

Dz: Oral, cu o oră înaintea meselor. *Adulți:* 500 mg la 6 ore fără a depăși 6 g/zi. *Copii:* oral, 25-50 mg/kg/zi, fracționat în 2-4 adm. La sugari și la copii sub 6 ani doza zilnică nu trebuie să depășescă 100 mg/kg/zi. Trat. trebuie continuat 2-5 zile după dispariția simptomatologiei. La pacienții cu IR, doza se adaptează în funcție de clearance-ul creatininei.

Cind: Alergie la cefalosporine.

A!: În caz de: alergice la peniciline, IR, diaree severă și persistentă apărută în timpul trat., la pacienții diabetici. Folosirea necorespunzătoare poate duce la suprainfecții bacteriene sau fungice cu germeni rezistenți. Se recomandă efectuarea antibiogramei înaintea începerii trat. precum și supravegherea hemogramei și funcției hepatice. Atenție la asocieri cu: antibiotice bacteriostatice, probenecid, aminoglicozide, diuretice cu acțiune intensă (furosemid, acid etacrinic). Pot pozitiva testul Coombs și rezultatele dozării glucozei. Pot crește nivelul plasmatic al transaminazelor. Precauție în primul trimestru de sarcină.

RA: Reacții alergice: erupții cutanate, febră, șoc anafilactic, prurit genital cu sau fără candidoză. Tulburări digestive: diaree, greață, vărsături, colită pseudomembranoasă. Alterarea funcției renale. Manifestări hematologice: eozinofilie, trombocitopenie, leucopenie.

CEFALOTINUM

COD ATC: J01DA03

CEFALOTINĂ *ANTIBIOTICE IAȘI;* Pulb. pt. sol. inj. 1 g cefalotină; ct. × 50 fl.; ct. × 100 fl. *(S/P-RF)*

Ind: Infecții bronhopulmonare, ORL și stomatologice, urogenitale, cutanate, osteoarticulare, la nivelul seroaselor, septicemie, endocardită, produse de germeni sensibili.
Dz: *Adulți:* 0,5-1 g la 4-6 ore, în inj. i.m. sau i.v. lent, maxim 12 g/zi. La pacienții cu IR doza se ajustează în funcție de clearance-ul creatininei. *Copii:* 50-100 mg/kg/zi în inj. i.m., fracționat la 4-6 ore, maxim 120 mg/kg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la cefalosporine.
A!: Prudență la pacienții alergici la peniciline, la bolnavii cu IR. Se recomandă supravegherea funcției renale când este necesară asocierea cu antibiotice aminoglicozidice, diuretice cu acțiune intensă sau cu alte medicamente cu potențial nefrotoxic. Folosirea necorespunzătoare poate determina selecționarea unor tulpini rezistente. Prudență la pacienții cu tendință la retenție hidrosalină. Poate modifica rezultatele dozării glucozei în urină și poate pozitiva testul Coombs. Precauție în sarcină și alăptare.
RA: Manifestările alergice (erupții maculo-papuloase, urticarie, prurit, febră, boala serului, șoc anafilactic, eritem polimorf, excepțional sindrom Stevens-Johnson, sindrom Lyell). Creșterea creatininemiei. Nefrită interstițială. Creștere tranzitorie a enzimelor hepatice (transaminaze, LDH, fosfataze alcaline) și bilirubinemiei. Manifestări hematologice (eozinofilie, leucopenie sau trombocitopenie reversibile). Uneori, fenomene de encefalopatie metabolică (stare confuzivă, tresăriri musculare, crize convulsive). Flebite la locul inj. i.v.; durere și indurație la locul inj. i.m.

CEFAMANDOLUM

COD ATC: J01DA07

MANDOL® *ELI LILLY;* Pulb. pt. sol. inj. 500 mg; 1 g; 2 g cefamandol *(S/P-RF)*

Ind: Infecții ale tractului respirator inferior, infecții ale tractului urinar, peritonite, septicemii, infecții ale pielii și structurilor tegumentare, infecții osteoarticulare, cauzate de germeni susceptibili. Profilaxia infecțiilor chirurgicale.
Dz: *Adulți:* 6 g, maxim 12 g, pe zi. *Sugari și copii:* 50 până la 100 mg/kg/zi în doze egale la 4 sau 8 ore. Maxim 150 mg/kg/zi în cazul infecțiilor severe. La pacienții cu IR trebuie adm. o doză redusă și nivelele serice sunt monitorizate îndeaproape.
Cind: Hipersensibilitatea la cefalosporine.
A!: Poate induce hipotrombinemia, rapid reversibilă după adm. vitaminei K. Este recomandată evaluarea stării renale, în special în cazul pacienților grav bolnavi care primesc doze maxime. A nu se consuma concomitent alcool. Precauție la pacienții cu reacții de hipersensibilitate la peniciline sau alte medicamente. Poate determina colită pseudomembranoasă. Precauție în cazul asocierii cu antibiotice aminoglicozidice. Poate determina rezultate fals pozitive ale testului Coombs direct, în cazul testelor pentru determinarea nivelului glucozei în urină, ale testului pentru proteinurie. Precauție în timpul sarcinii și al perioadei de alăptare.

RA: Șoc anafilactic, erupții eritematoase macropapulare, urticarie, eozinofilie și febra medicamentoasă. Scăderea clearance-ului la creatinină. Creșteri tranzitorii ale ureei în sânge. Creșteri tranzitorii ale nivelelor AST, ALT și ALP. Neutropenie. Trombocitopenie, hepatita tranzitorie și icterul colestatic. Durere la locul inj. i.m. Rar, tromboflebită, greață și vărsături.

CEFATRIZINUM

COD ATC: J01DA21

GERTEMYCIN *FARAN;* Cps. 500 mg cefatrizină; ct. × 3 blist. × 4 cps.; Pulb. pt. susp. orală 500 mg/5 ml; fl. cu pulb. pt. 60 ml susp. ***(P-RF)***

SPECICEF-N *SPECIFAR;* Cps. 500 mg ***(P-RF)***

Ind: Infecții ale căilor respiratorii superioare și inferioare, otita medie și sinuzita, infecții ale sistemului urogenital și prostatită, infecții ale pielii și părților moi, produse de germenii sensibili. Recoltarea produselor biologice pentru culturi microbiene se va face înainte de începerea trat.
Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* 750-1500 mg/zi divizate în 2-4 prize. Copii *sub 12 ani:* 20-70 mg/kg/zi divizate în 2-3 prize. Adm. în timpul mesei poate fi avantajoasă. Trat. se continuă cel puțin 2-3 zile după dispariția simptomelor. Pentru pacienții cu IR doza se ajustează în funcție de clearance-ul la creatinină.
Cind: Alergie la cefalosporine.
A!: Bolnavii alergici la peniciline. Poate induce colită pseudomembranoasă. Prudență în timpul sarcinii și alăptării.
RA: Gastrointestinale: diaree, grețuri și vărsături; hipersensibilitate: exantem, prurit, edem angioneurotic, artrită reactivă; alte RA: albuminurie, cefalee, prurit perigenital, moniliaza sistemului genital, vaginită, creșteri ale TGO și TGP.

CEFAZOLINUM

COD ATC: J01DA04

CEFAZOLIN "SANDOZ" *SANDOZ GmbH;* Pulb. pt. sol. inj. 1 g sau 2 g cefazolină ***(S/P-RF)***

CEFAZOLINĂ *EUROPHARM SA;* Pulb. pt. sol. inj. 1 g cefazolină ***(S/P-RF)***

LYZOLIN *M/S LYKA LABS. Ltd.;* Pulb. pt. sol. inj. 1 g cefazolină ***(S/P-RF)***

Ind: Infecții cu microorganisme sensibile localizate la nivelul: aparatului respirator; tractului urogenital; pielii și țesuturilor moi; căilor biliare; sistemului osteoarticular; endocardite; septicemii; profilaxia infecțiilor chirurgicale.
Dz: Inj. i.m./i.v. *Adulți:* 0,5-1,5 g de 2-4 ori pe zi. Maxim 12 g/zi. *Copii în vârstă de peste o lună:* 25-100 mg/kg/zi, fracționat în 3-4 doze. În IR doza se ajustează în funcție de clearance-ul creatininei. Adm. trebuie continuată 2-3 zile după dispariția simptomatologiei.
Cind: Hipersensibilitate la cefalosporine.
A!: Prudență la pacienții cu teren atopic, cu astm bronșic sau febra fânului; la persoanele alergice la peniciline. La pacienții cu IR se recomandă

reducerea dozei sau prelungirea intervalului dintre doze. Prudență la pacienții care prezintă factori de risc pentru deficit de vitamină K. Dacă în timpul trat. apare diaree severă și persistentă, trebuie suspectată apariția colitei pseudomembranoase. Folosirea necorespunzătoare poate duce la selecționarea unor tulpini rezistente. Prudență la pacienții hipertensivi și la cei cu tendință de retenție hidrosalină. Adm. concomitentă de probenecid întârzie eliminarea renală a cefazolinei. Poate modifica rezultatele dozării glucozei în urină și poate pozitiva testul Coombs. Nu se recomandă adm. la femeile gravide sau care alăptează.
RA: Manifestări alergice: rash cutanat, febră, edem angioneurotic, prurit, urticarie, sindrom Lyell, sindrom Stevens-Johnson, prurit vulvar, eozinofilie, nefrită interstițială alergică, anafilaxie. Tulburări hematologice: leucopenie, trombocitopenie, trombocitemie și pozitivarea testului Coombs, rar hipoprotrombinemie. Tulburări renale: creșterea nivelului produșilor de retenție azotată. Tulburări hepatice: creșterea nivelului transaminazelor și fosfatazei alcaline, hepatită colestatică tranzitorie, icter. Tulburări digestive: inapetență, diaree, greață și vărsături, rar colită pseudomembranoasă. Reacții locale: durere sau indurare la locul inj. i.m., flebite la locul inj. i.v. Alte evenimente adverse: prurit genital și anal, candidoză genitală și vaginită.

CEFEPIMUM *COD ATC: J01DA24*

MAXIPIME® *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Pulb. pt. sol. inj., un fl. conține 500 mg, 1 g, 2 g cefepimă ***(S/P-RF)***

Ind: Septicemie și bacteriemie, infecții ale tractului respirator inferior, infecții ale tractului urinar, episoade febrile la pacienții cu neutropenie, infecții biliare, produse de microorganisme sensibile.
Dz: Inj. i.v. sau i.m. profund. *Adulți:* 1-2 g de 2-3 ori/zi. La pacienții cu IR dozele trebuie reduse.
Cind: Alergie la cefalosporine sau la L-arginină.
A!: Apariția oricărei reacții alergice impune întreruperea trat. Prudență la pacienții cu alergie la peniciline. Un episod de diaree poate fi indiciul unei colite pseudomembranoase. Poate determina pozitivarea testului Coombs precum și a unor teste pentru glucozurie. Prudență în cazul adm. la femei însărcinate sau care alăptează.
RA: Diaree, rash, prurit, urticarie, febră, greață, vărsături, candidoză orală, flebită și tromboflebită după adm. i.v.; durere și inflamație la locul de inj. i.m.; cefalee, parestezii, anafilaxie, hTA, vasodilatație, dureri abdominale, colită pseudomembranoasă, ulcerații ale mucoasei bucale, artralgii cu edem, confuzie, amețeală, convulsii, alterarea gustului, tinitus, vaginită. Au fost observate creșteri ale numărului de eozinofile, ale concentrațiilor transaminazelor, modificarea timpului de protrombină și a timpului de tromboplastină parțial activată și scăderea fosfatemiei. Rar, granulocitopenie.

CEFIXIMUM *COD ATC: J01DA23*

EFICEF® 200 mg *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cps. 200 mg cefiximă ***(S/P-RF)***

Ind: În tratamentul infecțiilor bacteriene cu severitate diferită, produse de germeni sensibili la cefiximă dacă terapia pe cale orală este adecvată: bronșite acute și exacerbări ale bronșitei cronice; pneumonii bacteriene; angine și faringite, în special angine recidivante și/sau amigdalite cronice; sinuzite și otite acute; pielonefrite acute fără uropatie; infecții urinare joase complicate sau necomplicate, cu excepția prostatitelor; uretrite gonococice (la bărbați).

Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* 400 mg cefiximă (2 cps.) pe zi, administrată oral, în două prize, la interval de 12 ore. În uretritele gonococice eficacitatea maximă a fost obținută cu o doză unică de 400 mg cefiximă (2 capsule 200 mg). Insuficiența renală severă: doza se ajustează în funcție de clearance-ul creatininei: clearance > 20 ml/minut: nu necesită modificarea dozei; clearance < 20 ml/minut, doza zilnică nu trebuie să depășească 200 mg cefiximă. În infecții bacteriene obișnuite durata tratamentului depinde de evoluția bolii și este, de obicei, 7-10 zile. În infecții produse de streptococi-hemolitici: tratamentul nu se întrerupe mai devreme de 10 zile pentru a preveni complicațiile (reumatism articular acut, glomerulonefrită). În infecții necomplicate ale căilor urinare inferioare: durata recomandată a tratamentului este de 1-3 zile. Suprainfecții și infecții recidivante: durata tratamentului depinde de evoluția bolii; 7-14 zile de tratament sunt considerate suficiente.

Cind: Hipersensibilitate la cefiximă, la alte cefalosporine sau la oricare dintre excipienții produsului.

A!: Se face anamneza atentă a bolnavului înainte de administrare, deoarece poate să apară hipersensibilitate încrucișată la peniciline (tratamentul se urmărește pentru depistarea hipersensibilizării). Dacă apare diaree în timpul tratamentului se poate suspecta apariția colitei pseudomembranoase. În cazul tratamentului cronic sau repetat, pot apărea suprainfecții micotice sau cu bacterii rezistente. Interacțiuni medicamentoase: antibiotice din grupa aminoglicozidelor, polimixina, colistina și diuretice de tipul furosemidei și acidului etacrinic (se monitorizează funcția renală), probenecid, anticoagulante (derivați dicumarinici), antiagregante (de exemplu, acid acetilsalicilic, antiinflamatoare nesteroidiene). Influențarea rezultatelor testelor de laborator: reacții fals pozitive la determinarea cetonelor în urină; reacții fals pozitive la determinarea glicozuriei (dacă se utilizează metode enzimatice); test Coombs fals pozitiv pe perioada tratamentului.

Atentionări speciale: Se utilizează cu prudență la pacienții predispuși la reacții de hipersensibilitate (urticarie, erupții cutanate) sau astm bronșic. La pacienții cu tulburări gastrointestinale în antecedente (ca, de exemplu, colita ulceroasă, colita asociată antibioticelor), trebuie evaluat beneficiul tratamentului față de riscul apariției colitei pseudo-membranoase. Se va utiliza cu prudență la pacienții cu insuficiență renală; în acest caz poate fi necesară adaptarea dozei zilnice, în funcție de clearance-ul creatininei. Se întrerupe alăptatul pe parcursul tratamentului. Pacienții care conduc trebuie avertizați că poate apărea vertij.

CEFONICIDUM *COD ATC: J01DA17*

MONOCID *GLAXO SMITHKLINE;* Pulb. pt. adm. i.m., un fl. conține 1 g cefonicid; ct. × 1 fl. + 1 f. solv. (lidocaină 1%); ct. × 1 fl. + 1 f. solv. (bicarbonat de sodium 4%) ***(S/P-RF)***

Ind: Infecții ale tractului respirator, infecții ale tractului urinar, infecții ale pielii și țesuturilor moi, infecții ale oaselor și articulațiilor, septicemii, gonoree

necomplicată produse de microorganisme susceptibile. Profilaxia infecțiilor chirurgicale.
Dz: Inj. i.m. sau i.v., o singură dată pe zi. *Adulți:* Funcția renală normală: 0,5-2 g o dată/zi. Durata trat. variază în funcție de severitatea infecției. *Copii:* Cu vârsta de *2 ani și peste:* 50 mg/kg, maxim de 2 g pe 24 de ore. La pacienții cu IR se impune reducerea dozei.
Cind: Hipersensibilitate la antibiotice betalactamice.
A!: Soluțiile ce conțin lidocaină nu trebuie adm. i.v. Dozajul trebuie ajustat în IR și la vârstnici. Precauție la pacienții cu dietă hiposodată. Folosirea îndelungată poate duce la selectarea de tulpini de microorganisme rezistente. Precauție în cazul adm. concomitente cu medicamente nefrotoxice, probenecid, alcool. Nu trebuie amestecat cu produse hemoderivate, alte lichide proteice sau cu aminoglicozide. Prudență la copii sub 2 ani și la femei însărcinate.
RA: Durere la locul inoculării. Reacții gastro-intestinale: diaree, colită pseudomembranoasă. Efecte hematologice: leucopenie, pozitivare a testului Coombs și eozinofilie. Efecte hepatice: creșteri tranzitorii ale fosfatazelor alcaline, ALAT, ASAT, GGTP și LDH. Reacții de hipersensibilitate: febră, rash, prurit, eritem, reacții anafilactoide și anafilactice. Efecte renale: niveluri crescute de uree sanguină și de creatinină, rar diminuarea funcției renale.

CEFOPERAZONUM *COD ATC: J01DA32*

CEFOBID *PFIZER INTERNATIONAL CORPORATION;* Pulb. pt. sol. inj. 1 g, 2 g cefoperazonă ***(S/P-RF)***

CEFOZON *E.I.P.I.C.O.;* Pulb. pt. sol. inj. 0,5 g; 1 g cefoperazonă sodică; ct. × 1 fl. ***(S/P-RF)***

MEDOCEF *MEDOCHEMIE Ltd.;* Pulb. pt. sol. inj. 1 g, 2 g cefoperazonă; ct. × 10 fl. ***(S/P-RF)***

Ind: Infecții ale tractului respirator; ale tractului urinar; peritonite, colecistite, colangite și alte infecții intraabdominale; septicemii; meningite; infecții cutanate și ale țesuturilor moi; infecții ale oaselor și articulațiilor; afecțiuni inflamatorii pelviene, infecții ale tractului genital produse de microorganisme susceptibile. Profilaxia infecțiilor postoperatorii.
Dz: Adm. inj. i.m. sau i.v. *Adulți:* 1-4 g/zi adm. în mod egal la 12 ore; în cazuri severe doza se poate crește până la 8-16 g pe zi adm. în mod egal la 8-12 ore. În uretrita gonococică necomplicată 500 mg în doză unică. La pacienții cu IR (filtrare glomerulară sub 18 ml/min, sau creatinină serică peste 3,5 mg/dl) doza max. va fi de 4 g/zi. *Copii:* Sugari și copii mai mari: 50-200 mg/kg/zi în două administrări (la 12 ore).
Cind: La pacienți cu alergie cunoscută la cefalosporine.
A!: Precauție la pacienții cu sensibilitate cunoscută la penicilină. Prudență în caz de obstrucție biliară severă, IH gravă sau IR coexistentă. Dozele de cefoperazonă trebuie adm. după ședința de dializă. Poate determina deficiență de vitamina K. În cazul adm. prelungite se pot dezvolta microorganisme nesusceptibile. Prudență la copiii prematuri și nou-născuți. A nu se consuma alcool în timpul trat. Prudență la femei însărcinate sau care alăptează.

RA: Hipersensibilizare: rash cutanat, urticarie, eozinofilie și febră medicamentoasă. Hematologice: neutropenie, pozitivare a testului Coombs direct, scăderea Ht. sau Hb., eozinofilie tranzitorie și hipoprotrombinemie. Hepatice: creșteri tranzitorii ale nivelelor GOT și GPT și fosfatazei alcaline. Gastrointestinale: diaree. Reacții locale: durere locală în cazul adm. i.m.; flebită la locul perf. i.v.

CEFOTAXIMUM *COD ATC: J01DA10*

CEFANTRAL *LAB. LUPIN;* Pulb. pt. sol. inj. 1 g cefotaximă; ct. × 1 fl. sau 6 fl. ***(P-RF)***

CEFOTAX *E.I.P.I.C.O.;* Pulb. pt. sol. inj. 0,5 g sau 1 g cefotaximă; ct. × 1 fl. + 1 fl. solv. ***(P-RF)***

CEFOTAX T3A *T3A GROUP;* Pulb. pt. sol. inj., 1 fl. conține 0,5 g sau 1 g; ct. × 1 fl. + 1 fl. solv. ***(P-RF)***

CEFOTAXIM *ANTIBIOTICE IAȘI;* Pulb. pt. sol. inj. 1 g ***(P-RF)***

CEFOTAXIME *LEK;* Pulb. pt. sol. inj. 1 g; 2 g cefotaximă; ct. × 1 fl. sau ct. × 5 fl. ***(P-RF)***

CLAFORAN *LAB. ROUSSEL DIAMANT;* Pulb. pt. sol. inj., 1 fl. conține 0,5 g sau 1 g cefotaximă; ct. × 1 fl.+ 1 fl. solv. ***(P-RF)***

LYFORAN 1 g *M/S LYKA LABS;* Pulb. pt. sol. inj. 1 g cefotaximă ***(P-RF)***

NASPOR *GENEPHARM;* Pulb. pt. sol. inj. 1 g cefotaximă ***(P-RF)***

SEFOTAK 0,5 g *ECZACIBASI ILAC;* Pulb. pt. sol. inj. 0,5 g cefotaximă; ct. × 1 fl. + 1 f. solv. ***(P-RF)***

SEFOTAK 1 g *ECZACIBASI ILAC;* Pulb. pt. sol. inj. 1 g cefotaximă; ct. × 1 fl. + 1 f. solv. ***(P-RF)***

SPIROSINE *FARAN;* Pulb. pt. sol. inj. 1 g cefotaximă; ct. × 1 fl. + 1 f. solv. ***(P-RF)***

Ind: Infecții ale aparatului respirator, urinar, ORL, septicemii, endocardite, meningite, infecții ale oaselor și articulațiilor, ale pielii și țesuturilor moi, infecții abdominale și ginecologice, cauzate de microorganisme sensibile.
Dz: Inj. i.v. lent sau i.m. *Adulți și copii peste 12 ani:* 1 g la 12 ore. Doza poate fi crescută până la max. 12 g/zi. Nou-născuți și sugari: 50-100 mg/kg/zi, fracționat la intervale de 6-12 ore. Prematuri: max. 50 mg/kg/zi. În IR doza va fi ajustată după gradul disfuncției.
Cind: Hipersensibilitate la cefalosporine.
A!: Precauție la cei cu hipersensibilitate la penicilină și alți alergeni, în timpul sarcinii, la mamele care alăptează, la pacienții cu o disfuncție renală gravă și la cei cu boli gastrointestinale.
RA: Reacții alergice cutanate, tulburări gastrointestinale (colită pseudomembranoasă), cefalee, trombocitopenie, leucopenie tranzitorie, eozinofilie și neutropenie, creșteri temporare ale valorilor GOT, GPT, fosfatazei alcaline și ale azotului ureic în sânge.

CEFPIROMUM

COD ATC: J01DA37

CEFROM *LAB. AVENTIS PHARMA;* Pulb. pt. sol. inj./perf. 500 mg; 1000 mg; 2000 mg cefpirom; ct. × 1 fl.; 1 fl. + 1 f. solv. ***(S/P-RF)***

Ind: Infecții ale tractului respirator inferior; infecții ale tractului urinar inferior și superior; infecții ale pielii și țesuturilor moi; bacteriemii/septicemii; infecții la pacienți neutropenici; infecții severe produse de germeni sensibili.
Dz: Adm. inj. i.v. sau perf. i.v. *Adulți și adolescenți:* 1-2 g la 12 ore. Doza trebuie redusă la pacienții cu funcție renală afectată. Nu trebuie amestecat în aceeași seringă cu alte antibiotice.
Cind: Hipersensibilitate la cefalosporine.
A!: Precauție în cazul diatezei alergice, în special a hipersensibilității la antibiotice betalactamice. Diareea, severă sau/și persistentă, apărută în timpul trat. poate fi simptomul unei afecțiuni cu Clostridium difficile, cea mai severă formă fiind colita pseudomembranoasă. Dozarea trebuie adaptată în funcție de clearance-ul creatininei. Atenție în cazul asocierii cu aminoglicozide sau cu diuretice de ansă. Se va opri trat. în caz de neutropenie. Probenecidul crește conc. plasmatică a cefalosporinelor. Nu trebuie folosit în timpul sarcinii sau în perioada de alăptare.
RA: *Reacții anafilactice:* angioedem, bronhospasm, stare de rău, șoc anafilactic. *Cutanate:* rash, prurit, urticarie, eritem multiform, sindrom Stevens-Johnson, necroliza epidermală toxică. *Gastrointestinale:* grețuri, vărsături, dureri abdominale, diaree, enterocolite, colită pseudomembranoasă. *Hepatice:* creșterea ALAT, ASAT, fosfatazei alcaline, LDH și a bilirubinei. *Hematologice:* neutropenie, agranulocitoză. *Renale:* ceșteri ale ureei și creatininei serice, nefrită interstițială, rar IR. *Neurologice:* encefalopatie reversibilă. *Reacții locale:* Iritație inflamatorie a căii venoase și durere la locul injectării. *Altele:* cefalee, febră, perturbări ale gustului sau mirosului. *Infecții secundare:* dezvoltarea organismelor nesusceptibile, inclusiv moniliaza (candidiaza).

CEFPROZILUM

COD ATC: J01DA41

CEFZIL 125 mg/5 ml *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Pulb. pt. susp. orală. 125 mg cefprozil/5 ml; fl. pt. 60 ml; fl. pt. 100 ml ***(P-RF)***

CEFZIL 250 mg *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Cpr. film. 250 mg cefprozil; ct. × 1 blist.; ct. × 2 blist. ***(P-RF)***

CEFZIL 250 mg/5 ml *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Pulb. pt. susp. orală 250 mg cefprozil/5 ml; fl. pt. 60 ml; fl. pt. 100 ml ***(P-RF)***

CEFZIL 500 mg *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Cpr. film. 500 mg cefprozil; ct. × 1 blist.; ct. × 2 blist. ***(P-RF)***

Ind: Trat. infecțiilor produse de bacterii sensibile la cefprozil: *Adulți:* faringite, amigdalite și sinuzite, bronșite acute și cronice și pneumonii. Infecții cutanate. Infecții necomplicate ale tractului urinar incluzând cistite acute. *Copii:* faringite, amigdalite, otite medii și sinuzite. Infecții necomplicate cutanate.
Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* Infecții ale tractului respirator superior: 500 mg, în priză unică. Sinuzite: 250-500 mg, în priză unică. Infecții ale tractului respi-

rator inferior: 1000 mg, fracționat în două prize. Infecții necomplicate ale tractului urinar: 500 mg, în priză unică. *Copii între 6 luni și 12 ani:* Otite medii: 15 mg/kg la 12 ore. Faringite și amigdalite: 20 mg/kg la 24 ore. Sinuzite: 7,5-15 mg/kg la 12 ore. Infecții cutanate: 20 mg cefprozil/kg la 24 ore Trat. inf. produse de streptococul α-hemolitic se va face 10 zile. Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții cu I.H. *Pacienți cu I.R:* Nu este necesară o ajustare a dozei la pacienții cu clearance-ul creatininei > 30 ml/min. Pentru pacienții cu clearance al creatininei = 30 ml/min, după administrarea primei dz. std. se administrează în continuare doze reduse la ½ față de pacienții cu funcție renală normală.

Cind: Hipersensibilitate la cefprozil, alte cefalosporine, sau la oricare dintre excipienții produsului.

A!: Dacă acest medicament se administrează la pacienții alergici la penicilină, este necesară prudență deoarece există alergii încrucișate între antibioticele beta-lactamice. În cazul apariției unei reacții alergice la Cefprozil, se va întrerupe imediat administrarea produsului și se va institui tratamentul necesar. Trat. poate duce la apariția colitei pseudomembranoase, a cărei gravitate poate fi variabilă; existența unei colite pseudomembranoase trebuie avută în vedere la pacienții care prezintă diaree ca urmare a administrării agenților antibacterieni. Trebuie administrat cu prudență la pacienții care primesc un tratament concomitent cu diuretice de ansă, deoarece acestea pot fi nefrotoxice. Atenție la pacienții cu antecedente de tulburări gastrointestinale. Siguranța și eficacitatea la copii sub 6 luni nu au fost stabilite.

RA: Diaree, greață, vărsături și dureri abdominale, amețeală, rash și suprainfecții, prurit genital și vaginite.

CEFTAZIDIMUM

COD ATC: J01DA11

CEFTAMIL® *ANTIBIOTICE IAȘI;* Pulb. pt. sol. inj. 0,5 g, 1 g, ***(S/P-RF)***

CEFTIDIN 1 g *M/S LYKA LABS;* Pulb. pt. sol. inj. 1 g ***(S/P-RF)***

CETAZIME 1 g *T3A PHARMA GROUP;* Pulb. pt. sol. inj. 1 g; ct. × 1 fl. + 1 f. solv. × 5 ml ***(S/P-RF)***

CETAZIME 2 g *T3A PHARMA GROUP;* Pulb. pt. sol. inj. 2 g; ct. × 1 fl. + 1 f. solv. × 5 ml ***(S/P-RF)***

FORTUM® *GLAXO SMITHKLINE;* Pulb. pt. sol. inj. 500 mg; 1 g ceftazidime ***(S/P-RF)***

KEFADIM *ELI LILLY AND COMPANY;* Pulb. pt. sol. inj. 2 g ceftazidime ***(S/P-RF)***

KEFADIM 1 g *ELI LILLY AND COMPANY;* Pulb. pt. sol. inj. 1 g ceftazidime ***(S/P-RF)***

Ind: Infecții ale tractului respirator inferior, infecții ale pielii, infecții ale tractului urinar, infecții osoase și articulare, infecții ginecologice, infecții intraabdominale, infecții ale SNC, cauzate de tulpini susceptibile ale unor germeni patogeni.

Dz: Inj. i.v. *Adulți:* 1-6 g/zi adm. fracționat la 8-12 ore. Nou-născuți (0-4 săptămâni): 30 mg/kg, la 12 ore. *Sugari și copii* (1 lună-12 ani): 30-50 mg/kg,

max. 6 g/zi, i.v., fracționat la fiecare 8 ore. În cazul pacienților cu IR se recomandă ca dozele să fie reduse.
Cind: Hipersensibilitate la cefalosporine.
A!: Precauție la pacienții cu hipersensibilitate de tip I la penicilină și cefalosporine. Poate determina apariția colitei pseudomembranoase. Precauție în cazul asocierii cu medicamente nefrotoxice (aminoglicozide sau diuretice puternice). Poate determina pozitivarea testului Coombs precum și rezultate fals pozitive la determinarea glucozei urinare. Precauție la femei însărcinate sau care alăptează.
RA: Prurit, eritem, febră, flebite și inflamație la locul inj., diaree, greață, vărsături, dureri abdominale, cefalee, amețeli, parestezii, candidoze și vaginite, angioedem și reacții anafilactice. Eozinofilii și trombocitoze tranzitorii, creșterea ASAT, ALAT, LDH și fosfatazei alcaline. Creșteri ale valorilor serice ale ureei, azotului și creatininei. Rar, leucopenie, neutropenie, agranulocitoză, trombocitopenie și limfocitoză.

CEFTIBUTENUM

COD ATC: J01DA39

CEDAX *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Cps. 400 mg ceftibuten; ct. × 5 blist. × 1 cps. ***(P-RF)***; Pulb. pt. susp. orală 36 mg/ml ceftibuten ***(P-RF)***

Ind: Infecții ale căilor respiratorii superioare și inferioare, infecții ale tractului urinar, enterite și gastroenterite, cauzate de microorganisme sensibile.
Dz: *Adulți:* 400 mg zilnic, în priză unică sau fracționat la 12 ore. În caz de IR cu clearance creatininic mai mic de 50 ml/min doza trebuie redusă. *Copii* (vârste *sub 10 ani*): 9 mg/kg/zi (max. 400 mg/zi), oral, în doză unică sau fracționat la fiecare 12 ore.
Cind: Alergie la cefalosporine sau la oricare din componente.
A!: Necesită ajustarea dozei la pacienții cu IR precum și la cei supuși dializei. Precauție la pacienții cu istoric de boală gastrointestinală complicată, în special la cei cu colită cronică. Precauție la pacienții cu alergie la peniciline. Poate induce alterarea florei intestinale și apariția diareei inclusiv colita pseudomembranoasă datorată toxinei Clostridium difficile. Siguranța și eficacitatea la sugarii mai mici de șase luni nu a fost stabilită. Prudență la femeia însărcinată sau pe perioada nașterii.
RA: Greață, diaree, dispepsie, gastrită, vomă, durere abdominală, cefalee, manifestări clinice asemănătoare bolii serului; foarte rar diaree asociată cu Clostridium difficile; convulsii; modificări de laborator: scăderea hemoglobinei, leucopenie, eozinofilie și trombocitoză; creșteri ale AST, ALT și LDH; hiperbilirubinemie, test Coombs direct pozitiv. Reacții alergice, incluzând anafilaxie, sindrom Stevens-Johnson, eritem multiform, epidermoliză necrotică toxică, suprainfecție, disfuncție renală, nefropatie toxică, anemie aplastică, anemie hemolitică și hemoragie.

CEFTRIAXONUM

COD ATC: J01DA13

CEFORT® *ANTIBIOTICE IAȘI;* Pulb. pt. sol. inj. 250 mg, 500 mg, 1 g, 2 g ***(S/P-RF)***

CEFOTRIX 1 g *T3A PHARMA GROUP;* Pulb. pt. sol. perf. 1 g ceftriaxonă ***(S/P-RF)***

CEFTRIAXON 1 g, 2 g *ANTIBIOTICE IAȘI;* Pulb. pt. sol. inj. i.v./i.m. 1 g, Pulb. pt. sol. inj. 2 g ***(S/P-RF)***

CEFTRIAXON 250 mg, 500 mg *ANTIBIOTICE IAȘI;* Pulb. pt. sol. inj. i.v./i.m. 250 mg ct. × 1 fl. sau ct. × 50 fl., Pulb. pt. sol. inj. 500 mg ***(S/P-RF)***; ct. × 100 fl. ***(S)***

CEFTRIAXONE/GENEFHARM 1 g *GENEPHARM SA;* Pulb. pt. sol. inj. 1000 mg cefriaxonă ***(S/P-RF)***

LENDACIN *LEK PHARMACEUTICALS;* Pulb. pt. sol. inj. 250 mg; 1 g ceftriaxonă; ct. × 5 fl. ***(S/P-RF)***

NEVAKSON 1 g i.m *MUSTAFA NEVZAT ILAC;* Pulb. sol. inj. 1000 mg ***(S/P-RF)***

NEVAKSON 500 mg i.m. *MUSTAFA NEVZAT ILAC;* Pulb. sol. inj. 500 mg ceftriaxonă ***(S/P-RF)***

NOVOSEF® 0,5 g i.m. *ECZACIBASI ILAC;* Pulb. pt. sol. inj. i.m. 500 mg; fl. + f. solv. × 3,5 ml ***(S/P-RF)***

NOVOSEF® 1 g i.m. *ECZACIBASI ILAC;* Pulb. pt. sol. inj. i.m. 1 g; fl. + f. solv. × 3,5 ml ***(S/P-RF)***

NOVOSEF® 0,5 g i.v. *ECZACIBASI ILAC;* Pulb. pt. sol. inj. i.v./perf. i.v. 500 mg; fl.+ f. solv. × 5 ml ***(S/P-RF)***

NOVOSEF® 1 g i.v. *ECZACIBASI ILAC;* Pulb. pt. sol. inj. i.v./perf. i.v. 1 g; fl. + f. solv. × 10 ml ***(S/P-RF)***

OFRAMAX 1 g *RANBAXY LAB.;* Pulb. pt. sol. parent. 1 g ***(S/P-RF)***

OFRAMAX 250 mg *RANBAXY LAB.;* Pulb. pt. sol. parent. 250 mg ***(S/P-RF)***

RACEXON 1 g *GLAXO SMITHKLINE.;* Pulb. pt. sol. parent. 1 g ***(S/P-RF)***

ROCEPHIN *HOFFMANN LA ROCHE;* Pulb. pt. sol. inj. 500 mg; 1 g ceftriaxonă ***(S/P-RF)***

SAMIXON *HIKMA PH;* Pulb. pt. sol. inj. 500 mg ceftriaxonă ***(S/P-RF)***

Ind: Infecții ale tractului respirator, infecții ORL, infecții ale pielii și ale țesuturilor moi, ale tractului urinar, gonoree necomplicată, infecții pelvine, infecții intraabdominale, infecții osteo-articulare, septicemie, meningită, produse de microorganisme sensibile. Profilaxia infecțiilor chirurgicale.
Dz: Inj. i.m. sau i.v. *Adulți:* 1-4 g/zi, într-o singură inj. (sau fracționat în 2 doze egale). În infecțiile gonococice necomplicate, se recomandă o doză unică de 250 mg. *Copii:* 50-100 mg/kg/zi, fără a depăși 4 g, adm. o dată sau fracționat în 2 inj., la interval de 12 ore. Tratamentul trebuie continuat cel puțin 2 zile după dispariția semnelor de infecție. În IR severă, sau la cei cu IR și IH, doza nu trebuie să depășească 2 g/zi.
Cind: Hipersensibilitate la cefalosporine; hipersensibilitate la anestezice locale de tip amidic, porfirie, BAV, șoc cardiogen.

AI: Prudență la pacienții alergici la peniciline. Diareea severă și persistentă apărută în timpul tratamentului impune întreruperea administrării antibioticului; trebuie suspectată colita pseudomembranoasă. Poate determina scăderea timpului de protrombină. Poate determina selecționarea unor tulpini rezistente. Nu trebuie administrată la nou-născuții cu hiperbilirubinemie. Prudență la pacienții care au tendință la retenție hidrosalină. Prudență în cazul asocierii cu: diazepam, furosemid, ciclofosfamidă, dexametazonă, cloramfenicol. Pozitivează rareori testul Coombs și determinarea galactozemiei. Prudență la femeile gravide sau care alăptează.

RA: La locul inj. i.m. pot să apară durere și indurație. Au fost raportate: reacții de hipersensibilitate, diaree, creșterea nivelului transaminazelor și a ureei plasmatice; tulburări hematologice - eosinofilie, trombocitoză și leucopenie.

CEFUROXIMUM

COD ATC: J01DA06

AXETINE *MEDOCHEMIE Ltd.;* Pulb. pt. sol. inj. 250 mg; 750 mg; 1,5 g cefuroximă; ct. × 1 fl. sau 10 fl. ***(S/P-RF)***; ct. × 100 fl. ***(S)***

AXYCEF 125 mg; 250 mg, 500 mg *SANDOZ GmbH/LEK PHARMATECH;* Cpr. acop. 125 mg, 250 mg, 500 mg ***(P-RF)***

AXYCEF 125 mg/5 ml *SANDOZ GmbH/LEK PHARMATECH;* Pulb. pt. susp. orală ***(P-RF)***

CEFUROXIM *EUROPHARM;* Cps. 250 mg; 1 blist. × 10 cps. ***(P-RF)***

CEFUROXIMA *ARENA GROUP SA;* Cps. 250 mg; fl. × 10 cps. ***(P-RF)***; fl. × 1000 cps. ***(S)***

CEFUROXIME "SANDOZ" *SANDOZ GmbH;* Pulb. pt. sol. inj./perf., un fl. conține 750 mg sau 1500 mg; ct. × 1 fl; 5 fl.; 10 fl.; 25 fl.; 50 fl. ***(S/P-RF)***; ct. × 100 fl. ***(S)***

CEFUROXIME PANPHARMA *PANPHARMA;* Pulb. pt. sol. inj., un fl. conține 750 mg sau 1500 mg; ct. × 1 fl; 5 fl.; 10 fl.; 25 fl.; 50 fl. ***(S/P-RF)***

LIFUROX® *ELI LILLY;* Pulb. pt. sol. inj. 750 mg; 1500 mg cefuroximă ***(S/P-RF)***

MAXIL 1500 *L. FOURNIER;* Pulb. pt. sol. perf. 1500 mg cefuroximă; ct. × 1 fl. sau 10 fl. ***(S/P-RF)***

MAXIL 750 *L. FOURNIER;* Pulb. pt. sol. perf. 750 mg cefuroximă; ct. × 1 fl. sau 10 fl. ***(S/P-RF)***

VEKFAZOLIN *FARAN;* Pulb. inj. 750 mg ***(S/P-RF)***

ZILISTEN *DEMO;* Pulb. inj. 750 mg ***(S/P-RF)***

ZINACEF *GLAXO SMITHKLINE;* Pulb. inj. 750 mg; 1,5 g cefuroximă; Granule pt. susp. orală, 125 mg/5 ml susp.; fl. pt. 50 ml susp. ***(P-RF)***

ZINNAT *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. 125 mg; 250 mg; 500 mg cefuroximă; ct. × 10 cpr. film. ***(P-RF)***

ZINNAT *GLAXO SMITHKLINE;* Gran. pt. susp. orală 125 mg/5 ml ***(P-RF)***

Ind: *Adm. int.:* angine, faringite, amigdalite, otite medii acute la copii. *Adm. inj.:* infecții ale tractului respirator, tractului urinar, infecții ORL, infecții ale pielii și ale țesuturilor moi, infecții osteo-articulare, infecții obstetricale și ginecologice, gonoree, septicemie, meningite produse de microorganisme sensibile. Profilaxia infecțiilor chirurgicale.
Dz: *Oral: Copii și sugari mai mari de 3 luni:* 20-30 mg/kg/zi (max. 500 mg/zi) în două prize; după mese. *Inj.: Adulți și adolescenți (peste 12 ani):* 750-1500 mg la intervale de 8 ore, inj. i.m. sau i.v. (soluția); max. 6 g zilnic. *Sugari și copii:* 30-240 mg/kg/zi, fracționat în 3-4 injecții. *Nou-născuți:* 30-100 mg/kg/zi, fracționat în 2-3 adm. Gonoree: inj. i.m. o doză unică de 1500 mg. Trat. trebuie continuat cel puțin 3 zile după scăderea febrei și dispariția celorlalte simptome. La pacienții cu IR doza trebuie redusă.
Cind: Hipersensibilitate la cefalosporine.
A!: Prudență la pacienții alergici la peniciline. La bolnavii cu IR doza se adaptează în funcție de clearance-ul creatininei. Se recomandă supravegherea funcției renale când se asociază cu antibiotice aminoglicozidice, diuretice cu acțiune intensă sau cu alte medicamente cu potențial nefrotoxic. Poate determina selecționarea de tulpini bacteriene rezistente. În timpul trat. poate să apară diaree severă și persistentă (impune întreruperea adm.); trebuie suspectată colita pseudomembranoasă. Prudență la pacienții cu tendință la retenție hidrosalină, la pacienții diabetici și la copii sub 3 luni. Atenție în cazul asocierii cu: blocante H1, antiacidele, antibiotice bacteriostatice, antibiotice aminoglicozidice, diuretice cu acțiune intensă. Poate modifica rezultatele dozării glucozei în urină (prin met. reducătoare) și poate pozitiva testul Coombs. Precauție la femei însărcinate, în special în primul trimestru, și în perioada de alăptare.
RA: Manifestări alergice: erupții papuloase, urticarie, prurit, febră, boala serului, șoc anafilafilactic, eritem polimorf, excepțional sindrom Stevens-Johnson, sindrom Lyell. Tulburări digestive: dureri abdominale, greață, vărsături, inapetență, diaree, rar colită pseudomembranoasă. Tulburări hepatice și renale: creșterea transaminazelor, LDH, bilirubinemiei, fosfatazei alcaline, creatininemiei. Manifestări hematologice: eozinofilie, anemie, leucopenie și neutropenie reversibile. Nefrotoxicitate: afectarea funcției renale (mai ales în cazul asocierii cu antibiotice aminoglicozidice sau cu diuretice cu acțiune intensă). Tulburări SNC: tulburări ale stării de conștiență, mișcări anormale, crize convulsive, stupoare. Fenomene locale: flebită la locul inj. i.v., durere și indurație la locul inj. i.m.

CELECOXIBUM

COD ATC: M01AH01

CELEBREX 100 mg *PFIZER H.C.P. CORPORATION;* Cps. 100 mg celecoxib; ct. × 1 blist.; 2 blist.; 3 blist. × 10 cps. ***(P-6L)***

CELEBREX 200 mg *PFIZER H.C.P. CORPORATION;* Cps. 200 mg celecoxib; ct. × 1 blist.; 2 blist.; 3 blist. × 10 cps. ***(P-6L)***

Ind: Trat. simptomatic al bolii artrozice și poliartritei reumatoide.
Dz: *Int.:* Boală artrozică: 200 mg de 1-2 ori/zi. Poliartrita reumatoidă: 200-400 mg/zi, în 2 prize. La pacienții cu IH moderată trat. trebuie inițiat cu 1/2 din doza recomandată.
Cind: Hipersensibilitate la celecoxib sau la oricare dintre componentele produsului; hipersensibilitate la sulfonamide; pacienții cu astm bronșic, rinită acută, polipoză nazală, edem angioneurotic, urticarie sau alte reacții alergice după adm. de acid acetilsalicilic sau alte AINS; ulcer gastroduodenal activ sau hemoragii gastrointestinale; boli inflamatorii intestinale; IC congestivă severă; IH severă; IR; sarcină; alăptare; femei aflate la vârsta fertilă, în lipsa unei metode contraceptive eficace.
A!: Prudență la pacienții cu antecedente de boli gastrointestinale sau la pacienții cu risc de apariție a acestor tulburări; la pacienții cu antecedente de IC, disfuncție ventriculară stângă, HTA, edeme preexistente; la pacienții tratați cu diuretice sau care prezintă risc de hipovolemie; la vârstnici. Femeile aflate la vârsta fertilă trebuie sfătuite să utilizeze metode contraceptive alternative contraceptivelor orale. Precauție în cazul asocierii cu: anticoagulante cumarinice, diuretice, anti-HTA, IEC, ciclosporină sau tacrolimus, dextrometorfan, antidepresive, neuroleptice, antiaritmice, metotrexat, litiu, fluconazol, rifampicină, carbamazepină, barbiturice. Precauție la șoferi și persoane cu activități ce necesită precizie.
RA: Generale: edem periferic/retenție hidrosalină. Gastrointestinale: dureri abdominale, diaree, dispepsie, flatulență, ulcerații duodenale, gastrice și esofagiene, disfagie, perforații intestinale, esofagită, melenă, hemoragii gastrointestinale, pancreatită acută, constipație, eructații, gastrită, stomatită, vărsături. Hepatice: disfuncție hepatică, creșterea TGO și TGP, hepatită, icter. Sistem nervos: amețeli, insomnie, hipertonie, parestezie, ataxie. Organe de simț: tulburări de vedere, alterarea gustului. Psihiatrice: anxietate, depresie, confuzie. Respiratorii: faringită, rinită, sinuzită, infecții ale tractului respirator superior, tuse, dispnee, bronhospasm. Cutanate: rash, urticarie, alopecie, fotosensibilitate, cazuri izolate de afecțiuni cutanate exfoliative, cum sunt sindromul Stevens-Johnson, necroliza epidermică, eritemul multiform. Sanguine: anemie, leucopenie, trombocitopenie, pancitopenie. Cardiovasculare: HTA, palpitații, IC, IM. Tulburări renale și urinare: disfuncție renală (creșterea creatininemiei și uremiei, hiperpotasemie), IRA. Reacții alergice: reacții alergice severe, șoc anafilactic, angioedem, vasculită, miozită. Altele: crampe ale membrelor inferioare, tinitus, oboseală, infecții urinare.

CELIPROLOLUM *COD ATC: C07AB08*

CELIPRES *RANBAXY LAB.;* Cpr. film. 100 mg, 200 mg ***(P-6L)***

CELIPROL® 100; CELIPROL® 200 *LECIVA;* Cpr. film. 100 mg, 200 mg celiprolol ***(P-6L)***

Ind: HTA, în monoterapie sau în asociere cu alte antihipertensive; profilaxia crizelor de angină pectorală.
Dz: 200 mg/zi, în priză unică. Doza zilnică poate fi crescută după câteva săptămâni la 400 mg sau, treptat, până la maximum 600 mg, în funcție. de răspunsul terap. În IR dz. trebuie redusă la 100 mg/zi. Tratamentul este de lungă durată. Se recomandă administrarea medicamentului dimineața pe sto-

macul gol, cu cel puțin 30 min înainte de mese sau la cel puțin 2 ore după mese. Cpr. film. trebuie înghițite întregi, cu apă.

Cind: Hipersensibilitate la celiprolol sau la oricare dintre excipienții produselor; BAV de grad mare (II sau III); șoc cardiogen; bradicardie (sub 45-50 bătăi/min); boală de nod sinusal; bloc sinoatrial; insuficiență cardiacă care nu răspunde la tratamentul specific; angină Prinzmetal; hTA; formele severe de astm bronșic și bronhopneumopatie cronică obstructivă; formele severe de sindrom Raynaud și afecțiuni vasculospastice; feocromocitom netratat; antecedente de reacții anafilactice. Nu se recomandă adm. la copii.

Asocieri Cind: Floctafenină, sultopridă.

A!: Nu se recomandă utilizarea medicamentului în tratamentul HTA secundare provocată de feocromocitom (necesită monitorizarea tensiunii arteriale). Este posibilă administrarea de beta-blocante în feocromocitom după realizarea alfa-blocării. Pacienții cu I.R. necesită ajustarea dozelor în funcție de clearance-ul creatininei. Tratamentul nu trebuie întrerupt brusc la bolnavii cu insuficiență coronariană. Întreruperea bruscă a trat. cu beta-blocante la pacienții cu cardiopatie ischemică poate agrava angina, poate declanșa aritmii severe sau chiar poate provoca infarct miocardic acut sau moarte subită. La întreruperea trat. dz. trebuie redusă treptat pe o perioadă de 1-2 săpt. La nevoie, este necesară adm. concomitentă a unui alt antianginos. La pacienții diabetici tratați cu insulină sau antidiabetice orale și cu celiprolol este necesară prudență datorită riscului crescut de reacții hipoglicemice. Există riscul de apariție a unor reacții alergice severe la pacienții hipersensibili.

Asocieri care necesită prudență: cu amiodaronă, anestezice generale inhalatorii halogenate, blocante ale canalelor de calciu, clonidină, antiaritmice, baclofen, insulină și antidiabetice orale, lidocaină, antiacide gastrice, substanțe de contrast iodate.

RA: Oboseală, cefalee, tulburări de somn, amețeli, reacții alergice cutanate (prurit), agravarea psoriazisului sau apariția de exanteme psoriaziforme, greață, vărsături, diaree sau constipație, dureri abdominale, astenie musculară, tremor, parestezii, extremități reci. Este posibilă apariția brohospasmului la pacienții cu boli bronhopulmonare obstructive grave. Stări depresive, coșmaruri, scăderea libidoului, impotență, pneumonii interstițiale, tulburări de vedere, reducerea secreției lacrimale - gravă pentru purtătorii lentilelor de contact, creșterea nivelului anticorpilor antinucleari și, în mod excepțional, sindrom lupoid.

CETIRIZINUM

COD ATC: R06AE07

ALERID *CIPLA;* Cpr. film. 10 mg; ct. × 1 blist. × cpr. ***(P-6L)***

ALERID 10 mg *TERAPIA SA;* Cpr. film. 10 mg ***(P-6L)***

CETRINE *DR. REDDY'S LABORATORIES;* Cpr. 10 mg ***(P-6L)***

ZODAC *LECIVA;* Cpr. film. 10 mg ***(P-6L)***

ZYRTEC *UCB;* Cpr. film. 10 mg; Sol. orală 10 mg/ml (fl. × 10 ml); Sol. orală 10 mg/ml (fl. × 10 ml) ***(P-6L)***

ZYRTEC *FOURNIER SA;* Cpr. film. 10 mg; Sol. orală 10 mg/ml ***(P-6L)***

Ind: Rinite alergice, conjunctivite alergice, iritații, urticarie, dermografism, exeme cu localizare diversă, dermatite de contact, reacții alergice acute datorate unor toxiinfecții alimentare și înțepături de insecte.
Dz: Oral, 10 mg, o dată pe zi.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului.
A!: La șoferi sau persoane cu activități de precizie. Nu este recomandată la copii sub 12 ani precum și la femei gravide sau care alăptează.
RA: Somnolență, cefalee, amețeală, stare de agitație, uscăciune a gurii și disconfort gastrointestinal.

CETRIMIDUM

COD ATC: D08AJ04; D11AC01

CETRIMIDE *PHARCO PHARMACEUTICALS;* Cremă; 1 g cremă × 10 mg cetrimide, tub cu 20 g ***(OTC)***

Ind: Antiseptic tegumentar pentru curățirea rănilor, zgârieturilor și arsurilor; pentru curățirea preoperatorie a tegumentelor; pentru îndepărtarea crustelor și escoriațiilor din unele boli de piele.
Dz: Pelicula fină de cremă se aplică pe zona afectată a pielii. Pentru o acțiune bactericidă maximă, aria afectată trebuie să nu conțină urme de săpun, deoarece acesta poate scădea activitatea bactericidă a cetrimide. Crema nu se va aplica la nivelul ochilor.

CETRORELIXUM

COD ATC: H01CC02

CETROTIDE *ARES SERONO;* Pulb. pt. sol. inj., 1 fl. conține 0,25 mg; 3 mg cetrorelix ***(P-RF)***

Ind: Prevenirea ovulației premature în perioada stimulării ovariene controlate, în vederea prelevării ovocitelor din cadrul tehnicilor de reproducere asistată.
Dz: Inj. s.c. în peretele abdominal inferior. Conținutul unui fl. a 0,25 mg cetrorelix se adm. o dată pe zi, la interval de 24 ore, dimineața sau seara. Trat. cu cetrorelix 0,25 mg trebuie început în ziua a 5-a sau a 6-a a stimulării ovariene cu gonadotropine urinare sau recombinate. Conținutul unui fl. de 3 mg cetrorelix se adm. în ziua a 7-a a stimulării ovariene cu gonadotropine. Dacă după adm. de cetrorelix 3 mg, creșterea foliculară nu permite inducerea ovulației în a 5-a zi după injectare, se va adm. cetrorelix 0,25 mg o dată pe zi, începând de la 96 ore de la adm. de cetrorelix 3 mg, până la inducerea ovulației.
Cind: Hipersensibilitate la cetrorelix, hormoni exogeni peptidici sau manitol; sarcină și alăptare; menopauză; paciente cu afecțiuni renale sau hepatice moderate sau severe.
A!: Poate produce un sindrom de hiperstimulare ovariană care poate fi tratat simptomatic, repaus, administrare i.v. de electroliți sau soluții coloidale și heparino-terapie.
RA: Eritem, prurit și edem la locul inj.; greață și cefalee, prurit, reacție de hipersensibilitate asociată cu tuse, rash și hTA, după 7 luni de trat. al cancerului ovarian cu cetrorelix. Sindromul de hiperstimulare ovariană.

CHINIDINI SULFAS

COD ATC: C01BA01

CHINIDINA 200 mg *LAROPHARM SRL;* Cpr. 200 mg sulfat de chinidină *(P-6L)*

CHINIDINĂ EEL *BIO EEL SRL;* Cpr. 200 mg; 1 fl. × 15 cpr. ***(P-6L)***

CHINIDINĂ SULFAT *VITALIA K SA;* Cpr. 200 mg ***(P-6L)***

CHINIDINĂ SULFAT *ARENA GROUP SA;* Cpr. 200 mg; fl. × 20 cps. ***(P-6L)***

CHINIDINĂ SULFAT *NAPOFARM;* Cpr. 200 mg; fl. × 30 cps. ***(P-6L)***

CHINIDINĂ SULFURICĂ *FARMACOM SA;* Cpr. 200 mg; fl. × 20 cps. *(P-6L)*

KINIDIN DURULES *ASTRAZENECA;* Cpr. film. 200 mg; 1 fl. × 100 cpr. *(P-6L)*

Ind: Prevenirea recurențelor de FA. Tahicardia ventriculară și supraventriculară paroxistică. Descărcări ventriculare ectopice.
Dz: Oral, 0,4-1,0 g dimineața și seara. Intervalul QT va fi verificat înainte și după trat.
Cind: Hipersensibilitate la chinidină și chinină. Bloc AV de grad II sau complet în absența unui pace-maker. Trombocitopenie. Interval QT prelungit. Intoxicație cu digitală. În timpul sarcinii.
A!: După prima doză, pacientul va fi ținut sub observație. Atenție la pacienții cu conducere AV prelungită, decompensare susținută, șoc cardiogen, hTA, bradicardie, perturbări ale echilibrului potasic, trat. asociat cu antiaritmice din clasa I și II, β-blocante și glicozizi digitalici. Precauții în cazul miocarditelor sau a afecțiunilor miocardice severe. IC și hipokaliemia vor fi corectate înainte de începerea trat. Intervalul QT poate fi prelungit. Precauție în prezența modificărilor obstructive ale tractului gastrointestinal. Precauție în cazul asocierii cu: digoxină, digitoxină, cimetidină, derivați cumarinici, rifampicină, derivații barbiturici, fenitoină, verapamil, amiodaronă, nifedipină.
RA: Tractul gastrointestinal: diaree, grețuri și vărsături. SNC: Semne de cinconism (tinitus, tulburări de vedere, cefalee și obnubilare). Cardiovascular: tulburări de ritm (tahicardie ventriculară, frecvent torsada vârfurilor, sau fibrilației ventriculare), hTA. Reacții de hipersensibilitate: urticarie, febră, hepatită, rash, trombocitopenie, pancitopenie și agranulocitoză. Fotosensibilitate și sindrom asemănător lupusului eritematos.

CHLORAMBUCILUM

COD ATC: L01AA02

LEUKERAN *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. 2 mg; 5 mg clorambucil; fl. × 25 cpr. *(Ș/P-RF)*

Ind: Boală Hodgkin; anumitor forme de limfom non-Hodgkinian; leucemiei limfocitare cronice; macroglobulinemiei Waldenström (tratament de elecție); adenocarcinomului ovarian avansat. Cancer de sân.

Dz: Oral. *Adulți:* 0,1-0,2 mg/kg/zi, timp de 4-8 săpt. Schemele terapeutice diferă în funcție de afecțiunea tratată. *Copii:* poate fi utilizat în trat. bolii Hodgkin și al limfoamelor non-hodgkiniene. Dozele sunt similare cu cele folosite la adulți.
Cind: Având în vedere importanța indicațiilor, nu există Cind absolute.
A!: Este necesară monitorizarea hematologică precum și a pacienților cu afectare funcțională renală. Nu trebuie adm. la pacienții care au făcut recent radioterapie sau au primit alți agenți citotoxici. Se reduc dozele la pacienții cu afectare hepatică gravă. Poate produce afectări ale cromatidelor și cromozomilor. S-au raportat cazuri de apariție a leucemiei acute după trat. cu clorambucil pentru leucemie limfocitară cronică. Trebuie evitat în timpul sarcinii, mai ales în primul trimestru, și în perioada de alăptare.
RA: Supresia măduvei osoase. Tulburări gastrointestinale: greață, vărsături, diaree, ulcerații ale mucoasei bucale. Rar, fibroză pulmonară interstițială severă. Hepatotoxicitate și icter. Febră, reacții de hipersensibilitate, neuropatia periferică, pneumonia interstițială, cistită abacteriană. La copiii cu sindrom nefrotic și uneori la adulți pot apărea crize convulsive.

CHLORAMPHENICOLUM

COD ATC: J01BA01
S01AA

CLORAMFENICOL *ANTIBIOTICE IAȘI;* Pulb. pt. sol. inj. 1 g cloramfenicol; ct. × 1 fl. ***(P-RF)***; ct. × 10 fl. ***(S)***

CLORAMFENICOL *ARENA GROUP SA;* Cps. 250 mg; fl. × 20 cps. ***(P-RF)***

SIFICETINA *S.I.F.I.;* Sol. oft., 0,4% g (fl. 5 ml solv. + 1 rez. pulb.) ***(P-RF)***; Unguent 1% (tub × 5 g) ***(P-RF)***

Ind: Sistemic: în infecții grave cu germeni sensibili (febră tifoidă și paratifoidă; meningite purulente; abcese cerebrale; infecții abdominale cu anaerobi; tifos exantematic, febra Q și bruceloză; infecții urinare rezistente la alte antibiotice. Conjunctival: în toate infecțiile oculare externe produse de germeni sensibili la cloramfenicol (conjunctivite, keratite, dacriocistite, trahom, traumatisme mecanice sau termice, infecții pre- și postoperatorii).
Dz: Sistemic, adm. int., inj. i.v. sau i.m.: Adulți și copii: 50-100 mg/kg/zi, fracționate la 6 ore. *Prematuri* și *nou-născuți sub 2 săpt.:* 10 mg/kg/zi, la 6 ore. *Nou-născuți peste 2 săpt.:* 20 mg/kg/zi, la 6 ore. Uzual, doza totală la adult nu trebuie să depășească 25 g și la copii 700 mg/kg, iar durata trat. nu trebuie să depșească 14 zile. Local conjunctival: 1-2 pic. sau se aplică o cantitate mică de unguent, în ochi, de 3-8 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la cloramfenicol; insuficiență medulară în antecedente.
A!: Nu se recomandă în cazurile care se pot trata cu alte antibiotice sau chimioterapice sau atunci când nu s-a stabilit diagnosticul de certitudine. Se va evita utilizarea profilactică. Este necesar controlul periodic al hemogramei. Prudență la bolnavii cu IH sau IR. Precauție la nou-născuți și la bolnavii cu deficit de G-6-PDH. În timpul trat. trebuie evitat consumul de alcool. Atenție în cazul asocierii cu: anticoagulante cumarinice, fenitoină, sulfamide antidiabetice, fenobarbital, diuretice, alte medicamente deprimă hematopoieza. Nu se recomandă adm. în timpul sarcinii și la femeile care alăptează.
RA: Deprimarea hematopoiezei, cu pancitopenie – anemie aplastică, leucopenie sau agranulocitoză și trombocitopenie. Dozele mari pot provoca

fenomene toxice acute descrise sub numele de "sindrom cenușiu". Diaree și iritație perianală. Suprainfecțiile sunt relativ comune, rectocolita pseudomembranoasă apare foarte rar. Complicații neuropsihice: nevrită optică, rar polinevrită, confuzie și delir. Pot să apară reacții alergice.

CHLORHEXIDINUM

COD ATC: A01AB03
R02AA05

CORSODYL MINT MOUTHWASH *GLAXO SMITHKLINE;* Sol. uz ext. clorhexidină gluconat 0,2% (fl. × 300 ml) ***(OTC)***

PLAK OUT *SANTA N BALANOS;* Sol. bucală 0,12% (fl. × 250 ml); Gel clorhexidină diacetat 0,2% (tub × 35 g) ***(OTC)***

PLAK OUT *P.N. GEROLYMATOS;* Sol. ext. 10% (fl. × 10 ml) ***(OTC)***

SEPTOFORT *PHARMAVIT;* Cpr. 2 mg clorhexidină diacetat; fl. × 20 cpr. ***(OTC)***

Ind: Vulvovaginite acute și cronice, leucoree; pentru îngrijire înainte și după intervenții ginecologice.
Dz: Intravaginal, o dată/zi timp de 4-5 zile, apoi de 1-2 ori/săpt.
Cind: Alergie la una din componente.
RA: Sensibilizare sau reacții iritative locale.

CHLOROPYRAMINUM

COD ATC: R06AC03

NILFAN *SICOMED SA;* Dj. 25 mg clorpiramină; fl. × 20 dj. ***(P-6L)***

Ind: Manifestări alergice (coriză alergică, conjunctivită alergică, dermatoze alergice). Astm bronșic, edem Quincke, boala serului, migrenă de origine alergică, șoc anafilactic. Înțepături de insecte. Hiperemia gravidelor. Rău de mare și altitudine.
Dz: *Adulți:* 25 mg de 3 ori pe zi, după mesele principale. *Copii:* dozarea se face funcție de vârstă și greutatea corporală.
Cind: Sensibilitate la preparat.
RA: Amețeală, somnolență.

CHLOROTRIANISENUM

COD ATC: G03CA06

CLANISEN 24 mg *SINDAN SRL;* Cpr. 24 mg clorotrianisen; fl. × 20 cpr. ***(P-RF)***

Ind: Cancerul prostatei. Cancer vezical, urinar și mamar. Tulburări de climax și în vederea suprimării lactației.
Dz: Oral, 24-48 mg/zi, în timpul meselor.
Cind: În caz de: suspiciune sau existența unui cancer genital sau mamar în antecedente; fibromatoză și polipoză uterină; afecțiuni tromboembolice, dislipidemii, antecedente de icter colestatic, în timpul sarcinii.

A!: Precauție la bolnavii cardiaci, cu ateroscleroză și cu vârsta peste 75 ani. Este necesară investigarea atentă a stării aparatului cardiovascular, funcției renale și hepatice. Atenție la cei cu accidente tromboembolice în antecedente.
RA: Tulburări digestive (greață, vărsături, dureri abdominale, diaree, anorexie), reacții cutanate, ginecomastie, algii mamare moderate și dispariția libidoului, tulburări psihice, retenție de apă, metroragii la întreruperea tratamentului, pigmentarea mamelonului și a areolei. Afectarea aparatului cardiovascular, cu apariția unor fenomene ce pot merge până la IC.

CHLORPHENAMINUM *COD ATC: R06AB04*

CLORFENIRAMIN 4 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. 4 mg clorfenamină ***(P-6L)***

Ind: În dermatologie: urticarie acută și cronică, eczeme, dermatită atopică și de contact, prurit, eritem solar, înțepături de insecte. În medicina internă: boala serului, edem Quincke, migrenă, colită ulceroasă, alergii medicamentoase. În oftalmologie: procese alergice oculare. În O.R.L.: rinită alergică, coriză de fân.
Dz: *Adulți:* 2-4 mg de 3-4 ori/zi. *Copii:* 0,35 mg/kg/zi, divizat în 4 prize.
Cind: Hipersensibilitate la clorfenamină, IR și IH avansată, stări depresive. La pacienți cu risc de retenție urinară. La pacienți cu risc de glaucom cu unghi închis.
A!: Prudență la pacienții cu presiune intraoculară crescută, tulburări cardiovasculare, HTA, astm bronșic, la copii și la pacienții în vârstă. A nu se asocia cu: alcool, cu medicamentele depresive ale SNC, cu atropina și alte substanțe atropinice (antidepresive, antiparkinsoniene, anticolinergice, spasmolitice, disopiramidă, neuroleptice fenotiazinice). Nu este recomandată utilizarea de către femeile însărcinate și în perioada de alăptare. Nu se recomandă șoferilor sau celor cu activități de precizie.
RA: Somnolență, oboseală, iritație gastrică.

CHLORPROETHAZINUM *COD ATC: N05AA07*

NEURIPLEGE® 25 mg *SICOMED SA în colaborare cu LAB. GENEVRIER;* Cpr. film. 25 mg clorproetazină; ct. × 2 blist. × 10 cpr. film. ***(P-RF)***

Ind: Reumatologie: lumbago acut, cronic, lombosciatică, reumatism abarticular, artroze cu contracturi musculare. Balneofizioterapie și recuperare medicală: lombalgii, dorsalgii. Medicină sportivă: contracturi, elongații, crampe, rupturi fasciculo-musculare. Neurologie: spasticitatea din bolile neurologice, dar nu și boala Parkinson. Ginecologie: dismenoree. Alte maladii însoțite de contractură (torticolis).
Dz: *Adulți:* 25-75 mg/zi, în 2 prize. *Copii:* 25-50 mg/24 ore.
Cind: Miastenie, hTA severă, alergii la clorproetazină.
A!: A nu se asocia cu: antidepresive triciclice, barbiturice, deprimante centrale SNC, alcool. Prudență la gravide.
RA: HTA ortostatică, somnolență.

CHLORPROMAZINUM

COD ATC: N05AA01

CLORDELAZIN *SICOMED SA;* Sol. inj. 25 mg/5 ml clorpromazină (f. × 5 ml) ***(P-RF)***; Dj. 25 mg; fl. × 50 dj. ***(P-RF)***

PLEGOMAZIN® *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd;* Sol. inj. 25 mg/5 ml clorhidrat de clorpromazină (f. × 5 ml) ***(P-RF)***; Dj. 25 mg ***(P-RF)***

Ind: Stări de agitație din psihoze. Stări de greață și vomă. Preanestezie și potențarea anesteziei generale. Adjuvant în trat. tetanosului. Dureri de diferite etiologii. Porfiria acută intermitentă. Trat. mișcărilor coreice din cadrul bolii Huntington. Trat. sughițului rebel.

Dz: *Adm. inj. i.m.: Adulți:* 25-200 mg, max. 1000 mg/zi, în funcție de indicație. *Copii:* 0,5-1 mg/kg/zi, divizate în 2-3 prize, max. 40 mg la copii între 1-5 ani, respectiv 75 mg la copii peste 5 ani. *Oral: Adulți:* inițial 25-50 mg/zi, mărindu-se treptat doza până ce se ajunge la 75-150 mg/zi, în 3 prize. *Copii:* 1-3 mg/kg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la clorpromazină, la alte fenotiazine și la celelalte componente ale produsului; coma indusă de barbiturice și alcool; stări de deprimare ale SNC; glaucom cu unghi închis; risc de retenție urinară; mielodepresie; feocromocitom. Este Cind asocierea cu IMAO sau cu L-dopa.

A!: În caz de hipertermie de etiologie necunoscută; parkinson; epilepsie; afecțiuni cardiovasculare grave, insuficiență respiratorie, ateroscleroză gravă, accidente cerebrovasculare în antecedente, diabet zaharat, hipotiroidism și miastenia gravis; la vârstnici, la pacienții cu afecțiuni renale sau hepatice grave (prudență și administrarea unor doze mai mici). Se recomandă control medical periodic, evitarea consumului de alcool etilic. Precauție în cazul asocierii cu: anestezice generale, sedative, tranchilizante, analgezice opioide, litiu, antidepresive triciclice, anticolinergice, antihipertensive, antidiabetice, antiacide. A se evita consumul de alcool în timpul trat. Nu se recomandă adm. în timpul sarcinii sau în perioada de alăptare. Precauție la șoferi și la persoane cu activități de precizie.

RA: Neurologice: sedare, somnolență, diskinezii precoce, sindrom extrapiramidal, diskinezii tardive. Vegetative: hTA ortostatică, întârzierea ejaculării; efecte de tip atropinic. Endocrine și metabolice: impotență, frigiditate; amenoree, galactoree, ginecomastie, hiperprolactinemie; creștere în greutate. Alte RA: erupții cutanate alergice, fotosensibilizare, pigmentarea tegumentelor, depozite pigmentare la nivelul polului anterior al ochiului, icter colestatic, leucopenie sau agranulocitoză.

CHLORQUINALDOLUM

COD ATC: A07AXN1
P01AA04
D08AH02

CLORCHINALDOL *SICOMED SA;* Cpr. film. 100 mg clorchinaldol; fl. × 30 cpr.; ct. × 3 blist. × 10 cpr. ***(OTC)***

CLORCHINALDOL 100 mg *ARENA GROUP SA;* Dj. 100 mg clorchinaldol; 1 fl. × 30 dj. ***(OTC)***

SAPROMED *MEDUMAN SA;* Pulbere 3% clorchinaldol; fl. × 12 g pulb. ***(OTC)***

SAPROSAN® 100 mg *SINTOFARM SA;* Dj. 100 mg clorchinaldol; fl. × 20 dj. ***(OTC)***

Ind: Disbacterioze intestinale, enterocolite recidivante sau trenante, dispepsii, tulburări intestinale consecutive folosirii antibioticelor, schimbării alimentației sau climei; diaree estivală, dizenterie amebiană (forme ușoare), candidoză și giardioză, pemfigusul nou-născutului și alte piodermite ale vârstei copilăriei, plăgi de decubit, abcese infectate, micoze ale pielii, infecții microbiene locale ușoare.
Dz: Oral. *Adulți:* Curativ, 100-200 mg de 3 ori pe zi; profilactic, 100 mg de 3 ori pe zi. *Copii:* 10 mg/kg/zi.
Cind: Alergie la produs, IR sau IH severă, IC gravă, sarcină în primul trimestru.
A!: Atenție la supradozare; în cazurile acute trat. se adm. cel mult o săpt., în cele cronice cel mult o lună. În cazul asocierii cu alte preparate halochinice, nu se vor depăși 750 mg/zi la adult și 400 mg/zi la copii.
RA: Greață, vărsături, dureri abdominale, cefalee, amețeli, erupții cutanate alergice; nevrită periferică, nevrită optică, mielopatie.

CHLORZOXAZONUM

COD ATC: M03BB03

CLORZOXAZON 250 mg *ARMEDICA SA;* Cpr. 250 mg clorzoxazonă; fl. × 25 cpr. ***(P-6L)***

CLORZOXAZONĂ *SINTOFARM SA;* Cpr. 250 mg; fl. × 20 cpr. ***(P-6L)***

CLORZOXAZONĂ 250 mg *ARENA GROUP SA;* Cpr. 250 mg; fl. × 25 cpr. ***(P-6L)***

Ind: Spasme reactive ale musculaturii striate de natură traumatică, inflamatorie sau reflexă. Contuzii, tenosinovite, artrite, mialgii, lumbago, torticolis, contracturi datorate ischemiei etc.; contractură cronică de origine piramidală.
Dz: *Adulți:* 250-500 mg de 3-4 ori/zi, în funcție de gravitatea sindromului doza se poate mări la 500-750 mg de 3-4 ori/zi, la nevoie până la 750-1250 mg/zi după mese. *Copii: sub 2 ani* – 62,5-125 mg de 3-4 ori/zi; *2-6 ani* – 125-187,5 mg de 3-4 ori/zi; *6-10 ani* – 250 mg de 3-4 ori/zi.
Cind: Alergie la clorzoxazonă, IH, IR, litiază biliară.
A!: Precauție în timpul sarcinii.
RA: Greață, vomă, pirozis, sângerări intestinale, somnolență; excitație și anxietate, cefalee, amețeli; rar erupții cutanate alergice, echimoze, edem angioneurotic sau reacții anafilactice, icter colestatic.

CICLOPIROXUM

COD ATC: G01AX12
D01AE14

BATRAFEN *LAB. AVENTIS PHARMA;* Cremă, 1 g conține 10 mg ciclopiroxolamină (tub × 20 g); Sol. uz ext. 10 mg/g (fl × 10 ml sau 20 ml); Cremă vag. 1% (tub × 30 g) ***(P-RF)***

DAFNEGIN *POLI IND.;* Cremă vaginală, 1 g conține 10 mg ciclopiroxolamină (tub × 78 g); Ovule 100 mg; Sol. uz ext. 0,2% (fl. × 150 ml) ***(P-RF)***

Ind: *Adm. cutanată:* infecții cutanate provocate de dermatofiți, infecții cutanate mixte fungi + bacterii sau fungi + mycoplasme/chlamydii, erytrasmă, Pitiriasis versicolor, Tinea versicolor, Tinea pedis, eczeme interdigitale macerative, eczemă seboreică, candidoze etc. *Adm. vaginală:* infecții vulvovaginale și perianale cu germeni sensibili (mai ales Candida).
Dz: *Adm. cutanată:* aplicații locale de 2 ori/zi până la dispariția simptomatologiei (în medie 2 săpt.). *Adm. vaginală:* 1 ovul/zi, timp de 3-6 zile, consecutiv sau 5 g cremă vaginală/zi, 6-14 zile sau spălături vaginale cu soluția 0,2%, o dată/zi, dimineața.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului.
A!: Nu se recomandă utilizarea la copii. Se va evita contactul cu ochii. Prudență în per. de sarcină și alăptare.
RA: Prurit și iritație la locul adm.

CICLOSPORINUM

COD ATC: L04AA01

CICLORAL HEXAL 25; CICLORAL HEXAL 100 *HEXAL AG;* Cps. moi 25 mg, 100 mg ***(OTC)***

EQUORAL *IVAX PHARMACEUTICALS;* Cps. 25 mg, 50 mg, 100 mg, Sol. orală 100 mg/ml

SANDIMMUN NEORAL *NOVARTIS;* Sol. orală 100 mg/ml ciclosporină (fl × 50 ml); Cps. moi 25 mg; 50 mg ciclosporină; ct. × 10 blist. × 5 cps. moi ***(S/P-RF)***

Ind: Transplant (prevenirea respingerii grefei în transplanturi alogenice, prevenirea respingerii grefei după transplant de măduvă osoasă; prevenirea sau trat. reacției grefă-contra-gazdă). Boli autoimune (uveita endogenă; sindromul nefrotic; artrita reumatoidă; psoriazisul).
Dz: Transplant: este necesară monitorizarea nivelului plasmatic al ciclosporinei. Inițial: doză unică orală de 10-15 mg/kg cu 4-12 ore înaintea int. chir.; aceasta va fi menținută 1-2 săpt. postoperator, apoi va fi redusă treptat, până la o doză de întreținere de 2-6 mg/kg/zi. Transplant de măduvă: 12,5-15 mg/kg/zi. Trat. de întreținere se continuă cel puțin 3 luni (de preferat 6 luni). Boli autoimune: în funcție de indicație, pentru inducerea remisiunii, inițial 2,5-5 mg/kg/zi, în doză unică sau divizată, până se obține remisiunea. Doza poate fi crescută până la 5-7 mg/kg în cazuri refractare, pentru o scurtă perioadă de timp. La pacienții cu funcția renală afectată, doza inițială nu trebuie să depășească 2,5 mg/kg/zi. Pentru trat. de întreținere, doza trebuie redusă până la nivelul minim eficient, max. 5 mg/kg/zi. Ciclosporina poate fi adm. în asociere cu corticosteroizi sau AINS în doze mici.
Cind: Hipersensibilitate la ciclosporină. Perioada de alăptare.
A!: Trebuie monitorizat: nivelul creatininemiei, TA, parametrilor adecvați pentru evaluarea funcțiilor renală și hepatică, potasemiei. Se recomandă determinarea lipidelor înaintea trat. și după prima lună de tratament. Se recomandă întreruperea trat. dacă HTA apărută în timpul terapiei nu poate fi

controlată printr-un trat. corespunzător. Unii pacienți pot prezenta modificări histopatologice renale. A se evita ingerarea de cantități mari de potasiu. Leziunilor pielii atipice pentru psoriazis trebuie să li se facă biopsie înaintea începerii trat. Se recomandă biopsie renală la pacienții cu nefropatie cu leziuni minime dependentă de steroizi, la care ciclosporina se adm. mai mult de 1 an. Ciclosporina nu trebuie adm. împreună cu alți agenți imunosupresori, cu excepția corticosteroizilor. Precauție la pacienții cu hiperuricemie. Folosirea vaccinurilor cu virus viu atenuat trebuie evitată. Atenție în cazul asocierii cu: aminoglicozide, amfotericină B, ciprofloxacină, melfalan, trimetoprim, AINS, lovastatină, colchicină, ketoconazol, eritromicină și josamicină, doxiciclină, anticoncepționale orale, propafenonă, barbiturice, carbamazepină, fenitoină, metamizol, rifampicină, nafcilină, sulfadimidina și trimetroprimul adm. i.v., prednisolon, metilpredinisolon.
RA: Hipertricoza, tremorul, afectarea funcției renale, HTA, disfuncția hepatică, oboseala, hipertrofia gingivală, tulburările gastrointestinale (anorexie, greață, vărsături, diaree), senzație de arsură la mâini și picioare. Rar: cefalee, reacții cutanate posibil de natură alergică, anemie ușoară, hiperkaliemie, hiperuricemie, hipomagnezemie, creștere în greutate, edeme, pancreatită, parestezii, convulsii, dismenoree sau amenoree reversibile, crampe musculare, slăbiciune musculară sau miopatie, encefalopatie, tulburări de vedere și mișcare și afectarea stării de conștiență, trombocitopenie uneori asociată cu anemie hemolitică microangiopatică și afectarea funcției renale, neoplazii și tulburări limfoproliferative.

CILAZAPRILUM *COD ATC: C09AA08*

INHIBACE *HOFFMANN LA ROCHE;* Cpr. film. 5 mg cilazapril; ct. × 30 cpr. ***(P-6L)***

Ind: Trat. HTA esențiale și renale.
Dz: Int., o dată pe zi, înainte sau în cursul unei mese. HTA esențială: 2,5-5 mg. HTA renovasculară: inițial 0,5 mg sau mai puțin. La pacienții cu IR, dozele se stabilesc în funcție de clearance-ul creatininei. La cei tratați și cu diuretice se adm. doze mai mici.
Cind: Hipersensibilitate la cilazapril sau la alți IEC. Pacienții cu ascită. Sarcină și alăptare.
A!: hTA simptomatică. Ciroza hepatică. IR. Nivelul potasemiei trebuie monitorizat frecvent, în raport cu funcția renală. La copii. Atenție în cazul asocierii cu: alte medicamente hipotensoare, diuretice care economisesc potasiu, AINS, anestezice.
RA: Cefalee, amețeală, oboseală, hTA, dispepsie, greață, rash, tuse, edem angioneurotic, alterări ale parametrilor de laborator (creșteri ale creatininei serice și ureei, modificări ale Hb, Ht, elementelor figurate sanguine, potasemiei).

CIMETIDINUM *COD ATC: A02BA01*

ALTRAMET *LEK PHARMACEUTICALS;* Cpr. film. 200 mg ***(P-6L)***

ALTRAMET 300 *LEK PHARMACEUTICALS;* Cpr. film. 300 mg ***(P-6L)***

BELOMET *BELUPO;* Cpr. 200 mg ***(P-6L)***

CIMEDINE 200 *DAR AL DAWA;* Cpr. film. 200 mg ***(P-6L)***

CIMEHEXAL 200 *HEXAL AG;* Cpr. film. 200 mg ***(P-6L)***

CIMETIDIN *SINTOFARM SA în colaborare cu POLFA;* Cpr. 200 mg; fl. × 60 cpr. ***(P-6L)***

CIMETIDINĂ *ARENA GROUP SA;* Cps. 200 mg; fl. × 30 cps. ***(P-6L)***

CIMETIDINUM 200 mg *POLFA;* Cpr. film. 200 mg; ct. × 100 cpr. film. ***(P-6L)***

HISTODIL *RICHTER GEDEON;* Cpr. 200 mg; fl. × 50 cpr. ***(P-6L)***

Ind: Trat. profilactic sau curativ în: ulcer duodenal, ulcer gastric, ulcere postoperatorii, esofagita peptică de reflux. Profilaxia sindromului de aspirare acidă (Mendelson-Syndrom) în cazul intervențiilor chirurgicale. Sindrom Zollinger-Ellison. Trat. adjuvant în cazuri de hemoragii și eroziuni sau ulcere gastrice și/sau intestinale. În sindromul de ansă intestinală scurtă. În insuficiența pancreatică.
Dz: *Adm. int. Adulți:* Curativ: 800-1000 mg/zi, fracționat. Trat. se continuă cel puțin 4 săpt. Profilactic: 400-800 mg/zi, int., înainte de culcare. Durata trat. nu trebuie să depășească în general 12 săpt. Profilaxia sindromului de aspirare acidă în cazul intervențiilor elective: 400 mg, în seara precedentă intervenției. Sindromul Zollinger-Ellison: 1-2 g/zi (3 ori 200-400 mg la mese și 400-800 mg înainte de culcare). *Copii și tineri la pubertate:* 15-30 mg/kg/zi, max. 1600 mg/zi, în 4 doze. La pacienții cu funcție renală redusă se recomandă adaptarea dozei în funcție de clearance-ul de creatinină.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută față de compus. Copii și tineri în perioada de creștere.
A!: În afecțiuni gastroduodenale ușoare. Înaintea trat. de ulcer gastric se va verifica eventuala existență a unei leziuni maligne. La pacienți cu IR se va reduce doza. Precauție în cazul asocierii cu: medicamente care provoacă neutropenie, anticoagulante orale, β-blocante, benzodiazepine, antiepileptice, antidepresive triciclice, derivații xantinici, antiaritmice, antagoniști de calciu, ketoconazol, antiacide. În sarcină și alăptare. La șoferi și persoane cu activități de precizie. Potențează efectul alcoolului.
RA: Diaree, dureri articulare și musculare, edeme, amețeli, mâncărimi. Rar: erupții cutanate, căderea părului, creșterea creatininei și transaminazelor, ginecomastie reversibilă, dereglări în comportamentul sexual, confuzie și neliniște, cefalee, dereglări de somn, imagini duble, halucinații și spasme musculare, depresii și polineuropatii, leucopenie, trombocitopenie, pancitopenie, anemie aplastică; senzație de vomă, greață și dureri gastrice, febră, colestaza interhepatică, inflamații ale ficatului, pancreasului și ale rinichilor, bradicardie, tahicardie și tulburări de conducere.

CINNARIZINUM *COD ATC: N07CA02*

CEREBRAL *ALEXANDRIA CO;* Cpr. 25 mg cinarizină; 2 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

CINARIZINĂ 25 mg *ARENA GROUP SA;* Cps. 25 mg; fl. × 20 cps. ***(P-6L)***

CINARIZINĂ *PROMEDIC SRL;* Cpr. 25 mg; fl. × 40 cpr. ***(P-6L)***

CINEDIL *ALKALOID AD;* Cpr. 75 mg; fl. × 50 cpr. ***(P-6L)***

CINARIZIN 25 mg *LAROPHARM SRL;* Cpr. 25 mg ***(P-6L)***

CINNARIZIN *BALKAN PHARMA DUPNITZA;* Cpr. 25 mg ***(P-6L)***

CINNASAN *SANOFI ~ SYNTHELABO;* Cps. 75 mg; ct. × 2 blist. × 25 cps. *(P-6L)*

STUGERON *JANSSEN PHARMACEUTICA;* Cpr. 25 mg; ct. × 2 blist. × 25 cpr. ***(P-6L)***

STUGERON 25 mg *TERAPIA SA;* Cpr. 25 mg; ct. × 4 blist. × 10 cpr. *(P-6L)*

STUGERON FORTE *JANSSEN PHARMACEUTICA;* Cps. 75 mg; ct. × 1 blist. × 20 cps.; ct. × 3 blist. × 20 cps. ***(P-6L)***

STUGERON FORTE *TERAPIA SA;* Cps. 75 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. *(P-6L)*

Ind: Trat. simptomelor de dereglare labirintică (vertigo, amețeală, tinitus, nistagmus, greață, vărsături); de origine cerebrovasculară (amețeală, acufene, cefalee vasculară, nesociabilitate, iritabilitate, pierderea memoriei, lipsa de concentrare); de tulburare a circulației periferice (fenomenul Raynaud, acrocianoza, claudicația intermitentă, tulburările trofice, ulcerele trofice și varicoase, parestezia, crampe nocturne, extremități reci). Profilaxia răului de transport. Profilaxia migrenei.
Dz: *Adulți:* preferabil după mese, 25 mg de 3 ori/zi (75 mg/zi). *Copii:* jumătate din doza pentru adulți.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la medicament.
A!: La pacienții cu boala Parkinson. Precauție în cazul asocierii cu: alcool, depresive SNC, antidepresive triciclice. În sarcină și alăptare. La șoferi și persoane cu activități de precizie.
RA: Somnolență, tulburări gastrointestinale, cefalee, uscăciunea gurii, creștere ponderală, transpirație, reacții alergice, lichen plan, simptome lupoide; la pacienții vârstnici au fost descrise cazuri de agravare sau apariție a simptomelor extrapiramidale, uneori asociate cu senzații depresive.

CINOLAZEPAMUM *COD ATC: N05CDN1*

GERODORM *GEROT PHARMAZEUTIKA;* Cpr. 40 mg cinolazepam; ct. × 10 cpr.; ct. × 30 cpr. ***(P-RF)***

Ind: Tulburări de somn.
Dz: Int., cu aproximativ 30 minute înainte de ora dorită pentru declanșarea somnului. *Adulți:* 40 mg; *vârstnici:* doza inițială este de 20 mg.
Cind: Hipersensibilitate la benzodiazepine; intoxicație acută cu alcool, hipnotice, analgezice, neuroleptice, antidepresive sau litiu; abuz sau dependență față de alcool și medicamente. În timpul sarcinii și alăptării. Nu a fost stabilită siguranța adm. la copii.

A!: Se poate instala dependența fizică și psihică. Precauții în caz de miastenia gravis, disfuncții hepatice și renale, insuficiență cardiovasculară, la pacienții cu afecțiuni cerebrale, în vârstă sau cu debilitate fizică avansată. Întreruperea trat. trebuie făcută prin reducerea progresivă a dozei. Sensibilitatea la cinolazepam poate fi accentuată. Precauție în cazul asocierii cu: sedative, antidepresive, anestezice, analgezice centrale, antihipertensive, miorelaxante, alcool, opioide, hipnotice. Precauție la șoferi și la persoane cu activități de precizie.
RA: Pierderea capacității de concentrare, somnolență, modificări în activitatea motorie, agitație, stări depresive, confuzie, uscăciunea gurii, greață, vărsături, diaree, lipotimie, amețeli, hipotensiune, tahicardie, dureri de cap, prurit, senzație de foame, agitația picioarelor, somnolență la trezire, amnezie anterogradă, efect de „rebound" la întreruperea bruscă a adm. medicamentului.

CINOXACINUM

COD ATC: J01MB06

CINOBAC® *ELI LILLY AND COMPANY;* Cps. 500 mg cinoxacină; ct. × 2 blist. × 10 cps. ***(P-RF)***

Ind: Trat. infecțiilor urinare la adult, cauzate de: Escherichia coli, Proteus vulgaris, Klebsiella și tulpini de Enterobacter. Prevenirea infecțiilor de tract urinar. Este necesară testarea in vitro a sensibilității germenului.
Dz: *Curativ: Adulți:* 1 g/zi, în 2-4 prize, timp de 7-14 zile. În IR dozarea se va face funcție de valoarea clearance-ului la creatinină. *Profilactic:* 250 mg înainte de culcare, timp de cinci luni.
Cind: Hipersensibilitate la cinoxacină sau la alte chinolone. Anurici. Perioadă de alăptare.
A!: Pot apărea reacții de hipersensibilitate grave, uneori letale, chiar la prima doză. Convulsii și modificări ale EEG au fost raportate la câteva cazuri. Precauție la pacienții cu afecțiuni ale SNC. Doza la pacienții cu IR va fi mai mică decât doza uzuală. Va fi evitată expunerea excesivă la soare. Atenție la pacienții cu disfuncție hepatică. Precauție în cazul asocierii cu: teofilină, cofeină, antiacide sau sucralfat, preparate cu fer sau zinc, anticoagulante orale, AINS, ciclosporină. Precauție la copii și adolescenți sub 18 ani; în sarcină; la șoferi și la persoane cu activități de precizie.
RA: Gastrointestinale: greață, anorexie, vărsături, colici/dureri abdominale, gust neplăcut, diaree. SNC: cefalee, amețeli, insomnie, tremurături, fotofobie, tinnitus. Hipersensibilitate: Eritem cutanat, urticarie, prurit, edeme, angioedeme și eozinofilie, rar reacții anafilactice, necroliză toxică tegumentară, eritem multiform, sindrom Stevens-Johnson. Hematologice: trombocitopenie. Alte reacții: creșteri tranzitorii ale transaminazelor, fosfatazei alcaline, ureei, clearance-ului la creatinină.

CIPROFIBRATUM

COD ATC: C10AB

LIPANOR® 100 mg *SANOFI ~ SYNTHELABO;* Cps. 100 mg ciprofibrat; ct. × 3 blist. × 10 cps. ***(P-6L)***

Ind: Reducerea nivelului crescut de colesterol și trigliceride în sânge, asociat cu restricții în dietă.

Dz: Oral. *Adulți:* max. 100 mg/zi. În caz de afectare moderată a funcției renale, 100 mg la 2 zile.
Cind: Afectare renală sau hepatică gravă. Copii. Perioada de sarcină și alăptare.
A!: Prudență la pacienții cu afecțiuni hepatice, renale sau cu hipotiroidie. Este recomandată supravegherea funcției hepatice sau nivelurile plasmatice ale trigliceridelor și colesterolului. Prudență în cazul asocierii cu: anticoagulante orale, anticoncepționale, hipoglicemiante orale sau cu alte hipolipemiante.
RA: Cefalee, amețeală, rash cutanat, urticarie sau prurit și simptome gastrointestinale (greață, vărsături, diaree și dureri de stomac). Efecte adverse musculare. Pneumopatii, impotență, căderea părului, somnolență, oboseală. Alterări ale testelor hepatice.

CIPROFLOXACINUM

COD ATC: J01MA02
S01AX13

ALCON CILOXAN *ALCON SRL;* Sol. oft., conține 0,3% (fl. × 5 ml) ***(P-RF)***

ARISTIN-C *ANFARM HELLAS;* Cpr. film. 500 mg ciprofloxacină ***(P-RF)***

CIFRAN *RANBAXY LABORATORIES Ltd.;* Cpr. film. 250 mg; 500 mg ***(P-RF)***

CIPHIN 250 *SLOVAKOFARMA;* Cpr. film. 250 mg; blist. × 10 cpr. film. ***(P-RF)***

CIPHIN 500 *SLOVAKOFARMA;* Cpr. film. 500 mg; blist. × 10 cpr. film. ***(P-RF)***

CIPHIN 750 *SLOVAKOFARMA;* Cpr. film. 750 mg; blist. × 10 cpr. film. ***(P-RF)***

CIPHIN® *SLOVAKOFARMA;* Sol. perf. 2 mg/ml; fl. × 50 ml; fl. × 100 ml ***(S)***

CIPLOX *DEMO SA;* Sol. oft./auric. 0,3%, Ung. oft. 0,3% ***(P-RF)***

CIPROLOX *CIPLA;* Ung. oft. 0,3% (tub × 5 g) ***(P-RF)***; Sol. oft. 0,35 (fl. × 5 ml) ***(P-RF)***

CIPRINOL *KRKA d.d.*; Cpr. film. 250 mg; 500 mg ciprofloxacină, blist. × 10 cpr.; Sol. inj. 100 mg (f. × 10 ml) ***(P-RF)***

CIPRINOL *KRKA d.d.*; Sol. perf. 2 mg/ml; fl. × 50 ml; fl. × 100 ml ***(S)***; Sol. inj. 100 mg/10 ml (f. × 10 ml) ***(P-RF)***

CIPROBAY® *BAYER AG;* Cpr. film. 250 mg ***(P-RF)***

CIPROBAY® 100 *BAYER AG;* Sol. perf. 100 mg/50 ml (fl. × 50 ml) ***(S)***

CIPROBAY® 100 *BAYER AG;* Sol. perf. 100 mg, 0,2% ***(S)***

CIPROBAY® 200 *BAYER AG;* Sol. perf. 200 mg/100 ml (fl. × 100 ml) ***(S)***

CIPROBAY® 200 *BAYER AG;* Sol. perf. 2 mg/ml ***(S)***

CIPROBAY® 400 *BAYER AG;* Sol. perf. 2 mg/ml ***(S)***

CIPROBAY® 500 *BAYER AG;* Cpr. film. 500 mg ***(P-RF)***

CIPROBID *CADILA HEALTHCARE;* Sol. perf. 2 mg/ml; ct. × 1 fl. × 100 ml ***(S)***

CIPROCIN *E.I.P.I.C.O.;* Cpr. 250 mg; 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

CIPROCORE *CORE Ltd;* Sol. perf. 2 mg/ml (fl. × 100 ml) ***(S)***

CIPRODAR® tb. film. *DAR AL DAWA;* Tb. film. 250 mg, 500 mg ***(P-RF)***

CIPROFLOXACIN *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cpr. film. 500 mg; blist. × 10 cpr. film. ***(P-RF)***

CIPROFLOXACINĂ 250 mg *LAROPHARM;* Cpr. film. 250 mg

CIPROFLOXACINĂ *SICOMED SA;* Conc. pt. sol. perf. 100 mg/10 ml

CIPROFLOXACINĂ LPH® 250 mg; CIPROFLOXACINĂ LPH® 500 mg *LABORMED PHARMA SA în colaborare CU TORRENT LTD.;* Cpr. 250 mg, 500 mg ***(S/P-6L)***

CIPROLEN 250 *HELCOR SRL;* Cpr. film. 250 mg; blist. × 10 cpr.; fl. × 10 cpr. ***(P-RF)***

CIPROLEN 500 *HELCOR SRL;* Cpr. film. 500 mg; blist. × 10 cpr.; fl. × 10 cpr. ***(P-RF)***

CIPRO QUIN® *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cpr. film. 500 mg

CIPROXIN 5%, 10%, *BAYER AG;* Micro. caps. + diluant, 50 mg/ml; 100 mg/ml, ct. × 1 fl. + fl. diluant ***(P-RF)***

CITERAL® 250 mg *ALKALOID AD;* Cpr. film. 250 mg; fl. × 10 cpr. ***(P-RF)***

CITERAL® 500 mg *ALKALOID AD;* Cpr. film. 500 mg; fl. × 10 cpr. ***(P-RF)***

CUMINOL 250 *ARMEDICA SA în colaborare cu CHEMO IBERICA SA;* Cpr. film. 250 mg ***(P-RF)***

CUMINOL 500 *ARMEDICA SA în colaborare cu CHEMO IBERICA SA;* Cpr. film. 500 mg ***(P-RF)***

EUCIPRIN *EUROPHARM SA;* Cps. 250 mg; ct. × 3 blist. × 4 cps.; ct. × 2 blist. × 6 cps. ***(P-RF)***; ct. × 50 blist. ***(S)***

GRENIS-CIPRO *GENEPHARM;* Cpr. film. 500 mg ***(P-RF)***

QUINTOR *LAB. TORRENT Ltd;* Cpr. film. 250 mg; 500 mg; blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

SERVIFLOX *SANDOZ GmbH;* Cpr. film. 250 mg, 500 mg ***(S/P-RF)***

SIFLOKS® *ECZACIBASI ILAÇ;* Cpr. film. 500 mg; ct. × 2 blist. × 7 cpr. *(P-RF)*

UFEXIL *DEMO SA;* Sol. perf. 2 mg/ml; sac × 100 ml ***(S)***

Ind: Adm. sist.: Infecții necomplicate și complicate produse de microorganisme sensibile la ciprofloxacină: infecții respiratorii; infecții ORL; infecții oculare; infecții renale și ale căilor urinare; infecții genitale; infecții ale tractului gastrointestinal, infecții biliare, peritonite; infecții ale pielii și țesuturilor moi; infecții ale oaselor și articulațiilor; septicemii; infecții sau risc de infecții (pentru profilaxie) la pacienții imunodeprimați; decontaminare intestinală selectivă la pacienții imunodeprimați. Adm. topică: Ulcere corneene cu: Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus; conjunctivite bacteriene cu: Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae; otită externă difuză, alte infecții ale urechii cu germeni sensibili.
Dz: *Adm. sist.: Adulți:* int.: 125-500 mg de 1-2 ori/zi; sol. perf.: 100-400 mg de 1-3 ori/zi. Trat. inițial i.v. poate fi continuat cu adm. int. Durata trat.: cel puțin 3 zile de la dispariția febrei sau a simptomelor clinice. La pacienții vârstnici și la cei cu IR dozele se adaptează în funcție de gravitatea bolii și de clearance-ul creatininei. *Adm. topică:* Conjunctival: 1-2 pic. la 15 min – 4 ore, în funcție de afecțiunea tratată. Auricular: 3-4 pic. de 2-4 ori/zi sau mai frecvent în funcție de necesitate.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produselor sau la alte chinolone. Femei gravide.
A!: În adm. sist.: Apariția unei diarei severe și persistente poate ascunde o colită pseudomembranoasă. Pot apărea creșteri temporare ale transaminazelor, fosfatazei alcaline sau icter colestatic. Precauție la pacienții cu epilepsie, depresie sau psihoze. În cazurile în care hipersensibilitatea și reacțiile alergice au apărut după prima adm., adm. trebuie întreruptă și se adm. trat. corespunzător. La apariția semnelor de tendinită, adm. trebuie întreruptă. Prudență la pacienții cu miastenia gravis. La copil și adolescent există posibilitatea apariției unor artropatii grave. Trebuie evitată expunerea directă și în exces la soare sau la ultraviolete. La adm. i.v. au fost raportate reacții tegumentare locale. În adm. topică: Înainte de utilizarea oftalmică se vor îndepărta lentilele de contact. Adm. auriculară necesită urmărirea atentă a pacientului. Utilizarea prelungită poate duce la proliferarea organismelor rezistente, inclusiv fungi, la nivelul ochiului sau a conductului auditiv extern. Trat. va fi întrerupt dacă se constată apariția rash-ului cutanat sau altor semne de hipersensibilitate. Atenție în cazul adm. asociate cu: fier, sucralfat, antiacide conținând magneziu, aluminiu, calciu, săruri de zinc sau medicamente sub formă de soluție tampon (antiretrovirale), teofilină, ciclosporină, warfarină, glibenclamid, probenecid, metoclopramid, didanozină, cafeină. Prudență la șoferi și la persoane cu activități de precizie.
RA: După adm. sist.: astenie; greață, diaree, dureri abdominale, moniliază, dispepsie, modificarea testelor hepatice, creșterea fosfatazei alcaline, anorexie, flatulență, icter, colită pseudomembranoasă, hepatite, necroză hepatică; prurit, erupții maculopapulare, urticarie, fotosensibilitate, transpirații, sindrom Stevens-Johnson, sindrom Lyell; flebită și tromoboflebită, tahicardie, migrenă, sincope, vasodilatație, vasculite; creșterea creatininei și ureei, edeme, hiperglicemie; artralgii; mialgii, inflamații articulare, tendinite, ruptură de tendon (predominant tendonul lui Ahile), agravarea miasteniei gravis; insomnie, agi-

tație, confuzie, halucinații, parestezii, anxietate, depresie, tremor, convulsii, psihoze, creșterea presiunii intracraniene; tulburări ale sensibilității gustative, parosmie, anosmie; eozinofilie, anemie, leucopenie, leucocitoză, valori anormale ale protrombinei, trombocitopenie sau trombocitoză; reacții alergice, febră, reacții anafilactoide/anafilactice; dispnee, edem laringian; tinitus, reducerea tranzitorie a auzului, tulburări vizuale, diplopie, cromatopsie; IRA, moniliază vaginală, hematurie, cristalurie, nefrită interstițială; reacții tegumentare locale la adm. i.v. După adm. oft.: senzație de arsură locală sau disconfort, senzație de corp străin, prurit, hiperemie conjunctivală, keratopatie/keratită, reacții alergice, edem palpebral, lăcrimare, fotofobie, infiltrat cornean, greață, scăderea acuității vizuale, reacții de hipersensibilitate, precipitate albe cristaline în porțiunea superficială a corneei.

CISPLATINUM *COD ATC: L01XA01*

CISPLAMIN *VIANEX;* Conc. pt. sol. inj.; fl. cu 20 ml sau 100 ml sol. 0,5 mg/ml cisplatină ***(S)***

CISPLAMIN *VIANEX;* Liof. pt. sol. perf. 10 mg sau 50 mg cisplatină ***(S)***

CISPLATIN "EBEWE" 10 mg *EBEWE PHARMA;* Conc. pt. sol. perf. 0,5 mg/ml; fl. × 20 ml ***(S)***

CISPLATIN "EBEWE" 25 mg *EBEWE PHARMA;* Conc. pt. sol. perf. 0,5 mg/ml; fl. × 50 ml ***(S)***

CISPLATIN "EBEWE" 50 mg *EBEWE PHARMA;* Conc. pt. sol. perf. 0,5 mg/ml; fl. × 100 ml ***(S)***

CISPLATIN INJECTABIL 10 mg/10 ml *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Conc. pt. sol. perf. 1 mg/ml; fl. × 10 ml ***(S)***

CISPLATIN INJECTABIL 50 mg/50 ml *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Conc. pt. sol. perf. 1 mg/ml; fl. × 50 ml ***(S)***

PLATAMINE *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Pulb. pt. sol. inj., 1 fl. conține 10 mg sau 50 mg ***(S)***

PLATINEX *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Sol. inj., 1 fl. conține 10, 25 sau 50 mg cisplatină ***(S)***

PLATIDIAM 10 *PLIVA-LACHEMA.;* Conc. pt. sol. perf. 0,5 mg/ml; fl. × 20 ml ***(S)***

PLATIDIAM 25 *PLIVA-LACHEMA.;* Conc. pt. sol. perf. 0,5 mg/ml; fl. × 50 ml ***(S)***

PLATIDIAM 50 *PLIVA-LACHEMA.;* Conc. pt. sol. perf. 0,5 mg/ml; fl. × 100 ml ***(S)***

SINPLATIN 10 *SINDAN SRL;* Pulb. liof. 10 mg cisplatină ***(S)***

SINPLATIN 50 *SINDAN SRL;* Pulb. liof. 50 mg cisplatină ***(S)***

Ind: Terapie paliativă în: tumori testiculare metastatice, tumori ovariene metastatice, cancer avansat al vezicii, cancer al capului și gâtului.

Dz: Adm. doar i.v., în perf. lentă, în sol. conţinând cel puţin 0,3% NaCl. Tumori testiculare metastatice: (cisplatină + sulfat de bleomicină + vinblastină) cisplatină: 20 mg/m^2 timp de 5 zile consecutive (ziua 1-5) repetate la fiecare 3 săpt., timp de 3 cicluri. Tumori ovariene metastatice: (cisplatină + adriamicină) cisplatină: 50 mg/m^2 la fiecare 3 săpt. (ziua 1); ca agent terapeutic unic, cisplatina trebuie adm. în doză de 100 mg/m^2, repetată la fiecare 4 săpt. Cancer avansat al vezicii urinare: agent chimioterapic unic: 50-70 mg/m^2 la fiecare 3-4 săpt.
Cind: Antecedente de reacţii alergice la cisplatină sau alte produse conţinând platină.
A!: A nu se folosi dispozitive din aluminiu pt. prepararea sau injectarea sol. Induce nefrotoxicitate, mielodepresie şi ototoxicitate. Trebuie efectuate teste audiometrice înaintea şi în timpul trat. Examenele hematologice trebuie efectuate săpt. Funcţia hepatică trebuie monitorizată periodic. Trebuie efectuate examene neurologice periodice. Trebuie măsurate înaintea începerii trat. şi înaintea fiecărei cure de cisplatină: creatinina serică, ureea, clearance-ul creatininei, nivelele de potasiu, magneziu şi calciu. Trebuie aşteptată normalizarea funcţiei renale înainte de readm. Adm. concomitentă de antibiotice aminoglicozide poate potenţa nefrotoxicitatea cisplatinei. Compuşii cu mecanism similar de acţiune şi activitate mutagenă similară sunt consideraţi carcinogeni.
RA: Nefrotoxicitate: IR, microhematurie, alterări tubulare renale. Ototoxicitate: tinnitus şi/sau pierderea auzului la frecvenţele înalte. Hematologice: leucopenie, trombocitopenie, anemie. Gastrointestinale: greţuri, vărsături, anorexie. Electroliţii serici: hipomagneziemie, hipocalcemie, hipofosfatemie, hiperuricemia survine cu aceeaşi frecvenţă ca şi creşterea ureei sanguine şi creatininei serice. Neurotoxicitate: neuropatii periferice, pierderea gustului şi a percepţiei spaţiale.

CLADRIBINUM

COD ATC: L01BB04

LITAK® 10 SOLUŢIE *LIPOMED AG;* Sol. parent., 2 mg/ml cladribină; ct. × 1 fl. × 5 ml; ct. × 5 fl. × 5 ml ***(S)***

Ind: Leucemia cu celule păroase; afecţiuni limfoproliferative cu grad redus de malignitate, recurente sau refractare, cum sunt limfomul non-hodgkinian difuz sau folicular, leucemia limfatică cronică şi macroglobulinemia Waldenström (ca trat. de linia a doua).
Dz: Leucemia cu celule păroase: un singur ciclu de trat. cu 0,14 mg/kg/zi, adm. s.c., 5 zile consecutiv sau un singur ciclu de trat. cu 0,10 mg/kg/zi, adm. în p.i.v., 7 zile consecutiv. Limfomul non-hodgkinian, leucemia limfatică cronică şi macroglobulinemia Waldenström: cicluri de trat. cu 0,10 mg/kg/zi, adm. s.c. sau i.v., 5 zile consecutiv; în medie, se vor adm. 3 cicluri.
Cind: Hipersensibilitate la cladribină; sarcină şi alăptare; pacienţi HIV-pozitivi. A nu se asocia cu fenitoină şi cu vaccinul contra febrei galbene.
A!: Sunt de aşteptat reacţii adverse toxice cum sunt mielo- şi imunosupresia, limfocitopenia pe termen lung şi infecţiile oportuniste. Prudenţă şi evaluarea atentă a raportului risc/beneficiu în cazul adm. pacienţilor cu infecţii acute, risc crescut de infecţie, mielosupresie manifestă sau infiltrare medulară, trat. mielosupresive prealabile, precum şi pacienţilor cu IR şi IH. În primele 2-4 luni după tratament, este esenţială monitorizarea atentă a hemogramei. Evaluări periodice ale funcţiilor renale şi hepatice. În cazul

complicațiilor infecțioase, este necesară instituirea trat. antibiotic adecvat. La pacienții cu masă tumorală mare se adm. profilactic alopurinol, monitorizând atent funcția renală. Precauție în cazul asocierii cu: vaccinuri vii; ciclosporină, tacrolimus și alte medicamente cu risc de mielosupresie. Precauție la șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Cele mai frecvente RA sunt mielosupresia, mai ales anemia, trombocitopenia și neutropenia, precum și imunosupresia, infecțiile și febra. Au mai fost raportate următoarele RA: febră, oboseală, frisoane, astenie, diaforeză, letargie, scăderea apetitului, constipație, dureri abdominale, purpură, peteșii, epistaxis, hemoragii, cefalee, parestezii, slăbiciune musculară, depresie, edem, tahicardie, ischemie miocardică, respirație și zgomote anormale, tuse, dispnee, eritem localizat, tumefacție, durere, flebită, prurit, mialgii, artralgii, dureri osoase.

CLARITHROMYCINUM *COD ATC: J01FA09*

CLARITROMICINĂ *SICOMED SA;* Cpr. film. 250 mg ***(P-RF)***

CLARITROMICINĂ *LEK PHARMATECH;* Gran. pt. susp. orală, 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml ***(P-RF)***

FROMLID 250 *KRKA d.d.;* Cpr. film. 250 mg claritromicină ***(P-RF)***

FROMLID 500 *KRKA d.d.;* Cpr. film. 500 mg ***(P-RF)***

FROMLID® 125 mg/5 ml *KRKA d.d.;* Gran. pt. susp. orală 125 mg/5 ml ***(P-RF)***

KLABAX *RANBAXY LAB.;* Cpr. film. 250 mg, 500 mg

KLACID *ABBOTT LABORATORIES;* Gran. susp. 125 mg/5 ml; fl. × 100 ml; fl. × 60 ml ***(P-RF);*** Cpr. film. 250 mg; blist. × 14 cpr.; blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

KLACID 500 *ABBOTT LABORATORIES;* Pulb. liof. 500 mg ***(S/P-RF)***

KLACID 500 *ABBOTT LABORATORIES;* Cpr. film. 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

KLACID SR *ABBOTT LABORATORIES;* Cpr. film. 500 mg; ct. × 1 blist. × 7 cpr.; ct. × 1 blist. × 5 cpr. ***(P-RF)***

KLERIMED 250; 500 *MEDOCHEMIE Ltd.;* Cpr. film.

LEKOKLAR® 250 mg, 500 mg *LEK PHARMACEUTICALS;* Cpr. film. 250 mg, 500 mg ***(P-RF)***

LEKOKLAR® XL 500 mg *LEK PHARMACEUTICALS;* Cpr. film. 500 mg ***(P-RF)***

Ind: Infecții medii și severe ale tractului respirator și infecții cutanate cu germeni sensibili.

Dz: *Adulți:* Int.: Susp. uz int.: 15 mg/kg/zi, fracționată la 12 ore. Cpr. film.: 250-500 mg la 12 ore, 6-14 zile. Inj. i.v.: 8-16 mg/kg/zi, timp de 2-5 zile.

Imediat ce starea pacientului o permite, se trece la terapia orală. Dozele pediatrice se stabilesc funcție de greutatea corporală. În situația unei afectări renale grave, este necesară micșorarea dozelor sau prelungirea intervalelor de adm.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la claritromicină sau alte macrolide. A nu se asocia cu: cisaprid, pimozid sau terfenadină. În caz de hipokaliemie. IH severă. Femei gravide sau în perioada de alăptare.
A!: La pacienții cu funcție hepatică alterată adm. se face sub supravegherea testelor hepatice. La pacienții cu tulburări medii ale funcției renale este necesară prudență. Poate determina apariția de germeni rezistenți sau micoze. În cazul unor diarei severe și trenante trebuie suspectată o colită pseudomembranoasă. Precauție în cazul asocierii cu: warfarină, lovastatin, disopiramidă, fenitoină, ciclosporină, carbamazepină, teofilină, digoxină, midazolam, astemizol, dihidroergotamină, alte macrolide, omeprazol, zidovudină, ritonavir.
RA: Tract gastrointestinal: greață, vărsături, dispepsie, dureri gastrice sau intestinale, diaree, glosită, stomatită, colorări ale mucoasei bucale, limbii și dinților. Reacții de hipersensibilitate: urticarie, exanteme ușoare, sindrom Stevens-Johnson, anafilaxie. Sistem nervos: cefalee, modificări de gust sau de miros, teamă, amețeli, halucinații, coșmaruri, confuzie sau psihoze, tulburări ale auzului. Sistem cardio-circulator: tulburări ale ritmului cardiac, inclusiv tahicardii ventriculare și torsada vârfurilor la pacienți cu QT prelungit. Ficat și căi biliare: creșteri tranzitorii ale concentrațiilor serice ale transaminazelor, fosfataze alcaline, bilirubinei, tulburări ale funcțiilor hepatice (hepatita hepatocelulară cu sau fără icter) uneori asociate cu: indispoziție, greață, vărsături, colici abdominale, acuze abdominale care pot mima o colică biliară, pancreatită, ulcer perforat sau un abdomen acut. Altele: hipoglicemie, trombocitopenie. La locul injectării pot apărea iritații venoase ca: inflamație, durere, sensibilitate locală sau flebită.

CLEMASTINUM

COD ATC: R06AA04

CLEMASTIN 1 mg *PROMEDIC SRL;* Cpr. 1 mg clemastină; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

TAVEGYL *NOVARTIS;* Cpr. 1 mg; ct. × 20 cpr. ***(P-6L)***

Ind: Febra fânului și alte rinopatii alergice. Urticarie de diferite cauze. Prurit, dermatoze pruriginoase. Adjuvant în eczeme acute și cronice, dermatite de contact și erupții provocate de medicamente. Înțepături și mușcături de insecte.
Dz: Int., înainte de mese. *Adulți și copii peste 12 ani:* 1 mg dimineața și seara, max. 6 mg. *Copii sub 12 ani:* 1/2-1 mg dimineața și seara.
Cind: Hipersensibilitate la clemastină. Copii sub 1 an.
A!: Precauție la pacienții cu glaucom cu unghi îngust, ulcer peptic stenozant, obstrucție piloroduodenală, hipertrofie prostatică cu retenție urinară și disectazia colului vezicii urinare. Potențează efectele sedativelor, hipnoticelor, IMAO și alcoolului. În timpul sarcinii și al alăptării. Precauție la șoferi și persoane cu activități de precizie.
RA: Oboseală, sedare; ocazional, stimularea SNC; uscăciunea gurii, cefalee, erupții cutanate, greață, dureri epigastrice și constipație.

CLINDAMYCINUM

COD ATC: G01AA10
D10AF02
J01FF01

CLINDACIN *THE UNITED PHARMA;* Cps. 150 mg clindamicină ***(P-RF)***

CLINDAMYCIN *HEMOFARM;* Sol. inj. i.m., i.v. 300 mg/ml ***(S/P-RF)***

DALACIN T *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Sol. cutanată 1% (fl. × 30 ml) ***(P-RF)***

DALACIN® C 150 mg, 300 mg *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Cps. 150 mg; 300 mg ct. × 2 blist. × 8 cpr. ***(P-RF)***

DALACIN C *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Sol. inj. 150 mg/ml *(S/P-RF)*

DALACIN® V *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Cremă vaginală 2%; tub × 40 g; tub × 20 g ***(P-RF)***

KLIMICIN *LEK;* Cps. 150 mg clindamicină; ct. × 1 fl. × 100 cps. ***(S)***; Sol. inj. 150 mg/ml (f. × 2 ml) ***(P-RF)***

KLINDAN 300 *LEK PHARMACEUTICALS;* Sol. inj. 150 mg/ml (f. × 2 ml) ***(P-RF)***

KLINDAN 600 *LEK PHARMACEUTICALS;* Sol. inj. 150 mg (f. × 4 ml) ***(P-RF)***

LANACINE *LANNACHER;* Cps. 300 mg ***(P-RF)***

Ind: Adm. sist.: infecțiile grave cu anaerobi, infecții pulmonare, abdominale și pelvine, septicemii, deosebit de eficace în septicemii cu Bacteroides fragilis. În actinomicoză. În infecții streptococice și pneumococice. În stafilococii severe, ca și în infecțiile cu stafilococi rezistenți la benzilpenicilină și meticilină. Pentru profilaxia chirurgicală. Pneumonia cu Pneumocystis carinii. Infecții cu protozoare (malaria falciparum, babesiază, toxoplasmoză - asociată cu alte antiprotozoare).
Adm. tegumentară: Trat. acneei.
Adm. vaginală: Trat. vaginitelor bacteriene, produse de Haemophilus, Gardnerella, Corynebacterium, anaerobi, precum și în vaginitele nespecifice.
Dz: Adm. sist.: *oral; adulți:* 150-450 mg la 6 ore; *copii:* 3-6 mg/kg la 6 ore; *inj.: adulți:* 600 mg – 4,8 g/zi fracționat; copii: 15-40 mg/kg/zi (fracționat). Adm. tegumentar: se folosește în soluție 1%. Adm. *vaginal:* 5 g cremă vaginală, seara la culcare, timp de 3-7 zile consecutiv la pacientele negravide și de 7 zile consecutiv la pacientele gravide.
Cind: Hipersensibilitate la clindamicină, lincomicină sau la oricare dintre componenții produsului; antecedente de enterită regională, colită ulceroasă. În perioada de alăptare.
A!: S-au semnalat colite pseudomembranoase. Poate determina dezvoltarea microorganismelor rezistente, îndeosebi a fungilor. În timpul trat. cu cremă vaginală, pacientele trebuie instruite să evite relațiile sexuale și să nu folosească tampoane sau să facă irigații vaginale. Crema vaginală conține ulei mineral care poate afecta produsele din latex sau cauciuc, cum sunt

prezervativele sau diafragmele vaginale. Precauție în cazul asocierii cu blocante neuromusculare. Precauție în primul trimestru de sarcină.

RA: După adm. sistemică: dureri abdominale, esofagită, greață, vărsături, diaree, colită pseudomembranoasă, rash maculopapular, urticarie, eritem multiform, uneori asemănător cu sindromul Stevens-Johnson, reacții anafilactice, glosită, stomatită, neutropenie tranzitorie (leucopenie), eozinofilie, agranulocitoză, trombocitopenie, afectare hepatică (uneori cu icter), poliartrită, disfuncții renale (creșterea azotemiei, oligurie, proteinurie). După adm. vaginală: Candidoză vaginală, vulvovaginită, vaginită cu Thricomonas, tulburări vulvovaginale, dureri vaginale, metroragie, infecții urinare, endometrioză, durere abdominală, halenă, cefalee, infecții bacteriene, fungice, candidoză sistemică, greață, vărsături, constipație, dispepsie, flatulență, diaree, tulburări gastrointestinale, hipertiroidie, amețeală și vertij, epistaxis, prurit, rash maculopapular, eritem, urticarie, tulburări ale gustului, disurie, metroragie, infecții ale tractului respirator superior, travaliu anormal.

CLOBETASOLUM *COD ATC: D07AD01*

CLOBETASOL *LAURMED SRL;* Ung. 0,05% clobetasol; tub × 20 g ***(P-RF)***

CLODERM *THE UNITED PHARMA;* Ung. 0,05% clobetasol; tub × 25 g ***(P-RF)***; Cremă 0,05% clobetasol; tub × 25 g ***(P-RF)***

DERMASONE *TECHNILAB INC;* Ung. 0,05% clobetasol; tub × 15 g ***(P-RF)***; Cremă 0,05% clobetasol; tub × 15 g ***(P-RF)***

DERMOVATE *GLAXO SMITHKLINE;* Cremă 0,05% (tub × 25 g); Ung. 0,05% (tub × 25 g); Loțiune 0,05% clobetasol; fl. × 25 ml ***(P-RF)***

Ind: Dermatoze rebele la corticoterapie. Cazuri severe de psoriazis și dermatite eczematoase.

Dz: 2-3 aplicații pe zi în funcție de severitatea leziunii, cure de câteva zile, până la o săpt.

Cind: Hipersensibilitate la clobetazol, alți corticosteroizi sau orice alt component. Leziuni infectate ale pielii. Infecții virale și fungice ale pielii, inclusiv herpes simplex și varicelă. Sarcină și alăptare. Leziuni tbc ale pielii. Nu se va folosi cu pansament ocluziv.

A!: A se evita contactul cu mucoasa conjunctivală. Se va utiliza doar pe perioade scurte de câteva zile până la maximum o săpt. Se recomandă evitarea utilizării la copii. Se va aplica cu precauție pe leziunile feței, ale abdomenului sau ale axilelor.

RA: Reacții locale: arsură, prurit, atrofie, striații, modificări ale pigmentației, infecții secundare și hipertricoză. Reacții sistemice: supresia reversibilă a axului adreno-hipotalamo-hipofizar, manifestări ale sindromului Cushing, hiperglicemie și glicozurie.

CLOBUTINOLUM *COD ATC: R05DB03*

TUSSAMED sirop *HEXAL AG;* Sirop 0,4% (fl. × 100 ml) ***(OTC)***

Ind: Trat. simptomatic pentru tusea neproductivă.

Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* 40-80 mg de 3 ori/zi; *copii între 7 și 12 ani:* 30-40 mg de până la 3 ori/zi; *copii între 4 și 6 ani:* 20-30 mg de până la 3 ori/zi; *copii între 2 și 3 ani:* 20 mg de până la 3 ori/zi; *copii sub 2 ani:* 10-20 mg de până la 3 ori/zi. Durata trat.: max. 5-7 zile. Se adm. int. nediluat. La pacienții cu IR este necesară ajustarea dozei în funcție de gradul afectării renale.

Cind: Hipersensibilitate la produs; tuse la pacienții astmatici; insuficiență respiratorie; intoleranță ereditară la fructoză. La pacienții cu risc de tulburări neuropsihice. Primul trimestru de sarcină.

A!: Nu se adm. la pacienții cu tuse productivă. Precauție la diabetici. Precauție în cazul asocierii cu: alcool etilic, antidepresive, neuroleptice, teofilină, penicilină în doze mari, analgezice, opioide, antihistaminice H1 sedative, barbiturice, benzodiazepine, alte anxiolitice, clonidină și derivați. Precauție în sarcină și alăptare. Precauție la șoferi și la persoane cu activități de precizie.

RA: Vertij, greață, vărsături, somnolență sau insomnie, tremor, dispnee, dureri gastrointestinale, diaree. Reacții de hipersensibilitate (anafilaxie): reacții alergice, convulsii, edem angioneurotic, urticarie, vărsături, prurit, halucinații, anxietate, sincopă, tahicardie, sindrom Stevens-Johnson.

CLOMIFENUM

COD ATC: G03GB02

CLOSTILBEGYT *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd;* Cpr. 50 mg clomifen; blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

OVA-MIT *REMEDICA;* Cpr. 50 mg clomifen; blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

Ind: Trat. insuficienței ovulatorii la pacientele care doresc să rămână însărcinate și care corespund următoarelor condiții: funcție hepatică normală; estrogenii endogeni în limite fiziologice.

Dz: Trat. va trebui inițiat cu 50 mg/zi timp de 5 zile. Terapia poate fi inițiată în orice moment dacă pacienta nu a avut metroragii recente. Dacă ovulația nu pare să se fi produs după primul ciclu de trat., se va începe un al doilea ciclu cu 100 mg/zi timp de 5 zile; cel mai devreme la 30 zile de cel anterior.

Cind: Afecțiuni hepatice. Metroragii anormale. Chist ovarian. Suspiciune de sarcină.

A!: Examen ginecologic complet va fi efectuat înaintea fiecărei serii terapeutice. Biopsia endometrială va trebui să excludă întotdeauna cancerul endometrial. În caz de metroragii, diagnosticul impune investigații complete. Pacientele care acuză dureri pelviene puternice în urma adm., vor fi examinate cu multă atenție. Dacă se produce mărirea de volum a ovarului, trat. va fi întrerupt până când ovarul revine la dimensiunea inițială. Precauție la șoferi și la persoane cu activități de precizie.

RA: Eriteme vasomotorii, disconfort abdominal, metroragii, tumefacția ovarelor, mastodinii, simptome vizuale, greață și vărsături, nervozitate și insomnie, cefalee, poliurie, depresie și astenie, urticarie și dermatită alergică, câștig ponderal, alopecie reversibilă. S-a raportat o retenție mai mare de bromosulfoftaleină (BSP). Posibil anomalii congenitale.

CLOMIPRAMINUM

COD ATC: N06AA04

ANAFRANIL *NOVARTIS;* Dj. 10 mg; 25 mg clomipramină; ct. × 3 blist. × 10 dj. ***(P-RF)***

CLOMIPRAMIN *PROMEDIC SRL;* Dj. 25 mg; fl. × 30 dj. ***(P-RF)***

Ind: Stări depresive cu etiologie și simptomatologie variate. Sindroame obsesiv-compulsive. Fobii și atacuri de panică. Catalepsie acompaniind narcolepsia. Stări dureroase cronice. Enurezis nocturn.
Dz: Depresii, sindroame obsesiv-compulsive și fobii: Oral: Inițial 25 mg de 2-3 ori/zi, sau 75 mg preparat retard (preferabil seara). Doza se crește progresiv (25 mg la fiecare câteva zile) până la 100-150 mg, sau 150 mg preparat retard în timpul primei săpt. de trat; max. 250 mg/zi. Doză de întreținere: 50-100 mg. Boli cronice dureroase: 10-150 mg/zi. Enurezis nocturn (doar la copiii peste 5 ani): inițial pentru *copiii între 5-8 ani:* 20-30 mg; pentru cei între 9-12 ani: 25-50 mg; pentru *copiii peste 12 ani:* 25-75 mg. Doza este unică, după masa de seară. Dacă se obține răspunsul dorit, trat. continuă circa 1-3 luni, cu scăderea progresivă a dozei.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la antidepresivele triciclice din grupul dibenzazepinelor. Tratament concomitent cu IMAO. IMA. Perioada de alăptare.
A!: Insuficiență circulatorie, BAV (gr. I-III), aritmii. Monitorizarea și ECG se indică în astfel de cazuri. Glaucom cu unghi îngust. Tulburări de micțiune datorită unui obstacol. Prag scăzut de convulsie. Boli severe hepatice și renale. Tumori ale medulo-suprarenalei. La bolnavii sub terapie anticonvulsivantă. Poate accentua hTA la cei cu circulație labilă sau hTA. La pacienți hipertiroidieni sau sub tratament cu preparate tiroidiene. Monitorizare cardiacă în cazul în care apar febră, dureri în gât sau alte simptome care sugerează o infecție virală (au fost semnalate câteva cazuri de agranulocitoză). Este necesară monitorizarea funcțiilor hepatică și renală. Determină creșterea incidenței cariei dentare. Dacă există risc suicidal, pacientul trebuie strict supravegheat. Înaintea intervențiilor chirurgicale, anestezistul trebuie să țină cont de faptul că pacientul este sub terapie cu clomipramină. Atenție în cazul asocierii cu: clonidină, guanetidină, rezerpină, metil-dopa, adrenalină, noradrenalină, amfetamină, alcool, barbiturice, benzodiazepine, anestezice generale, anticolinergice, chinidină, fenitoină, nicotină, fenotiazine, cimetidină, metilfenidat, alprazolam, disulfiram, estrogeni. Precauție la femei însărcinate, șoferi, persoane cu activități de precizie.
RA: Uscăciunea gurii, transpirații, constipație, tulburări ale acomodării vizuale și vedere încețoșată, tulburări de micțiune, înroșirea feței, midriază, glaucom, somnolență, bulimie, confuzie, dezorientare, halucinații, stări anxioase, agitație, tulburări de somn, manii, hipomanii, agresivitate, tulburări de memorare, depersonalizare, insomnie, coșmaruri, agravarea depresiei, incapacitate de concentrare, activarea simptomelor psihotice, amețeală, tremor, mioclonii, delir, tulburări de vorbire, parestezii, slăbiciune sau hipertonie musculară, convulsii, ataxie, modificări EEG, hiperpirexie, hTA posturală, tahicardie sinusală și modificări ECG, palpitații, aritmii, creșterea TA, tulburări de conducere, precum lărgirea complexului QRS, modificări PQ, blocuri de ramură, greață, vomă, tulburări abdominale, diaree, anorexie, creșterea transaminazelor, hepatită cu sau fără icter, reacții alergice, fotosensibilitate, prurit, edem, creștere ponderală, tulburări de libidou și potență, galactoree, mărirea sânilor, SIADH, leucopenie, agranulocitoză, trombocitopenie, eozinofilie,

purpură, tinitus. Întreruperea bruscă a trat. determină greață, vărsături, dureri abdominale, diaree, cefalee, nervozitate și anxietate.

CLONAZEPAMUM

COD ATC: N03AE01

RIVOTRIL *HOFFMANN LA ROCHE;* Cpr. 0,5 mg clonazepam; fl. × 50 cpr.; Cpr. 2 mg clonazepam; fl. × 30 cpr.; fl. × 100 cpr. ***(P-6L)***

Ind: Epilepsia sugarilor și a copiilor. Epilepsia adulților și în crizele focale.
Dz: Dozele se cresc treptat. Oral: *inițial: sugari și copii până la 10 ani:* 0,01-0,03 mg/kg/zi; copii de peste 10 ani și adulți: 1-2 mg/zi. *Întreținere: sugari și copii până la 10 ani:* 0,05-0,1 mg/kg/zi; *copii de 10-16 ani:* 1,5-3 mg/zi, *adulți:* 2-4 mg/zi. Doza zilnică se poate adm. seara, într-o priză unică. Doza max. la adult: 20 mg/zi.
Cind: Nou-născuți, în special la prematuri. Perioada de alăptare.
A!: La bolnavi cu afecțiuni renale sau hepatice. Atenție în situația asocierii cu: alcool, barbiturice, hidantoină. Precauție la femei însărcinate, șoferi și persoane cu activități de precizie.
RA: Oboseală, somnolență, ataxie, tulburări de comportament (excitație, iritabilitate și agresivitate), depresie respiratorie, incontinență urinară, hipotonie musculară, tulburări vizuale și de coordonare, la sugari sau la copii mici poate crește cantitatea secrețiilor salivare sau bronșice.

CLONIDINUM

COD ATC: C02AC01

CLONIDINĂ *LAB. REMEDIA;* Cpr. 0,1 mg clonidină fl. × 100 cpr. ***(P-6L)***

CLONIDINĂ CLORHIDRAT *PROMEDIC SRL;* Cpr. 0,075 mg; fl. × 50 cpr. ***(P-6L)***

CLONIDINĂ *SINTOFARM SA;* Cpr. 0,15 mg clorhidrat de clonidină; fl. × 50 cpr. ***(P-RF)***; fl. × 100 cpr. ***(S)***

CLONIDINĂ 0,15 mg *ARENA GROUP SA;* Cpr. 0,15 mg; fl. × 50 cpr. ***(P-6L)***

HAEMITON *AWD. PHARMA;* Cpr. 0,075 mg; 0,3 mg; ct. × 10 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

Ind: HTA, forme moderate și severe. Profilaxia migrenei și a altor forme de cefalee vasculară recurentă, trat. bufeurilor vasomotorii de menopauză.
Dz: 0,100-0,150 mg o dată și 0,200-0,300 mg/zi. Pt. profilaxia migrenei: 0,050-0,100 mg/zi, în două prize.
Cind: Sarcină. Psihoză depresivă în antecedente. Șoferi și persoane cu activități de precizie.
A!: Precauție în IR și IH, scleroză cerebrală, cardiopatie ischemică, IM recent.
RA: Hiposalivație cu uscăciunea gurii, somnolență, bradicardie, constipație, amețeli, cefalee, hipoxie, greață, vărsături.

CLOPIDOGRELUM

COD ATC: B01AC04

PLAVIX® *SANOFI PHARMA în colaborare cu BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC;* Cpr. film. 75 mg clopidogrel bază; ct. × 2 blist.; ct. × 6 blist. × 14 cpr.; ct. × 5 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

Ind: Reducerea evenimentelor aterotrombotice la pacienții cu accident vascular cerebral ischemic, (mai vechi de 7 zile, dar mai recent de 6 luni), infarct miocardic (anterior cu câteva zile, dar mai recent de 35 zile) sau arteriopatie obliterantă a membrelor inferioare dovedită; la pacienți cu sindrom coronarian acut fără supradenivelare de segment ST (angor instabil sau infarct miocardic non-Q), în asociere cu acid acetilsalicilic (AAS)
Dz: *Adulți și vârstnici:* 75 mg/zi, priză unică. La pacienții cu sindrom coronarian acut fără supradenivelare de segment ST, tratamentul trebuie inițiat cu o doză de încărcare unică, de 300 mg și apoi trebuie continuat cu o doză zilnică de 75 mg (în asociere cu AAS în doză zilnică de 75-325 mg). Deoarece dozele mai mari de AAS au fost asociate cu un risc crescut de sângerare, se recomandă să nu se depășească doza de 100 mg AAS/zi.
Cind: Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre componentele produsului. Afectare hepatică severă. Hemoragie activă. Sarcină și alăptare.
A!: Prudență la pacienții cu risc de sângerare: traumatisme, leziuni gastrointestinale și intraoculare, int. chir. sau alte stări patologice. Clopidogrelul va fi întrerupt cu 7 zile înainte de int. chir. Prudență în IR, IH. Precauție în cazul asocierii cu: warfarină, AINS, heparină, trombolitice, medicamente care pot induce leziuni gastrointestinale.
RA: Manifestări hemoragice: hemoragii digestive, purpură, echimoză, hematom, epistaxis, hematurie, hemoragie oculară, hemoragii intracraniene. Manifestări hematologice: neutropenie, anemie aplastică, trombocitopenie. Manifestări gastrointestinale: dureri abdominale, dispepsie, gastrită, constipație, diaree, grețuri, dureri dentare, vărsături, ulcere peptice, gastrice sau duodenale. Anomalii cutanate și ale fanerelor. Tulburări ale SNC și periferic: cefalee, amețeli, vertij, parestezii. Reacții de hipersensibilitate: reacții cutanate (rash maculo-papular sau eritematos, urticarie) și/sau prurit, bronhospasm, angioedem, reacții anafilactoide.

CLORAZEPAS DIKALII

COD ATC: N05BA05

TRANXENE® 5 mg *SANOFI ~ SYNTHELABO;* Cps. clorazepat dipotasic 5 mg; fl. × 30 cps. ***(P-RF)***

TRANXENE® 10 mg *SANOFI ~ SYNTHELABO;* Cps. clorazepat dipotasic 10 mg; fl. × 30 cps. ***(P-RF)***

Ind: Stări de anxietate reactivă; crize de anxietate; delirium tremens; sindrom de abstinență la alcoolici.
Dz: *Adulți:* 5-30 mg/zi, oral. *Copii peste 2 1/2 ani:* numai în cazuri excepționale, 0,5 mg/kg/zi, fracționat. La vârstnici și în IR este recomandată reducerea dozelor. Durata trat.: cât mai scurtă posibil, max. 4-12 săpt. Întreruperea trat. se face progresiv.
Cind: Hipersensibilitate la clorazepat, la alte benzodiazepine sau la oricare dintre componentele produsului; insuficiență respiratorie gravă; sindromul de

apnee în timpul somnului; IH gravă; glaucom cu unghi închis; copii sub 2 1/2 ani. Asocierea cu alcool.

AI: Folosirea repetată și îndelungată poate determina dezvoltarea toleranței și dependenței. Nu trebuie utilizat pentru trat. depresiilor și al psihozelor, deoarece poate să mascheze simptomele acestor afecțiuni. La copii durata trat. trebuie să fie scurtă și raportul risc/beneficiu trebuie evaluat cu atenție. La vârstnici, pacienți cu IR sau IH este necesară reducerea dozelor. Precauție la pacienții cu insuficiență respiratorie și la cei cu miastenia gravis. Prudență în cazul asocierii cu: antidepresive triciclice, antihistaminice H1, anxiolitice - altele decât benzodiazepinele, neuroleptice, clonidină, cisapridă, clozapină, opioide, barbiturice, curarizante, miorelaxante centrale. Se va evita adm. în timpul sarcinii sau alăptării. Prudență la șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Amețeli, somnolență, astenie, bradipsihie, hipotonie musculară, reducerea performanțelor psihomotorii, slăbiciune, ataxie, cefalee, tulburări de vedere, greață, vomă, modificări ale gustului, disconfort epigastric, diaree, creștere în greutate, diminuarea libidoului și tulburări menstruale, rash cutanat, dureri articulare, amnezie anterogradă, reacții paradoxale (iritabilitate, agitație motorie, convulsii, agresivitate, stări confuzionale), sindrom de rebound cu exacerbarea anxietății la întreruperea bruscă a trat. Utilizarea prelungită și în doze mari poate determina dezvoltarea toleranței și dependenței. Întreruperea bruscă a trat. poate provoca sindrom de abstinență.

CLOTRIMAZOLUM *COD ATC: D02AC01*

CANESTEN® GYN 3 *BAYER AG;* Cpr. vag. 200 mg; ct. × 1 blist. × 3 cpr. ***(OTC)***

CLOTRIMAZOL *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cremă 1% (tub × 15 g) ***(OTC)***

CLOTRIMAZOL *BIOFARM SA;* Sol. cut. 1 g/100 ml (fl. × 30 ml) ***(OTC)***

CLOTRIMAZOL *HYPERION;* Cremă 1% (tub × 20 g) ***(OTC)***

CLOTRIMAZOL *MARK INT.;* Cremă 1% (tub × 35 g) ***(OTC)***

CLOTRIMAZOL *PHARMAPLANT BIOGALENICA;* Sol. cut. 1% (fl. × 50 ml) ***(OTC)***

CLOTRIMAZOL 100 mg *SICOMED SA;* Cpr. vag. 100 mg; ct. × 2 blist. × 6 cpr. ***(OTC)***

CLOTRIMAZOL 100 mg *MAGISTRA C&C;* Cpr. vag. 100 mg; ct. × 2 blist. × 6 cpr. ***(OTC)***

DERMATIN *PHARCO PHARM;* Sol. cut. 1 g/100 ml (fl. × 20 ml) ***(OTC)***

GYNE LOTRIM *SHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Cremă vag. 1% (tub × 50 g); Cpr. vag. 100 mg; ct. × 6 cpr. ***(OTC)***

LOTRIMIN *SHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Cremă 1% (tub × 15 g) ***(OTC)***

MED-CLOTRIMAZOL *MEDIPHARMA SERV.;* Cremă 1% (tub × 40 g) ***(OTC)***

Ind: Dermatomicoze provocate de: dermatofiți (Trichophyton infecțios, tipuri de Microsporium, Epidermophyton floccosum); levuri (Candida albicans și alte tipuri de Candida); mucegaiuri și alte ciuperci (Malassezia furfur). În afecțiunile cutanate provocate de ciuperci și suprainfectate: micoze interdigitale (Tinea pedum, Tinea manuum); micoze ale pielii (Tinea corporis, Pityriasis versicolor); micoze ale plicilor cutanate (Tinea inguinalis, Eritrasma); paronichii în onicomicoze (Tinea unguium). În plus în: sicoza bărbii, Favus, vaginita micotică (mai ales cu Candida), vaginita cu Trichomonas, vaginită bacteriană nespecifică.
Dz: Crema și soluția se aplică local, de 2-3 ori/zi, până la 4 săpt. Cpr. se introduc intravaginal, unul, seara la culcare, timp de 6 zile (la nevoie 2/zi, dimineața și seara, 6-12 zile). Pudră: se aplică de 1-2 ori/zi în zona afectată. Durata terapiei: dermatomicoze: 3-4 săpt.; eritrasmă, pitiriasis: 3 săpt.
Cind: Hipersensibilitate la clotrimazol.
A!: Nu trebuie folosit în regiunea ochilor și mucoaselor. Măsuri igienice sunt foarte importante în vindecarea dermatomicozelor interdigitale. Crema vaginală nu se aplică în perioada menstruală. Crema și cpr. vaginale pot reduce eficacitatea și siguranța produselor din latex ca prezervativele și diafragmele, precum și a spermicidelor vaginale. Prudență în timpul sarcinii, mai ales în primul trimestru.
RA: Iritație locală, uscăciunea pielii, eritem, prurit, reacții alergice.

CLOZAPINUM *COD ATC: N05AH02*

LEPONEX *NOVARTIS;* Cpr. 25 mg; 100 mg clozapină; ct. × 5 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

Ind: Schizofrenia rezistentă la trat.; pacienți care nu răspund la neurolepticele clasice sau care nu le tolerează.
Dz: Oral: Doza inițială: 12,5 mg de 1-2 ori în prima zi, apoi 25 mg de 1-2 ori a doua zi. Doza zilnică va fi crescută treptat 25-50 mg/zi. Domeniul dozelor terapeutice: 300-450 mg/zi, divizate în mai multe doze. Unii pacienți pot necesita doze de până la 600 mg/zi. Doza max.: 900 mg pe zi. Doza de întreținere: se va folosi doza minimă eficientă. Trat. trebuie menținut minim 6 luni. Oprirea trat. se face prin reducerea gradată a dozei într-o perioadă de 1-2 săpt.
Cind: Hipersensibilitate la clozapină, antecedente de granulocitopenie/agranulocitoză induse de medicament, funcție deficitară a măduvei osoase, psihoze alcoolice sau alte psihoze toxice, intoxicații medicamentoase, comă, colaps circulator și/sau deprimarea SNC, IH, IR sau IC gravă. Perioada de alăptare.
A!: Poate provoca agranulocitoză. Utilizarea se va limita la pacienții schizofrenici care nu reacționează la trat. clasic, care au inițial leucogramă normală și la care se poate face numărarea regulată a leucocitelor. Se va acorda atenție specială oricărui semn care poate sugera neutropenie. Medicamentele care au un potențial de deprimare a funcției măduvei osoase nu vor fi folosite concomitent cu clozapină. Va fi evitată folosirea concomitentă de antipsihotice cu acțiune prelungită. Înaintea începerii trat. trebuie efectuată formula leucocitară, nr. de leucocite trebuie monitorizat săpt., timp de 18 săpt. și ulterior cel puțin lunar. Dacă în timpul trat. apar infecții și/sau numărul de leucocite scade sub 3000/mm^3 și/sau numărul absolut de granulocite neutrofile scade sub 1500/mm^3, trat. va fi întrerupt imediat. În cazul creșterii rapide a do-

zelor poate apărea hTA ortostatică, cu sau fără sincopă. Pacienții care încep trat. cu clozapină necesită o supraveghere medicală atentă. La pacienții cu convulsii în antecedente sau cu tulburări cardiovasculare, renale sau hepatice, doza inițială va fi de 12,5 mg, adm. o dată în prima zi, creșterea dozei va fi lentă și în trepte. În caz de disfuncție hepatică, funcția ficatului trebuie monitorizată regulat. Este indicată supravegherea atentă la pacienții cu hipertrofie prostatică și glaucom cu unghi îngust. Pacienții cu febră vor fi examinați, pentru a exclude posibilitatea unei infecții sau apariția agranulocitozei. În prezența febrei mari se va lua în considerare posibilitatea unui sindrom malign neuroleptic. La vârstnici, se începere trat. cu o doză foarte mică și limitarea creșterii dozelor ulterioare la 25 mg/zi. Atenție în cazul asocierii cu: medicamente cu potențial de deprimare a funcției măduvei osoase, alcool, IMAO, deprimante SNC (narcotice, antihistaminice, benzodiazepine); medicamente cu efecte anticolinergice, hipotensoare sau deprimante respiratorii; medicamente ce se fixează în proporție mare pe proteine plasmatice; cimetidină; fenitoină; litiu; adrenalină și derivați (efectul de creștere a presiunii sanguine poate fi inversat). Precauție la femei însărcinate, șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Hematologice: agranulocitoză, leucocitoză și/sau eozinofilie. SNC: somnolență, amețeală, cefalee, modificări EEG, scade pragul de apariție a convulsiilor, simptome extrapiramidale, sindrom malign neuroleptic. SNV: uscăciunea gurii, tulburări de vedere, tulburări ale reglării sudorației și ale termoreglării, sialoree. Aparat cardiovascular/respirator: tahicardie, hTA posturală, cu sau fără sincopă, colaps circulator profund, modificări ECG, aritmii cardiace, pericardită, miocardită. Aparatul digestiv: greață, vărsături, constipație, creșteri ale enzimelor hepatice, colestază. Sistemul genito-urinar: incontinență sau retenție urinară, priapism. Alte RA: hipertermie benignă, reacții cutanate, decese subite.

CODEINUM

COD ATC: R05DA04

CODEINĂ FOSFAT *LEK PHARMACEUTICALS;* Cpr. 15 mg fosfat de codeină fl. × 20 cpr. ***(P-RF)***

CODEINĂ FOSFAT 15 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. 15 mg ***(P-RF)***

CODEINĂ FOSFORICĂ *SINTOFARM SA;* Cpr. 15 mg; fl. × 30 cpr. ***(P-RF)***

CODEINĂ FOSFORICĂ *IASSYFARM SRL;* Cpr. 15 mg; fl. × 20 cpr. ***(P-RF)***

CODEINĂ FOSFORICĂ *OZONE LAB.;* Cpr. 15 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr.; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

CODEINĂ FOSFORICĂ *REMEDIA;* Cpr. 15 mg; fl. × 30 cpr. ***(P-RF)***

CODEINĂ FOSFORICĂ *FLORILEX PHARMAMIT;* Cpr. 15 mg; 2 folii × 10 cpr. ***(P-RF)***

CODEINĂ FOSFORICĂ *BIO EEL SRL;* Cpr. 15 mg; blist. × 25 cpr. ***(P-RF)***

CODEINĂ FOSFORICĂ 15 mg *MAGISTRA C&C;* Cpr. 15 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

CODEINĂ FOSFORICĂ 15 mg *AESCULAP SRL;* Cpr. 15 mg; ct. × 1 blist. × 30 cpr. ***(P-RF)***

CODEINĂ FOSFORICĂ 15 mg *FABIOL SA;* Cpr. 15 mg; fl. × 20 cpr. ***(P-RF)***

CODEINE PHOSPHATE *ICN HUNGARY;* Cpr. 15 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

FARMACOD *FARMACOM SA;* Cpr. 15 mg; fl. × 20 cpr. ***(P-RF)***

FOSFAT DE CODEINĂ *TERAPIA SA;* Cpr. 15 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

FOSFAT DE CODEINĂ 15 mg *LAROPHARM SRL;* Cpr. 15 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

Ind: Tuse iritativă neproductivă; dureri de intensitate moderată; diaree acută.
Dz: *Adult:* 15 mg o dată, se repetă la nevoie, nu înainte de 4 ore. *Copii între 7-15 ani:* 15-30 mg/zi. *Copii între 3-6 ani:* 7,5-15 mg/zi.
Cind: IC, IH, IR, alergie sau intoleranță la codeină, insuficiență respiratorie marcată; la copiii sub 3 ani; în prezența hipersecreției traheobronșice, la bolnavii cu diaree acută toxiinfecțioasă. Nu se asociază cu: fenotiazine, antidepresive triciclice, IMAO. Femei care alăptează.
A!: La bolnavii cu astm bronșic și emfizem pulmonar. Dozele mai mari de 0,3 mg/kg pot produce convulsii la copii. Nu se adm. timp îndelungat din cauza riscului dependenței. La doze mari poate surveni deprimarea respiratorie. Atenție în cazul asocierii cu: antihistaminice, tranchilizante, sedative, hipnotice, antiHTA, alcool; caolin. Prudență la femei însărcinate, mai ales în primele 3 luni. Figurează în lista substanțelor dopante.
RA: Constipație, greață, amețeli, disforie, somnolență; dozele mari deprimă respirația, la copiii mici pot provoca convulsii.

CODERGOCRINUM

COD ATC: C04AE01

CO-DERGOCRIN *PHARMAPLANT BIOGALENICA;* Sol. orală 0,1% mesilat de codergocrină (fl. × 5 ml; fl. × 10 ml) ***(P-6L)***

ERGOCEPS *ANTIBIOTICE IAȘI;* Sol. orală 1 mg/ml (fl. × 20 ml) ***(P-6L)***

HYDERGINE *NOVARTIS;* Sol. orală 0,1% (fl. × 50 ml) ***(P-6L)***

REDERGIN *LEK PHARMACEUTICALS;* Sol. orală 1 mg/ml (fl. × 50 ml) ***(P-6L)***; Sol. inj. 0,3 mg/ml (f. × 1 ml) ***(P-RF)***

SANTAMIN *P.N. GEROLYMATOS;* Cpr. 1,5 mg; fl. × 30 cpr. ***(P-6L)***; Sol. orală 0,1% (fl. × 20 ml) ***(P-6L)***

SECATOXIN *IVAX PHARMACEUTICALS;* Sol. orală în pic. 1,0 mg/1 ml ***(P-6L)***

Ind: Simptome și semne de deteriorare psihică, în special cele legate de îmbătrânire; boală cerebrovasculară acută; migrene și cefalee vasculare (trat. preventiv); tulburări vasculare periferice. Simptome subiective asociate cu HTA.
Dz: *Oral:* 3-6 mg/zi, în mai multe prize, înainte de mese. Se recomandă trat. prelungit (3 luni sau mai mult) și chiar repetarea lui. *Parenteral:* 0,3 mg codergocrină în p.i.v. sau inj. i.v. lentă, de 1-2 ori/zi. Alternativ, poate fi

adm. 0,3 mg i.m. sau s.c., o dată sau de mai multe ori pe zi. În cazuri grave, 0,3-0,6 mg i.m. sau s.c., de 1-2 ori/zi, asociat cu trat. oral. Poate fi adm. și în inj. intraarteriale: 0,3-0,6 mg, diluată în 10-20 ml ser fiziologic.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la medicament.
A!: În caz de bradicardie severă. După adm. inj., trebuie controlată TA, deoarece ar putea să scadă.
RA: Congestie nazală, greață, disconfort abdominal.

COFEINUM

COD ATC: NO6BC01

COFEINUM NATRIU BENZOIC *SICOMED SA;* Sol. inj. 0,250 mg cafeină (f. × 1 ml) ***(P-RF)***; ct. × 100 f. × 1 ml ***(S)***

Ind: Stări de precolaps. Boli infecțioase. Narcoze. Intoxicații cu morfină, opioide, cloralhidrat. IC cu bradicardie. Anoxemie, respirație Cheyne-Stockes. Nevralgii, cefalee, migrenă, fenomene secundare rahianesteziei. Antidot în intoxicația acută cu alcool.
Dz: *Adulți:* inj. s.c. 0,25-0,50 g o dată și 1-2 g pe zi. *Copiii peste 3 luni:* 0,05-0,70 g pe zi, doza zilnică se împarte în 2-3 inj. i.m.
Cind: Miocardită, tahicardie, excitație maniacală, iritabilitate, copii agitați, convulsii.
RA: Excitație centrală acută, nervozitate accentuată; palpitații cu tahicardie și extrasistole; vâjâituri în urechi; tulburări vizuale, hipertonie a musculaturii striate, diureză crescută.

COLCHICINUM

COD ATC: M04AC01

COLCHICINĂ *BIOFARM SA;* Cpr. 1 mg; fl. × 40 cpr. ***(P-RF)***

COLCHICINĂ *FABIOL SA;* Cpr. 1 mg; fl. × 40 cpr. ***(P-RF)***

Ind: Trat. accesului de gută, profilaxia acceselor la începutul trat. gutei cronice cu uricozurice sau uricoinhibitorii; poliartrită reumatoidă, sclerodermie, maladie periodică și alte boli inflamatorii cronice.
Dz: În criza acută de gută: inițial 1 mg, apoi 0,5 mg din 2 în 2 ore până la dispariția durerii. Max.: 6 mg/zi. În următoarele 10 zile doza se reduce, treptat, până la 1 mg/zi. Pentru prevenirea unei crize acute posibile: 0,5-1 mg/zi sau la 2 zile, timp de 3-6 luni.
Cind: IH și IR grave. Ulcer gastroduodenal. În sarcină și în perioada de alăptare.
A!: Prudență la bătrâni, debilitați, cardiaci, hepatici, renali și la cei cu suferințe gastrointestinale. Dacă apar fenomene dispeptice este necesar să se întrerupă trat. Se va evita la femeia în perioada fertilă.
RA: Fenomene de gastroenterită acută (greață, vomă, diaree, colici). Urticarie, erupții morbiliforme, anemie megaloblastică, leucopenie, neutropenie, agranulocitoză, anemie aplastică, azoospermie, nevrită periferică, alopecie.

COLECALCIFEROLUM

COD ATC: A11CC05
A11CC01

SICOVIT® D$_3$ *SICOMED SA;* Sol. inj. ***(P-RF)***

VIGANTOL® OIL *MERCK KGaA;* Sol. ulei. pt. adm. int., 1 ml conține 0,5 mg colecalciferol (fl. × 50 ml) ***(P-6L)***

VIGANTOLETTEN 500 *MERCK KGaA;* Cpr. 0,0125 mg; blist. × 30 cpr. ***(P-6L)***

VIGANTOLETTEN 1000 *MERCK KGaA;* Cpr. 0,025 mg; blist. × 30 cpr. ***(P-6L)***

VITAMINA D$_3$ HIDROSOLUBILĂ *SICOMED SA;* Sol. inj. 200 000 UI/ml (f. × 1 ml); ct. × 1 f. ***(P-RF)***; ct. × 100 f. ***(S/P-RF)***

Ind: Profilaxia rahitismului, spasmofilie și osteomalacie; în trat. osteoporozei.
Dz: *Oral: Copii:* 500-5 000 U.I./zi sau la 2 zile. *Adulți:* 500-7 500 U.I./zi. În trat. hipoparatiroidismului și pseudohipoparatiroidismului se adm. 10 000-200 000 U.I./zi (se va controla nivelul seric al calciului). *Inj.:* Rahitism și tetanie hipocalcemică: profilactic, 200 000-400 000 U.I. la fiecare 6 luni, până la vârsta de 5 ani; curativ, 200 000 U.I., o dată pe săpt., 2 săpt.; osteomalacie/osteoporoză: 200 000 U.I. la fiecare 15 zile, timp de 3 luni.
Cind: Hipercalcemie, hipercalciurie, sarcoidoză, litiază renală, hipersensibilitate la vitamina D. În sarcină și alăptare.
A!: Prudență în IR, la bătrâni, la bolnavii imobilizați, în hipercolesterolemie, în hipotiroidism. În trat. cu doze mari repetate, se supraveghează calcemia și calciuria și se va întrerupe adm. când calcemia depășește valoarea normală, iar calciuria depășește valoarea de 300-400 mg/24 ore. Atenție în cazul asocierii cu: barbiturice, fenitoină, diuretice tiazidice, digitalice, blocante ale canalelor de calciu.
RA: Hipercalcemie și/sau hipercalciurie cu hipersensibilitate la vitamina D. Persistența nivelului seric crescut al calciului se poate manifesta prin simptome acute (aritmii, greață, vomă, simptome psihice, tulburări ale stării de conștiență) și cronice (scădere ponderală, formare de calculi renali, nefrocalcinoză, calcificări ale țesuturilor moi, lipsa poftei de mâncare, sete intensă, poliurie).

COLISTINUM (SULFAS)

COD ATC: J01XB01

COLISTIN *ANTIBIOTICE IAȘI;* Pulb. inj. conține colistină 500 000 UI sau 1 000 000 UI; ct. × 1 fl. ***(P-RF)***; ct. × 100 fl. ***(S/P-RF)***

COLISTIN *SICOMED SA;* Cpr. 250 000 UI sulfat de colistină; ct. × 5 folii × 6 cpr. ***(P-RF)***

Ind: Trat. infecțiilor cu microorganisme sensibile la colistină: renale, urogenitale, meningeale; septicemie.
Dz: *Adm. inj.: Adulți și copii:* 50 000 U.I. colistină/kg/zi. *Nou-născuți la termen, prematuri și sugari:* 50 000-100 000 UI/kg/zi. Adm. în 2-3 inj. i.m. sau în p.i.v. lente (1 oră). *Adm. int.: Prematuri și nou-născuți:* 50 000 UI/kg/zi,

în 3-4 prize. *Sugari:* 100 000-150 000 UI/kg/zi, în 3-4 prize. *Copii între 1 și 12 ani* de 3-4 ori pe zi câte 1 000 000 UI. *Copii peste 12 ani* și *adulți* de 4 ori pe zi câte 2 000 000 UI. În caz de IR doza trebuie ajustată în funcție de valorile clearance-ului la creatinină sau al creatininemiei.

Cind: Hipersensibilitate la polimixine. Miastenia gravis. Sarcină și alăptare.

AI: Prezența IR impune ajustarea dozelor și supravegherea atentă a pacientului pentru a observa eventuala apariție a paresteziilor peribucale. Aceeași supraveghere atentă trebuie efectuată și în cazul unui trat. de lungă durată. A nu asocia cu alte produse medicamentoase nefrotoxice. Colistina potențează efectul curarizantelor.

RA: IR, reversibilă la întreruperea trat. Reacții alergice. Blocul neuromuscular, la pacienții cu IR.

COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POLIMALTOZAT

COD ATC: B03AB04

FERRUM HAUSMANN *VIFOR;* Sirop, 1 ml conține fer (III) 10 mg, sub formă de complex hidroxid de fer (III)-polimaltozat 3,75 mg; ct. × 1 flac. a 150 ml ***(P-6L)***; Sol. orală, 1 ml sol. conține fer (III) 50 mg, sub formă de complex hidroxid de fer (III)-polimaltozat 178,6 mg; ct. × 1 flac. a 30 ml sol. orală ***(P-6L)***; Sol. inj. i.m., f. de 2 ml ce conțin 100 mg fer sub formă de complex polimaltozat de hidroxid de fer (III) ***(P-6L)***

PHARMA FERRUM sol. 5% *PHARMA PLANT BIOGALENICA;* Sol. orală ***(P-6L)***

Ind: *Sirop:* Tratamentul carenței latente de fer și al anemiei feriprive (carența de fer manifestă). Profilaxia carenței de fer în timpul sarcinii. *Sol. orală:* Profilaxia carenței de fer pentru a acoperi aportul zilnic recomandat femeilor în timpul sarcinii și alăptării, precum și la copii, adolescenți, femei fertile, adulți (ex. vegetarieni și vârstnici). *Sol. inj.:* Tratamentul carenței de fer când preparatele orale cu fer nu sunt eficiente sau nu pot fi utilizate: pacienți care nu tolerează sau nu răspund la terapia orală cu fer, cu malabsorbție, pacienți non-complianți la terapia orală cu fer, afecțiuni gastro-intestinale (ex. colita ulceroasă) care pot fi agravate de o terapie orală cu fer. Administrarea la copii sub 4 luni nu este indicată.

Dz: *Sirop, Sol. orală:* Anemie feriprivă (carența de fer manifestă): tratamentul durează aproximativ 3-5 luni, până la normalizarea valorilor hemoglobinei. Tratamentul trebuie continuat câteva săptămâni sau, în cazul femeilor gravide, cel puțin până la sfârșitul sarcinii, cu un dozaj asemănător celui descris în cazul carenței latente de fer, pentru refacerea depozitelor de fer. Carența latentă de fer: tratamentul durează aproximativ 1-2 luni. Administrarea se face în timpul mesei sau imediat după masă și se poate amesteca cu sucuri de fructe și legume sau cu alimente administrate cu biberonul. Se utilizează flacoanele dozatoare, doza putând fi divizată sau nu în mai multe prize.

Sirop: Carența de fer manifestă clinic: *copii până la 1 an,* 2,5-5 ml/zi (25-50 mg fer); *copii 1-12 ani,* 5-10 ml/zi (50-100 mg fer); *copii peste 12 ani, adulți, femei care alăptează,* 10-30 ml/zi (100-300 mg fer); *gravide,* 20-30 ml/zi (200-300 mg fer). Carența latentă de fer: *copii 1-12 ani,* 2,5-5 ml/zi (25-50 mg fer); *copii peste*

12 ani, adulți, femei care alăptează, 5-10 ml/zi (50-100 mg fer); *gravide,* 10 ml/zi (100 mg fer). *Profilaxie: gravide,* 5-10 ml/zi (50-100 mg) fer.

Sol. orală: Anemie feriprivă: *copii până la 1 an,* 10-20 picături/zi (25-50 mg fer); *copii 1-12 ani,* 20-40 picături/zi (50-100 mg fer); *copii peste 12 ani, adulți, femei care alăptează,* 40-120 picături/zi (100-300 mg fer); *gravide,* 80-120 picături/zi (200-300 mg fer), *prematuri,* 1-2 picături/kg și zi timp de 3-5 luni (2,5-5 mg fer). Carența latentă de fer: *copii până la 1 an,* 6-10 picături/zi (15-25 mg fer); *copii 1-12 ani,* 10-20 picături/zi (25-50 mg fer); *copii peste 12 ani, adulți, femei care alăptează,* 20-40 picături/zi (50-100 mg fer); *gravide,* 40 picături/zi (100 mg fer). *Profilaxie: copii până la 1 an,* 2-4 picături/zi (5-10 mg fer); *copii 1-12 ani,* 4-6 picături/zi (10-15 mg fer); *copii peste 12 ani, adulți, femei care alăptează,* 4-6 picături/zi (10-15 mg fer); *gravide,* 20-40 picături/zi (50-100 mg fer).

Sol. inj.: Adm. exclusiv i.m., cu efectuarea testului de toleranță înaintea administrării primei doze, astfel: se administrează ¼ - ½ dintr-o fiolă (25-50 mg fer) la *adulți* și jumătate din doza zilnică la *copii.* Dacă nu apar reacții adverse în cel puțin 30 minute de la administrare se poate administra restul cantității din doza inițială. Doza trebuie adaptată individual, în funcție de deficitul total de fer, calculat după formula următoare: Deficitul total de fer [mg] = Greutate [kg] × (Hb țintă - Hb actuală) [g/l] × 0,24* + depozitele de fer [mg]. Numărul total de fiole de administrat = deficitul total de fer [mg]/100 mg. Dacă doza totală necesară depășește doza zilnică maximă admisă, doza se administrează în mai multe prize.

Posologie obișnuită: *adulți:* 1 fiolă zilnic (2,0 ml = 100 mg fer); *copii,* în funcție de greutatea corporală. *Doza zilnică maximă tolerată: copii < 5 kg:* ¼ fiole (0,5 ml = 25 mg fer); *copii între 5 și 10 kg:* ½ fiole (1,0 ml = 50 mg fer); *pacienți cu greutatea între 10 și 45 kg:* 1 fiolă (2,0 ml = 100 mg fer); *adulți:* 2 fiole (4,0 ml = 200 mg fer).

Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului. Cazuri de supraîncărcare cu fer (hemocromatoză, hemosideroză) sau tulburări în metabolismul ferului (anemia saturnină, anemia sideroacrestică, talasemia etc.) și alte anemii care nu sunt determinate de carența de fer (ex. anemia hemolitică). Sol. inj.: Hipersensibilitate la complexul polimaltozat de hidroxid de fer (III) sau polimaltoză; anemia necauzată de carența de fer (ex. anemia hemolitică, anemia megaloblastică cauzată de carența vitaminei B_{12}, tulburări ale eritropoiezei, hipoplazia medulară); supraîncărcare cu fer (ex. hemocromatoză, hemosideroză); tulburări în utilizarea ferului (anemia sideroacrestică, talasemia, anemia saturnină, porfiria cutanată); sindromul Osler-Rendu-Weber; poliartrita cronică; astmul bronșic; afecțiuni renale infecțioase în fază acută; hiperparatiroidismul necontrolat; ciroza hepatică decompensată; hepatita infecțioasă; primul trimestru de sarcină; adm. i.v.

A!: Diabetici: produsul conține 0,04 unități de pâine/ml. În timpul sarcinii și alăptării trebuie utilizat doar după ce a fost analizat raportul beneficiu matern/risc fetal. *Sol. inj.:* Pot apărea reacții alergice sau anafilactoide (se tratează cu antihistaminice sau adrenalină). Prudență la administrare în cazul pacienților cu alergii, insuficiență renală, hepatică, angiocardiopatie, astm bronșic, cu capacitate scăzută de legare a ferului și/sau carență de acid folic, pacienți cu infecții acute sau cronice. Nu se administrează fiolele concomitent cu preparate orale cu fer (terapia orală cu fer se începe la cel puțin o săptămână după ultima injecție). La femei gravide se adm. numai dacă beneficiul tratamentului depășește potențialul risc pentru făt.

RA: Ocazional, pot apărea iritații gastrointestinale: senzație de plenitudine gastrică, presiune în regiunea epigastrică, greață, constipație sau diaree. Colorarea în negru a fecalelor fără semnificație clinică. *Sol. inj.:* în mod ocazional, pot apărea reacții locale, cum ar fi: durere la locul injectării, pigmentarea de durată a pielii, dureri articulare, inflamarea ganglionilor limfatici, febră, cefalee, amețeală, disconfort abdominal, greață, vomă, care se tratează simptomatic. Foarte rar pot apărea reacții alergice sau anafilactoide.

COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) SUCROZĂ

COD ATC: B03AC

VENOFER® *VIFOR SA;* Sol. inj./perf. i.v. 20 mg/ml fer (f. × 5 ml) ***(P-RF)***

Ind: Trat. carenței de fer când preparatele orale cu fer nu sunt suficient de eficiente, sunt ineficiente sau nu pot fi utilizate.
Dz: Adm. inj., exclusiv i.v., doza trebuie calculată pentru fiecare pacient în funcție de gradul carenței de fier. Posologie obișnuită: *Adulți:* 100 mg fier/zi, *copii:* dozare în funcție de greutate. Doza max. zilnică: *copii < 5 kg:* 25 mg, *copii între 5 și 10 kg:* 50 mg, *adulți:* 200 mg. Înaintea adm. primei doze se poate efectua un test de toleranță adm. 1/4-1/2 fer polimaltozat (25-50 mg fier) la adulți și jumătate din doza zilnică la copii.
Cind: Hipersensibilitate la produs; anemia necauzată de carența de fier; supraîncărcare cu fier; tulburări în utilizarea fierului; sindrom Osler-Rendu-Weber; poliartrită cronică; astm bronșic; afecțiuni renale infecțioase în fază acută; hiperparatiroidism necontrolat; ciroză hepatică decompensată; hepatită infecțioasă; primul trimestru de sarcină; adm. i.v.
A!: Adm. parenteral poate cauza reacții alergice și anafilactoide. Se va acorda atenție sporită pacienților cu alergii, IR și IH. Incidența efectelor nedorite la pacienții cu angiocardiopatie poate crește complicațiile cardiovasculare. Pacienții cu astm bronșic, pacienții cu capacitate de legare a fierului scăzută și/sau deficiență de acid folic sunt, în mod particular, predispuși la reacții alergice sau anafilactice. Adm. parenteral, preparatele cu fier pot influența nefavorabil evoluția infecțiilor la copii. Adm. concomitentă a IEC poate crește efectul sistemic al preparatelor parenterale cu fier.
RA: Dureri articulare, inflamarea ganglionilor limfatici, febră, cefalee, amețeală, tulburări abdominale, greață, vomă, foarte rar reacții alergice sau anafilactoide, o tehnică de inj. necorespunzătoare determină pigmentarea pielii, durere și inflamație la locul adm.

CYANOCOBALAMINUM

COD ATC: B03BA

VITAMINA B_{12} (SICOVIT B_{12}) *SICOMED SA;* 50 μg/ml sau 1000 μg/ml cianocobalamină (f. × 1 ml) ***(P-RF)***

Ind: Anemii pernicioase și parapernicioase. Anemie megaloblastică după gastrectomie sau asociată cu tulburări gastrointestinale. Anemii ale hepaticilor; anemii toxiinfecțioase, debilitate, convalescență, astenie, prematuri. Anorexie, denutriție. Osteoporoză, osteoartrită. Polinevrite alcoolice, diabetice, nevrite, nevralgii cervicobrahiale și faciale, Zona zoster. Ciroze hepatice, hepatite cronice, oliguria hepaticilor.
Dz: I.m., în anemia pernicioasă 100-1000 μg/zi, 2 săpt., apoi o dată pe lună; în nevrite 1000 μg/zi.
Cind: Policitemii, boli precanceroase.

CYCLOPENTOLATUM

COD ATC: S01FA04

HUMAPENT *HUMAN CO.;* Sol. oft. 0,5% clorhidrat de ciclopentolat (fl. × 10 ml) *(S/P-RF)*

Ind: Obținerea midriazei și cicloplegiei în scop diagnostic.
Dz: Instilații conj. *Adulți:* Inițial o picătură, urmată de o a doua picătură după 5 minute. *Copii:* o picătură de soluție 0,5%, 1%, urmată după 5 min, dacă se consideră necesar, de o a doua picătură de soluție 0,5% sau 1%.
Cind: Glaucomul cu unghi îngust.
A!: Prudență la pacienții în vârstă sau la cei cu presiunea intraoculară crescută. Examinarea tonometrică înaintea instilării oculare a picăturilor.
RA: Creșterea presiunii intraoculare. Reacții psihotice și tulburări comportamentale la copii. Ataxie, vorbire incoerentă, agitație, halucinații, lipsa capacității de orientare în timp și spațiu, tahicardie.

CYCLOPHOSPHAMIDUM

COD ATC: L01AA

ENDOXAN *SINDAN SRL*; Pulb. pt. sol. perf. 200 mg; 500 mg; 1000 mg ciclofosfamidă; ct. × 1 fl. *(S)*; Dj. 50 mg; ct. × 5 blist. × 10 dj. *(S)*

ENDOXAN-ASTA *ASTA MEDICA;* Pulb. pt. sol. inj. 200 mg; 500 mg; 1000 mg; ct. × 1 fl. *(S)*

SINFOSFAMIDA *SINDAN SRL;* Liof. pt. sol. inj. 200 mg; ct. × 1 fl. *(S)*

Ind: Ca medicație anticanceroasă (leucemii limfatice sau mieloide acute și cronice, limfoame maligne hodgkiniene și nonhodgkiniene, plasmocitom, tumori maligne solide, inclusiv metastaze - carcinom ovarian și testicular, carcinom mamar, carcinom bronșic, neurobalastom, sarcom Ewing). Ca medicație imunodepresivă (evitarea rejetului transplantelor de măduvă și alte organe; trat. în unele boli autoimune severe - poliartrită reumatoidă, artropatie psoriazică, lupus eritematos diseminat, sclerodermie, vasculite sistemice, nefropatii autoimune corticorezistente, miastenia gravis, anemii hemolitice autoimune, siclemie).
Dz: Dozele de ciclofosfamidă, intervalele între doze, durata trat. și schemele derapeutice (monoterapie, polichimioterapie) sunt în funcție de indicații. Adm. numai i.v., de preferință în perf.: 3-5 mg/kg/zi, ca trat. de întreținere; 10-15 mg/kg la intervale de 2-5 zile; 20-40 mg/kg la intervale de 21-28 zile După ce s-a obținut o remisiune satisfăcătoare, terapia de întreținere cu dj: 50-200 mg/zi, dimineața cu cantități mari de lichide.
Cind: Hipersensibilitate la ciclofosfamidă sau la oricare dintre componenții produsului, aplazie medulară, infecții acute, cistită hemoragică. Sarcină și alăptare.
A!: În prezența mielodepresiei și în funcție de severitatea acesteia, adm. ciclofosfamidei se întrerupe, se crește intervalul între doze sau dozele se micșorează. Este necesar controlul regulat al hemogramei. Înainte de începerea trat. este necesară combaterea eventualelor infecții. Pentru pacientele de vârstă fertilă sunt necesare măsuri contraceptive în timpul trat. și cel puțin 3 luni după oprirea acestuia. Prudență și reducerea dozelor la pacienții debilitați și în caz de IH sau IR. Înainte de începerea trat. trebuie măsurată diureza pacientului și se efectuează examenul urinei. Este necesar controlul periodic

al sedimentului urinar. Este necesară hidratarea corespunzătoare și asocierea de mesna pt. prevenirea cistitei hemoragice. Precauție în cazul asocierii cu: alți agenți care pot afecta măduva hematopoietică, alopurinol, hidroclorotiazidă, antracicline (doxorubicină, daunorubicină etc.), antidiabetice, suxametoniu, indometacină, inductoare enzimatice (fenobarbital, fenitoină, rifampicină), inhibitoare enzimatice (cloramfenicol, cimetidină), vaccinuri vii atenuate. Precauție la șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Deprimarea hematopoiezei (îndeosebi granulopoieza și limfopoieza), hematurie, cistită hemoragică sterilă, azoospermie, amenoree, afectarea gonadelor în perioada prepuberală, afectarea inimii manifestată prin tahiaritmii și IC, alopecie, greață, vărsături, ulcerații ale mucoasei digestive, diaree, anorexie; rar, hepatotoxicitate cu modificări ale valorii testelor de laborator (LDH, SGOT, CPK, fosfataza alcalină, bilirubină); tulburări ale metabolismului glucidic – hiperglicemie; retenție hidrică cu hiponatremie și fenomene de intoxicație cu apă, are proprietăți carcinogene (risc de dezvoltare a unor tumori secundare – carcinoame ale căilor urinare, modificări mielodisplazice, inclusiv leucemii acute); pigmentarea unghiilor și pielii, pneumonită și fibroză pulmonară interstițială, tulburări vizuale tranzitorii și vertij, reacții de hipersensibilitate, inclusiv șoc anafilactic.

CYCLOSERINUM

HELPOCERIN *HELP PHARM.;* Cps. 250 mg cicloserină; ct. × 5 blist. × 10 cps. ***(S/P-RF)***

Ind: În trat. tuberculozei active pulmonare și extrapulmonare, când trat. cu antituberculoase majore (streptomicină, izoniazidă, rifampicină, etambutol) s-a dovedit a fi ineficient. Cicloserina trebuie adm. în asociere cu o chimioterapie eficientă și nu ca agent terapeutic unic. Cicloserina este eficientă în tratarea infecțiilor urinare acute produse de specii sensibile de bacterii gram-negativ și gram-pozitiv, îndeosebi Enterobacter sp. și Escherichia Coli.

Dz: 0,5-1 g cicloserină/zi, po în 2 prize. Se recomandă ca la inițierea trat. (în primele 2 săpt.) să se adm. oral 0,5 g de 2 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la cicloserină; epilepsie; depresie, anxietate; psihoze; IR severă; alcoolism cronic.

A!: Înainte de începerea trat. cu cicloserină trebuie stabilită sensibilitatea organismului la med. și se vor realiza culturi. În cazul inf. tuberculoase trebuie testată sensibilitatea la alte antituberculoase din aceeași grupă. Adm. med. trebuie întreruptă sau dz. redusă dacă pacientul prezintă dermatite alergice sau convulsii, psihoze, somnolență, depresii, confuzie, hiperreflexie, cefalee, tremor, amețeală, parestezii, dizartrie. Indicele terapeutic în tuberculoză este mic. Există un risc mai mare de convulsii la alcoolici. Pacienții trebuie monitorizați d. p. d. v. hematologic, al funcțiilor hepatice și renale. Med. anticonvulsivante sau sedativele pot fi eficiente în controlarea simpt. de toxicitate asupra SNC cum ar fi convulsiile, anxietatea sau tremorul. Pacienții cărora li s-a administrat o doză de cicloserină mai mare de 500 mg pe zi trebuie monitorizați din acest punct de vedere. Administrarea cicloserinei și a altor antituberculoase a fost asociată în unele cazuri cu deficiența vitaminei B_{12} și/sau cea a acidului folic, cu anemie megaloblastică și anemie sideroblastică. Dacă semnele anemiei apar în timpul tratamentului, trebuie aplicată o

terapie adecvată. Se recomandă determinarea conc. plasm. a cicloserinei cel puțin o dată pe săptămână la pacienții cu IR, care primesc doze zilnice mai mari de 500 mg. Dz. trebuie ajustată astfel încât conc. plasm. să nu depășească 30 µg/ml.
Inter. med.: S-a demonstrat că administrarea concomitentă a etionamidelor are efecte neurotoxice. Alcoolul și cicloserina sunt incompatibile, în special când cicloserina este administrată în doze mari. Alcoolul mărește riscul de apariție a convulsiilor. Administrarea concomitentă a izoniazidei poate duce la creșterea efectelor asupra SNC (amețeală sau somnolență).
RA: *SNC:* convulsii, somnolență, cefalee, tremor, amețeală, confuzie, stări depresive, pierderi de memorie, manifestări psihotice, posibil însoțite de tendințe la suicid, schimbări de caracter, hiperiritabilitate, pareze, agresivitate, parestezii, comă. *Aparat cardiovascular:* scăderea bruscă a TA la pacienții cărora li s-a adm. 1-1,5 g/zi. Reacții alergice, erupții cutanate. Creșteri ale transaminazelor serice, în special la pacienții cu afecțiuni hepatice.

CYPROHEPTADINUM

COD ATC: R06AX02

CIPROHEPTADINĂ *MAGISTRA C&C.;* Cpr. 4 mg clorhidrat de ciproheptadină; fl. × 20 cpr.; fl. × 40 cpr. ***(P-6L)***

PERITOL *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Sirop 2 mg/5 ml clorhidrat de ciproheptadină (fl. × 100 ml); Cpr. 4 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

Ind: Rinită alergică și vasomotorie, dermatită de contact și alte dermatoze alergice pruriginoase, prurit în varicelă, reacții locale la înțepături de insecte, alergii medicamentoase, profilaxia reacțiilor alergice la sânge și plasmă, adjuvant în trat. șoc anafilactic; cefalee vasculară și histaminică; sindrom Dumping postgastrectomie, hipermotilitate intestinală prin carcinoid, carcinoid gastric secretor de serotonină și histamină; inapetență, mai ales la copii.
Dz: *Adulți:* 4-12 mg/zi. *Copii între 6 luni și 1 an:* – numai în mod excepțional – 0,4 mg/kg/zi; *între 3 și 6 ani:* 6 mg/zi; *între 7 și 14 ani:* 12 mg/zi.
Cind: Glaucom cu unghi îngust, stenoză pilorică, adenom de prostată, bătrâni, debilitați, copii sub 2 ani. Nu se asociază cu IMAO.
A!: Prudență în astmul bronșic, hipertiroidism, boli cardiovasculare, HTA. Prudență când se asociază cu băuturi alcoolice, deprimante centrale, antidepresive triciclice. Prudență în timpul sarcinii și alăptării. Prudență la șoferi și persoane cu activități de precizie.
RA: Somnolență, uscăciunea gurii, anorexie, tulburări de micțiune, amețeli, confuzie și ataxie, fenomene de excitație la copii.

CYPROTERONUM

COD ATC: G03HA01

ANDROCUR *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Cpr. 50 mg ciproteronă; ct. × 5 blist. × 10 cpr.; 1 fl. × 50 cpr. ***(P-RF)***

Ind: Carcinom de prostată inoperabil, devieri de comportament datorate excesului de androgeni, tendință de androgenizare la femei, pubertate precoce.

Dz: Combaterea efectului androgen adrenocortical după orhiectomie – 100-200 mg/zi; fără orhiectomie – 100 mg de 2-3 ori/zi, fără întrerupere, până la realizarea efectului terapeutic dorit. Combaterea creșterii testosteronului în trat. cu antagoniști LH-RH – inițial 100 mg de 2 ori pe zi, 5-7 zile, apoi 100 mg de 2 ori/zi, 3-4 săpt., asociat cu un antagonist LH-RH. În trat. excitabilității sexuale masculine exacerbate: 50-100 mg de 2 ori/zi (pe perioade scurte: 100 mg de 3 ori/zi). Pentru întreținerea efectului se va utiliza doza minimă eficace.
Cind: Afecțiuni hepatice, femei însărcinate sau care alăptează, depresii cronice severe, tulburări tromboembolice, modificări vasculare grave în cadrul diabetului zaharat.
RA: Tulburări de spermatogeneză și dinamică sexuală, ginecomastie, scăderea cortizolului circulant, modificări hepatice.

CYTARABINUM *COD ATC: L01BC*

ALEXAN® *HEINRICH MACK;* Sol. inj. 40 mg/2 ml citarabină (f. × 2 ml); 100 mg/5 ml citarabină (f. × 5 ml) ***(S)***.

CYTOSAR™ *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Pulb. pt. sol. inj. fl. a 100 mg; 500 mg; 1000 mg ***(S)***

Ind: Leucemia acută non-limfocitară la adult și copil. Leucemia acută limfocitară. Leucemia mielocitară cronică (faza blastică).
Dz: *Adulți și copii:* Terapia de inducție a leucemiei acute non-limfocitare: 100 mg/m^2/zi, în p.i.v. sau 100 mg/m^2 i.v. la interval de 12 ore (zilele 1 până la 7). Adm. intratecală în leucemia cu afectare meningeală: 5-75 mg/m^2, o dată/zi, timp de 4 zile sau o dată la 4 zile. Schema de tratament folosită depinde de tipul și severitatea manifestărilor clinice și de răspunsul la terapia anterioară.
Cind: Hipersensibilitate la citarabină.
A!: Atenție la pacienții cu supresie medulară indusă anterior de medicamente. Monitorizarea leucocitelor și trombocitelor. Se va lua în considerare întreruperea sau modificarea terapiei în cazul trombocitelor < 50000 sau a PMN < 1000/mm^3. Nu se va folosi un diluant ce conține alcool benzilic. Tromboflebita a apărut la unii pacienți la locul de puncționare venoasă. Pacienții cu afectare renală sau hepatică pot avea un risc mai mare de toxicitate a SNC după terapia cu doze mari. Controale regulate ale măduvei spinării, ale funcției ficatului și rinichiului. Trebuie monitorizate nivelele serice de acid uric. Precauție în cazul asocierii cu: alți agenți antineoplazici sau mielosupresivi sau cu radioterapie, digoxină, gentamicină. Precauție la femei însărcinate sau care alăptează.
RA: Anemie, leucopenie, trombocitopenie, megaloblastoză, modificări morfologice celulare la nivelul măduvei spinării și pe frotiul periferic; infecții virale, bacteriene, fungice, septicemie, pneumonie; sindromul citarabină (febră, mialgie, durere osoasă, câteodată durere toracică, rash maculopapular, conjunctivită, stare de rău general); anorexie, diaree, inflamație sau ulcerație orală sau anală, durere abdominală; durere în gât, ulcerații esofagiene, esofagită, febră, rash, prurit, ulcerația pielii, tromboflebită; celulită la nivelul locului de puncționare; afectare renală; toxicitate nervoasă, amețeală; anafilaxie, edem

alergic; durere toracică; pericardită, dispnee, cefalee. Uneori, la doze mari, toxicitate severă uneori fatală a SNC, toxicitate corneană reversibilă și conjunctivită hemoragică; afectare cerebrală și cerebelară cu modificări de personalitate, somnolență și comă; septicemie și abces hepatic; edem pulmonar; afectare hepatică cu hiperbilirubinemie; necroză intestinală; colită necrozantă, neuropatie periferică motorie și senzitivă, pneumonie interstițială difuză, alopecie, cardiomiopatie.

D

DACARBAZINUM

COD ATC: L01AX04

DACARBAZIN LACHEMA 100 *LACHEMA;* Liof. pt. sol. inj., 100 mg dacarbazină; ct. × 10 fl. ***(S)***

DACARBAZIN LACHEMA 200 *LACHEMA;* Liof. pt. sol. inj., 200 mg dacarbazină; ct. × 10 fl. ***(S)***

DALTRIZEN *SINDAN SRL;* Liof. pt. sol. inj., 100 mg dacarbazină; ct. × 1 fl. ***(S)***

DALTRIZEN *SINDAN SRL;* Liof. pt. sol. inj., 100 mg dacarbazină; ct. × 1 fl. ***(S)***

Ind: Melanom malign, maladia Hodgkin, leiomiosarcom, fibrosarcom, rabdomiosarcom, neuroblastom.
Dz: Soluția diluată: 10 mg/ml poate fi adm. inj. i.v. ca atare în aprox. 1 min sau p.i.v. în aprox. 30 min. *Melanomul malign:* 2-4,5 mg/kg/zi, de 10 zile, cu repetarea curei după 4 săpt. sau 250 mg/kg/zi timp de 5 zile, repetându-se după 3 săpt. (mono- sau polichimioterapie). *Maladia Hodgkin*: adulți: 150 mg/m^2/zi timp de 5 zile, cura repetându-se la 4 săpt.
Cind: Hipersensibilitate la dacarbazină, nr. de leucocite < 3 000/ mm^3 și trombocite < 100 000/mm^3, sarcină și alăptare.
A!: Monitorizare hematologică: controlul nr. de leucocite, trombocite și eritrocite; asocierea cu fenobarbital și fenitoină.
RA: Greață, vărsături, anorexie, diaree, stomatită; rash, eritem; leuco- și trombocitopenie; parestezii faciale tranzitorii, alopecie, creșterea valorilor TGO și TGP, simptome asemănătoare gripei - febră, mialgii și indispoziție.

DACLIZUMABUM

COD ATC: L04AA08

ZENAPAX® *HOFFMANN LA ROCHE;* Conc. pt. sol. perf., 5 mg/ml daclizumab; ct. × 1 fl. × 5 ml ***(S)***

Ind: Profilaxia rejecției acute de organ în transplantul renal alogen de novo, asociat cu un trat. cu imunosupresive, incluzând ciclosporină și glucocorticoizi, la pacienții care nu sunt hiperimunizați.

Dz: *Adulți:* 1 mg/kg. Concentratul se diluează în 50 ml soluție salină izotonă și se adm. i.v. timp de 15 min. Inițial, trebuie adm. în cele 24 h înainte de transplant. Dozele următoare trebuie adm. la intervale de 14 zile, până la un total de 5 doze.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la daclizumab sau la componenții produsului; sarcină și alăptare.
A!: Nu există experiență privind utilizarea daclizumabului la pacienții hiperimunizați. Se vor lua precauții pentru combaterea reacțiilor severe de hipersensibilitate. Pacienții tratați cu imunosupresive după transplant, prezintă risc crescut de dezvoltare a afecțiunilor limfoproliferative și a infecțiilor oportuniste. Nu există experiență la copii.
RA: Tulburări gastrointestinale (constipație, greață); edeme ale membrelor, tulburări ale SNC și periferic, tulburări ale aparatului urinar, durere posttraumatică, HTA, tulburări ale aparatului respirator, tulburări ale pielii și anexelor, tulburări musculo-scheletice, episoade infecțioase, tulburări limfoproliferative post-transplant, reacții severe de hipersensibilitate.

DACTINOMYCINUM *COD ATC: L01DA01*

COSMEGEN® *MERCK SHARP & DOHME;* Liof. pt. sol. inj., 0,5 mg dactinomicină; ct. × 1 fl. ***(S)***

Ind: Tumoră Wilms, rabdomiosarcom, carcinom de testicul și uter, alte neoplasme: trat. paleativ al sarcomului Ewing și al sarcomului botrioid.
Dz: În cure scurte. Adm. i.v.: Doza variază în funcție de toleranța pacientului, mărimea și localizarea neoplasmului, precum și de folosirea altor forme de terapie. Poate fi necesară reducerea dozelor uzuale sugerate, atunci când altă chimioterapie sau terapie cu raze × este folosită concomitent sau a fost folosită anterior. *Adulți* sau *copii:* max. 15 µg/kg/zi sau 400-600 µg/m 2/zi, timp de 5 zile. *Adulți:* uzual, 0,5 mg/zi, pt. max. 5 zile. *Copii:* 0,015 mg/kg/zi, timp de 5 zile. Ca o schemă alternativă, doza totală de 2,5 mg/m^2 suprafață corporală, este adm. timp de o săpt. Atât la adulți sau la copii, o cură secundară poate fi adm. după cel puțin 3 săpt.
Cind: Varicelă. Zona zoster. Copii sub vârsta de 6-12 luni. Femei care alăptează.
A!: Pulberea și soluția trebuie mânuite și adm. cu atenție. Este extrem de coroziv pentru țesuturile moi. Este necesară monitorizarea frecventă a pacientului pentru sesizarea apariției RA. În cazul trat. tumorii Wilms localizată pe partea dreaptă, adm. dactinomicinei timp de 2 luni, în care se face iradiere, necesită precauții suplimentare deoarece s-au observat hepatomegalie și valori crescute ale GOT serice. Dacă în timpul trat. apare stomatită, diaree sau depresie hematopoietică severă, adm. trebuie întreruptă până când pacientul își revine. Este necesară monitorizarea funcției renale, hepatice și măduvei osoase. Precauție în sarcină. Numărarea zilnică a trombocitelor și a leucocitelor.
RA: Diverse: indispoziție, fatigabilitate, letargie, febră, mialgie, proctită, hipocalcemie. Orale: cheilită, disfagie, esofagită, stomatită ulceroasă, faringită. Gastrointestinale: anorexie, greață, vomă, durere abdominală, diaree, ulcerații gastrointestinale, toxicitate hepatică inclusiv ascită, hepatomegalie, hepatită și modificări ale testelor hepatice. Hematologice: anemie, până la anemie aplas-

tică, agranulocitoză, leucopenie, trombopenie, pancitopenie, reticulopenie. Dermatologice: alopecie, erupții cutanate, acnee, eritem în flacără sau pigmentare crescută a tegumentelor supuse anterior iradierii. Țesuturi moi: dacă apare extravazarea în timpul adm. i.v. se va produce afectarea severă a țesuturilor moi, rezultatul fiind contractura brațelor.

DALTEPARINUM

COD ATC: B01AB04

FRAGMIN *PHARMACIA NV/SA Membru al grupului PFIZER;* Sol. inj., o f. (0,2 ml) conține 2 500 UI (anti-Xa) dalteparină sodică; ct. × 2 seringi preumplute; ct. × 10 seringi preumplute ***(P-RF)***; ct. × 10 seringi preumplute ***(S)***

FRAGMIN *PHARMACIA NV/SA Membru al grupului PFIZER;* Sol. inj., o f. (0,2 ml) conține 5 000 UI (anti-Xa) dalteparină sodică; ct. × 2 seringi preumplute; ct. × 10 seringi preumplute ***(P-RF)***; ct. × 10 seringi preumplute ***(S)***

FRAGMIN *PHARMACIA NV/SA Membru al grupului PFIZER;* Sol. inj., 1 ml conține 2 500 UI (anti-Xa) dalteparină sodică; ct. × 10 f. × 4 ml ***(P-RF)***

FRAGMIN *PHARMACIA NV/SA Membru al grupului PFIZER;* Sol. inj., o f. (1 ml) conține 10 000 UI (anti-Xa) dalteparină sodică; ct. × 10 seringi preumplute ***(P-RF)***

FRAGMIN *PHARMACIA NV/SA Membru al grupului PFIZER;* Sol. inj., o f. (0,3 ml) conține 7 500 UI (anti-Xa) dalteparină sodică; ct. × 2 blist. × 5 seringi preumplute ***(P-RF)***

FRAGMIN *PHARMACIA NV/SA Membru al grupului PFIZER;* Sol. inj., o f. (0,6 ml) conține 15 000 UI (anti-Xa) dalteparină sodică; ct. × 1 blist. × 5 seringi preumplute ***(P-RF)***

Ind: Trat. trombozei venoase profunde acute și al emboliei pulmonare. Prevenirea coagulării în circuitul extracorporal în timpul hemodializei și hemofiltrării în IRA sau IRC. Tromboprofilaxia intervențiilor chirurgicale. Angina instabilă și IM non-Q.
Dz: Trat. trombozei venoase acute profunde și al emboliei pulmonare: adm. în p.i.v. continuă sau s.c. în doza unică sau de 2 ori/zi. Doza max.: 18 000 UI. S.c.: inițial, 100 UI/kg/12 h sau 200 UI//kg/24 h. P.i.v.: inițial, 100 UI/kg, în interval de 12 h. Trat. se continuă timp de 5 zile. Prevenirea coagulării în timpul hemodializei și hemofiltrării: IRC, pacienți fără risc de hemoragie; hemodializă și hemofiltrare cu durata de max. 4 h: Aceeași posologie ca mai jos, sau numai o inj. i.v. cu 5 000 UI; hemodializă și hemofiltrare cu durata de peste 4 h: Un bolus i.v. cu 30-40 UI/kg, urmat de adm. în p.i.v. a 10-15 UI/kg/h. IRA, pacienți cu risc crescut de hemoragie: Un bolus i.v. cu 5-10 UI/kg, urmat de adm. în p.i.v. a 4-5 UI/kg/h. Tromboprofilaxia int. chir.: 2 500-5 000 UI s.c. cu 1-2 h înainte de int. chir., apoi 2 500-5 000 UI s.c. în fiecare dimineață, până când pacientul se mobilizează (5-7 zile sau mai mult). Angina instabilă și IM non-Q: 120 UI/kg s.c. de două ori/zi. Doza max.: 10 000 UI/12 h. Trat. se continuă cel puțin 6 zile.
Cind: Hipersensibilitate la dalteparină (sau alte heparine cu masa moleculară mică). Ulcer gastro-duodenal acut și hemoragie cerebrală. Forme grave de

coagulopatii. Endocardită septică. Leziuni și int. chir. la nivelul SNC, ochilor și urechilor. Este CI anestezia regională datorită riscului crescut de hemoragie.
A!: Nu se adm. i.m. Atenție în caz de trombocitopenie și deficiențe plachetare, în IH și IR gravă, în HTA necontrolată, în retinopatia hipertensivă sau diabetică. Precauții la cei ce au suferit recent o int. chir. Precauții speciale sunt necesare în cazul trombocitopeniei cu evoluție rapidă sau al trombocitopeniei severe, asociate cu un rezultat pozitiv sau necunoscut al testelor de depistare in vitro a anticorpilor antiplachetari în prezența dalteparinei sau a altor heparine cu masă moleculară mică și/sau heparine. Nivelurile de Xa la pacienții aflați sub dializă acută trebuie monitorizate. Precauție în cazul asocierii cu: medicamente ce afectează hemostaza (AINS, antagoniști ai vitaminei K, dextranul).
RA: Hemoragie, hematoame subcutanate la locul inj. și ușoară trombocitopenie (tip I), creștere tranzitorie, ușoară/moderată a transaminazelor hepatice; necroza cutanată, reacțiile alergice. Rar, reacții anafilactoide, trombocitopenie severă mediată imunologic (tip II) asociată cu tromboza arterială și/sau venoasă sau trombembolism.

DANAZOLUM

COD ATC: G03XA01

DANOL *SANOFI WINTHROP;* Cps. a 200 mg danazol; ct. × 10 blist. × 10 cps. ***(P-6L)***

DANOL 100 *SANOFI WINTHROP;* Cps. a 100 mg danazol; ct. × 10 blist. × 10 cps. ***(P-6L)***

DANOVAL *KRKA d.d.;* Cps. a 100 mg sau 200 mg danazol; ct. × 1 fl. × 100 cps. ***(P-6L)***

Ind: Endometrioze; edem angioneurotic ereditar; afecțiune benignă mamară, ginecomastie, displazie mamară; menoragie primară, sindrom premenstrual; pubertate precoce.
Dz: Oral. *Adulți:* 200-800 mg/zi, în 2-4 prize. La femei, se începe trat. în prima sau în a doua zi a ciclului menstrual. În pubertatea precoce primară: 100-400 mg/zi, în funcție de vârstă și greutatea copiilor, precum și de răspunsul clinic.
Cind: IH, hepatită cronică sau recentă. Perioada alăptării.
A!: Poate provoca efecte androgenice ireversibile. Prudență în: IC sau IR severă; epilepsie sau stări migrenoase; în trat. prelungit trebuie supravegheat nivelul transaminazelor serice și glicemia. Este posibilă creșterea efectului anticoagulantelor cumarinice.
RA: Tulburări ale menstruației, retenție hidrosalină, acnee, seboree, accentuarea pilozității, modificarea timbrului vocii, hipertrofie clitoridiană, diminuarea volumului sânilor, căderea părului, bufeuri, nervozitate, crampe musculare, creștere în greutate. Modificarea curbei hiperglicemiei provocate sau creșterea nivelelor transaminazelor.

DAUNORUBICINUM

COD ATC: L01DB02

DAUNOBLASTINA *PHARMACIA - Membru al Grupului PFIZER;* Pulb. pt. sol. inj., 20 mg clorhidrat de daunorubicină; ct. × 1 fl. pulb. + 1 fl. solv. × 10 ml ***(S)***

Ind: Leucemia acută mieloblastică sau limfoblastică; neuroblastom și rabdomiosarcom.
Dz: Adm. i.v. Doza unică poate varia între 0,5 și 3 mg/kg. Dozele între 0,5-1 mg/kg se pot repeta la una sau mai multe zile; dozele de 2 mg/kg se vor adm. la 4 sau mai multe zile. Dozele de 2,5-3 mg/kg, mai rar utilizate, se vor adm. la 7-14 zile. Doza totală maximă este 20 mg/kg. La pacienții cu alterarea funcției hepatice doza se va reduce.
Cind: Boli cardiace severe sau preexistente. Infecții severe.
A!: Monitorizare intraspitalicească în perioada de inducție a remisiunii leucemiei acute. Controlul acidului uric și ureei în sânge de 3 - 4 ori pe săpt. în cursul primei săpt. de trat. Se recomandă aport crescut de lichide și alopurinol. Numărătoarea eritrocitară, formula leucocitară și nr. trombocitelor vor fi evaluate zilnic în cursul primei săpt. de trat. Se va monitoriza funcția hepatică (GOT, GPT, fosfataza alcalină, bilirubina, BSP). Efectuarea ECG înainte și după fiecare ciclu de trat.
RA: Mielosupresie, cardiotoxicitate, alopecie, stomatită, grețuri, varsături, diaree; dacă extravazează în timpul adm., determină leziuni tisulare grave până la necroză severă. Au fost raportate cazuri de fleboscleroză.

DEFEROXAMINUM

COD ATC: V03AC01

DESFERAL *NOVARTIS PHARMA;* Pulb. pt. sol. inj., 500 mg deferoxamină; ct. × 10 fl. pulb. ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. supraîncărcării cronice cu fer din: hemosideroză posttransfuzională; hemocromatoză idiopatică; supraîncărcare cu fer asociată cu porfirie cutanată tarda. Trat. intoxicației acute cu fier. Trat. supraîncărcării cronice cu aluminiu. Pt. diagnosticul supraîncărcării cu fier sau aluminiu.
Dz: Trat. în supraîncărcarea cronică cu fier: *copii și adulți:* doză inițială 0,5 g/zi, apoi crescând doza până se atinge o excreție de fier în platou. Terapia este considerată satisfăcătoare când nivelul feritinei serice este apropiat de valorile normale (300 g/ml). Doza zilnică este de 20-40 mg/kg. P.i.v. sunt mai eficiente decât adm. s.c., dar adm. s.c. lentă pe o perioadă de 8-12 ore este considerată a fi eficientă și convenabilă pentru pacienții din ambulator. Perf. se poate adm. de 3-7 ori/săpt. Pentru eliminarea fierului deja absorbit se adm. i.m. sau i.v., o singură doză de 2 g pentru adulți și 1 g pentru copii. Rata max. de adm. i.v. este de 15 mg/kg/oră, până la o doză totală i.v. de 80 mg/kg/zi. Trat. supraîncărcării cu aluminiu la pacienții cu IR terminală: 1-4 g/săpt., adm. i.m., sub formă de p.i.v. sau s.c. ori intraperitoneal.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la substanța activă, cu excepția cazurilor în care desensibilizarea se dovedește a fi posibilă.
A!: Dacă pacienții acuză febră însoțită de enterite/enterocolite acute, durere abdominală difuză sau faringite, se întrerupe temporar trat. și se recomandă efectuarea de teste bacteriologice și antibioterapie. Trebuie efectuate examene oftalmologice și ORL înaintea începerii trat., precum și la intervale de aproximativ 3 luni, pe durata trat. Atenție sporită la pacienții cu IR severă. La pacienții cu encefalopatie determinată de încărcarea cu aluminiu poate să exacerbeze disfuncția neurologică (crize comițiale). Trebuie adm. numai în p.i.v. lentă, căci injectarea i.v. rapidă poate duce la colaps. Asocierea cu proclorperazina poate duce la tulburări temporare ale stării de conștiență.

Asocierea cu vit. C (100-150 mg/zi) poate intensifica excreția chelaților. Se recomandă monitorizarea funcției cardiace pe perioada acestui trat. combinat. Prudență pe perioada sarcinii (în primele 3 luni).
RA: Reacții alergice ale pielii, manifestări anafilactice, iritație locală la locul adm., tulburări ale vederii și auzului, opacifieri ale cristalinului, tulburări ale funcției renale și hepatice; trombocitopenie; tulburări cardiovasculare (HTA, aritmii cardiace), tulburări neurologice (convulsii, confuzie mintală), crampe ale gambelor.

DESIRUDINUM

COD ATC: B01AX02

REVASC® *LAB. AVENTIS PHARMA;* Pulb. pt. sol. inj., 15 mg desirudin; ct. × 2 fl. pulb.+ 2 f. × 1 ml solv.; ct. × 10 fl. pulb. + 10 f. × 1 ml. solv. ***(S)***

Ind: Prevenirea trombozelor venoase profunde (după proteză de coapsă, de genunchi).
Dz: Adm. 15 mg de 2 ori/zi; prima inj. cu 5-15 min înaintea intervenției chirurgicale. Tratament postoperator 9-12 zile.
Cind: HTA, IR, IH severe, hemoragie.
A!: Alergici, accidente vasculare cerebrale, endocardită bacteriană acută.
RA: Hemoragii, hematurie, infecții urinare, hTA, hematoame, edeme de gambă, febră, dispnee.

DESLANOSIDUM

COD ATC: C01AA07

DESLANOZID *BIOFARM SA;* Sol. inj. 0,2 mg/ml deslanozid; ct. × 5 f. × 2 ml; ct. × 100 f. × 2 ml ***(S/P-RF)***

Ind: Forme acute sau grave de IC, digitalizarea copiilor; fibrilație și flutter artrial cu ritm rapid, TPSV.
Dz: *Adulți:* trat. de atac: 0,6-0,8 mg/zi i.v. lent, 2-3 zile, întreținere: 0,4 mg/zi; în EPA: 0,8-1,2 mg, repetat la 30 de min, până la doza totală de 1,6 mg; *copii:* 0,008-0,016 mg/kg/zi, i.m. sau i.v., pt. digitalizare (întreținerea se face p.o. cu Lanatozid C).
Cind: BAV, bradicardie marcată, tahicardie ventriculară, bigeminism, pericardită constrictivă. Nu se asociază cu: Calciu i.v., amine simpatomimetice.
A!: Prudență la bolnavii cu miocardită; în IR și la bătrâni, la nou-născuți și la imaturi. Prudență în cazul asocierii cu: chinidină, diuretice cu acțiune intensă.

DESLORATADINUM

COD ATC: R06AX27

AERIUS *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Cpr. film. 5 mg desloratadină; ct. cu 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 cpr. ***(P-RF)***

AERIUS *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Sirop 0,5 mg/ml desloratadină; fl. × 30, 50, 60, 100, 120, 150, 225 sau 300 ml + linguriță dozatoare ***(P-RF)***

Ind: Ameliorarea simptomelor asociate cu rinita alergică și urticaria idiopatică cronică.
Dz: *Cpr.: Adulți și adolescenți (12 ani și peste):* 5 mg/zi, cu sau fără alimente. *Sirop: Copii 2-5 ani:* 2,5 ml (1,25 mg) o dată/zi, cu sau fără alimente. *Copii 6-11 ani:* 5 ml (2,5 mg) o dată/zi, cu sau fără alimente. *Adulți și adolescenți (12 ani și peste):* 10 ml (5 mg) o dată pe zi, cu sau fără alimente.
Cind: Hipersensibilitate la substanța activă, la oricare dintre excipienți sau la loratadină. Femeile care alăptează.
A!: *Cpr.:* Nu au fost stabilite eficacitatea și siguranța adm. la copii sub 12 ani. Prudență în IR. *Sirop:* Nu au fost stabilite eficacitatea și siguranța adm. la copii sub 2 ani. Prudență în IR.
RA: Cefalee, uscăciunea gurii, oboseală.

DESMOPRESSINUM

COD ATC: H01BA02

ADIURETIN® *FERING-LECIVA;* Sol. nazală 0,1 mg/ml acetat de desmopresină; ct. × 1 fl. × 5 ml + aplic. nazal ***(P-RF)***

ADIURETIN® SD *FERING-LECIVA;* Sol. inj. 0,4 μg/ml desmopresină; ct. × 5 f. × 1 ml ***(P-RF)***

Ind: Diabet insipid neurogen.
Dz: Instilație nazală, 1-4 picături de 1-2 ori/zi în funcție de gradul de poliurie și sete (doza zilnică *adulți:* 10-40 μg; *copii:* 5-30 μg)
Cind: Alergie specifică; cardiopatia ischemică; epilepsia. Nu se adm. înainte și în timpul anesteziei cu ciclopropan.
A!: Prudență în timpul sarcinii, în eclampsie și alte situații în care trebuie evitată creșterea TA; prudență la copii. Efectul antidiuretic poate fi potențat de clorpropamidă, carbamazepină.
RA: Iritația mucoasei nazale, cefalee, conjunctivită.

DESONIDUM

COD ATC: S01BA11

PRENACID *S.I.F.I.;* Sol. oft. 0,25% desonid fosfat de sodiu; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(P-RF)***

PRENACID *S.I.F.I.;* Unguent oft. 0,25% desonid fosfat de sodiu; ct. × 1 tub × 10 g ***(P-RF)***

Ind: Trat. inflamațiilor segmentului anterior al ochiului și ale anexelor acestuia, conjunctivite alergice, blefarite scuamoase, episclerite, irite, iridociclite. Reacții inflamatorii postoperatorii și traumatice.
Dz: *Soluție:* 1-2 pic. de 3-4 ori/zi. *Unguent oft.:* se aplică de 3-4 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la produs. HTA intraoculară, herpes simplex, boli virale ale corneei în stadiul ulcerației acute. Conjunctivitele cu keratită ulceroasă. tbc și micozele ochiului. Afecțiuni oftalmice acute purulente, conjunctivite purulente, blefarite purulente și herpetice. Orjelet, leziuni sau zgârieturi corneene.
A!: În cazul adm. mai mult de 2 săpt. se recomandă verificarea tonusului ocular (stimulează apariția cataractei). Trat. patologiei combinate cu slăbirea corneei necesită precauții. În conjunctivite bacteriene, virale sau fungice adm. topică a corticoizilor poate masca extinderea infecției. Precauție la copii și femei gravide.
RA: Senzație de arsură sau înțepături.

DEXAMETHASONUM

COD ATC: H02AB02, S01BA01

DEXAGRANE *LAB. LEURQUIN MEDIOLANUM;* Sol. oft. 0,1% dexametazonă; ct. × 1 fl. × 5 ml ***(P-RF)***

DEXAMED *MEDOCHEMIE Ltd.;* Sol. inj. 4 mg/1 ml; ct. × 2 blist. × 10 f. × 2 ml ***(P-RF)***; ct. × 100 f. × 2 ml ***(S)***

DEXAMETHASONE SODIUM PH *E.I.P.I.C.O.;* Sol. inj. 4 mg/ml fosfat de dexametazonă; ct. × 5 f. × 2 ml ***(P-RF)***; ct. × 100 f. × 2 ml ***(S)***

DEXONA *LAB. CADILA;* Sol. inj., 4 mg/ml dexametazonă; ct. × 1 blist. × 6 fl. × 2 ml ***(P-RF)***

MAXIDEX *ALCON SRL;* Sol. oft. 0,1% dexametazonă; ct. × 1 fl. × 5 ml ***(P-RF)***

MAXIDEX *ALCON SRL;* Ung. oft. 0,1% dexametazonă; ct. × 1 tub × 3,5 g ***(P-RF)***

SUPERPREDNOL *SICOMED SA;* Cpr. 0,5 mg dexametazonă; ct. × 1 fl. × 40 cpr. ***(P-RF)***

Ind: *Adm. sistemică*: Boli reumatice și colagenoze: cardită reumatismală, poliartrită reumatoidă, LED, sclerodermie, periarterită nodoasă, dermatomiozită. Boli alergice: astm bronșic, alergii medicamentoase, alimentare sau la polen, boala serului, edem angioneurotic, șoc anafilactic. Boli digestive: necroză hepatică, hepatită cronică activă, hepatită alcoolică acută, ciroză, boala Crohn, colită ulceroasă și ulcero-hemoragică. Boli renale: glomerulonefrită acută cu oligurie marcată sau anurie, nefroză. Boli pulmonare: sarcoidoză, fibroză pulmonară. Boli hematologice: anemie hemolitică dobândită, purpură trombopenică idiopatică, leucemie limfatică, limfosarcom. Boli infecțioase și toxice grave. Boli dermatologice: dermite alergice și eczeme, eritrodermie exfoliativă, pemfigus, psoriazis. Boli oftalmologice: episclerite, sclerite, keratite, irite, iridociclite. Boli ORL: laringite acute alergice sau inflamatorii. Boli neurologice: polinevrite acute toxice. Este de preferat în testarea diagnostică pentru hiperfuncția CSR, mai ales pentru secreția de ACTH și în hiperplazia suprarenală congenitală. *Adm. locală*: inflamații articulare, abarticulare, ale țesuturilor moi, afecțiuni oculare: uveită anterioară acută sau cronică, iridociclită, irită, ciclită, herpes zoster oftalmic; kerato-conjunctivita flictenulară, conjunctivita nepurulentă inclusiv cea sezonieră, catarală, alergică; ulcerații marginale recurente de cauză toxică sau alergică; arsuri termice sau chimice; postoperator, pt. reducerea inflamațiilor.

Dz: Adm. p.o: *Adulți:* inițial 3-15 mg/zi, se scade treptat până la doza de întreținere 0,5-1,5 mg/zi. *Copii:* doza de atac 1-3 mg/zi, apoi se scade la doza minimă activă de întreținere. Adm. inj.: doza inițială: 0,5-20 mg; max. 80 mg/zi. Adm. local conj.: 1-2 pic. în sacul conjunctival, inițial, la fiecare 30-60 de min, rărind apoi adm. la 2-4 h. Trat. se va reduce ulterior la 1 pic. de 3-4 ori/zi. În inflamația cronică, alergii sau inflamații minore: adm. la fiecare 3-6 h, până când se obține efectul dorit.

Cind: Ulcer gastro-duodenal, psihoze, osteoporoză, cetoacidoză diabetică, sindrom Cushing. Adm. conj. este Cind în herpes simplex acut, vaccină, varicelă și cele mai multe afecțiuni virale ale corneei și conjunctivei, tbc, afecțiuni micotice, infecții acute purulente netratate. În perioada de alăptare.

A!: Prudență în diabet zaharat, miastenia gravis, boli convulsivante, IR și uremie, HTA, IC, tromboze vasculare, boli infecțioase, tbc, infecții fungice sistemice, herpes zoster și herpes simplex, varicelă, poliomielită. În cazul în care nu răspund la trat. în intervalul de timp scontat, se vor institui alte forme de trat. Dacă apar fenomene de sensibilitate la produs, se va întrerupe adm. Utilizarea topică prelungită a steroizilor poate cauza RA sistemice. Prudență în cazul asocierii cu: antidiabetice orale, anticoagulante cumarinice, diuretice saluretice, salicilați, fenilbutazonă, indometacină, barbiturice, fenitoină, rifampicină. Prudență la femei însărcinate.

RA: Adm. sistemic poate produce: pirozis, epigastralgii, acutizarea sau agravarea ulcerului gastro-duodenal, hiperglicemie cu acutizarea sau agravarea diabetului zaharat, agitație, insomnie, tulburări psihotice, cataractă, glaucom, osteoporoză, creșterea catabolismului proteic, miopatii, peteșii, echimoze, telangiectazii, acnee, tulburări sexuale, întârzierea creșterii la copii, deprimarea imunității cu favorizarea infecțiilor, întârzierea vindecării plăgilor, necroză osoasă aseptică, vasculite, pancreatită, retenție hidrosalină, pierdere de potasiu și creșterea TA. Dozele mari și trat. îndelungat pot provoca fenomene de hipercorticism exogen (facies "lună plină", adipozitate) și chiar de hipocorticism endogen evidențiate la întreruperea bruscă a trat. sau la creșterea necesității de hormon manifestate prin exacerbarea simptomatologiei bolii tratate, reumatism steroidian sau semne de insuficiență suprarenală. Dozele mari adm. în finalul sarcinii pot provoca insuficiență suprarenală la nou-născut. Întreruperea bruscă a trat. poate determina creșterea bruscă a TA. Folosirea îndelungată a steroizilor topici, în adm. conj., poate determina creșterea presiunii intraoculare. Adm. locală în afecțiunile care produc subțierea corneei, poate duce la perforarea acesteia.

DEXKETOPROFENUM

COD ATC: M01AE17

TADOR *BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP;* Cpr. film. 25 mg dexketoprofen; ct. × 1 blist. × 10 cpr. film.; ct. × 3 blist. × 10 cpr. film.; ct. × 5 blist. × 10 cpr. film. ***(P-RF)***

Ind: Trat. simptomatic de scurtă durată al durerilor musculo-scheletice, dismenoree, durerile dentare.

Dz: 25 mg la 8 ore. Doza zilnică max. 75 mg. Nu trebuie folosit timp îndelungat. Se recomandă adm. cu cel puțin 30 de min. înaintea meselor. *Vârstnici:* doza zilnică max. 50 mg. Doza poate fi crescută dacă există o toleranță generală bună. IH: doza zilnică max. 50 mg, cu monitorizare atentă clinică și biologică. IR: doza inițială max. 50 mg pe zi.

Cind: Hipersensibilitate la dexketoprofen, orice alt AINS sau la excipienții produsului; antecedente de crize de bronhospasm, rinită acută, urticarie sau edem angioneurotic la acid acetilsalicilic; ulcer gastroduodenal activ sau în antecedente dispepsie cronică; boli hemoragice, tratament concomitent cu anticoagulante; boală Crohn sau colită ulceroasă; antecedente de astm bronșic; IR moderată - gravă; IH gravă; sarcină și alăptare; copii.
A!: Se va adm. cu prudență la pacienții cu afecțiuni alergice în antecedente. Pacienții care au simptome gastrointestinale sau antecedente de afecțiuni gastrointestinale trebuie monitorizați pentru a detecta semnele unei eventuale hemoragii gastrointestinale. Dacă apare hemoragie sau ulcer gastrointestinal în timpul tratamentului, se întrerupe adm. și este instituită terapie adecvată. În cazul unei creșteri importante a TGO și TGP, tratamentul trebuie oprit. Se adm. cu atenție la pacienții cu afecțiuni ale măduvei hematopoetice, LES sau boală mixtă de țesut conjunctiv. Produsul trebuie adm. cu prudență la pacienții cu afecțiuni hepatice, renale sau cardiace, ca și în alte boli care predispun la retenție hidrosalină sau la cei tratați cu diuretice și la cei cu hipovolemie, deoarece au risc crescut de nefrotoxicitate. Pacienții vârstnici au risc crescut de insuficiență renală, cardiacă sau hepatică. Asocieri Cind: alte AINS, doze mari de salicilați, anticoagulante orale, heparină și ticlopidină, litiu, metotrexat în doze mari (> 15 mg metotrexat/săptămână), hidantoine și sulfonamide. Asocieri care necesită precauții: - diuretice, IEC. Asocieri care necesită supraveghere: beta-blocante, ciclosporină și tacrolimus, trombolitice, probenecid. Atenție la persoanele care conduc vehicule sau folosesc utilaje.
RA: greață și/sau vărsături, dureri abdominale, diaree, dispepsie. RA mai puțin frecvente: tulburări de somn, anxietate, cefalee, amețeli, vertij, palpitații, gastrită, constipație, uscăciunea gurii, flatulență, eritem cutanat. Rar pot apărea: parestezii, HTA, edeme periferice, bradipnee, ulcer peptic, hemoragie sau perforație, anorexie, creșterea enzimelor hepatice, urticarie, acnee, hipersudorație, poliurie, tulburări menstruale, tulburări în sfera prostatei.

DEXPANTHENOLUM

COD ATC: D03AX03

BEPANTHEN *HOFFMANN LA ROCHE;* Cremă, Ung. 5% dexpantenol; ct. × 1 tub × 30 g ***(OTC)***

DEXPANTHENOL *PHARCO PHARMACEUTICALS;* Cremă ***(OTC)***

PANTHENOL *ANKERPHARM GROUP CHAUVIN;* Spray 5% 140 ml ***(OTC)***

PANTHENOL *ANKERPHARM GROUP CHAUVIN;* Cpr. 100 mg dexpantenol; ct. × 1 fl. × 20 cpr. ***(OTC)***

Ind: Adjuvant în trat. unor leziuni cutanate superficiale acute și cronice: excoriații, leziuni postoperatorii cu vindecare întârziată, arsuri, eritem solar, ulcerații, fisuri, dermatite buloase și veziculare, herpes labial.
Dz: Se aplică pe suprafețele afectate o dată sau de câteva ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la dexpantenol sau la oricare dintre componentele produsului.
RA: Reacții alergice.

DEXRAZOXANUM

COD ATC: V03AF02

CARDIOXANE® *CHIRON B.V.;* Liof. pt. sol. perf., 500 mg dexrazoxan; ct. × 1 fl. liof. ***(S)***

CARDIOXANE® *CSC PHARMACEUTICALS/CHIRON B.V.;* Liof. pt. sol. inj. ***(S)***

Ind: Profilaxia efectelor cardiotoxice produse de citostatice antraciclinice.
Dz: P.i.v. de scurtă durată (15 min), cu aproximativ 30 de min înaintea inj. antraciclinelor. Doza recomandată este de 20 de ori mai mare decât cea de doxorubicină. Obișnuit se adm. 1 g/m^2 la fiecare 21 de zile. Trat. trebuie început simultan cu prima doză de doxorubicină (sau altă antraciclină) și trebuie repetat la fiecare doză următoare.
Cind: Hipersensibilitate la dexrazoxan. Sarcină și alăptare.
A!: Se adm. doar pacienților tratați cu citostatice cu structură antraciclinică, îndeosebi doxorubicină. Se impune supraveghere hematologică regulată. Pacienții cu IR sau afecțiuni hepatice trebuie supravegheați atent. Dacă liofilizatul sau soluția atinge pielea sau mucoasele, regiunea afectată se va spăla imediat cu apă. Pentru a evita apariția tromboflebitei locale, diluarea soluției de dexrazoxan trebuie efectuată imediat înainte de perfuzare. Poate potența toxicitatea hematologică a chimioterapiei sau radioterapiei anticanceroase. Nu trebuie amestecat cu alte medicamente în timpul perfuzării.
RA: Durere și iritație la locul injecției. Leucopenie ușoară/moderată, trombocitopenie ușoară, grețuri, vărsături, alopecie, creștere tranzitorie a enzimelor hepatice, a trigliceridelor și amilazei serice, hipotermie, anemie, tulburări de coagulare, scăderea trecătoare a calciului seric, mărirea eliminării urinare a fierului și zincului.

DEXTRANOMERUM

COD ATC: D03AX02

CRUPODEX *BIOGAL PH. WORKS. Ltd;* Pulb.; ct. 1 fl. × 60 g; ct. × 10 plicuri × 1 g ***(P-6L)***

DEBRISAN *PHARMACIA & UPJOHN - Membru al Grupului PFIZER;* Gran. 60 g

Ind: Trat. plăgilor exsudate și infectate (plăgile chirurgicale și posttraumatice, ulcerele de decubit și ulcerele de la nivelul membrelor inferioare).
Dz: Granulele de dextranomer pot fi aplicate direct pe plagă. Inițial pot fi necesare 2 aplicări/zi, iar apoi una pe zi. Dextranomerul folosit se îndepărtează prin irigare cu soluție salină și tamponare. Trat. se continuă până la curățarea plăgii și dispariția exsudatului.
A!: Precauție în următoarele situații: când dextranomerul este aplicat în apropierea ochilor; în ulcere profunde cu orificii de deschidere mici, ca de exemplu fistule și cavități.
RA: Durere tranzitorie în regiunea plăgii.

DEXTROMETHORPHANUM

COD ATC: R05DA09

DEXIR® ADULȚI *LAB. UPSA;* Sol. orală 15 mg/5 ml bromhidrat de dextrometorfan; ct. × 1 fl. × 125 ml ***(P-RF)***

DEXIR® COPII *LAB. UPSA;* Sol. orală 7,5 mg/5 ml bromhidrat de dextrometorfan; ct. × 1 fl. × 125 ml ***(P-RF)***

HUMEX *LAB. URGO;* Sirop 0,1% bromhidrat de dextrometorfan; ct. × 1 fl. × 125 ml ***(P-RF)***

HUMEX *LAB. URGO;* Sirop 0,4% bromhidrat de dextrometorfan; ct. × 1 fl. × 125 ml ***(P-RF)***

PULMODEXANE *LAB. A BAILLY;* Sol. orală 300 mg/100 ml bromhidrat de dextrometorfan; ct. × 1 fl. × 125 ml + lg. dozatoare ***(P-RF)***

ROBITUSSIN ANTITUSSICUM *WYETH-LEADERLE PHARMA;* Sol. orală 7,5 mg/5 ml bromhidrat de dextrometorfan; ct. × 1 fl. × 50 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml ***(P-RF)***

ROBITUSSIN JUNIOR *WYETH-LEADERLE PHARMA;* Sol. orală 3,75 mg/5 ml bromhidrat de dextrometorfan; ct. × 1 fl. × 50 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml ***(P-RF)***

ROFEDEX *BIOFARM SA;* Sirop 15 mg/5 ml bromhidrat de dextrometorfan; ct. × 1 fl. × 100 ml ***(OTC)***

TUSSIN *EUROPHARM SA;* Cpr.10 mg bromhidrat de dextrometorfan; ct. × 1 fl. × 20 cpr. ***(P-RF)***

TUSSIN FORTE *EUROPHARM SA;* Cpr. 20 mg bromhidrat de dextrometorfan; ct. × 1 fl. × 20 cpr. ***(P-RF)***

TUSSIN SIROP *EUROFARMACO;* Sirop 0,1% bromhidrat de dextrometorfan; ct. × 1 fl. × 150 g ***(P-RF)***

WICK FORMEL 44 + HUSTEN *PROCTER & GAMBLE;* Sirop, 20 mg/15 ml bromhidrat de dextrometorfan; ct. × 1 fl. × 120 ml ***(P-RF)***

WICK KINDER FORMEL 44 + *PROCTER & GAMBLE;* Sirop 7,5 mg/15 ml bromhidrat de dextrometorfan; ct. × 1 fl. × 120 ml ***(P-RF)***

Ind: Trat. simptomatic al tusei neproductive.
Dz: *Adulți și copii peste 15 ani:* 60-120 mg/zi, fracționat în 3-4 prize. Max. 30 mg o dată și 120 mg/zi. *Copii sub 15 ani:* 1 mg/kg/zi, fracționat în 3-4 prize; *copii între 30 luni - 6 ani:* 15-20 mg/zi; *copii între 6-12 ani:* 20-35 mg/zi; *copii între 12-15 ani:* 35-50 mg/zi. Intervalul între doze trebuie să fie de min. 4 ore.
Cind: Hipersensibilitate la dextrometorfan sau la componentele produsului; insuficiență respiratorie; astm bronșic; Copii sub 15 ani în cazul preparatelor pentru adulți, respectiv copii sub 30 de luni în cazul preparatelor pentru copii. Nu se asociază cu IMAO. În perioada de alăptare.
A!: Tusea productivă nu constituie o ind. terapeutică a antitusivelor centrale. Dacă tusea nu cedează la doza uzuală trebuie reevaluată situația clinică. În IH și la vârstnici, doza va fi scăzută. În caz de diabet zaharat trebuie ținut seama de conținutul în zahăr al preparatelor. Nu se recomandă asocierea cu: alte deprimante ale SNC (analgezice opioide, antidepresive triciclice, antiH1-sedative, barbiturice, alcool, benzodiazepine și alte anxiolitice, clonidină și neuroleptice). Precauție la femei însărcinate; la șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Constipație, somnolență, stări de amețeală, greață, vomă, bronhospasm, reacții alergice cutanate.

DIAZEPAMUM

COD ATC: N05BA01

DIAZEPAM *TERAPIA SA;* Sol. inj. 5 mg/ml diazepam; ct. × 5 f. × 2 ml *(P-RF)*; ct. × 100 f. × 2 ml *(S)*

DIAZEPAM *TERAPIA SA;* Cpr. 5 mg diazepam; ct. × 3 blist. × 10 cpr. *(P-RF)*; ct. × 100 blist. × 10 cpr. *(S)*

DIAZEPAM *TERAPIA SA;* Cpr. 10 mg diazepam; ct. × 3 blist. × 10 cpr. *(P-RF)*; ct. × 100 blist. × 10 cpr. *(S)*

DIAZEPAM 10 mg *ARMEDICA SA;* Cpr 10 mg diazepam; ct. × 2 blist × 10 cpr. *(P-RF)*

DIAZEPAM 2 mg; DIAZEPAM 10 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. 2 mg sau 10 mg diazepam; ct. × 2 blist. × 10 cpr. *(P-RF)*; ct. × 100 blist. × 10 cpr. *(S)*

DIAZEPAM DESITIN® SOLUȚIE RECTALĂ 10 mg *DESITIN;* Sol. rectală, 2,5 ml soluție conțin 10 mg diazepam; ct. × 5 pungi × 1 tub × 2,5 ml + canulă *(P-RF)*

DIAZEPAM DESITIN® SOLUȚIE RECTALĂ 5 mg *DESITIN;* Sol. rectală, 2,5 ml soluție conțin 5 mg diazepam; ct. × 5 pungi × 1 tub × 2,5 ml + canulă *(P-RF)*

Ind: Stări de tensiune, neliniște și agitație, labilitate emoțională, tulburări neurovegetative funcționale, insomnie, nevroze anxioase, stări reactive, boli psihosomatice: tulburări de comportament la pacienții cronici psihopatizați, sindrom acut de abstinență la alcoolici, tulburări de comportament la epileptici; status epilepticus și accese convulsive severe recurente (forma injectabilă); stări de contractură a musculaturii striate de natură reflexă sau de cauză neurologică; premedicație în anestezie și intervenții chirurgicale și liniștire postoperator, iminență de avort, naștere prematură sau dirijarea travaliului în hipertonie uterină (forma injectabilă).
Dz: Oral: *Adulți:* 2-10 mg de 2-4 ori/zi. *Bătrâni:* 2 mg de 1-2 ori/zi. *Copii (> 6 luni):* 1 mg de 2 ori/zi (se poate crește cu prudență până la max. 0,30 mg/kg/zi). i.m. sau i.v. lent: *Adulți și copii mari:* 2-20 mg o dată, se poate repeta după 3-4 ore; *sugari* (mai mari de 1 lună): 1-2 mg (0,25 mg/kg) o dată; se poate repeta până la 2 mg/kg/zi.
Cind: Alergie la diazepam, miastenia gravis, șoc, comă, intoxicație acută cu alcool, sau alte deprimante centrale, glaucom. Nu se asociază cu IMAO și alte antidepresive. Nu se adm. în sarcină în primul trimestru.
A!: Prudență la bolnavii cu glaucom, doze mici la cerebro-vasculari, în insuficiență cardio-respiratorie, la bătrâni și debilitați. Precauție în cazul asocierii cu: barbiturice, alcool, analgezice opioide și alte deprimante centrale. Forma inj. nu se amestecă cu alte medicamente și nu se adaugă soluțiilor perf. i.v. Prudență la șoferi și persoane cu activități de precizie.
RA: Oboseală, somnolență, amețeală, ataxie, cefalee, stare confuzivă, depresie, disartrie, tremor, tulburări de vedere, diplopie, hTA, greață, greutate în

micțiune, tulburări de libido, leucopenie, icter, hiperexcitabilitate. La bolnavii cu mic rău epileptic poate produce crize de mare rău sau instalarea unui status epilepticus. Adm. în doze mari, timp îndelungat induce farmacodependența Inj. i.v. poate produce apnee și/sau sincopă cardiacă; local apar iritații și tromboze.

DICLOFENACUM

COD ATC: M01AB05
M02AA15
S01BC03

ALMIRAL 25 *MEDOCHEMIE Ltd.;* Cpr. 25 mg diclofenac sodic; ct. × 3 blist. × 10 cpr. film. ***(P-RF)***; ct. × 100 blist. × 10 cpr. film. ***(S)***

ALMIRAL 50 *MEDOCHEMIE Ltd.;* Cpr. 50 mg diclofenac sodic; ct. × 3 blist. × 10 cpr. film. ***(P-RF)***; ct. × 100 blist. × 10 cpr. film. ***(S)***

ALMIRAL *MEDOCHEMIE LTD;* Sol. inj. 75 mg/3 ml ***(S/P-RF)***

ARTHREX CELLUGEL *C.P.M. CONTRACT PHARMA GmbH & Co;* Gel, 100 g conțin diclofenac sodic 1 g; ct. × 1 tub × 50 g ***(OTC)***

CLAFEN® *ANTIBIOTICE IAȘI,* Cremă; Gel; Sup. 100 mg; Cpr. film. gastrorez. 50 mg ***(P-RF)***

DECLOPHEN *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd;* Sup., 100 mg diclofenac; ct. × 1 blist. × 5 sup. ***(P-RF)***

DICLAC® 5% gel *HEXAL AG;* Gel 5% diclofenac; ct. × 1 tub × 50 g ***(OTC)***

DICLAC 75 ID *HEXAL AG;* Cpr. elib. prel., diclofenac sodic 75 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. elib. prel. ***(P-RF)***

DICLO-75 VON CT *C.T. ARZNEIMITTEL;* Sol. inj. 25 mg/ml diclofenac sodic; ct. × 3 f. × 3 ml; ct. × 1 f. × 3 ml; ct. × 5 f. × 3 ml ***(P-RF)***

DICLOBERL 50 *BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP;* Sup. 50 mg diclofenac sodic; ct. × 10 sup. ***(P-RF)***

DICLOFEN *THE UNITED PHARMA;* Cremă 1%; ct. × 1 tub × 30 g ***(OTC)***

DICLOFENAC 100 mg *ANTIBIOTICE IAȘI;* Sup. 100 mg diclofenac sodic; ct. × 2 blist. × 3 sup. ***(P-RF)***

DICLOFENAC *HELCOR SRL;* Dj. gastrorez., 50 mg diclofenac sodic; ct. × 2 blist. × 10 dj. gastrorez. ***(P-RF)***

DICLOFENAC *PROMEDIC;* Dj. 50 mg diclofenac sodic; ct. × 2 blist. × 10 dj. ***(P-RF)***

DICLOFENAC *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cremă, conține 1,0 g de diclofenac sodic/100 g; ct. × 1 tub × 20 g ***(OTC)***

DICLOFENAC *CHIRMIS FARMIMPEX;* Gel 1%; ct. × 1 tub × 50 g ***(OTC)***

DICLOFENAC MK CREMĂ *MARK INT;* Ung. 1%; ct. × 1 tub × 35 g ***(OTC)***

DICLOFENAC *ARENA GROUP SA;* Dj. conțin diclofenac sodic 50 mg; ct. × 1 fl. × 20 dj. ***(P-RF)***

DICLOFENAC *HYPERION SA;* Cremă 1% diclofenac sodic; ct. × 1 tub × 25 g ***(OTC)***

DICLOFENAC *SINTOFARM SA;* Sup. 100 mg diclofenac sodic; ct. × 2 folii × 5 sup. ***(P-RF)***

DICLOFENAC *TERAPIA SA;* Cpr. film. 50 mg diclofenac sodic ; ct. × 2 blist. × 10 cpr. film. ***(P-RF)***

DICLOFENAC 100 mg *EUROPHARM SA;* Sup. 100 mg diclofenac sodic; ct. × 2 folii × 5 sup. ***(P-RF)***; ct. × 50 folii × 5 sup. ***(S)***

DICLOFENAC AL I. M. *ALIUD PHARMA GmbH;* Sol. inj. 25 ml/ml diclofenac sodic; ct. × 1 f. × 3 ml; ct. × 5 f. × 3 ml; ct. × 10 f. × 3 ml; ct. × 30 f. × 3 ml ***(P-RF)***

DICLOFENAC DUO *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Cps. ret. 75 mg diclofenac sodic; ct. × 30 cps. ret. ***(P-RF)***

DICLOFENAC MK GEL *MARK INT;* Gel 1%; ct. × 1 tub × 25 g; ct. × 1 tub × 45 g ***(OTC)***

DICLOFENAC SODIC *HELCOR SRL;* Sup. 100 mg diclofenac sodic; ct. × 2 folii × 3 sup. ***(P-RF)***

DICLOFENAC SODIC *SANTA SA;* Sup. 100 mg diclofenac sodic; ct. × 6 sup. ***(P-RF)***

DICLOFENAC SODIC *NORDFARM PRODUCT;* Sup. 100 mg diclofenac sodic; ct. × 6 sup. ***(P-RF)***

DICLOFENAC SODIC *IASSYFARM SRL;* Sup. 100 mg diclofenac sodic; ct. × 10 sup. ***(P-RF)***

DICLOFENAC SODIC *ARGEȘFARM;* Sup. 100 mg diclofenac sodic; ct. × 6 sup. ***(P-RF)***

DICLOFENAC SODIC *MAGISTRA C&C;* Sup. 100 mg diclofenac sodic; ct. × 1 blist. × 6 sup. ***(P-RF)***

DICLOFENAC SODIC *LAB. REMEDIA SRL;* Sup. 100 mg diclofenac sodic; ct. × 2 plachete × 5 sup. ***(P-RF)***

DICLOFENAC SODIC 50 mg *LAB. REMEDIA SRL;* Dj. gastrorez 50 mg diclofenac sodic; ct. × 1 fl. × 20 dj. ***(P-RF)***

DICLOFENAC SODIC 75 mg/3 ml *HEMOFARM;* Sol inj. 75 mg/3 ml ***(P-RF)***

DICLOGESIC *DAR AL DAWA;* Cpr. film. 50 mg diclofenac sodic; ct. × 2 blist. × 10 cpr. film. ***(P-RF)***

DICLOGESIC® 100 *DAR AL DAWA;* Sup. 100 mg diclofenac sodic; ct. × 1 folie × 5 sup. ***(P-RF)***

DICLOSAL GEL *SLAVIA PHARM;* Gel 1%; ct. × 1 tub × 45 g ***(OTC)***

DICLOSIN *SINTOFARM SA;* Gel 1% diclofenac sodic; ct. × 1 tub × 40 g ***(OTC)***

DICLOTARD 100 mg *TERAPIA SA;* Cpr. film. 100 mg diclofenac sodic; ct. × 2 blist. × 10 cpr. film. ***(P-RF)***

EPIFENAC *E.I.P.I.C.O.;* Cpr. gastrorez., diclofenac sodic 25 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

EPIFENAC *E.I.P.I.C.O.;* Sup. diclofenac sodic 100 mg; ct. × 1 blist. × 5 sup. ***(P-RF)***

FLOGOFENAC *ECOBI PHARMACEUTICI;* Gel 1%; ct. × 1 tub × 50 g ***(OTC)***

MED-DICLOFENAC *MEDIPHARMA SERV SRL;* Gel 1%; ct. × 1 tub × 40 g ***(OTC)***

N-DICLOFENAC *NORDFARM PRODUCT;* Dj. 50 mg diclofenac sodic; ct. × 1 fl. × 20 dj. ***(P-RF)***

NACLOF *NOVARTIS;* Sol. oft. diclofenac sodic 1 mg/ml; ct. × 1 fl. × 5 ml ***(P-6L)***

NAKLOFEN *KRKA d.d.;* Gel 1%; ct. × 1 tub × 60 g ***(OTC)***

NOVO-DIFENAC *NOVOPHARM;* Cpr. film. 25 mg diclofenac sodic; ct. × 1 fl. × 100 cpr. ***(P-RF)***

NOVO-DIFENAC *NOVOPHARM;* Cpr. film. 50 mg diclofenac sodic; ct. × 1 fl. × 100 cpr. ***(P-RF)***

NOVO-DIFENAC SR *NOVOPHARM;* Cpr. film. 100 mg diclofenac sodic; ct. × 1 fl. × 100 cpr. ***(P-RF)***

REFEN® *HEMOFARM VRASC;* Sol. inj. 25 mg/ml diclofenac sodic; ct. × 5 f. × 3 ml ***(P-RF)***

REFEN RETARD *HEMOFARM VRASC;* Cpr. ret. 100 mg diclofenac sodic; ct. × 20 cpr. ret. ***(P-RF)***

REWODINA® - 75 SF *AWD PHARMA;* Sol. inj. 25 mg/ml diclofenac sodic; ct. × 1 f. × 3 ml; ct. × 30 f. × 3 ml ***(P-RF)***

REWODINA® 100 RETARD *AWD PHARMA;* Cpr. ret. 100 mg diclofenac sodic; ct. × 2 folii x 10 cpr. ret.; ct. × 10 folii × 10 cpr. film. ***(P-RF)***

RHEUMAVEK *FARAN;* Cpr. film. 25 mg diclofenac sodic; ct. × 3 blist. × 10 cpr. film. ***(P-RF)***

RHEUMAVEK *FARAN;* Sol. inj. 25 mg/ml diclofenac sodic; ct. × 5 f. × 3 ml ***(P-RF)***

RHEUMAVEK EMULGEL *FARAN;* Gel 1% diclofenac sodic; ct. × 1 tub × 100 g ***(OTC)***

RUVOMINOX *RAFARM;* Sol. oft. 0,1% diclofenac sodic; ct. × 1 f. × 5 ml ***(P-6L)***

SANFINAC *SANOFI WINTHROP;* Cpr. 25 mg diclofenac sodic; ct. × 1 fl. × 100 cpr. ***(P-RF)***

SANFINAC *SANOFI WINTHROP;* Cpr. 50 mg diclofenac sodic; ct. × 1 fl. × 100 cpr. ***(P-RF)***

TRATUL *GEROT;* Sol. inj. 30 mg/ml diclofenac deanol; ct. × 5 f. × 3 ml ***(P-RF)***

TRATUL 120 *GEROT;* Sup. 120 mg diclofenac; ct. × 6 sup. ***(P-RF)***

TRATUL 60 *GEROT;* Sup. 60 mg diclofenac; ct. × 6 sup. ***(P-RF)***

TRATUL 50 *GEROT;* Cps. gastrorez diclofenac 50 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. gastrorez. ***(P-RF)***

UNGUENT ANTIALGIC *PHARMA LABOR;* Unguent 1% diclofenac sodic; ct. × 1 tub × 40 g ***(OTC)***

VERAL® *SLOVAKOFARMA;* Gel 1% diclofenac sodic; ct. × 1 tub × 35 g; ct. × 1 tub × 55 g ***(OTC)***

VOLTAREN *NOVARTIS;* Dj. 25 mg diclofenac sodic; ct. × 20 dj. ***(P-RF)***

VOLTAREN *NOVARTIS;* Dj. 50 mg diclofenac sodic; ct. × 20 dj. ***(P-RF)***

VOLTAREN *NOVARTIS;* Sol. inj. 75 mg/ml diclofenac sodic; ct. × 5 f. × 3 ml ***(P-RF)***

VOLTAREN *NOVARTIS;* Sup. 50 mg diclofenac sodic; ct. × 2 blist. × 5 sup. ***(P-RF)***

VOLTAREN *NOVARTIS;* Sup. 100 mg diclofenac sodic; ct. × 1 blist. × 5 sup. ***(P-RF)***

VOLTAREN EMULGEL *NOVARTIS;* Gel 1 %; ct. × 1 tub × 20 g ***(OTC)***

VOLTAREN RAPID *NOVARTIS;* Dj. 50 mg diclofenac sodic; ct. × 1 blist. × 10 dj. ***(P-RF)***

VOLTAREN RETARD *NOVARTIS;* Cpr. ret. 100 mg diclofenac sodic; ct. × 1 blist. × 10 cpr. ret. ***(P-RF)***

VURDON® *HELP;* Sol. inj. 25 mg/ml diclofenac sodic; ct. × 5 f. × 3 ml ***(P-RF)***

VURDON® *HELP;* Gel 1%; ct. × 1 tub × 25 g; ct. × 1 tub × 100 g ***(OTC)***

VURDON® *HELP;* Sol. oft. 0,1% diclofenac sodic; ct. × 1 fl. × 5 ml ***(P-6L)***

Ind: *Adm. sistemic*: trat. de lungă durată în: poliartrită reumatoidă, spondilită anchilopoietică, poliartrită reumatoidă juvenilă, sindrom Reiter; artroze invalidante însoțite de dureri; trat. de scurtă durată în: inflamații acute articulare și abarticulare; lombalgii, radiculite; artrită microcristalină; artrită gutoasă; dureri ușoare și moderate, algii musculare și osteoarticulare; cefalee de origine vasculară; dismenoree. *Adm. topic*: afecțiuni inflamatorii și traumatisme ale tendoanelor, ligamentelor, mușchilor și articulațiilor. Edeme postoperatorii și posttraumatice. *Adm. conj.*: inhibiția miozei în timpul chirurgiei cataractei; inflamația postoperatorie după chirurgia cataractei și alte proceduri chirurgicale; prevenirea pre- și postoperatorie a edemului macular cistoid asociat cu extracția cataractei și implantarea de cristalin artificial; afecțiuni inflamatorii neinfecțioase ale polului anterior al ochiului. Adjuvant în trat. local al inflamațiilor posttraumatice în leziuni penetrante și nepenetrante.

Dz: *Adm. sistemică*. Int.: trat. de lungă durată: inițial 150 mg/zi, în 2-3 prize; trat. de întreținere: 75-100 mg/zi. Trat. de scurtă durată: 150 mg/zi, fracționat în 2-3 prize. Intrarectal: 100 mg seara, ca doză unică sau ca ultimă doză în trat. zilnic. Inj., profund i.m.; *adulți și copii peste 12 ani:* 75 mg de 1-2 ori pe zi, max. 150 mg/zi. În cazul pacienților în vârstă dozele adm. vor fi calculate cu grijă. În *adm. topică tegumentară:* 2-4 aplicații/zi, la nivelul zonei afectate. Pt. ind. oft.: *Adulți:* Preoperator: Minimum 5 × 1 pic. în cele 3 ore care preced intervenția. Postoperator: 3 × 1 pic. imediat după intervenție și apoi 3-5 pic./zi, cât timp este necesar; alte indicații: 4-5 × 1 pic./zi, în funcție de severitatea afecțiunii.

CInd: Hipersensibilitate la diclofenac sau la oricare dintre componentele produsului; alergie la alte AINS. Ulcer gastric și duodenal activ. Rectită sau rectoragii recente. Trimestrul al III-lea de sarcină și perioada de alăptare; IH sau IR gravă. În adm. topică este CI în caz de leziuni cutanate.

AI: Prudență în caz de: reacții alergice induse de acidul acetilsalicilic, de alte medicamente sau alimente; astm bronșic; afecțiuni inflamatorii sau ulcerative ale tractului gastrointestinal; este necesar și trat. antiulceros la pacienții cu ulcer sau sângerări gastrointestinale în antecedente; afecțiuni cu tendință la retenție hidrosalină, IC; HTA; discrazii sanguine; infecții; diabet zaharat; IH și IR. În cazul trat. prelungit este necesar controlul funcțiilor hepatice și renale. Prudență în caz de intervenții chirurgicale. Prudență la vârstnici și copii. Produsele topice nu trebuie aplicate pe mucoase, mai ales la nivel ocular. Produsele topice se adm. numai la adulți. Este necesară supravegherea atentă în cazul asocierii cu: alte AINS; glucocorticoizi; anticoagulante orale; heparine; ticlopidină și alte antiagregante plachetare; trombolitice; litiu; metotrexat; diuretice și IEC; antiHTA; beta-blocante; digoxină; ciclosporină, compușii cu aur, medicație nefrotoxică; zidovudină; medicație fotosensibilizantă. Poate determina modificări ușoare ale valorilor transaminazelor serice și poate crește potasemia. Prudență la șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Tulburări gastrointestinale: greață, vărsături, diaree, epigastralgii, rareori ulcerații gastrointestinale, sângerări digestive; reacții locale iritative la nivelul rectului. Reacții alergice: erupții cutanate, prurit, eritem multiform, dermatită exfoliativă, sindrom Stevens-Johnson, necroliza toxică dermică, astm bronșic, edem Quinque, șoc anafilactic. Sistem nervos: cefalee, vertij, astenie, somnolență, insomnie, anxietate, tulburări de memorie, dezorientare, stare confuzivă și alte tulburări psihice, convulsii, neuropatie periferică incluzând parestezii. Tulburări de auz (tinitus, foarte rar surditate); tulburări ale senzației gustative. Aparat genitourinar: tulburări renale, rareori proteniurie, valori crescute ale creatininei serice, sindrom nefrotic, nefrită interstițială, IR, oligurie, hematurie. Hematologice: leucopenie, agranulocitoză, trombocitopenie, anemie feriprivă sau hemolitică, depresie medulară. Tulburări metabolice: hiperglicemie, glicozurie și hiperkalemie. Alte reacții: reacții de fotosensibilizare, creșterea transaminazelor serice, edem; cazuri izolate de HTA, dureri toracice, palpitații, impotență. În cazul adm. topice pot apărea: Reacții locale: rar, manifestări alergice cutanate pruriginoase sau de tip eritem localizat. Reacții de hipersensibilitate: dermatologice; respiratorii: foarte rar apar crize de astm bronșic; generale: foarte rare reacții de tip anafilactic. Adm. local conj. poate produce: senzație de arsură pasageră și/sau încețoșarea vederii; rar, pot apărea reacții de sensibilizare ca prurit, eritem, fotofobie.

DIDANOSINUM

COD ATC:J05AF02

VIDEX *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Cpr. mast. 25 mg didanozină; ct. × 1 fl. × 60 cpr. mast. ***(S/P-RF)***

VIDEX *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Cpr. mast. 50 mg didanozină; ct. × 1 fl. × 60 cpr. mast. ***(S/P-RF)***

VIDEX *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Cpr. mast. 100 mg didanozină; ct. × 1 fl. × 60 cpr. mast. ***(S/P-RF)***

VIDEX *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Cpr. mast. 150 mg didanozină; ct. × 1 fl. × 60 cpr. mast. ***(S/P-RF)***

VIDEX EC 125 mg *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Cps. gastrorez 125 mg didanozină; ct. × 3 blist. × 10 cps. gastrorez. ***(S/P-RF)***

VIDEX EC 200 mg *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Cps. gastrorez 200 mg didanozină; ct. × 3 blist. × 10 cps. gastrorez. ***(S/P-RF)***

VIDEX EC 250 mg *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Cps. gastrorez 250 mg didanozină; ct. × 3 blist. × 10 cps. gastrorez. ***(S/P-RF)***

VIDEX EC 400 mg *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Cps. gastrorez 400 mg didanozină; ct. × 3 blist. × 10 cps. gastrorez. ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. adulților HIV - infectați și al copiilor cu imunodeficiență progresivă sau avansată, de preferință în combinație cu alți agenți antiretrovirali.
Dz: Se adm. cu cel puțin 30 de min. înainte de masă. Deși nu s-a stabilit până acum doza optimă, pot fi făcute următoarele recomandări: *Adulți:* Doza inițială este dependentă de greutate; intervalul între doze va fi de 12 ore (BID). În studiile clinice s-au utilizat doze până la 600 mg/zi. Dozele inițiale medii: *la adulții cu > 60 kg,* cpr. se dau în doze de 200 mg BID; la *adulții < 60 kg,* doze de 125 mg BID. Fiecare doză se adm. sub forma a 2 cpr., în scopul asigurării unei cantități suficiente de neutralizant pentru pacient. *Copii:* 240 mg/m^2/zi (180 mg/m^2/zi în combinație cu ZDV). Intervalul de adm. a dozelor este de 12 ore. Ajustarea dozei: Creșterile semnificative ale amilazei serice vor determina întreruperea promptă a terapiei și evaluarea posibilității apariției pancreatitei, chiar în absența simptomelor de pancreatită. La pacienții anurici dializați, jumătate din doza zilnică totală recomandată se adm. o dată pe zi. Doza va fi administrată după dializă.
Cind: La pacienții cu hipersensibilitate la produs.
A!: La pacienții cu pancreatită (s-a dovedit legătura între riscul de pancreatită și doza zilnică). Atunci când este justificată de condițiile clinice, adm. va fi întreruptă până la excluderea diagnosticului de pancreatită prin teste de laborator și ecografie. De asemenea, când este necesar tratamentul simultan și cu alte med. cu toxicitatea asupra pancreasului, didanosina trebuie să fie întreruptă, dacă este posibil în timpul acestei terapii concomitente. La pacienții tratați cu didanosină poate apărea neuropatia periferică toxică, caracterizată de obicei de parestezii distale bilaterale simetrice, furnicături și durere a membrelor inferioare, și mai puțin frecvent a mâinilor. Atunci când este justificată de condițiile clinice, terapia cu didanosină va fi întreruptă până la rezoluția simptomelor. Dacă în timpul tratamentului apar creșteri semnificative ale concentrațiilor de acid uric, terapia va fi întreruptă. Terapia va fi întreruptă dacă valorile enzimelor hepatice cresc peste limita normală. Terapia va fi reluată numai dacă beneficiile potențiale ale tratamentului cu didanosină depășesc net riscurile potențiale. Nu există suficientă experiență clinică pentru a recomanda modul de dozare la copii cu vârsta mai mică de 3 luni. La copiii sub tratament se recomandă examinarea extinsă a retinei la fiecare 6 luni sau atunci când apar modificări vizuale.

RA: Pancreatita și creșteri ale amilazei serice și lipazei serice, neuropatia periferică, anomalii în testele de funcționare hepatică, cu rare cazuri de IH și moarte; diaree, greață/vomă, reacții alergice, diabet zaharat, uscăciunea gurii, astenie, durere de cap și concentrațiile de acid uric mărite. Acidoza lactică. În cazuri rare s-au raportat modificări ale retinei sau ale nervului optic, leucopenie, trombocitopenie, anemie.

DIFLUNISALUM

COD ATC: N02BA11

DIFLUNISAL *TEVA;* Cpr. film. 500 mg diflunisal; ct. × 60 cpr. film. ***(P-RF)***; ct. × 500 cpr. film. ***(S)***

DOLOBID *MERCK SHARP & DOHME;* Cpr. 500 mg diflunisal; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

Ind: Tratamentul de durată al durerilor de intensitate medie, osteoartritei, artritei reumatoide.
Dz: *Doza analgezică:* 100 mg o dată (doza de atac), apoi 500 mg/12 ore (doza de menținere); maxim 1500 mg pe zi. *Antiinflamator:* 500-1 000 mg/zi, în 1 sau 2 prize.
Cind: Ulcer gastroduodenal, diateză hemoragică; IH; Hipersensibilitate la produs sau la derivați salicilați.
A!: În sarcină. În caz de hipersensibilitate la AINS, teren alergic, trat. concomitent cu anticoagulante, tulburări grave ale funcțiilor hepatice sau renale, tulburări gastrointestinale cronice, deficit de G-6-PDH, trimestru I și II de sarcină, perioada de alăptare. Atenție dacă se adm. copiilor și adolescenților cu boli febrile, datorită posibilității apariției sindromului Reye. În caz de astm bronșic, alergie la polen, rinită alergică, polipi nazali, afecțiuni respiratorii bronhoobstructive cronice, hipersensibilitate la analgezice și antireumatice pot să apară crize de astm, erupții cutanate, edem Quincke.
RA: Tulburări gastrointestinale: greață, vărsături, diaree, ulcere gastrointestinale asociate cu microhemoragii și perforații. Reacții de hipersensibilitate. Tulburări ale funcțiilor hepatice și renale, hipoglicemie, reacții cutanate severe.

DIGOXINUM

COD ATC: C01AA05

CORLAN *PLIVA KRAKOW;* Sol. inj. 0,25 mg/ml digoxină; ct. × 10 f. × 1 ml ***(S/P-RF)***

DIGOXIN *SICOMED SA;* Cpr. 0,25 mg digoxină; ct. × 1 fl. × 40 cpr. ***(P-6L)***

DIGOXIN 0.5 mg/2 mg *SICOMED SA;* Sol. inj. 0,25 mg/ml digoxină; ct. × 5 f. × 2 ml; ct. × 10 f. × 2 ml ***(S/P-RF)***; ct. × 100 f. × 2 ml ***(P-6L)***

LANOXIN *GLAXO SMITHKLINE;* Sol. orală 0,05 mg/ml digoxină; ct. × 1 fl. × 60 ml ***(P-6L)***

LANOXIN *GLAXO SMITHKLINE;* Sol. inj. 0,25 mg/ml digoxină; ct. × 5 f. × 2 ml ***(S/P-RF)***

Ind: IC acută, IC congestivă, cord pulmonar cronic, IC la copii; fibrilație și flutter atriale, tahicardie supraventriculară. Este de ales pentru digitalizare rapidă și la bolnavii cu tendiță mare de acumulare a digitalicelor.
Dz: *Adulți și copii peste 10 ani:* i.v. lent, inițial 0,25-0,50 mg apoi, cu grijă, câte 0,25 mg la intervale de 4-6 ore până la digitalizarea deplină (obișnuit până la 1 mg doză totală) recomandabil sub control ECG; oral, inițial 0,50-0,75 mg, apoi, câte 0,25-0,50 mg la 6-8 ore până la digitalizarea deplină (obișnuit până la 1-1,5 mg doză totală). Întreținere: 0,125-0,50 mg/zi, oral. *Copii: nou-născuți:* 0,025-0,04 mg/kg inj. i.v. (la nevoie i.m.) sau 0,040-0,060 mg/kg, oral; *copiii de 1 lună-2 ani:* i.v., 0,035-0,050 mg/kg sau oral, 0,060-0,080 mg/kg; *copiii de 2-10 ani:* inj., 0,025-0,040 mg/kg sau oral, 0,040-0,060 mg/kg. Doza zilnică de întreținere este de 20-30% din doza digitalizantă.
Cind: Blocul cardiac complet intermitent sau în BAV de grad II, mai ales dacă există antecedente de crize Adams-Stokes. Aritmiile produse prin intoxicație cu glicozizi cardiotonici. Aritmiile supraventriculare asociate cu fascicule accesorii atrioventriculare. Dacă este cunoscuta sau suspectată o cale de conducere accesorie, chiar și când nu există antecedente de aritmii supraventriculare, cardiomiopatia hipertrofică obstructivă cu excepția cazurilor în care există concomitent fibrilație atrială și IC. Hipersensibilitate la digoxin și alte digitalice glicozidice.
A!: Aritmiile pot fi precipitate prin intoxicație digitalică. Prudență în cazuri de tulburări de conducere sino-atriale. În cazurile în care s-au adm. glicozide cardiotonice în ultimele 2 săpt., trebuie reconsiderat dozajul inițial și eventual reducerea dozei. Prudență la vârstnici. Hipopotasemia sensibilizează miocardul la acțiunea glicozizilor cardiotonici. Hipomagneziemia și hipercalcemia severă cresc sensibilitatea miocardului la acțiunea glicozizilor cardiotonici. Injectarea rapidă i.v. poate produce vasoconstricție cu HTA și/sau scăderea fluxului coronarian. Atenție în cazul pacienților cu boală tiroidiană. Pacienții cu sindrom de malabsorbție sau rezecții gastrointestinale pot necesita doze crescute. Riscul provocării unor aritmii periculoase folosind electroconversia cu curent continuu este crescut în prezența toxicității digitalice și este proporțional cu energia de electroconversie folosită. Precauție în caz de BAV incomplet, în perioada imediat următoare unui IM. Calea i.m. este dureroasă și se asociază cu necroza musculară. Prudență și/sau doze mici la bolnavii cu IR, la nou-născuții prematuri și imaturi, în stenoza subaortică hipertrofică idiopatică, cardita reumatismală, IM, bolile pulmonare grave, hipoxie, mixedem. Prudență în cazul asocierii cu: digitoxină, simpatomimetice, calciu i.v., diuretice kaliuretice, purgative (folosite abuziv), medicație cortizonică, rezerpină, hidroxid de aluminiu, trisilicat de magneziu, kaolin, acid aminosalicilic, sulfasalazină. Precauție în sarcină.
RA: Necardiace: anorexie, greață, vărsături, diaree, ginecomastie, slăbiciune musculară, apatie, fatigabilitate, astenie, cefalee, tulburări de vedere, depresie, psihoze. Adm. int. s-a asociat cu ischemie intestinală și, rar, cu necroză intestinală. Poate apărea rash tegumentar, însoțit de eozinofilie marcată. Foarte rar trombocitopenie. Cardiace: aritmii, tulburări de conducere. În caz de supradozare pot apărea tahicardii atriale.

DIHYDROCODEINUM

COD ATC: N02AA08

DHC CONTINUS *LAB. NAPP;* Cpr. ret. 60 mg dihidrocodeină; ct. × 56 cpr. ret. ***(P-RF)***

DHC CONTINUS *LAB. NAPP;* Cpr. ret. 90 mg dihidrocodeină; ct. × 56 cpr. ret. ***(P-RF)***

DHC CONTINUS *LAB. NAPP;* Cpr. ret.. 120 mg dihidrocodeină; ct. × 56 cpr. ret. ***(P-RF)***

DHC CONTINUS 60; 90; 120 *MUNDIPHARMA;* Cpr. cu elib. prel. 60 mg; 90 mg; 120 mg ***(P-RF)***

Ind: Tratamentul durerii acute sau cronice de intensitate medie sau puternică, asociate unor afecțiuni reumatice, ortopedice, neurologice, dermatologice, oncologice etc.
Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* 1-2 cpr. a 60 mg la 12 ore sau 1 cpr. a 90 mg sau 120 mg la 12 ore. *Bătrâni:* Doza este mai redusă.
Cind: Depresie respiratorie, afecțiuni obstructive ale căilor aeriene superioare. Dihidrocodeina poate provoca eliberare de histamină și de aceea nu se va adm. în criza astmatiformă. De asemenea se va adm. cu precauție la bolnavii de astm. Copii sub 12 ani.
A!: Dozele vor fi reduse la bătrâni, în hipotiroidism, afecțiuni hepatice cronice și IR. Trebuie evitat la pacienții cu presiune intracraniană crescută și la cei cu traumatisme craniene. Se va evita consumul de alcool. Precauție la bolnavii ce sunt tratați cu IMAO. Este recomandat ca adm. la mamele ce alăptează să se facă numai dacă este absolut necesar. Atenție la persoanele care conduc autoturisme sau operează cu mașini și utilaje.
RA: Uneori pot apărea constipație, greață, vărsături, dureri de cap, vertij și retenție urinară.

DIHYDROERGOCRIPTINUM *COD ATC: N04BC03*

DAVERIUM *POLI IND. CHIMICA;* Cpr. 20 mg metilsulfonat de α-dihidroergocriptină; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

Ind: Boală Parkinson; tratament de întreținere în cefalee și migrenă; hiperprolactinemie și inhibarea lactației.
Dz: Parkinson: Doza inițială: 5 mg p.o, de 2 ori/zi. Doza de întreținere: 60 mg/zi; poate fi crescută până la 120 mg/zi, prin creșteri succesive cu 10 mg, de două ori pe săpt. Dacă este adm. împreună cu levodopa, cu sau fără inhibitori de decarboxilază, pot fi suficiente doze mai mici; este posibilă reducerea dozei de levodopa, care se va face gradat, până când se obține efectul terapeutic optim. Cefalee și migrenă: Doza de atac: 10 mg p.o pe zi, seara înainte de culcare. Doza de întreținere: 10 mg de 2 ori/zi, dimineața și seara. Se va adm. max. 6 luni. Hiperprolactinemie: Doza de atac: 5 mg p.o de 2 ori/zi. Doza de întreținere: creșterea treptată a dozelor până la 10-20 p.o de 2 ori/zi. Inh. lactației: 5 mg p.o de 2 ori/zi, timp 5-10 zile.
N.B. Pentru doze < 10 mg vor fi folosite alte produse ce conțin alfa-dihidroergocriptină cu conc. corespunzătoare.
Cind: Hipersensibilitate la componente ale produsului; sarcină; alăptare; copii.
A!: La începutul tratamentului este recomandată monitorizarea TA. La pacienții cu migrenă sau cu Parkinson care prezintă galactoree, la cei cu amenoree prolactin-dependentă, cu tulburări menstruale sau cu acromegalie, tratamentul

poate elimina sterilitatea pre-existentă. De aceea, femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să utilizeze o metodă contraceptivă nehormonală. La pacienții cu acromegalie și antecedente de boală ulceroasă, în lipsa unor studii adecvate, se recomandă evitarea adm. Se impune prudență la pacienții cu antecedente de boli psihice, boli cardiovasculare grave, ulcer gastroduodenal și hemoragii digestive. Asocieri CI: alcaloizi din ergot și simpatomimetice, eritromicină și josamicină. Asocieri care necesită precauție: griseofulvină, levodopa, med. psihoactive sau hipotensoare. Poate fi influențată capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
RA: Greață, vărsături, gastralgii, pirozis, dispepsie, amețeli, hTA, lipotimie, astenie, somnolență, anxietate, cefalee și tahicardie. RA apar în primele zile de tratament și sunt de scurtă durată. Rar s-au observat erupții cutanate.

DIHYDROTACHYSTEROLUM

COD ATC: A11CC02

A.T. 10® *MERCK SHARP & DOHME;* Sol. orală 1 mg/ml dihidrotahisterol; ct. × 1 fl. × 15 ml ***(P-6L)***

TACHYSTIN *ANKERPHARM GROUP CHAUVIN;* Sol. orală 0,1% dihidrotahisterol; ct. × 1 fl. × 20 ml ***(P-6L)***

Ind: Hipoparatiroidie idiopatică sau postoperatorie; pseudohipoparatiroidie.
Dz: Uzual: 0,5-1,5 mg/zi. Se poate adm. fie după mese fie pe nemâncate, cu puțin lichid.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componenții produsului; hipercalcemie; hipervitaminoză D. Nu se recomandă asocierea cu: analogi sau metaboliți ai vit. D sau cu antiacide care conțin magneziu.
A!: Prudență în cazul antecedentelor de litiază renală, arterioscleroză, IC, hiperfosfatemie, IR. Înainte de începerea trat. și în timpul acestuia se controlează calcemia. Prudență în cazul asocierii cu: diuretice tiazidice, doze mari de preparate conținând calciu, tiroxină. Prudență în timpul sarcinii și alăptării.
RA: Hipercalcemie manifestată prin pierderea poftei de mâncare, gust metalic, greață, vărsături, diaree sau constipație, paloare facială, cefalee, palpitații, oboseală și senzație de slăbiciune, uscăciunea mucoasei bucale, sete. Afectări renale, calcificări la nivelul cordului, plămânilor sau rinichilor. Dureri osoase și musculare, HTA, aritmii, urină tulbure, fotofobie, prurit, scădere în greutate. Suferință biliară.

DILTIAZEMUM

COD ATC: C08DB01

ALDIZEM *ALKALOID AD;* Cpr. 60 mg clorhidrat de diltiazem; ct. × 1 fl. × 30 cpr. ***(P-6L)***

ALDIZEM *ALKALOID AD;* Cpr. 90 mg clorhidrat de diltiazem; ct. × 1 fl. × 30 cpr. ***(P-6L)***

ALTIAZEM® RR *F.I.R.M.A;* Cps. ret. 180 mg clorhidrat de diltiazem; ct. × 16 cps. ret. ***(P-6L)***

ASDILT *EUROPHARM SA;* Cps. 60 mg clorhidrat de diltiazem; ct. × 2 blist. × 10 cps. ***(P-6L)***; ct. × 50 blist. × 10 cps.; ct. × 100 blist. × 10 cps. ***(S)***

CORZEM® 120 *HELCOR SRL;* Cpr. film. 120 mg diltiazem; ct. × 1 blist. × 10 cpr. film. ***(P-6L)***

CORZEM® 60 *HELCOR SRL;* Cpr. film. 60 mg diltiazem; ct. × 2 blist. × 10 cpr. film. ***(P-6L)***

DIACORD *MAGISTRA C&C;* Cpr. 60 mg clorhidrat de diltiazem; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

DIACORDIN® *LECIVA;* Cpr. 60 mg clorhidrat de diltiazem; ct. × 5 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

DILTIAZEM *E.I.P.I.C.O.;* Cpr. 60 mg clorhidrat de diltiazem; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

DILTIAZEM *SICOMED SA;* Cpr. 60 mg clorhidrat de diltiazem; ct. × 1 fl. × 20 cpr. ***(P-6L)***

DILTIAZEM 60 mg *ARENA GROUP SA;* Cpr. 60 mg clorhidrat de diltiazem; ct. × 1 fl. × 20 cpr. ***(P-6L)***

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE *TEVA;* Cpr. 60 mg clorhidrat de diltiazem; ct. × 1 fl. × 100 cpr. ***(P-6L)***

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE *TEVA;* Cpr. 90 mg clorhidrat de diltiazem; ct. × 1 fl. × 100 cpr. ***(P-6L)***

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE *TEVA;* Cpr. 120 mg clorhidrat de diltiazem; ct. × 1 fl. × 100 cpr. ***(P-6L)***

DILZEM 60 mg *PFIZER;* Cpr. 60 mg clorhidrat de diltiazem; ct. × 3 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

DILZEM PARENTERAL *PFIZER;* Liof. pt. sol. inj. 25 mg clorhidrat de diltiazem; ct. × 5 fl. pulb. + 5 f. solv. × 5 ml ***(S)***

DILZEM RETARD *PFIZER;* Cpr. ret. 90 mg clorhidrat de diltiazem; ct. × 3 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

Ind: Angina pectorală cronică stabilă, angina vasospastică, angina instabilă, HTA.
Dz: Int., 60 mg de 3 ori/zi, înainte de masă. În cazurile severe, max. 240-360 mg/zi.
Cind: Boala nodului sinusal (excepție cazurile cu pacemaker ventricular); BAV gr. II sau III (excepție cazurile cu pacemaker ventricular); IC; hTA; hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului. Este Cind asocierea cu dantrolen adm. în p.i.v. Perioada de alăptare.
A!: Prudență la pacienții cu bradicardie, BAV gr. I, la vârstnici, la pacienții cu IR sau IH, în cazul anesteziei generale. Prudență în cazul asocierii cu: antiaritmice, alfa$_1$-blocante, amiodaronă, beta-blocante, ciclosporină, carbamazepină, digoxină, cimetidină, midazolam, rifampicină, baclofen, imipramină, neuroleptice, corticosteroizi, tetracosactid. Prudență în timpul sarcinii, la șoferi și persoane cu activități de precizie.
RA: Bradicardie sinusală, bloc sinoatrial, BAV, edeme ale membrelor inferioare, erupții cutanate (eritem, urticarie, eritem descuamativ, eventual cu fe-

bră), astenie, somnolență, cefalee, insomnie, vertij, dispepsie, epigastralgii, uscăciunea gurii, constipație. Creșteri izolate ale transaminazelor hepatice. Excepțional hepatită.

DIMENHYDRINATUM

COD ATC: N07CAN1

XALINAT *SICOMED SA;* Dj. ret. 200 mg dimenhidrat; ct. × 1 blist. × 10 dj. ret. *(P-RF)*

XALINAT® 100 mg *SICOMED SA;* Sup. 100 mg dimenhidrat; ct. × 1 blist. × 5 sup. *(P-RF)*

XALINAT® 16,5 mg/5 ml *SICOMED SA;* Sirop 16,5 mg/5 ml dimenhidrat; ct. × 1 fl. × 100 ml *(P-RF)*

XALINAT® 25 mg *SICOMED SA;* Sup. 25 mg dimenhidrat; ct. × 1 blist. × 5 sup. *(P-RF)*

XALINAT® 50 mg/ ml *SICOMED SA;* Sol. inj. 50 mg/ml dimenhidrat; ct. × 5 f. × 2 ml *(P-RF)*

Ind: Profilaxia vărsăturilor datorate răului de mișcare. Sindrom Ménière.
Dz: 200 mg de 2-3 ori pe zi *(adult); copil < 3 luni:* 1 linguriță/zi; 3-12 luni: 3 lingurițe/zi; *1-12 ani:* 2 lingurițe de 3 ori pe zi.
Cind: Hipersensibilitate la produs.
A!: Prudență în timpul sarcinii, la șoferi și persoane cu activități de precizie.
RA: Confuzie, iritabilitate, anxietate, tulburări vizuale, cefalee.

DIMETINDENUM

COD ATC: R06AB03

FENISTIL *ZYMA;* Sol. orală 0,1% maleat de dimetinden; ct. × 1 fl. × 20 ml *(P-RF)*

FENISTIL *ZYMA;* Gel 0,1 % maleat de dimetinden; ct. × 1 tub × 30 g *(OTC)*

Ind: Trat. simptomatic al: urticarie, alergii ale căilor respiratorii superioare, alergii alimentare și medicamentoase, pruritului, înțepăturilor de insecte, eczeme și alte dermatoze pruriginoase.
Dz: *Int.: Adulți și copii peste 12 ani:* 3-6 mg/zi, divizat în 3 prize. *Copii:* 0,1 mg/kg/zi. *Topic:* 2-4 aplicații/zi.
Cind: Hipersensibilitate la unul din componenți. Copii sub o lună, în special copii prematuri.
A!: Glaucom. Retenție urinară asociată tulburărilor uretro-prostatice. Boli obstructive pulmonare cronice. La copii, antihistaminicele pot provoca agitație. Sub vârsta de 1 an, efectul sedativ al dimetindenului poate provoca episoade de apnee în timpul somnului. Se evită expunerea prelungită la soare a zonelor tratate. La sugari și copii mici, se evită folosirea dimetinden gel pe suprafețe întinse sau pe leziuni și inflamații cutanate. Precauție în cazul asocierii cu: deprimante ale SNC, IMAO, antidepresive triciclice, medicamente anticolinergice. Precauție, sau se evită adm., int. sau topic, în sarcină și perioada de alăptare; la șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Somnolență, tulburări gastrointestinale, uscăciunea gurii și/sau a gâtului, vertij, agitație, cefalee, edem, erupții cutanate, spasme musculare, tulburări respiratorii, semne de iritație locală, reacții de hipersensibilizare.

DINOPROSTONUM

COD ATC: G02AD02

PROSTIN E2 *PHARMACIA - Membru al Grupului PFIZER;* Gel vaginal 1 mg dinoprostonă; ct. × 1 seringă preumplută × 3 g gel ***(S/P-RF)***

PROSTIN E2 *PHARMACIA - Membru al Grupului PFIZER;* Gel vaginal 2 mg dinoprostonă; ct. × 1 seringă preumplută × 3 g gel ***(S/P-RF)***

Ind: Întreruperea sarcinii. Inducerea travaliului.
Dz: Inducerea avortului și întreruperea unei sarcini patologice: Adm. locală extraamniotică, inj. în spațiul dintre peretele uterin și sacul amniotic: 3-5 mg. După 5-6 h de la prima inj. nereușită, trat. poate fi repetat cu 5-10 mg. Adm. locală intraamniotică prin metoda transabdominală sau cale de abordare vaginală: 25 mg, inj. poate fi repetată după 8-12 ore. Adm. i.v.: se adaugă 10-20 mg dinoprostonă în 500 ml glucoză 5% sau ser fiziologic 0,45%; perf. trebuie începută la o rată de 0,5-1 ml/min și se crește până la max. 2 ml/min; perf. trebuie continuată max. 12 h. În caz de nereușită, poate fi repetată numai după o pauză de 12 h. Inducerea travaliului: inițial, 2-3 mg/min în p.i.v., doza poate fi crescută, la intervale de 20-30 min, în funcție de răspunsul activității uterine; max. 35-40 mg/min. Doza care se dovedește eficientă trebuie să fie menținută până la sfârșitul perioadei placentare.
Cind: Astm bronșic, faza activă a colitei ulceroase, drepanocitoză, HTA, epilepsie, uter cicatriceal.
A!: Prudență în: IC, bronșită spastică, forma activă a tbc pulmonare, faza de remisiune a colitei ulceroase, tulburări severe ale funcției hepatice, malformații congenitale uterine sau fibrom uterin. După întreruperea sarcinii este necesară o monitorizare adecvată pt. a confirma golirea completă a cavității uterine. Dacă întreruperea sarcinii a fost indusă cu dinoprostonă (PGF2a), golirea cavității uterine trebuie neapărat dusă până la capăt. Adm. concomitentă de ocitocină și ergometrină potențează efectul dinoprostonei; efectele adverse pot fi, de asemenea, mai intense.
RA: Gastrointestinale (greață, vărsături, diaree, colici intestinale); crampe abdominale; tahicardie; dureri de cap, variații ale TA: bronhospasm; transpirații; slăbiciune; alergie.

DIOSMECTITA

COD ATC: A07BC05

SMECTA *IPSEN BIOTECH;* Pulb. susp., un plic pt. susp. orală conține 3 g diosmectită dioctaedrică; ct. × 30 plicuri; ct. × 10 plicuri ***(OTC)***

Ind: Diareea acută a copilului. Diaree acută și cronică la adult. Sindrom de colon iritabil.
Dz: Int. *adult:* 3 plicuri/zi; *copil:* 1 plic/zi pentru 0-1 an, 2 plicuri/zi pentru 1-2 ani, 3 plicuri/zi peste 3 ani. Sindromul colonului iritabil: 3 plicuri/zi, timp de 1 săpt., după care 2 plicuri/zi până la sfârșitul primei luni de trat. Curele se reiau la nevoie. Conținutul unui plic se suspendă în 1/2 pahar cu apă.

A!: Trat. nu înlocuiește rehidratarea. Pentru evitarea interferării cu absorbția altor substanțe adm. int., acestea se vor adm. cu o oră înaintea diosmectitei.
RA: Constipație.

DIOSMINUM

COD ATC: C05CA03

DIOSMIN *SALUS RESEARCHES SPA;* Cremă 5% diosmină; ct. × 1 tub × 40 g ***(OTC)***

Ind: Adjuvant în trat. sindromului prevaricos al extremităților inferioare, tumefacției și edemelor gambei, sensibilității ramificațiilor venoase, crampelor; sindromului varicos, flebectazii, flebalgii, eczeme; manifestări hemoragice datorate fragilității capilare, sindromului postflebitic, hemoroizilor interni și externi.
Dz: 1-2 aplicații locale, în zona interesată.
Cind: Hipersensibilitate față de diosmină sau excipienți. În sarcină.
RA: Vertij, sensibilizare și iritare cutanată.

DIPYRIDAMOLUM

COD ATC: B01AC07

DIPIRIDAMOL *PROMEDIC SRL;* Dj. 25 mg dipiridamol; ct. × 1 fl. × 60 dj. ***(OTC)***

DIPIRIDAMOL *SICOMED SA;* Cpr. film. 25 mg dipiridamol; ct. × 1 fl. × 60 cpr. film.; ct. × 6 blist. × 10 cpr. film. ***(OTC)***

DIPIRIDAMOL *SICOMED SA;* Cpr. film. 75 mg dipiridamol; ct. × 1 fl. × 20 cpr. film.; ct. × 2 blist. × 10 cpr. film. ***(OTC)***

DIPIRIDAMOL *SICOMED SA;* Sol. inj. 5 mg/ml dipiridamol; ct. × 5 f. × 2 ml ***(P-RF)***; ct. × 100 f. × 2 ml ***(S)***

Ind: Cardiopatie ischemică cronică. Profilax. tromboembolismului după înlocuire de valve cardiace, în trat. diferitelor afecțiuni tromboembolice; adm. i.v. în testul de stres pentru diagnosticul scintigrafic al bolii cardiace ischemice, echocardiografie. Utilizări posibile (asociat cu aspirina). limitarea evolutivității complicațiilor diabetului zaharat; stadii inițiale ale bolii Kawasaki; profilaxia migrenei; tulburări vasculare periferice.
Dz: Int.: *adulți:* 300-600 mg/zi; *copii:* 5 mg/kg/zi, cu aproximativ 1 oră înaintea mesei. Inj. i.v.; în testul de stres pt. diagnostic scintigrafic al bolii cardiace ischemice: 560 µg/kg timp de 4 min (sau 300-400 mg p.o.) Echocardiografie: 750-840 µg/kg.
Cind: Criza de angină pectorală, IMA recent, hTA, angina instabilă, tulburări de coagulare. Sol. inj. nu se asociază cu alte preparate.
A!: Precauție în cazul asocierii cu: derivați de xantină, anticoagulante orale, penicilină, cefalosporină, cloramfenicol, tetraciclină. Prudență în sarcină, în special în trimestrul al II-lea și al III-lea.
RA: Tulburări digestive (greață, vomă, diaree), amețeli, slăbiciune, rash cutanat, dureri precordiale, aritmii.

DIRITHROMICINUM

COD ATC: J01FA13

DYNABAC® *ELI LILLY;* Cpr. film. 250 mg diritromicină; ct. × 1 blist. × 10 cpr. film. *(P-RF)*

Ind: Infecții provocate de germeni sensibili: faringite și amigdalite cauzate de S. pyogenes; bronșite acute și acutizări ale bronșitelor cronice cauzate de S. pneumoniae, S. pyogenes, Streptococi (grupul viridans), S. aureus și M. catarrhalis; pneumonii cauzate de S. pneumoniae, M. pneumoniae, L. pneumophila și M. catarrhalis; infecții cutanate cauzate de streptococii β-hemolitici de grup A.
Dz: Oral. *Adulți:* 500 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la diritromicină sau alte macrolide. La copiii sub 12 ani.
A!: A se verifica hipersensibilitatea pacientului la macrolide sau la alte medicamente. Atenție la pacienții care prezintă manifestări alergice în antecedente. Va fi luată în considerare colita pseudomembranoasă la pacienții care dezvoltă diaree în cursul terapiei. Precauție în cazul asocierii cu: teofilină, antiacide, antiH_2, warfarină, digoxină, ergotamină, triazolam, ciclosporină, terfenadină, hexobarbital, carbamazepină, alfentanil, disopiramidă, lovastatină. Sarcină și alăptare.
RA: Dureri abdominale, diaree, grețuri, cefalee, vărsături, dispepsie, flatulență, anorexie, astenie, amețeli, insomnie, somnolență, vasodilatație, iritații cutanate, urticarie, prurit, vaginite și moniliază vaginală.

DISTIGMINI BROMIDUM

COD ATC: N07AA03

UBRETID 0,5 mg *NYCOMED PHARMA AG;* Sol. inj. 0,5 mg/ml bromură de distigmină; ct. × 25 f. × 1 ml *(P-RF)*

UBRETID® 0,5 mg *NYCOMED PHARMA AG;* Cpr. 5 mg bromură de distigmină; ct. × 2 blist. × 10 cpr.; ct. × 5 blist. × 10 cpr. *(P-6L)*

UBRETID® 5 mg *NYCOMED PHARMA AG;* Sol. inj. 0,5 mg/ ml bromură de distigmină; ct. × 3 f. × 1 ml; ct. × 5 f. × 1 ml *(P-RF)*

UBRETID 5 mg *NYCOMED PHARMA AG;* Tb. 5 mg × 20 *(P-6L)*

Ind: Atonie intestinală postoperatorie. Atonie postoperatorie a musculaturii vezicii urinare și a ureterelor. Tulburare neurogenă a micțiunii. Incontinență urinară. Constipație cronică hipotonă și megacolon. Miastenia gravis pseudoparalitică.
Dz: Int. Inițial, 5 mg/zi. După o săpt. 5-10 mg la fiecare 2-3 zile. Adm. dimineața, pe stomacul gol. Inj. i.m. *Adulți:* inițial 0,5 mg. Următoarea inj. poate fi adm. numai după 24 de ore. Aceeași doză poate fi adm. din nou la intervale de 2-3 zile. Doza poate fi crescută la 0,1 mg/kg.
Cind: Vagotonie severă, însoțită de hTA, bradicardie, hiperaciditate, hiperperistaltism intestinal și gastric, hipersalivație, tulburări circulatorii periferice, spasme ale căilor biliare și urinare, ulcere gastrice, enterite; spasme musculare, epilepsie, boală Parkinson, șoc postoperator și insuficiențe circulatorii; IC netratată, IM, astm bronșic.

A!: În trat. paraliziei neurogene a vezicii urinare se va adm. asociat cu un alfa-blocant. Trat. efectelor muscarinice se va face cu atropină. Precauție în cazul asocierii cu: anticolinergice, neuroleptice, antiH$_1$, curarizante antidepolarizante, suxametoniu, neomicină, streptomicină, kanamicină. Precauție în timpul sarcinii și alăptării.
RA: Efecte muscarinice: greață, vărsături, diaree, enterospasm, bronhospasm, bradicardie, mioză, diaforeză. Efecte nicotinice: spasme musculare, fasciculații, astenie musculară, dificultăți în deglutiție. În cazul amenoreei funcționale temporare poate produce sângerări.

DISULFIRAMUM *COD ATC: N07BB05*

ANTALCOL *ARMEDICA SA;* Cpr. 500 mg disulfiram; ct. × 1 fl. × 50 cpr. ***(S/P-RF)***

ANTALCOL *SINTOFARM SA;* Cpr. 500 mg disulfiram; ct. × 1 fl. × 50 cpr.; ct. × 1 fl. × 1 000 cpr. ***(S/P-RF)***

Ind: Alcoolismul cronic, ca trat. adjuvant.
Dz: Prima zi 500 mg-1,5 g, zilele 2-10 câte 500 mg-1 g/zi, apoi trat. de întreținere: 500 mg la 2-3 zile.
Cind: Afecțiuni miocardice și coronariene, IH, diabet, epilepsie, psihoză, sarcină, farmacodependență. După ingestia recentă de alcool (în ultimele 24 de ore). Nu se asociază cu: anticoagulante cumarinice, fenitoină, metronidazol, izoniazidă, barbiturice, fenotiazine, haloperidol, clorprotixen, antihistaminice, ACTH.
A!: Prudență în boli ale tiroidei, leziuni cerebrale, nefrită, hepatită. Trat. se începe în spital necesitând cooperarea bolnavului.
RA: Gust neplăcut, tulburări digestive, halenă fetidă, cefalee, astenie, tulburări de memorie, somnolență, impotență, erupții alergice, polinevrite, nevrită optică, fenomene psihotice. După ingestia de alcool sunt posibile reacții grave: deprimare respiratorie, colaps, aritmii cardiace, comă, convulsii, moarte.

DITHRANOLUM *COD ATC: D05AC01*

PSORIANOL 1% *HYPERION SA;* Ung. 1% ditranol; ct. × 1 tub × 20 g ***(P-RF)***

PSORIANOL 0,5% *HYPERION SA;* Ung. 0,5% ditranol; ct. × 1 tub × 20 g ***(P-RF)***

Ind: Tratamentul psoriazisului, inclusiv la nivelul scalpului. Alopecia areata.
Dz: Se aplică o dată/zi pe zona afectată.
Cind: Hipersensibilitate la una din componentele produsului; leziuni deschise.
A!: Nu se aplică pe mucoase. Trebuie evitată aplicarea pe față. Sarcină și alăptare.
RA: Reacții de sensibilizare. Poate modifica colorația părului și a unghiilor. Adm. dozelor crescute duce la afectare renală.

DOBUTAMINUM

COD ATC: C01CA07

DOBUTAMIN SOLVAY INFUS 250 mg *SOLVAY PHARMACEUTICALS;* Sol. perf. 250 mg/50 ml *(S)*

DOBUTREX® *ELI LILLY;* Pulb. liof. pt. perf. 250 mg dobutamină; ct. × 1 fl. pulb. *(S)*

DOBUTREX SOLUTION *ELI LILLY;* Sol. inj. 12,5 mg/ml dobutamină; ct. × 1 fl. × 20 ml *(S)*

Ind: Stimularea inotropismului în stări de hipoperfuzie, la pacienți cu debit cardiac insuficient. Suport inotrop necesar pacienților cu presiuni ventriculare de umplere anormal de crescute (IC acută, IMA, șoc cardiogen, după int. chir. pe cord, supradozare de β-blocanți, IC cronică; stări de hipoperfuzie acută secundară traumatismelor, int. chir., septicemiilor sau hipovolemiei, când TA medie este peste 70 mmHg și presiunea pulmonară capilară este de 18 mmHg sau mai mare, cu răspuns inadecvat la volumul de umplere și presiune ventriculară de umplere crescută; debit cardiac scăzut ca urmare a ventilației mecanice cu presiune expiratorie pozitivă). Testarea în scop diagnostic a bolii coronariene.
Dz: Adm. în p.i.v. continuă. 2,5 și 40 μg/kg/min. Ritmul de adm. și durata terapiei trebuie ajustate pe baza următorilor indicatori clinici: parametri hemodinamici-frecvența și ritmul cardiac, TA, debitul cardiac și presiunile de umplere ventriculară și semnele congestiei pulmonare și ale irigării diferitelor organe (excreția urinară, temperatura cutanată și starea psihică).
Cind: Sensibilitate la dobutamină.
A!: Soluțiile saline nu trebuie utilizate în reconstituirea dobutaminei clorhidrat. Doza trebuie redusă sau chiar se poate opri temporar trat. dacă apar creșteri nedorite ale frecvenței cardiace sau presiunii sistolice sau dacă apar fenomene aritmice. Precauție în cazul pacienților cu flutter atrial, fibrilație atrială, IMA. Nu îmbunătățește hemodinamica la majoritatea pacienților cu obstrucții mecanice care împiedică fie umplerea, fie golirea ventriculară, sau pe amândouă. Răspunsul inotrop poate fi inadecvat în cazul pacienților cu o marcată reducere a complianței ventriculare. Trebuie monitorizate atent frecvența cardiacă, ritmul cardiac, debitul cardiac, TA și ritmul de perfuzie. Atenție în șocul cardiogen cu hTA severă. Unele efecte hemodinamice ale dobutaminei pot să difere la copii în comparație cu adulții. Copiii trebuie monitorizați cu mare atenție. Terapia cu dobutamină se va întrerupe prin reducerea gradată a dozei. Efectele dobutaminei pot fi contracarate de β-blocante. Precauție în timpul sarcinii.
RA: Creșterea excesivă a frecvenței cardiace și a presiunii sistolice, aritmii ectopice; flebită la nivelul inj. i.v.; greață, dureri de cap, durere anginoasă, dureri toracice nespecifice, palpitații, tahipnee și reacții sugestive pentru hipersensibilitate (erupții eritematoase, febră, eozinofilie și bronhospasm).

DOCETAXOLUM

COD ATC: L01CD02

TAXOTERE *LAB. AVENTIS PHARMA;* Conc. și solv. pt. sol. perf. 1 fl. conține 20 mg docetaxel; ct. × 1 fl. × 0,5 ml + 1 fl. × 1,5 ml solv. *(S)*

TAXOTERE *LAB. AVENTIS PHARMA;* Conc. și solv. pt. sol. perf. 1 fl. conține 80 mg docetaxel; ct. × 1 fl. × 2 ml + 1 fl. × 6 ml solv. *(S)*

TAXOTERE *SINDAN SRL;* Conc. și solv. pt. sol. perf. 1 fl. conține 20 mg docetaxel; ct. × 1 fl. × 0,5 ml + 1 fl. × 1,5 ml solv. *(S)*

TAXOTERE *LAB. AVENTIS PHARMA;* Conc. și solv. pt. sol. perf. 1 fl. conține 80 mg docetaxel; ct. × 1 fl. × 2 ml + 1 fl. × 6 ml solv. *(S)*

Ind: Trat. neoplasmului de sân, al celui ovarian, pulmonar, al capului și gâtului.
Dz: Perf. i.v. lentă, uzual 20-80 mg o dată la 3 săpt.; doza se calculează în funcție de suprafața corporală.
Cind: Hipersensibilitate la componentele produsului; leucopenie; afecțiuni hepatice severe; perioadă de sarcină sau alăptare.
A!: Înaintea fiecărei adm. este necesară testarea hemoleucogramei și a funcției hepatice. Începând cu o zi înaintea adm. și continuând 2 zile după adm. este utilă asocierea unui steroid. În caz de neoplasm al capului sau gâtului, este utilă asocierea cu un antibiotic. În cazul în care concentratul sau sol. perf. vine în contact cu pielea sau mucoasele, acestea se spală imediat.
RA: Reacții alergice: eritem, prurit, senzație de constricție toracică, respirație dificilă, astenie, febră, frisoane; rar, convulsii sau pierderea temporară a cunoștinței. Între adm. pot să apară: anemie, leucopenie, trombocitopenie, creșterea enzimelor hepatice, febră, eritem la nivelul palmelor sau tălpilor, erupții buloase de tip eritem multiform sau sd. Stevens-Johnson, modificarea culorii sau căderea unghiilor, tumefierea mâinilor, a picioarelor sau creștere în greutate. Senzație de amorțeală sau dureri articulare sau musculare. Tulburări digestive; greață, vărsături, diaree, usturimi ale gurii, alopecie reversibilă, colită; rar, hepatită. Aritmii, amețeli sau senzație de slăbiciune. Durere, eritem și uscăciunea pielii, flebită și tumefiere la locul inj.

DOLASTERONUM *COD ATC: A04AD*

ANZEMET® 100 mg/5 ml *LAB. AVENTIS PHARMA;* Sol. inj. 20 mg/ml dolasteron (f. × 5 ml) ***(P-RF)***

ANZEMET® 12,5 mg/0,625 ml *LAB. AVENTIS PHARMA;* Sol. inj. 20 mg/ml dolasteron (f. × 0,625 ml) ***(P-RF)***

ANZEMET® 200 mg *LAB. AVENTIS PHARMA;* Cpr. film. 200 mg dolasteron ***(P-RF)***

Ind: Prevenirea grețurilor și vărsăturilor produse de chimioterapie sau cele postoperatorii.
Dz: *Prevenirea grețurilor și vărsăturilor produse de chimioterapie: adulți:* 100 mg cu o oră înaintea chimioterapiei. *Copii (2-16 ani):* 1,8 mg/kg, cu o oră înaintea chimioterapiei; max. 100 mg/zi. *Prevenirea grețurilor și vărsăturilor postoperatorii: adulți:* 100 mg cu 2 ore înaintea operației. *Copii (2-16 ani):* 1,2 mg/kg, cu 2 ore înaintea operației.
Cind: Hipersensibilitate la produs.
A!: Modifică ECG, induce tulburări de conducere. Prudență la pacienții cu: hipokalemie, hipomagneziemie, sindrom congenital QT, la cei trat. cu antiaritmice care prelungesc QT, trat. cu antracicline.

RA: Rash, transpirații, constipație, dispepsie, anorexie, rar pancreatită, tulburări de gust, tinnitus, fotofobie, agitație, tulburări de somn, creșteri tranzitorii ale transaminazelor.

DOMPERIDONUM

COD ATC: A03FA03

MOTILIUM *JANSSEN PHARMACEUTICA;* Cpr. film. 10 mg domperidon; ct. × 1 blist. × 10 cpr. film.; ct. × 3 blist. × 10 cpr. film. ***(P-6L)***

MOTILIUM 10 mg *TERAPIA SA;* Cpr. film. 10 mg domperidon; ct. × 1 blist. × 10 cpr. film. ***(P-6L)***

MOTILIUM LINGUAL *JANSSEN PHARMACEUTICA;* Liof. oral. 10 mg domperidon; ct. × 3 blist. × 10 liof. oral. ***(P-6L)***

Ind: Sindromul dispeptic complex (golire gastrică întârziată, reflux gastro-esofagian și esofagite). Greață și vomă (indicație specifică este greața și voma provocată de antagoniști ai dopaminei).
Dz: Dispepsie cronică: *Adulți:* 10 mg de 3 ori/zi, cu 15-30 min înainte de mese. *Copii peste 5 ani:* 2,5 mg/10 kg de 3 ori/zi, înainte de mese. Când rezultatele nu sunt satisfăcătoare, dozajul de mai sus poate fi dublat. Stări acute și subacute (în special greață și vomă): *Adulți:* 20 mg de 3-4 ori/zi, înainte de mese și înainte de culcare. *Copii peste 5 ani:* 5 mg/10 kg, de 3-4 ori/zi, înainte de mese și înainte de culcare. La pacienții cu IR, frecvența adm. trebuie redusă.
Cind: Intoleranță cunoscută la medicament. Când stimularea motilității gastrice poate fi periculoasă. La pacienții cu prolactinom. La copii sub 5 ani.
A!: În afecțiuni hepatice și renale. Atenție în cazul adm. concomitente cu: medicamente anticolinergice, antisecretoare și antiacide. Precauție la femei însărcinate sau în perioada de alăptare.
RA: Crampe intestinale tranzitorii. Fenomenele extrapiramidale. Creștere a nivelului prolactinei care poate duce la galactoree și ginecomastie. Efecte neurologice. Reacții alergice (prurit, urticarie).

DONEPEZILUM

COD ATC: N06DA02

ARICEPT *PFIZER H.C.P. CORPORATION;* Cpr. film. 5 mg clorhidrat de donepezil; ct. × 2 blist. × 14 cpr. film. ***(P-RF)***

ARICEPT *PFIZER H.C.P. CORPORATION;* Cpr. film. 10 mg clorhidrat de donepezil; ct. × 2 blist. × 14 cpr. film. ***(P-RF)***

Ind: Boala Alzheimer, forme ușoare și medii.
Dz: Oral. *Adulți/vârstnici:* inițial 5 mg/zi, doză unică, seara, înainte de culcare. După o lună de trat. doza poate fi crescută la 10 mg/zi, doză unică.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la componente sau la derivați de piperidină. În sarcină și în perioada de alăptare. La copii.
A!: A se monitoriza regulat adm. medicamentului. Beneficiul clinic trebuie reevaluat periodic. Întreruperea trat. trebuie avută în vedere atunci când efectul terapeutic nu mai este evident. Este posibil să accentueze relaxarea mus-

culară tip succinilcolină în timpul anesteziei. Precauție la pacienții cu "sick sinus syndrome" sau alte tulburări de conducere supraventriculară. Pacienții cu risc de ulcer trebuie monitorizați pt. simptomatologie activă sau ocultă de hemoragie gastro-intestinală. Precauție la pacienții cu astm sau afecțiuni pulmonare obstructive. Trebuie evitată adm. concomitentă cu alți inhibitori de acetilcolinesterază, agoniști sau antagoniști colinergici. Precauție în cazul asocierii cu: teofilină, warfarină, cimetidină, digoxină, ketoconazol, chinidinele, itraconazol, eritromicină, fluoxetină, rifampicină, fenitoină, carbamazepină, alcool, medicația anticolinergică, succinilcolină, alți agenți blocanți neuromusculari sau agoniști colinergici sau β-blocanți.
RA: Diaree, crampe musculare, oboseală, greață, vărsături, insomnie, cefalee, dureri, răceală, tulburări abdominale, sincopă, bradicardie, bloc sinoatrial și atrioventricular, creșterea nivelului seric al creatinkinazei musculare.

DOPAMINUM

COD ATC: C01CA04

DOPAMIN AWD *AWD PHARMA;* Sol. inj. 10 mg/ml clorhidrat de dopamină; ct. × 5 f. × 5 ml ***(S)***

DOPAMIN SOLVAY® 200 *SOLVAY PHARMACEUTICALS;* Sol. inj. 20 mg/ml clorhidrat de dopamină; ct. × 5 f. × 10 ml ***(S)***

DOPAMINA CLORHIDRAT *SICOMED;* Sol. inj. 5 mg/ml clorhidrat de dopamină; ct. × 100 f. × 10 ml ***(S)***

Ind: Stările de șoc (cardiogen, postoperator, hipovolemic, septic, anafilactic); hTA severă; iminență de șoc sau de IR.
Dz: P.i.v. *Adult:* 100-1500 μg/min. *Copii:* 4-6 μg/kg/min. Sol. de perf. trebuie preparată imediat înainte de adm. După stabilizarea clinică, perf. de dopamină nu trebuie întreruptă brusc. Durata perfuziei depinde de condițiile individuale.
Cind: Hipertiroidism, feocromocitom, glaucom cu unghi închis, adenom de prostată, tahiaritmii, fibrilație ventriculară, vasoconstricție periferică cu postsarcină crescută, astm bronșic cu hipersensibilitate la sulf.
A!: Prudență la bolnavii cu ateroscleroză sistemică, la cei cu boli vasculare și la diabetici. Simpatomimeticele figurează pe lista substanțelor dopante (este interzisă la sportivi). Prudență în cazul asocierii cu: guanetidină, IMAO, diuretice, antidepresive triciclice, anestezice, fenitoină, alcaloizi din ergot, tiamină. Prudență în timpul sarcinii.
RA: Greață, vărsături, cefalee, agitație, tremor al degetelor, simptome de angină pectorală, palpitații, creșterea TA, tulburări de ritm cardiac (tahicardie sinusală, ritmuri ectopice supraventriculare și ventriculare), creștere a presiunii telediastolice a ventriculului stâng, necroza tegumentelor, necroză paravenoasă. Risc de hemoragie gastrointestinală din cauza redistribuției fluxului sanguin.

DORNAZA ALFA

COD ATC: R05CB13

PULMOZYME® *HOFFMANN LA ROCHE;* Sol. inhal. (2,5 ml) conțin 2 500 UI (2,5 mg) de alfa-dornază ***(S)***

Ind: Fibroză chistică (pacienți cu CVF mai mare de 40% sau cu vârstă peste 5 ani).

Dz: 2500 UI, în doză unică zilnică. Pacienții peste 21 ani pot beneficia de adm. a 2 prize zilnice.
Cind: Hipersensibilitate la produs sau la constituenții săi. Mamele care alăptează.
A!: Nu trebuie amestecată în nebulizator cu alte medicamente sau soluții. Precauție la femei însărcinate.
RA: Faringită, alterarea vocii, laringită, eritem epidermic, cu sau fără prurit. La inițierea trat. funcția pulmonară se poate deteriora, iar expectorația poate crește cantitativ. Eritem cutanat, urticarie. La unii pacienți s-au dezvoltat anti-corpi anti alfa-dornază.

DORZOLAMIDUM

COD ATC: S01EC03

TRUSOPT 2% *MERCK SHARP & DOHME;* Sol. oft. 2%; ct. × 1 fl. × 15 ml ***(P-6L)***

Ind: Trat. hipertensiune oculară; glaucom cu unghi deschis; glaucom pseudo-exfoliativ și alte glaucoame secundare cu unghi deschis.
Dz: Monoterapie: o pic. de 3 ori/zi în ochiul afectat (ochii afectați). Terapie complementară: o pic. de 2 ori/zi în ochiul afectat (ochii afectați).
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului.
A!: Precauție la pacienți cu afectare renală severă; pacienți cu glaucom cauzat de închiderea acută a unghiului; pacienți cu afectare hepatică. Dacă apar semnele unor reacții severe de hipersensibilitate sau reacții adverse locale oculare (conjunctivite, reacții palpebrale) trebuie întreruptă adm. medicamentului. Nu este recomandată adm. concomitentă cu alți inhibitori ai anhidrazei carbonice. Prudență la femei însărcinate sau care alăptează.
RA: Gust amar, arzător sau usturător, greață, vedere neclară, lăcrimare, cefalee, conjunctivită, iritarea pleoapei și astenie. Iridociclita și rash-ul au fost raportate rareori. A fost raportat un caz de litiază renală.

DOXAZOSINUM

COD ATC: C02CA04
G04CAN1

CARDURA *PFIZER INT. CORPORATION;* Cpr. 1 mg sau 2 mg doxazosină; ct. × 3 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

CARDURA XL 4 mg, 8 mg *PFIZER INT. CORPORATION;* Cpr. cu elib. prel. 4 mg, 8 mg doxazosină; ct. × 2 blist. × 14 cpr. elib. prel. ***(P-6L)***

DOZASIN® 1 mg, 2 mg, 3 mg *PROMEDIC SRL;* Cpr. 1 mg, 2 mg, 3 mg doxazosină; ct. × 3 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

KAMIREN® *KRKA d.d.;* Cpr. 1 mg, 2 mg sau 4 mg doxazosină; ct. × 2 blist. × 10 cpr.; ct. × 3 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

MAGUROL *MEDOCHEMIE Ltd;* Cpr. 1 mg, 2 mg sau 4 mg doxazosină; ct. × 2 blist. × 7 cpr. ***(P-6L)***

ZOXON 1 *LECIVA;* Cpr. 1 mg doxazosină; ct. × 1 blist. × 15 cpr.; ct. × 2 blist. × 15 cpr. ***(P-6L)***

ZOXON 2 *LECIVA;* Cpr. 2 mg doxazosină; ct. × 1 blist. × 10 cpr.; ct. × 3 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

ZOXON 4 *LECIVA;* Cpr. 4 mg doxazosină; ct. × 3 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

Ind: HTA. Hipertrofia benignă de prostată.
Dz: Oral. HTA: 1-16 mg/zi. Hipertrofia benignă de prostată: 2-4 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la chinazoline.
A!: Precauție la pacienții cu IH. Prudență în timpul sarcinii sau lactației; la șoferi și persoane cu activități de precizie.
RA: Amețeală, cefalee, oboseală, greață, vertij, edem, astenie, somnolență, rinită, tulburări gastrice (dureri abdominale, diaree și vărsături), agitație, tremor, incontinență urinară, priapism și impotență, reacții alergice, epistaxis, tahicardie, palpitații, durere toracică, angor, IM, accidente cerebrovasculare, aritmii cardiace, privire încețoșată.

DOXEPINUM

COD ATC: N06AA12

DOXEPIN 25 mg *TERAPIA SA;* Dj. 25 mg; ct. × 3 blist. × 10 dj. ***(P-RF)***

Ind: Sindroame depresive cu componentă anxioasă; psihoze/nevroze endogene sau de involuție; stare depresivă postpartum sau în sindromul de abstinență la alcool, sedative sau hipnotice; afecțiuni somatice însoțite de anxietate; psihoză maniaco-depresivă.
Dz: 75-150 mg/zi; max. 300 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la doxepină, glaucom cu unghi îngust, retenție urinară, IH gravă, copii sub 12 ani. Asocierea cu IMAO. Perioada de alăptare.
A!: Pacienții depresivi vor fi supravegheați îndeaproape în perioada de început a trat. (risc crescut de suicid). Prudență la vârstnici, epileptici, cei cu IM recent, hipertiroidism, afecțiuni hepatice și intercurente. În timpul trat. nu se consumă băuturi alcoolice! Prudență în cazul asocierii cu: hipnotice, tranchilizante, guanetidină, clonidină, alte antidepresive, anticolinergice, simpatomimetice directe, hormoni tiroidieni, anestezice, cimetidină. Prudență în perioada de sarcină; la șoferi și persoane cu activități de precizie.
RA: *Anticolinergice:* uscăciunea gurii, tulburări de vedere, constipație, transpirație, retenție urinară. *Cardiovasculare:* hTA sau HTA, tahicardie, aritmii. *Gastrointestinale:* greață, vomă, indigestie, tulburări gustative, diaree, anorexie. *Endocrine:* tulburări ale libidoului, ginecomastie, tumefacția sânilor și galactoree la femei, scăderea glicemiei. *SNC:* amețeală, confuzie, dezorientare, halucinații, parestezie, ataxie, tulburări extrapiramidale, tremor, convulsii. *Hematologice:* eozinofilie, leucopenie, agranulocitoză, trombocitopenie, purpură. *Alergice:* prurit cutanat, edem facial, fotosensibilitate, erupție.

DOXORUBICINUM

COD ATC: L01DB01

ADRIBLASTINA CS 10 mg *PHARMACIA - Membru al Grupului PFIZER;* Sol. inj. 2 mg/ml clorhidrat de doxorubicină; ct. × 1 fl. × 5 ml ***(S)***

ADRIBLASTINA CS 50 mg *PHARMACIA - Membru al Grupului PFIZER;* Sol. inj. 2 mg/ml clorhidrat de doxorubicină; ct. × 1 fl. × 5 ml ***(S)***

ADRIBLASTINA PFS *PHARMACIA - Membru al Grupului PFIZER;* Sol. inj. 2 mg/ml clorhidrat de doxorubicină; ct. × 1 fl. × 5 ml ***(S)***

ADRIBLASTINA PFS *PHARMACIA - Membru al Grupului PFIZER;* Sol. inj. 2 mg/ml clorhidrat de doxorubicină; ct. × 1 fl. × 25 ml ***(S)***

ADRIBLASTINA RD *PHARMACIA - Membru al Grupului PFIZER;* Liof. pt. sol. inj. 10 mg clorhidrat de doxorubicină; ct. × 1 f. liof. + 1 f. solv. × 5 ml ***(S)***

ADRIBLASTINA RD *SINDAN SRL;* Liof. pt. sol. inj. 10 mg clorhidrat de doxorubicină; ct. × 1 f. liof. ***(S)***

ADRIBLASTINA RD *PHARMACIA - Membru al Grupului PFIZER;* Liof. pt. sol. inj. 50 mg clorhidrat de doxorubicină; ct. × 1 f. liof. ***(S)***

ADRIBLASTINA RD 50 mg *SINDAN SRL;* Liof. pt. sol. inj. 50 mg clorhidrat de doxorubicină; ct. × 1 f. liof. ***(S)***

ADRIBLASTINA® PFS 10 mg/5 ml *SINDAN SRL;* Sol. inj. 2 mg/ml clorhidrat de doxorubicină; ct. × 1 fl. × 5 ml ***(S)***

ADRIBLASTINA® PFS 50 mg/25 ml *SINDAN SRL;* Sol. inj. 2 mg/ml clorhidrat de doxorubicină; ct. × 1 fl. × 25 ml ***(S)***

CAELYX *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Conc. pt. sol. perf. 2 mg/ml clorhidrat de doxorubicină; ct. × 1 fl. × 10 ml; ct. × 1 fl. × 25 ml; ct. × 10 fl. × 10 ml; ct. × 10 fl. × 25 ml ***(S)***

DOXOLEM *LEMERY SA;* Liof. pt. sol. inj. 10 mg clorhidrat de doxorubicină; ct. × 1 f. liof. + 1 f. solv. × 5 ml ***(S)***

DOXOLEM *LEMERY SA;* Liof. pt. sol. inj. 50 mg clorhidrat de doxorubicină; ct. × 1 f. liof. ***(S)***

DOXORUBICIN "EBEWE" *EBEWE PHARMA;* Conc. pt. perf. 10 mg clorhidrat de doxorubicină; ct. × 1 fl. × 5 ml ***(S)***

DOXORUBICIN "EBEWE" *EBEWE PHARMA;* Conc. pt. perf. 50 mg clorhidrat de doxorubicină; ct. × 1 fl. × 25 ml ***(S)***

DOXORUBICIN TEVA *TEVA;* Liof. pt. sol. inj. 10 mq clorhidrat de doxorubicină: ct. × 1 fl. pulb. ***(S)***

SINDROXOCIN® 10 mg *SINDAN SRL;* Liof. pt. sol. perf. 10 mg clorhidrat de doxorubicină; ct. × 1 fl. liof. ***(S)***

SINDROXOCIN® 50 mg *SINDAN SRL;* Liof. pt. sol. perf. 50 mg clorhidrat de doxorubicină; ct. × 1 fl. liof. ***(S)***

Ind: Leucemie limfoblastică, leucemie mieloblastică acută, tumora Wilms, neuroblastom, osteosarcoame și sarcoame ale țesuturilor moi, carcinom de sân, pulmonar, carcinomul vezicii biliare, carcinom tiroidian, limfoame Hodgkin și non-Hodgkin, carcinomul bronșic cu celule mici și carcinomul gastric. Adm. intravezical este eficientă în tumorile vezicale superficiale. Este eficientă în cancerul ovarian în stadiu avansat, cancer de sân metastatic, sarcomul Kaposi corelat cu SIDA. Puțin eficace în: melanomul malign, cancerul renal, cancerul intestinului gros, tumorile cerebrale și metastazele de la nivelul SNC.

Dz: Adm. i.v. În monoterapie: *adulți:* 60-75 mg/m^2 la 21 de zile. *Copii:* 30 mg/m^2/zi trei zile consecutiv, repetată la 4 săpt. Doza cumulativă max.: 550 mg/m^2. Asociat cu agenți chimioterapeutici cu acțiune mielosupresivă: 25-50 mg/m^2 la 3-4 săpt.; asociat cu agenți chimioterapeutici fără acțiune mielosupresivă: 60-75 mg/m^2. La pacienții cu IH se reduce doza. Adm. intravezical: 30-50 mg/instilare, la o săpt. - o lună.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele preparatului. Sarcină și alăptare. În trat. SK-SIDA care poate fi trat. eficient prin adm. terapiei locale sau a alfa-interferonului sistemic. La pacienții cu mielosupresie severă. La pacienții trat. anterior cu doze cumulative de doxorubicină și/sau daunorubicină. Trat. local intravezical este Cind la pacienții cu tumori vezicale complicate cu obstruarea uretrală sau cu infecții ale tractului urinar.
A!: Pe perioada primei cure de trat. se impune o supraveghere atentă și frecventă a pacientului. O atenție particulară se va acorda cardiotoxicității induse de doxorubicină. Se recomandă efectuarea ECG înainte și după fiecare ciclu de tratament. Cardiomiopatia indusă de clorhidratul de doxorubicină este asociată în mod specific cu reducerea persistentă a voltajului undei QRS, prelungirea duratei intervalului sistolic și reducerea fracției de ejecție, evidențiate prin ECG sau prin angiografie cu nuclid radioactiv. Este necesară monitorizarea: nivelului plasmatic al acidului uric și a nr. elem. figurate. Adm. de doxorubicină poate să potențeze toxicitatea altei terapii anticanceroase. Înaintea începerii trat. și, eventual, în timpul acestuia, se recomandă efectuarea de examene de laborator de rutină pentru a controla funcția hepatică. În cazul adm. intravezicale, se recomandă spălarea atentă a regiunilor periuretrale fie în cursul adm., fie după evacuarea soluției medicamentoase din vezică. Nu se adm. în aceeași seringă cu heparină sau cu 5-Fluorouracil. Toxicitatea doxorubicinei crește la asocierea cu citarabina sau ciclosporina. Cardiotoxicitatea sa este scăzută de novobiocină și strofantina K. Eficacitatea terapeutică este crescută de interferon. Fenobarbitalul reduce eficacitatea doxorubicinei. Precauție la șoferi și persoane cu activități de precizie.
RA: *RA majore:* mielosupresia și cardiotoxicitatea. *Cutanate:* alopecie, hiperpigmentarea patului unghial și pliuri dermale, onicoliză. *Gastrointestinale:* grețuri, vărsături, stomatită, esofagită, ulcerații și necroza colonului, în special ale cecumului, anorexie și diaree. *Vasculare:* fleboscleroză. *Locale:* leziuni tisulare severe, inclusiv necroza. *Reacții de hipersensibilitate:* febră, frison, urticarie, șoc anafilactic. Rar, conjunctivite și lăcrimare. În cazul adm. intravezicale pot apărea: hematurie, arsuri sau înțepături uretrale și vezicale, disurie, polakiurie.

DOXYCYCLINUM

COD ATC: J01AA02

DOXICICLINA *ARENA GROUP SA;* Cps. 100 mg doxiciclină; ct. × 1 fl. × 20 cps. ***(P-RF)***; ct. × 1 fl. × 500 cps; ct. × 1 fl. × 1000 cps. ***(S)***

DOXICICLINA *EUROPHARM SA;* Cps. 100 mg doxiciclină; ct. × 1 blist. × 10 cps. ***(P-RF)***; ct. × 50 blist. × 10 cps. ***(S)***

DOXICICLINĂ *LEK PHARMATECH;* Cps. 100 mg doxiciclină; ct. × 1 blist. × 10 cps. ***(P-RF)***; ct. × 100 blist. × 10 cps. ***(S)***

DOXICICLINĂ *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cps. 100 mg doxiciclină; ct. × 1 blist. × 10 cps. ***(P-RF)***; ct. × 100 blist. × 10 cps. ***(S)***

DOXYDAR *DAR AL DAWA;* Cps. 100 mg doxiciclină; ct. × 1 blist. × 8 cps. ***(P-RF)***

REMICYN *REMEDICA;* Cpr. film. doxiciclină 100 mg; ct. × 1 blist. × 10 cps. ***(P-RF)***; ct. × 100 blist. × 10 cps. ***(S)***

UNIDOX SOLUTAB *YAMANOUCHI EUROPE B.V.;* Cpr. disp. 100 mg doxicilină; ct. × 1 blist. × 10 cpr. disp. ***(P-RF)***

VIBRAMYCIN® *PFIZER;* Cps. doxiciclină 100 mg; ct. × 1 blist. × 10 cps. ***(P-RF)***

Ind: Infecții produse de microorganisme sensibile: Rickettsii, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia trachomatis, Calymmatobacterium granulomatis, Borrelia recurrentis și B. duttoni, Ureaplasma urealyticum, Plasmodium falciparum; microorganisme gram-negativ: Haemophilus ducreyi, Yersinia pestis, Francisella tularensis, Bartonella bacilliformis, Bacteroides sp., Fusobacterium sp., Campylobacter fetus, Brucella. Se recomandă testarea sensibilității. Este indicată în trat. infecțiilor determinate de următoarele microorganisme gram-negativ, atunci când testarea bacteriologică indică o sensibilitate adecvată la antibiotic: Neisseria gonorrhoeae, Vibrio cholerae, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Shigella sp., Acinetobacter sp., Haemophilus influenzae, specii de Klebsiella, Branhamella catarrhalis. Este indicată în trat. infecțiilor determinate de următoarele microorganisme grampozitiv, atunci când antibiograma indică o sensibilitate adecvată: Streptococcus sp., Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus. Când este Cind penicilina, doxiciclina constituie o alternativă pentru trat. infecțiilor determinate de: Treponema pallidum și treponema pertenue, Listeria monocytogenes, Clostridium sp., Bacillus anthracis, Leptotrichia buccalis, Actinomyces sp. Pt. profilaxia și trat. leptospirozelor; holerei. Este indicată în profilaxia următoarelor afecțiuni: Tifos tsutsugamushi; diareea călătorilor; malarie.

Dz: Int. *Adulți:* 200 mg în prima zi de trat. (adm. ca doză unică sau câte 100 mg la 12 ore), urmată de doze de întreținere de 100 mg o dată pe zi. În cazul infecțiilor severe, se adm. 200 mg/zi pe tot parcursul perioadei de trat. *Copii cu vârsta peste 8 ani; cu greutatea < 50 kg:* 4 mg/kg în prima zi de trat., iar în zilele următoare 2 mg/kg o dată pe zi. Pentru infecții severe se poate adm. max. 4 mg/kg. *Copii cu greutate peste 50 kg* poate fi adm. doza uzuală a adultului. Trat. trebuie continuat cel puțin 24-48 h după dispariția simptomelor și febrei.

Cind: Hipersensibilitate la doxiciclină sau alte tetracicline. Copii mai mici de 8 ani. Sarcină, începând cu luna a 2-a; alăptare. Este Cind asocierea cu penicilină; antiacide cu aluminiu, calciu sau magneziu, preparate de fer și săruri de bismut.

A!: Folosirea în timpul dezvoltării dentiției poate produce colorarea permanentă a dinților. S-a observat o diminuare a ratei de creștere a peroneului la prematurii care au primit oral tetraciclină. Pacienții care se expun direct la lumina solară sau la radiații UV trebuie avertizați că pot surveni reacții de fotosensibilizare. Dezvoltarea exagerată a microorganismelor rezistente. În trat. de lungă durată, se impune efectuarea investigațiilor hematologice, renale și hepatice. Precauție în cazul asocierii cu: anticoagulante, alcool, barbiturice, carbamazepină, fenitoină, metoxifluran.

RA: Gastrointestinale: anorexie, greață, vărsături, diaree, glosită, disfagie, enterocolită, leziuni inflamatorii în regiunea anogenitală (candidoză), disfuncție hepatică, esofagită, ulcerații esofagiene. Cutanate: erupții cutanate maculopapulare și eritematoase; reacții de fotosensibilizare. Toxicitate renală: creșterea ureei plasmatice. Reacții de hipersensibilitate: urticarie, edem angioneurotic, anafilaxie, purpură anafilactoidă, boala serului, pericardită și exacerbarea LES. Bombarea fontanelei la sugari și hipertensiune intracraniană benignă la adulți. Hematologice: anemie hemolitică, trombocitopenie, neutropenie și eozinofilie. Modificări microscopice ale culorii glandei tiroide (negru-maro), fără modificarea funcției tiroidiene.

DROTAVERINUM

COD ATC: A03AD02

NO-SPA® *CHINOIN PHARMA AND CHEM. WORKS;* Cpr. 40 mg clorhidrat de drotaverină; ct. 1 blist. × 20 cpr. ***(OTC)***

NO-SPA® *CHINOIN PHARMA AND CHEM. WORKS;* Sol. inj. 20 mg/ml clorhidrat de drotaverină; ct. × 5 f. × 2 ml; ct. × 25 f. × 2 ml ***(P-RF)***

NO-SPA® FORTE *CHINOIN PHARMA AND CHEM. WORKS;* Cpr. 80 mg clorhidrat de drotaverină; ct. 1 blist. × 10 cpr., ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(OTC)***

NO-SPA® FORTE *CHINOIN PHARMA AND CHEM. WORKS;* Sol. inj. 20 mg/ml clorhidrat de drotaverină; ct. × 1 suport × 5 f. × 4 ml; ct. × 5 suporturi × 5 f. × 4 ml ***(P-RF)***

Ind: Ca antispastic în: spasme ale musculaturii netede a căilor biliare sau ale musculaturii netede a tractului urinar. Ca trat. adjuvant în: ulcerul gastric sau duodenal, gastrită, enterită, colită, spasme ale sfincterelor cardia și piloric; sindromul de intestin iritabil, constipație spastică sau meteorism, pancreatită; dismenoree, anexită, dureri intense în timpul travaliului, contracții tetanice uterine, iminență de avort.
Dz: Adm. int. *Adulți:* 120-240 mg/zi, fracționat în 2-3 prize. *Copii: între 1-6 ani:* 40-120 mg/zi, fracționat în 2-3 prize; *peste 6 ani:* 80-200 mg/zi, fracționat în 2-5 prize. Adm. inj.: 40-80 mg, inj. s.c. sau i.m. de 1-3 ori/zi. În caz de colică litiazică acută renală și/sau biliară se inj. 40-80 mg i.v. lent (în 30 de secunde).
Cind: IH, IR, IC severă, BAV de gr. II sau III. Șofatul sau folosirea utilajelor este Cind timp de o oră după adm. i.v.
A!: În cazul adm. i.v. pacienții trebuie să se afle în poziție culcată. La pacienții cu intoleranță la lactoză, cpr. pot provoca tulburări gastrointestinale. Prudență în cazul asocierii cu levodopa. Precauție în timpul sarcinii și al alăptării.
RA: Cefalee, vertij, palpitații, greață; hTA după adm. i.v.

DROTRECOGINUM ALPHA

COD ATC: B01AD10

XIGRIS® *ELI LILLY;* Liof. pt. sol. perf. 5 mg drotrecogin alfa (activat); ct. × 1 fl. liof. × 5 mg ***(S)***

XIGRIS® *ELI LILLY;* Liof. pt. sol. perf. 20 mg drotrecogin alfa (activat); ct. × 1 fl. liof. × 20 mg ***(S)***

Ind: Reducerea mortalității pacienților adulți cu sepsis sever (sepsis asociat cu disfuncție acută de organ) care au un risc mare de deces. Eficacitatea nu a fost stabilită la pacienții adulți cu sepsis sever și risc de deces mai mic. Siguranța și eficacitatea nu au fost stabilite la copii cu sepsis sever.

Dz: p.i.v. cu viteza de 24 µg/kg/oră timp de 96 h. Dacă adm. este întreruptă, se readministrează cu aceeași viteza de perfuzie, de 24 µg/kg/oră. Nu se recomandă creșterea dozei sau adm. i.v. rapidă in bolus. Prep. și adm. se face aseptic.

Cind: Hemoragie internă activă; accident vascular hemoragic recent; int. chir. recentă intracraniană sau medulară sau traumatism cranian sever; traumatism cu risc crescut hemoragic; prezența unui cateter epidural; neoplasm sau masă lezională intracraniană sau semne de hernie cerebrală. Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului.

A!: Fiecare pacient trebuie evaluat din punct de vedere al raportului beneficiu/risc. La cei cu sepsis sever care suferă de una sau mai multe din următoarele condiții, riscul hemoragic crescut trebuie luat în considerare cu atenție atunci când se decide folosirea drotrecoginei: terapie asociată cu heparina; număr de trombocite < 30 000 × 10^6/l, chiar dacă numărul de trombocite crește după transfuzii; timp de protrombină–INR > 3; hemoragie gastrointestinală recentă (în ultimele 6 săptămâni); adm. recentă (în ultimele 3 zile) a unei terapii trombolitice, de anticoagulante orale sau de inhibitori GP IIb/IIIa, de acid acetilsalicilic > 650 mg/zi sau de alte antiagregante plachetare; AVC recent (în ultimele 3 luni); malformație sau anevrism intracranian; diateză hemoragică cunoscută; hepatopatie cronică severă; orice condiție în care hemoragia constituie un pericol semnificativ sau ar fi deosebit de dificil de tratat din cauza localizării. Dacă apare o hemoragie semnificativă clinic, se va întrerupe imediat adm. Continuarea utilizării altor agenți care afectează coagularea trebuie evaluată cu atenție. Adm. trebuie întreruptă cu 2 ore înainte de proceduri cu risc de hemoragie. Siguranța și eficacitatea nu au fost stabilite la copii.

RA: Evenimentele hemoragice severe au fost observate, pe parcursul perioadei de 28 de zile a studiului clinic de fază 3 (hemoragie intracraniană, orice hemoragie care a pus viața în pericol, orice eveniment hemoragic care a necesitat administrarea a > 3 unități de masă eritrocitară pe zi timp de 2 zile consecutiv sau orice eveniment hemoragic evaluat ca eveniment advers grav).

DUTASTERIDUM

COD ATC: G04CB02

AVODART® *GLAXO SMITHKLINE;* Cps. moi 0,5 mg dutasteridă; ct. × un blister × 10 cps. moi, ct. × 3 blistere × 10 cps. moi, ct. × 9 blistere × 10 cps. moi ***(P-6L)***

Ind: Tratamentul simptomelor moderate-severe ale hiperplaziei benigne de prostată (HBP).

Dz: *Adulți* (inclusiv *vârstnici*), 0,5 mg dutasteridă (o capsulă moale) oral, în priză unică. Capsulele moi trebuie înghițite întregi și pot fi administrate cu sau fără alimente. În insuficiența renală nu se preconizează reducerea dozelor (după o doză de 0,5 mg dutasteridă, concentrația în urină este mai mică de 0,1%).

Cind: Sarcină (poate inhiba dezvoltarea organelor genitale externe la fătul de sex masculin), femei în perioada sexuală activă (cantități mici de dutasteridă au fost regăsite în sperma subiecților tratați, de aceea se recomandă ca pacientul să utilizeze un prezervativ), copii și adolescenți. Pacienți cu hipersensibilitate la dutasteridă, la alți inhibitori de 5-alfa reductază sau la oricare dintre excipienții produsului. Pacienți cu insuficiență hepatică severă.
A!: La pacienți cu HBP, tușeul rectal și alte investigații pentru cancerul de prostată trebuie efectuate înainte de începerea tratamentului și periodic după aceea. Femeile, copiii și adolescenții trebuie să evite contactul cu capsulele moi care curg (în cazul contactului cu capsulele moi care curg, aria de contact trebuie spălată imediat cu apă și săpun). Precauții la pacienții cu insuficiență hepatică ușoară-moderată. În timpul tratamentului cu dutasteridă, trebuie evaluată atent orice creștere susținută a concentrațiilor plasmatice ale antigenului prostatic specific (APS), componentă importantă în cadrul screening-ului pentru depistarea cancerului de prostată, având în vedere inclusiv lipsa complianței la tratament. Prudență la asocierea cu verapamil, diltiazem, ritonavir, indinavir, nefazodon, itraconazol, ketoconazol.
RA: Impotență, alterarea (scăderea) libidoului, tulburări de ejaculare, ginecomastie. Incidența reacțiilor adverse scade în timp.

DYDROGESTERONUM *COD ATC: G03DB01*

DUPHASTON® *SOLVAY PHARMACEUTICALS;* Cpr. film. 10 mg didrogesteronă; ct. × 1 blist. × 20 cpr. film. ***(P-RF)***

Ind: Deficit endogen de progesteron (tulburări menstruale, endometrioză, sindrom premenstrual, infertilitate și avort habitual, terapie de substituție hormonală).
Dz: *Dismenoree*: 10 mg, de 2 ori/zi, din ziua 5 până în ziua 25 a ciclului; *Endometrioză:* 10 mg, de 2-3 ori/zi, din ziua 5 până în ziua 25 a ciclului, sau continuu; *Amenoree secundară*: un estrogen, o dată/zi, din ziua 1 până în ziua 25 a ciclului, asociat cu 10 mg didrogesteronă, de 2 ori/zi, din ziua 11 până în ziua 25 a ciclului; *Hemoragie uterină disfuncțională*: pentru oprirea hemoragiei: 10 mg, de 2 ori/zi, împreună cu un estrogen, o dată pe zi, 5-7 zile; pentru a preveni hemoragia: un estrogen, o dată/zi, pe toată durata ciclului, asociat cu 10 mg didrogesteronă, de 2 ori/zi, din ziua 11 până în ziua 25 a ciclului; *Sindrom premenstrual:* 10 mg, de 2 ori/zi, din ziua 11 până în ziua 25 a ciclului; *Infertilitate cauzată de insuficiența luteală*: amenințare de avort: 40 mg o dată, apoi 10 mg la 8 ore, până la dispariția simptomelor; *Avort habitual:* 10 mg, de 2 ori/zi, până în săpt. a 20-a de sarcină; infertilitate: 10 mg, de 2 ori/zi, din ziua 11 până în ziua 25 a ciclului; *Trat. de substituție hormonală menopauză/postmenopauză:* asociat cu terapie estrogenică continuă: 10-20 mg didrogesteronă, zilnic, în ultimele 12-14 zile ale fiecărui ciclu de 28 zile; în combinație cu terapie estrogenică ciclică: 10-20 mg didrogesteronă, zilnic, în ultimele 12-14 zile ale ciclului de terapie estrogenică.
Cind: Hipersensibilitate față de unul dintre constituenții medicamentului.
RA: Sângerare de privație.

E

ECONAZOLUM

COD ATC: G01AF05

ECOMI *GEYMONAT SpA;* Ovule 150 mg ***(P-RF)***

ECON *I&I EXIM VIVA FARM SRL;* Ovule 150 mg ***(P-RF)***

Ind: Antimicotic (dermatofiți, drojdii, ciuperci, în special Candida albicans), bactericid (bacili și coci grampozitivi), infecții și suprainfecții vaginale primare și secundare, sensibile la chimioterapie.
Dz: 1 ovul/zi, timp de 3 zile; în caz de recidivă, se adm. a doua cură de 3 zile.
Cind: Hipersensibilitate la econazol.
A!: Prudență în sarcină și alăptare.
RA: Iritații, iritații vaginale, crampe pelviene.

EFAVIRENZUM

COD ATC: J05AG03

STOCRIN™ *MERCK SHARP & DOHME;* Cps. 50 mg, 100 mg sau 200 mg ***(S/P-RF)***

STOCRIN *MERCK SHARP & DOHME;* Cpr. film. 300 mg sau 600 mg

STOCRIN 30 mg/ml *MERCK SHARP & DOHME;* Sol. orală 30 mg/ml ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. antiviral asociat al adulților, adolescenților și copiilor de 3 ani și peste, infectați cu HIV-1.
Dz: *Terapie antiretrovirală concomitentă: Adulți:* 600 mg o dată pe zi, oral. *Adolescenți și copii (3-17 ani):* doza variază între 200-600 mg.
Cind: Hipersensibilitate semnificativă clinic la substanța activă sau la oricare dintre excipienți; IH severă; adm. concomitentă cu terfenadină, astemizol, cisapridă, midazolam sau triazolam.
A!: În monoterapie rezistența virală se dezvoltă rapid; nu previne riscul de transmitere a HIV prin contact sexual sau prin contaminare cu sânge; erupții cutanate ușoare - moderate; prudență la pacienții cu afecțiuni hepatice ușoare - moderate; IR; copii sub 3 ani sau cu greutate corporală mai mică de 13 kg; sarcina și alăptarea.
RA: Erupții cutanate, amețeli, grețuri, cefalee, astenie, reacții alergice, afectarea coordonării, ataxie, confuzie, stupoare, vertij, vărsături, diaree, hepatită, concentrare deficitară, insomnie, anxietate, tulburări ale perioadei de somn cu visuri, somnolență, depresie, tulburări de gândire, agitație, amnezie, delir, labilitate emoțională, euforie, halucinații și tulburări psihotice, erupții cutanate, amețeli, tulburări de concentrare și coșmaruri.

EMEDASTINUM

COD ATC: S01GX06

EMADINE *ALCON SRL;* Sol. oft. 0,5 mg/ml (1 ml sol. oft. conține difumarat de emedastină 0,884 mg echivalent cu 0,5 mg emedastină) ***(P-6L)***

Ind: Trat. simptomatic al conjunctivitelor alergice sezoniere.
Dz: 1 pic. se instilează de două ori/zi în sacul conjunctival al ochiului/ochilor afectat(i).
Cind: Hipersensibilitate la emedastină sau la oricare dintre componenții produsului.
A!: Prudență la vârstnici, IR, IH, lentile de contact, sarcină și alăptare, șoferi și activități de precizie.
RA: Disconfortul ocular, ochi uscat, hiperemie oculară, prurit ocular, vedere încețoșată, pătarea corneei, lăcrimare, edemul pleoapelor, senzație de corp străin, conjunctivită, keratită, infiltrate, orjelet, cruste ale marginii pleoapelor, oboseală oculară, iritație oculară, scăderea acuității vizuale, senzație de ochi lipicios, secreție oculară, edem conjunctival, rănire accidentală și fotofobie, cefalee și rinită, simptome de răceală (guturai), dureri, inclusiv dureri de spate.

EMEPRONII BROMIDUM

COD ATC: G04BD01

CISRELAX *GALENIKA ad;* Cpr. film. 200 mg ***(P-RF)***

Ind: Polakiurie sau incontinență urinară; polakiurie și tenesme în cursul cistitei acute sau cronice.
Dz: 600-1200 mg/zi, repartizate în 3 prize; incontinență urinară, polakiurie nocturnă 200-800 mg înainte de culcare.
Cind: Stadii avansate ale hipertrofiei de prostată, cu vezică urinară atonă și cantitate mare de urină reziduală, atonie gastrică.
A!: Prudență în glaucom, ileus, în cursul hemoragiilor digestive, pilorospasm, obstrucții la nivelul tractului urinar inferior, sarcină și alăptare.
RA: Rar, senzație de gură uscată, tulburări de acomodare și tahicardie.

ENALAPRILUM

COD ATC: C09AA02

EDNYT *GEDEON RICHTER Ltd;* Cpr.: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, sau 20 mg maleat de enalapril ***(P-6L)***

ENALAP *E.I.P.I.C.O.;* Cpr. 10 mg enalapril maleat ***(P-6L)***

ENALAPRIL 5 mg; ENALAPRIL 10 mg; ENALAPRIL 20 mg *MAGISTRA C&C;* Cpr. 5 mg, 10 mg sau 20 mg maleat de enalapril ***(P-6L)***

ENALAPRIL 5 mg; ENALAPRIL 10 mg; ENALAPRIL 20 mg *LEK PHARMACEUTICALS*; Cpr. 5 mg, 10 mg sau 20 mg maleat de enalapril ***(S/P-6L)***

ENALAPRIL 5 mg, ENALAPRIL 10 mg; ENALAPRIL 20 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. 10 mg, 20 mg maleat de enalapril ***(S/P-6L)***

ENALAPRIL 10 mg *SINTOFARM SA în colaborare cu POLFA;* Cpr. 10 mg ***(P-6L)***

ENALAPRIL ***10 mg*** *FABIOL SA;* Cpr. 10 mg ***(P-6L)***

ENALAPRIL ***20 mg*** *FABIOL SA;* Cpr. 10 mg ***(P-6L)***

ENALAPRIL 5 mg, ENALAPRIL 10 mg *OZONE LABORATORIES Ltd;* Cpr. 5 mg sau 10 mg ***(P-6L)***

ENALAPRIL 5 mg, 10 mg *LAROPHARM SRL;* Cpr. 5 mg sau 10 mg ***(P-6L)***

ENALAPRIL LACHEMA 20 *LACHEMA;* Cpr. 20 mg ***(P-6L)***

ENAP 2,5 *KRKA d.d.;* Cpr. 2,5 mg ***(P-6L)***

ENAP 5 *KRKA d.d.;* Cpr. 5 mg ***(P-6L)***

ENAP *KRKA d.d.;* Cpr. 10 mg sau 20 mg ***(P-6L)***

ENAP *KRKA d.d.;* Sol. inj. 1,25 mg/ml (f. × 1 ml) ***(S/P-RF)***

ENARENAL *POLFA;* Cpr. 10 mg maleat de enalapril ***(P-6L)***

EPHICORD *EUROPHARM SA;* Cps. 10 mg ***(S/P-6L)***

ERITRO 200 *LEK PHARMATECH;* Cpr. 200 mg; Pulb. pt. susp. orală 200 mg/5 ml **(P-RF)**

INVORIL 5 mg, INVORIL 10 mg *RANBAXY LABORATORIES Ltd;* Cpr. 5 mg sau 10 mg ***(P-6L)***

MEGAPRESS *GENEPHARM SA;* Cpr. 20 mg ***(P-6L)***

OLINAPRIL 5 mg; OLINAPRIL 10 mg; OLINAPRIL 20 mg *LEK PHARMACEUTICALS;* Cpr. 5 mg, 10 mg sau 20 mg

RENITEC *MERCK SHARP & DOHME;* Cpr. 5 mg, 10 mg sau 20 mg enalapril maleat ***(P-6L)***

TENSAPRIL® 20 mg *SICOMED SA;* Cpr. 20 mg **(P-6L**

VIMAPRIL *VIM SPECTRUM SRL;* Cpr. 10 mg ***(P-6L)***

Ind: HTA esențială, inclusiv forme maligne sau refractare; HTA cu nefropatie diabetică; HTA renovasculară (cu excepția cazurilor de stenoză de arteră renală bilaterală sau pe rinichi unic funcțional). IC congestivă; disfuncție ventriculară stângă asimptomatică sau după IMA.
Dz: *HTA esențială:* doza inițială este de 5 mg, în priză unică, zilnic; doza se poate crește, fără a depăși 40 mg/zi; doza uzuală de întreținere este de 10-20 mg/zi, fracționat în 1-2 prize. *IC congestivă:* doza inițială este de 2,5 mg pe zi în priză unică; doza se poate crește fără a depăși 40 mg/zi; doza de întreținere recomandată este de 5-20 mg/zi, în 1-2 prize. În IR dozele se adaptează în funcție de clearance-ul creatininei.
Cind: Hipersensibilitate la enalapril; edem angioneurotic provocat de un ICE în antecedente; sarcină și alăptare; stenoză de arteră renală bilaterală sau pe rinichi unic funcțional; hiperpotasemie.
A!: Prudență în hTA ortostatică; diuretice, depleție hidrosalină; IR, bolnavii dializați; vârstnici, înaintea unei intervenții chirurgicale; ateroscleroză avansată, car-

diopatie ischemică, insuficiență circulatorie cerebrală, stenoză aortică severă; pacienții imunodeprimați sau cu boli autoimune (colagenoze etc.).
RA: hTA, hTA ortostatică, tuse uscată însoțită sau nu de obstrucție nazală, edemul angioneurotic, cefalee, astenie, anorexie, greață, dureri abdominale, reacții alergice (prurit, erupții cutanate, edem angioneurotic etc.), fenomene de IR funcțională, hiperpotasemie, neutropenie, agranulocitoză, anemie aplastică.

ENFLURAMINUM *COD ATC: N01AB04*

ETHRANE *ABBOTT LABORATORIES Ltd.;* Lichid pentru vapori de inhalat, enfluran 100% ***(S)***

Ind: Inducerea și menținerea anesteziei generale (inclusiv operații cezariene), la adulți și copii.
Dz: *Inducția:* începerea inducției cu o concentrație de enfluran 0,5%, care crește treptat cu câte 0,5%, la câteva respirații. *Menținerea:* concentrații de enfluran între 0,5% și 2%. *Trezirea:* concentrația de enfluran poate fi redusă la 0,5% spre sfârșitul intervenției și adm. poate fi oprită în momentul începerii închiderii plăgii la nivelul tegumentului.
Cind: Hipersensibilitate la enfluran și la alte anestezice halogenate, icter și/sau febră inexplicabilă.
A!: Modificări electro-encefalografice, activitate motorie localizată, prudență la pacienții care din cauza unor antecedente medicale sau a unei medicații asociate, pot fi mai sensibili la efectul stimulant cortical al anestezicului, cardiaci, ușoară creștere a glicemiei, ciroză sau alte afecțiuni hepatice, sarcină, alăptare.
RA: Tresăriri musculare localizate reversibile, hTA, deprimare respiratorie, grețuri și vărsături la trezire; rar aritmii tranzitorii, frisoane, sughiț, hepatotoxicitate, hipertermie malignă.

ENOXAPARINUM (NATRICUM) *COD ATC: B01AB05*

CLEXANE *RHÔNE-POULENC RORER;* Seringă preumplută cu sol. inj. enoxaparină sodică 20 mg/0,2 ml; 40 mg/0,4 ml; 60 mg/0,6 ml; 80 mg/0,8 ml sau 100 mg/1 ml ***(P-RF)***

Ind: Profilaxia bolii tromboembolice venoase în chirurgia generală și/sau ortopedică. Profilaxia tromboembolismului venos la pacienții imobilizați la pat. Trat. trombozei venoase profunde (TVP) constituite, cu sau fără embolism pulmonar. Trat. anginei pectorale instabile și al IMA non-Q (subendocardic). Profilaxia coagulării în circuitul extracorporeal în timpul ședințelor de hemodializă.
Dz: Inj. s.c. profund în trat. profilactic și curativ; inj. în circuitul de hemodializă. Enoxaparina nu se inj. i.m. *Profilaxia trombozei venoase la pacienții chirurgicali:* 20 mg enoxaparină o dată/zi, adm. într-o singură inj. subcutanată. La pacienții cu risc tromboembolic mare doza este de 40 mg enoxaparină o dată/zi, adm. într-o singură injecție sc. În chirurgia generală prima inj. trebuie adm. cu 2 ore înainte de actul chirurgical. În chirurgia ortopedică prima inj. trebuie adm. cu 12 ore preoperator. Durata medie a trat. este de 7-10 zile. *Profilaxia trombozei venoase la pacienții cu afecțiuni medicale:* 40 mg enoxa-

parină sodică o dată pe zi, adm. într-o singură inj. sc. minimum 6, maximum 14 zile. *Trat. trombozei venoase profunde (TVP) constituite, cu sau fără embolism pulmonar:* Enoxaparina se va inj. sc. în doza unică de 1,5 mg/kg pe zi sau în doza de 1 mg/kg la fiecare 12 ore. La pacienții cu TVP complicată se recomandă doza de 1 mg/kg la fiecare 12 ore. Durata medie a trat. este de 10 zile. *Trat. anginei pectorale instabile și al infarctului miocardic non-Q:* Se inj. sc. 1 mg enoxaparină sodică/kg la fiecare 12 ore, minimum 2 zile. *Prevenirea coagulării în circuitul extracorporeal în timpul hemodializei:* 1 mg enoxaparină sodică/kg. La pacienții cu risc hemoragic doza se va reduce la 0,5 mg/kg pentru abord vascular dublu sau 0,75 mg/kg pentru abord vascular simplu.

Cind: Hipersensibilitate la enoxaparină, heparină sau alte heparine cu greutate moleculară mică: hemoragie sau risc de hemoragie legate de tulburări ale hemostazei; antecedente de trombocitopenie în cursul trat. anterioare cu enoxaparină sau cu alte heparine; afecțiuni organice cu risc de hemoragie (de ex. ulcer gastrointestinal acut); endocardită infecțioasă acută cu excepția celei localizate pe proteze valvulare mecanice.

A!: Nu se inj. i.m.; prudență la afectare renală severă; IH; rahianestezia/anestezia epidurală; proceduri de revascularizare coronariană percutană; proteze valvulare cardiace; risc hemoragic crescut; antecedente de ulcer gastro-duodenal; accident vascular cerebral (AVC) ischemic recent; HTA severă necontrolată medicamentos; retinopatie diabetică; după intervenții neuro-chirurgicale sau oftalmologice recente. Se recomandă monitorizarea trombocitelor. Sarcină și alăptare.

RA: Hemoragii; trombocitopenie; dureri, iritația pielii la locul injectării; hematoame la locul injectării; rar, rash cutanat sever la locul injectării; foarte rar noduli inflamatori duri; foarte rar reacții cutanate alergice localizate (erupție buloasă) și reacții alergice sistemice, inclusiv reacții anafilactoide; creșterea asimptomatică și reversibilă a concentrației plasmatice a unor enzime hepatice; creșterea asimptomatică și reversibilă a numărului plachetelor.

ENTACAPONUM *COD ATC: N04BX02*

COMTAM *NOVARTIS;* Cpr. film. 200 mg (fl. × 30, 60, 100 sau 500 cpr. film.) ***(S/P-RF)***

Ind: Adjuvant al medicamentelor standard conținând levodopa/benserazida sau levodopa/carbidopa pentru utilizare la pacienții cu boala Parkinson și în cazul fluctuațiilor motorii la sfârșit de doză (fenomene *end-of-dose*), ce nu pot fi stabilizate prin folosirea combinațiilor standard.

Dz: *Oral:* simultan cu fiecare doză de levodopa/carbidopa sau levodopa/benserazida. Se administrează un comprimat a 200 mg împreună cu fiecare doză de levodopa/inhibitor dopa decarboxilaza. Doza maximă recomandată este de 200 mg, de zece ori pe zi, adică 2 g entacapona. Eficacitatea preparatului entacapona ca adjuvant levodopa/inhibitor dopa al decarboxilazei cu eliberare prelungită nu a fost dovedită. Entacapona poate fi administrată cu sau fără alimente. Pentru a reduce reacțiile adverse dopaminergice provocate de levodopa, adică diskinezie, greață, vărsături și halucinații, este necesar adesea să se reducă dozele de levodopa în cursul primelor zile din prima săptămână, la începerea tratamentului cu entacaponă. În funcție de starea clinică a pacientului, doza zilnică de levodopa trebuie redusă cu aproximativ 10-30%, prin extinderea intervalului de administrare și/sau prin reducerea cantității de levodopa pe doză. Dacă tratamentul cu entacaponă se întrerupe, este necesară adaptarea dozelor celorlalte medicamente antiparkinsoniene, în special levodopa, pentru a controla suficient simptomele parkinsoniene.

Vârstnici: Nu este necesară modificarea dozelor de entacaponă la pacienții în vârstă. *Copii*: Deoarece nu a fost studiată administrarea de entacaponă la pacienții sub 18 ani, administrarea acestui produs sub această vârstă nu poate fi recomandată.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la entacaponă sau la oricare din excipienții acestui produs. *Afecțiuni hepatice:* Entacapona este contraindicată la pacienții cu feocromocitom datorită creșterii riscului crizelor de hipertensiune. Este contraindicată utilizarea concomitentă cu inhibitorii neselectivi de monoaminooxidaza (MAO-A și MAO-B) (ex. phenelzina, tranilcipriomina); de asemenea cu asociații inhibitor selectiv – inhibitor neselectiv. Entacopona poate fi folosită împreună cu selegilina (inhibitor selectiv de MAO-B), dar doza de selegilină nu trebuie să depășească 10 mg. Sindrom neuroleptic malign (SNM) și/sau rabdomioliză netraumatică în antecedente.

A!: Deoarece SNM a fost semnalat rareori la pacienți cu boala Parkinson când tratamentul dopaminergic a fost întrerupt brusc, se recomandă atenție deosebită și în cazul întreruperii bruște a tratamentului cu entacapona. Când este necesar, întreruperea tratamentului cu entacapona trebuie făcută lent; dacă apar semne sau simptome nedorite, în această situație se impune o creștere a dozei de levodopa. Entacapona poate agrava hipotensiunea ortostatică produsă de levodopa.

Nu se recomandă utilizarea de entacaponă în cursul sarcinii. Entacapona se excretă prin lapte. Nu este cunoscută siguranța privind administrarea produsului la copii. Femeia nu trebuie să alăpteze în perioada tratamentului cu entacaponă.

Poate provoca vertij și hipotensiune ortostatică, de aceea conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor se vor face cu precauție.

RA: Cele mai frecvente reacții adverse provocate de entacaponă sunt datorate creșterii activității dopaminergice și se întâlnesc mai ales la începutul tratamentului. Reducerea dozei de levodopa scade severitatea și frecvența acestor reacții.

Simptome mai frecvente: greață, vărsături, dureri abdominale, constipație și/sau diaree. Urina se poate colora în roșu-brun, dar acesta este un fenomen fără importanță. În general reacțiile adverse determinate de entacaponă sunt ușoare sau medii.

Alte simptome: tulburări ale sistemului nervos vegetativ, hipotensiune posturală, oboseală, transpirații abundente, cefalee, tulburări nervoase centrale și periferice, diskinezie, agravarea parkinsonului, amețeli, distonie, hiperkinezie, crampe ale membrelor inferioare, vertij, tremor; tulburări gastrointestinale: greață, diaree, dureri abdominale, gură uscată, constipație. Tulburări psihice: insomnie, halucinații, confuzie, coșmaruri.

În cursul tratamentului cu entacapona s-a raportat o ușoară scădere a hemoglobinei, eritrocitelor și hematocritului. Aceste fenomene sunt atribuite reducerii absorbției fierului la nivelul tractului gastrointestinal. În cazul tratamentului de lungă durată (6 luni) a fost observată la 1,5% din pacienți o scădere semnificativă clinic a hemoglobinei. Au fost raportate rar creșteri semnificative ale enzimelor hepatice.

EPERVUDINUM *COD ATC: D06BBN1*

HEVIZOS *BIOGAL PHARMACEUTICAL WORKS Ltd;* Ung. 0,8% (tub × 3 g sau 10 g) ***(P-RF)***

Ind: Tratamentul topic al formelor cutanate de Herpes simplex și Herpes zoster.
Dz: Aplicații locale, de două ori pe zi.

EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM *COD ATC: R03CA02*

EFEDRINĂ 50 mg *ARMEDICA SA;* Cpr. 50 mg ***(P-RF)***

EFEDRINĂ *ARENA GROUP SA;* Cpr. 50 mg ***(P-RF)***

EFEDRINĂ *SICOMED SA;* Sol. inj. 10 mg/ml sau 50 mg/ml (f. × 1 ml) ***(S)***

Ind: Congestie nazală datorată virozelor, afecțiunilor respiratorii alergice sau comune. Sinuzită, rinosinuzită.
Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* 50-60 mg de 3-4 ori/zi (maxim 250 mg/zi); *6-12 ani:* 30 mg de 3-4 ori/zi (maxim 120 mg/zi); *Sub 6 ani:* conform recomandării medicului.
Cind: Afecțiuni cardiace, HTA.; diabet; adenom prostatic; afecțiuni tiroidiene; sarcină, alăptare; interacțiuni medicamentoase cu IMAO.
RA: Nervozitate, amețeli, somnolență; creșteri ale TA; tulburări de micțiune la bolnavii cu afecțiuni de prostată.

EPINEPHRINUM *COD ATC: C01CA24*

ADRENALINĂ *TERAPIA SA;* Sol. inj. 1‰ (f. × 1 ml) ***(S)***

Ind: Șoc anafilactic, alte reacții anafilactice acute sistemice, angioedem laringean; stop cardiac, hemoragii capilare de suprafață (în aplicație locală), se asociază anestezicelor locale vasodilatatoare pentru a le prelungi acțiunea și a le diminua toxicitatea generală; criza de astm bronșic.
Dz: *Astm bronșic,* inj. sc. 0,3 mg, eventual repetat la 20 de minute (cel mult 2-3 doze); *șoc anafilactic,* i.v. lent 0,1-0,5 mg, sau sc. 0,3-0,5 mg la fiecare 10-20 minute; *sincopa cardiacă,* i.v. lent 0,5-1 mg, eventual repetat după 5-15 minute; *hemostatic,* în aplicații locale, sol. 1/100 000-1/2 000, asociată anestezicelor locale, în sol. 1/200 000-1/20 000.
Cind: HTA, bolile miocardice, cardiopatia ischemică, tahicardia și aritmiile ectopice, IMA, ateroscleroza avansată, cord pulmonar, hemoragii interne, hipertiroidismul, feocromocitomul, glaucomul cu unghi îngust, adenomul de prostată cu retenție de urină, IR severă, parkinsonism. Cind sunt relative în situații de urgență, care pun viața în pericol.
A!: Prudență în diabet zaharat, Basedow, tineri, bătrâni, femei la menopauză, în stări de hipercalcemie și hipokaliemie; interacțiuni medicamentoase cu ciclopropan și halotan, sarcină; inj. iv. sunt periculoase (multă prudență).

RA: Palpitații, tahicardie, aritmii ectopice, dureri anginoase, anxietate, neliniște, slăbiciune, amețeli, cefalee, parestezie în extremități, creșterea glicemiei.

EPIRUBICINUM

COD ATC: L01DB03

EPISINDAN *SINDAN SRL;* Liof. pt. sol. inj. 10 mg sau 50 mg ***(S)***

FARMORUBICIN C.S. *PHARMACIA & UPJOHN Ltd. - Membru al grupului PFIZER;* Sol. inj. 10 mg/5 ml; 50 mg/25 ml ***(S)***

FARMORUBICIN PFS *PHARMACIA & UPJOHN Ltd. - Membru al grupului PFIZER;* Sol. inj. 2 mg/ml (fl. × 5 ml sau fl. × 25 ml) ***(S)***

FARMORUBICIN RD *PHARMACIA & UPJOHN Ltd. - Membru al grupului PFIZER;* Pulb. pt. sol. inj. 10 mg sau 50 mg ***(S)***

FARMORUBICIN RD *SINDAN SRL;* Liof. pt. sol. inj. 10 mg sau 50 mg ***(S)***

FARMORUBICIN® PFS 10 mg/5 ml *SINDAN SRL;* Sol. inj. 2 mg/ml (fl. × 5 ml) ***(S)***

FARMORUBICIN® PFS 50 mg/25 ml *SINDAN SRL;* Sol. inj. 2 mg/ml (fl. × 25 ml) ***(S)***

PHARMARUBICIN C.S. *PHARMACIA & UPJOHN Ltd.- Membru al grupului PFIZER;* Sol. inj. 2 mg/ml (fl. × 5 ml sau fl. × 25 ml) ***(S)***

Ind: Carcinom mamar, carcinom ovarian, pulmonar, gastric, hepatic, pancreatic și carcinom sigmo-rectal, carcinom de cap și gât, limfom non-Hodgkin și boala Hodgkin, sarcom de țesut moale și oase, leucemie acută și mielom multiplu. Carcinom de vezică urinară cu celule tranziționale.
Dz: Doza în monoterapie 60-89 mg/m^2 inj. i.v. în interval de 3-5 minute, repetat la 21 zile; doze mai mici în asociere, IH.
Cind: Mielodepresie marcată, cardiaci, antecedente de suferință cardiacă, hipersensibilitatea la componentele produsului, sarcină, alăptare.
A!: Supraveghere atentă și repetată a pacientului (hemoleucograma, funcția hepatică, ECG), cardiotoxicitate, hiperuricemie.
RA: Mielodepresie, cardiotoxicitate, căderea părului, oprirea creșterii bărbii; inflamația mucoaselor (stomatită cu zone de eroziune dureroase, localizate de-a lungul marginilor laterale ale limbii și pe mucoasa sublinguală); tulburări gastrointestinale: greață, vomă, diaree; hiperpirexie. Rar anafilaxie, febră, rash și urticarie. Cazuri rare de leucemie mielogenă secundară acută, cu sau fără fază preleucemică.

EPOETINUM

COD ATC: B03XA01

EPOMAX 2 *FUMEDICA BIOTEC AG;* Sol. inj. 2.000 ui/ml (f. × 1 ml) ***(S/P-RF)***

EPOMAX 4 *FUMEDICA BIOTEC AG;* Sol. inj. 4.000 ui/ml (f. × 1 ml) ***(S/P-RF)***

Amoksiklav® 2x
amoxicilină și acid clavulanic

Calitatea care îți dă încredere

Amoksiklav® 2x

- ☐ **Risc scăzut de dezvoltare a rezistenței bacteriene**
- ☐ **Spectru antibacterian larg**
- ☐ **Multiple indicații clinice**
- ☐ **Complianță excelentă**

GARANȚIA
APROBAT FDA
CALITĂȚII

lek
o nouă companie Sandoz

Lek Pharmaceuticals d.d. reprezentat în România de Lek PharmaTech SRL
Calea 13 Septembrie nr. 90, București, Tel: 021 403 4558, Fax: 021 403 4569

Flonidan®
loratadină

soluția...



...pentru a ține alergia sub control

- Acționează rapid și eficient de la prima administrare
- Nu are efect sedativ
- Acționează la nivelul tuturor etapelor procesului inflamator de tip alergic
- Indicat pentru toate vârstele (de la 1 an)

lek
o nouă companie Sandoz

Lek Pharmaceuticals d.d. reprezentat în România de Lek PharmaTech SRL, Calea 13 Septembrie, nr. [illegible], București, Tel [illegible]

Lekoklar®

CLARITROMICINĂ

Comprimate de 250 mg
și 500 mg

O lovitură
de maestru

Eficiența
face diferența

- Antibioticul tipic pentru infecțiile cu germeni atipici
- Terapia antiinfecțioasă cea mai sigură și eficientă pentru pacienții alergici la betalactamine
- Standardul de aur al eradicării Helicobacter pylori

lek
o nouă companie Sandoz

Lek Pharmaceuticals d.d. reprezentat în România de Lek PharmaTech SRL
Calea 13 Septembrie nr. 90, București, Tel: 021 403 4558, Fax: 021 403 4569

Ortanol®

omeprazol

capsule a 20 mg x 14/flacon

- Calmează rapid durerile epigastrice și pirozisul
- Reduce recidivele bolii de reflux gastroesofagian, ulcerului și infecțiilor cu Helicobacter pylori
- Este tratamentul de elecție:
  - al bolii de reflux gastroesofagian
  - al ulcerului peptic
  - al infecției cu Helicobacter pylori
- Se administrează în doză unică zilnică

ORTANOL®
OMEPRAZOL
lek
Când nu-ți arde de glumă!

lek

O nouă companie Sandoz

Lek Pharmaceuticals d.d. reprezentat in Romania de LeK PharmaTech SRL, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Bucuresti, Tel 403 45 58

Ceclodyne®
cefaclor

Când forța merge mână în mână cu blândețea



Excelentă activitate in vitro, inclusiv asupra celor mai frecvenți agenți patogeni implicați în etiologia infecțiilor respiratorii;

Eficacitatea clinică excelentă datorită rezistenței sale crescute la acțiunea beta-lactamazelor;

Siguranță și tolerabilitate superioară comparativ cu alte antibiotice betalactamice asigurate de profilul farmacocinetic de excepție;

Cel mai bun **raport cost / eficiență.**

Ceclodyne®
250 mg/5 ml
Pulbere pentru Suspensie Orală
Ceclodyne® Forte 500 mg
CEFACLOR
Ceclodyne®

lek | PharmaTech

Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, București, România
Tel.: 021-403 45 50; Fax: 021-403 45 47

Axycef®
cefuroxim axetil

COMPENSAT 65%



Puterea de a învinge rezistenţa bacteriană

Eficienţă clinică dovedită

Siguranţă în administrare

Complianţă excelentă

Axycef® campion la toate probele

Tratament de primă intenție pe lista de medicamente compensate

Axycef® 500 mg comprimate acoperite
CEFUROXIMUM AXETILUM
lek
10 comprimate

lek | PharmaTech

Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, București, România
Tel.: 021-403 45 50; Fax: 021-403 45 47


Cel mai precis instrument
în eradicarea
Streptococului beta-hemolitic
de grup A

Eficacitate dovedită împotriva Streptococului beta-hemolitic de grup A

Siguranță și tolerabilitate

Complianță totală (administrare o dată pe zi)

Cexyl 250 mg
blister a 10 capsule.
Cexyl forte 500 mg
blister a 10 capsule.
Cexyl 125 mg / 5 ml
suspensie pediatrică.
Cexyl 250 mg / 5 ml
suspensie pediatrică.

lek | PharmaTech

Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, București, telefon: (021) 403.45.48, fax: (021) 403.45.47,e-mail: office@pharmatech.ro



Cuminol®
ciprofloxacină
250 mg şi 500 mg
comprimate filmate

Eficient în:

- infecţii ale tractului urinar
- infecţii ale căilor respiratorii
- infecţii ORL
- infecţii ale organelor genitale
- infecţii gastro-intestinale
- infecţii ale pielii şi ţesuturilor moi
- infecţii osteo-articulare

GEDEON RICHTER ROMÂNIA S.A.

540306 TÂRGU-MUREŞ • STR. CUZA VODĂ, NR. 99-105
TEL.: 0265 - 268.297 • FAX: 0265 - 268.875
E-MAIL: marketing@gedeon-richter.ro

bucurați-vă
de simfonia naturii

ANTIHISTAMINIC NESEDATIV

Symphoral®
loratadină

comprimate 10 mg
1 blister* 10 comprimate

sirop 1 mg/ml
flacon 120 ml sirop

indicații
- rinite alergice
- urticarie
- alte dermatoze alergice

administrare
o dată pe zi

profil de siguranță foarte bun
raport cost / eficiență avantajos

GEDEON RICHTER ROMÂNIA S.A.

540306 TÂRGU-MUREȘ • STR. CUZA VODĂ, NR. 99-105
TEL.: 0265 - 268.297 • FAX: 0265 - 268.875
E-MAIL: marketing@gedeon-richter.ro



albendazol

DUADOR®

spaima parazițilo r

comprimate 200 mg



- administrare ușoara
- foarte bine tolerat
- raport cost / eficiență optim

GEDEON RICHTER ROMÂNIA S.A.

540306 TÂRGU-MUREȘ • STR. CUZA VODĂ NR. 99-105
TEL.: 0265 - 268.297 • FAX: 0265 - 268.875
E-MAIL: marketing@gedeon-richter.ro



PORTOFOLIU de PRODUSE

GEDEON RICHTER ROMÂNIA S.A.





Comprimate

Aciclovir 200 mg / aciclovir
Acid acetilsalicilic tamponat 100 mg / acid acetilsalicilic tamponat
Acid acetilsalicilic tamponat 500 mg / acid acetilsalicilic tamponat
Anxiar® 1 mg / lorazepam
Atenolol 50 mg / atenolol
Atenolol 100 mg /atenolol
Clorzoxazon / clorzoxazon
Cordil™ 10 mg / isosorbid dinitrat
Cordil™ 20 mg / isosorbid dinitrat
Cordil™ 40 mg / isosorbid dinitrat
Cuminol® 250 mg / ciprofloxacin
Cuminol® 500 mg / ciprofloxacin
Diazepam 10 mg / diazepam
Duador® 200 mg / albendazol
Esquel® 80 mg /gliclazid
Exigan® / compus
Edulciclam® / ciclamat de sodiu
Efedrină / efedrină
Fasconal P® / compus
Fenitoin / fenitoin
Impamid® 2,5 mg / indapamid
Meguan® 500 mg / metformin
Meguan® 850 mg /metformin
Nitrazepam 5 mg / nitrazepam
Piracetam 400 mg / piracetam
Piracetam 800 mg / piracetam
Prazolex® 0,25 mg / alprazolam
Prazolex® 1 mg / alprazolam
Prednison 5 mg / prednison
Symphoral® 10 mg / loratadină
Zeplan® 10 mg / simvastatin
Zeplan® 20 mg / simvastatin

Soluții

Haloperidol 2 mg/ml / haloperidol
Iodosept® 40 g / polividon iod
Iodosept® 400 g / polividon iod
Sirofer® sirop / gluconat feros
Symphoral® sirop 1mg/ml / loratadină

Unguente și creme

Aciclovir 5% / aciclovir
Biazol® 1% / bifonazol
Fenilbutazonă / fenilbutazonă
Herpestop® / moroxidin
Reviken® / compus
Unguent cu nicotinat de metil nicotinat de metil
Unguent cu sulf / compus

GEDEON RICHTER ROMÂNIA S.A.

540306 TÂRGU-MUREȘ • STR. CUZA VODĂ, NR. 99-105
TEL.: 0265 - 268.297 • FAX: 0265 - 268.875
E-MAIL: marketing@gedeon-richter.ro

Roche

Sperantele prind aripi

- Noua generație de interferon pegylat - moleculă ramificată 40KD
- Eficacitate superioară terapiei convenționale
- Posibilitatea evaluării precoce (12 săptămâni) a răspunsului la terapie
- Siguranță și tolerabilitate crescută
- Administrare simplă

PEGASYS®

peginterferon alfa-2a (40KD)

Cea mai bună sansă de vindecare a hepatitei cronice C

KYTRIL®

dministrare simplă cu un control sigur
în prevenirea
aturilor postoperatori și în terapia citostatică

- **Control pentru 24 ore**
- **Reduce riscul cefaleei severe, amețelilor, tulburărilor vizuale**
- **Potențial redus de interacțiune medicamentoasă**
- **Fără contraindicații la cardiaci**

Roche
F.Hoffmann La Roche Ltd.
Reprezentanța pentru România
Str. Cap. Av. N. Drossu nr.9, Sector 1, București
Tel: (+4021) 224.03.97 / (+4021) 224.03.98
Fax: (+4021) 224.03.99

Targeting Cancer
With Care
Roche Oncology



Solvay Pharma, [illegible] in Gastroenterologie

Durere sau
disconfort abdominal?

duspatalin®

mebeverină cu eliberare prelungită

Solvay
Pharma Romania
Str. Johann Strauss 2A, Sector 2, 020312 Bucureşti, [illegible]
Tel: +40-21 231 78 00 / 01 /02; Fax: +40-21 [illegible]
e-mail:office@solvay-pharma.ro; [illegible]

SOLVAY

Peste 30 de ani de experienţă în tratarea vertijului

betaserc®

24mg
8mg

diclorhidrat de betahistină

Preferat de Pacienţi, Preferat de Medici

Acțiune duală[1] prin care înlătură vertijul și amețeala[2] și redă siguranța de mișcare a pacienților dumneavoastră. Poate fi administrat concomitent cu orice altă medicație.

Betaserc® nu sedează, ci facilitează adaptarea vestibulară fiziologică[3].

Mod de administrare: 1 comprimat de 24mg de 2 ori pe zi sau câte 2 comprimate de 8mg de 3 ori pe zi.

1. Arrang J-M et al. Eur J Pharmacol 1985.
2. Lacour M, Sterkers O. CNS Drugs 2001; Hicks JJ et al. Arch Otolaryngol 1967.
3. Colletti V. 30th Annual Congress of the Neurootological and Equilibrometric Society (NES), Oporto, Portugal 2003.

Solvay
Pharma Romania

Solvay Pharma Romania
Str. Johann Strauss 2A, Sector 2, 020312 București, România
Tel: +40-21 231 78 90 / 91 / 92; Fax: +40 21 230 78 85;
e-mail: office@solvay-pharma.ro; http://www.solvay-pharma.ro

SOLVAY
a Passion for Progress®

EPREX 1000 *CILAG AG;* Sol. inj. 1.000 ui/ml (f. × 0,5 ml) ***(S/P-RF)***

EPREX 2000 *CILAG AG;* Sol. inj. 2.000 ui/ml (f. × 0,5 ml) ***(S/P-RF)***

EPREX 3000 *CILAG AG;* Sol. inj. 3.000 ui/ml (f. × 0,3 ml) ***(S/P-RF)***

EPREX 4000 *CILAG AG;* Sol. inj. 4.000 ui/ml (f. × 0,4 ml) ***(S/P-RF)***

EPREX 10 000 *CILAG AG;* Sol. inj. 10.000 ui/ml (f. × 1 ml) ***(S/P-RF)***

NEORECORMON 500 *HOFFMANN LA ROCHE;* 1 seringă preumplută cu 0,3 ml sol. inj. 500 ui corespunzând la 4,15 mg epoetină beta (eritropoetină umană recombinată) ***(S/P-RF)***

NEORECORMON 1000 *HOFFMANN LA ROCHE;* 1 seringă preumplută cu 0,3 ml sol. inj. 1000 ui corespunzând la 8,3 mg epoetină beta (eritropoetină umană recombinată) ***(S/P-RF)***

NEORECORMON 2000 *HOFFMANN LA ROCHE;* 1 seringă preumplută cu 0,3 ml sol. inj. 2000 ui corespunzând la 16,6 mg epoetină beta (eritropoetină umană recombinată) ***(S/P-RF)***

NEORECORMON 4000 *HOFFMANN LA ROCHE;* 1 seringă preumplută cu 0,3 ml sol. inj. 4000 ui corespunzând la 33,2 mg epoetină beta (eritropoetină umană recombinată) ***(S/P-RF)***

NEORECORMON 5000 *HOFFMANN LA ROCHE;* 1 seringă preumplută cu 0,3 ml sol. inj. 5000 ui corespunzând la 41,5 mg epoetină beta (eritropoetină umană recombinată) ***(S/P-RF)***

NEORECORMON 10 000 *HOFFMANN LA ROCHE;* 1 seringă preumplută cu 0,6 ml sol. inj. 10000 ui corespunzând la 83 mg epoetină beta (eritropoetină umană recombinată) ***(S/P-RF)***

RECORMON NEU 1000 ie *HOFFMANN LA ROCHE;* Pulb. liof. pt. sol. inj. 1000 ie ***(S/P-RF)***

RECORMON NEU 2000 ie *HOFFMANN LA ROCHE;* Pulb. liof. pt. sol. inj. 2000 ie ***(S/P-RF)***

RECORMON NEU 5000 ie *HOFFMANN LA ROCHE;* Pulb. liof. pt. sol. inj. 5000 ie ***(S/P-RF)***

RECORMON NEU 10 000 ie *HOFFMANN LA ROCHE;* Pulb. liof. pt. sol. inj. 10000 ie ***(S/P-RF)***

Ind: Anemie asociată cu IR cronică (anemie renală) la pacienți dializați; anemie renală simptomatică la pacienți care nu sunt încă supuși dializei; prevenirea anemiei datorată prematurității la nou-născuți; prevenirea și trat. anemiei la pacienți adulți cu tumori solide și tratați cu chimioterapice pe bază de platină; creșterea disponibilului de sânge autolog la pacienți planificați pentru intervenții chirurgicale care presupun transfuzii (program de predonare).
Dz: *Trat. pacienților anemici cu IR cronică* Doza inițială este de 3 × 20 UI/kg și săpt., inj. sc. sau 3 × 40 UI/kg și săpt. inj. iv., crescut la 80 UI/kg - de 3 ori/săpt. și, dacă sunt necesare creșteri ulterioare, acestea vor consta în 20 UI/ kg de 3 ori/săpt. la intervale lunare. Apoi, pentru a menține o valoare a hematocritului între 30 și 35%, doza este inițial redusă la jumătate din cea adm. anterior. *Prevenirea anemiei la prematuri:* 3 × 250 UI/kg și săpt. Trat.

trebuie să dureze 6 săpt. *Trat. pacienților cu tumori solide:* 450 UI/kg și săpt. *Trat. destinat creșterii cantității de sânge autolog:* Doza trebuie determinată de către echipa de chirurgi, individual pentru fiecare pacient, în funcție de cantitatea necesară de sânge predonat și de rezerva endogenă de celule roșii.
Cind: HTA greu controlabilă, hipersensibilitate la epoetina beta, infarct miocardic sau ictus, angină pectorală instabilă, risc de tromboză venoasă profundă.
A!: Prudență în anemie refractară cu exces de blaști în transformare, epilepsie, trombocitoză, IH cronică, deficit de acid folic și vitamină B_{12}, supraîncărcare marcată cu aluminiu, monitorizarea potasemiei și trombocitelor.
RA: HTA cu simptome de tip encefalopatie, creștere moderată, dependentă de doză, a numărului trombocitelor, tromboze ale shuntului, scădere a valorilor feritinei serice, simultan cu creșterea valorii hematocritului; rar pot să apară reacții cutanate precum rash, prurit, urticarie sau reacții la locul de injectare. În cazuri izolate s-au observat reacții anafilactoide, simptome de tip gripal precum febră, frisoane, cefalee, dureri la nivelul membrelor și/sau osoase, stare de rău.

EPROSARTANUM

COD ATC: C09CA02

TEVETEN *SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.;* Cpr. film. 200 mg, 300 mg sau 400 mg ***(P-6L)***

TEVETEN 600 *SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.;* Cpr. film. 600 mg (ct. × 2 blist. sau 4 blist. × 7 cpr. film.) ***(P-6L)***

Ind: HTA esențială (antagonist selectiv al receptorilor AT1 pentru angiotensina II), cu efect comparabil cu cel al enalaprilului.
Dz: *Oral:* înainte sau după masă. Inițial 400 mg o dată pe zi. Se poate crește la 600-800 mg/zi. Efectul maxim se obține după 2-3 săptămâni. Se poate asocia cu diuretice tiazidice sau blocanți ai canalelor de calciu. Nu necesită modificarea dozelor la vârstnici, insuf. renală sau hepatică. Nu interacționează cu digoxina, warfarina, glibenclamida, ranitidina, ketoconazolul.
Cind: Sarcină, copii.
RA: hTA.

EPTIFIBATIDUM

COD ATC: B01AC16

INTEGRILIN™ *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Sol. perf. cu 0,75 mg/ml (fl. × 100 ml); sol. inj. 2 mg/ml (fl. × 10 ml) ***(S)***

Ind: Prevenirea infarctului miocardic precoce la pacienții cu angină pectorală instabilă sau infarct miocardic non-Q; pacienții supuși intervenției coronariene percutane (PCI) pentru prevenirea ocluziei vasului coronarian tratat și a complicațiilor ischemiei cardiace acute. Eptifibatida se adm. în asociație cu acid acetilsalicilic și heparină nefracționată.
Dz: *Adulți (peste 18 ani) cu angină instabilă sau infarct miocardic non-Q:* 180 µg/kg în bolus i.v. adm. cât mai repede posibil după stabilirea diagnosticului, urmat de o perfuzie continuă cu 2 µg/kg și min, timp de până la 72 de ore, sau până la inițierea pontajului chirurgical aortocoronarian (CABG), sau

până la externare. Dacă intervenția chirurgicală percutană (PCI) este efectuată în timpul adm. eptifibatidei, perfuzia se continuă 20-24 de ore după intervenție, cu o durată totală a trat. de cel mult 96 de ore. *Adulți (peste 18 ani) supuși intervenției coronariene percutane* (PCI) 180 µg/kg în bolus i.v., adm. cu puțin timp înaintea începerii PCI, urmat de o perfuzie continuă cu 2 µg/kg și min, timp de cel puțin 20-24 de ore.

CInd: Hemoragii gastrointestinale, genitourinare importante sau alte hemoragii active în ultimele 30 de zile înaintea trat.; antecedente de accident vascular cerebral în ultimele 30 de zile sau hemoragie cerebrală; tumori intracraniene, malformații arteriovenoase sau anevrisme cerebrale în antecedente; intervenții chirurgicale majore sau traumatisme severe în ultimele 6 săpt.; antecedente de diateză hemoragică; trombocitopenie; timp de protrombină > de 1,2 ori față de martor sau INR ≥ 2; HTA severă; IR severă; IH semnificativă clinic; adm. concomitentă sau planificată a altui inhibitor GPIIb/IIIa parenteral; hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare din excipienți.

A!: Pacientul trebuie supravegheat cu atenție pentru a se putea depista semnele de hemoragie (hematocrit sau hemoglobină, numărul de trombocite, creatinină serică, timp de protrombină (PT) și timp de tromboplastină parțial activat); interacțiuni medicamentoase cu alte medicamente care afectează hemostaza, prudență în IMA transmural cu unde-Q patologice recente, supradenivelarea segmentelor ST sau bloc de ramură stângă, trombocitopenie, IH, IR severă, pacienți sub 18 ani, sarcină și alăptare.

RA: Hemoragii, în proporție similară cu placebo: fibrilație atrială, hTA, insuficiență cardiacă congestivă, stop cardiac și șoc.

ERDOSTEINUM *COD ATC: R05CB15*

ERDOMED *MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O.;* Cps. 150 mg sau 300 mg ***(P-6L)***

ERDOMED *CSC PHARMACEUTICALS;* Pulb. pt. sol. inhal. 225 mg ***(P-6L)***

Ind: Tulburările secreției bronhice în pusee acute de bronhopneumopatie cronică obstructivă, în completarea antibioterapiei.

Dz: 300 mg de 2 ori/zi timp de 10 zile.

CInd: Insuf. hepatică sau renală severă (creatinină < 25 ml/min).

A!: Ulcer gastroduodenal.

RA: Gastralgie, grețuri, vome.

ERGOCALCIFEROLUM *COD ATC: A11CC01*

SICOVIT® D2 400 000 UI/1 ml *SICOMED SA*; Sol. inj. 400 000 ui/ml **(P-RF)**

SICOVIT® D2 600 000 UI/1 ml *SICOMED SA;* Sol. inj. 600 000 ui/ml **(P-RF)**

VITAMINA D$_2$ *SICOMED SA;* Sol. inj. 400 000 u.i./ml sau 600 000 u.i./ml (f. × 1 ml) ***(P-RF)***; sol. orală 200 000 u.i./ml (f. × 3 ml) ***(P-6L)***

Ind: Trat. și profilaxia rahitismului, în osteoartrite, osteomalacie și decalcifiere gravidică; în spasmofilia de tip rahitic, în fracturi (în asociere cu calciul), în

carii dentare repetate; tuberculoza pulmonară și în special extrapulmonară; în leziunile cutanate ulcerative; în intoxicații cu plumb, favorizând depunerea plumbului în oase.
Dz: *În rahitism și tetania hipocalcemică, profilactic,* oral 400-2 400 u.i. zilnic *până la vârsta de 1 1/2 ani,* apoi 3-6 luni/an (în sezonul rece) până la vârsta de 5 ani sau adm. intermitentă, oral, câte 300 000 u.i. la fiecare 6 luni, până la 1 1/2 ani, apoi o dată/an (la începutul iernii), până la vârsta de 5 ani, sau i.m. profund 600 000 u.i. o dată/an; curativ, oral sau im., 600 000 u.i. o dată, continuând, după 6 luni, cu dozele recomandate pentru profilaxie. În carența vitaminică la *adult* și *bătrân,* profilactic oral 400-2 000 u.i. zilnic, oral sau i.m. 300 000 u.i. o dată la 6 luni sau 600 000 u.i. o dată pe an; curativ în osteoporo-malacie, oral 4 000-20 000 u.i./zi, oral sau intramuscular 600 000 u.i. la intervale de 1-2 săpt. *În spasmofilia hipocalcemică,* oral 4 000-8 000 u.i./zi, oral sau i.m. 600 000 u.i. o dată.
Cind: Hipercalcemie, hipercalciurie, litiază renală, hipersensibilitate la vit. D.
A!: IR, bătrâni, bolnavii imobilizați, hipercolesterolemie, hipotiroidism; supravegherea calciuriei, eventual a calcemiei; sarcină, alăptare.
RA: Fenomene de hipervitaminoză: oboseală, anorexie, greață, vomă, diaree, poliurie cu urină diluată, sudorație, sete, slăbiciune, pierdere în greutate, decalcifierea oaselor, hipercalcemie, hipercalciurie, perturbarea probelor renale, depunere de calciu în diferite țesuturi, litiază renală.

ERGOMETRINUM

COD ATC: G02AB03

ERGOMET *BIOFARM SA;* Sol. inj. 0,2 mg/ml (ct. × 10 f. sau 100 f. × 1 ml) ***(S/P-RF)***

Ind: Profilaxia și controlul metroragiilor post-partum, involuție uterină imperfectă, retenție de lohii; hemoragii în cursul operațiilor cezariene, metroragii post-abortum, meno- și metroragii grave.
Dz: Inj. i.m.: 0,2-0,4 mg ergometrină maleat; inj. i.v.: 0,1-0,2 mg ergometrină maleat; la nevoie, se poate repeta după 1 oră; intern 0,2-0,8 mg ergometrină maleat de 3 ori/zi.
Cind: Sarcină, travaliu (până la degajarea umărului), alăptare, toxemie, IH gravă.
A!: Prudență în HTA, bolile vasculare obliterante (angină pectorală, arterite periferice, infecții, boli hepatice, boli renale, deficit de pompă cardiacă.
RA: Dozele mari pot provoca greață, vomă, dureri pelviene, HTA trecătoare; inj. i.v. rapidă (în mai puțin de 1 minut) poate produce HTA bruscă (chiar accidente cerebro-vasculare), parestezii, amețeli, cefalee, tinitus, palpitații, dureri precordiale, dispnee, sudorație; rareori erupții cutanate.

ERTAPENEMUM

COD ATC: J01DH

INVAZ *MERCK SHARP & DOHME;* Pulb. conc. sol. perf. 1 g ***(S/P-RF)***

Ind: Tratamentul pacienților adulți cu infecții moderate-severe, determinate de tulpini de microorganisme sensibile, precum și ca tratament inițial, empiric, administrat înainte de identificarea agenților patogeni în infecții intra-abdominale complicate; infecții complicate ale tegumentelor și ale structurilor pielii, inclusiv infecții ale extremităților inferioare în cadrul diabetului zaharat; pneumonie comunitară, infecții complicate ale tractului urinar, inclusiv pielonefrită, infecții pelvine acute, inclusiv endometrită post-partum, avort septic și infecții ginecologice postchirurgicale, septicemie bacteriană.

Dz: *Adulți:* doza uzuală 1 g, 3-14 zile, administrată o dată pe zi, perfuzie i.v. (calea i.m. este o alternativa); durata perfuziei trebuie să fie mai mare de 30 de minute. *IR:* la pacienții cu clearance al creatininei 30 ml/min și 1,73 m^2, nu este necesară ajustarea dozei. Pacienților cu IR avansată, inclusiv celor hemodializați, trebuie să li se administreze doza de 500 mg pe zi.

Cind: Hipersensibilitate la ertapenem sau față de alte medicamente din aceeași clasă sau la pacienții care au prezentat reacții anafilactice la betalactamine. Datorită utilizării clorhidratului de lidocaină ca solvent, este contraindicată administrarea i.m. la pacienții cu hipersensibilitate cunoscută față de anestezice locale de tip amidic și la pacienții cu șoc sever sau stop cardiac.

AI: Înainte de începerea tratamentului trebuie făcută o investigație atentă a reacțiilor de hipersensibilitate anterioare la peniciline, cefalosporine, alte betalactamine și alți alergeni. Dacă apare o reacție alergică, administrarea trebuie întreruptă imediat.

Nu au fost stabilite siguranța și eficacitatea la copii; nu este recomandată administrarea la pacienți cu vârsta sub 18 ani.

Sarcină și alăptare: trebuie administrat în timpul sarcinii doar dacă beneficiul potențial justifică riscul potențial pentru mamă și făt. Ertapenem se excretă în laptele matern. Administrarea la mama care alăptează trebuie efectuată cu precauție.

RA: *Frecvente:* Diaree, complicații la nivelul venei perfuzate (flebita, tromboflebita), greață și cefalee. *Rare:* Amețeli, somnolență, insomnie, convulsii, confuzie, hTA, dispnee, candidoză orală, constipație, regurgitații acide, diaree asociată cu *C.* difficile, uscăciunea gurii, dispepsie, anorexie, prurit vaginal. A fost raportată colită pseudomembranoasă a cărei gravitate poate varia.

ERYTHROMYCINUM *COD ATC: J01FA01*

ERITRO 200 *LEK PHARMATECH;* Pulb. susp. 200 mg/5 ml (fl. cu pulbere pt. 60 ml susp.) ***(P-RF)***; cpr. 200 mg ***(S/P-RF)***; cps. 200 mg ***(P-RF)***

ERITROMAGIS 200 mg *ARENA GROUP SA;* Cpr. 200 mg ***(P-RF)***

ERITROMICINA 200 mg *LEK PHARMATECH;* Cpr. 200 mg ***(P-RF)***

ERITROMICINĂ *ANTIBOTICE IAȘI;* Pulb. pt. sol. inj. 300 mg ***(S/P-RF)***

ERITROMICINĂ *HELCOR SRL;* Cpr. 200 mg ***(P-RF)***

ERITROMICINĂ 200 mg *ANTIBOTICE IAȘI;* Cpr. 200 mg **(S/P-RF)**

ERITROMICINA 200 mg *EUROPHARM SA;* Cpr. 200 mg ***(S/P-RF)***

ERYC *BIOGAL PHARMACEUTICAL WORKS Ltd.;* Cps. 125 mg ***(P-RF)***

ERYHEXAL *HEXAL AG;* Pulb. susp. 200 mg/5 ml (fl. cu pulb. pt. 100 ml susp.) ***(P-RF)***

ERYTHRODAR *DAR AL DAWA;* Cpr. film. 250 mg ***(P-RF)***

ERYTHROMYCIN RIVO 125 *RIVOPHARM;* Pulb. pt. susp. orală 125 mg/5 ml (fl. cu pulb. pt. 60 ml susp.) ***(P-RF)***

ERYTRO-TEVA *TEVA;* Pulb. pt. susp. orală 200 mg/5 ml sau 400 mg/5 ml (fl. cu pulb. pt. 60 ml susp.) ***(P-RF)***

INDERM *SANKYO;* Sol. ext. 1% (fl. × 50 ml) ***(OTC)*** *COD ATC: D10AF02*

LACTOBIONAT ERITROMICINĂ *ANTIBIOTICE SA;* Pulb. pt. sol. inj. 300 mg ***(S)***

PORPHYROCIN *MEDOCHEMIE Ltd.;* Cpr. 250 mg ***(S/P-RF)***

PROPIONAT DE ERITROMICINĂ *SICOMED SA;* Cpr. 200 mg ***(P-RF)***

Ind: Trat. infecțiilor cu microorganisme sensibile: infecții bronho-pulmonare, ORL, cutanate, genitale, osoase. Streptococcus pyogenes, streptococ alfa, beta-hemolitic, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus – numeroase tulpini sunt rezistente – Streptococcus pyogenes, Mycoplasma pneumoniae, difterie, Chlamydia trachomatis, Campylobacter fetus jejuni, Bordetella pertussis, Neisseria, sifilis, Listeria monocytogenes).
Dz: *Adulți:* 1,5-2 g/zi, în 2-3 prize, cu o jumătate de oră înainte de mese. În infecțiile grave, doza zilnică poate să crească la 4 g/zi (divizate în 4 prize). *Copii:* în general 50 mg/kg și zi, în 2-3 prize. În infecții grave se dublează doza. *Șancrul primar, sifilisul secundar și latent (< 1 an):* 3-4 g/zi, timp de 10-15 zile. Infecții acute pelviene: 500 mg i.v., la 6 h, timp de 3 zile, urmate de 500 mg oral, de 2 ori/zi (la 12 h), timp de 7 zile. *Uretrita gonococică:* 500 mg de 2-3 ori/zi, timp de 14 zile. *Infecții cu Bordetella pertussis:* 40-50 mg/kg/zi, 5-14 zile (dozele și durata optimă a trat. nu s-au stabilit cu exactitate). *Conjunctivite* cu Chlamydia *la copii:* 12,5 mg (eritromicină bază)/kg la 6 h, timp de 10-14 zile. Intravenos, în injecții lente, la adulți 300-900 mg la fiecare 6 ore; la copii 30-50 mg/kg și zi (fracționat). În aplicații locale, de 2 ori/zi (după spălarea și uscarea zonei de piele interesată).
Cind: Hipersensibilitate la antibioticele din clasa macrolidelor. IH gravă. Nu se asociază cu alcaloizi vasoconstrictori proveniți din *Secale cornutum*, mai ales cu ergotamina și dihidroergotamina.
A!: Prudență la IR, astm bronșic, interacțiuni medicamentoase cu teofilina, anticoagulante cumarinice, ergotamină sau DH-ergotamină; sarcină și alăptare.
RA: Tulburări gastrointestinale: grețuri, vărsături, diaree, dureri abdominale, suprainfecție cu microorganisme rezistente la eritromicină, colestază hepatică (grețuri, vărsături, dureri abdominale, febră, prurit, icter și eozinofilie), reacții alergice, hipoacuzii tranzitorii și reversibile.

ESOMEPRAZOLUM

COD ATC: A02BC05

NEXIUM 20 mg; NEXIUM 40 mg *ASTRAZENECA;* Cpr. film. 20 mg sau 40 mg ***(P-RF)***

Ind: Boală de reflux gastroesofagian, vindecarea eroziunilor și profilaxia recăderilor. Eradicarea *Helicobacter pylori* în cadrul schemelor terapeutice.

Dz: Oral, cpr. întregi sau desfăcute în 1/2 pahar cu apă necarbogazoasă; nu se vor adm. cu alte lichide. Se amestecă până când cpr. se dizolvă și se bea conținutul imediat sau în interval de 30 de minute. *Boala de reflux gastroesofagian:* vindecarea eroziunilor în esofagita de reflux: 40 mg o dată/zi, timp de 4-8 săpt.; *trat. simptomelor în esofagita de reflux:* 20 mg o dată/zi la pacienții cu rezultate negative la investigațiile paraclinice timp de 4 săpt. După dispariția simptomelor, prevenirea reapariției acestora poate fi obținută prin adm. orală a 20 mg esomeprazol o dată/zi, la nevoie; *profilaxia de durată a recăderilor la pacienții cu esofagită vindecată:* 20 mg o dată/zi. *Eradicarea Helicobacter pylori în cadrul schemelor terapeutice:* 20 mg de 2 ori/zi, în asociere cu 1 g amoxicilină de 2 ori/zi și 500 mg claritromicină de 2 ori/zi, timp de 7 zile. La pacienții cu IH severă se dau maxim 20 mg/zi. *Copii:* produsul nu este recomandat la această categorie.

Cind: Hipersensibilitate la esomeprazol, derivați de benzimidazol sau la oricare dintre excipienți. Intoleranță ereditară la fructoză, malabsorbție de glucoză-galactoză sau insuficiență de sucrază-izomaltază.

A!: Pacienții tratați timp îndelungat, mai mult de un an trebuie supravegheați regulat. Când se prescrie esomeprazol pentru eradicarea Helicobacter pylori, trebuie luate în considerare posibilele interacțiuni între componentele schemei terapeutice triple. Atenție în prezența oricărui simptom de alarmă (pierdere în greutate semnificativă neintenționată, vărsături recurente, disfagie, hematemeză sau melenă) sau atunci când ulcerul gastric este suspectat sau diagnosticat; trebuie exclus un proces malign, deoarece esomeprazolul poate ameliora simptomatologia, mascând diagnosticul. Prudență în IR severă. Sarcină și alăptare.

RA: *Mai frecvente:* cefalee, durere abdominală, diaree, flatulență, greață/vărsături, constipație; dermatită, prurit, urticarie, amețeală, uscăciunea gurii. *Posibile* (observate pentru omeprazol): *SNC și periferic:* parestezii, somnolență, insomnie, vertij; mai ales la pacienții debilitați pot să apară confuzie reversibilă, agitație, agresivitate, depresie și halucinații; *sistem endocrin:* ginecomastie; *aparat digestiv:* stomatită și candidoză gastrointestinală; *măduva hematopoetică:* leucopenie, trombocitopenie, agranulocitoză și pancitopenie; *ficat:* creșterea enzimelor hepatice, encefalopatie la pacienții cu afectare hepatică severă preexistentă; hepatită cu sau fără icter, IH; *sistem musculoscheletal:* artralgii, slăbiciune musculară și mialgii; *tegumente:* erupții cutanate, eritem multiform, sd. Stevens-Johnson, necroliză epidermică toxică, alopecie; *alte reacții adverse:* stare generală de rău; reacții de hipersensibilitate (edem angioneurotic, febră, bronhospasm, nefrită interstițială, șoc anafilactic); hipersudorație, edeme periferice, vedere încețoșată, modificări ale gustului și hiponatremie.

ESTRADIOLUM

COD ATC: G03CA03

CLIMARA *SCHERING PLOUGH EUROPE AG;* Sist. transderm 3,9 mg/ 12,5 cmp ***(P-6L)***

ESTRADERM TTS - 25 *NOVARTIS;* Sist. transdermic 2 mg ***(P-6L)***

ESTRADERM TTS - 50 *NOVARTIS;* Sist. transdermic 4 mg ***(P-6L)***

ESTRADIOL *BIOFARM SA;* Sol. inj. 2,5 mg/ml (f. × 1 ml) ***(P-RF)***

ESTREVA *LAB. THERAMEX;* Gel 0,1% ***(P-6L)***

ESTROFEM *NOVO NORDISK A/S;* Cpr. film. 1 mg sau 2 mg ***(P-6L)***

FEM 7 *GEDEON RICHTER;* Sist. transderm. ***(P-6L)***

FEMSEVEN 75 *MERCK KGaA;* Sist. transderm 2,25 mg estradiol hemihidrat, care eliberează în organism 75 g/zi ***(P-6L)***

FEMSEVEN 100 *MERCK KGaA;* Sist. transderm 3 mg estradiol hemihidrat, care eliberează în organism 100 g/zi ***(P-6L)***

OESCLIM *LAB. FOURNIER;* Sist. transderm 25 g/24 h, 50 g/24 h sau 100 g/24 h ***(P-6L)***

OESTROGEL *LAB. BESINS INTERNATIONAL;* Gel 0,06% (tub × 80g) ***(P-6L)***

RISELLE *N.V. ORGANON;* Implant 25 mg 17-β-estradiol ***(P-RF)***

VAGIFEM *NOVO NORDISK A/S;* Cpr. vag. 25 µg 17-β-estradiol hemihidrat ***(P-6L)***

Ind: Terapia de substituție hormonală cu estrogen fiziologic pt. menopauză: tulburări vasomotorii - transpirație, bufeuri și alte simptome ale deficitului estrogenic - atrofie urogenitală, tulburări de micțiune, tulburări de somn și dispoziție afectivă oscilantă. Prevenirea osteoporozei. Injectabil în trat. amenoreei primare sau secundare, dismenoreei funcționale, pentru trat. endometritei post-partum și post-abortum și în trat. cancerului la prostată (inoperabil, metastazat sau recidivant). În adm. vag. este indicat în trat. vaginitei atrofice datorată unei deficiențe estrogenice.
Dz: *Int.:* 2-4 mg/zi: femeile histerectomizate și cele aflate în post-menopauză pot începe trat. în oricare zi; cele care mai au ciclu menstrual pot începe trat. în a 5-a zi de sângerare. *Ext.:* se aplică pe piele și se lasă timp de 7 zile preparate care eliberează 50 µg pe zi, la nevoie 75 µg pe zi sau 100 µg pe zi. *Inj.:* amenoree primară sau secundară 2,5-5 mg de 2-3 ori/săpt.; endometrită post-partum și post-abortum: 3-5 adm. a 5 mg; cancer la prostată: 100 mg o dată, la fiecare 2-3 săpt. *Adm. vaginală:* 25 µg/zi timp de două săpt. *Implante:* 25 mg 17 β-estradiol o dată la 4-8 luni.
Cind: Sarcină cunoscută sau suspectată, perioada de alăptare; cancere de sân sau uter; tumori hipofizare; sângerări genitale anormale, nediagnosticate; forme severe de endometrioză; lupus eritematos sistemic și alte colagenoze; afecțiuni hepatice acute sau cronice severe, antecedente de afecțiuni hepatice; sindrom Rotor sau sindrom Dubin-Johnson; tromboză venoasă profundă, boală tromboembolică; afecțiuni renale severe; porfirie; otoscleroză; hipersensibilitate la estradiol sau la celelalte componente ale produsului.
A!: Măsurarea TA, examenul sânilor, examen ginecologic și o anamneză atentă; prudență în hiperplazia endometrului cu sângerări uterine și risc crescut de carcinom endometrial; creștere modestă a riscului de cancer mamar pentru trat. prelungit (mai mult de 5 ani) cu doze mari de estrogeni; prudență în epilepsie, diabet zaharat, HTA, afecțiuni hepatice sau renale ușoare sau moderate, tumori benigne ale sânului, antecedente familiale de cancer de sân, fibrom uterin; dispozitivele transdermice cu estradiol nu sunt indicate la copii.
RA: *Piele:* Comune: Reacții cutanate tranzitorii la nivelul zonei de aplicare a sist. transdermic. *Tract urogenital:* Comune: Sângerări uterine neregulate. Rare: Hiperplazie endometrială. *Sistem endocrin:* Comune: Tensiunea sânilor. *Tract*

gastro-intestinal: Neobișnuite: Greață, crampe abdominale, balonare. *SNC:* Comune: Cefalee. Neobișnuite: Migrenă. Rare: Amețeli. *Sistem cardiovascular:* Rare: Tromboflebite, creșterea TA. *Diverse:* Neobișnuite: Crampe ale picioarelor, edeme și/sau modificări ale greutății corporale.

ESTRAMUSTINUM *COD ATC: L01XX11*

ESTRACYT® *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Pulb. pt. sol. inj. estramustină 300 mg ***(S)***; cps. estramustină 140 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Stadii avansate de carcinom prostatic, în special la pacienții cu tumori refractare la trat. hormonal, și în terapia primară a pacienților cu factori de prognostic ce indică un răspuns slab la trat. hormonal pur.
Dz: *Int:* 7-14 mg/kg corp/zi, în 2-3 prize. *Inj.:* 5 mg/kg corp/zi, timp de până la 3 săpt., apoi 300 mg de 2 ori/săpt.
Cind: Hipersensibilitate la estradiol sau derivații azotiperitei. Afecțiuni hepatice grave. Afecțiuni cardiovasculare grave: ischemice, tromboembolice sau complicații datorate retenției hidrosaline.
A!: Prudență în antecedente de tromboflebită, tromboză sau afecțiuni tromboembolice, afecțiuni vasculare cerebrale sau maladii coronariene, diabet zaharat, HTA, retenție hidrosalină, migrenă, disfuncție renală, afecțiuni osoase metabolice asociate cu hipercalcemie, IR, disfuncții hepatice, sarcină și alăptare.
RA: Ginecomastie, impotență, greață/vărsături, diaree, retenție hidrosalină/edemul, tromboembolie, cardiopatie ischemică, IC, HTA, rareori, edem angioneurotic, slăbiciune musculară, depresie, cefalee, confuzie, letargie, reacții de hipersensibilitate, inclusiv rash cutanat alergic și edem angioneurotic.

ESTRIOLUM *COD ATC: G03CA04*

ESTRIOL SALBE *WYETH LEDERLE PHARMA;* Ung. 0,1% (tub × 25 g sau 50 g + aplicator) ***(P-RF)***

OVESTIN *N.V. ORGANON;* Cremă vag. 0,1% (tub × 15 g sau 30 g); ovule 0,5 mg; cpr. vag. 2 mg ***(P-RF)***

Ind: Insuficiența ovariană primară sau secundară la pubertate (hipoplazie uterină și mamară, amenoree, vaginită atrofică). Climacteriu.
Dz: *Adm. vaginală:* 0,5 mg pe zi pentru primele câteva săpt., apoi reducere progresivă la doză de întreținere 0,5 mg de 2 ori/săpt.
Cind: Tromboze; tumoră estrogenodependentă diagnosticată sau suspectată; sângerări vaginale nediagnosticate; istoric al manifestărilor sau deteriorării unei otoscleroze în cursul sarcinii sau în timpul unei utilizări anterioare a steroizilor; sarcină.
A!: Examene medicale periodice; prudență în colelitiază; tulburări tromboembolice; IC latentă sau manifestă; HTA; retenție lichidiană prin disfuncție renală; epilepsie sau migrenă (antecedente de astfel de manifestări); patologie hepatică severă; endometrioză; mastopatie fibrochistică; porfirie; hiperlipoproteinemie; antecedente de prurit, icter colestatic sau herpes în timpul sarcinii sau în cursul utilizării de preparate pe bază de estrogen; alăptare.
RA: *Adm. vag.:* iritație locală și prurit; tensiune sau durere mamară.

gastro-intestinal: Neobișnuite: Greață, crampe abdominale, balonare. *SNC:* Comune: Cefalee. Neobișnuite: Migrenă. Rare: Amețeli. *Sistem cardiovascular:* Rare: Tromboflebite, creșterea TA. *Diverse:* Neobișnuite: Crampe ale picioarelor, edeme și/sau modificări ale greutății corporale.

ESTRAMUSTINUM *COD ATC: L01XX11*

ESTRACYT® *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Pulb. pt. sol. inj. estramustină 300 mg ***(S)***; cps. estramustină 140 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Stadii avansate de carcinom prostatic, în special la pacienții cu tumori refractare la trat. hormonal, și în terapia primară a pacienților cu factori de prognostic ce indică un răspuns slab la trat. hormonal pur.
Dz: *Int:* 7-14 mg/kg corp/zi, în 2-3 prize. *Inj.:* 5 mg/kg corp/zi, timp de până la 3 săpt., apoi 300 mg de 2 ori/săpt.
Cind: Hipersensibilitate la estradiol sau derivații azotiperitei. Afecțiuni hepatice grave. Afecțiuni cardiovasculare grave: ischemice, tromboembolice sau complicații datorate retenției hidrosaline.
A!: Prudență în antecedente de tromboflebită, tromboză sau afecțiuni tromboembolice, afecțiuni vasculare cerebrale sau maladii coronariene, diabet zaharat, HTA, retenție hidrosalină, migrenă, disfuncție renală, afecțiuni osoase metabolice asociate cu hipercalcemie, IR, disfuncții hepatice, sarcină și alăptare.
RA: Ginecomastie, impotență, greață/vărsături, diaree, retenție hidrosalină/edemul, tromboembolie, cardiopatie ischemică, IC, HTA, rareori, edem angioneurotic, slăbiciune musculară, depresie, cefalee, confuzie, letargie, reacții de hipersensibilitate, inclusiv rash cutanat alergic și edem angioneurotic.

ESTRIOLUM *COD ATC: G03CA04*

ESTRIOL SALBE *WYETH LEDERLE PHARMA;* Ung. 0,1% (tub × 25 g sau 50 g + aplicator) ***(P-RF)***

OVESTIN *N.V. ORGANON;* Cremă vag. 0,1% (tub × 15 g sau 30 g); ovule 0,5 mg; cpr. vag. 2 mg ***(P-RF)***

Ind: Insuficiența ovariană primară sau secundară la pubertate (hipoplazie uterină și mamară, amenoree, vaginită atrofică). Climacteriu.
Dz: *Adm. vaginală:* 0,5 mg pe zi pentru primele câteva săpt., apoi reducere progresivă la doză de întreținere 0,5 mg de 2 ori/săpt.
Cind: Tromboze; tumoră estrogenodependentă diagnosticată sau suspectată; sângerări vaginale nediagnosticate; istoric al manifestărilor sau deteriorării unei otoscleroze în cursul sarcinii sau în timpul unei utilizări anterioare a steroizilor; sarcină.
A!: Examene medicale periodice; prudență în colelitiază; tulburări tromboembolice; IC latentă sau manifestă; HTA; retenție lichidiană prin disfuncție renală; epilepsie sau migrenă (antecedente de astfel de manifestări); patologie hepatică severă; endometrioză; mastopatie fibrochistică; porfirie; hiperlipoproteinemie; antecedente de prurit, icter colestatic sau herpes în timpul sarcinii sau în cursul utilizării de preparate pe bază de estrogen; alăptare.
RA: *Adm. vag.:* iritație locală și prurit; tensiune sau durere mamară.

ESTROGENI CONJUGAȚI

COD ATC: G03FA12

PREMARIN 0,625 mg *WYETH LEDERLE PHARMA GmbH;* Dj. 0,625 mg ***(P-6L)***

PREMARIN 1,25 mg *WYETH LEDERLE PHARMA GmbH;* Dj. 1,25 mg ***(P-6L)***

Ind: La femei aflate în perioadele de menopauză și postmenopauză: simptome vasomotorii moderate-severe, asociate cu deficiență de estrogeni, cum ar fi transpirații și bufeuri; prevenirea și tratarea osteoporozei asociate cu deficiență estrogenică; reducerea riscului coronarian și a mortalității asociate, la femeile aflate în postmenopauză; vaginite și uretrite atrofice; hipoestrogenism.
Dz: *Adulți:* Doza inițială uzuală este de 0,625-1,25 mg estrogeni conjugați pe zi. Administrarea poate fi continuă sau ciclică (în cure de 3 săptămâni cu o săptămână pauză). Trebuie administrată doza minimă eficace terapeutic.
Cind: La pacientele care prezintă: hipersensibilitate la estrogeni sau la oricare din componentele Premarin; cancer de sân diagnosticat, suspectat sau în antecedente; neoplazii estrogeno-dependente diagnosticate sau suspectate; hemoragii genitale de etiologie neprecizată; tromboflebită activă sau tulburări tromboembolice; sarcină confirmată sau suspectată.
Premarin este contraindicat la copii. Nu se administrează în timpul sarcinii.
A!: La femeile cu uter intact, tratamentul estrogenic fără asocierea unui progestativ crește riscul de hiperplazie endometrială și de carcinom de endometru. Riscul pare să depindă atât de durata tratamentului, cât și de doza de estrogen. Controlul periodic la pacientele cu uter intact trebuie să fie făcut cel puțin anual, inclusiv biopsie de endometru. Studiile au indicat o reducere a riscului de cancer de endometru atunci când se asociază un progestativ terapiei de substituție estrogenică. Includerea unui progestativ în schemele terapeutice de substituție hormonală poate prezenta riscuri suplimentare; acestea includ efecte adverse asupra metabolismului glucidelor și lipidelor. Alegerea progestativului adecvat poate fi importantă pentru reducerea acestor riscuri.
RA: Sistem genitourinar: sângerări vaginale intermitente, sângerări ușoare, modificări ale fluxului menstrual, amenoree; *glandă mamară:* sensibilitate, mărirea dimensiunilor, galactoree; *tub digestiv:* pancreatită, greață, vărsături, crampe abdominale, flatulență, icter colestatic; tegumente: cloasmă sau melasmă (care poate persista și după întreruperea tratamentului), alopecie, rash; *glob ocular:* aplatizarea curburii corneene, intoleranță la lentile de contact; *sistem nervos central:* cefalee, migrenă, amețeli, coree; *altele:* scădere sau creștere în greutate, edeme, modificări ale libidoului, agravarea porfiriei.

ETACRIDINUM

COD ATC: S01AXN2

OPHOSEPT *DR. WINZER;* Sol. oft. 0,1% (fl. × 10 ml) ***(P-RF)***

Ind: Antiseptic pt. infecții ale părții anterioare a ochiului, cauzate de bacterii grampozitive (stafilococi, streptococi, diplococi, pneumococi) dar și germeni gramnegativi (Haemophilus/Koch-Weeks, Moraxella/ Morax-Axenfeld, Neisseria) și protozoare (Entamoeba histolytica). Nu este activ față de Proteus, Pseudomonas și Escherichia.
Dz: Dacă nu este altfel prescris, se instilează de 2-3 ori pe zi, 1-2 picături în sacul conjunctival al pleoapei inferioare până la vindecarea afecțiunii. Se

pune o picătură în sacul conjunctival și, prin închiderea ușoară a pleoapelor se realizează difuzarea soluției. Excesul medicamentului care se scurge din ochi se tamponează ușor cu vată. Lentilele de contact trebuie scoase înainte de aplicarea picăturilor, putând fi amplasate din nou după 40 de minute de la administrare.
Cind: Sensibilitate față de una din componente.
RA: În cazuri izolate, după folosirea intensă și de lungă durată, poate să apară o modificare fină și superficială a corneei care dispare în două-trei zile după întreruperea tratamentului. Foarte rar poate să apară alergie de contact.

ETAMSYLATUM *COD ATC: B02BX01*

DICYNONE *OM PHARMA;* Cpr. 250 mg ***(P-RF)***; Sol. inj. 125 mg/ml (f. × 2 ml) ***(S/P RF)***

ETAMSILAT *SICOMED SA;* Sol. inj. 125 mg/ml (f. × 2 ml) ***(S)***

Ind: Prevenirea și trat. hemoragiilor capilare, pre- și postoperatorii; prevenirea și trat. hemoragiilor capilare de diverse etiologii și localizări; metroragie, menoragie primară sau datorată dispozitivelor intrauterine, de mică intensitate, în absența unei patologii organice; profilaxia hemoragiilor periventriculare la prematuri.
Dz: *Int.: Adulți:* Preoperator: 250 sau 500 mg cu 1 oră înainte de intervenție. Postoperator: 250 sau 500 mg la intervale de 4-6 ore atât cât persistă riscul hemoragic. Medicina internă: 500 mg de 2 sau 3 ori/zi (1 000 sau 1 500 mg). Menometroragii: 500 mg de 3 ori/zi (1 500 mg). *Copii:* Se adm. jumătate din doza adultului. *Inj.: Adulți:* Preoperator: 250-500 mg i.v., cu 1 oră înainte de intervenție. Peroperator: 250-500 mg i.v.; se repetă la nevoie. Postoperator: 250-500 mg i.v. la intervale de 4-6 ore, atât cât persistă riscul hemoragic. În urgențe, în funcție de severitatea hemoragiei: 250-500 mg i.v. sau i.m. la fiecare 4-6 ore, atât cât persistă hemoragia și riscul hemoragic. *Copii:* Se adm. jumătate din doza adultului. La nou-născuți: 10 mg/kg (0,1 ml = 12,5 mg etamsilat) în injecții intramusculare, în primele 2 ore de la naștere, apoi la fiecare 6 ore, timp de 4 zile
Cind: Porfirie acută, astm bronșic.
A!: Febră; monitorizarea TA, sarcină și alăptare.
RA: Febră, cefalee, erupții cutanate, tulburări digestive - epigastralgii, greață, vomă, diaree; hipotensiune arterială trecătoare; reacții alergice; au fost semnalate cazuri grave de astm bronșic și șoc anafilactic cu risc letal.

ETANERCEPTUM *COD ATC: L04AA11*

ENBREL *WYETH LEDERLE PHARMA GmbH;* Pulb. și solvent pentru sol. inj. etanercept 25 mg ***(S)***

Ind: Trat. poliartritei reumatoide active la adulți când răspunsul la alte medicamente antireumatice a fost inadecvat. Trat. formei poliarticulare active de artrită reumatoidă juvenilă cronică, la copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 17 ani, care au prezentat un răspuns inadecvat sau au dovedit intoleranță la metotrexat.
Dz: *Adulți* (18-64 ani): 25 mg etanercept de 2 ori pe săpt. prin inj. sc. *Copii* și *adolescenți* (≥ 4 la < 18 ani): 0,4 mg/kg (până la o doză maximă de 25 mg) de 2 ori pe săpt. ca inj. s.c., cu un interval de 3-4 zile între doze.

Cind: Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți. Sepsis sau risc de sepsis; infecții active, inclusiv infecții cronice sau localizate.
A!: Prudență în infecții; reacții alergice; imunosupresie; vaccinări; formarea de autoanticorpi; boală de demielinizare a SNC preexistentă sau recentă; reacții hematologice; sarcină și alăptare.
RA: Reacții la locul de injecție; infecții; teste pozitive pentru anticorpi anti-ADN dublu catenar; cefalee, rinită, amețeală, faringită, tuse, astenie, durere abdominală, erupție cutanată, tulburări respiratorii, dispepsie, sinuzită.

ETHAMBUTOLUM

COD ATC: J04AK02

ETAMBUTOL *SICOMED SA;* Cps. 250 mg ***(S/P-RF)***

ETAMBUTOL *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cpr. 400 mg ***(S/P-RF)***

ETAMBUTOL 250 mg *ARENA GROUP SA;* Cps. 250 mg ***(S/P-RF)***

ETAMBUTOL 400 mg *SICOMED SA;* Cps. 400 mg ***(S/P-RF)***

SYNTOMEN 400 *BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP;* Cpr. 400 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Tuberculoza pulmonară, tuberculoza miliară, pleurezia tuberculoasă, peritonita tuberculoasă, meningita tuberculoasă, tuberculoza genito-urinară, tuberculoza osteo-articulară și ganglionară. Se va asocia obligatoriu cu alte chimioterapice și antibiotice antituberculoase. Tuberculoza pulmonară și extrapulmonară (în terapie combinată cu alte antituberculoase); infecții cu mycobacterii atipice sensibile.
Dz: *Adulți:* oral, 15 mg/kg și zi, priza unică, pe stomacul gol, zilnic sau 40-50 mg/kg și zi de 2 ori/săpt. asociat cu alt tuberculostatic (izoniazidă, rifampicină, streptomicină). În IR: 10 mg/kg și zi. *Copii:* oral, 25 mg/kg și zi.
Cind: Hipersensibilitate la clorhidrat de etambutol; nevrită optică, retinopatie diabetică, cataractă; IR renală severă.
A!: Prudență în hiperuricemie; tulburări vizuale (cataractă sau retinopatie diabetică); disfuncții renale; copii sub 13 ani; bătrâni; alcoolici; fumatori. Interacțiuni medicamentoase cu antiacidele gastrice cu aluminiu. Sarcină și alăptare.
RA: Nevrita optică cu pierderea parțială a vederii (reversibilă în câteva luni dacă se suprimă trat. imediat), febră, artralgii, erupții cutanate alergice, prurit, cefalee, grețuri, vărsături, dureri abdominale, parestezii, stări confuzive, rareori nevrite periferice sau alterări pasagere ale funcției hepatice, hiperuricemie.

ETHOSUXIMIDUM

COD ATC: N03AD01

PETINIMID *GEROT;* Cps. 250 mg, sirop 50 mg/ml (fl. × 250 ml) ***(P-6L)***

PETNIDAN *DESITIN;* Cps. 250 mg ***(P-6L)***

SUXILEP *JENA PHARM GmbH & Co. KG;* Cps. 250 mg ***(P-6L)***

Ind: Epilepsie petit mal.
Dz: La *copii între 3-6 ani:* oral, începând cu 250 mg/zi; la *copiii mai mari și la adulți* 500 mg/zi, se crește săpt. cu câte 250 mg, după nevoie; dozele utile

sunt cuprinse între 250 și 1200 mg/zi (obișnuit 20-40 mg/kg corp), fracționat, în timpul meselor.

Cind: Hipersensibilitate la ethosuximidă sau alte succinimide.

A!: Prudență în tulburări hepatice sau renale; efectuarea regulată a hemogramei și a testelor de urină; controlul periodic al funcțiilor hepatice; trat. cu ethosuximidă nu trebuie întrerupt brusc; sarcină și alăptare.

RA: Greață, vărsături, anorexie, dureri gastrice, scădere în greutate, diaree, oboseală, dureri de cap, amețeli, ataxie și fotofobie. Rareori se pot manifesta tulburări de somn, scăderea puterii de concentrare, sughiț, albuminurie, urticarie, erupții, sindrom Stevens-Johnson, lupus eritematos sistemic, sclerodermie, hirsutism, reacții de tip parkinsonian, iritabilitate, agresivitate, excitație, inerție, miopie, hemoragii vaginale, inflamarea limbii și a vălului palatin, creșterea valorilor GOT și a urobilinogenului, leucopenie, agranulocitoză, trombocitopenie, eozinofilie, anemie aplastică și pancitopenie.

ETILEFRINUM

COD ATC: C01CA01

THOMASIN *APOGEPHA;* Sol. orală 15 mg/ml (fl. × 20 ml); Cpr. 10 mg ***(P-6L)***

THOMASIN RETARD *APOGEPHA;* Cpr. ret. 25 mg ***(P-6L)***

Ind: Stări hipotensive cronice, hipotensiune ortostatică.

Dz: *Adulți* și *copii mari:* câte 5-10 mg etilefrin de 2-3 ori/zi, înainte de mese; *copii mici:* câte 2,5-5 mg etilefrină de 3 ori/zi.

Cind: Hipertiroidie, IC (necompensată), boală coronariană, HTA, IR severă, feocromocitom, glaucom cu unghi îngust, adenom de prostată cu retenție de urină, asociere cu IMAO.

A!: Simpatomimeticele figurează pe lista substanțelor dopante (interzise la sportivi).

RA: Uneori cefalee, neliniște, anxietate, tremor, tahicardie, aritmii ectopice, dureri anginoase (mai ales la dozele mari).

ETOFENAMATUM

COD ATC: M02AA06

CIMAL *SPECIFAR S.A.;* Gel 10% ***(OTC)***

RHEUMON *TROPON GmbH;* Emulsie 10%; cremă 10% ***(OTC)***

RHEUMON *TROPON GmbH;* Sol. inj. 500 mg/ml (f. × 2 ml) ***(P-RF)***

COD ATC: M01AGN1

Ind: Boli reumatice, acute și subacute, dureri de origine reumatică.

Dz: Se aplică, de mai multe ori/zi, la nivelul zonei afectate, un segment de 5-10 cm etofenamat gel, se masează apoi ușor pentru a pătrunde în piele.

A!: Nu se aplică la nivelul leziunilor pielii și nici pe leziuni eczematoase.

RA: Foarte rar apar local zone de înroșire a pielii, arsuri sau prurit.

ETOMIDATUM

COD ATC: N01AX07

ETOMIDAT-LIPURO *B. BRAUN MELSUNGEN;* Emulsie inj. 2 mg/ml (f. × 10 ml). ***(S)***

Ind: Inducerea anesteziei generale.
Dz: Doza trebuie ajustată individual, în funcție de răspunsul clinic. *Dozele recomandate*: La *adulți*, doza hipnotică eficace este de 0,15-0,30 mg etomidat/kg (0,075-0,15 ml/kg). La *copii sub 15 ani și vârstnici* se administrează o singură doză de 0,15-0,2 mg etomidat (0,075-0,15 ml/kg), ajustată în funcție de efectul clinic. La pacienții cu ciroză hepatică și la cei tratați anterior cu neuroleptice, doza trebuie micșorată. În cazul utilizării anesteziei în marele rău epileptic sau în crizele epileptice în serie, se injectează rapid 0,3 mg etomidat/kg (0,15 ml), în decurs de 10 secunde. Dacă este necesar, această doză poate fi repetată de mai multe ori. Trebuie injectat strict intravenos, de regulă lent (o doză în aproximativ 30 secunde) și, dacă este necesar, fracționat. Injectarea intraarterială trebuie evitată, datorită riscului de necroză. Injectarea paravenoasă provoacă durere puternică. La pacienții cu epilepsie manifestă sau cu risc convulsivant crescut, injectarea trebuie efectuată rapid, în câteva secunde, pentru a evita pătrunderea prea lentă a etomidatului în creier; trecerea rapidă a acestuia în creier previne apariția convulsiilor.
Cind: Hipersensibilitate la etomidat, emulsii lipidice sau la oricare dintre excipienții produsului. Copii sub 6 luni.
A!: Înainte de administrarea etomidatului, pentru a evita apariția miocloniilor trebuie administrată medicație adecvată, de exemplu diazepam, care poate fi injectat i.m. cu aproximativ o oră înainte sau i.v. cu aproximativ 10 minute înainte. Nu se adm. pacienților cu tulburări ereditare ale biosintezei hemului, cu excepția cazurilor în care indicația administrării etomidatului a fost ferm stabilită și după evaluarea atentă a raportului risc potențial/beneficiu terapeutic. Nu se adm. în timpul sarcinii sau în timpul alăptării.
Afectează capacitatea de a conduce autovehicule sau utilaje.
RA: Etomidatul inhibă biosinteza corticosuprarenaliană a steroizilor. Ocazional s-au observat: greață și vărsături (totuși, acestea au fost probabil provocate de opioidele administrate concomitent sau ca premedicație), tuse, sughiț și tremor. Rareori, după administrarea de etomidat, s-a observat eliberarea de histamină. Există raportări izolate privind apariția laringospasmului după administrarea de etomidat. În cazul asocierii cu deprimante SNC poate să apară apnee tranzitorie.

ETOPOSIDUM

COD ATC: L01CB01

ETOPOSID EBEWE 50 mg; ETOPOSID EBEWE 100 mg; ETOPOSID EBEWE 200 mg *EBEWE PHARMA GmbH. Nfg KG;* conc. pt. sol. perf. 20 mg/ml (fl. × 2,5 ml sau fl. × 5 ml sau fl. × 10 ml) ***(S)***

ETOPOSIDE *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Conc. pt. sol. perf. 20 mg/ml (fl. × 5 ml sau fl. × 25 ml) ***(S)***

ETOPOSIDE PIERRE FABRE 100 mg/5 ml *LAB. PIERRE FABRE;* Conc. pt. sol. perf. 20 mg/ml (fl. × 5 ml) ***(S)***

SINTOPOZID 100 mg/5 ml *SINDAN SRL;* Conc. pt. sol. perf. 20 mg/ml (fl. × 5 ml) ***(S)***

VEPESID *BRISTOL-MEYERS SQUIBB;* Cps. moi 50 mg sau 100 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Tumori testiculare refractare – în scheme polichimioterapice la pacienți care au efectuat trat. chirurgical, chimioterapic și radioterapie adecvate; tumori pulmonare cu celule mici – în scheme polichimioterapice; este eficient și în alte tipuri de carcinoame pulmonare; limfoame maligne hodgkiniene și non-hodgkiniene (în special cele histiocitare); leucemie acută non-limfocitară; cancer de sân tratat anterior; coriocarcinom placentar; sarcom Kaposi.
Dz: Int. în doză de 100-200 mg etopozidă/m^2 și zi timp de 5 zile (zilele 1-5 ale curei citostatice) sau 200 mg etopozidă/m^2 și zi, în zilele 1, 3 și 5; curele se repetă la fiecare 3-4 săpt., în asociere cu alte chimioterapice. Perfuzie iv. în ser fiziologic sau glucoză 5%, timp de aprox. 2 ore. Dozele uzuale sunt cuprinse între 50-120 mg/m^2 și zi, pentru o perioadă de 3-5 zile, consecutiv, în serii repetate la 14 zile funcție de protocolul utilizat. Curele se repetă după un interval de 14 zile. Doza totală uzuală pentru o cură i.v. este de 400 mg/m^2.
Cind: Hipersensibilitate la etopozidă.
AI: Se poate produce o mielosupresie severă urmată de infecții sau sângerări. Pacienții trebuie supravegheați atât pe durata terapiei cât și după oprirea acesteia (numărul trombocitelor, hemoglobina, numărul leucocitelor și formula leucocitară). Interacțiuni medicamentoase cu ciclosporina și vaccinuri cu germeni vii atenuați. Sarcină și alăptare. Șoferi și activități de precizie.
RA: Mielosupresie (leucopenii, trombocitopenii, leucemii acute), greață și vărsături, anorexie, stomatită, inflamația mucoasei digestive, esofagite ușoare sau severe, diaree, alopecie reversibilă, reacții de tip anafilactic, cazuri de hipertensiune arterială și/sau hiperemie, apnee, neuropatie periferică, somnolență și oboseală, toxicitate hepatică, gust neplăcut, febră, rash, pigmentație, prurit, urticarie, dureri abdominale, constipație, disfagie, cecitate tranzitorie și un singur caz de reactivare a unei radiodermite.

ETORICOXIBUM *COD ATC: M01AH05*

ARCOXIA® 60 mg; 90 mg; 120 mg *MERCK SHARP & DOHME;* Cpr. film. 60 mg; 90 mg; 120 mg, Ct. × 1 blist. × 7 cpr. film., ct. × 2 blist. × 7 cpr. film., ct. × 1 blist. × 14 cpr. film., ct. × 2 blist. a 14 cpr. film. ***(P-RF)***

Ind: Tratamentul simptomatic al bolii artrozice (BA), al poliartritei reumatoide și al durerii și semnelor inflamației asociate cu artrita gutoasă acută.
Dz: Administrare orală, cu sau fără alimente. Boală artrozică: 60 mg o dată pe zi. Poliartrită reumatoidă: 90 mg o dată pe zi. Artrită gutoasă acută: 120 mg o dată pe zi, în perioada cu simptomatologie acută. La pacienții cu clearance al creatininei ≥ 30 ml/min nu este necesară ajustarea dozei. La pacienții cu insuficiență hepatică ușoară (scor Child-Pugh 5-6) nu trebuie administrată o doză mai mare de 60 mg o dată pe zi. La pacienții cu insuficiență hepatică moderată (scor Child-Pugh 7-9) doza recomandată este de 60 mg în fiecare a doua zi.

Cind: Pacienți cu hipersensibilitate cunoscută la etoricoxib sau la oricare dintre excipienți. Ulcer peptic activ sau hemoragie gastrointestinală (GI) activă. Disfuncție hepatică gravă (scor Child-Pugh > 9). Pacienți cu clearance al creatininei estimat de < 30 ml/min. Pacienți care au prezentat semne de astm bronșic, rinită acută, polipi nazali, edem angioneurotic sau urticarie în urma administrării de acid acetilsalicilic sau a altor medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS). Gravide și femeile care alăptează. Copii și adolescenți cu vârsta sub 16 ani. Boală intestinală inflamatorie. Insuficiență cardiacă congestivă decompensată.

A!: Administrare cu prudență la pacienți cu boală cardiacă ischemică, antecedente de insuficiență cardiacă, insuficiență ventriculară stângă, hipertensiune arterială, edeme anterior începerii tratamentului, antecedente de boli cerebrovasculare, funcție renală alterată, antecedente de perforații gastrointestinale, ulcere și hemoragii digestive superioare, vârsta peste 65 de ani, disfuncție hepatică. Prudență la asocierea cu: Warfarină (monitorizarea INR), inhibitori ECA (mai ales la vârstnici sau pacienți cu funcție renală alterată), nu se recomandă asocierea cu acid acetilsalicilic sau alte AINS în doze mai mari decât cele folosite în profilaxia cardiovasulară, ciclosporină și tacrolimus (monitorizarea funcției renale), litiu (monitorizarea litemiei), metotrexat (monitorizarea toxicității metotrexatului, contraceptive orale, digoxină (monitorizare la pacienți cu risc crescut de toxicitate digitalică), rifampicină.

RA: Incidența reacțiilor adverse a fost evaluată utilizând următoarea scală: frecvente: > 1/100, < 1/10; puțin frecvente: > 1/1000, < 1/100; rare: > 1/10000, < 1/1000; foarte rare: < 1/10000. Puțin frecvente: gastroenterită, infecții respiratorii superioare, infecții ale tractului urinar, creșterea sau scăderea apetitului, edeme/retenție de lichide, creștere în greutate, anxietate, disgeuzie, insomnie, parestezii/hiperestezie, somnolență, depresie, scăderea performanțelor intelectuale, vedere neclară, insuficiență cardiacă congestivă, modificări nespecifice ale ECG, înroșirea feței, hipertensiune arterială, tuse, dispnee, epistaxis, echimoze, distensie abdominală, reflux acid, tulburări ale peristaltismului intestinal, constipație, uscăciunea gurii, ulcer gastroduodenal, sindrom de colon iritabil, esofagită, ulcer bucal, vărsături, edem al feței, prurit, rash, crampe/spasme musculare, durere/redoare musculoscheletală, proteinurie, creșterea azotului ureic sanguin, a creatininfosfokinazei, scăderea hematocritului, a hemoglobinei, hiperpotasemie, scăderea numărului de leucocite, de trombocite, creșterea creatininei serice, a acidului uric, dureri toracice. Frecvente: astenie/fatigabilitate, stare de curbatură, amețeli, cefalee, dureri abdominale, flatulență, pirozis, diaree, dispepsie, disconfort epigastric, greață, creșteri ale ALAT, ASAT. Foarte rare: hipersensibilitate medicamentoasă, infarct miocardic, accident cerebrovascular, perforație și sângerare gastrointestinală.

EXAMETAZIMUM

COD ATC: V09AA01
V09HA02

CERETEC *AMERSHAM PLC;* Liof. pt. sol. inj. 0,5 mg *(S)*

Ind: Scintigrafia cerebrală și marcare *in vitro* cu technețiu-99m a leucocitelor, leucocitele marcate fiind apoi reinjectate, efectuându-se ulterior scintigrafia pentru vizualizarea localizărilor acestora.

Dz: Pentru scintigrafia cerebrală, 350-500 MBq; pentru localizarea *in vivo* a leucocitelor marcate cu technețiu-99m, 200 MBq.

AI: Prudență la copii; sarcină și alăptare.
RA: Hipersensibilitate ușoară, manifestată prin apariția unui rash urticarian eritematos după inj. i.v. directă a produsului reconstituit.

EXEMESTANUM *COD ATC: L02BG06*

AROMASIN® *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Dj. 25 mg *(S/P-RF)*

Ind: Trat. cancerului de sân avansat, la femeile în postmenopauză naturală sau indusă, la care boala a progresat sub trat. antiestrogenic. Eficiența nu a fost demonstrată la pacientele a căror tumoră este lipsită de receptori estrogenici.
Dz: Doza uzuală este de 25 mg exemestan o dată/zi, atât timp cât este eficace (împiedică dezvoltarea tumorii).
Cind: Hipersensibilitate la exemestan. Premenopauză. Sarcină și alăptare.
AI: Statusul postmenopauză trebuie confirmat prin măsurarea concentrațiilor serice de LH, FSH și estradiol; prudență la pacienții cu IH sau IR; copii; șoferi și activități de precizie.
RA: Bufeuri, greață, oboseală, transpirație și amețeli. RA mai rare: cefalee, insomnie, durere, erupții cutanate, durere abdominală, anorexie, vomă, depresie, alopecie, edem periferic sau al membrelor inferioare, constipație și dispepsie. Au fost raportate ocazional trombocitopenie și leucopenie. Au fost observate ocazional creșteri ale enzimelor hepatice și ale fosfatazei alcaline.

EZETIMIBUM *COD ATC:C10AX09*

EZETROL *MERCK SHARP & DOHME;* Cpr. 10 mg

Ind: Hipercolesterolemie primară: în asociere cu un inhibitor de HMG-CoA reductază (statină), ca tratament adjuvant al dietei la pacienți cu hipercolesterolemie primară (heterozigotă familială și non-familială) la care tratamentul cu o statină în monoterapie nu oferă rezultate satisfăcătoare. Hipercolesterolemie homozigotă familială (HHoF): în asociere cu o statină ca terapie adjuvantă a dietei la pacienții cu HHoF. În monoterapie, ca terapie adjuvantă a dietei la pacienții cu hipercolesterolemie primară (heterozigotă familială și non-familială) la care tratamentul cu o statină este considerat neadecvat sau nu este tolerat. Sitosterolemie homozigotă (fitosterolemie): tratament adjuvant al dietei la pacienții cu sitosterolemie homozigotă familială.
Dz: Oral, 10 mg zilnic, asociat cu dietă corespunzătoare hipolipidică. Când se asociază cu sechestranți de acizi biliari, administrarea trebuie făcută fie cu ≥ 2 ore înainte sau cu ≥ 4 ore după administrarea acestuia. Copii și adolescenți ≥ 10 ani, nu este necesară ajustarea dozei.
Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții cu insuficiență hepatică ușoară (scor Child-Pugh 5-6). Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții cu insuficiență renală.
Cind: Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți. Tratamentul în asociere cu o statină este contraindicat în timpul sarcinii și

alăptării. Este contraindicată administrarea în asociere cu o statină la pacienții cu boală hepatică activă sau cu persistență inexplicabilă a valorilor crescute ale transaminazelor serice. Atunci când Ezetrol este administrat cu o statină, consultați rezumatul caracteristicilor produsului (RCP) al acelei statine.
A!: La administrarea în asociere cu o statină se va consulta RCP-ul statinei respective. Nu este recomandată utilizarea la pacienți cu insuficiență hepatică moderată sau severă. La asocierea cu o statină, la inițierea tratamentului și în concordanță cu recomandările statinei respective trebuie efectuate teste pentru evaluarea funcției hepatice. Nu este recomandată administrarea asociat cu fibrați. La gravide se administrează doar dacă este absolut necesar.
RA: Reacții adverse frecvente (≥ 1/100, < 1/10) la administrarea medicamentului singur: cefalee, dureri abdominale și diaree; asociat cu o statină: cefalee și oboseală, dureri abdominale, constipație, diaree, flatulență și greață, mialgii. Reacții adverse suplimentare raportate după punerea pe piață a produsului: rare (≥ 1/10000, <1/1000): hipersensibilitate, inclusiv angioedem și rash.

F

FAMCICLOVIRUM

COD ATC: J05AB09

FAMVIR *NOVARTIS PHARMA AG;* Cpr. 250 mg; Cpr. film. 500 mg ***(P-RF)***

Ind: Trat. formei acute a infecției cu *Herpes zoster*, reducerea perioadei de disconfort dată de nevralgia postherpetică, trat. formei acute de herpes genital și al herpesului genital recurent.
Dz: Adm. int. Infecțiile cu *Herpes zoster*: 250 mg de 3 ori/zi, cât mai devreme posibil, timp de 7 zile. Pentru pacienții considerați cu risc de dezvoltare a nevralgiei postherpetice 500 mg de 3 ori/zi, timp de 7 zile. Infecțiile genitale herpetice, primul episod: 250 mg de 3 ori/zi, timp de 5 zile. Infecțiile genitale herpetice recurente: 250 mg de 2 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la famciclovir, penciclovir sau la excipienți.
A!: Prudență la copii, tulburări funcționale renale, evitarea relațiilor sexuale, sarcină și alăptare.
RA: Cefalee și greață; rar: vomă, vertij, halucinații și stări confuzionale.

FAMOTIDINUM

COD ATC: A02BA03

FAMODAR 10; FAMODAR 20; FAMODAR 40 *DAR AL DAWA;* Cpr. film. 20 sau 40 mg ***(P-6L)***

FAMODIN 20; FAMODIN 40 *AC HELCOR SRL;* Cpr. film. 20 mg sau 40 mg ***(S/P-6L)***

FAMOSAN *ALKALOID AD;* Cpr. film. 20 mg sau 40 mg ***(P-6L)***

FAMOTAK *SEDICO;* Cpr. film. 20 mg sau 40 mg ***(P-6L)***

FAMOTIDIN *PROMEDIC SRL;* Dj. 20 mg ***(P-6L)***

FAMOTIDINĂ 20 mg; FAMOTIDINĂ 40 mg *SICOMED SA;* Cpr. film. 20 mg sau 40 mg ***(P-6L)***

FAMOTIDINA 40 mg *SINTOFARM SA* în colaborare cu *POLFA;* Cpr. film. 40 mg ***(P-6L)***

GASTROSIDIN *ECZACIBASI ILAC;* Cpr. film. 40 mg ***(P-6L)***

NOVO FAMOTIDINE *NOVOPHARM Ltd.;* Cpr. film. 20 mg sau 40 mg ***(P-6L)***

PANALBA *HELP PHARMACEUTICALS Ltd.;* Cpr. film. 40 mg ***(P-6L)***

QUAMATEL 20 mg; QUAMATEL 40 mg; *GEDEON RICHTER Ltd.;* Cpr. film. 20 sau 40 mg ***(P-6L);*** Pulb. liof. sol. inj. 20 mg ***(P-RF)***

QUAMATEL 20 mg; *GEDEON RICHTER Ltd.;* Liof./solv. pt. sol. inj. 20 mg ***(S/P-PR)***

ULCERAN - 40 *MEDOCHEMIE Ltd.;* Cpr. 40 mg ***(S/P-6L)***

ULFAMID *KRKA d.d.;* Cpr. film. 20 mg sau 40 mg ***(P-6L)***

Ind: Ulcer gastro-duodenal activ. Profilaxia recăderilor ulcerului duodenal. Esofagita de reflux. Sindrom Zollinger-Ellison, mastocitoză sistemică, sindrom de neoplazie endocrină multiplă. Hemoragie digestivă superioară. Trat. leziunilor gastro-duodenale și profilaxia acestora la pacienții cu risc.
Dz: *Intern:* Ulcer gastro-duodenal activ 40 mg famotidină, în priză unică, seara la culcare sau 20 mg de 2 ori/zi, dimineața și seara, timp de 4-8 săpt. Profilaxia recăderilor ulcerului duodenal: 20 mg, seara la culcare. Esofagita de reflux: 20 mg, de 2 ori/zi, dimineața și seara, timp de 4-8 săpt. Sd. Zollinger-Ellison: 20 mg, la intervale de 6 ore. IR severă 20 mg, seara la culcare. *Inj:* Cazurile severe: 20 mg i.v., de 2 ori/zi, la un interval de 12 ore. Sd. Zollinger-Ellison: 20 mg i.v., la un interval de 6 ore. În anestezia generală 20 mg i.v., în dimineața zilei intervenției chirurgicale sau cu cel puțin 2 ore înainte de începerea intervenției.
Cind: Hipersensibilitate la famotidină sau la oricare din componenții produsului.
A!: Verificarea benignității leziunii înaintea începerii trat., prudență în IR, copii, interacțiuni medicamentoase cu antiacidele gastrice; sarcină și alăptare.
RA: Rareori: cefalee, vertij, diaree, constipație, uscăciunea gurii, greață, vărsături, oboseală; excepțional - reacții alergice (rash, prurit, anafilaxie), creșterea nivelului transaminazelor serice.

FELODIPINUM

COD ATC: C08CA02

AURONAL 2,5 mg; AURONAL 5 mg; AURONAL 10 mg *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Cpr. elib. prel. 2,5 mg, 5 mg sau 10 mg ***(P-6L)***

FELOCORD 5 mg, 10 mg *PROMEDIC SRL;* Dj. 5 mg, 10 mg

FELOHEXAL 5 mg; FELOHEXAL 10 mg *HEXAL AG;* Cpr. film. cu elib. prel. 5 mg, 10 mg ***(OTC)***

FELOTARD® 2,5 mg; FELOTARD® 5 mg; FELOTARD® 10 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. film. cu elib. prel. ***(P-6L)***

PLENDIL *ASTRA ZENECA*; Cpr. film. ret. 2,5 mg, 5 mg sau 10 mg ***(P-6L)***

PRESID 2,5 mg; 5 mg; 10 mg *IVAX PHARMACEUTICALS;* Cpr. 2,5 mg, 5 mg, 10 mg ***(P-6L)***

Ind: HTA. Angină pectorală.
Dz: Inițial 5 mg zilnic (2,5 mg la vârstnici), doza de întreținere 5-10 mg zilnic.
Cind: Hipersensibilitate la felodipină, sarcină.
AI: Prudență la copii, poate precipita o hTA semnificativă, cu ischemie miocardică, interacțiuni medicamentoase cu inhibitorii enzimatici și inductorii enzimatici, alăptare.
RA: Înroșirea feței, cefalee, palpitații, obnubilare și oboseală; edeme, tumefiere moderată a mucoasei gingivale. Rar rash, prurit, cefalee, obnubilare, tahicardie, palpitații, sincopă, fatigabilitate. Izolat reacții de fotosensibilitate, artralgii, mialgii, parestezii, grețuri, vărsături, hiperplazie gingivală, creșterea valorii enzimelor hepatice, reacții de hipersensibilitate.

FENOFIBRATUM

COD ATC: C10AB05

FENOFIBRAT 100 mg; FENOFIBRAT 200 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cps. 100 mg respectiv 200 mg; ct. × 20 cpr. ***(S/P-6L)***

FENOFIBRAT LPH® 100 mg; FENOFIBRAT LPH® 200 mg; *LABORMED PHARMA SA;* Cps. 100 mg ***(P-6L)*** și 200 mg ***(S/P-6L)***

LICHOL *VIANEX SA;* Cps. 100 mg ***(P-6L)***

LIPANTHYL *LAB. FOURNIER SA;* Cps. micronizate 100 mg ***(P-6L)***

LIPANTHYL 200 M *LAB. FOURNIER SA;* Cps. micronizate 200 mg ***(P-6L)***

LIPANTHYL SUPRA 160 mg *LAB. FOURNIER SA;* Cpr. film. elib. modif. 160 mg ***(P-6L)***

LIPIVIM *VIM SPECTRUM SRL;* Cps. 200 mg ***(P-6L)***

LIPOFIB SR 250 mg *ETHYPHARM ambalat de TERAPIA SA;* Cps. cu elib. prel. ***(P-6L)***

LIPOFIB LPH® 100; 200 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cps. 100 mg, 200 mg ***(P-6L)***

Ind: Hipertrigliceridemie primară (de tip I); Disbetalipoproteinemia primară (tip III); Hiperlipidemia (tip II b) combinată cu hipercolesterolemie (tip II a).
Dz: 300-600 mg/zi divizate în 3 prize, în timpul meselor.
Cind: Hipersensibilitate la fenofibrat; IH și IR severe cu sindrom nefrotic sau ciroză biliară primară.
RA: Greață, vomă, diaree, colelitiază, eritem, prurit, dureri de cap, amețeli, mialgii.

FENSPIRIDUM

COD ATC: R03DX03

EURESPAL *LAB. SERVIER IND.;* Sirop 0,2% (fl. × 150 ml) ***(P-6L)***

EURESPAL 80 mg *LAB. SERVIER IND.;* Cpr. film. 80 mg ***(P-6L)***

Ind: Bronşită cronică cu sau fără insuficienţă respiratorie; simptome respiratorii sau ORL ale reacţiilor alergice; rinite alergice sezoniere şi perene; tratament de întreţinere în astmul bronşic necomplicat sau complicat.
Dz: *Adulţi*: doza uzuală recomandată este 160 mg fenspiridă pe zi, înainte de mese (dimineaţa şi seara). Dacă este nevoie de creşterea efectului şi/sau în afecţiunile acute, doza recomandată este de 240 mg fenspiridă pe zi (dimineaţa, la prânz şi seara). *Copii*: la copii se recomandă să se administreze sirop; între 0-24 luni sau o greutate de până la 10 kg: 4 mg/kg corp zilnic, adică 2-4 linguriţe de sirop (sau 10-20 ml) adăugate la un biberon. Peste 24 luni sau o greutate de peste 10 kg: 2-4 linguri de sirop (sau 30-60 ml) zilnic, înainte de mese.
Cind: Nu se cunosc.
A!: Administrarea fenspiridei nu trebuie să întârzie instituirea tratamentului antiinfecţios. Nu este recomandată administrarea fenspiridei în timpul sarcinii, deşi instalarea sarcinii în timpul tratamentului nu jusifică întreruperea acesteia. Nu se recomandă alăptarea în timpul tratamentului.
Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje: Fenspirida poate influenţa capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje, datorită posibilităţii apariţiei somnolenţei.
RA: Sunt posibile tulburări gastrointestinale (greaţă, vărsături, epigastralgii), somnolenţă. Rar poate să apară tahicardie moderată, care dispare la reducerea dozelor.

FENTANYLUM

COD ATC: N02AB03
N01AH01

DUROGESIC 25 g/h; DUROGESIC 50 g/h; DUROGESIC 100 g/h *JANSSEN PHARMACEUTICA;* Sist. transderm 2,5 mg/10 cmp ***(P-TS)***

FENTANYL *JANSSEN PHARMACEUTICA;* Sol. inj. 0,05 mg/ml (f. × 2 ml) ***(S)***

FENTANYL *GEDEON RICHTER Ltd.;* Sol. inj. 0,05 mg/ml (f. × 5 ml) ***(S)***

FENTANYL *POLFA;* Sol. inj. 0,05 mg/ml (f. × 2 ml sau f. × 10 ml) ***(S)***

FENTANYL–JANSSEN *JANSSEN PHARMACEUTICA;* Sol. inj. 0,05 mg/ml (f. × 10 ml) ***(S)***

Ind: Anestezia generală sau locală. Analgezia cu neuroleptice. Premedicaţie anestezică.
Dz: Doza se stabileşte individual. Se poate adm. i.m., i.v. şi în perfuzie: 0,002-0,05 mg/kg. Analgezia cu neuroleptice: 0,2-0,6 mg i.v. *Vârstnici:* doza va fi redusă. *Copii:* 0,002-0,003 mg/kg i.m.
Cind: Hipersensibilitate la fentanyl.
A!: Inducerea rigidităţii musculare poate fi evitată prin adm. i.v. lentă, premedicaţie cu benzodiazepine şi folosirea de miorelaxante. Prudenţă în deprimare respiratorie; complianţă intracerebrală compromisă; hipotiroidism necontrolat, afecţiuni pulmonare, rezervă respiratorie scăzută; alcoolism; funcţia hepatică şi renală alterată. Interacţiuni medicamentoase cu barbituricele, benzodiazepinele, neurolepticele, alcoolul, ritonavirul. Sarcină şi alăptare, şoferi şi activităţi de precizie.

RA: Depresie respiratorie, apnee, rigiditate musculară, mișcări mioclonice, bradicardie, hipotensiune (tranzitorie), greață, vărsături și amețeală. Rar: laringospasm; reacții alergice (cum ar fi anafilaxia, bronhospasmul, pruritul, urticaria) și asistolie; depresie respiratorie secundară, de rebound, după intervenția chirurgicală.

FENTICONAZOLUM

COD ATC: D01AC12
G01AF12

LOMEXIN *RECORDATI SpA;* Ovule 200 mg sau 600 mg; cremă vag. 2%; cremă 2% *(P-RF)*

LOMEXIN *LAB. FOURNIER SA;* Cremă vag. 2%; Ovule 600 mg *(P-RF)*

LOMEXIN T *RECORDATI SpA;* Ovule 1 g *(F-RF)*

Ind: *Ovule:* Candidoze genitale suprainfectate sau neinfectate cu bacterii gram-pozitive. *Cremă:* Candidoze cutanate, intertrigo (în special genito-crural, anal și perianal), onyxis și perionyxis, dermatofite ale pielii fără păr, pityriasis versicolor.
Dz: *Ovule:* 600 mg, la culcare, în doză unică. *Cremă:* 1-2 aplicații/zi (candidoze, intertrigo: 2-3 săpt.; onyxis și perionyxis: 2 luni; dermatofite: 2-6 săpt.; pityriasis versicolor 2-4 săpt.).
Cind: Hipersensibilitate la fenticonazol sau la alți imidazoli.
A!: Nu este recomandată folosirea prezervativelor, diafragmelor din cauciuc, spermicidelor, săpunului cu pH acid. Se evită contactul cu ochii. Prudență în sarcină.
RA: Foarte rar: manifestări de intoleranță locală: senzație de arsură, câteodată prurit, eritem. Posibilă alergie.

FERROCHOLINATUM

COD ATC: B03ABN1

FER-SOL *E.I.P.I.C.O.;* Sol. orală 24 mg fer/ml (fl. × 15 ml) *(P-6L)*

Ind: Trat. anemiei feriprive la copii. Profilaxia anemiei feriprive la nou-născuții prematuri.
Dz: *Adulți:* 6-10 mg fer/kg. *Copii sub 2 ani:* 9,6 mg fer de 3 ori/zi. *Copii între 2 și 6 ani:* 14,4 mg fer de 3 ori/zi. *Copii între 6 și 10 ani:* 19,2 mg fer de 3 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la fer citrat; anemie normocromă sau hipercromă (talasemia); anemie refractară, anemie prin insuficiență medulară, hipersideremii.
A!: Hiposideremia asociată cu sindroame inflamatorii nu răspunde la trat. cu fier; este necesar trat. etiologic al anemiei; control al eficacității trat. la 3 luni; interacțiuni medicamentoase cu tetracicline, difosfonați, penicilamină, tiroxină, fluorochinolone, antiacide.
RA: Tulburări gastrointestinale (greață, vărsături), reacții alergice, colorarea scaunelor în negru.

FERROSII FUMARAS

COD ATC: B03AA02

FERRONAT *IVAX PHARMACEUTICALS;* Susp. orală 3% (fl. × 100 ml) *(P-6L)*

Ind: Anemii feriprive (microcitare) posthemoragice, prin aclorhidrie, de sarcină, nutriționale ale sugarilor, secundare infecțiilor, infestării parazitare sau cancerului; anemii macrocitare tratate cu cianocobalamină; stări de sideropenie la copii în creștere, în caz de hemoragii cronice; pentru profilaxia carențelor de fier în sarcină, la copii, la donatori de sânge.
Dz: Int., la *adulți,* curativ, 300-600 mg/zi (pe stomacul gol sau, în caz de iritație gastrică, la mese). La *copii* sub 3 ani – 5 mg/kg și zi, 3-6 ani – 1/2 din doza adultului.
Cind: Hemocromatoză, hemoliză cronică, anemie sideroacrestică, anemia din intoxicația cu plumb, talasemie, boli hepatice grave, alergie sau intoleranță la fier; gastrite severe, ulcerații gastrice, varice esofagiene, diaree, colită ulceroasă, sindrom de malabsorbție intestinală (se recomandă fier injectabil).
A!: Hiposideremia asociată cu sindroame inflamatorii nu răspunde la trat. cu fier; este necesar trat. etiologic al anemiei; control al eficacității trat. la 3 luni; interacțiuni medicamentoase cu tetracicline, difosfonați, penicilamină, tiroxină, fluorochinolone, antiacide.
RA: Rareori greață, dureri epigastrice, constipație sau diaree (scaunul este colorat în negru), senzație de vertij, bufeuri de căldură.

FERROSII GLUCONAS

COD ATC: B03AA03

GLUCONAT FEROS *PHARMEX ROM IND.;* Cpr. 35 mg Fe ***(OTC)***

Ind: Anemii feriprive (microcitare) posthemoragice, prin aclorhidrie, de sarcină, nutriționale ale sugarilor, secundare infecțiilor, infestării parazitare sau cancerului; anemii macrocitare tratate cu cianocobalamină; stări de sideropenie la copii în creștere, în caz de hemoragii cronice; pentru profilaxia carențelor de fier în sarcină, la copii, la donatori de sânge.
Dz: *Adulți:* curativ 600-1200 mg gluconat feros/zi (72-144 mg fier); profilactic 100-300 mg gluconat feros/zi. *Copii:* 200-600 mg gluconat feros/zi; *sugari:* 150 mg/zi. Doza zilnică se fracționează în 3 prize, adm. în afara meselor (dacă se produc fenomene de iritație gastrică, se adm. la mese).
Cind: Hemocromatoză, hemoliză cronică, anemie sideroacrestică, anemia din intoxicația cu plumb, talasemie, boli hepatice grave, alergie sau intoleranță la fier; gastrite severe, ulcerații gastrice, varice esofagiene, diaree, colită ulceroasă, sindrom de malabsorbție intestinală (se recomandă fier injectabil).
A!: Hiposideremia asociată cu sindroame inflamatorii nu răspunde la trat. cu fier; este necesar trat. etiologic al anemiei; control al eficacității trat. la 3 luni; interacțiuni medicamentoase cu tetracicline, difosfonați, penicilamină, tiroxină, fluorochinolone, antiacide.
RA: Rareori greață, dureri epigastrice, constipație sau diaree (scaunul este colorat în negru), senzație de vertij, bufeuri de căldură.

FERROSII SULFAS

COD ATC: B03AA07

FERRO-GRADUMET *GALENIKA a.d.;* Cpr. ret. sulfat feros anhidru 325 mg, corespunzător la 105 mg Fe (II) ***(P-6L)***

FERRO-GRADUMET *ABBOTT LABORATOIRES Ltd.;* Cpr. ret. sulfat feros anhidru 325 mg, corespunzator la 105 mg Fe (II) ***(P-6L)***

Ind: Anemii feripive; cerințe crescute de fier; carență latentă de fier.
Dz: Se admin. oral 80-100 mg de 1-2 ori/zi, in funcție de gravitatea anemiei.
Cind: Hipersensibilitate la proteinsuccinilat de fer. Hemosideroză, hemocromatoză. Anemie aplastică, anemie hemolitică și anemie sideroacrestică. Pancreatită cronică. Ciroză hepatică.
A!: Hiposideremia asociată cu sindroame inflamatorii nu răspunde la trat. cu fier; este necesar trat. etiologic al anemiei; control al eficacității trat. la 3 luni; interacțiuni medicamentoase cu tetracicline, difosfonați, penicilamină, tiroxină, fluorochinolone, antiacide.
RA: Ocazional tulburări gastrointestinale ușoare (dureri gastrice, constipație, diaree, grețuri).

FERUCARBOTRANUM

COD ATC: V08CB03

RESOVIST *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Sol. inj. 0,5 mmol Fe/ml (seringă pre-umplută × 0,9 ml sau 1,4 ml) ***(S)***

Ind: Substanță de contrast pentru imagistica prin rezonanță magnetică (RMN) a leziunilor hepatice, atunci când examinarea fără substanță de contrast nu a oferit informatii certe.
Dz: *Adulți:* cu greutate < 60 kg: 0,9 ml (echivalent cu 0,45 mmol fer); pacienți cu greutate > 60 kg: 1,4 ml (echivalent cu 0,7 mmol fer). *Vârstnici, pacienți cu insuficiență renală sau hepatică:* nu sunt necesare ajustări ale dozei.
Cind: Hipersensibilitate la ferucarbotran sau la oricare dintre excipienți; hipersensibilitate la dextran. Nu există experiență clinică la pacienți cu vârsta sub 18 ani; de aceea, utilizarea la acești pacienți nu este recomandată.
A!: Ferucarbotranul nu trebuie folosit în timpul sarcinii decât dacă este absolut necesar. Nu se administrează în timpul alăptării decât în cazuri speciale. În acest caz alăptarea se întrerupe câteva zile.
RA: La pacienții cu teren atopic, incluzând antecedente de astm bronșic, este necesară atenție specială deoarece s-a observat că la aceștia incidența reacțiilor adverse este de 2 ori mai mare. Majoritatea reacțiilor adverse au fost de intensitate ușoară - moderată. *Organismul ca întreg și reacțiile la locul de injectare:* obișnuite: durere < 2%; neobișnuite: astenie, durere dorsolombară, reacții la locul injectării; rare: hipersensibilitate și anafilaxie. *Aparat cardiovascular:* obișnuite: vasodilatație < 2%; neobișnuite: durere precordială; rare: hipertensiune arterială, flebită. *Tract gastrointestinal:* neobișnuite: greață, vărsături. *Sistem nervos central:* obișnuite: parestezii < 2%; neobișnuite: cefalee; rare: hipoestezie, anxietate, amețeală, convulsii. Organe de simț: neobișnuite: modificarea gustului; rare: parosmie. *Aparat respirator:* rare: dispnee, tuse, rinită. *Tegumente:* neobișnuite: prurit, erupții cutanate; rare: eczemă, urticarie. Ocazional, poate să apară o creștere ușoară și tranzitorie a timpului parțial

de tromboplastină (TPT), în asociere cu scăderea activității factorului XI (scăderea maximă a fost în medie de 15 %), timpul Quick nemodificându-se. După administrare de ferucarbotran a fost observată o creștere dependentă de doză a sideremiei și a concentrației feritinei, cu atingerea unui nivel maxim după 24 ore, în timp ce capacitatea totală de legare a fierului nu a fost afectată. Ca și în cazul altor complexe paramagnetice, foarte rar s-au observat reacții de hipersensibilitate și anafilactice, inclusiv șoc, care necesită intervenție medicală de urgență.

FEXOFENADINUM

COD ATC: R06AX26

TELFAST 120 *LAB. AVENTIS PHARMA;* Cpr. film. clorhidrat de fexofenadină 120 mg, corespunzător la fexofenadină 112 mg ***(P-6L)***

TELFAST 180 *LAB. AVENTIS PHARMA;* Cpr. film. clorhidrat de fexofenadină 180 mg, corespunzător la fexofenadină 168 mg ***(P-6L)***

Ind: Trat. simptomatic al urticariei cronice idiopatice și rinitei alergice sezoniere.
Dz: Adm. orală 120-180 mg o dată/zi.
Cind: Hipersensibilitate la fexofenadină sau la oricare dintre excipienții produsului.
A!: Prudență la copii sub 12 ani; vârstnici; IR; IH; interacțiuni medicamentoase cu antiacide; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Cefalee, somnolență, greață, amețeli, oboseală; reacții de hipersensibilitate.

FILGRASTIMUM

COD ATC: L03AA02

NEUPOGEN *HOFFMANN-LA ROCHE;* Sol. inj. filgrastim 300 g/ml (f. × 1 ml) sau 480 g/ 1,6 ml (f. × 1,6 ml) ***(S/P-RF)***

NEUPOGEN *HOFFMANN-LA ROCHE;* Sol. inj. filgrastim 30 MU/ 0,5 ml sau 48 MU/0,5 ml (seringă pre-umplută × 0,5 ml) ***(S/P-RF)***

Ind: Reducerea duratei neutropeniei și a incidenței neutropeniei febrile, la pacienții tratați cu citostatice pentru cancere nemieloide și a neutropeniei după terapie mieloablativă, urmată de transplant medular; neutropenie severă congenitală, ciclică sau idiopatică.
Dz: Perf. i.v. sau s.c. 5-12 g/kg și zi, în funcție de indicație și situația clinică.
Cind: Hipersensibilitate la filgrastim; neutropenie congenitală severă (sindromul Kostmann) cu citogenetică anormală.
A!: Prudență la pacienții cu mielodisplazie; malignități mieloide; afectare severă renală sau hepatică; sarcină și alăptare.
RA: Durere osteo-musculară; tulburările urinare; hTA; creșterea reversibilă a nivelului LDH, FA, acidului uric, GPT; leucocitoză; tulburări vasculare (boală veno-ocluzivă și modificări de volum); alergii; splenomegalie; trombocitopenie; cefalee; diaree; anemie; epistaxis; scăderea glicemiei; reacții la locul injecției, hepatomegalie, artralgie, alopecie, osteoporoză și rash.

FINASTERIDUM

COD ATC: G04CB01
D11AX10

PROPECIA *MERCK SHARP & DOHME;* Cpr. film. 1 mg ***(P-6L)***

PROSCAR® *MERCK SHARP & DOHME;* Cpr. 5 mg ***(P-6L)***

Ind: Trat. și controlul adenomului de prostată.
Dz: Adm. orală 5 mg zilnic, înainte sau după ingestia de alimente.
Cind: Hipersensibilitate la finasterid; sarcină; finasterid nu este indicat la femei și copii.
A!: Monitorizare pentru uropatie obstructivă; tușeu rectal și ASP (modifică valorile reale ale ASP) periodic.
RA: Rar impotență, scăderea libidoului; scăderea volumului ejaculatului; dureri și creștere de volum la nivelul sânilor; reacții de hipersensibilitate.

FLECAINIDUM

COD ATC: C01BC04

TAMBOCOR 50 *3M MEDICA;* Cpr. acetat de flecainidă 50 mg ***(S/P-6L)***

TAMBOCOR 50 *3M HEALTH CARE Ltd.;* Cpr. 50 mg ***(S/P-6L)***

TAMBOCOR 100 *3M MEDICA;* Cpr. acetat de flecainidă 100 mg ***(S/P-6L)***

Ind: Trat. și prevenirea recidivelor în tahicardii ventriculare cu potențial letal, tahicardii ventriculare simptomatice și invalidante (în absența afectării funcției ventriculului stâng), tahicardii supraventriculare (în absența afectării funcției ventriculului stâng).
Dz: 100 mg de 2 ori/zi, dimineața, până la maximum 200 mg (excepțional până la 300 mg).
Cind: Hipersensibilitate la flecainidă; în primele 3 luni după un IMA sau în cazul unui debit cardiac redus (fracție de ejecție a ventriculului stâng sub 35%), cu excepția pacienților cu aritmii ventriculare care pun viața în pericol; IC severă, decompensată; șoc cardiogen, cu excepția celui datorat aritmiilor; bradicardie severă; tulburări de conducere atriale; tulburări de conducere atrioventriculară și/sau intraventriculară la pacienți fără stimulator cardiac implantat; boala nodului sinusal (sindromul bradicardie-tahicardie), la pacienți fără stimulator cardiac implantat; tulburări electrolitice (de exemplu hipo- sau hiperpotasemii); hTA severă.
A!: ECG standard la intervale de 1 lună sau, la nevoie, examen ECG de efort; prudență după implantarea unui stimulator cardiac; IR, IH; monitorizarea concentrației plasmatice a flecainidei; interacțiuni medicamentoase cu antiaritmice din clasa I, sultopridă, digoxină, cimetidină, betablocante, amiodaronă, digitalice, verapamil, diltiazem, antidepresive triciclice, anestezice locale, cărbune activat; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Tulburări cardiace (acutizări severe ale IC și șoc cardiogen), agravarea tulburărilor de conducere preexistente; bloc atrioventricular, bloc de ramură complet și permanent sau bloc interatrial; încetinirea conducerii; poate agrava tulburările de ritm preexistente sau poate provoca apariția unei noi tulburări de ritm); vertij, tulburări de vedere (diplopie, vedere încețoșată, diminuarea acuității vizuale), tremor, senzație de instabilitate, cefalee, stare de astenie,

scăderea libidoului, greață, uscăciunea gurii, tulburări de gust, creșterea enzimelor hepatice cu sau fără icter, febră, artralgii, mialgii, urticarie; leucopenie, trombocitopenie, pneumonie interstițială.

FLUCONAZOLUM

COD ATC: J02AC01

DIFLAZON *KRKA d.d;* Sol. perf. 2 mg/ml ***(S)***

DIFLAZON 50 mg; DIFLAZON 100 mg; DIFLAZON 150 mg; DIFLAZON 200 mg *KRKA d.d;* Cps. 50 mg, 100 mg, 150 mg sau 200 mg ***(P-RF)***

DIFLUCAN® *PFIZER H.C.P.;* Cps. 50 mg sau 150 mg ***(P-RF)***; Sol. perf. 2 mg/ml (fl. × 100 ml) ***(S)***; Pulb. pt. susp. orală 50 mg/5 ml sau 200 mg/5 ml (fl. pentru 35 ml susp.) ***(P-RF)***

FLUCORIC *RANBAXY LAB.;* Cps. 50 mg, 100 mg, 150 mg

FLUCOVIM 50; FLUCOVIM 100; FLUCOVIM 150 *VIM SPECTRUM SRL;* Cps. 50 mg, 100 mg sau 150 mg ***(P-RF)***

MYCOMAX 50; MYCOMAX 150 *LECIVA;* Cps. 50 mg sau 150 mg ***(P-RF)***

MYCOMAX SIR *LECIVA;* Sirop 5 mg/ml ***(P-RF)***

MYCOMAX INF *LECIVA;* Sol. perf. 2 mg/ml (fl. × 100 ml) ***(P-RF)***

MYCOSYST 50 mg; MYCOSYST 100 mg; MYCOSYST 150 mg; MYCOSYST 200 mg *GEDEON RICHTER Ltd.;* Cps. 50 mg, 100 mg, 150 mg sau 200 mg ***(P-RF)***

SYSCAN 100 *LAB. TORRENT Ltd.;* Cps. 100 mg ***(P-RF)***

Ind: Trat. în criptococoze, incluzând meningita criptococică și infecții cu alte localizări (ex. pulmonare, cutanate); trat. de întreținere pentru a preveni recidiva infecției criptococice la pacienții cu SIDA. Candidoze sistemice, incluzînd candidemia, candidozele diseminate și alte forme de infecții candidozice invazive. Candidoze ale mucoaselor. Candidoze genitale. Prevenirea infecțiilor fungice la pacienți cu neoplazii. Dermatomicoze incluzând tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor, tinea unguium (onicomicoze) și infecții dermice candidozice. Micoze endemice profunde incluzând coccidiomicoze, paracoccidio-micoze, sporotricoze și histoplasmoze la pacienți cu imunitate normală.

Dz: *Adulți:* meningite criptococice și infecții criptococice cu alte localizări – 400 mg în prima zi urmată de 200-400 mg în priză unică zilnic; durata trat.: 6-8 săpt., apoi profilactic 200 mg/zi. Pentru candidemie, candidoza diseminată și alte infecții candidozice invazive – 400 mg în prima zi, urmată de 200-400 mg zilnic. Pentru candidozele orofaringiene – 50 până la 100 mg o dată/zi timp de 7-14 zile. Pentru prevenirea recidivei candidozei orofaringiene la pacienții cu SIDA – 150 mg o dată pe săpt. Pentru candidoze vaginale – oral 150 mg fluconazol ca doză unică. În balanita candidozică – oral 150 mg fluconazol ca doză unică. Prevenirea candidozelor – 50 la 400 mg fluconazol o dată/zi. Pentru infecțiile dermice incluzând tinea pedis, corporis, cruris și infecțiile candidozice – 150 mg o dată pe săpt., sau 50 mg o dată/zi; durata trat. este de 2 la 6 săpt. Pentru tinea unghium – 150 mg oral o dată/săpt.

până la înlocuirea unghiei infectate. Pentru micoze endemice profunde: 200-400 mg zilnic timp de până la 2 ani. Durata trat. se stabilește individual, dar în general este de 11-24 luni în coccidiomicoze, 2-17 luni în paracoccidiomicoze, 1-16 luni în sporotricoze și 3-17 luni în histoplasmoze. Pentru ajustarea dozelor în funcție de vârstă și funcția renală.
Cind: Hipersensibilitate la fluconazol sau la alți compuși azolici înrudiți.
A!: Hepatotoxicitate: monitorizare a funcției hepatice; interacțiuni medicamentoase cu anticoagulante, sulfoniluree, hidroclorotiazidă, fenitoină, rifampicină, ciclosporină, teofilină, terfenadină, zidovudină; sarcină și alăptare.
RA: Greață, dureri abdominale, diaree, flatulență, rash, cefalee, modificări ale testelor funcționale renale, hematologice și hepatice, reacții cutanate exfoliative, contracturi musculare, leucopenie, trombocitopenie și alopecie; rare cazuri de anafilaxie.

FLUDARABINUM

COD ATC: L01BB05

FLUDARA *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Pulb. liof. pt. sol. inj. 50 mg *(S)*

FLUDARA® ORAL *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Cpr. film. 10 mg *(P-RF)*

Ind: Leucemie limfocitară cronică cu celule B, care nu a răspuns la trat. sau la care boala a progresat sub un trat. conținând cel puțin un agent alchilant standard.
Dz: Adm. i.v. 25 mg/ml, 5 zile consecutiv la fiecare 28 de zile. De obicei se vor adm. 6 cicluri.
Cind: Hipersensibilitate la componentele produsului, sarcină, alăptare, IR severă.
A!: Monitorizare neurologică, hematopoietică și renală; interacțiuni medicamentoase cu pentostatin, dipiridamol.
RA: Fenomene de aplazie medulară, febră, frisoane, infecții; în unele cazuri oboseală, anorexie, greață, vomă, stare de slăbiciune.

FLUDROCORTISONUM

COD ATC: H02AA02

ASTONIN-H *MERCK KgaA;* Cpr. 0,1 mg fludrocortizon *(P-RF)*

Ind: hTA constituțională (esențială). Sindromul ortostatic. hTA ortostatică idiopatică. Tulburări circulatorii periferice. Boala Addison. Sindromul adrenogenital.
Dz: *Adulți:* în hTA esențială și sindromul ortostatic se începe cu 0,2-0,3 mg/zi; după ameliorarea simptomelor se adm. 0,1-0,2 mg/zi. În boala Addison: 0,1-0,2 mg/ zi. În sd. adrenogenital: hidrocortizon 15-30 mg/m, asociat cu fludrocortizon. *Copii:* în general 0,1 mg/zi.
Cind: HTA, edeme, ateroscleroză cerebrală avansată.
A!: Prudență în sarcină și alăptare.
RA: Edeme (retenție de sodiu), HTA, cefalee.

FLUMAZENILUM *COD ATC: V03AB25*

ANEXATE *HOFFMANN LA ROCHE;* Sol. inj. flumazenil 0,1 mg/ml (f. × 5 ml) ***(P-RF)***

Ind: Combaterea efectelor sedative centrale ale benzodiazepinelor în anestezie și terapie intensivă (intoxicații cu benzodiazepine).
Dz: În anestezie doza inițială este de 0,2 mg, adm. i.v. în 15 secunde, apoi 0,1 mg repetat la nevoie, până la doza totală de 1 mg.
Cind: Hipersensibilitate la flumazenil.
A!: Prudență în sarcină.
RA: Rar, greață, vărsături; uneori, după adm. rapidă pot apărea: anxietate, palpitații.

FLUMETASONUM *COD ATC: D07AB03*

PIVALAT DE FLUMETAZON *ANTIBIOTICE IAȘI;* Ung. pivalat de flumetazon 0,02% (tub × 15 g) ***(P-RF)***
PIVALAT DE FLUMETAZON N *ANTIBIOTICE IAȘI;* Ung., Cremă ***(P-RF)***

Ind: Afecțiuni cutanate inflamatorii care răspund la corticosteroizi, neinfectate: eczeme seboreice, eczeme de contact, dermatite, fotodermite, psoriazis vulgar, lichen plan, neuro-dermatite localizate, lupus eritematos discoid.
Dz: Unguentul/crema se aplică în strat subțire pe zona afectată a pielii, repetând aplicația de 2-4 ori/zi.
Cind: Infecții bacteriene și virale ale pielii (ex., varicelă, erupții postvaccinale, herpes simplex, herpes zoster), afecțiuni micotice ale pielii, sifilis, tuberculoză cutanată, acnee rosacee, dermatite periorale, acnee vulgară, aplicații perioculare, hipersensibilitate la oricare din componenți.
A!: Prudență în trat. îndelungat, în special pe pielea feței; copii; pansamente ocluzive; sarcină și alăptare.
RA: Rar la locul aplicării: iritație, senzație de arsură, prurit sau erupție; izolat atrofie moderată a pielii; alergie de contact, modificări ale pigmentației pielii sau infecții secundare; după trat. îndelungat pe zone întinse, sub pansamente ocluzive se pot agrava vergeturile, telangiectazia, purpura, acneea steroidiană.

FLUNISOLIDUM *COD ATC: R03BA03*

BRONILIDE *BOEHRINGER INGELHEIM;* Aerosol presurizat dozat; conține flunisolidum hemihidrat 255 g/doză; fl. cu valvă dozatoare × 6 ml cu sau fără spacer (120 pufuri) ***(P-6L)***

Ind: Trat. profilactic în astmul bronșic persistent ușor, moderat, sever, astmul de efort.
Dz: *Adulți:* 0,5 mg flunisolide (2 pufuri) de 2 ori/zi, dimineața și seara, maxim 2 mg flunisolide/zi. *Copii de 6 ani și peste:* 0,5 mg (2 pufuri) de 2 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la flunisolide și la oricare dintre excipienți, tuberculoză pulmonară, infecții micotice, bacteriene sau virale, copii sub 6 ani.

A!: Flunisolidul nu este indicat pentru trat. crizei de astm; reducerea dozei de corticoizi sistemici se va face treptat; evitarea pulverizării produsului în ochi; aplicarea unei tehnici corecte de inhalare; inhalarea produsului înainte de masă și clătirea gurii după inhalare; prudență în sarcină și alăptare.
RA: Ușoară iritație a căilor aeriene superioare și tuse; bronhospasm paradoxal; răgușeală; candidoză oro-faringiană.

FLUNITRAZEPAMUM

COD ATC: N05CD03

FLUNITRAZEPAM 1 mg; FLUNITRAZEPAM 2 mg; *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. flunitrazepam 1 mg sau 2 mg ***(S/P-RF)***

NILIUM *HELP PHARMACEUTICALS Ltd.;* Cpr. 2 mg ***(P-RF)***

ROHYPNOL *HOFFMANN LA ROCHE;* Cpr film flunitrazepam 1 mg ***(P-RF)***

ROHYPNOL 1 mg *TERAPIA SA;* Cpr. film. flunitrazepam 1 mg ***(P-RF)***

Ind: Trat. de scurtă durată al insomniei, când tulburările sunt grave.
Dz: *Adulți:* 0,5-1 mg; în situații excepționale, doza poate fi mărită până la 2 mg. *Vârstnici:* 0,5 mg; în situații excepționale, doza poate fi mărită până la 1 mg. IR: reducerea dozelor în funcție de afectarea renală.
Cind: Miastenia gravis, hipersensibilitate la benzodiazepine, insuficiență respiratorie gravă, apnee, IH gravă, copii.
A!: Risc de dependență, doza va fi micșorată treptat; durata trat. nu va depăși 4 săpt.; amnezie anterogradă; reacții paradoxale; prudență în insuficiență respiratorie; alcoolism sau narcomanie în antecedente; interacțiuni medicamentoase cu alcool etilic, relaxante ale SNC, antipsihotice, hipnotice, anxiolitice/sedative, antidepresive, analgezice opioide, antiepileptice, anestezice și sedative, antihistaminice, inhibitorii enzimatici; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Somnolență în timpul zilei, detașare, vigilență scăzută, stări confuzionale, oboseală, cefalee, amețeală, slăbiciune musculară, ataxie sau diplopie; ocazional: tulburări gastrointestinale, modificări ale libidoului sau reacții cutanate; amnezie anterogradă; reacții paradoxale: neliniște, agitație, iritabilitate, agresivitate și în cazuri mai grave: manie, furie, coșmaruri, halucinații, psihoze, tulburări comportamentale.

FLUOCINOLONI ACETONIDUM

COD ATC: D07AC04

FLUOCINOLON ACETONID *LAROPHARM SRL;* Ung. 0,025% (tub × 20 g) ***(P-RF)***

FLUOCINOLON N *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cremă, Ung. ***(P-RF)***

Ind: Afecțiuni inflamatorii, pruriginoase și alergice ale pielii: dermatite alergice (eczemă, intertrigo, prurigo, neurodermită, dermatită seboreică, lichen plan, prurit ano-genital), psoriazis, lupus eritematos cronic; cheloide și cicatrice hipertrofice.
Dz: Se aplică ușor o cantitate mică la nivelul zonei afectate de 2-3 ori/zi și se masează.

Cind: Leziuni cutanate tuberculoase, micoze ale pielii și în majoritatea virozelor; acnee rozacee și vulgară, dermatita periorală, rash produs de scutece; hipersensibilitate la componentele cremei sau ale unguentului.
A!: Prudență în infecție asociată cu o afecțiune cutanată inflamatorie; folosirea îndelungată sau trat. unor zone mari poate produce hipercorticism; nu trebuie aplicat la nivelul feței; copiii sub un an; sarcină și alăptare.
RA: Iritare la locul aplicării, reacții de hipersensibilizare, striuri, subțierea tegumentului, telangiectazie sau atrofie.

FLUOCORTOLONUM *COD ATC: D07AC05*

ULTRALAN *SCHERING PLOUGH EUROPE AG;* Cremă 0,25% (tub × 15 g, 30 g sau 50 g); ung. 0,25% (tub × 15 g, 30 g sau 50 g) ***(P-RF)***

Ind: Dermatoze inflamatorii, alergice și pruriginoase: eczeme, dermatite diverse, neurodermite, prurigo, psoriazis, lichen plan, lupus eritematos discoid netuberculos; prurit anal și vulvar.
Dz: Se aplică local, pe piele, la început de 2-3 ori/zi, apoi o dată/zi.
Cind: Tuberculoză cutanată, leziuni sifilitice, varicelă, vaccină, zona zoster, herpes simplex, dermatită periorală, rozacee, acnee, hipersensibilitate la componentele produsului.
A!: Prudență în aplicarea pe față timp îndelungat; sarcină și alăptare.
RA: Rareori iritație locală, prurit, hipertricoză, foliculite, erupții acneiforme, dermatită periorală; aplicarea prelungită poate provoca atrofia locală a pielii, telangiectazii, purpură, vergeturi; dozele mari, aplicate pe suprafețe mari, pot fi cauză de fenomene de hipercorticism; rareori suprainfecții cu germeni rezistenți.

FLUORESCEINUM NATRIUM *COD ATC: S01JA01*

FLUORESCITE® *ALCON SRL;* Sol. inj. fluoresceină sodică 10% (f. × 5 ml) ***(S/P-RF)***

Ind: Angiofluorografiile sau angioscopiile în scop diagnostic, ale fundului de ochi sau ale vascularizației irisului.
Dz: Se injectează conținutul fiolei rapid în vena antecubitală, după luarea măsurilor pentru evitarea extravazării. Luminiscența apare în vasele retiniene și coroidiene în 9-14 secunde și poate fi observată cu echipamentul standard de vizualizare. *Copii:* 7,7 mg/kg.
Cind: Hipersensibilitate la fluoroсceină.
A!: Test intradermic înaintea injectării; a se evita extravazarea; prudență în istoric de alergie sau astm bronșic; colorație gălbuie a pielii și urinii; sarcină și alăptare.
RA: Greață și cefalee, disconfort gastrointestinal, sincopă, vomă, hTA, simptome și semne de hipersensibilitate; rar: stop cardiac, ischemie de arteră bazilară, șoc sever, convulsii, tromboflebită la locul injectării; erupție urticariană și prurit generalizat, bronhospasm și reacții anafilactice exacerbare a simțului gustativ.

FLUOROMETHOLONUM

COD ATC: S01BA07

FLUMETOL *FARMILA;* Susp. oft. 5 ml ***(P-RF)***

FLUMETOL S *FARMILA;* Susp. oft. 10 ml; Ung. oft. 0,1% ***(P-RF)***

FLUMETOL SEMPLICE *FARMILA;* Susp. oft. 0,2% (fl. × 10 ml) ***(P-RF)***

Ind: Afecțiuni inflamatorii ale segmentului anterior al ochiului precum și ale anexelor ochiului, conjunctivite, blefaroconjunctivite, keratite și keratoconjunctivite, episclerite și sclerite, dacriocistite, reacții postoperatorii.
Dz: Se instilează 1-2 picături colir în sacul conjunctival de 2-4 ori pe zi. Unguentul se aplică în sacul conjunctival de 1-2 ori pe zi.
Cind: Hipertensiune intraoculară; herpes simplu acut și cea mai mare parte a bolilor virale ale corneei în faza acută ulcerativă, exceptând asocierea cu chimioterapice antivirale; conjunctivite cu keratite ulcerative, încă din faza inițială (test la fluoresceină pozitiv). În cheratitele herpetice virale nu se recomandă utilizarea produsului. Tuberculoza oculară. Micoza oculară. Oftalmii purulente acute, conjunctivite purulente și blefarite purulente și herpetice care ar putea fi mascate sau agravate de corticosteroizi. Orjelet. Hipersensibilitate la unul dintre componenții produsului.
A!: În timpul tratamentelor prelungite se recomandă controlul frecvent al tensiunii intraoculare. Utilizarea prelungită ar putea produce glaucom, leziuni de nerv optic, deficite de acuitate și de câmp optic, formarea cataractei subcapsulare sau pot contribui la stabilizarea infecțiilor oculare secundare cu patogeni eliberați de țesutul ocular.
RA: Ocazional pot apărea senzații de arsură locală, iritații, fenomene de hipersensibilitate individuală la unul din componentele produsului.

FLUOROURACILUM

COD ATC: L01BC02

5-FLUOROURACIL „EBEWE" 250 mg; 500 mg; 1000 mg; 5000 mg *EBEWE PHARMA Ges. m.b.H. Nfg KG;* Conc. pt. sol. perf. 50 mg/ml (fl. × 5 ml, 10 ml, 20 ml sau 100 ml) ***(S)***

5 FU „LEDERLE" 250 mg; 500 mg; 1000 mg *WYETH LEDERLE PHARMA:* Sol. perf. 50 mg/ml (fl. × 5 ml, 10 ml sau 20 ml) ***(S)***

FLUOROSINDAN *SINDAN SRL;* Sol. inj. i.v. 50 mg/ml (fl. × 5 ml) ***(S)***

FLUROBLASTIN *SINDAN SRL în colaborare cu PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Sol. inj. i.v. 50 mg/ml (fl. × 10 ml sau 20 ml) ***(S)***

Ind: Trat. paleativ al tumorilor maligne, în special de rect, colon și sân, dar și gastrice, pancreatice, hepatice (tumori primare), uterine (în special de cervix), ovariene și de vezică urinară.
Dz: Maxim 1 g/zi. Trat. inițial: perfuzare: 15 mg/kg sau 600 mg/m^2 și zi în 4 ore. Injectare: 12 mg/kg sau 480 mg/m^2 și zi, 3 zile consecutiv. Trat. de întreținere: injectare: 5-10 mg/kg sau 200-400 mg/m^2 i.v., o dată/săpt. Trat. asociat cu alte citostatice: dozele recomandate trebuie reduse corespunzător.
Cind: Posibile infecții grave cu depresie a măduvei osoase, cu afectare gravă a funcției hepatice, cu status hematologic grav afectat, hipersensibilizare la fluorouracil.

A!: Prudență la pacienții cu risc, status nutrițional inadecvat, IR, IH, afectarea funcției măduvei hematogene, istoric de iradiere pelvică crescută sau folosire anterioară de agenți alchilanți, după intervenții chirurgicale majore; supraveghere atentă, numărătoarea leucocitelor cu formula leucocitară; sindrom de eritrodisestezie palmo-plantară; interacțiuni cu calciu leucovorin; copii, sarcină și alăptare.
RA: Stomatită și esofagofaringită, diaree, anorexie, greață și vomă; leucopenie; alopecie și dermatită; pancitopenie, trombocitopenie, agranulocitoză, anemie; ischemie miocardică; reacții alergice; sindrom acut cerebelos, nistagmus, cefalee; piele uscată; fisuri; fotosensibilitate, pigmentare venoasă, sindrom de eritrodisestezie palmo-plantară, manifestată ca parestezii ale mâinii și piciorului, urmate de durere, eritem și umflături; stenoză duct lacrimal, modificări vizuale, lăcrimare și fotofobie; dezorientare, confuzie, euforie; afectare hepatică; tromboflebită, epistaxis, modificări ale unghiilor (inclusiv pierderea lor).

FLUOXETINUM

COD ATC: N06AB03

ANXETIN *DAR AL DAWA;* Cps. fluoxetină 20 mg ***(P-RF)***

FLOXET *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Cps. 20 mg ***(P-RF)***

FLUOCIM *CIMEX Ltd.;* Cps. 20 mg ***(S/P-RF)***

FLUOHEXAL 20 *HEXAL;* Cps. 20 mg ***(P-RF)***

FLUOXETIN LPH® 20 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cps. 20 mg ***(P-RF)***

FLUOXIN *VIM SPECTRUM SRL;* Cps. 20 mg ***(P-RF)***

FLURAN *RANBAXY LAB.;* Cps. 20 mg ***(P-RF)***

FLUVAL 20 mg *KRKA d.d.;* Cps. 20 mg ***(P-RF)***

FRAMEX *GEDEON RICHTER Ltd.;* Cps. 20 mg ***(P-RF)***

MAGRILAN *MEDOCHEMIE Ltd.;* Cps. 20 mg ***(P-RF)***

PORTAL *LEK PHARMACEUTICALS;* Cps. 20 mg ***(P-RF)***

PROZAC *ELI LILLY;* Cps. fluoxetină 20 mg ***(P-RF)***

PROZAC *LABORATORIOS LILLY;* Cpr. disp. fluoxetină 20 mg ***(P-RF)***

Ind: Depresie: ca trat. simptomatic al bolii depresive, însoțită sau nu de anxietate, în special atunci când nu este necesară sedarea. Tulburări obsesiv-compulsive. Bulimie nervoasă. Tulburare disforică premenstruală (TDPM).
Dz: Depresie, însoțită sau nu de anxietate: 20 mg/zi. Tulburare obsesiv-compulsivă: 20-60 mg/zi. Bulimie nervoasă: 60 mg/zi. TDPM: 20 mg/zi. Trat. se adm. 6 luni, după care se evaluează necesitatea continuării terapiei. Toate indicațiile: Doza recomandată poate să fie crescută sau scăzută. Dozele mai mari de 80 mg/zi nu au fost evaluate sistematic.
Cind: Hipersensibilitate la fluoxetină.
A!: Prudență la copii; reacții alergice; convulsii în antecedente; antecedente de manie sau hipomanie; afectare hepatică; boli cardiace acute; diabet; ten-

tative de suicid; interacțiuni medicamentoase cu IMAO, carbamazepină, haloperidol, clozapină, diazepam, alprazolam, litiu, fenitoină și antidepresive triciclice (de exemplu imipramina și desipramina), tramadol, sumatriptan, litiu, triptofan, flecainidă, encainidă, vinblastină, anticoagulante și antiagregante, alcool etilic și preparatele medicinale de sunătoare; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie
RA: Reacții de hipersensibilitate, frisoane, sindrom serotoninic, fotosensibilitate; diaree, greață, vărsături, dispepsie, disfagie, modificarea gustului, uscăciunea gurii; rareori teste anormale ale funcției hepatice; foarte rar cazuri de hepatită idiosincrazică; cefalee, tulburări de somn, amețeală, anorexie, oboseală, euforie, fasciculații musculare, ataxie, tremor, mioclonie, convulsii și neliniște psihomotorie, halucinații, reacție maniacală, confuzie, agitație, anxietate și simptome asociate (nervozitate), tulburări de concentrare și de gândire (depersonalizare), atacuri de panică; retenție urinară, micțiuni frecvente; ejaculare întârziată sau absentă, lipsa orgasmului, priapism, galactoree; alopecie, căscat, tulburări de vedere, echimoze, transpirații, vasodilatație, artralgii, mialgii, hTA posturală; hiponatriemie.

FLUPENTIXOLUM

COD ATC: N05AF01

FLUANXOL DEPOT *H. LUNDBECK A/S;* Sol. inj. flupentixol decanoat 20 mg/ml (f. × 1 ml) ***(P-RF)***

Ind: Schizofrenie subacută și cronică (fără tulburări majore în sfera psihomotorie), stări paranoid-halucinatorii cronice, psiho-sindroame organice de tipul halucinozei etilice și psihozelor de involuție; pentru profilaxie în psihoza maniaco-depresivă.
Dz: I.m. 20-60 mg la fiecare 2-4 săpt.
Cind: Intoxicație acută cu deprimante centrale, stări de agitație marcată, sarcină, alergie la flupentixol.
A!: Prudență la bătrâni; IC; interacțiuni medicamentoase cu deprimante centrale, antihipertensive, alcool și levodopa; alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Diminuarea performanțelor psihomotorii, tulburări de somn (mai ales insomnie), uscăciunea gurii, tulburări de vedere, disurie (uneori, la începutul trat.), constipație, relativ frecvent hTA ortostatică; manifestări de tip extrapiramidal (la doze mari).

FLUPHENAZINUM

COD ATC: N05AB02

LYORODIN DEPOT *RODLEBEN PHARMA (JENNA);* Pulb. pt. sol. inj. 12,5 mg/ml (f. × 2 ml) ***(P-RF)***

Ind: Schizofrenie (mai ales forme paranoid-halucinatorii sau cu catatonie); hebefrenie, manie și hipomanie, depresii sau agitație; vomă centrală sau postoperatorie; premedicație în anestezie.
Dz: Psihoze: i.m. inițial 1 mg, apoi 2-10 mg/zi (fracționat, la 6-8 ore). Pentru combaterea vomei sau ca premedicație, 1-2 mg i.m. sau i.v. lent. Preparate retard: i.m. 10-15 mg la 10-25 zile.

Cind: Afecțiuni neurologice cu leziuni subcorticale, intoxicație cu hipnotice, stări de deprimare centrală, comă, discrazii sanguine, leziuni hepatice, IR, alergie la flufenazină sau alte fenotiazine; copii, bătrâni, ulcer, boli convulsive, miastenia gravis, boli cardiovasculare, feocromocitom, glaucom cu unghi îngust, adenom de prostată.
A!: Interacțiuni medicamentoase cu deprimante, atropină, antihipertensive, levodopa; prudență în sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Frecvent sindrom neuroleptic cu simptome extrapiramidale; rareori diskinezie tardivă persistentă (trat. prelungit cu doze mari); ocazional diminuarea potenței sexuale, constipație sau diaree, poliurie, tulburări vizuale, acrocianoză; la dozele mari: hTA ortostatică, vărsături, edeme, erupții cutanate alergice, chiar fenomene anafilactoide; rareori icter colestatic, discrazii sanguine (leucopenie, agranulocitoză, trombocitopenie, pancitopenie).

FLURBIPROFENUM

COD ATC: R07AX

STREPFEN® *BOOTS HEALTHCARE INT.;* Cpr. de supt 8,75 mg ***(P-6L)***

Ind: Tratamentul simptomatic al durerilor faringiene.
Dz: *Adulți și copii peste 12 ani*: un comprimat de supt la 3-6 ore, în funcție de gravitatea simptomelor; doza maximă este de 5 comprimate în 24 de ore. Este recomandat ca acest produs să se folosească pentru o perioadă de maximum 3 zile. *Copii*: nu este indicat copiilor sub 12 ani. *Vârstnici*: nu este necesară ajustarea dozei la această categorie de vârstă. Ca și în cazul altor comprimate de supt, pentru a se evita apariția iritațiilor locale se va schimba în permanență poziția comprimatului la nivelul cavității bucale.
Cind: Hipersensibilitate la flurbiprofen, acid acetilsalicilic, alte antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) sau la oricare dintre excipienți. Ulcer gastric activ sau în antecedente. Antecedente de bronhospasm, rinită sau urticarie asociate cu administrarea acidului acetilsalicilic sau a altor AINS.
A!: Bronhospasmul poate fi agravat la pacienții cu astm bronșic prezent sau în antecedente. Va fi folosit cu precauție la pacienții cu teren atopic. Prudență la pacienții cu afecțiuni renale, cardiace sau hepatice, antecedente de afecțiuni gastrice.
Flurbiprofen poate prelungi timpul de sângerare; se recomandă prudență la pacienții cu risc de hemoragii, în special la nivelul tubului digestiv.
Se recomandă evitarea administrării în timpul sarcinii și alăptării.
Efecte asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje: Poate produce vertij.
RA: Dispepsie, greață, vărsături, hemoragii gastro-intestinale, diaree, ulcerații ale mucoasei bucale, exacerbarea ulcerului gastric și perforație gastrică. Flurbiprofenul poate produce iritații tranzitorii ale mucoasei bucale cu tulburarea gustului. Reacții de hipersensibilitate: urticarie, angioedem, crize de astm, reacții anafilactice și erupții cutanate de diferite tipuri. Rar pot să apară reacții nervos centrale: vertij, cefalee. Foarte rar poate să apară afectare renală cu retenție hidrică și edeme, icter și trombocitopenie. Aceste efecte sunt, de obicei, reversibile la oprirea tratamentului. Foarte rar s-a raportat anemie aplastică și agranulocitoză asociate cu administrarea flurbiprofenului, fără a se stabili o relație de cauzalitate.

FLUTAMIDUM

COD ATC: L02BB01

FLUCINOM® *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Cpr. 250 mg ***(S/P-RF)***

FLUTAMIDA SINDAN 250 mg *SINDAN SRL;* Cpr. 250 mg ***(S/P-RF)***

FLUTAN *MEDOCHEMIE Ltd.;* Cpr. 250 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. cancerului prostatic avansat la pacienții netratați anterior sau la cei care nu au răspuns sau au devenit rezistenți la trat. hormonal; carcinom prostatic B2-C2 (T2b-T4).
Dz: Oral 250 mg de 3 ori/zi, la interval de 8 ore.
Cind: Hipersensibilitate la flutamidă sau la oricare dintre excipienți.
A!: Prudență în afectare hepatică; testarea periodică a funcțiilor hepatice; interacțiuni medicamentoase cu anticoagulante; sarcină și alăptare.
RA: Ginecomastie si/sau dureri ale sânilor, uneori însotite de galactoree; diaree, greață, vărsături, apetit crescut, insomnie, oboseală, afectarea tranzitorie a funcțiilor hepatice și hepatită; rare: scăderea libidoului, tulburări gastrice, anorexie, dureri similare celor din ulcerul gastroduodenal, precordialgii, constipație, edeme, echimoze, herpes zoster, prurit, sindrom lupuș-like, cefalee, vertij, slăbiciune, indispoziție, vedere încețoșată, sete, dureri toracale, anxietate, depresie, limfedem; reducere a numărului de spermatozoizi; au fost raportate: anemie hemolitică, anemie macrocitară, methemoglobinemie, sulfhemoglobinemie, reacții de fotosensibilitate - care includ eritem, ulcerații, erupții buloase și necroliză epidermală și modificarea culorii urinii în galben-portocaliu sau galben-verde, icter colestatic, encefalopatie hepatică și necroză hepatică; valori anormale ale testelor de laborator au inclus modificări ale funcțiilor hepatice, creșterea valorii ureei sanguine (BUN) și rar a creatininei serice.

FLUTICASONUM

COD ATC: D07AC17
R01AD08
R03BA05

CUTIVATE *GLAXO SMITHKLINE;* Ung. propionat de fluticazonă 0,005% (tub × 15 g); Cremă propionat de fluticazonă 0,05% (tub × 15 g) ***(P-RF)***

FLIXONASE™ *GLAXO SMITHKLINE;* Susp. nazală 50 µg/doză ***(P-RF)***

FLIXOTIDE® 125 INHALER *GLAXO SMITHKLINE;* Aerosol - susp. inhal. 125 g/doză ***(P-6L)***

FLIXOTIDE® 125 INHALER CFC-FREE *GLAXO SMITHKLINE;* Aerosol - susp. inhal. 125 g/doză (fl. presurizat × 60 sau 120 doze) ***(P-6L)***

FLIXOTIDE® 25 INHALER *GLAXO SMITHKLINE;* Aerosol - susp. inhal. 25 g/doză ***(P-6L)***

FLIXOTIDE® 250 INHALER *GLAXO SMITHKLINE;* Aerosol - susp. inhal. 250 g/doză ***(P-6L)***

FLIXOTIDE® 250 INHALER CFC-FREE *GLAXO SMITHKLINE;* Aerosol - susp. inhal. 250 g/doză (fl. presurizat × 60 sau 120 doze) ***(P-6L)***

FLIXOTIDE® 50 INHALER *GLAXO SMITHKLINE;* Aerosol - susp. inhal. 50 g/doză ***(P-6L)***

FLIXOTIDE® NEBULES® 0,5 mg/2 ml *GLAXO SMITHKLINE;* Susp. inhal. 0,5 mg/2 ml ***(P-RF)***

FLIXOTIDE® NEBULES® 2 mg/2 ml *GLAXO SMITHKLINE;* Susp. inhal. 2 mg/ 2 ml ***(P-RF)***

Ind: *Cremă și ung.:* trat. manifestărilor inflamatorii și pruriginoase ale dermatozelor sensibile la corticosteroizi: eczeme inclusiv eczema atopică, infantilă și discoidă (numulară); prurigo nodular; psoriazis (exclusiv psoriazis eritrodermic); neurodermatoze inclusiv lichenul simplu; lichenul plan; dermatite seboreice; dermatite de contact; lupus eritematos discoid; adjuvant al trat. sistemic cu steroizi în eritrodemia generalizată; reacții după înțepături de insecte. *Spray nazal:* profilaxia și trat. rinitelor alergice sezoniere, inclusiv febra fânului și al rinitelor perene. *Aerosol:* trat. profilactic în astmul ușor, moderat, sever.
Dz: *Cremă și ung:* se va aplica pe zona afectată un strat subțire de 2 ori/zi. *Spray nazal: adulți și copii peste 12 ani:* 2 pulverizări în fiecare nară o dată/zi, preferabil dimineața, maxim 4 pulverizări în fiecare nară/zi; *copii 4-12 ani:* o pulverizare în fiecare nară. *Aerosol: adulți și copii peste 16 ani:* 100 până la 1000 µg de 2 ori/zi; *copii peste 4 ani:* 50-100 µg de 2 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componentele produselor; *Cremă și ung.:* acnee rozacee; acnee vulgară; dermatite periorale; infecții virale cutanate primare; prurit perianal și genital.
A!: Prudență în sarcină și alăptare. *Cremă și ung.:* infecțiile leziunilor cutanate primare; copii sub 1 an; aplicarea de lungă durată, în doze mari și pe o suprafață corporală mare; aplicarea pe față; evitarea contactului cu ochii. *Spray nazal:* expunerea intensă la alergeni poate necesita un trat. adițional. *Aerosol:* monitorizare; tehnica de inhalare; tuberculoză activă sau reziduală.
RA: *Cremă și ung:* arsuri locale și prurit; tulburări trofice cutanate ca: subțieri, striații, dilatarea vaselor superficiale, hipertricoză și hipopigmentare; infecții secundare; hipercorticism după doze mari sau trat. pe suprafețe cutanate întinse. *Spray nazal:* uscăciunea și iritarea mucoasei nazale, gust și miros neplăcut, epistaxisuri. *Aerosol:* Candidoza bucală și laringiană, disfonie, bronhospasm paradoxal.

FLUTRIMAZOLUM *COD ATC: D01AC16*

MICETAL *CSC PHARMACEUTICALS/J. URIACH & CIA SA;* Sol. ext. 1% ***(P-RF)***

MICETAL CREMĂ *CSC PHARMACEUTICALS/J. URIACH & CIA SA;* Cremă 1% ***(P-RF)***

MICETAL GEL *CSC PHARMACEUTICALS/J. URIACH & CIA SA;* Gel 1% ***(P-RF)***

MICETAL SPRAY *CSC PHARMACEUTICALS/J. URIACH & CIA SA;* Spray ***(P-RF)***

Ind: *Gelul* este indicat pentru tratamentul topic al Pityriasis capitis (mătreață) și al dermatitei seboreice.
Crema este indicată pentru tratamentul următoarelor afecțiuni: micoze cutanate

superficiale cum sunt Tinea pedis (picior de atlet), Tinea cruris, Tinea corporis, Tinea facie și barbae și Tinea inguinalis provocate de specii de Trichophyton (de ex. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. tonsurans), specii de Microsporum (de ex. M. canis, M. gypseum) sau de Epidermophyton floccosum; candidoze cutanate, provocate de levuri din genul Candida (de ex. C. albicans, C. parapsilosis, C. guillermondii, C. tropicalis); Pitiriasis versicolor provocat de Malassezia furfur (Pityrosporum ovale).

Soluția de uz cutanat este indicată pentru tratamentul următoarelor afecțiuni: micoze cutanate superficiale cum sunt Tinea pedis (picior de atlet), Tinea cruris, Tinea corporis, Tinea facie și barbae și Tinea inguinalis provocate de specii de Trichophyton (de ex. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. tonsurans), specii de Microsporum (de ex. M. canis, M. gypseum) sau de Epidermophyton floccosum; candidoze cutanate, provocate de levuri din genul Candida (de ex. C. albicans, C. parapsilosis, C. guillermondii, C. tropicalis); Pitiriasis versicolor provocat de Malassezia furfur (Pityrosporum ovale).

Dz: *Adulți și copii peste 10 ani: Gelul* se aplică de 3 ori pe săptămână, timp de 4 săptămâni. Pe scalp și zona adiacentă se aplică o cantitate suficientă de gel, masând sau fricționând ușor. După 3-5 minute se îndepărtează prin spălare cu apă din abundență. Dacă după 4 săptămâni de tratament situația clinică nu se îmbunătățește, diagnosticul trebuie reevaluat.

Crema. La adulți se aplică local o dată pe zi, preferabil seara. O cantitate mică de cremă se aplică pe zona afectată și cea înconjurătoare. Durata tratamentului depinde de natura și localizarea infecției și de microorganismul implicat. Pentru prevenirea recidivelor se recomandă ca tratamentul să dureze 4 săptămâni pentru *Tinea pedis* și micoza interdigitală; 2-3 săptămâni pentru *Tinea corporis*; 1-2 săptămâni pentru *Pitiriasis versicolor*; 2-4 săptămâni pentru candidozele cutanate. Ameliorarea simptomatologiei clinice și calmarea pruritului apar din primele zile de tratament. Dacă după 4 săptămâni de tratament situația clinică nu se îmbunătățește, diagnosticul trebuie reevaluat. Pentru evitarea unei noi contaminări sau a reinfecției pacienții trebuie sfătuiți să respecte măsurile de igienă uzuală. *Copii:* Crema nu se folosește la copiii sub 10 ani.

Soluție de uz cutanat. La adulți și copii peste 10 ani soluția se aplică local o dată pe zi, preferabil seara. Se va aplica o cantitate suficientă pentru a acoperi întreaga zonă afectată și cea adiacentă la pacienții cu dermatofiție sau candidoză cutanată și pe întreaga suprafață a trunchiului la pacienții cu *Pitiriasis versicolor*. Durata tratamentului depinde de natura și localizarea infecției și de microorganismul implicat. Pentru prevenirea recidivelor se recomandă ca tratamentul să dureze: 4 săptămâni pentru tinea pedis și micoza interdigitală; 2-3 săptămâni pentru Tinea corporis; 1-2 săptămâni pentru Pitiriasis versicolor; 2-4 săptămâni pentru candidozele cutanate.

Cind: Hipersensibilitate la flutrimazol și la alte antifungice imidazolice sau la oricare dintre componenții produsului.

A!: Produsul este indicat numai pentru uz cutanat. Nu se aplică pe mucoase. Trebuie evitat contactul cu ochii. Dacă în timpul tratamentului apar fenomene de iritație sau de sensibilizare, tratamentul trebuie întrerupt și se face terapia adecvată. Nu se recomandă la copiii sub 10 ani. Precauție în sarcină și alăptare.

RA: În primele zile de tratament poate să apară local iritație sau prurit.

FLUVASTATINUM

COD ATC: C10AA04

LESCOL 20; LESCOL 40 *NOVARTIS;* Cps. fluvastatin 20 mg și 40 mg *(P-6L)*

LESCOL XL *NOVARTIS;* Cpr. elib. prel. 80 mg ***(P-6L)***

Ind: Hipercolesterolemia primară la pacienții care nu răspund în mod adecvat la regimul alimentar controlat.
Dz: Doza recomandată este de 20-40 mg o dată/zi, seara.
Cind: Hipersensibilitate la fluvastatin; boală hepatică activă sau cu creșteri persistente și neexplicate ale transaminazelor; copii; sarcină și alăptare; femeile fertile care nu adoptă precauții contraceptive adecvate.
A!: Dozări periodice ale lipidelor; teste funcționale hepatice înainte de începerea trat. și periodic în cursul acestuia; prudență în antecedente de hepatopatie sau alcoolism; mialgii difuze inexplicabile, sensibilitate sau slăbiciune musculară și cu creștere marcată a CPK de peste 10 ori limita superioară a normalului; afecțiune acută sau severă care predispune la apariția IR secundare rabdomiolizei; IR; interacțiuni medicamentoase cu colestiramină, imunosupresoare, gemfibrozil, acid nicotinic, eritromicină.
RA: Dispepsie, greață, insomnie, sinuzită, flatulență, dureri abdominale, hipoestezie, afecțiuni dentare și infecții ale tractului urinar.

FLUVOXAMINUM

COD ATC: N06AB08

FEVARIN *SOLVAY PHARMACEUTICALS BV;* Cpr. film. 50 mg sau 100 mg fluvoxamină ***(P-RF)***

Ind: Trat. tulburărilor depresive.
Dz: Doza inițială este de 50-100 mg, într-o singură priză, seara. Doza zilnică: 100-200 mg; doza maximă 300 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la fluvoxamină.
A!: Prudență în IH, copii, epileptici; interacțiuni medicamentoase cu IMAO, warfarină, fenitoină, teofilină, carbamazepină, antidepresive triciclice, litiu; sarcină și alăptare.
RA: Vedere încețoșată și uscăciunea gurii; greață, vărsături.

FOLLITROPINUM ALFA

COD ATC: G03GA05

GONAL-F 37,5 ui; GONAL-F 75 ui; GONAL-F 150 ui *SERONO;* Pulb. pt. sol. inj. folitropină alfa, hormon uman foliculostimulant recombinant (FSH) 37,5 ui, 75 ui, 150 ui ***(P-RF)***
Ind: Anovulație, stimularea dezvoltării multifoliculare. Bărbați cu hipogonadism hipogonadotrofic.
Dz: Inj. s.c. 75-150 UI FSH zilnic, crescând preferabil cu 37,5 UI sau 75 UI la intervale de 7 zile, sau mai bine de 14 zile dacă este necesar, pentru a obține un răspuns adecvat. După obținerea răspunsului optim, se adm. o injecție unică de 5000-10000 UI hCG la 24-48 ore de la ultima injecție de GONAL-F. Se recomandă ca pacienta să aibă contact sexual în ziua respec-

tivă și în cea care urmează adm. hCG. Bărbați cu hipogonadism hipogonadotrofic: 150 UI de 3 ori/săpt.
Cind: Hipersensibilitate la FSH, sarcină și alăptare, mărirea dimensiunilor ovarelor sau chisturi în afara ovarului polichistic, hemoragii genitale de etiologie necunoscută, carcinom ovarian, uterin sau mamar, tumori ale hipotalamusului și glandei hipofize.
A!: Trebuie evaluată infertilitatea cuplului, risc crescut de hiperstimulare, sindromul de hiperstimulare ovariană, monitorizarea atentă a răspunsului ovarian, riscul sarcinilor multiple.
RA: Reacții locale la locul injectării, durere în regiunea inferioară a abdomenului, posibil în asociere cu grețuri, vomă și creștere în greutate, tromboembolia arterială, ginecomastie, acnee și creșterea în greutate.

FOLLITROPINUM BETA

COD ATC: G03GA06

PUREGON 50 ui *N. V. ORGANON;* Sol. inj. 50 ui/0,5 ml (fl. × 0,5 ml) ***(P-RF)***

PUREGON 100 ui *N. V. ORGANON;* Pulb. liof. 100 ui; Sol. inj. 100 ui/0,5 ml (fl. × 0,5 ml) ***(P-RF)***

PUREGON 150 ui *N. V. ORGANON;* Pulb. liof. 150 ui (ct. × 1; 3; 5 sau 10 f. pulb. + 1; 3; 5 sau 10 f. solvent) ***(P-RF)***

Ind: Trat. infertilității la femei în anovulație și hiperstimularea ovariană controlată.
Dz: Anovulație: trat secvențial cu adm. 50 UI/zi până când creșterea foliculară și/sau concentrațiile plasmatice de estradiol indică un răspuns farmacodinamic adecvat. Hiperstimularea ovariană controlată doză inițială de 100-225 UI cel puțin în primele 4 zile, în general 75-375 UI pentru 6-12 zile. După aceea, doza trebuie ajustată individual, în funcție de răspunsul ovarian.
Cind: Tumori ale ovarului, sânului, uterului, hipofizei sau hipotalamusului, sarcină și alăptare, hemoragii vaginale de etiologie nediagnosticată; hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți; insuficiență ovariană primară; chisturi ovariene sau ovare mărite, fără legătură cu boala ovarelor; malformații ale organelor sexuale sau fibroame uterine, incompatibile cu sarcina.
A!: Trebuie exclusă prezența endocrinopatiilor non gonadale necontrolate, risc crescut de sarcini multiple și sarcini ectopice; evaluarea ultrasonografică a dezvoltării foliculare și determinarea nivelelor de estradiol trebuie efectuată înainte de trat. și la intervale regulate în timpul trat.; prudență în factor de risc pentru tromboză; interacțiuni medicamentoase cu clomifen și agoniști GnRH.
RA: Hiperstimulare ovariană nedorită, reacții la locul injectării, tromboembolii arteriale.

FORMESTANUM

COD ATC: L02BG02

LENTARON DEPOT 250 mg *NOVARTIS;* Pulb. pt. sol. inj. 250 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. cancerului mamar avansat pentru pacientele aflate în postmenopauză naturală sau indusă artificial.
Dz: 250 mg i.m., o dată la 2 săpt.

Cind: Status endocrin premenopauzal, hipersensibilitate la formestat, sarcină și alăptare.
A!: Evitarea inj. lângă nervul sciatic sau inj. intravasculară, prudență în IH, IR, diabet; șoferi și activități de precizie.
RA: Intoleranță locală; prurit, durere, iritație, senzație de arsură, umflătură dureroasă, granulom la locul injecției. Ocazional abces steril, inflamație la locul injecției, rash, prurit, exantem, tulburări vasomotorii, bufeuri, metroragii, crampe pelvine, colpită, greață, vărsături, constipație, crampe musculare, artralgii, durere în gât. Rar hematom la locul injecției, alopecie, hipertricoză facială, letargie, somnolență, cefalee, amețeli, labilitate emoțională, edem al membrelor inferioare, tromboflebită, senzație de slăbiciune datorită reacțiilor vaso-vagale, amețeală imediat după injecție, reacție anafilactică (rash, greață, vertij, tahicardie, oboseală).

FORMOTEROLUM

COD ATC: R03AC13

OXIS TURBUHALER 4,5 μg/doză; OXIS TURBUHALER 9 μg/doză *ASTRAZENECA;* Pulb. inhal. 4,5 g/doză sau 9 g/doză ***(P-6L)***

Ind: Trat. și profilaxia crizelor de bronhospasm.
Dz: *Adulți și vârstnici:* 4,5-9 g o dată sau de 2 ori/zi, maxim 18 g o dată sau de 2 ori/zi. *Copii peste 6 ani:* 4,5-9 g o dată sau de 2 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la formoterol.
A!: În cazul unei crize, se va adm. un beta 2-agonist cu durata scurtă de acțiune; prudență în tireotoxicoză; tulburări cardiovasculare severe (boala ischemică, tahiaritmii sau IC severă); interval QTc prelungit; diabet; hipokaliemie severă; IR, IH; interacțiuni medicamentoase cu betablocante, chinidină, disopiramid, procainamidă, fenotiazine, antihistaminice (terfenadina), IMAO, antidepresive triciclice, L-Dopa, L-tiroxina, oxitocina și alcoolul etilic; sarcină și alăptare.
RA: Uzuale: cefalee, palpitații, tremor; rare: agitație, stare de neliniște, tulburări de somn, crampe musculare, tahicardie, exantem, urticarie, prurit, bronhospasm, hipopotasemie; în cazuri izolate: grețuri, tulburări gustative, amețeală, angină pectorală, oscilații ale tensiunii arteriale și hiperglicemie. În timpul trat. cu beta$_2$-simpatomimetice pot apărea creșteri ale nivelului sanguin de insulină, acizi grași liberi, glicerol sau corpi cetonici.

FOSFESTROLUM

COD ATC: L02AA04

HONVAN *ASTA MEDICA;* Sol. inj. 60 mg/ml (f. × 5 ml) ***(S)***; Cpr. film. 120 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Neoplasm malign al prostatei.
Dz: *i.v.:* 550-1100 mg/zi primele 5 zile, apoi 275 mg o dată sau de 2 ori pe săptămână; oral: 150-600 mg/zi.
Cind: Nu se recomandă adm. i.v. lentă.
RA: Greață și vărsături (mai puțin severe decât cele induse de stilbestrol la doze echivalente); durere la locul injectării.

FOSFOCREATININUM

COD ATC: C01EB06

NEOTON *CSC PHARMACEUTICALS/ALFA WASSERMANN S.p.A;* Pulb. pt. sol. inj. i.v., flac. cu 1 g creatin fosfat sare de sodiu; ct. × un flac. de sticlă cu 1 g creatin fosfat sare de sodiu + un flac. de 50 ml cu solvent ***(S)***

Ind: Cardioprotector în chirurgia cardiacă, fiind adăugat în soluția cardioplegică. Dereglarea metabolică a miocardului în cazul ischemiei.
Dz: 1 flacon, 1 dată sau de două ori pe zi în funcție de indicațiile medicului, administrat în perfuzie i.v. timp de 35-45 minute.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută față de componentele medicamentului și în insuficiența renală cronică, când sunt utilizate doze mari (5-10 g/zi).
A!: Doze în exces de 1 g creatin fosfat, administrate i.v. rapid, pot conduce la scăderea presiunii sângelui. Administrarea de doze mari (5-10 g/zi) duce la creșterea cantității de fosfat introdusă, cu posibile influențe asupra metabolismului calciului și secreției hormonale ce reglează homeostaza calciului, funcția renală și metabolismul purinelor. Asemenea doze mari trebuie să fie administrate pacienților selectați cu grijă și pe perioade scurte.
RA: Nu se cunosc.

FOSFOMYCYNUM

COD ATC: J01XX01

MONURAL *INPHARZAM SA ZAMBON;* Gran. pt. susp. orală 3 g/plic ***(P-RF)***

UNIRYLE *LEK PHARMATECH;* Cpr. disp. 1 g ***(P-RF)***

Ind: Trat. infecțiilor acute necomplicate ale tractului urinar inferior determinate de germeni sensibili la fosfomicină, precum și profilaxia de scurtă durată (una sau două doze) a infecțiilor acute necomplicate ale tractului urinar inferior.
Dz: Oral, de preferat pe stomacul gol, înainte de a merge la culcare și după golirea vezicii urinare. *Adulți:* 3 g de fosfomicină, o singură dată (la nevoie, de 2 ori).
Cind: Hipersensibilitate la fosfomicină; IR severă.
A!: Prudență în sarcină și alăptare.
RA: Ocazional tulburări gastrointestinale (greață, diaree, pirozis); rar rash cutanat.

FOSINOPRILUM

COD ATC: C09AA09

MONOPRIL *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Cpr. 10 mg sau 20 mg ***(P-6L)***

Ind: Trat. HTA.
Dz: Doza inițială este de 10 mg. Doza de întreținere este de 10-40 mg.
Cind: Hipersensibilitate la fosinopril; antecedente de angioedem față de orice alt IEC; sarcină și alăptare.

A!: Terapia trebuie întreruptă imediat dacă apare angioedem; prudență în afecțiuni cardiace congestive, HTA renovasculară sau depleție de volum sau de electroliți; IR; riscul apariției hiperkaliemiei; interacțiuni medicamentoase cu diuretice, antiacide.
RA: Amețeli, tulburări respiratorii, tuse, tulburări gastrointestinale, palpitații/dureri ale pieptului, rash/prurit, dureri/parestezie a mușchilor scheletici, oboseală și perturbări ale simțului gustativ.

FOTEMUSTINUM *COD ATC: L01AD05*

MUSTOPHORAN *LAB. SERVIER IND;* Pulb. liof. pt. sol. inj. 200 mg ***(S)***

Ind: Melanom malign diseminat (localizări cerebrale).
Dz: Monochimioterapie: trat. de atac – 100 mg/m^2 – 3 adm. consecutive la o săpt. interval, urmat de un repaus de 4-5 săpt.; trat. de întreținere – 100 mg/m^2 – o adm. la 3 săpt. Polichimioterapie: a treia adm. a trat. de atac este suprimată.
Cind: Sarcină și alăptare.
A!: Nu se adm. la pacienții care au făcut un trat. chimioterapic la un interval mai mic de 4 săpt.
RA: La 4-5 săpt. de la adm.: trombopenie, leucopenie. La 2 ore de la adm. apar: greață, vomă. Mai rar: stări febrile, diaree, dureri abdominale, creșterea tranzitorie a ureei, prurit, tulburări neurologice tranzitorii (parestezii, stări de angoasă, tulburări de conștiență).

FRUCTOSUM *COD ATC: C01EB07*

FRUCTOSE 5% *INFOSINT;* Sol. perf. 5% ***(S)***

Ind: Hepatite acute și cronice, leziuni toxice hepatice.
Dz: Perf. i.v. 2000-3000 ml/ zi.

FURAZOLIDONUM *COD ATC: A07AXN0 G01AX06*

FURAZOLIDON *TERAPIA SA;* Cpr. 100 mg ***(S/P-RF)***

FURAZOLIDONA EEL *ARENA GROUP SA;* Cpr. 25 mg ***(P-RF)***

FURAZOLIDONA FORTE EEL *ARENA GROUP SA;* Cpr. 100 mg ***(P-RF)***

Ind: Toxiinfecții alimentare (salmoneloze), dizenterii bacilare, enterite infecțioase ale sugarului, lambliază, dizenterie amoebiană; activ față de numeroase tulpini de colibacili patogeni, salmonele, shigele, enterococi, stafilococi, ca și față de Trichomonas, Giardia și Entamoeba.
Dz: *Oral: Adulți:* 100 mg de 1-4 ori/zi; *Copii sub 1 an:* 8-16 mg de 4 ori/zi, *Copii 1-5 ani:* 25-35 mg de 4 ori/zi, *Copii peste 5 ani:* 50 mg de 4 ori/zi.

Cind: IR gravă, intoleranță la nitrofurani, copii sub o lună, deficit de G-6-PDH.
A!: Interacțiuni medicamentoase cu IMAO, simpatomimetice cu acțiune indirectă (amfetamină, efedrină), sedative, antihistaminice, tranchilizante și neuroleptice; prudență în sarcină și alăptare.
RA: Rareori cefalee, greață, vomă (la doze mari), erupții cutanate alergice, febră, artralgii, foarte rar agranulocitoză, anemie hemolitică (cei cu deficit de G-6-PDH); colorează urina în galben închis.

FURÔSEMIDUM *COD ATC: C03CA01*

FURIX RETARD 30 mg; FURIX RETARD 60 mg *NYCOMED;* Cps. ret. 30 mg sau 60 mg ***(S/P-6L)***

FURORESE *HEXAL AG;* Sol. inj. 10 mg/ml (f. × 2 ml, 4 ml sau 25 ml) ***(S/P-RF)***

FUROSEMID *SICOMED SA;* Sol. inj. 10 mg/ml (f. × 2 ml) ***(S/P-RF);*** Cpr. 40 mg ***(P-6L)***

FUROSEMID *OZONE LABORATORIES Ltd.;* Cpr. 40 mg ***(S/P-6L)***

FUROSEMID *AESCULAP SRL;* Cpr. 40 mg ***(P-6L)***

FUROSEMID LPH® 40 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. 40 mg ***(S/P-6L)***

FUROSEMID *MAGISTRA C & C;* Cpr. 40 mg ***(P-6L)***

FUROSEMID *BALKAN PHARMA DUPNITZA AD;* Cpr. 40 mg ***(P-6L)***

FUROSEMID *FARMACOM SA;* Cpr. 40 mg

FUROSEMID EEL *BIO EEL SRL;* Cpr. 40 mg ***(P-6L)***

FUROSEMIDĂ 40 mg *LAROPHARM SRL;* Cpr. 40 mg ***(P-6L)***

FUROSIL *SLAVIA PHARM SRL;* Cpr. 40 mg ***(P-6L)***

FUSID *TEVA;* Cpr. 40 mg ***(P-6L)***

LASIX *LAB. AVENTIS PHARMA;* Sol. inj. 10 mg/ml (f. × 2 ml) ***(S/P-RF);*** Cpr. 40 mg ***(P-6L)***

MED-FUROSEMID *MEDIPHARMA SERV SRL;* Cpr. 40 mg ***(P-6L)***

Ind: Trat. edemelor din IC, ciroză hepatică sau afecțiuni renale; formele ușoare și moderate de HTA; unele cazuri de IR acută cu oligurie.
Dz: *Adulți oral* 40-80 mg/zi, în 1-2 prize, mărit treptat, până la maximum 240 mg/zi, în 2-3 prize. În IR sunt necesare uneori doze mai mari: 500 mg - 1 g/zi. La *copii* doza este de 1-2 mg/kg/zi. *Adm. inj.:* 20-40 mg, i.v. repetat până la obținerea diurezei.
Cind: Hipersensibilitate la furosemidă sau alte sulfamide; obstacol al căilor urinare cu oligurie; hipovolemie cu deshidratare; intoxicație digitalică, alăptare.

A!: Controlul echilibrului electrolitic, glicemiei, ureei, creatininei din ser și al debitului urinar; se evită trat. prelungit, cu doze mari sau însoțit de o dietă prea strictă; ciroză hepatică; gută; sportivi; interacțiuni medicamentoase cu diuretice care rețin potasiul, tiazidice, antiinflamatoare nesteroidiene, corticosteroizi, substanțe de contrast iodate, antiaritmice, eritromicină, astemizol, bepridil, vincamină, digitalice, inhibitorii enzimei de conversie, fenitoină, curarizante, antibiotice aminoglicozidice, cefaloridină, cisplatină, neuroleptice, litiu, antiacide gastrice; sarcină.
RA: Deshidratare, hiperazotemie, hiponatriemie, hipopotasemie, hipovolemie cu hipotensiune ortostatică, encefalopatia hepatică, hipopotasemie cu sau fără alcaloză metabolică, tulburări de ritm grave, mai ales ventriculare, creștere a glicemiei, creștere a uricemiei, trombembolie, scăderea marcată a TA, până la colaps, cazuri rare de pancreatită, nefrită interstițială, erupții alergice cutanate, leucopenie, trombopenie, dureri lombare, surditate trecătoare sau definitivă.

FUSAFUNGINUM *COD ATC: R02AB03*

BIOPAROX® *LAB. SERVIER IND;* Aerosol 0,125 mg/doză ***(P-6L)***

Ind: Trat. local antibacterian și antiinflamator în afecțiuni ale căilor respiratorii superioare: rinită, rinofaringită, amigdalită și post-amigdalectomie, laringită, traheită, sinuzită.
Dz: *Adulți:* 4 pufuri oral și/sau în fiecare nară la intervale de 4 ore. *Copii:* 4 pufuri oral și/sau în fiecare nară la intervale de 6 ore.
Cind: Antecedente de alergie la medicament. Copii sub 12 ani.
A!: Trat. prelungit nu este justificat.
RA: Uscăciunea mucoasei buco-faringiene și nazale, înțepături, cazuri izolate de edem, eritem, bronhospasm, în special la pacienții cu teren alergic.

G

GABAPENTINUM *COD ATC. N03AX12*

GABAGAMMA 100; GABAGAMMA 300; GABAGAMMA 400 *WÖRWAG PHARMA GmbH&CO;* Cps. 100, 300 și 400 mg ***(P-6L)***

NEURONTIN *PFIZER H.C.P.CORPORATION;* Cps. 100 mg gabapentină; ct. × 2 blist. × 10 cps.; ct.. × 10 blist. × 10 cps. ***(P-6L)***

NEURONTIN *PFIZER H.C.P.CORPORATION;* Cps. 300 mg gabapentină; ct. × 5 blist. × 10 cps.; ct.. × 10 blist. × 10 cps. ***(P-6L)***

NEURONTIN *PFIZER H.C.P.CORPORATION;* Cps. film. 600 mg, 800 mg ***(P-6L)***

NEURONTIN *GODECKE PARKE DAVIS;* Cps. 400 mg gabapentină; ct. × 5 blist. × 10 cps.; ct. × 10 blist. × 10 cps. ***(P-6L)***

NEUROSTIM 400 mg *HELCOR SRL;* Cpr. film. 400 mg gabapentină; ct. × 4 blist. × 10 cps. ***(P-6L)***

NEUROSTIM 800 mg *HELCOR SRL;* Cpr. film. 800 mg gabapentină; ct. × 4 blist. × 10 cps. ***(P-6L)***

Ind: *Epilepsie:* ca monoterapie în trat. convulsiilor parțiale, cu/fără fenomene de generalizare secundară, la adulți și copii peste 12 ani. Siguranța și eficacitatea monoterapiei la copii cu vârsta sub 12 ani nu au fost încă determinate. În tratamentul asociat al convulsiilor parțiale, cu/fără fenomene de generalizare secundară, la adulți și copii începând cu vârsta de 3 ani. *Durerea neuropatică:* la adulți cu vârsta peste 18 ani.
Dz: *Epilepsie: Adulți și copiii peste 12 ani:* 900-3600 mg/zi. Inițial 300 mg de trei ori pe zi (TID) din prima zi, sau titrând doza astfel: în prima zi 300 mg în priză unică; a doua zi: câte 300 mg de două ori pe zi; a treia zi: câte 300 mg de trei ori pe zi. Apoi, doza poate fi crescută, cu adm. divizată în trei doze egale până la o doză maximă de 3600 mg/zi. Intervalul maxim între două adm., în cazul adm. a trei doze pe zi, nu trebuie să depășească 12 ore. *Copii* cu vârsta *între 3 și 12 ani:* 25-35 mg/kg/zi, divizat în trei prize egale (de 3 ori pe zi). Titrarea inițială până la o doză eficace poate fi făcută în trei zile, administrând 10 mg/kg/zi în prima zi, 20 mg/kg/zi în a doua zi și 30 mg/kg/zi în a treia zi. Apoi, doza poate fi crescută, cu adm. divizată în trei doze egale, până la doza maximă de 35 mg/kg/zi. Au fost bine tolerate doze de până la 40-50 mg/kg/zi. *Durerea neuropatică la adulți:* Doza inițială: 900 mg/zi, divizat în trei doze egale și titrat, dacă este necesar, în funcție de răspuns, până la o doză maximă de 3600 mg/zi. La pacienții cu funcția renală alterată se ajustează doza în funcție de clearance-ul creatininei.
Cind: Hipersensibilitate la gabapentin sau compușii produsului.
A!: Întreruperea bruscă a tratamentului poate duce la status epilepticus. Întreruperea sau înlocuirea tratamentului cu alt medicament antiepileptic trebuie făcută în mod treptat, timp de min. 1 săpt. Atenție la asocieri cu: antiacide conținând aluminiu și magneziu. Sarcină și alăptare.
RA: Durere abdominală, durere dorsală, oboseală, febră, cefalee, infecții virale, vasodilatație, constipație, anomalii dentare, diaree, dispepsie, creșterea apetitului, uscăciune oro-faringiană, greață și/sau vărsături, leucopenie, edeme periferice, fracturi, mialgii, confuzie, tulburări de coordonare, depresie, amețeli, dizartrie, labilitate emoțională, insomnie, nervozitate, somnolență, tremor, spasme, tuse, faringită, rinită, abraziuni, acnee, prurit, rash, ambliopie, diplopie, impotență.

GADODIAMIDUM

COD ATC: V08CA03

OMNISCAN *AMERSHAM HEALTH;* Sol. inj., 287 mg/0,5 ml gadodiamidă; ct. × 1 fl. × 5 ml; ct. × 1 fl. × 15 ml; ct. × 10 fl. × 15 ml; ct. × 10 fl. × 10 ml; ct. × 1 fl. × 20 ml; ct. × 10 fl. × 20 ml ***(S/P-RF)***

Ind: Imagistică prin rezonanță magnetică pentru cap și coloană vertebrală.
Dz: 0,1 mmol/kg (echivalent cu 0,2 ml/kg corp) până la 100 kg. La o greutate > 100 kg, 20 ml sunt de regulă suficienți.
Cind: Hipersensibilitate la gadodiamidă sau la excipienți; IR.
A!: Este necesar echipament pt. tratarea reacțiilor de hipersensibilitate; prudență în sarcină și alăptare.

RA: Disconfort, cu senzație generală de căldură, răcoare sau senzație de presiune locală sau durere la locul injectării; amețeală, greață, durere de cap și senzație modificată a gustului sau mirosului; reacții alergice, greață, somnolență, convulsii.

GADOBUTROLUM

COD ATC: V08CA09

GADOVIST® *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Sol. inj. 1,0 mmol/ml gadobutrol; ct. × 1 flac. × 30 ml sol. inj., ct. × 10 flac. × 30 ml sol. inj./flac. *(S)*

Ind: Îmbunătățirea contrastului în imagistica de rezonanță magnetică craniană și spinală (IRM); îmbunătățirea contrastului în angiografia prin rezonanță magnetică (CE-MRA). Indicații speciale în IRM spinală: diferențierea tumorilor intra- și extramedulare, identificarea zonelor cu tumori solide în cavitățile medulare cunoscute, determinarea diseminării tumorilor intramedulare.

Dz: Doza necesară se administrează intravenos în bolus. Metoda IRM cu contrast îmbunătățit poate începe imediat după aceea (la puțin timp de la injectare, în funcție de secvențele pulsului utilizate și de protocolul de examinare). Doza zilnică maximă studiată la om, 10,5 ml/kg, a fost bine tolerată. *Adulți,* IRM craniană și spinală: în doză de 0,1 ml/kg este suficient pentru diagnostic. Pentru excluderea metastazelor sau a tumorilor recidivante, în doză de 0,3 ml/kg conduce adesea la o precizie mai mare a diagnosticului.

Pentru investigațiile privind perfuzia cerebrală: se recomandă secvențele T_2^*-ponderate utilizate în asociere cu IRM cranială și spinală, pentru detectarea leziunilor în masă și a ischemiei focale fără suspectarea leziunilor în masă. Pentru aceste examinări, se recomandă utilizarea unui injector: 0,3 ml/kg (3-5 ml/secundă). CE-MRA: imaginea unui singur câmp vizual: 7,5 ml/kg sub 75 kg, 10 ml/kg pentru ≥ 75 kg (care corespunde la 0,1-0,15 mmol/kg); imaginea mai multor câmpuri vizuale: 15 ml/kg sub 75 kg, 20 ml/kg ≥ 75 kg (care corespunde la 0,2-0,3 mmol/kg).

Cind: Hipersensibilitate la gadobutrol sau la oricare dintre excipienții produsului.

A!: Pentru produse similare au fost raportate reacții anafilactice, care nu au putut fi excluse. La pacienții cu predispoziție la reacții alergice, decizia trebuie luată după o evaluare atentă a raportului risc potențial/beneficiu terapeutic. Starea de excitație marcată, durerea, anxietatea pot crește riscul reactiilor adverse. Precauții speciale la pacienți cu prag convulsivant scăzut. Utilizarea în timpul sarcinii se face numai dacă este absolut necesar. Alăptarea se întrerupe cel puțin 24 de ore după administrare. Atenție în insuficiența hepatică severă.

RA: Pacienții cu predispoziție la reacții alergice prezintă mai frecvent reacții de hipersensibilitate. În cazuri rare pot să apară reacții anafilactice însoțite de dispnee și de alte simptome care pot merge până la șoc. Similar altor medii de contrast, pot să apară reacții alergice întârziate (după ore sau zile). Ocazional, au fost observate reacții cutanate de tip alergic. Senzația de scurtă durată de rece (slabă până la moderată), de căldură sau durere la locul injectării reprezintă reacții posibile asociate cu puncția venoasă sau cu injectarea mediului de contrast. Ocazional, s-au observat greață și vărsături și, de asemenea, reacții de tip alergic cutanate și ale mucoaselor, cefalee pasageră și amețeli. Durere tisulară, cu durată de câteva minute la injectarea paravasculară. Senzații tranzitorii de gust sau miros pot să apară în timpul sau imediat după injecția în bolus.

GANCICLOVIRUM

COD ATC: J05AB06

CYMEVENE® *HOFFMANN LA ROCHE;* Pulb. pt. sol. inj. 500 mg ganciclovir; ct. × 1 fl. pulb. ***(S/P-RF)***

CYMEVENE® *HOFFMANN LA ROCHE;* Cpr. 250 mg ganciclovir; ct. × 1 fl. × 84 cps. ***(S/P-RF)***

Ind: Prevenirea și trat. infecției cu CMV la pacienții imunocompromiși.
Dz: *Inducție:* 5 mg/kg în p.i.v. de 1 oră, repetat la 12 ore, timp de 14-21 zile. *Întreținere:* 5 mg/kg p.i.v. de 1 oră, repetat la 24 ore, 7 zile/săpt., sau 6 mg/kg și zi, timp de 5 zile/săpt.; ajustarea dozei la cei cu IR.
Cind: Hipersensibilitate la ganciclovir sau aciclovir.
A!: Potențial factor teratogen și carcinogen; terapia nu trebuie inițiată dacă neutrofilia absolută este < 500 celule/µl, sau trombocitele < 25000 celule/µl; prudență în afectare renală; copii; vârstnicii; asocierea cu probenecid, zidovudină, didanosină, imipenem + cilastatin; sarcină și alăptare.
RA: Pacienții cu SIDA: leucopenie, anemie, trombocitopenie, diaree, greață, anorexie, vomă, astenie, suprainfecții, dureri abdominale, cefalee, inflamație la locul injectării, flebită. Pacienții cu transplante: hipercreatininemie. Alte RA: febră, durere generală, suprainfecții, celulită, edeme, modificări de laborator, durere toracică, frisoane, abces, hemoragie sau flebită la locul injectării, dureri de sân, fotosensibilitate, dispepsie, anomalii funcționale hepatice, eructații, ulcerații bucale, constipație, disfagie, incontinență fecală, anemie hipocromă, pancitopenie, depresie medulară, eosinofilie, parestezii, convulsii, somnolență, amețeală, anxietate, euforie, insomnie, ataxie, confuzie, uscăciunea gurii, hiperestezie, reacții maniacale, depresie, comă, nervozitate, psihoză, tremor, rash, prurit, alopecie, transpirații, acnee, herpes simplex, urticarie, afectarea vitrosului, durere oculară, ambliopie, orbire, conjunctivită, surzenie, dezlipire de retină, glaucom, creșterea creatininei, tromboflebită profundă, migrenă, vasodilatație, aritmie, HTA sau hTA, urinare frecventă, infecție urinară, IR, hematurie, uremie, scăderea glicemiei, miastenie, pancreatită, septicemie și insuficiență multiplă de organ.

GANIRELIXUM

COD ATC: H01CC01

ORGALUTRAN *N.V. ORGANON;* Sol. inj. 0,25 mg/0,5 ml ganirelix; ct. × 1 seringă preumplută; ct. × 5 seringi preumplute ***(P-RF)***

Ind: Prevenirea vârfurilor secretorii premature de hormon luteinizant, la femeile supuse hiperstimulării ovariene controlate în cadrul tehnicilor de reproducere asistată.
Dz: 0,25 mg s.c. o dată pe zi, începând cu ziua a 6-a a adm. de FSH.
Cind: Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți; hipersensibilitate la hormonul de eliberare a gonadotropinei (GnRH) sau la oricare alt analog GnRH; disfuncții moderate sau severe ale funcției hepatice sau renale; sarcină sau alăptare.
A!: Prudență în afecțiuni alergice grave; sindromul hiperstimulării ovariene (OHSS); greutate < 50 kg sau > 90 kg.
RA: Reacție cutanată locală la locul injectării; cefalee și greață; amețeli, astenie, dureri abdominale, OHSS, sarcină ectopică sau pierderea sarcinii.

GEMCITABINUM

COD ATC: L01BC05

GEMZAR *ELI LILLY;* Liof pt. sol. inj. 1 g clorhidrat de gemcitabină; ct. × 1 fl. pulb. ***(S)***

GEMZAR *ELI LILLY;* Liof pt. sol. inj. 200 mg clorhidrat de gemcitabină; ct. × 1 fl. pulb. ***(S)***

Ind: Cancerul pulmonar fără celule mici. Cancer pancreatic: adenocarcinom local avansat sau metastatic al pancreasului.
Dz: *Cancer pulmonar fără celule mici:* monoterapie: 1000 mg/m^2, în perf i.v. 30 de min, repetată o dată pe săpt. timp de 3 săpt., urmată de o pauză de o săpt. În asociere (cu cisplatin): 1250 mg/m^2, în perf. i.v. 30 de min, în zilele 1 și 8 ale fiecărui ciclu de 21 zile. *Cancer de pancreas:* 1000 mg/m^2, în perf. i.v. 30 de min, repetată o dată pe săpt. timp de până la 7 săpt., urmată de o pauză de o săpt.
Cind: Hipersensibilitate la gemcitabină.
A!: Monitorizare hematologică, renală și hepatică; interacțiuni cu radioterapia; sarcină și alăptare.
RA: Anemie, leucopenie și trombocitopenie, anormalitățile testelor funcției hepatice, grețuri, vărsături, diaree, stomatită, proteinurie și hematurie ușoară, rash, alopecie, dispnee, bronhospasm, pneumonie interstițială, febră, cefalee, frisoane, mialgii, astenie și anorexie, tuse, rinită, reacție anafilactoidă, edeme periferice, sindrom hemolitic uremic.

GEMFIBROZILUM

COD ATC: C10AB04

INNOGEM *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Cps. 300 mg gemfibrozil; ct. × 10 blist. × 10 cps. ***(P-6L)***

IPOLIPID *MEDOCHEMIE Ltd.;* Cps. 300 mg

Ind: Tulburări lipidice: Fredrickson tip II A, II B, III, IV, V. Hiperlipidemie asociată cu diabet zaharat. Xantom asociat cu hiperlipidemie. Prevenirea maladiei coronariene.
Dz: 1200 mg/zi în 2 doze adm. cu 30 de min. înainte de masa de dimineață și de seară. Doza poate varia: 900-1500 mg/zi pentru rezultate satisfăcătoare.
Cind: Pacienți cu disfuncție hepatică și/sau renală.
A!: La pacienții care primesc anticoagulante (doza de anticoagulante trebuie redusă la jumătate) pentru menținerea timpului protrombinei la nivelul dorit.
RA: Tulburările gastrointestinale.

GENTAMICINUM

COD ATC: J01GB03
S01AA11

DIAKARMON *HELP PHARMACEUTICALS;* Sol. inj. 40 mg/ml gentamicină; ct. × 50 f. × 2 ml ***(S)***

GENTAMED *MEDOCHEMIE Ltd.;* Sol. inj. 40 mg/ml gentamicină; ct. × 10 f. × 2 ml ***(P-RF)***

GENTAMICIN *LEK PHARMACEUTICALS;* Sol. inj. 20 mg/ml, 40 mg/ml gentamicină; ct. × 2 blist. × 5 f. × 2 ml ***(P-RF)***

GENTAMICIN *CHINOIN PHARMA AND CHEM. WORKS;* Sol. inj. 20 mg/ml gentamicină; ct. × 10 f. × 2 ml ***(P-RF)***; ct. × 25 f. × 2 ml ***(S)***

GENTAMICIN *CHINOIN PHARMA AND CHEM. WORKS;* Sol. inj. 40 mg/ml gentamicină; ct. × 10 f. × 2 ml ***(P-RF)***; ct. × 25 f. × 2 ml ***(S)***

GENTAMICIN *SHIN POONG PHARM;* Sol. inj. 40 mg/ml gentamicină; ct. × 50 f. × 2 ml ***(S)***

GENTAMICIN *BELUPO;* Sol. inj. 1 ml conține 10 mg gentamicină; ct. × 10 f. × 2 ml ***(P-RF)***

GENTAMICIN LEK 80 mg/2 ml *LEK PHARMACEUTICALS;* Sol inj. i.v. și i.m. 80 mg/2 ml ***(S/P-RF)***

GENTAMICIN "SANDOZ" 40 mg; GENTAMICIN "SANDOZ" 80 mg *SANDOZ GmbH;* Sol. inj. 40 mg și 80 mg ***(S/P-RF)***

GENTAMICINE LEURQUIN 80 mg *LAB. LEURQUIN MEDIOLAN.;* Sol. inj. 40 mg/ml gentamicină; ct. × 1 fl. × 2 ml ***(P-RF)***; ct. × 100 fl. × 2 ml ***(S)***

GENTAMYCIN *KRKA d.d.;* Sol. inj. 40 mg/ml gentamicină; ct. × 10 f. × 1 ml; ct. × 10 f. × 2 ml ***(P-RF)***; ct. × 50 f. × 2 ml ***(S)***

GENTAMYCIN „BIOCHEMIE" *BIOCHEMIE;* Sol. inj. 40 mg/ml sulfat de gentamicină; ct. × 50 f. × 1 ml; ct. × 50 f. × 2 ml ***(S)***

GENTAMYCIN SULPHATE *E.I.P.I.C.O.;* Sol. oft. 0,5% sulfat de gentamicină (echiv. cu 0,3% gentamicină bază); ct. × 1 fl. × 10 ml ***(P-RF)***

GENTICOL *S.I.F.I.;* Sol. oft. 0,5% sulfat de gentamicină (echiv. cu 0,3% gentamicină bază); ct. × 1 fl. × 10 ml + disp. picurare ***(P-RF)***

GENTICOL *S.I.F.I.;* Ung. oft. 0,5% sulfat de gentamicină (echiv. cu 0,3% gentamicină bază); ct. × 1 tub × 10 g ***(P-RF)***

LYRAMYCIN *M/S LYKA LABS;* Sol. parent. 40 mg/ml gentamicină; ct. × 10 fl. × 2 ml ***(P-RF)***

OPHTAGRAM *LAB. CHAUVIN;* Sol. oft. 0,5% gentamicină; ct. × 1 fl. × 5 ml ***(P-RF)***

OPHTAGRAM *LAB. CHAUVIN;* Ung. oft. 0,3% gentamicină; ct. × 1 tub × 0,5 g ***(P-RF)***

PAN-GENTAMICINE *PANPHARMA;* Sol. parent. 80 mg/ml gentamicină; ct. × 1 fl. × 2 ml; ct. × 10 f. × 2 ml ***(P-RF)***

Ind: *Adm. inj.:* infecții provocate de germeni sensibili (E. coli, Proteus, Shigella, Salmonella, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Providencia, Haemophilus, gonococi și stafilococi, incluzând pe cei rezistenți la penicilină) ale tractului respirator, căilor urogenitale, oculare severe, în urma arsurilor grave, septicemii și intra-spitalicești. *Adm. ext.:* trat. local al infecțiilor bacteriene ale polului anterior al ochiului și profilactic în traumatisme și intervenții chirurgicale oftalmologice, trat. infecțiilor conductului auditiv extern.

Dz: *Adm. inj.:* 2-3 mg/kg și zi în 2-3 prize, până la 5 mg/kg și zi, repartizate în 3-4 prize. *Oftalmic:* 1-3 picături se instilează în sacul blefaro-conjunctival de 3-4 ori/zi. *Auricular:* se instilează 2-4 picături de 3-4 ori/zi și o dată în cursul nopții.
Cind: Hipersensibilitate la gentamicină sau aminoglicozide.
A!: Prudență în IR, boli neuromusculare, afecțiuni vestibulare sau/și cohleare, vârstnici; monitorizare renală, vestibulară și cohleară, hepatică, hematologică; interacțiuni medicamentoase cu alte substanțe ototoxice și/sau nefrotoxice, blocanți neuromusculari, alte antibiotice aminoglicozide; sarcină și alăptare.
RA: Alterarea funcțiilor nervului vestibular (vertij, tinitus, nistagmus, sindrom Ménière și tulburări de echilibru), nervului cohlear (hipoacuzie la tonuri înalte, rar surditate completă), nefrotoxicitate, neuropatie periferică (parestezii faciale și ale extremităților, tremor și spasm muscular), reacții alergice, tulburări hematologice, suprainfecții, febră medicamentoasă, greață, vărsături, scădere ponderală, alopecie, hipersalivație, fibroză pulmonară, hTA sau HTA, dureri localizate la locul injectării. La doze extrem de mari pot surveni blocaje neuromusculare și paralizii ale musculaturii respiratorii.

GINKGO BILOBA *COD ATC: N06DX02*

BILOBIL® *KRKA d.d.;* Cps. 40 mg extract standardizat de Ginkgo Biloba; ct. × 2 blist. × 10 cps.; ct. × 6 blist. × 10 cps. ***(P-6L)***

GINKO BILOBA *BIOFARM SA;* Cpr. cu extract standardizat Ginko Biloba 24% gingkoflavone și 6% terpene lactone (ct. × 2 blist. × 15 cpr.).

GINKO BILOBA *LAROPHARM SRL;* Cps. 40 mg

GINKOGINK *LAB. URPAC ASTIER;* Cpr. 40 mg extract standardizat de Ginkgo Biloba; ct. × 3 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

GINKOGINK *LAB. URPAC ASTIER;* Cpr. 40 mg extract standardizat de Ginkgo Biloba; ct. × 3 blist. × 10 cpr.; ct. × 9 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

GINKOGINK *LAB. URPAC ASTIER;* Sol. orală 40 mg/ml extract standardizat de Ginkgo Biloba; ct. × 1 fl. × 90 ml; ct. × 1 fl. persurizat × 150 ml ***(P-6L)***

FLAVOTAN 40 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cps. 40 mg extract standardizat de Ginkgo Biloba ***(OTC)***

TANAKAN (EGB 761) *IPSEN BIOTECH;* Cpr. film. 40 mg extract standardizat de Ginkgo Biloba; ct. × 2 blist. × 15 cpr., film. ***(P-6L)***

TANAKAN (EGB 761) *IPSEN BIOTECH;* Sol. orală 40 mg/ml extract standardizat de Ginkgo Biloba; ct. × 1 fl. × 30 ml ***(P-6L)***

Ind: Trat. tulburărilor psihocomportamentale la vârstnici și al claudicațiilor intermitente din arteriopatiile cronice obliterante ale membrelor inferioare (stadiul 2).
Dz: 120 mg/zi, p.o, în timpul mesei.
Cind: Hipersensibilitate la extract standardizat de Ginkgo Biloba sau la celelalte componente ale produsului.

A!: Prudență în sarcină și alăptare.
RA: Rareori pot să apară tulburări digestive, cefalee, erupții cutanate.

GLATIMER ACETAT

COD ATC: L03AX13

COPAXONE *TEVA;* Pulb. liof. pt. sol. inj. 20 mg acetat de glatimeră; ct. × 7 fl. pulb. + 7 f. × 1 ml solv. ***(S)***

Ind: Reducerea frecvenței recăderilor la pacienții cu scleroză multiplă (SM), la care alternează episoadele de recădere cu cele de remisiune.
Dz: *Adulți:* - 20 mg, s.c. (braț, abdomen, șold și coapse) o dată pe zi, la aceeași oră. Este destinat trat. pe termen lung și nu se va întrerupe adm. fără indicația medicului. Utilizare la *copii, vârstnici:* Nu s-a studiat utilizarea specifică.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la acetat de glatimeră sau manitol. Sarcină și alăptare.
A!: Adm. exclusiv s.c. Nu se adm. pe cale i.v.
RA: În mod obișnuit: reacții locale la locul injectării. Ocazional: vasodilatație, dureri toracale, tahicardie, anxietate și/sau dispnee.

GLIBENCLAMIDUM

COD ATC: A10BB01

GLIBENCLAMID *SICOMED SA;* Cpr. 5 mg glibenclamidă; ct. × 1 fl. × 60 cpr. ***(P-6L)***

GLIBENCLAMID *LAROPHARM SRL;* Cpr. 5 mg glibenclamidă; ct. × 3 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

GLIBENCLAMID 5 mg *ARENA GROUP SA;* Cpr. 5 mg glibenclamidă; ct. × 1 fl. × 30 cpr. ***(P-6L)***

GLIBENCLAMID LPH® 1,75 mg; GLIBENCLAMID LPH® 3,5 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. 1,75 mg și 3,5 mg ***(S/P-6L)***

GLIBIL 5 *HIKMA.;* Cpr. 5 mg glibenclamidă; ct. × 3 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

MANINIL *BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP;* Cpr. 1,75 mg glibenclamidă; ct. × 1 fl. × 120 cpr.; ct. × 3 blist. × 10 cpr.; ct. × 3 blist. × 20 cpr. ***(P-6L)***

MANINIL *BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP;* Cpr. 3,5 mg glibenclamidă; ct. × 1 fl. × 120 cpr.; ct. × 3 blist. × 10 cpr.; ct. × 3 blist. × 20 cpr. ***(P-6L)***

MANINIL *BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP;* Cpr. 5 mg glibenclamidă; ct. × 1 fl. × 120 cpr. ***(P-6L)***

Ind: Diabetul zaharat de tip II (tip adult) insulino-independent.
Dz: Inițial: 0,875-1,75 mg pe zi, doza se crește treptat, la intervale de câteva zile - o săpt., până la doza de întreținere de 10,5 mg pe zi.

Cind: Diabetul zaharat de tip I, insulino-dependent, eșecul secundar complet al terapiei cu glibenclamidă în diabetul zaharat de tip II, în special în caz de decompensare metabolică cu acidoză, precomă sau comă diabetică, decompensarea metabolică în cursul bolilor infecțioase, int. chir., în cazul rezecției pancreatice; IH gravă, IR gravă; hipersensibilitate cunoscută la glibenclamidă sau la excipienți; sarcină.
A!: Monitorizarea atentă; prudență în funcție hepatică afectată; trat. lungi; vârstnici; asocieri cu sulfonamide, cloramfenicol, fenilbutazonă, azapropazonă, sulfinpirazonă, derivați cumarinici, miconazol și feniramidol, metformină, acarboză, salicilați, IMAO, fenfluramină, pentoxifilină, oxitetraciclină, anabolizante, IEC, clofibrat, fluoxetină, ciclofosfamidă, ifosfamidă, trofosfamidă, simpatolitice, barbiturice, fenitoină și rifampicină, glucagon, glucocorticoizi, hormoni tiroidieni, diuretice inclusiv acetazolamidă, acid nicotinic (în doze mari), fenotiazine, diazoxid și hormoni sexuali, anti H_1; sarcină și alăptare.
RA: Reacții hipoglicemice, tulburări de vedere pasagere, tulburări gastrointestinale, reacții de fotosensibilizare, eritem polimorf, sindrom Lyell, dermatită exfoliativă, eritrodermie și eritem nodos, colestază, hepatită, creșterea enzimelor hepatice, trombocitopenie cu purpură, leucocitopenie, eritrocitopenie, pancitopenie și granulocitopenie până la agranulocitoză.

GLICLAZIDUM *COD ATC: A10BB09*

DIABREZIDE® *MOLTENI DENTAL;* Cpr. 80 mg gliclazidă; ct. × 4 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

DIAPREL *LAB. SERVIER;* Cpr. 80 mg gliclazidă; ct. × 3 blist. × 20 cpr. ***(P-6L)***

DIAPREL MR® *LAB. SERVIER;* Cpr. elib. prel. 30 mg gliclazidă; ct. × 1 blist. × 30 cpr. elib. prel.; ct. × 2 blist. × 30 cpr. elib. prel. ***(P-6L)***

GLIDIET *MONDI-MUNDIPHARMA;* Cpr. 80 mg gliclazidă; ct. × 5 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

Ind: Diabetul zaharat insulino-independent.
Dz: *Adulți:* de la 80 mg până la 240 mg pe zi, maxim 320 mg pe zi.
Cind: Hipersensibilitate la gliclazidă, la alți derivați de sulfoniluree sau la excipienții produsului; diabet zaharat insulino-dependent, mai ales diabet juvenil, diabet complicat cu ceto-acidoză sau stările precomatoase diabetice; IR sau IH severă; trat. concomitent cu miconazol; sarcină și alăptare.
A!: Monitorizarea glicemiei; prudență la vârstnici; subnutriție; degradarea stării generale; insuficiență suprarenală sau hipopituitarism; regim alimentar neregulat; febră, traumatisme, procese infecțioase, intervenții chirurgicale; IR sau IH; interacțiuni cu miconazol, fenilbutazonă, administrată sistemic crește efectul hipoglicemiant al derivaților de sulfoniluree (desface legăturile acestora de proteinele plasmatice), alcool etilic, beta-blocante, fluconazol, IEC, clorpromazină, glucocorticoizi, progestogeni, ritodrină, salbutamol, terbutalină; șoferi și activități de precizie.
RA: Hipoglicemie, tulburări gastrointestinale (greață, dispepsie, diaree și constipație), reacții la nivelul pielii și mucoaselor (rash, prurit, urticarie, erupții maculopapulare), tulburări hematologice (anemie, leucopenie, trombocitopenie, creșteri ale fosfatazei alcaline, hepatită), icter colestatic.

GLIMEPIRIDUM

COD ATC: A01BB12

AMARYL® *LAB. AVENTIS PHARMA;* Cpr. 1 mg, 2 mg, 3 mg glimepiridă; ct. × 2 blist. × 15 cpr. ***(P-6L)***

Ind: Diabet zaharat de tip 2, insulino-independent.
Dz: Doza inițială este de 1 mg o dată, zilnic; doza poate fi crescută treptat, la intervale de 1-2 săpt., la 2 mg, 3 mg sau 4 mg pe zi, în funcție de situația metabolică.
Cind: Diabet zaharat de tip 1 insulino-dependent; eșec al terapiei cu glimepiridă; precomă sau comă diabetică; pancreatectomie; dezechilibru metabolic diabetic (de ex. cetoacidoză, inclusiv în antecedente); hipersensibilitate la glimepiridă, la alte sulfoniluree antidiabetice, la sulfonamide sau la componenții produsului; IR sau IH grave; sarcină și alăptare.
A!: Monitorizare regulată a glicemiei, glucozuriei, tabloului sanguin și a funcției hepatice; respectarea cu strictețe a trat.; prudență la vârstnici; situații de stres; interacțiuni medicamentoase cu alopurinol, azapropazonă, beta-blocante, chinină, chinolone antibacteriene, ciclofosfamidă și ifosfamidă, cloramfenicol, anticoagulante cumarinice, disopiramidă, fenfluramină, fenilbutazonă, feniramidol, fibrați, fluoxetină, guanetidină, IEC, IMAO, insulină și diferite antidiabetice orale, miconazol, pirazinamidă, pentoxifilină, oxifenbutazonă, probenecid, salicilați, steroizi anabolizanți și androgenici, sulfinpirazonă, sulfonamide, tetracicline, clonidină, guanetidină și rezerpină, acetazolamidă, adrenalină sau alte simpatomimetice, barbiturice, ciclosporină, diazoxid, fenitoină, fenotiazine, glucagon, glucocorticoizi, hormoni sexuali feminini, hormoni tiroidieni, indometacină, HIN, laxative, nicotinați, rifampicină, saluretice, alcool; șoferi și activități de precizie.
RA: Hipoglicemie (greață, vărsături, senzație imperioasă de foame, tremurături, neliniște, iritabilitate, tulburări de concentrare, afectarea capacității de reacție, stare confuzională, depresie, cefalee, amețeli, fatigabilitate, somnolență și alte tulburări de somn, delir, respirație superficială, bradicardie, deficite neurologice tranzitorii - tulburări vizuale, afazie, pareze și parestezii), senzație de sațietate sau de presiune epigastrică, epigastralgie, diaree, icter colestatic, creșterea valorilor serice ale TGO, TGP și hepatită, eventual IH, trombocitopenie, eritropenie, leucopenie, granulocitopenie care pot evolua către agranulocitoză, pancitopenie, (mielosupresie) și anemie hemolitică, vasculită, reacții de hipersensibilitate, îndeosebi cutanate, hiponatremie, fotosensibilizare.

GLIPIZIDUM

COD ATC: A01BB07

GLIPIZID LPH® 5 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. 5 mg ***(S/P-6L)***

GLUCOTROL XL *PFIZER H.C.P. CORPORATON;* Cpr. film. gits, 5 mg, 10 mg glipizid; ct. × 1 fl. × 30 cpr. film. ***(P-6L)***

MINIDIAB *PHARMACIA & UPJOHN;* Cpr. 5 mg glipizid; ct. × 2 blist. × 15 cpr. ***(P-6L)***

Ind: Adjuvant al dietei la pacienții cu diabet zaharat insulino-independent, atunci când dieta adecvată nu este suficientă.

Dz: Doza inițială este de 5 mg/zi, administrată la micul dejun, apoi dozele se cresc cu 5 mg în funcție de glicemie până la maxim 20 mg pe zi.
Cind: Hipersensibilitate la glipizid, alte sulfoniluree sau sulfamide și la excipienți; diabet insulino-dependent (Tip I - diabet juvenil), ceto-acidoza diabetică, precomă diabetică; IR sau IH severă; sarcină și alăptare.
A!: Monitorizarea glicemiei și glicozuriei; prudență în febră, traumatisme, infecții sau proceduri chirurgicale; eșec secundar; interacțiuni medicamentoase cu AINS și alte medicamente cu legare mare de proteinele plasmatice, salicilați, sulfonamide, cloramfenicol, probenecid, anticoagulante cumarinice, IMAO, beta-blocante, diuretice tiazidice și alte diuretice, corticosteroizi, fenotiazine, preparate tiroidiene, estrogeni, contraceptive orale, fenitoină, acid nicotinic, simpatomimetice, blocanți ai canalelor de calciu, HIN; șoferi și activități de precizie.
RA: Hipoglicemie, erupții cutaneo-mucoase (prurit, urticarie, erupții maculopapuloase); tulburări gastrointestinale (greață, diaree, disconfort epigastric), tulburări hepatice (icter colestatic, hepatite toxice), reacții hematologice (leucopenie, agranulocitoză, trombocitopenie, anemie hemolitică, anemie aplazică, pancitopenie); porfirie și reacții tip disulfiram, cazuri de hiponatriemie.

GLIQUIDONUM

COD ATC: A10BB08

GLURENORM *BOEHRINGER INGELHEIM;* Cpr. 30 mg gliquidonă; ct. × 6 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

Ind: Trat. diabetului zaharat la vârstă mijlocie și înaintată.
Dz: Inițial 15 mg la micul dejun, cu creștere gradată a dozei până la 120 mg/zi.
Cind: Diabetul insulinodependent, comă și precomă diabetică, afecțiunile metabolice grave asociate cu ceto-acidoză, alergie la sulfamide; sarcină.
A!: Monitorizarea glicemiei; IR gravă; respectarea regimului alimentar; asocierea cu salicilați, sulfonamide, fenilbutazonă, tuberculostatice, cloramfenicol, tetraciclină, cumarinice, ciclofosfamidă, IMAO, beta-blocante, clorpromazină, simpatomimetice, corticoizi, hormoni tiroidieni, contraceptive orale, acid nicotinic, alcool; prudență în alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Reacții hipoglicemice, fenomene alergice cutanate, modificări ale compoziției sângelui sau fenomene de intoleranță digestivă.

GLUCAGONUM

COD ATC: H04AA01

GLUCAGEN® HYPOKIT 1 mg *NOVO NORDISK A/S;* Liof./solv. pt. sol. inj. 1 mg de clorhidrat de glucagon; ct. × 1 fl. liof. + seringă preumplută × 1 ml solv. ***(S)***

Ind: Trat. hipoglicemiei severe la persoanele cu diabet zaharat; oprirea temporară a peristaltismului intestinal în timpul examinării tractului gastrointestinal; evaluarea secreției maximale a pancreasului la persoanele cu diabet.
Dz: *Hipoglicemie - Adulți și copii peste 25 kg:* 1 mg; *copii sub 25 kg* sau *sub 6-8 ani:* inj. s.c./i.m. 0,5 mg. Dacă pacientul nu răspunde în 10 minute trebuie să i se administreze glucoză intravenos. *Examinarea tractului gastrointestinal:* inj. i.v./i.m. 0,2-2 mg.
Cind: Hipersensibilitate la glucagon sau la excipienți; tumoră de glandă supraadrenală.

A!: Prudență în regim strict, nivele scăzute de adrenalină, hipoglicemie cronică sau hipoglicemie produsă de alcool; afecțiuni cardiace.
RA: Greață și vărsături, tahicardie.

GLUCOSAMINUM *COD ATC: M01AX05*

DONA® *ROTTAPHARM;* Pulb. pt. sol. orală, 1884 mg glucozaminosulfat cristalin (echivalent a 1500 mg glucozaminosulfat); ct. × 20 plicuri unidoză ***(P-6L)***

Ind: Boală artrozică cu diferite localizări (genunchi, șold, coloană vertebrală, umăr, mână, gleznă etc.).
Dz: Oral 1500 mg glucozaminosulfat (dizolvat în 50 ml apă) o dată/zi, timp de 1-3 luni sau mai mult. Trat. se repetă de 2-3 ori/an.
Cind: Hipersensibilitate la glucozaminosulfat, fenilcetonurie.
A!: Prudență în sarcină.
RA: Reacții adverse la nivelul tractului gastrointestinal.

GLUCOSUM *COD ATC: B05BA03*

DEXTROSE 5% *BAXTER HEALTH CARE;* Sol. perf. glucoză anhidră 50 g/1000 ml (sub formă de glucoză monohidrat 55 g); sac × 1000 ml ***(S)***

DEXTROSE 5% *INFOSINT;* Sol. perf., glucoză anhidră 50 g/1000 ml (sub formă de glucoză monohidrat 55 g); sac PVC × 500 ml; sac PVC × 250 ml ***(S)***

DEXTROSE 5% VIOSER *VIOSER SA;* Sol. perf. glucoză anhidră 50 g/1000 ml (sub formă de glucoză monohidrat 55 g); ct. × 10 fl. × 500 ml; ct. × 10 fl. × 1000 ml ***(S)***

DEXTROSE 10% *BAXTER HEALTH CARE;* Sol. perf. glucoză anhidră 100 g/1000 ml (sub formă de glucoză monohidrat 110 g); sac × 1000 ml ***(S)***

DEXTROSE 10% *INFOSINT;* Sol. perf. glucoză anhidră 100 g/1000 ml (sub formă de glucoză monohidrat 110 g); sac PVC × 500 ml; sac PVC × 250 ml ***(S)***

DEXTROSE 10% VIOSER *VIOSER SA;* Sol. perf. glucoză anhidră 100 g/1000 ml (sub formă de glucoză monohidrat 110 g); ct. × 10 fl. × 500 ml; ct. × 10 fl. × 1000 ml ***(S)***

DEXTROSE 20% *INFOSINT;* Sol. perf. glucoză anhidră 200 g/1000 ml (sub formă de glucoză monohidrat 220 g); sac PVC × 500 ml; sac PVC × 250 ml ***(S)***

GLUCOSE 5% *BIEFFE MEDITAL;* Sol. perf., glucoză anhidră 50 g/1000 ml (sub formă de glucoză monohidrat 55 g); sac × 250 ml ***(S)***

GLUCOSE 5% *B. BRAUN MELSUNGEN;* Sol. perf. glucoză anhidră 50 g/1000 ml (sub formă de glucoză monohidrat 55 g); ct. × 10 fl. × 500 ml; 1 fl. × 500 ml ***(S)***

GLUCOSE 10% *B. BRAUN MELSUNGEN;* Sol. perf. glucoză anhidră 100 g/1000 ml (sub formă de glucoză monohidrat 110 g); ct. × 10 fl. × 500 ml; ct. × 1 fl. × 500 ml ***(S)***

GLUCOSE 20% BRAUN *B. BRAUN MELSUNGEN;* Sol. perf. glucoză anhidră 200 g/1000 ml (sub formă de glucoză monohidrat 220 g); ct. × 10 fl. × 500 ml ***(S)***

GLUCOSI INFUNDIBILE 10% *HEMOFARM;* Sol. perf. glucoză anhidră 100 g/1000 ml (sub formă de glucoză monohidrat 110 g); 1 fl. × 500 ml ***(S)***

GLUCOSI INFUNDIBILE 5% *HEMOFARM;* Sol. perf. glucoză anhidră 50 g/1000 ml (sub formă de glucoză monohidrat 55 g); 1 fl. × 500 ml ***(S)***

GLUCOSTERIL 5% *FRESENIUS KABI;* Sol. perf. glucoză anhidră 50 g/1000 ml (sub formă de glucoză monohidrat 55 g); 1 fl. sticlă × 250 ml; 1 fl. plastic × 250 ml; 1 fl. sticlă × 500 ml; 1 fl. plastic × 500 ml ***(S)***

GLUCOSTERIL 10% *FRESENIUS KABI;* Sol. perf. glucoză anhidră 100 g/1000 ml (sub formă de glucoză monohidrat 110 g); 1 fl. sticlă × 250 ml; 1 fl. plastic × 250 ml; 1 fl. sticlă × 500 ml; 1 fl. plastic × 500 ml ***(S)***

GLUCOZĂ *SICOMED SA;* Sol. inj., glucoză anhidră 200 g/1000 ml (sub formă de glucoză monohidrat 220 g); ct. × 10 f. × 10 ml; ct. × 50 f. × 10 ml ***(S)***

GLUCOZĂ *SICOMED SA;* Sol. inj., conține glucoză anhidră 400 g/1000 ml (sub formă de glucoză monohidrat 440 g); ct. × 10 f. × 10 ml; ct. × 50 f. × 10 ml ***(S)***

GLUCOZĂ *SICOMED SA;* Sol. perf., glucoză anhidră 50 g/500 ml (sub formă de glucoză monohidrat 55 g); ct. × 6 fl. × 500 ml ***(S)***

GLUCOZĂ 5% *SICOMED SA;* Sol. perf., glucoză anhidră 50 g/1000 ml (sub formă de glucoză monohidrat 55 g); ct. × 10 pungi × 250 ml ***(S)***

GLUCOZĂ 10% *SICOMED SA;* Sol. perf., glucoză anhidră 100 g/500 ml (sub formă de glucoză monohidrat 110 g); ct. × 1 pungă × 250 ml; ct. × 10 pungi × 250 ml; ct. × 1 pungă × 500 ml; ct. × 10 pungi × 500 ml ***(S)***

GLUCOZĂ 20% *SICOMED SA;* Sol. perf., glucoză anhidră 200 g/1000 ml (sub formă de glucoză monohidrat 220 g); sac × 250 ml; ct. × 10 pungi × 250 ml; sac × 500 ml; ct. × 10 pungi × 500 ml ***(S)***

GLUCOZĂ 33% *SICOMED SA;* Sol. perf., glucoză anhidră 330 g/1000 ml (sub formă de glucoză monohidrat 363 g); ct. × 10 f. × 10 ml; ct. × 50 f. × 10 ml; ct. × 100 f. × 10 ml ***(S)***

GLUCOZĂ 40% BRAUN *B. BRAUN MELSUNGEN;* Sol. perf., glucoză anhidră 400 g/1000 ml (sub formă de glucoză monohidrat 440 g); ct. × 10 fl. × 250 ml; ct. × 10 fl. × 500 ml ***(S)***

GLUCOSE 5% m/v *HELVETICA PROFARM SA;* Sol. perf., glucoză anhidră 50 g/1000 ml (sub formă de glucoză monohidrat 55 g); ct. × 10 fl. PLASCO® × 500 ml ***(S)***

GLUCOSE 10% *BIEFFE MEDITAL;* Sol. perf., glucoză anhidră 100 g/ 1000 ml (sub formă de glucoză monohidrat 110 g); pungă × 500 ml ***(S)***

GLUCOSE 10% m/v *HELVETICA PROFARM SA;* Sol. perf., glucoză anhidră 100 g/1000 ml (sub formă de glucoză monohidrat 110 g); fl. × 500 ml; ct. × 10 fl. PLASCO® × 500 ml ***(S)***

Ind: *Glucoză 5%:* Solvent sau vehicul pentru electroliți și medicamente compatibile. Aport de apă în caz de deshidratare hipertonă.
Glucoză 10%: Solvent sau vehicul pentru electroliți și medicamente compatibile. Supliment energetic parenteral.
Dz: Perfuzie cu debit constant în venele periferice. *Glucoză 5%:* 30-40 ml/kg, echivalând cu 1,5-2 g glucoză/kg, maxim 6,0 g/kg. Viteza maximă de perfuzie este de 3 ml/kg/oră, echivalând cu 0,15 g glucoză/kg/oră. *Glucoză 10%:* 30-40 ml/kg, echivalând cu 3-4 g glucoză/kg, maxim 6,0 g/kg. Viteza maximă de perfuzie este de 2,5 ml/kg/oră sau 0,25 g glucoză/kg/oră.
Cind: Hiperglicemie, hipokaliemie (fără administrare simultană de electroliți), acidoză metabolică, stări de hiperhidratare și deshidratare hipotonă.
A!: Glicemia, balanța hidro-electrolitică și echilibrul acido-bazic trebuie monitorizate frecvent; prudență în diabet zaharat; stări post-traumatice sau postoperatorii; IC, stări edematoase, HTA, sarcină și alăptare.
RA: Nu apar dacă administrarea este corect adaptată scopului propus.

GLYCEROLUM *COD ATC: A06AX01*

GLICERIN SUPOZITOARE *PERRIGO;* Sup. 0,28 g glicerină; ct. × 25 sup. ***(OTC)***

SUPOZITOARE CU GLICERINĂ pentru copii *ANTIBIOTICE IAȘI;* Sup. 1,3904 g glicerină; ct. × 2 blist. × 3 sup. ***(OTC)***

SUPOZITOARE CU GLICERINĂ pentru adulți *ANTIBIOTICE IAȘI;* Sup. 2,0856 g glicerină; ct. × 2 blist. × 3 sup. ***(OTC)***

Ind: Constipație.
Dz: 1 sup. o dată pe zi, la nevoie.

GONADOTROPHINUM CHORIONICUM *COD ATC: G03GA01*

OVIDREL *SERONO;* Pulb. + Solv. pt. sol. inj. 250 µg ***(P-RF)***

PREGNYL *N.V. ORGANON;* Liof. pt. sol. inj., gonadotrofină corionică umană 500 U.I.; ct. × 3 fl. x 3 f. solv.; ct. × 6 f. liof. + 6 f. solv. × 1 ml ***(P-RF)***

PREGNYL *N.V. ORGANON;* Pulb. liof. pt. sol. inj., gonadotrofină corionică umană 1500 U.I.; ct. × 3 f. liof. + 3 f. solv. × 1 ml ***(P-RF)***

Ind: *La femei:* infertilitate anovulatorie, avort habitual, amenințare de avort. *La bărbați:* hipogonadism hipogonadotrofic. Criptorhidism. Oligo-astenospermie și azoospermie.
Dz: *Femei:* infertilitate anovulatorie: inj. i.m. 10000 UI la mijlocul ciclului. Superovulație: inj. i.m. 10000 UI, în priză unică. Insuficiența de corpus luteum: inj. i.m. 5000 UI în a 5-a zi de ovulație, repetat în a 9-a zi. Avort habitual, amenințare de avort: inj. i.m. 10000 UI, apoi câte 5000 UI de două ori/săpt. *Bărbați:* hipogonadism hipogonadotrofic: inj. i.m./s.c. 2000 UI de 2 ori/săpt. Criptorhidism: inj. i.m./s.c. 500 UI sau 1000 UI la 5 zile.
Cind: Tumori hipofizare sau ovariene, carcinom de prostată sau neoplasm androgen - dependent. Disgenezie ovariană, absența uterului, menopauză precoce, ocluzie tubară cu excepția cazului în care pacienta se află în terapie de superovulație pentru fertilizare in vitro. Tromboflebita activă; hipersensibilitate la gonadotrofină; în reducerea surplusului ponderal; alăptare.
A!: Nu este eficace la bărbați cu FSH crescut; prudență în hipotiroidism, deficit adreno-cortical sau hiperprolactinemie; poate produce sindrom de hiperstimulare ovariană; risc de sarcini multiple; afecțiuni cardiace sau renale, epilepsie, migrenă sau astm bronșic; poate produce precocitate sexuală.
RA: Reacție locală/durere la locul de injecție. Cefalee, astenie, depresie, iritabilitate, agitație. Reacții alergice. Sindrom de hiperstimulare ovariană la femei. La bărbați: retenție lichidiană, edeme, senzație de tensiune la nivelul mameloanelor, ginecomastie, precocitate sexuală.

GOSERELINUM *COD ATC: L02AE03*

ZOLADEX *ASTRAZENECA;* Implant 3,6 mg și 10,8 mg ***(S/P-RF)***

ZOLADEX DEPOT *ASTRAZENECA;* Liof. pt. sol. inj. retard, 3,6 mg goserelină; ct. × 1 seringă preumplută ***(S/P-RF)***

ZOLADEX® LA *ASTRAZENECA;* implant, 10,8 mg goserelină; ct. × 1 plic + seringă preumplută × 10,8 mg implant ***(P-RF)***

Ind: Cancer de prostată; cancerul de sân la femeile la pre- și peri-menopauză care răspunde la trat. hormonal; endometrioză; presubțierea endometrului dinaintea ablației chirurgicale; fibrom uterin.
Dz: 3,6 mg inj. s.c. în peretele abdominal anterior, la fiecare 28 zile.
Cind: Hipersensibilitate la goserelină sau alți analogi LH-RH; sarcină sau alăptare.
A!: Prudență la copii; obstrucție ureterală la bărbați; reducere a densității minerale osoase la femei; creștere a rezistenței cervixului uterin.
RA: Reacții de hipersensibilizare, artralgii, rash cutanat, hTA, HTA, echimoze la locul de injectare, bufeuri, scădere a libidoului, obstrucție ureterală, cefalee, modificări ale afectivității, inclusiv depresie, uscăciunea mucoasei vaginale și modificări ale dimensiunilor sânilor.

GRANISETRONUM

COD ATC: A04AA02

KYTRIL *HOFFMANN LA ROCHE;* Sol. inj. 1 mg/ml ***(S/P-RF)***

KYTRIL *HOFFMANN LA ROCHE;* Sol. orală 20 µg/ml ***(P-RF)***

KYTRIL 1 g; KYTRIL 2 mg *HOFFMANN LA ROCHE;* Cpr. film. 1 mg, 2 mg ***(P-RF)***

Ind: Prevenirea și trat. grețurilor și vărsăturilor acute sau tardive produse de citostatice sau radioterapie.
Dz: *Adm. inj.: Adulți:* 3 mg în perf. sau inj. i.v., la nevoie se repetă de 1-2 pe zi. *Copii peste 2 ani:* doză unică de 40 µg/kg, la nevoie se repetă 40 µg/kg. *Adm. p.o.:* 2 mg pe zi.
Cind: Hipersensibilitate la granisetron sau la oricare din componenții produsului.
A!: Prudență în simptome de ocluzie intestinală subacută; hipersensibilitate încrucișată cu alți antagoniști 5HT3; sarcină și alăptare.
RA: Cefalee și constipație, reacții de hipersensibilitate, creșteri tranzitorii ale valorilor transaminazelor hepatice.

GRISEOFULVINUM

COD ATC: D01BA01

GRISEOFULVIN *SICOMED SA;* Cpr. 125 mg griseofulvină; ct. × 1 fl. × 60 cpr. ***(P-RF)***

GRISEOFULVIN *ORION;* Cpr. 125 mg griseofulvină; ct. × 1 fl. × 100 cpr. ***(P-RF)***

Ind: Dermatofiții ale regiunilor păroase ale pielii capului și feței: favus, tricofiție, microsporie, sicozis parazitar, dermatofiții ale unghiilor (cu excepția candidozei); toate tipurile de dermatofiții cutanate.
Dz: Se adm. în timpul meselor sau după mese. *Adulți:* 500 mg/zi (fracționat în 1-4 prize), zilnic (timp de 4-8 săpt. pentru micozele superficiale, 6-8 luni în onicomicoze ale degetelor mâinii, 12-18 luni în onicomicoze ale degetelor picioarelor); în cazurile grave, doza se poate crește la 1 g/zi. *Copii:* 10 mg/kg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la griseofulvină, porfirii hepatice, IH gravă, LED, nefropatii; primul trimestru de sarcină.
A!: Asocieri cu anticoagulante cumarinice, contraceptive orale, barbiturice; prudență în sarcină și alăptare.
RA: Cefalee, rash, uscăciunea gurii, modificarea percepției gustative, tulburări gastrointestinale, angioedem, eriteme multiforme, dermatită exfoliativă, proteinurie, leucopenie și alte discrazii sanguine, candidoză, parestezii, fotosensibilitate și cefalee severă, depresie, confuzie, amețeli, insomnie și oboseală. În special la copii, în unele cazuri au apărut anormalități ale organelor sexuale și ale sânilor.

GUAIFENESINUM

COD ATC: R05CA03

ADULT MELTUS *SETON HEALTHCARE GROUP;* Sirop guaiafenezină 2 g/100 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml ***(OTC)***

JUNIOR MELTUS *SETON HEALTHCARE GROUP;* Sirop guaiafenezină 1 g/100 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml ***(OTC)***

ROBITUSSIN EXPECTORANS *WYETH-LEDERLE PHARMA;* Sol. orală 100 mg/5 ml guaiafenezină; ct. × 1 fl. × 50 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml ***(OTC)***

TRECID *BIOFARM SA;* Sirop guaiafenezină 2 g/100 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml ***(OTC)***

TRECID® *BIOFARM SA;* Sol. orală guaiafenezină 10 g/100 ml; ct. × 1 fl. sticlă brună cu dop picurător × 20 ml ***(OTC)***

TRECID *SICOMED SA;* Cpr. 100 mg guaiafenezină; ct. × 1 fl. × 60 cpr. ***(OTC)***

Ind: Bronșite, laringite, traheite acute și cronice; catar respirator; spasme musculare (fibrozite, miozite, rupturi tendinoase, torticolis, sciatică).
Dz: *Adulți:* 100-200 mg de 4-6 ori/zi; *copii sub 7 ani:* 1-5 picături de 3 ori/zi; *copii peste 7 ani:* 100 mg, 20 picături sau o linguriță de sirop de 3 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la guaiafenezină; ulcer gastroduodenal, gastroduodenite; tulburări de deglutiție; copii sub 5 ani.
A!: Interacțiuni cu alcool și medicamentele care produc depresie respiratorie; reacție fals pozitivă pentru acidul 5-hidroxi-indolacetic în urină (interferă diagnosticul de sindrom carcinoid); prudență la șoferi și activități de precizie.
RA: Rareori, iritație gastrointestinală și sedare excesivă până la somnolență (mai ales la copiii mici).

H

HALOPERIDOLUM

COD ATC: N05AD01

DOZIC HALOPERIDOL *ROSEMONT PHARMACEUTICALS;* Sol. orală 2 mg/ml haloperidol; ct. × 1 fl. × 100 ml ***(P-RF)***

HALDOL *JANSSEN PHARMACEUTICA;* Cpr. 2 mg haloperidol; ct. × 1 blist. × 25 cpr. ***(P-RF)***

HALDOL *JANSSEN PHARMACEUTICA;* Cpr. 5 mg haloperidol; ct. × 1 blist. × 25 cpr. ***(P-RF)***

HALDOL *JANSSEN PHARMACEUTICA;* Sol. orală 2 mg/ml haloperidol; ct. × 1 fl. × 15 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml ***(P-RF)***

HALOPER *CTS CHEMICAL;* Cpr. 0,5 mg, 1,5 mg, 5 mg, 10 mg haloperidol; ct. × 3 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

HALOPERIDOL *ARMEDICA;* Sol. orală 2 mg/ml haloperidol; ct. x 1 fl. × 10 ml ***(P-RF)***

HALOPERIDOL *PHARMAPLANT BIOGALENICA;* Sol. orală 2 mg/ml haloperidol; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(P-RF)***

HALOPERIDOL 5 mg/ml *GEDEON RICHTER;* Sol. inj. 5 mg/ml haloperidol; ct. × 5 f. × 1 ml ***(P-RF)***

HALOPERIDOL DECANOAT *GEDEON RICHTER;* Sol. inj. 50 mg/ml haloperidol; ct. × 5 f. × 1 ml ***(P-RF)***

Ind: Tulburări psihotice; tulburări grave de comportament la copii; sindrom Gilles de la Tourette; autism infantil; coree Huntington. Greață și vărsături induse de citostatice.
Dz: *Adm. orală:* Psihoze și tulburări de comportament asociate: La *adulți* 0,5-5 mg de 2-3 ori/zi; se poate crește, la nevoie, până la 75-100 mg/zi. La *copiii peste 3 ani:* 25-50 µg/kg și zi, în 2 prize; la nevoie se crește până la 150 µg/kg/zi. Combaterea vomei: 1-5 mg de 2 ori/zi. *Adm inj:* Psihoză acută: *Adulți:* 5-10 mg i.v. sau i.m. maxim 15-40 mg/zi. *Copii peste 10 ani:* 2,5-5 mg i.v. sau i.m.
Cind: Hipersensibilitate la haloperidol; deprimare toxică severă a sistemului nervos, provocată de alcool sau de deprimante centrale; comă; leziuni ale ganglionilor bazali; tulburări neurologice însoțite de manifestări piramidale sau extrapiramidale.
A!: Prudență în antecedente de cardiopatii grave, epilepsie, glaucom, disfuncție hepatică, hipertiroidism, tireotoxicoză, hipokaliemie, afecțiuni respiratorii grave, IR, retenție urinară; control stomatologic repetat; vârstnici; monitorizarea hematologică, a manifestărilor precoce ale diskineziei tardive și a funcțiilor hepatice; asocieri cu amfetaminele, anticolinergicele și antihistaminicele, antiepilepticele, alcool și deprimante centrale, metildopa, levodopa, antidepresivele triciclice, inductoare enzimatice; litiul, anticoagulantele orale, simpatomimetice; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Tulburări extrapiramidale, sindrom neuroleptic malign, sedare, somnolență, agitație, insomnie, confuzie, cefalee, vertij, crize epileptice, greață și vărsături, hiperprolactinemie, tahicardie, hTA, constipație, tulburări de vedere, uscăciunea gurii, tulburări de termoreglare, retenție urinară, tulburări de erecție, edeme periferice, sudorații profuze, arsuri gastrice, scăderea tranzitorie a numărului elementelor figurate sanguine; rareori agranulocitoză și trombocitopenie, disfuncții hepatice și hepatită; foarte rar rash cutanat, urticarie sau fenomene anafilactice.

HALOTHANUM

COD ATC: N01AB01

HALOTANE Liquid *RHODIA LIMITED;* Lichid pt. inhal. 100% halotan; ct. × 1 fl. × 250 ml ***(S)***

NARCOTAN *LECIVA;* Lichid pt. inhal. 100% halotan; ct. × 1 fl. × 250 ml ***(S)***

Ind: Inducerea și menținerea anesteziei.
Dz: *Adulți:* inducerea anesteziei: 2-4% halotan; menținerea anesteziei: 0,5-2% halotan. *Copii:* inducție: 1,5-2%, menținere: 0,5-2%.
Cind: Hiperpirexie malignă sau la cei susceptibili de a dezvolta hiperpirexie malignă. Apariția icterului și a pirexiei după expunerea la halotan este o Cind pentru utilizarea lui ulterioară.
A!: Prudență în intervenții obstetricale, expunerea repetată în decurs de 3 luni, ciroza, hepatita virală sau alte afecțiuni hepatice pre-existente, leziuni

intracraniene, hTA, bradicardie, feocromocitom, miastenia gravis; asigurarea unei ventilații adecvate a sălilor; asocieri cu: curarizante, aminoglicozide, adrenalină, alte simpatomimetice, aminofilină, teofilină și antidepresive triciclice; sarcină, alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Bradicardie și/sau hTA, frisoane, febră, greață și vărsături, afectare hepatică.

HEPARINUM

COD ATC: B01AB01

CALCIPARINE® *SANOFI~SYNTHELABO;* Sol. inj. s.c. heparină calcică 25000 UI/ml; ct. × 5 blist. × 2 f. × 1 ml + 2 seringi × 1 ml; ct. × 50 f. × 1 ml ***(S)***

CALCIPARINE® *SANOFI~SYNTHELABO;* Sol. inj. s.c. heparină calcică 5000 UI/0,2 ml; ct. × 5 blist. × 2 seringi preumplute unidoză × 0,2 ml ***(S)***

CALCIPARINE® *SANOFI~SYNTHELABO;* Sol. inj. s.c. heparină calcică 12500 UI/0,5 ml; ct. × 5 blist. × 2 f. × 0,5 ml + 2 seringi × 1 ml; ct. × 50 f. × 0,5 ml ***(S)***

ESSAVEN *AVENTIS PHARMA;* Gel heparină, 60000 U.I./100 g; ct. × 1 tub × 40 g ***(OTC)***

HEPARIN *GALENIKA;* Sol. inj. heparină sodică 5000 UI/ ml; ct. × 5 f. × 1 ml; ct. × 5 f. × 5 ml ***(S)***

HEPARIN "SANDOZ" 25000 UI/5 ml *SANDOZ GmbH;* Sol inj. 25000 ui/5 ml ***(S)***

HEPARINA *BIOFARM SA;* Sol. inj. heparină sodică 5000 UI/ml; ct. × 5 f. × 1 ml; ct. × 100 f. × 1 ml ***(S)***

HEPARINA *FABIOL SA;* Sol. inj. heparină sodică 5000 UI/ml; ct. × 5 f. × 1 ml; ct. × 100 f. × 1 ml ***(S)***

HEPARINE SODIQUE PANFARMA *PANPHARMA;* Sol. inj. heparină sodică 5 000 UI/ml; ct. × 10 fl. × 5 ml ***(S)***

LIOTON *BERLIN CHEMIE AG MENARINI GROUP;* Gel heparină 100 000 UI/100 g; ct. × 1 tub × 50 g ***(OTC)***

VIATROMB *CSC PHARMACEUTICALS;* Emulsie cut.; 25 g emulsie conțin heparină sodică lipozomală 0,20 g (30 000 UI) ***(OTC)***

VIATROMB *FORTE CSC PHARMACEUTICALS;* Emulsie cut.; 25 g emulsie conțin heparină sodică lipozomală 0,40 g (60 000 UI) ***(OTC)***

Ind. *Adm. inj.:* trat. trombozelor venoase și al emboliei pulmonare, trombozelor arteriale (îndeosebi IMA); profilaxia accidentelor tromboembolice venoase și arteriale; ca anticoagulant în cadrul transfuziilor, circulației extracorporale și dializei. *Ext:* sindrom varicos și complicațiile lui; flebită varicoasă postchirurgicală; complicațiile safenectomiei; traumatisme și contuzii; edeme și infiltrații localizate; hematoame subcutanate. Afecțiuni traumatice musculo-tendinoase și capsulo-ligamentare.

Dz: *Adm. inj.: adulți și copii:* inj. i.v. 400-600 UI/kg/zi; vârstnici: reducerea dozei la jumătate. *Ext.:* Se aplică de 1-3 ori pe zi câte 3-10 cm gel pe suprafața afectată, masând ușor.
Cind: Prudență în antecedente de trombopenie după administrare de heparină sau heparinoizi; tendință de hemoragii la pacienți cu tulburări de hemostază, cu excepția coagulopatiei de consum nedatorată heparinei; leziuni organice cu risc hemoragic; endocardite infecțioase acute (cu excepția celor ce survin pe proteze mecanice); perioada postoperatorie, după int. chir. cerebrale sau medulare; accident cerebrovascular hemoragic; alergie la heparină.
A!: *Adm. inj.:* controlul de laborator al coagulării sângelui și numărarea trombocitelor înaintea începerii trat., apoi la intervale de 2-3 zile; evitarea manevrelor ce pot leza vasele de sânge; prudență în IH, IR, HTA, bolile vasculare retiniene, traumatisme; *Ext.:* Nu se va aplica în caz de sângerare, pe plagă sau pe mucoasă. Interacțiuni medicamentoase: acid acetilsalicilic, AINS, ticlopidina, anticoagulante orale, glucocorticoizi sistemici (doze mari), dextran 40, sarcină și alăptare.
RA: Accidente hemoragice; hematoame la locul inj. s.c. sau noduli inflamatori; rar: trombocitopenie severă, necroză cutanată la locul inj., manifestări alergice cutanate sau sistemice; osteoporoză (în cazul trat. prelungit cu doze mari); creșterea transaminazelor, eozinofilie; excepțional alopecie, priapism; câteva cazuri de hipoaldosteronism cu hiperkaliemie și/sau acidoză metabolică.

HEXESTROLUM

COD ATC: G03CBN0

SINTOFOLIN *TERAPIA SA;* Sol. inj. diacetat de hexestrol 5 mg/2 ml; ct. × 3 f. × 2 ml ***(P-RF)***; ct. × 100 f. × 2 ml ***(S)***

SINTOFOLIN *TERAPIA SA;* Sol. inj. diacetat de hexestrol 20 mg/5 ml; ct. × 5 f. × 5 ml ***(P-RF)***; ct. × 50 f. × 5 ml ***(S)***

Ind: Amenoree primară și secundară, oligomenoree, dismenoree, frigiditate, avort habitual, hipoplazie uterină și mamară, menopauză, colpite senile, prurit anovulvar, psoriazis, acnee, inhibarea lactației.
Dz: *Oligomenoree:* 1-2 mg/zi, timp de 10-15 zile, în prima jumătate a ciclului menstrual. *Amenoree:* 1-2 mg/zi în prima parte a ciclului (17-20 zile). *Avort habitual:* 40 mg/zi. *Climacteriul:* 1-2 mg/zi, timp de 10-15 zile și se va repeta trat. la interval de 4-5 săpt. *Colpite senile:* 1-2 mg/zi timp de 10-12 zile.
Cind: Tumori ale uterului și sânului, inflamații acute ale anexelor, hiperfoliculinemie, tuberculoză pulmonară evolutivă, epilepsie, IH, alăptare.
A!: Nu se administrează în săpt. care precedă menstrele; prudență în adenom pituitar; femei cu antecedente tromboembolice cu vârsta peste 35 ani sau după cezariană.
RA: Rar, la administrarea îndelungată, crește frecvența afecțiunilor tromboembolice, HTA, afectare hepatică, calculoză biliară.

HEXETIDINUM

COD ATC: A01AB12

DAD APA DE GURĂ *DAR AL DAWA;* Apă de gură 0,1% g/ml ***(OTC)***

HEXORAL® *PFIZER H.C.P.;* Sol. bucală 0,1% hexetidină; ct. × 1 fl. × 200 ml + măsură doz. × 15 ml ***(OTC)***

HEXORAL® *PFIZER H.C.P.;* Aerosol 0,1% hexetidină; ct. × 1 fl. presurizat × 40 ml + sist. pulverizare ***(OTC)***

Ind: Infecții cu germeni sensibili ale zonei oro-faringiene, inclusiv cele dentare.
Dz: Clătirea gurii, gargară, pulverizare de 2 ori/zi de preferat dimineața și seara, după mese și toaleta locală.
Cind: Alergie la unul din componenți.
RA: După întrebuințare îndelungată apare o iritație locală.

HEXOPRENALINUM *COD ATC: G02CA*

GYNIPRAL 0,5 mg *NYCOMED GmbH;* Cpr. 0,5 mg hexoprenalină sulfat, ct. × 20 cpr., ct. × 100 cpr. ***(S/P-RF)***

GYNIPRAL 10 µg *NYCOMED GmbH;* Sol inj. 10 µg/2 ml; ct. de 5 × 2 ml; 5 × 5 ml ***(S/P-RF)***

Ind: *Sol. inj.:* Tocoliză acută: Suprimarea travaliului în timpul nașterii în caz de asfixie acută intrauterină (suferință fetală), oprirea travaliului înainte de cezariană. În caz de prezentatie transversă, înaintea efectuării manevrelor de rotatie, în prolaps de cordon ombilical sau travaliu distocic. Ca măsură de urgență pentru tratamentul pacientelor în ambulator în caz de naștere prematură, înainte de transportarea la spital. Tocoliză masivă: Oprirea travaliului prematur eficient cu angajarea fătului și/sau dilatarea colului uterin. Tocoliză pe termen lung: Prevenirea travaliului prematur cu contracții uterine de intensitate și frecvență crescute fără angajarea capului sau dilatarea colului uterin. Oprirea contracțiilor uterine înaintea timpului, în timpul și după cerclajul colului uterin.
Cpr.: Iminența de avort și de naștere prematură (în principal pentru continuarea tratamentului perfuzabil).
Dz: *Sol. inj.:* Tocoliză acută: 10 mg. în continuare, dacă este necesar, tratamentul poate fi continuat prin perfuzie. Tocoliză masivă: Se va începe tratamentul cu 10 µg (o fiolă de 2 ml) în bolus, urmată de perfuzie de 0,3 µg/min. Alternativ se poate da o perfuzie de 0,3 µg/min fără o injectare prealabilă în bolus. Tocoliză pe termen lung: 0,075 µg/min ca perfuzie în picături lente. După oprirea travaliului, tocoliza poate fi menținută pentru 48 ore cu comprimate. *Observație:* dozele menționate mai sus sunt doar instrucțiuni generale, tocoliza necesitând o ajustare individuală pentru fiecare pacientă tratată.
Cpr.: Iminența de avort sau de naștere prematură: După o administrare anterioară de soluție injectabilă, tratamentul cu comprimate a 0,5 mg se începe cu 1-2 ore înainte de sistarea administrării perfuziei. Inițial se ia un comprimat la fiecare 3 ore, apoi la intervale mai largi, de 4-6 ore (8-4 comprimate pe zi) cu puțin lichid.
Cind: Hipersensibilitate la unul din componentele preparatului. La paciente astmatice sau cu hipersensibilitate la sulfit. În: hipertiroidism, afecțiuni cardiace, în special aritmii tahicardice, miocardită, defecte de valvă mitrală și stenoză aortică subvalvulară hipertrofică, afecțiuni severe hepatice și renale, glaucom cu unghi închis, sângerări genitale severe (abruptio placentae prematură) și infecții intrauterine, alăptare.

A!: *Sol. inj.:* Se monitorizează frecvența cardiacă, tensiunea arterială a mamei și alura ventriculară a fătului în timpul folosirii. Înainte și în timpul tratamentului se recomandă controale ECG regulate. La pacientele cu sensibilitate individuală crescută față de medicamentele simpatomimetice, se va administra sub supraveghere medicală foarte atentă, în doză redusă, care se ajustează individual. Se întrerupe tratamentul imediat în cazul apariției de: dispnee, angină pectorală, senzație de presiune toracică sau semne de insuficiență cardiacă. Se reduc dozele în cazul creșterii marcate a frecvenței cardiace (mai mult de 130/minut) și în cazul scăderii importante a tensiunii arteriale. Controlul glicemiei la gravide cu diabet zaharat și al nou-născutului. Se evită consumul excesiv de lichid în timpul travaliului (doza medie zilnică nu trebuie să depășească 1500 ml). Se oprește administrarea înainte de începerea anesteziei cu halotan. Simptomele de supradozare sunt decelabile prin creșterea marcată a frecvenței cardiace materne observată la controlul regulat al pulsului și prin apariția tremorului, palpitațiilor, cefaleei, transpirației. Interacțiuni medicamentoase cu beta-adrenolitice neselective, metilxantine de tip teofilină, antidiabetice, simpatomimetice inclusiv bronhodilatatoare. Nu se administrează concomitent cu alcaloizii ergotaminici, preparate care conțin calciu sau vitamina D, cu dihidrotachisterol sau mineralocorticoizi.

Cpr.: Interacțiuni cu: beta-blocate, antidiabetice. Anumite medicamente pentru circulație și antiastmatice cresc mai ales efectele secundare (pulsațiile cordului, creșterea frecvenței pulsului), de asemenea cafeaua și ceaiul pot intensifica efectele secundare. Contraindicată asocierea cu alcaloizi ergotaminici. Nu se asociază cu preparate de calciu, vitamina D sau dihidrotachisterol.

RA: *Sol. inj.:* Cefalee, tremor, anxietate, transpirații, palpitații și amețeli. În cazuri rare: greață și vărsături. Pot apărea la pacientele astmatice reacții de hipersensibilitate sub formă de greață, diaree, dispnee, atac astmatic acut, tulburări ale conștienței sau șoc. În cazuri izolate au fost observate extrasistole ventriculare sau dureri anginoase (simptomele dispar foarte repede după întreruperea tratamentului). Poate crește ușor frecvența cardiacă maternă și poate scădea tensiunea arterială diastolică. Creșterea glicemiei. Reducerea peristaltismului intestinal. Poate produce hipopotasemie în primele zile de tratament.

Cpr.: Cefalee, anxietate, tremor fin al degetelor, transpirații, palpitații și amețeli, hipotensiune (mai ales scăderea valorii tensiunii diastolice). Rar, grețuri și vărsături. Cazuri izolate: ritm cardiac neregulat, dispnee, senzație de presiune toracică (aceste simptome dispar foarte rapid la întreruperea tratamentului). Creșterea glicemiei mai ales la diabetice, creșterea diurezei mai ales la începutul tratamentului. Tendință la edeme, reducerea peristaltismului intestinal.

HYDROCHLOROTHIAZIDUM *COD ATC: C03AA03*

NEFRIX *SICOMED SA;* Cpr. 25 mg hidroclorotiazidă; ct. × 1 fl. × 40 cpr. ***(P-6L)***

NEFRIX *SICOMED SA;* Cpr. 50 mg hidroclorotiazidă; ct. × 1 fl. × 20 cpr. ***(P-6L)***

Ind: Cardiopatie decompensată cu edem, stenoză mitrală cu hipertensiune pulmonară; ciroză hepatică ascitogenă; edeme de origine medicamentoasă; HTA; edeme nefrotice; diabet insipid.

Dz: *Adulți:* 25-75 mg/zi, în 1-2 prize, maxim 100 mg. *Copii: 3-7 ani:* 0,025 g/zi; *7-14 ani:* 0,05 g/zi.
Cind: Hipokaliemie; alcaloză; IR gravă; IH; hipersensibilitate la hidroclorotiazidă; sarcină.
AI: Prudență în ciroză, nefropatii toxice, diabet zaharat, gută, alăptare.
RA: Trat. prelungit poate provoca hipokaliemie, alcaloză, hiperglicemie, hiperuricemie.

HYDROCORTISONUM *COD ATC: H02AB09*

FLEBOCORTID *NILE CO.;* Pulb. pt. sol. inj. 100 mg hidrocortizon; ct. × 1 f. pulb. + 1 f. solv. × 2 ml ***(P-RF)***

HYDROCORTISONE 100 mg *HEMOFARM;* Liof. pt. sol. inj. 100 mg hidrocortizon; ct. × 1 fl. liof. + 1 f. solv. × 2 ml ***(S/P-RF)***

HYDROCORTISONE 500 mg *HEMOFARM;* Liof. pt. sol. inj. 500 mg hidrocortizon; ct. × 1 fl. liof. + 1 f. solv. × 2 ml ***(S/P-RF)***

HYDROCORTISONE NA SUCCIN. *E.I.P.I.C.O.;* Pulb. pt. sol. inj. a 100 mg hidrocortizon succinat sodic; ct. × 1 fl. pulb. + 1 f. solv. × 2 ml ***(S/P-RF)***

HYDROCORTISONE NA SUCCIN. *ROTEXMEDICA;* Pulb. pt. sol. inj. 100 mg hidrocortizon succinat sodic; ct. × 100 fl. pulb. ***(S/P-RF)***

HIDROCORTIZON *ANTIBIOTICE IAȘI;* Unguent ***(P-RF)***

HIDROCORTIZON ACETAT *ANTIBIOTICE IAȘI;* Ung. 1% hidrocortizon acetat; ct. × 1 tub × 20 g ***(P-RF)***

HIDROCORTIZON ACETAT *BIOFARM SA;* Susp. inj. 25 mg/ml hidrocortizon acetat; ct. × 5 f. × 1 ml; ct. × 100 f. × 1 ml ***(S/P-RF)***

HIDROCORTIZON HEMISUCCINAT *SICOMED;* Sol. inj. hidrocortizon hemisuccinat 5 mg/ml; ct. × 1 f. × 1 ml sol. A + 1 f. × 4 ml sol. B; ct. × 5 f. × 1 ml sol. A + 1 f. × 4 ml sol. B; ct. × 50 f. × 1 ml sol. A + 1 f. × 4 ml sol. B ***(S/P-RF)***

Ind: Insuficiență acută corticosuprarenaliană; adrenalectomie bilaterală; șoc anafilactic și alte reacții alergice grave; infecții generalizate cu toxicitate ridicată; LES; pneumonie prin aspirație.
Dz: Inj. i.m. i.v. sau perf. i.v. 100-500 mg, repetat la intervale de 1, 3, 6 sau 10 ore, în funcție de reacția pacientului.
Cind: Herpes simplex (keratite), psihoze acute, tuberculoză latentă.
A!: Prudență în ulcer gastric sau duodenal activ sau latent, sindrom Cushing, diverticulită, anastomoze intestinale recente, osteoporoză, IR, infecții locale sau sistemice (poate masca simptomele infecțiilor); se evită întreruperea bruscă a trat. cu glucocorticoizi; hipocorticism exogen; intervenții chirurgicale; regim hiposodat și suplimentare a potasiului; diabet zaharat; miastenia gravis; monitorizarea potasemiei; sarcină și alăptare.
RA: Sindrom Cushing, hirsutism, acnee, balanță negativă a azotului; dezechilibre electrolitice; agravarea diabetului zaharat inclusiv hiperglicemia și

glicozuria; osteoporoza reversibilă cu dificultate, necroze aseptice ale șoldului și humerusului; activarea și complicarea ulcerului gastric și duodenal, inclusiv perforarea și hemoragia; agravarea sau mascarea infecțiilor; creșterea TA; convulsii; peteșii și purpură; tulburări ale ciclului menstrual, inclusiv amenoreea, sângerarea prelungită; insomnie; tulburări psihice, euforie, nervozitate; cataractă subcapsulară posterioară; creșterea tensiunii intraoculare; creșterea presiunii intracraniene cu edem papilar; pancreatită; suprimarea creșterii la copii; eritem facial; esofagită ulceroasă; transpirații; vertij; slăbiciune; cefalee; exoftalmie. Atrofie subcutanată sau cutanată, abcesul steril, hiper- și hipo-pigmentația pot fi asociate cu glucocorticoizii injectați.

HYDROCORTISONUM BUTYRATUM *COD ATC: D07AB02*

LOCOID *YAMANOUCHI EUROPE B.V.;* Cremă 0,1% hidrocortizon butamirat; ct. × 1 tub × 30 g ***(P-RF)***

LOCOID *YAMANOUCHI EUROPE B.V.;* Sol. cut. 0,1% hidrocortizon butamirat; ct. × 1 fl. × 30 ml ***(P-RF)***

LOCOID CRELO *YAMANOUCHI EUROPE B.V.;* Emulsie 0,1% hidrocortizon butamirat; ct. × 1 fl. × 30 g ***(P-RF)***

LOCOID LIPOCREAM *YAMANOUCHI EUROPE B.V.;* Cremă 0,1% hidrocortizon butamirat; ct. × 1 tub × 30 g ***(P-RF)***

Ind: Eczeme, dermatite și psoriazis.
Dz: Se aplică de 1-3 ori/zi în strat subțire pe leziune.
Cind: Infecții bacteriene (impetigo, lues, TBC, piodermite), virale (Herpes simplex, varicelă, herpes zoster, veruci vulgare, veruci plane, condiloame, molluscum contagiosum) sau fungice (Candida sau dermatofiți); leziuni cutanate ulcerate, răni, ihtioză, rozaceea facială, acneea vulgaris, dermatita periorală, fragilitate capilară tegumentară, atrofie tegumentară, pruritul perianal și genital; hipersensibilitate la compus.
A!: Trebuie evitat trat. de lungă durată și contactul cu ochii; sarcină și alăptare.
RA: Iritație ușoară, suprainfecții bacteriene, reacții alergice.

HYDROMORPHONUM *COD ATC: N02AA03*

HIDROMORFON *SICOMED SA;* Sol. inj. 0,2% clorhidrat de hidromorfonă; ct. × 3 f. × 1 ml; ct. × 100 f. × 1 ml ***(P-TS)***

Ind: Dureri moderate și severe (boli neoplazice, infarct miocardic, intervenții chirurgicale); anxietate asociată durerii; insomnii provocate de durere; diaree; reduce dispneea din IC; reduce tusea din EPA și stadiile terminale ale cancerului pulmonar; premedicație la intervențiile chirurgicale.
Dz: Inițial 1-2 mg la 4-6 ore inj. s.c., i.m., i.v. lent sau perf i.v. Datorită dezvoltării toleranței, dozele ulterioare pot fi crescute.
Cind: Deprimare respiratorie, astm, IC datorată bolilor pulmonare cronice, alcoolism acut, traumatisme cranio-cerebrale, hipertensiune intracraniană.

A!: Prudență la hipotiroidieni, insuficiență corticosuprarenală, disfuncții hepatice sau renale, hipertrofie prostatică, șoc, tulburări intestinale inflamatorii sau obstructive, miastenia gravis, copii, sarcină și alăptare.
RA: Greață, vomă, constipație, amețeli, confuzie, micțiuni dificile (are și efect antidiuretic), spasme ureterale sau biliare, gură uscată, transpirații, înroșirea feței, vertij, bradicardie, palpitații, hTA ortostatică, hipotermie, modificări de dispoziție, halucinații, mioză, rigiditate musculară, urticarie, prurit, dermatită de contact. Produce dependență, iar la întreruperea trat. apar fenomene de sevraj. La doze mari, depresie respiratorie, hTA până la colaps și comă progresivă, convulsii (la copii), rabdomioliză până la IR. Supradozarea se manifestă, prin: comă, mioză puternică (apoi midriază), depresie respiratorie, edem pulmonar.

HYDROTALCITUM *COD ATC: A02AD04*

RUTACID *KRKA dd;* Cpr. mast. 500 mg hidrotalcit; ct. × 2 blist. × 10 cpr. mast.; ct. × 6 blist. × 10 cpr. mast. ***(OTC)***

TALCID *BAYER AG;* Cpr. mast. 500 mg hidrotalcit; ct. × 2 blist. × 10 cpr. mast.; ct. × 5 blist. × 10 cpr. mast. ***(OTC)***

Ind: Gastrite, ulcere gastrice și duodenale, esofagită de reflux.
Dz: 0,5-1 g hidrotalcit oral la 1-2 ore după fiecare masă, seara la culcare sau atunci când reapar simptomele.
Cind: Hipersensibilitate la hidrotalcit sau la celelalte componente ale produsului.
A!: Prudență în IR; asocierea cu tetracicline, preparate cu fer, digoxină, acid chenodeoxicholic, cimetidină, anticoagulante cumarinice.
RA: Doze mari pot produce diaree.

HYDROXYCARBAMIDUM *COD ATC: L01XX05*

HYDREA *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Cps. 500 mg hidroxiuree; ct. × 1 fl. × 100 cps. ***(S/P-RF)***

HYDROXICARBAMIDE *PLIVA KRAKOW;* Cps. 500 mg hidroxiuree; fl. metalic × 1 pungă × 100 cps. ***(S/P-RF)***

Ind: Melanom, leucemie mielocitară cronică rezistentă și carcinom ovarian recurent, metastatic ori inoperabil; carcinom primar cu celule scuamoase (epidermoid) al capului și gâtului (excluzând buzele) și carcinomul colului uterin.
Dz: *Tumori solide:* Terapie intermitentă: 80 mg/kg, p.o. în doză unică, o dată la 3 zile. Terapie continuă: 20-30 mg/kg, p.o. în doză unică zilnică. *Leucemia cronică mielocitară rezistentă:* 20-30 mg/kg, p.o. în doză unică zilnică.
Cind: Depresie medulară (< 2500 leucocite/mm^3 sau $<100\ 000$ trombocite/mm^3) sau anemie severă; sarcină și alăptare.
A!: Prudență la pacienți care au fost supuși anterior radioterapiei/chimioterapiei; IR severă; vârstnici; măsuri contraceptive în timpul trat.; aport sufi-

cient de lichide; monitorizarea hemoleucogramei; interacțiuni medicamentoase cu uricozurice, citarabină.
RA: Leucopenie, trombocitopenie, anemie; stomatită, anorexie, greață, vărsături, diaree și constipație; rash maculo-papular, eritem facial și eritem periferic; alopecie, hiperpigmentare, atrofierea pielii și a unghiilor, formare de scuame, papule violete; somnolență; cefalee, amețeli, dezorientare, halucinații și convulsii; afectare temporară a funcției tubulare; febră, frisoane și creșteri ale concentrațiilor enzimelor hepatice; infiltrate pulmonare difuze și dispnee.

HYDROXYCHLOROQUINUM

COD ATC: P01BA02

PLAQUENIL *SANOFI~SYNTHELABO;* Cpr. film. 200 mg sulfat de hidroxiclorochină; ct. × 6 blist. × 10 cpr. film. ***(P-RF)***

PLAQUENIL *SANOFI~SYNTHELABO;* Dj. 200 mg sulfat de hidroxiclorochină; ct. × 1 fl. × 100 dj. ***(P-RF)***

Ind: Lupus eritematos sistemic; lupus eritematos discoid; artrită reumatoidă; artrită cronică juvenilă; afecțiuni dermatologice produse sau agravate de lumina solară; malarie.
Dz: *Maladii reumatice:* inițial, 400-800 mg/zi. Întreținere: 200-400 mg/zi. *Afect. dermatologice*: 400 mg/zi. *Malarie:* la *adulți,* 400 mg în aceeași zi a fiecărei săpt.; la *copii,* 6,5 mg/kg, dar nu va depăși doza pentru adult.
Cind: Maculopatie oculară preexistentă; hipersensibilitate la derivați de 4-aminochinolină.
A!: Examen oftalmologic înaintea începerii trat. și apoi anual; teste sanguine periodice; prudență în deficiențe hepatice sau renale, tulburări gastrointestinale, neurologice sau sanguine; sensibilitate la chinină, deficit G-6-PDH, porfirie, psoriazis; copii mici; asociere cu digoxină; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Retinopatie cu modificări de pigmentare și defecte ale câmpului vizual; rash cutanat; modificări pigmentare ale pielii și mucoaselor, albirea părului și alopecie; dermatită exfoliativă; greață, diaree, anorexie, dureri abdominale; slăbiciune musculară, vertij, tinitus, surditate de cauză nervoasă, cefalee, labilitate emoțională; rar depresie medulară, cardiomiopatie, neuromiopatie, psihoză și convulsii.

HYDROXYZINUM

COD ATC: N05BB01

HIDROXIZIN *SICOMED SA;* Dj., 25 mg clorhidrat de hidroxizină; ct. × 1 fl. × 30 dj. ***(P-RF)***

Ind: Stări de anxietate, agitație psihomotorie, nevroze, psihoze, tulburări de somn, alcoolism, distonii neurovegetative, greață și vărsături, urticarie, prurit și dermatite alergice cu componentă psihoafectivă, sindrom Ménière.
Dz: *Adulți și copii peste 10 ani:* 50-100 mg *Copii peste 1 an:* 1 mg/kg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la hidroxizină, primul trimestru de sarcină, alăptare.

A!: Prudență în IR, glaucom cu unghi închis; asocieri cu deprimante centrale, analgezicele opioide, alcool și anticoagulante cumarinice; șoferi și activități de precizie.
RA: Somnolență, tremor, uscăciunea gurii, convulsii.

I

IBUPROFENUM

COD ATC: M01AE01

ADVIL® *WYETH-LEDERLE PHARMA GmbH;* Dj. ibuprofen 200 mg; ct. × 1 blist. × 10 dj; ct. × 2 blist. × 10 dj; ct. × 3 blist. × 10 dj; ct. × 5 blist. × 10 dj. ***(OTC)***

ANTIDOL *EUROPHARM SA;* Cps. ibuprofen 400 mg; ct. × 2 blist. × 6 cps. ***(P-6L)***; ct. × 50 blist. × 6 cps. ***(S)***

ANTIDOL *EUROPHARM SA;* Sup. ibuprofen 500 mg; ct. × 2 blist. × 5 sup.; ct. × 50 blist. × 5 sup. ***(P-RF)***

FASPIC® 400 *ZAMBON GROUP S.p.a.;* Pulb. pt. susp. orală, ibuprofen 400 mg/1 plic; ct. × 12 plicuri × 3 g pulb. ***(P-6L)***

FASPIC® 600 *ZAMBON GROUP S.p.a;* Pulb. pt. susp. orală ibuprofen 600 mg/1 plic; ct. × 30 plicuri × 3 g pulb. ***(P-6L)***

IBUFEN® *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cpr. film. 200 mg

IBUGESIC® *DAR AL DAWA*; Susp. orală ibuprofen 100 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml ***(P-RF)***

IBUTIMEN RETARD 600 *NYCOMED*; Cpr. retard ibuprofen 600 mg; ct. × 1 fl. × 100 cpr.; ct. × 3 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

IBUPROFEN *POLFA;* Dj. ibuprofen 200 mg; ct. × 100 dj. ***(OTC)***

IBUPROFEN *LEINER HEALTH PRODUCTS;* Cpr. film. ibuprofen 200 mg; fl. × 24 cpr. film.; fl. × 100 cpr. film. ***(OTC)***

IBUPROFEN 200 mg *ARENA GROUP SA;* Cps. ibuprofen 200 mg; ct. × 1 fl. × 20 cps. ***(OTC)***

MARCOFEN *EUROPHARM;* Cps. 400 mg ***(P-6L)***

MARCOFEN *GLAXO SMITHKLINE;* Sirop 2% ibuprofen; ct. × 1 fl. × 60 ml ***(P-RF)***

MEDIBUPROFEN *MEDIFARM SERV SRL;* Gel 5% ibuprofen; ct. × 1 tub × 40 g ***(OTC)***

NUROFEN *BOOTS CO. PLC.;* Cpr. film. 200 mg ibuprofen; ct. × 2 blist. × 6 dj. ***(OTC)***

NUROFEN FORTE *BOOTS CO. PLC.;* Cpr. film. 400 mg ibuprofen; ct. × 2 blist. × 12 dj. ***(P-6L)***

NUROFEN PT. COPII *BOOTS CO. PLC.;* Susp. orală 2% ibuprofen; ct. × 1 fl. × 100 ml ***(OTC)***

NUROFEN GEL *BOOTS CO. PLC.;* Gel 5% ibuprofen ***(OTC)***

PADUDEN *TERAPIA SA;* Cps. 200 mg ibuprofen; ct. × 3 blist. × 10 cps. ***(OTC)***

PADUDEN SR 300 mg *TERAPIA SA;* Cps. cu elib. prel. ***(P-6L)***

PROFINAL *GULF PHARMACEUTICAL IND.;* Cpr. film. 400 mg ibuprofen; ct. × 2 blist. × 12 cpr. film. ***(P-6L)***

PROFINAL *GULF PHARMACEUTICAL IND.;* Cpr. film. 600 mg ibuprofen; ct. × 2 blist. × 10 cpr. film.; ct. × 4 blist. × 10 cpr. film ***(P-6L)***

PROFINAL *GULF PHARMACEUTICAL IND.;* Dj. 200 mg ibuprofen; ct. × 2 blist. × 10 dj. ***(P-6L)***

PROTOPEN 400 *LAB. VOGEN.;* Cpr. film. 400 mg ibuprofen; ct. × 3 blist. × 10 cpr. film. ***(P-6L)***

REUPROFEN 200 mg *HELCOR SRL;* Cpr. film. 200 mg ibuprofen; ct. × 3 blist. × 10 cpr. film. ***(OTC)***

REUPROFEN 400 mg *HELCOR SRL;* Cpr. film. 200 mg ibuprofen; ct. × 3 blist. × 10 cpr. film. ***(P-6L)***

RUPAN *MEDOCHEMIE Ltd.;* Cpr. film. 200 mg ibuprofen; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(OTC)*** ct. × 10 blist. × 10 cpr.; ct. × 100 blist. × 10 cpr. ***(S)***

SOLPAFLEX GEL *GLAXO SMITHKLINE;* Gel 5% ibuprofen ***(OTC)***

UPFEN *LAB. UPSA.;* Cpr. film. 200 mg ibuprofen; ct. × 2 blist. × 10 cpr. film. ***(OTC)***

UPFEN *LAB. UPSA.;* Cpr. eff. 200 mg ibuprofen; ct. × 2 tuburi × 10 cpr. eff. ***(OTC)***

URGO IBUPROFEN 5% GEL *LAB. UPSA.;* Gel 5% ibuprofen; ct. × 1 tub. × 60 g ***(OTC)***

Ind: Trat. simptomatic al afecțiunilor dureroase și al febrei; trat. poliartritei reumatoide (inclusiv artrita juvenilă), osteoartritelor, spondilartritei ankilopoietice, artritei gutoase și artritei psoriazice.
Dz: 400-1800 mg/zi, divizat în 3-4 prize, maxim 2400 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la ibuprofen și alte AINS, ulcer peptic activ sau în antecedente, hemoragii gastrointestinale, colită ulceroasă, tulburări hepatice și/sau renale grave, LES sau alte colagenoze; începând cu luna 6-a de sarcină.
A!: Supraveghere strictă medicală; prudență la vârstnici, copii, boli active ale tractului gastro-intestinal, istoric de bronhospasm, afectarea funcțiilor renale și/sau hepatice sau cardiace, istoric de IC sau HTA, deficite intrinseci de coagulare, tulburări de vedere; asocieri cu diuretice, anticoagulante orale, ticlopidină, alfa-blocante, glucocorticoizi, acid acetilsalicilic sau alte AINS, digoxină, fenitoină, litiu, metotrexat, dispozitive contraceptive intrauterine; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Pirozis, anorexie, greață, vomă, dispepsie, disconfort abdominal, diaree, ulcer activ și hemoragii gastro-intestinale, cefalee, confuzie, tinitus și som-

nolență, tulburări psihotice, reacții depresive, febră, redoarea mușchilor gâtului, tulburări senzoriale, ambliopie toxică, vedere încețoșată și tulburări ale vederii colorate, urticaria, exantemul și purpura, prurit, sdr. Stevens-Johnson, reacții de hipersensibilitate, prelungirea timpului de sângerare, trombocitopenie, granulocitopenie, agranulocitoză, anemie hemolitică și anemie aplastică, valori anormale ale testelor hepatice, icter, retenție hidrosalină, disurie, nefrită interstițială acută.

ICODEXTRINUM

COD ATC: B05DAN1

EXTRANEAL *BAXTER HEALTH CARE;* Sol. dializă perit icodextrină 7,5%; pungă × 1,5 l sol; pungă × 2 l sol.; pungă × 2,5 l sol. ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. IRC, în program de dializă peritoneală continuă ambulatorie (CAPD) sau dializă peritoneală automată (APD).
Dz: Maxim 2 l, o dată/zi, în timpul celui mai lung schimb, de obicei în timpul nopții în CAPD, iar în APD în timpul zilei.
Cind: Alergie la polimeri derivați din amidon, maltoză sau izomaltoză; int. chir. abdominale în luna precedentă începerii trat.; fistule abdominale, tumori, plăgi deschise, hernie sau alte cazuri în care integritatea peretelui abdominal și a cavității peritoneale este compromisă.
A!: Nu se recomandă copiilor și în IRA; prudență în nutriție anormală, disfuncții respiratorii, deficit de potasiu, diabet zaharat; monitorizarea balanței hidrice, hematologice; sarcină și alăptare.
RA: Dureri abdominale, crampe musculare, hemoragii, infecții la locul de ieșire a cateterului, obstruarea cateterului, dezechilibre hidro-electrolitice, hTA, HTA.

IDARUBICINUM

COD ATC: L01DB06

ZAVEDOS *PHARMACIA & UPJOHN;* Cps. 5 mg idarubicină; ct. 1 fl. × 1 cps. ***(S)***

ZAVEDOS *PHARMACIA & UPJOHN;* Cps. 10 mg, 25 mg idarubicină; ct. 1 fl. × 1 cps. ***(S)***

ZAVEDOS *PHARMACIA & UPJOHN;* Pulb. liof. pt. sol. inj. 10 mg idarubicină; ct. 1 fl. pulb. liof. ***(S)***

ZAVEDOS *SINDAN & PHARMACIA & UPJOHN;* Pulb. liof. pt. sol. inj. 5 mg, 10 mg idarubicină; ct. 1 fl. pulb. liof. ***(S)***

Ind: *Int.:* Leucemie acută nonlimfocitară (LANL), neoplasm mamar. *Inj.:* LANL la adulți pentru inducția remisiunii, leucemie acută limfocitară (LAL) ca trat. de linia a doua la adulți și copii. Cancer de sân.
Dz: *Int.:* Adulți cu LANL: 15-30 mg/m^2/zi timp de 3 zile. Cancer avansat de sân: 35-45 mg/m^2, doză unică sau divizată pe parcursul a 3 zile consecutive repetat la fiecare 3 sau 4 săpt. *Inj.: Adulți cu LANL:* 12 mg/m^2 i.v. zilnic, timp de 3 zile sau 8 mg/m^2 i.v. zilnic timp de 5 zile. *Adulți cu LAL:* 12 mg/m^2 i.v. zilnic timp de 3 zile, *copii:* 10 mg/m^2 i.v. zilnic timp de 3 zile.
Cind: Hipersensibilitate la idarubicină sau/și la alte antracicline, afecțiuni renale sau hepatice severe, infecții greu de controlat; sarcină și alăptare.

A!: Prudență în depresie medulară preexistentă, afecțiuni cardiace preexistente și terapii anterioare cu antracicline, iradiere totală sau transplant de măduvă osoasă în antecedente, infecții sistemice, boli gastrointestinale active; monitorizarea hematologică, cardiacă și hepatică; interacțiuni cu mielosupresive, radioterapie; șoferi și activități de precizie.
RA: Mielosupresie severă, toxicitate cardiacă, alopecie, greață, vărsături, inflamații ale mucoaselor, diaree, febră, tremor; rash cutanat, creșterea enzimelor hepatice și a bilirubinei, frisoane, infecții severe.

IFOSFAMIDUM

COD ATC: L01AA06

HOLOXAN 1 g; HOLOXAN 2 g *ASTA MEDICA;* Pulb. pt. sol. inj. 1 g, 2 g ifosfamidă; ct. × 1 fl. pulb. ***(S)***

HOLOXAN 200 mg; HOLOXAN 500 mg *ASTA MEDICA;* Pulb. pt. sol. inj. 200 mg, 500 mg ifosfamidă; ct. × 1 fl. pulb. ***(S)***

Ind: Tumori inoperabile: carcinom bronșic, pancreatic, ovarian, mamar, tumorile testiculare, sarcoamele țesuturilor moi, limfoamele maligne.
Dz: 1,2-2,4 g/m^2/zi, i.v., timp de 5 zile consecutiv sau doză unică 5 g/m^2.
Cind: Hipersensibilitate la ifosfamidă; depleție medulară marcată; infecții active; IR sau obstrucții ale tractului urinar; cistite; sarcină și alăptare.
A!: Monitorizare hematologică și renală; diureză corespunzătoare; adm. împreună cu mesna; prudență la vârstnici, radioterapie anterioară, diabet zaharat, IH, metastaze cerebrale, cerebropatii; asocieri cu alte citostatice, agenți nefrotoxici, vaccinuri, warfarină, allopurinol, hidroclortiazidă, clorpromazină, triiodotironină, disulfiram, sulfoniluree, fenobarbital, fenitoină, suxametoniu.
RA: Leucopenie, trombocitopenie, anemie, cistită hemoragică, afecțiuni renale, sdr. Fanconi, encefalopatie, greață și vărsături, alopecie, azoospermie sau oligospermie, tulburări de ovulație, amenoree, fibroză pulmonară interstițială cronică, pneumonii, inflamații cutanate; reacții de hipersensibilizare, creșterea enzimelor hepatice și/sau a bilirubinei, anorexie, constipație, flebite, febră, polineuropatii, tulburări de vedere.

ILOPROSTUM

COD ATC: B01AC11

ILOMEDIN® 20 *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Conc. pt. sol. perf. 20 µg/ml; ct. × 5 f. × 1 ml; ct. × 5 f. × 2,5 ml ***(S)***

Ind: Trat. trombangeitei obliterante avansate (boala Buerger) cu ischemie gravă a membrelor, când revascularizația nu este indicată. Afecțiuni arteriale periferice ocluzive, în special al acelora cu risc de amputație, la care int. chir. sau/și angioplastia nu sunt posibile. Sindrom Raynaud invalidant, care nu a răspuns la alt trat.
Dz: Adm. sub strictă supraveghere în spital. Inițial 0,5 ng/kg/min, timp de 30 minute. Apoi este crescută la intervale de 30 de minute, cu câte 0,5 ng/kg/min până la maximum 2 ng/kg/min. Durata tratamentului este de până la 4 săptămâni. În IR sau ciroză hepatică se reduce doza la jumătate. Nu se recomandă perfuzarea continuă câteva zile datorită dezvoltării tahifilaxiei și apariției unui rebound cu hiperagregabilitate trombocitară la oprirea tratamentului.

Cind: Hipersensibilitate la iloprost. Afecțiuni cu risc hemoragic (ulcer gastroduodenal activ, traumatisme, hemoragie intracraniană). Afecțiuni coronariene severe sau angor instabil; infarct miocardic în ultimele 6 luni; IC congestivă cronică sau acută; aritmii; suspiciune de edem pulmonar. Sarcină și alăptare.
A!: Nu se amână intervenția chirurgicală la pacienții care necesită de urgență amputare. Monitorizarea funcției cardiare și a TA. Iloprost poate fi folosit numai după diluare iar nici un alt medicament nu se adăugă în soluția preparată pentru perfuzie. Ingestia produsului sau contactul cu mucoasele trebuie evitate. Atenție la asocieri cu alfa-blocante, blocantele canalelor de calciu, vasodilatatoare directe, IEC, acid acetilsalicilic sau alte AINS, molsidomină.
RA: Înroșirea feței, stare generală de rău, crampe abdominale, diaree, transpirație, senzație de căldură și slăbiciune musculară, dureri în membrul afectat, în mușchii masticatori și în maxilar, parestezii, febră, frison, confuzie, apatie, sedare, agitație, scăderea sau creșterea TA, tahicardie, aritmii, extrasistole, reacții alergice.

IMATINIBUM

COD ATC: L01XX28

GLIVEC 50 mg *NOVARTIS PHARMA;* Cps. imatinib 50 mg; ct. × 3 blist. × 12 cps. *(S)*

GLIVEC 100 mg *NOVARTIS PHARMA;* Cps. imatinib 100 mg; ct. × 2 blist. × 12 cps.; ct. × 4 blist. × 12 cps.; ct. × 8 blist. × 12 cps.; ct. × 10 blist. × 12 cps.; ct. × 15 blist. × 12 cps. *(S)*

Ind: Trat. leucemie granulocitară cronică (LGC), cu cromozom Philadelphia pozitiv, în criză blastică, în fază accelerată sau în fază cronică după eșecul trat. cu interferon alfa.
Dz: 400 mg/zi pentru pacienții cu LGC în fază cronică și 600 mg/zi pentru pacienții în fază accelerată sau criză blastică.
Cind: Hipersensibilitate la produs.
A!: Prudență la copii, hepatici, IR; monitorizarea hepatică și a hemogramei, asocieri cu inhibitori/inductori ai CYP3A4; sarcină și alăptare.
RA: Neutropenie, trombocitopenie, anemie, cefalee, greață, vomă, diaree, dispepsie, edem periorbitar, dermatită, erupții, spasme musculare și crampe, dureri musculo-scheletice, tumefacții articulare, edeme, neutropenie febrilă, pancitopenie, anorexie, amețeli, tulburări de gust, parestezii, insomnie, conjunctivită, lăcrimare, revărsat pleural, epistaxis, hemoragii gastrointestinale, melenă, ascită, ulcer gastric, reflux gastroesofagian, ulcerații bucale, edem palpebral, prurit, eritem, piele uscată, alopecie, sudorație nocturnă, febră, oboseală, slăbiciune, rigiditate, creștere în greutate.

IMIDAPRILUM

COD ATC: C09A A16

TANATRIL *LAB. FOURNIER SA;* Cpr. a 5 mg; 10 mg; 20 mg imidapril; ct. × un blister × 7 cpr.; ct. × un blister × 10 cpr.; ct. × 2 blistere × 7 cpr.; ct. × 3 blistere × 5 cpr.; ct. × 2 blistere × 7 cpr.; ct. × 2 blistere × 10 cpr.; ct. × 4 blistere × 7 cpr.; ct. × 3 blistere × 10 cpr.; ct. × 5 blistere × 10 cpr.; ct. × 8 blistere × 7 cpr.; ct. × 10 blistere × 10 cpr.; ct. × 100 blistere × 10 cpr.

Ind: Tratamentul hipertensiunii arteriale esențiale.
Dz: Se adm. oral, preferabil cu 15 minute înainte de masă. *Adulți:* Inițial 5 mg imidapril o dată pe zi. Dacă nu s-a obținut un control optim al tensiunii arteriale după cel puțin 3 săptămâni de tratament, doza zilnică poate fi crescută până la 10 mg clorhidrat de imidapril, care a fost dovedită a fi cea mai eficace doză zilnică. La unii pacienți poate fi necesară doza maximă recomandată: 20 mg/zi. *Vârstnici* (65 de ani sau peste): Inițial 2,5 mg o dată pe zi. Doza zilnică trebuie ajustată în funcție de răspunsul tensiunii arteriale (maxim 10 mg o dată pe zi). Insuficiența renală cu clearance-ul creatininei între 30 ml/min și 80 ml/min: se începe tratamentul cu 2,5 mg/zi. La pacienți cu clearance al creatininei sub 10 ml/min și până la 29 ml/min nu trebuie administrat. Insuficiență hepatică: inițial 2,5 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la clorhidratul de imidapril, alți IECA sau oricare dintre excipienții produsului; Antecedente de edem angioneurotic asociat cu tratament anterior cu IECA; Angioedem ereditar/idiopatic; Sarcină; Alăptare; Hipertensiune renovasculară; Insuficiență renală cu sau fără hemodializă (clearance-ul creatininei < 10 ml/min). Copii.
A!: Prudență la pacienți cu psoriasis, hipertensiune renovasculară, stenoză aortică, cardiomiopatie hipertrofică, insuficiență renală, pacienți care urmează un tratament de LDL afereză cu dextran sulfat, hipersensibilitate la toxine și mușcătura insectelor. Pacienți cu risc crescut de hipotensiune arterială la doza inițială: se corectează deficitul hidric și/sau electrolitic, se întrerupe terapia cu diuretice cu 2 - 3 zile înainte de tratamentul cu IEC. La pacienții hipertensivi cu insuficiență cardiacă asociată s-a observat hipotensiune arterială simptomatică după tratament cu IECA. La acești pacienți doza inițială trebuie să fie de 2,5 mg clorhidrat de imidapril o dată pe zi, sub stricta supraveghere medicală. Pacienții cu risc crescut de hipotensiune arterială la doza inițială trebuie supravegheați timp de 6-8 ore de la administrarea primei doze de imidapril și, de asemenea, ori de câte ori se crește doza de imidapril sau de diuretic asociat. Doza inițială trebuie să fie de 2,5 mg clorhidrat de imidapril. Acest lucru se aplică și pacienților cu angină pectorală și boală cerebrovasculară. Acești pacienți prezintă un risc crescut de infarct miocardic sau de accident vascular cerebral acut, ca urmare a unei hipotensiuni arteriale de durată. Interacțiuni cu spironolactonă, triamteren, amilorid, suplimentele de potasiu, sărurile de potasiu, litiu, anestezice, antipsihotice, antihipertensive, alopurinol, citostatice, agenți imunosupresori, glucocorticoizi sistemici, procainamidă, AINS, antidiabetice, rifampicină, antiacide, simpatomimetice, alcool. Prudență la persoanele care conduc vehicule sau folosesc utilaje.
RA: Reacțiile adverse cele mai frecvente observate la grupul de pacienți tratați cu imidapril au fost: tuse, amețeli, fatigabilitate/somnolență, dispepsie și vărsături. În particular, următoarele reacții adverse au fost observate în timpul terapiei cu imidapril sau alți IECA. Supradozare: hipotensiune arterială severă, șoc, obnubilare, bradicardie, tulburări electrolitice și insuficiență renală.

IMIGLUCERASUM *COD ATC: A16AB02*

CEREZYME *GENZYME BV;* Pulb. pt. sol. perf. imiglucerază 200 UI/fl.; ct. × 1 fl; ct. × 25 fl. ***(S/P-RF)***

CEREZYME *GENZYME BV;* Pulb. pt. sol. perf. imiglucerază 400 UI/fl.; ct. × 1 fl; ct. × 5 fl.; ct. × 25 fl. ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. enzimatic de substituție pe termen lung, la pacienți cu diagnostic confirmat de boală Gaucher tip I, care prezintă manifestări clinice semnificative.
Dz: Perf. i.v. timp de 1-2 ore, inițial 60 UI/kg o dată la 2 săpt., apoi 2,5 UI/kg de 3 ori/săpt. sau 15 UI/kg o dată la 2 săpt.
Cind: Hipersensibilitate la produs.
A!: Apar anticorpi IgG față de imiglucerază; risc de hipertensiune pulmonară; sarcină și alăptare.
RA: Disconfort, prurit, arsură, inflamație sau abces steril la locul puncției venoase, prurit, congestie, angioedem, jenă toracică, tahicardie, cianoză, simptome respiratorii, hTA, greață, vomă, crampe abdominale, diaree, erupții cutanate, oboseală, amețeli, febră, rigiditate.

IMIPENEMUM + CILASTATIMUM *COD ATC: J01DH51*

TIENAM® *MERCK SHARP & DOHME;* Fl. conț. 500 mg imipenem și 500 mg cilastatină sodică; ct. × 5 fl. pulb. ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. infecțiilor polimicrobiene și mixte cu agenți aerobi/anaerobi; în trat. inițial, înaintea identificării agenților etiologici implicați în: infecții abdominale, ale căilor respiratorii inferioare; ginecologice, septicemii; infecții ale tractului genitourinar, ale oaselor și articulațiilor; infecții ale pielii și țesuturilor moi; endocardite.
Dz: *În scop terapeutic*, la *adulții* cu funcție renală normală și greutate corporală > 70 kg: inf. ușoare: 250 mg la 6 ore; inf. moderate: 500-1000 mg la 8-12 ore; inf. severe: 500-1000 mg la 6-8 ore. Doza trebuie redusă pentru pacienții cu clearance al creatininei < 70 ml/min/1,73 m^2 și/sau greutate corporală < 70 kg. *În scop profilactic:* profilaxia infecțiilor postoperatorii la *adulți:* 1000 mg i.v. la inducerea anesteziei și 1000 mg, 3 ore mai târziu. Pentru int. chir. cu risc crescut se pot adm. două doze suplimentare de 500 mg la 8 și la 16 ore după inducție. *În scop terapeutic:* la *copii (de 3 luni sau mai mari): copiii cu greutate corporală > 40 kg* vor primi doze de adult; *sugarii* și *copiii sub 40 kg:* 15 mg/kg la 6 ore. Doza totală zilnică maxim 2 g.
Cind: Hipersensibilitate la produs. Meningită. Copii sub 3 luni. Asocierea cu ganciclovir.
A!: Înaintea începerii trat. este făcută o anamneză atentă în legătură cu o posibilă hipersensibilitate la antibiotice β-lactamice în antecedente. Dacă apare o reacție alergică, adm. va fi întreruptă și se vor lua măsurile corespunzătoare. Apariția colitei pseudomembranoase a fost raportată și se poate prezenta variat, de la forme blânde până la cele cu risc letal. De aceea trebuie prescris cu atenție la cei cu istoric de boli gastrointestinale, în special de colită. Tratamentul anticonvulsivant trebuie continuat la pacienții cu tulburări convulsive cunoscute. Dacă apar tremor focal, mioclonii sau convulsii, pacienții vor fi consultați neurologic și vor începe trat. anticonvulsivant, dacă acesta nu era instituit. Sarcină și alăptare.
RA: Eritem, durere și indurație locală, tromboflebită; rash, prurit, urticarie, sd. Steven-Johnson, angioedem, necroliză epidermică toxică, candidoză, febră, reacții anafilactice; greață, vărsături, diaree, pătarea dinților, colita pseudomembranoasă; eozinofilie, leucopenie, neutropenie, agranulocitoză, trombocitopenie,

prelungirea timpului de protrombină, creșteri ale transaminazelor serice, bilirubinei, fosfatazei alcaline serice, rar hepatită; oligurie/anurie, poliurie, IRA, stări confuzionale sau convulsii, pierderea auzului, modificări ale gustului.

IMIQUIMODUM *COD ATC: D06BB10*

ALDARA® 5% *3M MEDICA;* Cremă 5%; ct. × 12 plicuri × 250 g cremă 5% ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. la adulți a condiloamelor ano-genitale externe.
Dz: Se aplică de 3 ori pe săpt. și se lasă pe piele 6-10 ore.
Cind: Hipersensibilitate la produs.
A!: Prudență la adm. în zona prepuțului la bărbații fără circumcizie, vârstnici; nu se recomandă la trat. condiloamelor interne; sarcină și alăptare.
RA: Eritem, escoriații, scuame, edeme, indurație, ulcerație, cruste și vezicule, cefalee, simptome de tip gripal și mialgii.

INDAPAMIDUM *COD ATC: C03BA11*

INDAPAMIDUM 1,5 mg; INDAPAMIDUM 2,5 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. film. cu elib. prel.1,5 mg și Cpr. film. 2,5 mg ***(S/P-6L)***

INDAPSAN *SANOFI WINTHROP;* Cpr. indapamidă hemihidrată 2,5 mg; ct. × 3 blist. × 20 cpr. ***(P-6L)***

TERTENSIF *LAB. SERVIER;* Cpr. film. indapamidă 2,5 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. film. ***(P-6L)***

TERTENSIF SR *LAB. SERVIER;* Cpr. cu elib. prel. indapamidă 1,5 mg; ct. × 2 blist. × 15 cpr. ***(P-6L)***

Ind: HTA esențială.
Dz: 2,5 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la indapamidă, accidente vasculare cerebrale recente; afecțiuni hepatice grave.
A!: Supravegherea nivelurilor kaliemiei și uricemiei; prudență în gută, asocieri cu litiul, medicații proaritmogene, glucocorticoizi, alte diuretice care elimină potasiu, laxativele, AINS, antidiabeticele orale, antiaritmice, antiHTA, vasodilatatoare, neuroleptice; sarcină și alăptare.
RA: Hipokaliemie, oboseală, hTA ortostatică, hiperuricemie, alergii.

INDINAVIRUM *COD ATC: J05AE02*

CRIXIVAN® 100 mg; CRIXIVAN® 200 mg *MERCK SHARP & DOHME;* Cps. indinavir 100 mg; 200 mg ct. × 1 fl. × 180 cps. ***(S/P-RF)***

CRIXIVAN® 333 mg *MERCK SHARP & DOHME;* Cps. indinavir 333 mg; ct. × 1 fl. × 135 cps. ***(S/P-RF)***

CRIXIVAN GOLD *MERCK SHARP & DOHME;* Cps. 400 mg ***(S)***

Ind: Trat. adulților, adolescenților și copiilor de 4 ani și peste, infectați cu HIV-1.

Dz: *Adulți:* 800 mg p.o, la 8 ore. *Copii și adolescenți* 500 mg/m^2 p.o la 8 ore.
Cind: Hipersensibilitate la indinavir.
A!: Risc de nefrolitiază (monitorizarea funcției renale și hidratare); prudență în hemofilie (tip A sau B), IH ușoară sau moderată, IR; asocieri cu terfenadină, cisapridă, astemizol, alprazolam, triazolam, pimozidă, derivați de ergot, rifampicină, statine, sildenafil, warfarină, rifabutină, delavirdină, ritonavir, saquinavir, didanozină, fenobarbital, fenitoină, dexametazonă și carbamazepină; sarcină și alăptare.
RA: Greață, cefalee, diaree, astenie, erupții cutanate, modificarea gustului, piele uscată, dureri abdominale, dispepsie, flatulență, insomnie, prurit, hiperestezie, uscăciunea gurii, disurie, regurgitații acide, parestezii și mialgii, nefrolitiază, piurie, hipertrigliceridemie, hipercolesterolemie, rezistență la insulină și hiperglicemie, redistribuirea țesutului adipos, creșteri ale volumului eritrocitar mediu, transaminazelor, bilirubinei indirecte, bilirubinei serice totale; scăderea neutrofilelor; hematurie, proteinurie, cristalurie.

INDOMETACINUM

COD ATC: M02AA23
M01AB01
S01BC01

ELMETACIN *SANKYO;* Sol. ext. 1% indometacin; ct. × 1 fl. × 50 ml + sist. pulveriz. ***(OTC)***

INDOCOLLYRE *LAB. CHAUVIN;* Sol. oft. 0,1% indometacin; ct. × 1 fl. × 5 ml ***(P-6L)***

INDOMETACIN *HELCOR;* Sup. indometacin 50 mg; ct. × 6 sup. ***(P-RF)***

INDOMETACIN *TERAPIA SA;* Cps. indometacin 25 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. ***(P-RF)***; ct. × 100 blist. × 10 cps. ***(S)***

INDOMETACIN *ANTIBIOTICE IAȘI;* Gel 1%; Ung. 4% ct. × 1 tub × 35 g ***(OTC)***

INDOMETACIN *ANTIBIOTICE IAȘI;* Sup. indometacin 50 mg; ct.. x 2 blist. × 3 sup. ***(P-RF)***

INDOMETACIN *EUROPHARM SA;* Sup. indometacin 50 mg; ct. × 2 blist. × 5 sup. ***(P-RF)***; ct. × 50 blist. × 5 sup. ***(S)***

INDOMETACIN MK CREMĂ *MARK INT.;* Ung indometacin 4%; ct. × 1 tub × 35 g ***(OTC)***

INDOMETACIN *BALKAN PHARMA TROYAN;* Gel 5% indometacin; ct. × 1 tub × 40 g ***(OTC)***

INDOMETACIN *SANTA SA;* Sup. indometacin 50 mg; ct. × 6 sup. ***(P-RF)***

INDOMETACIN *SINTOFARM SA;* Sup. indometacin 50 mg; ct. × 2 folii × 5 sup. ***(P-RF)***

INDOMETACIN *NORDFARM PRODUCT;* Sup. indometacin 50 mg; ct. × 10 sup. ***(P-RF)***

INDOMETACIN *IASSYFARM SRL;* Sup. indometacin 50 mg; ct. × 10 sup. ***(P-RF)***

INDOMETACIN *ARGEȘFARM;* Sup. indometacin 50 mg; ct. × 6 sup. ***(P-RF)***

INDOMETACIN *AESCULAP;* Sup. indometacin 50 mg; ct. × 6 sup. ***(P-RF)***

INDOMETACIN *MAGISTRA C&C;* Sup. indometacin 50 mg; ct. × 1 blist. × 6 sup. ***(P-RF)***

INDOMETACIN *LAB. REMEDIA SRL;* Sup. indometacin 50 mg; ct. × 2 plachete × 5 sup. ***(P-RF)***

INDOMETACIN 25 mg *ARENA GROUP SA;* Cps. indometacin 25 mg; ct. × 1 fl. × 30 cps. ***(P-RF)***

INDOMETACIN 4% *HYPERION;* Ung. indometacin 4%; ct. × 1 tub × 25 g; ct. × 1 tub × 40 g ***(OTC)***

INDOMETACIN 50 mg *ARENA GROUP SA;* Cps. indometacin 25 mg; ct. × 1 fl. × 20 cps. ***(P-RF)***

INDOSIN GEL *SINTOFARM SA;* Gel indometacin 2%; ct. × 1 tub × 40 g ***(OTC)***

Ind: Artrită reumatoidă cronică și pusee acute; spondilartrită anchilopoietică; artroză degenerativă; disfuncții musculo-scheletale acute; dureri cu localizare lombo-sacrală; gută (puseu acut); periartrită, tendinită, tenosinovită, bursită, capsulită; dismenoree primară; inflamații, dureri și edeme în afecțiuni și după intervenții chirurgicale ORL, stomatologie, ortopedie. Ung: Afecțiuni reumatismale, leziuni, inflamații și dureri de origine circulatorie, degerături.
Dz: *Int.:* 50-200 mg/zi, în funcție de indicație. *Ung.:* local de 2-3 ori pe zi.
Cind: Ulcer peptic activ, leziuni gastrointestinale recurente în antecedente, alergie la indometacină, aspirină sau alți AINS; hemofilie sau alte tulburări hemoragice; IR și IH severă; copii sub 14 ani. Aplicarea pe mucoase și leziuni cutanate (ulcer de gambă, supurații). Sarcină și alăptare.
A!: Prudență la vârstnici, pacienți cu tulburări de coagulare, tulburări psihiatrice, parkinsonism, epilepsie, IC, HTA, disfuncții hepatice sau renale; asocieri cu ticlopidină, aspirină și alți salicilați sau AINS, anticoagulante orale și heparină, probenecid, litiu, beta-blocante, diuretice tiazidice și care economisesc potasiu, metotrexat; șoferi și activități de precizie.
RA: Cefalee, insomnie, amețeală, somnolență, stări de confuzie, tinitus, greață, vărsături, dispepsie, ulcerație și hemoragie gastrointestinală, edem periferic, HTA, palpitații, tahicardie, aritmii, disfuncții renale și hepatice (rar icter), tulburări de vedere, discrazie sanguină, hiperglicemie, glicozurie, hematurie, creșteri/scăderi în greutate, manifestări respiratorii acute (dispnee, astm), reacții alergice și anafilactice.

INFLIXIMABUM

COD ATC: L04AA12

REMICADE *SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG;* Pulb. pt. conc. sol. perf. infliximab 100 mg/fl.; ct. × 1, 2 sau 3 fl. ***(S)***

Ind: Artrită reumatoidă. Boala Crohn activă și severă, trat. bolii Crohn cu fistule și activă. Spondilita anchilopoetică.

Dz: *Artrită reumatoidă:* perf. 3 mg/kg, timp de 2 ore, urmate de doze suplimentare de 3 mg/kg, la 2 și la 6 săpt. de la prima perfuzie și apoi o dată la 8 săpt. Se asociază cu metotrexat. *Boala Crohn severă și activă:* p.i.v. 5 mg/kg, timp de 2 ore, apoi perfuzii adiționale la 2 și 6 săpt. urmate de perfuzii la fiecare 8 săpt. (trat. de menținere). *Boala Crohn cu fistule și activă:* perf. inițială cu 5 mg/kg, în timp de 2 ore, repetat la 2 și 6 săpt. urmate de perfuzii adiționale la 8 săptămâni. *Spondilita anchilopoetică:* p.i.v. 5 mg/kg, timp de 2 ore, repetat la 2 și 6 săpt. de la prima perfuzie, apoi la fiecare 6 sau 8 săpt.
Cind: Tuberculoză, hipersensibilitate la infliximab și la alte proteine murine, sepsis, infecții manifeste clinic și/sau abcese, infecții oportuniste. Insuficiență cardiacă congestivă severă (NYHA clasa III-IV).
A!: Hipersensibilitate (de tip IV) la repetarea trat. după 2-4 ani; infecțiile trebuie tratate înaintea adm. de infliximab; nu se recomandă trat la copiii, vârstnici, boli hepatice sau renale, sarcină și alăptare.
RA: Infecții virale, febră, abcese, celulită, sepsis, vindecare întârziată a plăgilor, infecții bacteriene, autoanticorpi, anomalii ale factorilor complementului, anemie, leucopenie, limfadenopatie, limfocitoză, limfopenie, neutropenie, depresie, stare de confuzie, agitație, amnezie, apatie, nervozitate, somnolență, cefalee, conjunctivită, endoftalmită, cheratoconjunctivită, HTA, echimoze/hematoame, hTA, sincopă, peteșii, tromboflebită, bradicardie, palpitații, vasospasm, infecții ale tractului respirator, dispnee, sinuzită, epistaxis, bronhospasm, pleurezie, reacții alergice, greață, diaree, dureri abdominale, dispepsie, constipație, colecistită, rash, prurit, urticarie, hipersudorație, dermatită fungică/onicomicoză, eczemă/seboree, hordeolum, erupție buloasă, furunculoză, hipercheratoză, reacție de fotosensibilitate, rozacee, veruci, infecții ale tractului urinar, pielonefrită, piurie, mialgii, artralgii, vaginite, durere toracică, edem, reacții la locul de injectare. Hipersensibilitate de tip IV. Tulburări limfoproliferative.

INOSINUM *COD ATC: J05AX05*

ISOPRINOSINE *EWOPHARMA;* Cpr. inozină 500 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

Ind: Herpes zoster, herpes simplex I și II, bronșite virale, panencefalita sclerozantă subacută, eucefalite virale, rujeolă, varicelă, oreion, gripă, hepatite infecțioase, pre-SIDA.
Dz: *Adulți:* 50 mg/kg/zi; *copii sub 5 ani:* 50-100 mg/kg/zi; *copii peste 5 ani:* 50 mg/kg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la produs.
A!: Prudență în gută; asocierea cu imunodepresive.
RA: Greață.

INSULINE *COD ATC: A10AB01*

ACTRAPID HM *NOVO NORDISK A/S;* Sol. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(S/P-6L)***

ACTRAPID INNOLET *NOVO NORDISK A/S;* Sol. inj. insulină 100 UI/ml; dispozitiv a 3 ml; ct. × 5 dispozitive tip InnoLet ***(S/P-6L)***

ACTRAPID® HM *NOVO NORDISK A/S;* Sol. inj. insulină 40 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(S/P-6L)***

ACTRAPID® HM PENFILL *NOVO NORDISK A/S;* Sol. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml + dop piston + disc cauciuc ***(S/P-6L)***

ACTRAPID® NOVOLET *NOVO NORDISK A/S;* Sol. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 5 dispozitive × 3 ml ***(S/P-6L)***

HUMULIN L *ELI LILLY;* Sol. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(S/P-6L)***

HUMULIN–M1 *ELI LILLY;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(S/P-6L)***

HUMULIN–M2 *ELI LILLY;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(S/P-6L)***

HUMULIN–M3 *ELI LILLY;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml; ct. × 5 cartușe × 1,5 ml ***(S/P-6L)***

HUMULIN–M3 *ELI LILLY;* Susp. inj. insulină 40 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(S/P-6L)***

HUMULIN–M4 *ELI LILLY;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml; ct. × 5 cartușe × 1,5 ml ***(S/P-6L)***

HUMULIN–M5 *ELI LILLY;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(S/P-6L)***

HUMULIN N.P.H *ELI LILLY;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml; ct. × 5 cartușe × 1,5 ml ***(S/P-6L)***

HUMULIN REGULAR *ELI LILLY;* Sol. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(S/P-6L)***

HUMULIN® L *LILLY FRANCE;* Susp. inj. insulină 40 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(S/P-6L)***

HUMULIN® M3 (30/70) *LILLY FRANCE;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml ***(S/P-6L)***

HUMULIN® N *LILLY FRANCE;* Susp. inj. insulină 40 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(S/P-6L)***

HUMULIN® N *LILLY FRANCE;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml ***(S/P-6L)***

HUMULIN® R *LILLY FRANCE;* Susp. inj. insulină 40 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(S/P-6L)***

HUMULIN® R *LILLY FRANCE;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml ***(S/P-6L)***

ILETIN II LENTE *HUMAN SERUM;* Sol. inj. insulină 40 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(S/P-6L)***

ILETIN II NPH *HUMAN SERUM;* Sol. inj. insulină 40 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(S/P-6L)***

ILETIN II REGULAR *HUMAN SERUM;* Sol. inj. insulină 40 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(S/P-6L)***

INSULATARD HM *NOVO NORDISK A/S;* Sol. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(S/P-6L)***

INSULATARD HM *NOVO NORDISK A/S;* Sol. inj. insulină 40 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(S/P-6L)***

INSULATARD HM INNOLET *NOVO NORDISK A/S;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; dispozitiv a 3 ml; ct. × 5 dispozitive tip InnoLet ***(S/P-6L)***

INSULATARD HM NOVOLET *NOVO NORDISK A/S;* Sol. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml ***(S/P-6L)***

INSULATARD HM PENFILL *NOVO NORDISK A/S;* Sol. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 10 cartușe × 3 ml ***(S/P-6L)***

INSULATARD® HM PENFILL *NOVO NORDISK A/S;* Sol. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml ***(S/P-6L)***

INSULIN MIXTARD 30 HM *NOVO NORDISK A/S;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(S/P-6L)***

INSULIN MIXTARD 50 HM *NOVO NORDISK A/S;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(S/P-6L)***

INSULIN MONOTARD HM *NOVO NORDISK A/S;* Sol. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(S/P-6L)***

INSUMAN BASAL *LAB. AVENTIS PHARMA;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 1 fl. × 5 ml; ct. × 5 fl. × 5 ml; ct. × 4 cartușe × 3 ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml; ct. × 10 cartușe × 3 ml ***(S/P-6L)***

INSUMAN BASAL OptiSet *LAB. AVENTIS PHARMA;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 3 penuri × 1 cartuș × 3 ml; ct. × 4 penuri × 1 cartuș × 3 ml; ct. × 5 penuri × 1 cartuș × 3 ml; ct. × 10 penuri × 1 cartuș × 3 ml ***(S/P-6L)***

INSUMAN COMB 25 *LAB. AVENTIS PHARMA;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 1 fl. × 5 ml; ct. × 5 fl. × 5 ml; ct. × 4 cartușe × 3 ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml; ct. × 10 cartușe × 3 ml ***(S/P-6L)***

INSUMAN COMB 25 OptiSet *LAB. AVENTIS PHARMA;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 3 penuri × 1 cartuș × 3 ml; ct. × 4 penuri × 1 cartuș × 3 ml; ct. × 5 penuri × 1 cartuș × 3 ml; ct. × 10 penuri × 1 cartuș × 3 ml ***(S/P-6L)***

INSUMAN COMB 50 *LAB. AVENTIS PHARMA;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 1 fl. × 5 ml; ct. × 5 fl. × 5 ml; ct. × 4 cartușe × 3 ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml; ct. × 10 cartușe × 3 ml ***(S/P-6L)***

INSUMAN COMB 50 OptiSet *LAB. AVENTIS PHARMA;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 3 penuri × 1 cartuș × 3 ml; ct. × 4 penuri × 1 cartuș × 3 ml; ct. × 5 penuri × 1 cartuș × 3 ml; ct. × 10 penuri × 1 cartuș × 3 ml ***(S/P-6L)***

INSUMAN RAPID *LAB. AVENTIS PHARMA;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 1 fl. × 5 ml; ct. × 5 fl. × 5 ml; ct. × 4 cartușe × 3 ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml; ct. × 10 cartușe × 3 ml ***(S/P-6L)***

INSUMAN RAPID OptiSet *LAB. AVENTIS PHARMA;* Susp. inj. insulină 100 UI/ ml; ct. × 3 penuri × 1 cartuș × 3 ml; ct. × 4 penuri × 1 cartuș × 3 ml; ct. × 5 penuri × 1 cartuș × 3 ml; ct. × 10 penuri × 1 cartuș × 3 ml ***(S/P-6L)***

MIXTARD® 20 HM NOVOLET *NOVO NORDISK A/S;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml ***(S/P-6L)***

MIXTARD® 20 HM PENFILL *NOVO NORDISK A/S;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml ***(S/P-6L)***

MIXTARD® 30 HM *NOVO NORDISK A/S;* Susp. inj. insulină 40 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(S/P-6L)***

MIXTARD® 30 HM PENFILL *NOVO NORDISK A/S;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml ***(S/P-6L)***

MIXTARD® 30 INNOLET *NOVO NORDISK A/S;* Susp. inj. insulină 100 UI/ ml; dispozitiv a 3 ml; ct. × 5 dispozitive tip InnoLet × 1 cartuș × 3 ml ***(S/P-6L)***

MIXTARD® 30 NOVOLET *NOVO NORDISK A/S;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml ***(S/P-6L)***

MIXTARD® 40 HM NOVOLET *NOVO NORDISK A/S;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml ***(S/P-6L)***

MIXTARD® 40 HM PENFILL *NOVO NORDISK A/S;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml ***(S/P-6L)***

MONOTARD HM *NOVO NORDISK A/S;* Sol. inj. insulină 40 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(S/P-6L)***

ULTRATARD HM *NOVO NORDISK A/S;* Sol. inj. insulină 40 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(S/P-6L)***

ULTRATARD HM *NOVO NORDISK A/S;* Sol. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(S/P-6L)***

Ind: Diabet insulinodependent și complicațiile acestuia; insulinoterapie temporară cu ocazia sarcinii sau a intervențiilor chirurgicale.
Dz: Dozajul este dependent de necesitățile pacientului. Doza medie zilnică pentru trat. de întreținere la cei cu *diabet zaharat de tip 1:* 0,5-1 UI/kg. La *copii < 12 ani:* 0,7-1 UI/kg/zi. Se adm. s.c., în peretele abdominal. Se pot adm. în coapsă, regiunea fesieră sau deltoidiană.
Cind: Hipersensibilitate la insulină; hipoglicemie.
A!: Control metabolic complet, cu monitorizarea glicemiei; prudență la vârstnici, infecții, stări febrile, afecțiuni renale sau hepatice, asocieri cu antidiabetice orale, octreotid, IMAO, α-blocante, IEC, salicilați, alcool, steroizi anabolizanți, contraceptive orale, tiazide, glucocorticoizi, hormoni tiroidieni, simpatomimetice, danazol, fenitoină, litiu, fenotiazine, heparină, acid nicotinic; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Hipoglicemie (transpirații reci, piele rece, paloare, nervozitate, tremor, anxietate, astenie marcată, confuzie, dificultate în concentrare, somnolență, foame excesivă, tulburări de vedere temporare, cefalee, greață și palpitații),

edeme și anomalii de refracție, hipersensibilitate locală (eritem, inflamație, prurit și lipodistrofie la locul injecției), reacții de hipersensibilitate grave.

INSULINE ASPART *COD ATC: A10AD05*

NOVOMIX 30 PENFILL *NOVO NORDISK A/S;* Susp. inj. insulină aspart 100 UI/ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml ***(S/P-6L)***

NOVOMIX® 30 FLEXPEN® *NOVO NORDISK A/S;* Susp. inj. insulină aspart 100 UI/ml; ct. × 5 pen-uri × 3 ml; ct. × 10 pen-uri × 3 ml ***(S/P-6L)***

NOVORAPID PENFILL® *NOVO NORDISK A/S;* Sol. inj. insulină aspart 100 UI/ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml ***(S/P-6L)***

NOVORAPID® FLEXPEN® *NOVO NORDISK A/S;* Sol. inj. insulină aspart 100 UI/ml; ct. × 5 pen-uri × 1 cartuș × 3 ml; ct. × 10 pen-uri × 1 cartuș × 3 ml ***(S/P-6L)***

Ind: Diabet zaharat.
Dz: Doza este individuală și determinată de către medic în concordanță cu nevoile pacientului. În mod normal se asociază cu o insulină cu acțiune intermediară sau prelungită, adm. cel puțin o dată pe zi. Cerința individuală de insulină este cuprinsă între 0,5-1,0 UI/kg/zi
Cind: Hipoglicemie; Hipersensibilitate la insulina aspart sau la oricare din excipienți.
A!: Control metabolic complet, cu monitorizarea glicemiei; prudență la vârstnici, infecții, stări febrile, afecțiuni renale sau hepatice, asocieri cu antidiabetice orale, octreotid, IMAO, α-blocante, IEC, salicilați, alcool, steroizi anabolizanți, contraceptive orale, tiazide, glucocorticoizi, hormoni tiroidieni, simpatomimetice, danazol, fenitoină, litiu, fenotiazine, heparină, acid nicotinic; șoferi și activități de precizie. Este recomandată monitorizarea gravidelor cu diabet zaharat de-a lungul sarcinii sau în perioada de concepție.
RA: Hipoglicemie (transpirații reci, piele rece, paloare, nervozitate, tremor, anxietate, astenie marcată, confuzie, dificultate în concentrare, somnolență, foame excesivă, tulburări de vedere temporare, cefalee, greață și palpitații), edeme și anomalii de refracție, hipersensibilitate locală (eritem, inflamație, prurit și lipodistrofie la locul injecției), reacții de hipersensibilitate.

INSULINE GLARGINE *COD ATC: A10AE04*

LANTUS® OptiSet® *LAB. AVENTIS PHARMA;* Sol. inj. insulină glargin 3,64 mg (corespunzătoare la 100 UI insulină/ml); ct. × 3 pen-uri + 1 cartuș × 3 ml; ct. × 4 pen-uri + 1 cartuș × 3 ml; ct. × 5 pen-uri + 1 cartuș × 3 ml; ct. × 10 pen-uri + 1 cartuș × 3 ml; ***(S/P-6L)***

LANTUS® 100 UI/ml *LAB. AVENTIS PHARMA;* Sol. inj. insulină glargin 3,64 mg (corespunzătoare la 100 UI insulină/ml); ct. × 4 cartușe × 3 ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml; ct. × 10 cartușe × 3 ml ***(S/P-6L)***

LANTUS® 100 UI/ml *LAB. AVENTIS PHARMA;* Sol. inj. insulină glargin 3,64 mg (corespunzătoare la 100 UI insulină/ml); ct. × 1 fl. × 5 ml; ct. × 2 fl. × 5 ml; ct. × 5 fl. × 5 ml; ct. × 10 fl. × 5 ml; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(S/P-6L)***

Ind: Diabet zaharat.
Dz: Se adm. zilnic, într-o singură injecție s.c., seara. Doza de insulină se individualizează pe baza monitorizării metabolice stricte.
Cind: Hipersensibilitate la insulină. Hipoglicemie.
A!: Nu este insulina de ales pentru trat. cetoacidozei diabetice; prudență la copii, IH sau IR, vârstnici, stenoză a arterelor coronare sau a vaselor cerebrale, retinopatie proliferativă, afecțiuni intercurente; simptomele de alarmă ale hipoglicemiei pot fi modificate la anumite grupe de risc (pacienții la care controlul glicemiei este ameliorat marcat; la care hipoglicemia se dezvoltă treptat; vârstnici; cu neuropatie vegetativă; cu antecedente de diabet zaharat; cu afecțiuni psihiatrice; sub trat. concomitent cu alte medicamente); interacțiuni medicamentoase cu antidiabetice orale, IEC, disopiramidă, fibrați, fluoxetină, IMAO, pentoxifilină, propoxifen, salicilați, sulfonamide, glucocorticoizi, danazol, diazoxid, diuretice, glucagon, HIN, estrogeni, fenotiazine, somatotropină, hormoni tiroidieni, beta-blocante, clonidină, săruri de litiu, alcool; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Hipoglicemie, amauroză tranzitorie, lipodistrofie, eritem, durere, prurit, papule, inflamație și edem la locul injectării, reacții alergice, anticorpi la insulină.

INSULINE LISPRO *COD ATC: A10AB04*

HUMALOG *ELI LILLY;* Sol. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml ***(S/P-6L)***

HUMALOG MIX 25 *ELI LILLY;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml ***(S/P-6L)***

HUMALOG MIX 25 PEN *ELI LILLY;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 5 disp. tip PEN × 1 cartuș × 3 ml ***(S/P-6L)***

HUMALOG MIX 50 *ELI LILLY;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml ***(S/P-6L)***

HUMALOG MIX 50 PEN *ELI LILLY;* Susp. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 5 disp. tip PEN × 1 cartuș × 3 ml ***(S/P-6L)***

HUMALOG PEN *ELI LILLY;* Sol. inj. insulină 100 UI/ml; ct. × 5 disp. tip PEN × 1 cartuș × 3 ml ***(S/P-6L)***

Ind: Trat. pacienților cu diabet zaharat, care necesită insulină pentru controlul hiperglicemiei.
Dz: Este determinată de medic în funcție de necesități. Acțiunea rapidă a insulinei lispro impune adm. s.c. cât mai aproape de masă (15 minute înainte) comparativ cu mixturile de insulină obișnuită (30 minute înaintea mesei). Nu se adm. i.v.
Cind: Hipersensibilitate la insulina lispro sau la unul din excipienți; hipoglicemie.

A!: Control metabolic complet, cu monitorizarea glucozei; prudență la vârstnici, infecții, stări febrile, IH, IR, asocieri cu antidiabetice orale, octreotid, IMAO, α-blocante, IEC, salicilați, alcool, steroizi anabolizanți, contraceptive orale, tiazide, glucocorticoizi, hormoni tiroidieni, simpatomimetice, danazol, fenitoină, litiu, neuroleptice fenotiazinice, heparină, acid nicotinic; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Hipoglicemie (transpirații reci, piele rece, paloare, nervozitate, tremor, anxietate, astenie marcată, confuzie, dificultate în concentrare, somnolență, foame excesivă, tulburări de vedere temporare, cefalee, greață și palpitații), edeme și anomalii de refracție, eritem, inflamație, prurit și lipodistrofie la locul injectării.

INTERFERONUM ALFACON-1 *COD ATC: L03AB09*

INFERGEN *YAMANOUCHI;* Sol. inj. interferon alfacon 9 µg/0,3 ml; ct. × 1 fl.; ct. × 6 fl. ***(S/P-RF)***

Ind: Hepatită cronică cu virusul hepatitei C (HCV).
Dz: *Adulți:* 9 µg de 3 ori/săpt., inj. s.c.
Cind: Hipersensibilitate la substanța activă; epilepsie sau tulburări psihice severe; afecțiuni cardiace severe preexistente; disfuncție renală sau hepatică severă; boală hepatică decompensată; hepatite cronice la pacienți care sunt sau au fost tratați recent cu agenți imunosupresivi, cu excepția celor care au întrerupt trat. de scurtă durată cu corticosteroizi; hepatite și boli autoimune; primitori de transplant sub trat. imunosupresiv; afecțiuni tiroidiene preexistente, care nu sunt controlate adecvat.
A!: Prudență la copii, leucopenie, stări depresive, IC congestivă, IMA și/sau aritmii, psoriazis, tulburări de coagulare, afecțiuni debilitante, disfuncții tiroidiene; examen oftalmologic; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Febră, oboseală, cefalee și mialgii, rigiditate, anorexie, artralgii, greață, vomă, diaree, alopecie, lombalgii, dureri abdominale, depresie, hipersudorație, alterări ale gustului, instabilitate emoțională, insomnie, reacții la locul injectării, somnolență, confuzie, rash, reacții alergice, herpes simplex, prurit, dureri oculare, epistaxis, tuse, infecții/inflamații ale tractului respirator superior, pneumonie, variații ale greutății corporale, edeme, dispnee, tahicardie, HTA și hTA, libidou scăzut, hipoestezii, constipație, hemoragii gingivale, leucocitopenie, trombocitopenie și neuropatie.

INTERFERONUM ALFA-2a *COD ATC: L03AB04*

ROFERON® A *HOFFMANN LA ROCHE;* Sol. inj. interferon alfa-2a 18 milioane U.I./ml; ct. × 1 fl. × 1 ml ***(S/P-RF)***

ROFERON® A *HOFFMANN LA ROCHE;* Sol. inj. interferon alfa-2a 3 milioane U.I./ml; ct. 1 seringă × 0,5 ml + ac 16-5/10 ***(S/P-RF)***

ROFERON® A *HOFFMANN LA ROCHE;* Sol. inj. interferon alfa-2a 4,5 milioane U.I./ml; ct. 1 seringă × 0,5 ml + ac 16-5/10 ***(S/P-RF)***

ROFERON® A *HOFFMANN LA ROCHE;* Sol. inj. interferon alfa-2a 6 milioane U.I./ml; ct. 1 seringă × 0,5 ml + ac 16-5/10 ***(S/P-RF)***

ROFERON® A *HOFFMANN LA ROCHE;* Sol. inj. interferon alfa-2a 18 milioane U.I./ml; ct. 1 seringă × 0,5 ml + ac 16-5/10 ***(S/P-RF)***

ROFERON® A *HOFFMANN LA ROCHE;* Sol. inj. interferon alfa-2a 18 milioane U.I./ml; o doză 0,6 ml; ct. × 1 cartuș multidoză; ct. × 3 cartușe multidoză ***(S/P-RF)***

ROFERON® A *SINDAN SRL;* Sol. inj. interferon alfa-2a 6 milioane U.I./ml; ct. 1 seringă × 0,5 ml + ac ***(S/P-RF)***

ROFERON® A *SINDAN SRL;* Sol. inj. interferon alfa-2a 18 milioane U.I./ml; ct. 1 seringă × 0,5 ml + ac ***(S/P-RF)***

ROFERON A-PEN *HOFFMANN LA ROCHE* ***(P-RF)***

Ind: Trat. neoplasmelor limfatice și hematopoietice, neoplasme solide, maladii virale.
Dz: Doza variază între 3-36 milioane U.I./zi, în funcție de indicație.
Cind: Hipersensibilitate la produs; afectare cardiacă severă; disfuncție severă renală, hepatică sau a măduvei hematopoietice; epilepsie și/sau alte disfuncții ale SNC; hepatită cronică decompensată sau ciroză hepatică severă; hepatită cronică care este sau a fost tratată recent cu agenți imunosupresori, cu excepția trat. de scurtă durată cu glucocorticoizi; leucemie mieloidă cronică la bolnavi la care este posibil un transplant alogen de măduvă osoasă.
A!: Monitorizare renală, hepatică sau medulară; supraveghere neuropsihiatrică; prudență în depresie medulară severă, transplant, psoriazis, diabet zaharat, copii; asocieri cu medicamente biotransformate prin oxidare; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Simptome pseudo-gripale, anorexie, greață, vărsături, tulburări de gust, senzație de uscăciune a gurii, scădere în greutate, diaree, dureri abdominale, creșterea ALAT, fosfatazei alcaline, LDH și bilirubinei, amețeală, vertij, tulburări de vedere, scăderi ale funcției cerebrale, tulburări de somn, tendință la suicid, parestezii, scăderea sensibilității, neuropatie, prurit și tremor, hTA tranzitorie, pusee hipertensive pasagere, edeme, cianoză, aritmii, palpitații și dureri toracice, reexacerbări ale herpesului labial, rash, prurit, uscăciunea mucoaselor, rinoree și epistaxis, scădere a funcției renale, leucopenie tranzitorie, hipocalcemie inconstantă, hiperglicemie, reacții la locul injectării. Anticorpi antiinterferon.

INTERFERONUM ALFA-2b *COD ATC: L03AB05*

INTRON A 18 milioane U.I. *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Sol. inj. interferon alfa-2b recombinant 15 milioane U.I./ml; ct. × 1 cartuș × 18 milioane UI/1,2 ml + 6 ace + 6 tampoane cu alcool ***(S/P-RF)***

INTRON A 30 milioane U.I. *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Sol. inj. interferon alfa-2b recombinant 25 milioane U.I./ml; ct. × 1 cartuș × 30 milioane UI/1,2 ml + 6 ace + 6 tampoane cu alcool ***(S/P-RF)***

INTRON A *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Pulb. pt. sol. inj. interferon alfa-2b recombinant 3 milioane U.I; ct. × 1 fl. pulb. ***(S/P-RF)***

INTRON A *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Sol. inj. interferon alfa-2b recombinant 6 milioane U.I./ ml; ct. × 1 fl. × 0,5 ml; ct. × 1 fl. × 3 ml ***(S/P-RF)***

INTRON A *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Sol. inj. interferon alfa-2b recombinant 10 milioane U.I./ ml; ct. × 1 fl. × 0,5 ml; ct. × 1 fl. × 1 ml; ct. × 1 fl. × 2,5 ml ***(S/P-RF)***

INTRON A *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Sol. inj. interferon alfa-2b recombinant 15 milioane U.I./ ml; ct.-trusă × 1 PEN cu un cartuș × 1,2 ml + 6 ace + 6 tampoane cu alcool ***(S/P-RF)***

INTRON A *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Sol. inj. interferon alfa-2b recombinant 25 milioane U.I./ ml; ct.-trusă × 1 PEN cu un cartuș × 1,2 ml + 6 ace + 6 tampoane cu alcool ***(S/P-RF)***

INTRON A *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Sol. inj. interferon alfa-2b recombinant 50 milioane U.I./ml; ct.-trusă × 1 PEN cu un cartuș × 1,2 ml + 6 ace + 6 tampoane cu alcool ***(S/P-RF)***

INTRON A PEN *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Sol. inj. 15 M ui/ml (18 M ui/1,2 ml), 25 M ui/ml (30 M ui/1,2 ml); 15 M ui/ml (18 M ui/1,2 ml)/cooperare R & D România; 25 M ui/ml (30 M ui/1,2 ml)/ cooperare R & D România ***(S/P-RF)***

Ind: Hepatita cronică B. Hepatita cronică C. Leucemie cu celule "păroase". Leucemie mieloidă cronică. Mielom multiplu. Limfom folicular. Tumoră carcinoidă. Sarcomul Kaposi asociat cu SIDA. Melanom malign.
Dz: Variază între 5-20 milioane U.I./zi, de 3-5 ori/săpt., în funcție de indicație.
Cind: Hipersensibilitate la produs. Afecțiuni cardiace grave. Disfuncție renală sau hepatică gravă. Epilepsie și/sau afecțiuni ale SNC. Afecțiune psihică severă preexistentă sau istoric de tulburare psihică severă. Hepatită cronică cu ciroză hepatică decompensată. Hepatită cronică la pacienții care sunt sau au fost tratați recent cu agenți imunosupresivi, excluzând sevrajul pe termen scurt la corticosteroizi. Hepatită autoimună, o boală autoimună în antecedente; sau pacienți cu transplant, cu trat. imunosupresiv. Afecțiune tiroidiană preexistentă, dacă aceasta nu poate fi controlată prin trat. convențional. Terapia combinată cu ribavirină: a se vedea informațiile privind ribavirina, adm. combinată cu ribavirina la pacienți cu hepatită cronică C.
A!: În caz de reacții de hipersensibilitate acută, adm. se întrerupe; monitorizare hepatică, examen oftalmologic; hidratare adecvată; prudență în diabet zaharat, tulburări de coagulare, afecțiuni pulmonare, afecțiuni psihice, antecedente de crize cardiace congestive, IMA și/sau aritmii, psoriazis; copii; asocieri cu narcotice, hipnotice, teofilina sau aminofilina; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Febră, oboseală, contracturi musculare/frisoane, anorexie și grețuri, vărsături, diaree, artralgie, astenie, somnolență, amețeli, senzație de uscăciunea gurii, simptome asemănătoare gripei, depresie, tentative de suicid, indispoziție, transpirație abundentă, alterarea gustului, iritabilitate, insomnie, stare de confuzie, tulburări de concentrare și hTA, dureri abdominale, rash, nervozitate, afecțiune la locul de injectare, parestezie, herpes simplex, prurit, dureri oculare, anxietate, epistaxis, tuse, faringită, infiltrate pulmonare, pneumonită și pneumonie, pierderi de cunoștință, scădere în greutate, edeme faciale, dispnee, dispepsie, tahicardie, HTA, creșterea apetitului, scăderea libidoului, hipo-

estezie, scaune moi, sângerări gingivale, neuropatie, polineuropatie, rabdomioliză, IR, sindrom nefrotic, disfuncții renale, diabet agravat, autoanticorpi.

INTERFERONUM ALFA-2b + RIBAVIRINUM

COD ATC: J05AB541

REBETRON® *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Trusă: 1) 2 ct. × 7 blist. × 10 cps. sau 12 cps. × 200 mg ribavirină; 2) 2 pen-uri multidoză × 18 M ui interferon alfa-2b recombinat × 1,2 ml (6 doze × 3 M ui/0,2 ml) ***(P-RF)***

Ind: Asociere eficace împotriva virusului hepatitei C cronică la adulți, care au răspuns la interferon alfa, dar prezintă recădere și la bolnavi netratați anterior (cu ALT crescută, ARN-VHC pozitiv și activitatea inflamatorie crescută).
Dz: Tratament sub supraveghere medicală. Oral 1-1,2 g/zi ribavirină, în două prize, la mese, dimineața și seara + interferon alfa-2b injectabil.
RA: Astenie, febră, cefalee, scădere ponderală, amețeli, parestezii, anorexie, dureri abdominale, diaree, vome, artralgii, mialgii, agitatie, anxietate, depresie, insomnie.

INTERFERONUM BETA-1a

COD ATC: L03AB07

AVONEX *GENESIS PHARMA;* Pulb. liof. pt. sol. inj. interferon beta-1a 30 µg; ct. × 4 doze (fl. pulb. + seringă preumplută) ***(P-RF)***

REBIF 22 micrograme *ARES-SERONO;* Sol. inj. 22 µg/0,5 ml; ct. × 1 seringă preumplută × 0,5 ml; ct. × 3 seringi preumplute × 0,5 ml; ct. × 12 seringi preumplute × 0,5 ml ***(P-RF)***

REBIF 3 micrograme *SERONO;* Pulb. pt. sol. inj. 3 milioane U.I.; ct. × 10 fl. pulb. ***(S/P-RF)***

REBIF 3 000 000 *SERONO;* Pulb. pt. sol. inj. 3 milioane U.I.; ct. × 3 fl. pulb. + 3 f. solv. × 2 ml ***(S/P-RF)***

REBIF 44 micrograme *ARES-SERONO;* Sol. inj. 22 µg/0,5 ml; ct. × 1 seringă preumplută × 0,5 ml; ct. × 3 seringi preumplute × 0,5 ml; ct. × 12 seringi preumplute × 0,5 ml ***(P-RF)***

Ind: Trat. ambulatoriu al pacienților cu scleroză multiplă cu recăderi, caracterizată prin cel puțin două atacuri recurente de disfuncție neurologică, timp de trei ani consecutivi, fără dovezi de progresie continuă a bolii.
Dz: 30 µg i.m. o dată pe săpt.
Cind: Hipersensibilitate la interferonul natural sau recombinant, la albumina serică umană. Sarcină. Depresii severe sau tendință la suicid. Epilepsie.
A!: Prudență în depresie, convulsii în antecedente, boli cardiace, monitorizare psihiatrică, hematologică și hepatică; interacțiuni cu medicamente biotransformate de cit. P450; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Sindrom de tip gripal: dureri musculare, febră, frisoane, astenie, cefalee și greață; diaree, anorexie, vărsături, artralgii, insomnie, anxietate, rash, reacții la locul injectării, vasodilatație, palpitații, alopecie, sincopă trecătoare, depresii și tendință la suicid, reacții de hipersensibilizare.

INTERFERONUM BETA-1b *COD ATC: L03AB08*

BETAFERON® *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Pulb. liof. pt. sol. inj. interferon beta-1b 250 µg (8 milioane UI)/ml; ct. × 5 fl. + 1 fl. solv.; ct. × 5 fl. + 5 seringi preumplute; ct. × 15 fl. + 15 fl. solv.; ct. × 15 fl. + 15 seringi preumplute. ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. ambulator al pacienților cu scleroză multiplă recurent recidivantă, cu cel puțin două atacuri cu disfuncții neurologice în ultimii doi ani, urmate de o recuperare parțială/totală.
Dz: 8 milioane UI inj. sc. la 2 zile.
Cind: Hipersensibilitate la produs sau albumină umană; sarcină.
RA: Inflamație locală, durere, necroză; febră, frison, dureri musculare, depresie, instabilitate emoțională, convulsii, confuzii; leucopenie.

IODAMIDUM *COD ATC: V08AA03*

ISTEROPAC E.R. *BRACCO;* Sol. intrauterină iodamidă 4,1 g/10 ml; ct. × 5 f. × 10 ml ***(S)***

Ind: Histerosalpingografie.
Dz: Introducere intrauterină sub presiune moderată, 5-10 ml (3 ml în caz de uter infantil); adm. se face la cel puțin 10 zile de la terminarea menstruației.
Cind: Sarcină, inflamații pelviene acute sau acutizate, alergie sau intoleranță la iodamidă.
A!: Prudență extremă sau se evită în alergie sau intoleranță la iod sau la alte produse organoiodate de contrast; nu se adm. în timpul menstruației, premenstrual și cel puțin 30 de zile după chiuretajul uterin, modifică rezultatele testelor funcției tiroidiene.
RA: Reacții de intoleranță sau alergie – sudorație, urticarie, eritem, prurit, artralgii, dispnee, colaps cardio-vascular – mai frecvente la bolnavele alergice; foarte rar frisoane, febră, greață, vomă, dureri abdominale.

IODIDUM *COD ATC: H03CA*

LIPIODOL® 190 mg *LAB. GUERBET;* Cps. moi 190 mg iod; ct. × 1 blister × 3 cps.; ct. × 1 blister × 75 cps. ***(P-6L)***; ct. × 1500 cps. moi ***(S)***

Ind: Bronhografie, histerosalpingografie, uretrografie, colangiografie intraoperatorie, explorarea sinusurilor feței, mielografie.

Dz: Pentru bronhografie bolnavului i se adm. cu câteva zile înainte de examen calmante ale tusei; în ziua examenului nu va ingera nimic. Se va efectua anestezia locală a regiunii faringo-laringiene; la copii este obligatorie anestezia generală.
Cind: Alergie sau intoleranță la iod, tireotoxicoză, IC, IgM - gamopatii monoclonale, tbc, boli inflamatorii; nu se introduce în regiuni care sângerează.
RA: Anorexie, cefalee, febră, iodism; supurație pulmonară (după bronhografie), salpingită acută (după histero-salpingografie).

IODIXANOLUM

COD ATC: V08AB09

VISIPAQUE *NYCOMED IMAGING AS;* Sol. inj. iodixanol 150 mg/ml; ct. × 10 fl. × 50 ml; ct. × 6 fl. × 200 ml ***(S/P-RF)***

VISIPAQUE *NYCOMED IMAGING AS;* Sol. inj. iodixanol 270 mg/ml; ct. × 10 fl. × 50 ml; ct. × 10 fl. × 100 ml; ct. × 6 fl. × 200 ml ***(S/P-RF)***

VISIPAQUE *NYCOMED IMAGING AS;* Sol. inj. iodixanol 320 mg/ml; ct. × 10 fl. × 50 ml; ct. × 10 fl. × 100 ml; ct. × 6 fl. × 200 ml ***(S/P-RF)***

Ind: Examinări radiologice ale adultului: cardioangiografii, angiografie cerebrală, periferică, abdominală, urografie, flebografie, examinare CT cu contrast.
Dz: Doza variază între 150-320 mg I/ml în funcție de tipul de examinare, vârstă, greutate, debitul cardiac și starea generală a pacientului, cât și de tehnica utilizată.
Cind: Tireotoxicoză manifestă, IC decompensată.
A!: Înaintea adm. trebuie pregătite toate măsurile de trat. necesare posibilelor reacții severe. Substanțele de contrast non-ionice au o activitate anticoagulantă in vitro mai mică decât cele ionice. Prudență în afecțiuni renale, antecedente alergice, astm sau reacții la compuși iodați; interferă în testele funcționale tiroidiene; sarcină și alăptare.
RA: Senzație de căldură, de rece sau durere la locul injectării, tulburări de vedere, cefalee, greață, tulburări de gust; reacții cutanate, prurit, parosmie, angioedem și simptome respiratorii.

IOHEXOLUM

COD ATC: V08AB02

OMNIPAQUE® *NYCOMED;* Sol. inj. iohexol 140 mg I/ml; ct. × 10 fl. × 50 ml; ct. × 6 fl. × 200 ml ***(S)***

OMNIPAQUE® *NYCOMED;* Sol. inj. iohexol 180 mg I/ml; ct. × 10 fl. × 10 ml; ct. × 10 fl. × 15 ml; ct. × 10 fl. × 50 ml ***(S)***

OMNIPAQUE® *NYCOMED;* Sol. inj. iohexol 240 mg I/ml; ct. × 10 fl. × 10 ml; ct. × 10 fl. × 50 ml; ct. × 10 fl. × 100 ml; ct. × 10 fl. polipropilenă × 50 ml ***(S)***

OMNIPAQUE® *NYCOMED;* Sol. inj. iohexol 300 mg I/ml; ct. × 10 fl. × 10 ml; ct. × 6 fl. × 20 ml; ct. × 10 fl. × 50 ml; ct. × 10 fl. × 100 ml; ct. × 10 fl. polipropilenă × 50 ml ***(S)***

OMNIPAQUE® *NYCOMED;* Sol. inj. iohexol 350 mg I/ml; ct. × 6 fl. × 20 ml; ct. × 10 fl. × 50 ml; ct. × 10 fl. × 100 ml; ct. × 6 fl. × 200 ml; ct. × 10 fl. polipropilenă × 50 ml *(S)*

Ind: Mediu de contrast pentru: razele X, cardioangiografie, arteriografie, urografie, flebografie și CT; mielografie lombară, toracică, cervicală și CT cisternelor bazale, precedată de inj. subarahnoidiană; artrografie, pancreatografie endoscopică retrogradă, colangiopancreatografie endoscopică retrogradă, herniografie, histerosalpingografie, sialografie, examinări ale tractului gastrointestinal.
Dz: Doza este dependentă de: tipul examinării, vârstă, greutate, starea generală a pacientului și tehnica utilizată, fiind de 200-350 mg I/ml.
Cind: Hipersensibilitate la iohexol în antecedente. Tireotoxicoza manifestă.
A!: Prudență în astm sau reacții alergice la medii de contrast iodate, afecțiuni cardiace severe sau cu HTA pulmonară, patologie cerebrală acută, tumori sau epilepsie în antecedente, disfuncții renale, diabet zaharat, paraproteinemie, disfuncție renală și hepatică, feocromocitom, hipertiroidism; mediile de contrast non-ionice au mai puțin efect asupra coagulării in vitro, comparativ cu cele ionice; hidratare adecvată; asocieri cu biguanide, IL-2; interferă în testele funcției tiroidiene; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Senzație de căldură, gust metalic tranzitoriu, disconfort abdominal, durere, reacții de hipersensibilitate, hipersensibilitatea și inflamația glandelor salivare, spasm arterial, reacții neurologice, aritmii, IC, semne de ischemie, artralgii, cefalee, greață, vărsături sau vertij, fotofobie și meningism.

IOPAMIDOLUM *COD ATC: V08AB04*

GASTROMIRO *BRACCO;* Sol. orală iopamidol 30 g/100 ml; fl. × 100 ml *(S/P-RF)*

IOPAMIRO 200 *EWOPHARMA/BRACCO;* Sol. inj. iopamidol 20%; ct. × 1 f. × 10 ml; ct. × 5 f. × 10 ml *(S/P-RF)*

IOPAMIRO 300 *EWOPHARMA/BRACCO;* Sol. inj. iopamidol 30%; ct. × 1 f. × 10 ml; ct. × 5 f. × 10 ml; ct. × 1 f. × 30 ml; ct. × 1 fl. × 50 ml; ct. × 1 f. × 100 ml *(S/P-RF)*

IOPAMIRO 370 *EWOPHARMA/BRACCO;* Sol. inj. iopamidol 37%; ct. × 1 f. × 10 ml; ct. × 5 f. × 10 ml; ct. × 1 f. × 30 ml; ct. × 1 fl. × 50 ml; ct. × 1 f. × 100 ml ; ct. × 1 f. × 200 ml *(S/P-RF)*

Ind: *Int.:* Substanță de contrast pentru examinarea radiologică a tractului digestiv; *Inj.:* pentru mielografie, angiografie cerebrală, arteriografie și venografie periferică, angiocardiografie, ventriculografie stângă și arteriografie coronariană, aortografie, angiografie viscerală selectivă, urografie, artrografie.
Dz: *Int.:* Doza variază în funcție de tipul examinării, vârstă, greutate, starea generală a pacientului și tehnica utilizată, fiind de 10-750 ml sol. diluată. *Inj.:* Doza variază în funcție de tipul examinării, vârstă, greutate, starea generală a pacientului și tehnica utilizată.
Cind: Hipersensibilitate la derivații iodați.

A!: Prudență la alergici, astmatici, IH și IR gravă, IC, boli sistemice grave, diabet, mielom multiplu, epilepsie; sarcină și alăptare.
RA: *Int.:* diaree, reacții tip anafilactic, *Inj.:* cefalee, greață, vomă, senzație de cald, dispnee, hTA, aritmii ventriculare.

IOPROMIDUM

COD ATC: V08AB05

ULTRAVIST 240 *SHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Sol. inj. iopromid 499 mg/ml; ct. × 1 fl. × 50 ml; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(S/P-RF)***

ULTRAVIST 300 *SHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Sol. inj. iopromid 623 mg/ml; ct. × 1 fl. × 20 ml; ct. × 1 fl. × 50 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml; ct. × 1 fl. × 200 ml ***(S/P-RF)***

ULTRAVIST 370 *SHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Sol. inj. iopromid 769 mg/ml; ct. × 1 fl. × 50 ml; ct. × 10 fl. × 30 ml; ct. × 100 ml; ct. × 1 fl. × 200 ml ***(S/P-RF)***

Ind: Creșterea contrastului în CT, angiografie cu subtracție digitală, urografie, flebografie a extremităților, venografii, vizualizarea cavităților corpului, arteriografii.
Dz: Urografii: *Adulți* 0,8-1,3 ml/kg, *copii* 0,5-1,2 ml/kg. CT: 1-2,5 ml/kg. Angiografie cu subtracție digitală: 30-60 ml în bolus i.v.
Cind: Hipersensibilitate la iopromid, hipertiroidism.
A!: Nu se recomandă pentru mielografii, ventriculografii. Nu se va face histerosalpingografie în cursul sarcinii sau în caz de inflamații la nivelul pelvisului.
RA: Greață, vărsături, senzație generală de căldură, reacții alergice, crize epileptice, confuzie, somnolență, tulburări de vedere.

IPRATROPII BROMIDUM

COD ATC: R03BB01
R01AX03

ATROVENT® *BOEHRINGER INGELHEIM;* Sol. inhal. bromură de ipratropium 0,26 mg/ml; ct. × 1 fl. × 20 ml ***(P-6L)***

ATROVENT® METERED DOSE INHALER *BOEHRINGER INGELHEIM;* Susp. inhal. bromură de ipratropium 20 µg/doză; ct. × 1 fl. multidoză × 15 ml ***(P-6L)***

ATROVENT® NAZAL 0,03% *BOEHRINGER INGELHEIM;* Aerosol nazal bromură de ipratropium 0,03%; ct. × 1 fl. × 15 ml ***(P-RF)***

ATROVENT® NAZAL 0,06% *BOEHRINGER INGELHEIM;* Aerosol nazal bromură de ipratropium 0,06%; ct. × 1 fl. × 15 ml ***(P-RF)***

IPRAVENT 20-INHALER *CIPLA;* Aerosol, bromură de ipratropium 20 µg/doză; ct. × 1 fl. × 20 doze ***(P-6L)***

Ind: *Inhal.:* trat. de întreținere al bronhospasmului din BPCO, cu predominanța bronșitei sau a emfizemului și în trat. bronhospasmului acut asociat BPCO și astmului bronșic. *Nazal:* rinite alergice și non-alergice.

Dz: *Inhal întreținere: Adulți și adolescenți:* 500 µg de 3-4 ori/zi; *Copii 6-12 ani:* 250 µg de 3-4 ori/zi; *Copii < 6 ani:* 100-250 µg de 3-4 ori/zi. Trat. în criză: *Adulți și adolescenți:* 500 µg repetat, până la remiterea crizei; *Copii 6-12 ani:* 250 µg repetat, până la remiterea crizei; *Copii < 6 ani:* 100 µg repetat, până la remiterea crizei. *Nazal: Adulți și adolescenți:* 42-84 µg/nară de 2-4 ori/zi; *Copii 6-12 ani:* maxim 42 µg/nară de 2 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la atropină sau la substanțe înrudite.
A!: Se va evita contactul cu ochii; tehnică de adm. corectă; prudență în glaucom, adenom de prostată sau obstrucție vezicală; asocieri cu β-mimetice și xantine, steroizi și cromoglicat disodic, parasimpatolitice; sarcină și alăptare.
RA: Cefalee, greață, uscăciunea gurii și faringelui, tahicardie, palpitații, tulburări de acomodare vizuală, midriază, creșterea presiunii intraoculare, tulburări de motilitate gastrointestinală și retenție urinară, tuse, bronhoconstricție paradoxală, epistaxis.

IPRAZOCHROMUM *COD ATC: N02CX03*

DIVASCAN *BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP;* Cpr. iprazocrom 2,5 mg; ct. × 60 cpr. ***(P-6L)***

Ind: Profilaxia migrenelor și a formelor înrudite de cefalee. Retinopatie diabetică.
Dz: *Profilaxia migrenelor: adulți* 2,5-10 mg de 3 ori/zi. *Retinopatia diabetică: adulți* 5 mg de 3 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la iprazocrom sau la alți derivați de adrenocrom; sarcină.
RA: Hipersensibilitate cutanată, inapetență, colorația roșu-brună a urinei.

IRBESARTANUM *COD ATC: C09CA04*

APROVEL® *SANOFI PHARMA - BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Cpr. irbesartan 75 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr.; ct. × 4 blist. × 14 cpr.; ct. × 7 blist. × 14 cpr.; ct. × 14 blist. × 14 cpr. ***(P-6L)***

APROVEL® 150 mg *SANOFI PHARMA - BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Cpr. irbesartan 150 mg; ct. × 1 blist. × 14 cpr.; ct. × 2 blist. × 14 cpr.; ct. × 4 blist. × 14 cpr.; ct. × 7 blist. × 14 cpr. ***(P-6L)***; ct. × 4 blist. unidoză × 14 cpr. ***(S)***

APROVEL® 300 mg *SANOF PHARMA - BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Cpr. irbesartan 300 mg; ct. × 1 blist. × 14 cpr.; ct. × 2 blist. × 14 cpr.; ct. × 4 blist. × 14 cpr.; ct. × 7 blist. × 14 cpr. ***(P-6L)***; ct. × 4 blist. unidoză × 14 cpr. ***(S)***

Ind: Trat. HTA esențiale.
Dz: Doza inițială și de întreținere 150 (75-300) mg o dată/zi, adm. în timpul mesei sau între mese.

Cind: Hipersensibilitate la produs. Sarcină trim. II-III. Alăptare.
A!: Prudență în depleție de volum intravascular, stenoză aortică sau mitrală, cardiomiopatie hipertrofică obstructivă; risc crescut de hTA severă și IR; monitorizarea funcției renale și a potasemiei; hiperaldosteronismul primar nu răspunde la irbesartan; asocieri cu diuretice și alte antiHTA, săruri de potasiu, heparină, litiu; primul trimestru al sarcinii; șoferi și activități de precizie.
RA: Infecții respiratorii, cefalee, dureri musculoscheletice, toracice, abdominale, amețeli, oboseală, diaree, tuse, grețuri/vărsături, traumatisme musculoscheletice, dispepsie/pirozis, edeme, rash, tahicardie, anxietate, nervozitate.

IRINOTECANUM

COD ATC: L01XX19

CAMPTO *LAB. AVENTIS PHARMA;* Conc. pt. sol. perf.; 20 mg/ml ct. × 1 f. × 2 ml; ct. × 1 f. × 5 ml ***(S)***

Ind: Trat. cancerului colorectal avansat în combinație cu 5-fluorouracil (5-FU) și acid folinic, la pacienții care nu au mai fost tratați cu chimioterapie în cancer avansat; în monoterapie, la pacienții tratați anterior cu chimioterapie care au inclus 5-FU, irinotecan; în combinație cu cisplatin, este indicat în tratamentul carcinomului de col uterin cu celule scuamoase, avansat, la pacienți care nu au fost tratați cu chimioterapie.
Dz: Numai pacienților *adulți.* Doza recomandată depinde de vârstă, greutate, starea generală a pacientului, indicație.
Cind: Pacienți cu boli cronice intestinale inflamatorii sau ocluzie intestinală. Hipersensibilitate la produs. Sarcină și alăptare. La pacienții cu Bd > 3 ori mai mare decât limita maximă normală. Pacienți cu insuficiență medulară severă. Pacienți cu status de performanță OMS > 2.
A!: Va fi adm. numai sub supravegherea unui oncolog calificat. Datorită naturii și frecvenței efectelor secundare, în următoarele cazuri se va administra numai după o atentă evaluare a raportului beneficii/risc: la pacienții cu factori de risc, în special cu status de performanță OMS = 2; în cazurile rare în care se presupune că pacientul nu va urma recomandările pivind controlul efectelor secundare. Se recomandă ca aceste cazuri să fie strict supravegheate, în spital.
Diareea tardivă; monitorizarea formulei sanguine complete; prudență în afecțiuni hepatice, renale sau cardiace; pacienții cu astm; vârstnici. Hipersensibilitate la produs. Prudență în asocierea cu suxametoniu. Sarcină și alăptare. Șoferi.
RA: Diaree, greață și vărsături; rar obstrucție intestinală, ileus sau hemoragie intestinală; anorexia, dureri abdominale, mucozita; neutropenie, anemie, trombocitopenie; reacții la locul perfuzării. Alopecie; reacții cutanate, reacții alergice ușoare și reacții anafilactoide; crampe și parestezii, creșterea tranzitorie a nivelului seric al transaminazelor, fosfatazei alcaline sau bilirubinei.

ISEPAMICINUM

COD ATC: J01GB11

ISEPAMICIN® *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Sol. inj., 250 mg/ml; ct. × 1 f. × 1 ml ***(P-RF)***

Ind: Infecții cu bacili gramnegativi, în special urinare. În septicemii, infecții respiratorii, abdominale (în asociere cu alte antibiotice).

Dz: i.m sau perfuzie i.v 15 mg/kg/zi în 2 prize la 12 ore. IR: deducerea dozelor.
Cind: Alergie, miastenie, asocieri cu substanțe nefro- și ototoxice.
A!: IR, vârstnici, sarcină; asocierea cu furosemid, acid etacrinic.
RA: Nefrotoxicitate, ototoxicitate (tulburări de echilibru reversibile, hipoacuzie și surditate ireversibile). Reacții alergice, hipomagneziemie, colita pseudomembranoasă (rar).

ISOCONAZOLUM

COD ATC: G01AF07

GYNO-TRAVOGEN *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Ovule nitrat de izoconazol 600 mg; ct. × 1 blist. × 1 ovul + 2 degete mănușă ***(P-RF)***

IZOCON 1 *I&I EXIM VIVA FARM;* Cremă 1%; ct. × 1 tub × 25 g ***(P-RF)***

OVOCON *I&I EXIM VIVA FARM;* Ovule nitrat de izoconazol 600 mg; ct. × 1 folie × 3 ovule ***(P-RF)***

TRAVOGEN *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Cremă nitrat de izoconazol 1%; ct. × 1 tub × 10 g; ct. × 1 tub × 15 g; ct. × 1 tub × 20 g; ct. × 1 tub × 30 g; ct. × 1 tub × 35 g; ct. × 1 tub × 40 g; ct. × 1 tub × 50 g ***(P-RF)***

Ind: *Vaginal:* micoze vaginale și infecții mixte cu bacterii grampozitive. *Ext:* micozelor superficiale ale pielii acoperite sau neacoperite cu păr, produse de: dermatofite, levuri, ciuperci asemănătoare levurilor și ciuperci de mucegai, eritrasmă.
Dz: *Vaginal:* 600 mg/zi, seara, înainte de culcare. *Ext:* o aplicație pe zi, cel puțin 6 săpt.
Cind: Hipersensibilitate la isoconazol.
A!: Trat. profilactic simultan al partenerului; se evită dușurile vaginale, lenjeria trebuie schimbată zilnic și fiartă.
RA: Senzație de arsură locală, prurit.

ISOFLURANUM

COD ATC: N01AB06

FORANE *ABBOTT LABORATOIRES Ltd.;* Lichid pt. inhal. isofluran 100%; ct. × 1 fl. × 100 ml ***(S)***

ISOFLURANE *RHODIA Ltd.;* Lichid pt. inhal. isofluran 100%; ct. × 1 fl. × 100 ml; ct. × 1 fl. × 250 ml ***(S)***

Ind: Anestezie generală prin inhalare.
Dz: *Inducție:* concentrație de 0,5%. Conc. 1,5-3% produc anestezia chirurgicală în 7-10 minute. *Menținere:* 1-2,5% isofluran în amestecuri de oxigen/oxid de azot. Uneori adm. suplimentară de 0,5-1,0% isofluran atunci când este adm. numai cu oxigen.
Cind: Hipersensibilitate la isofluran sau antecedente de hipertermie malignă survenită după adm. isofluran.
A!: Utilizarea de vaporizoare care eliberează cu exactitate concentrațiile necesare; prudență în hipertensiune intracraniană; asocieri cu med. curarizante antidepolarizante; sarcină și alăptare.

RA: Aritmii, leucocitoză, creșteri mici ale concentrației plasmatice a fluorului, hTA și deprimare respiratorie.

ISONIAZIDUM

COD ATC: J04AC01

ISONIAZIDĂ 100 mg *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cpr. isoniazidă 100 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(S/P-RF)***; ct. × 150 blist. × 10 cpr. ***(S)***

IZONIAZIDĂ *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cpr. izoniazidă 300 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***; ct. × 150 blist. × 10 cpr. ***(S/P)***

IZONIAZIDĂ *TERAPIA SA;* Cpr. izoniazidă 100 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. ***(S/P-RF);*** ct. × 100 blist. × 10 cpr. ***(S)***

IZONIAZIDĂ *TERAPIA SA;* Sol. inj. izoniazidă 50 mg/ml; ct. × 5 f. × 10 ml; ct. × 50 f. × 10 ml; ct. × 100 f. × 10 ml ***(S)***

Ind: Tbc pulmonară, miliară, osoasă, genito-urinară și articulară, meningita tbc, pleurezia și peritonita tbc.
Dz: *Terapeutic*: la *adulți* 5 mg/kg/zi, în 1-2 prize, sau 15 mg/kg/zi, de 2 ori pe săpt. La *copii* 10 mg/kg/zi (maxim 300 mg/zi) sau 20 mg/kg/zi, de 2 ori/săpt.; în meningite pot fi necesare doze până la 30 mg/kg/zi. *Profilactic:* la *adulți* 300 mg/zi; la *copii* 10 mg/kg/zi (maxim 300 mg/zi).
Cind: Alergie la izoniazidă, IH gravă, afecțiuni hepatice iatrogene.
A!: Prudență în epilepsie, IR, afecțiuni hepatice, antecedente psihotice, alcoolici, alergici sau vârstnici; asocieri cu carmabazepină, fenitoină, primidonă, disulfiram, alcool, etionamidă, glucocorticoizi, ketoconazol, anestezice volatile halogenate; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Cefalee, amețeli, tulburări neurologice, polinevrită datorată antagonizării piridoxinei, encefalopatie toxică, tulburări psihotice, convulsii, constipație, hiperhidroză, xerostomie, hTA posturală, agitație, somnolență sau insomnie, spasme musculare, fenomene alergice, uscăciunea gurii, greață, epigastralgii, anorexie, creșterea transaminazelor serice, mai rar hepatită toxică, agranulocitoză, leucopenie, sindrom lupoid, fenomene artritice, vasculită, acnee, ginecomastie.

ISOSORBIDI DINITRAS

COD ATC: C01DA08

CORDIL *ARMEDICA SA DEXXON Ltd.;* Cpr. izosorbid dinitrat 10 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. ***(P-6L)***

CORDIL *ARMEDICA SA DEXXON Ltd.;* Cpr. izosorbid dinitrat 20 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. ***(P-6L)***

CORDIL 10 *DEXXON Ltd.;* Cpr. izosorbid dinitrat 10 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

CORDIL 20 *DEXXON Ltd.;* Cpr. izosorbid dinitrat 20 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

CORDIL 40 SR *DEXXON Ltd.;* Cpr. film. ret. izosorbid dinitrat 40 mg; ct. × 6 blist. × 10 cpr. film. ***(P-6L)***

CORDİL 40 mg SR *ARMEDICA SA DEXXON Ltd.;* Cpr. film. ret. izosorbid dinitrat 40 mg; ct. × 1 fl. × 25 cpr. film. ret. ***(P-6L)***

DINICORD RETARD® 20 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cps. cu elib. prelungită 20 mg ***(S/P-6L)***

DINITER SR 20 mg, 40 mg *TERAPIA SA;* Cps. cu elib. prel. ***(P-6L)***

ISO-MACK SPRAY *HEINRICH MACK NACHF;* Aerosol isosorbid dinitrat 125 mg/doza; ct. × 1 fl. × 20 ml ***(P-RF)***

ISO-MACK retard *HEINRICH MACK NACHF;* Cps. retard isosorbid dinitrat 20 mg; ct. × 5 blist. × 10 cps. ret. ***(P-6L)***

ISO-MACK retard *HEINRICH MACK NACHF;* Cps. retard isosorbid dinitrat 40 mg; ct. × 5 blist. × 10 cps. ret. ***(P-6L)***

ISO-MACK retard *HEINRICH MACK NACHF;* Cps. retard isosorbid dinitrat 60 mg; ct. × 5 blist. × 10 cps. ret. ***(P-6L)***

ISODINIT *BALKAN PHARMA DUPNITZA;* Cpr. isosorbid dinitrat 10 mg; ct. × 2 blist. × 30 cpr. ***(P-6L)***

ISODINIT RETARD *BALKAN PHARMA DUPNITZA;* cpr. retard isosorbid dinitrat 20 mg; ct. × 6 blist. × 10 cpr. ret. ***(P-6L)***

ISOSORBID *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cpr. isosorbid dinitrat 20 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

ISOSORBID DINITRAT *MICROSIN;* Cpr. isosorbid dinitrat 10 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. ***(P-6L)***

ISOSORBID DINITRAT 10 mg *ARENA GROUP SA;* Cpr. isosorbid dinitrat 10 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. ***(P-6L)***

ISOSORBID DINITRAT 10 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. isosorbid dinitrat 10 mg; ct. × 3 blist. × 20 cpr. ***(P-6L)***; ct. × 100 blist. × 20 cpr. ***(S)***

ISOSORBID DINITRAT 10 mg *REMEDIA;* Cpr. isosorbid dinitrat 10 mg; ct. × 1 fl. × 60 cpr. ***(P-6L)***

ISOSORBIDE DINITRATE *E.I.P.I.C.O.;* Cpr. isosorbid dinitrat 5 mg; ct. × 2 blist. × 15 cpr. ***(P-6L)***

ISOSORBIDE DINITRATE *E.I.P.I.C.O.;* Cpr. isosorbid dinitrat 10 mg; ct. × 3 blist. × 20 cpr. ***(P-6L)***

MAYCOR® Retard 20 *PFIZER H.C.P. CORPORATION;* Cps. retard isosorbid dinitrat 20 mg; ct. × 5 blist. × 10 cps. ret. ***(P-6L)***

MAYCOR® Retard 40 *PFIZER H.C.P. CORPORATION;* Cps. retard isosorbid dinitrat 40 mg; ct. × 5 blist. × 10 cps. ret. ***(P-6L)***

ROMISODIN *SICOMED SA;* Cpr. isosorbid dinitrat 10 mg; 20 mg; ct. × 1 fl. × 60 cpr. ***(P-6L)***

Ind: Profilaxia și trat. curativ al crizelor de angină pectorală, IC cronică, trat. cardiopatiei ischemice dureroase, sechele post-IMA, IMA recent cu insuficiență acută ventriculară stângă, IC dreaptă, rinite angiospastice, afecțiuni ale vaselor periferice însoțite de spasm.

Dz: Crize de angină pectorală: sublingual 5-10 mg, repetat la nevoie la 5-10 minute. EPA: 5-10 mg, repetat la nevoie. Profilaxia crizelor anginoase, IC moderată: 10-20 mg la 4-6 ore. Trat. IC refractare și a angorului instabil cu crize repetate: 40-80 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la derivații nitrați, hTA gravă.
A!: Prudență în șoc, colaps, hemoragii cerebrale, traumatisme cerebrale, glaucom, cardiomiopatie obstructivă; nu se va întrerupe brusc trat.; asocieri cu agenți methemoglobinizanți, vasodilatatoare, antiHTA și diuretice, alcool; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Cefalee, vertij, oboseală.

ISOSORBIDI MONONITRAS *COD ATC: C01DA14*

MONO MACK *HEINRICH MACK NACHF;* Cpr. isosorbid mononitrat 20 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

MONO MACK *HEINRICH MACK NACHF;* Cpr. isosorbid mononitrat 40 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

MONO MACK DEPOT *HEINRICH MACK NACHF;* Cpr. ret. isosorbid mononitrat 100 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ret.; ct. × 5 blist. × 10 cpr.; ct. × 10 cpr. ret. ***(P-6L)***

MONONITRON® 60 mg *SICOMED SA;* Cpr. film. 60 mg ***(P-6L)***

OLICARD 40 RETARD *SOLVAY PHARMA.;* Cps. retard isosorbid mononitrat 40 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. ret. ***(P-6L)***

OLICARD 60 RETARD *SOLVAY PHARMA.;* Cps. retard isosorbid mononitrat 60 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. ret.; ct. × 5 blist. × 10 cps. ret. ***(P-6L)***

PENTACARD 10 *BYK GULDEN;* Cpr. isosorbid mononitrat 10 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

PENTACARD 20 *BYK GULDEN;* Cpr. isosorbid mononitrat 20 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

PENTACARD 40 *BYK GULDEN;* Cpr. isosorbid mononitrat 40 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

Ind: Profilaxia și trat. de întreținere al anginei pectorale. IC cronice.
Dz: Inițial 20 mg de 2 ori/zi, crescut la nevoie la 40 mg de 2 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la nitrați, colaps circulator acut, șoc cardiogen, hTA severă.
A!: Prudență în cardiomiopatie hipertrofică obstructivă, pericardită constrictivă și tamponadă cardiacă, presiune scăzută de umplere, stenoza aortică și/sau mitrală, tendință la hTA ortostatică, boli asociate cu presiune intracraniană crescută, asocieri cu vasodilatatoare, antiHTA, β-blocante, antagoniști de calciu, neuroleptice, antidepresive triciclice, alcool, dihidroergotamină; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Cefalee, hTA ortostatică, tahicardie reflexă cu senzații de amețeală, somnolență, greață, înroșirea feței și eritem alergic, colaps, însoțit de sincope și bradiaritmii.

ISOTRETINOINUM *COD ATC: D10BA01*

ROACCUTANE® *HOFFMANN LA ROCHE;* Cps. moi izotretinoin 10 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. ***(P-RF)***

ROACCUTANE® *HOFFMANN LA ROCHE;* Cps. moi izotretinoin 20 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. ***(P-RF)***

SOTRET 10; 20 *RANBAXY LAB.;* Cps. gel moi 10 mg, 20 mg

Ind: Formele grave de acnee nodulochistică rezistente la trat., în special acneea chistică și acneea conglobată, atunci când apar și leziuni la nivelul trunchiului.
Dz: Inițial 0,5 mg/kg/zi. Doza de întreținere 0,1-1,0 mg/kg/zi timp de 16 săpt.
Cind: Hipersensibilitate la izotretinoin, IR, IH, hipervitaminoză A, hiperlipidemie forte, sarcină și alăptare.
A!: Adm. simultană a altor keratolitice sau exfoliative nu este indicată, nici trat. concomitent cu UV; expunerea la soare trebuie evitată; monitorizarea funcției hepatice; prudență în diabet; asocieri cu izotretinoin, vitamina A, tetracicline.
RA: Uscăciunea mucoaselor, epistaxis, răgușeală, conjunctivite și opacifiere reversibilă a corneei, fotosensibilitate, fotofobie, hemeralopie, cataractă lenticulară, granulomatoză Wegener, anemie, neutropie, creșterea/scăderea numărului de trombocite, creșterea VSH, tulburări de auz, infecții locale sau sistemice cu germeni grampozitiv, exanteme, prurit, transpirații, granuloame piogenice, paronichie, distrofia unghiilor, subțierea firelor de păr, alopecie reversibilă, acnee fulminans, hirsutism și hiperpigmentație (facială), dureri musculare și articulare, afecțiuni inflamatorii ale intestinului, hiperuricemie și tulburări psihice sau ale SNC, hipertensiune intracraniană benignă, creștere temporară și reversibilă a transaminazelor.

ITRACONAZOLUM *COD ATC: J02AC02*

ORUNGAL *JANSSEN PHARMACEUTICA;* Cps. itraconazol 100 mg; ct. × 1 blist. × 4 cps; ct. × 3 blist. × 5 cps.; ct. × 7 blist. × 4 cps. ***(P-RF)***

SPORANOX *JANSSEN PHARMACEUTICA;* Sol. orală itraconazol 10 mg/ml; ct. × 1 fl. × 150 ml + lg. dozatoare × 5 ml sau 10 ml ***(P-RF)***

Ind: Candidoza orală și vulvovaginală. Pityriasis versicolor, dermatomicoze, keratite fungice. Onicomicoze determinate de dermatofiți și/sau levuri. Micoze sistemice: aspergiloze, candidoze, criptococoze, histoplasmoze, sporotrichoze, paracoccidioidomicoze, blastomicoze și alte tipuri rare de micoze sistemice sau tropicale. Candidoze bucale și/sau esofagiene la pacienții HIV pozitivi și alți pacienți imunocompromiși. Profilaxia infecțiilor fungice sistemice, la pacienții cu boli hematologice maligne sau la cei supuși transplantului de măduvă.
Dz: Candidoza vulvovaginală (200 mg/zi 3 zile) Pityriasis versicolor (200 mg/zi, 7 zile), dermatomicoze (200 mg/zi 7 zile sau 100 mg/zi 15 zile), keratite fungice (200 mg/zi 21 zile); imediat după masa principală.
Cind: Hipersensibilitate la itraconazol.
A!: Prudență la copii, vârstnici, afecțiune hepatică, IR; asocieri cu rifampicină, rifabutină, fenitoină, ritornavir, claritromicină, terfenadină, astemizol, cisapridă, triazolam, chinidină, pimozidă, simvastatină, saquinavir, alcaloizi din Vinca,

busulfan, docetaxel, trimetrexat, nifedipină, verapamil, ciclosporină, tacrolimus, rapamicină, digoxină, carbamazepină, buspironă, alfentanil, rifabutină, metilprednisolon; sarcină și alăptare.
RA: Diaree, greață, dureri, cefalee, creșteri reversibile ale enzimelor hepatice, amețeli, reacții alergice, hipokaliemie, edeme, hepatită, alopecie.

J

JOSAMYCINUM *COD ATC: J01FA07*

WILPRAFEN *HEINRICH MACK NACHF;* Susp. orală propionat de josamicină 160,2 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml ***(P-RF)***

WILPRAFEN *HEINRICH MACK NACHF;* Cpr. film. josamicină 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. film. ***(P-RF)***

Ind: Infecții acute și cronice, provocate de germeni sensibili la josamicină, la nivelul ORL, căilor respiratorii, ale cavității bucale, ale pielii și țesuturilor moi, ale căilor urinare și organelor sexuale.
Dz: *Adulți și copii > 14 ani:* 1-2 g/zi p.o., fracționat în 3 prize. La *sugari* și *copii < 14 ani:* 30-50 mg/kg/zi, fracționat în 3 prize.
Cind: Hipersensibilitate față de eritromicină și alte antibiotice din grupa macrolidelor, leziuni hepatice la prematuri.
A!: Asocieri cu teofilină, alcaloizi din ergot, lincomicină, terfenadină, astemizol, ciclosporină, digoxină; prudență în sarcină și alăptare.
RA: Anorexie, pirozis, greață și diaree, reacții cutanate, modificări ale valorilor enzimelor hepatice.

K

KALII CHLORIDUM *COD ATC: B05XA01 A12BA01*

CLORURĂ DE POTASIU 1000 mg *LAB. REMEDIA;* Cpr. disp. clorură de potasiu 1000 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. ***(P-6L)***; ct. × 500 cpr. ***(S)***

CLORURĂ DE POTASIU 7,45% *B. BRAUN MELSUNGEN;* Conc. pt. sol. perf. clorură de potasiu 7,45%; ct. × 10 f. × 20 ml; ct. × 100 f. × 20 ml; ct. × 20 f. × 20 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml; ct. × 20 fl. × 20 ml ***(S)***

Ind: Hipopotasemie (mai ales în tulburări digestive, vărsături, diaree), miastenie, comă diabetică, trat. cu ACTH, cortizon; pentru ușurarea regimului desodat în: nefrită, nefroză, ciroză, hipertensiune arterială.

Dz: Oral, 0,6-3 g/zi.
Cind: Hiperpotasemie, anurie.
RA: Dureri epigastrice.

KALII IODIDUM

COD ATC: H03CA01

IODURĂ DE POTASIU *SICOMED SA;* Cpr. iodură de potasiu 1 mg; ct. × 5 pungi × 200 cpr. ***(P-RF)***

JODID® 100 *MERCK KGaA;* Cpr. iod 100 μg sub formă de iodură de potasiu 130,8 μg; ct. × 4 blist. × 25 cpr. ***(P-RF)***

JODID® 200 *MERCK KGaA;* Cpr. iod 200 μg sub formă de iodură de potasiu 261,6 μg; ct. × 4 blist. × 25 cpr. ***(P-RF)***

Ind: Trat. și profilaxia tulburărilor datorate deficitului de iod: prevenirea și trat. gușei.
Dz: 50-200 μg/zi, în funcție de situația clinică.
Cind: Hipertiroidism manifest; hipertiroidism latent în cazul adm. unor doze mai mari de 150 μg iod/zi.
A!: Trebuie exclusă existența autonomiei tiroidiene difuze sau focale; prudență în carcinomul tiroidian; interacțiuni medicamentoase cu antitiroidiene, litiu și diuretice care economisesc potasiul; sarcină și alăptare.
RA: Hipertiroidism la dozele zilnice de iod mai mari de 150 μg.

KALII PERMANGANICUM

COD ATC: V03AB18

KALIUM PERMANGANICUM *SICOMED SA;* Cpr. permanganat de potasiu 50 mg; ct. × 1 fl. × 1000 cpr. ***(S)***

Ind: *Ext:* antiseptic în afecțiuni dermatologice, otorinolarigologice; *int:* infecții urinare; intoxicații cu fosfor, morfină, stricnină.
Dz: *Ext:* badjonări cu sol 2-5%; *int:* oral 50-300 mg/zi; iv sol 1% 1-4 mg/kg.
Cind: Hipersensibilitate la produs.
A!: Colorează urina în albastru; colorează pielea și mucoasele. Nu se asociază cu alcool, glicerină și perhidrol.
RA: Iritație și senzație de arsură la locul aplicării.

KANAMYCINUM

COD ATC: J01GB04

KANAMICINA *I. M. FARMACO SA;* Pulb. pt. sol. inj., kanamicină bază 1 g; ct. × 50 fl. pulb. ***(S)***

PAN-KANAMYCINE *LAB. PANPHARMA;* Pulb. pt. sol. inj., kanamicină bază 1 g; ct. × 50 fl. × 1 g; ct. × 100 fl. × 1 g ***(S)***

KANAMICINĂ SULFAT *ANTIBIOTICE IAȘI;* Ung. oft. 1% kanamicină sulfat; ct. × 1 tub × 6 g ***(P-RF)***

Ind: *Inj:* infecții renale, urologice și genitale; septicemii și endocardite; infecții respiratorii; infecții cutanate; tbc cu BK rezistent la antituberculoasele majore. *Oftal.:* inflamații acute ale polului ocular anterior; blefarite ulceroscuamoase și ulcerocrustoase, conjunctivite alergice, kerato-conjunctivite flictenulare, keratite superficiale nespecifice, keratite traumatice, sclero-keratite, episclerite.
Dz: *Inj.:* 15 mg/kg/zi în două prize la 12 ore, perf. i.v. 0,5-1 g în 250 ml sol. izotonică de glucoză sau ser fiziologic. În IR se adaptează în funcție de Cl creatininei. *Oftal.:* se alică la o oră în timpul zilei și la 2 ore noaptea, apoi de 3-4 ori/zi.
Cind: *Inj.:* Alergie la aminoglicozide, miastenie, hipoacuzie, IR, IC gravă, sarcină, alăptare. *Oftal.:* afecțiunile tuberculoase și fungice ale ochiului, supurațiile acute, infecții virotice, ulcere corneene simple sau supurate, glaucom, antecedente de hipersensibilitate la componentele unguentului.
A!: Prudență în IR, vârstnici, tulburări vestibulare și cohleare; asocierea cu medicamente nefro- și ototoxice, curarizante, miorelaxante, anestezice generale, toxina botulinică.
RA: *Inj.:* IR, nefrotoxicitate, ototoxicitate, alergii. *Oftal.:* fenomene iritative sau de sensibilizare, cataractă subcapsulară posterioară, creșterea presiunii intraoculare.

KETAMINUM

COD ATC: N01AX03

CALYPSOL *RICHTER GEDEON;* Sol. inj., clorhidrat de ketamină 50 mg/ml; ct. × 5 f. × 10 ml ***(S)***

KETAMINE PANPHARMA *PANFARMA;* Sol. inj., clorhidrat de ketamină 50 mg/ml; ct. × 1 f. × 5 ml; ct. × 25 f. × 5 ml ***(S)***

Ind: Intervenții de scurtă durată; intervenții instrumentale sau de diagnosticare dureroase; inducerea anesteziei.
Dz: *Adulți:* doza inițială 1-4,5 mg/kg i.v. *Copii:* iv doza inițială 0,5-4,5 mg/kg; doza medie pentru o anestezie cu o durată de 5-10 minute este de 2 mg/kg. *Adulți:* im doza inițială 6,5-13 mg/kg. *Copii:* 2,0-5,0 mg/kg. O doză de 10 mg/kg induce o anestezie cu o durată de 12-25 minute. Anestezia se menține prin repetarea dozei inițiale sau jumătate din doza inițială.
Cind: Eclampsie, HTA.
A!: Barbituricele sunt incompatibile cu ketamina, asocieri cu tubocurarina.
RA: În perioada de trezire, pot apărea: HTA, tahicardie, salivație, greață, vomă, tulburări respiratorii, halucinații, agitație psihomotorie și confuzie mentală.

KETOCONAZOLUM

COD ATC: J02AB02
D01AC08

FUNGICIDE *LAB. TORRENT Ltd.;* Cpr., ketoconazol 200 mg; ct. × 10 cpr.; ct. × 30 cpr. ***(P-RF)***

KETOCONAZOL 200 mg *MAGISTRA C & C;* Cpr. ketoconazol 200 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

KETOCONAZOL *OZONE LABORATORIES;* Cpr. ketoconazol 200 mg; ct. × 1 fl. × 10 cpr. ***(P-RF)***

KETOCONAZOL *ARENA GROUP SA;* Cpr. ketoconazol 200 mg; ct. × 1 fl. × 10 cpr. ***(P-RF)***

KETOCONAZOL 200 mg *SLAVIA PHARM SRL;* Cpr. ketoconazol 200 mg; ct. × 1 fl. × 10 cpr. ***(P-RF)***

N-KETOCONAZOL 200 mg *NORDFARM PRODUCT.;* Cpr. ketoconazol 200 mg; ct. × 1 fl. × 10 cpr. ***(P-6L)***

KETOCONAZOL LPH® 200 mg *LABORMED PHARMA SA;* în colaborare cu *TORRENT LTD.;* Cpr. 200 mg ketoconazol ct × 2 blist. × 10 cpr.; ct. × 100 blist. × 10 cpr. ***(S/P-RF)***

KETODAR® ȘAMPON *DAR AL DAWA;* Șampon 2%, fl. 100 mg ***(OTC)***

KETOSTIN 200 mg *HELCOR SRL;* Cpr. ketoconazol 200 mg; ct. × 1 fl. × 10 cpr; ct. × 1 folie × 10 cpr. ***(P-RF)***

NIZORAL *JANSSEN PHARMACEUTICA;* Șampon ketoconazol 2%; ct. × 1 fl. × 60 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml ***(OTC)***

NIZORAL *JANSSEN PHARMACEUTICA;* Cpr. ketoconazol 200 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr.; ct. × 3 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

NIZORAL *JANSSEN PHARMACEUTICA;* Cremă ketoconazol 2%; ct. × 1 tub × 15 g; ct. × 1 tub × 30 g ***(P-RF)***

NIZORAL 200 mg *TERAPIA SA;* Cpr. ketoconazol 200 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

SOSTATIN *FARAN LAB.;* Cpr. ketoconazol 200 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

Ind: *Sistemic:* infecții micotice cu germeni sensibili la ketoconazol: Candida, Torulopsis, Cryptococcus, Pityrosporum, Blastomyces, Histoplasma, Coccidioides, Paracoccidioides, Geotrichum, Drechslera longirostrata; Epidermophyton; Petriellidium boydii, Hendersonula toruloidea, Madurella; Basidiobolus ranarum, Fonsecaea pedrosol. *Ext.:* trat. și profilaxia infecțiilor cu Malassezia (Pityrosporum), cum sunt Pitiriasis versicolor (localizat), dermatita seboreică și Pitiriasis capitis (mătreața). *Vag:* trat. local al candidozelor vulvovaginale acute și cronice.

Dz: *Sistemic: Adulți:* 200 mg/zi, p.o în timpul mesei. La pacienții cu micoze sistemice grave, doza poate fi crescută la 400 mg/zi. *Copii:* 4-7 mg/kg/zi. *Ext.:* spălare cu șampon 2%, care se menține pe piele/scalp timp de 3-5 minute înainte de clătire. Pitiriasis versicolor: o dată/zi timp de 5 zile; Dermatita seboreică și pitiriasis capitis: de 2 ori/săpt. timp de 2-4 săpt. *Vag:* 1 ovul vaginal/zi, timp de 3-5 zile consecutiv.

Cind: Hipersensibilitate la ketoconazol, la alte antifungice cu structură imidazolică sau la oricare dintre componenții produselor.

A!: *Sistemic:* excluderea diagnosticului de sarcină și utilizarea metodelor contraceptive în timpul trat.; monitorizare hepatică; asocieri cu antiH1 nesedative, cisapridă, triazolam, alcool, midazolam, anticoagulante orale, busulfan, ciclosporină, tacrolimus, didanozină, izoniazidă, metilprednisolon (inj.), rifampicină, antiacide. *Ext.:* se va evita contactul cu ochii. Prudență în sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: *Sistemic:* hepatotoxicitate; foarte rar, ginecomastie; cefalee, vertij; greață, vărsături, diaree; prurit, erupții cutanate, urticarie. *Ext.:* senzație de arsură locală, prurit sau dermatită de contact, păr gras sau uscat, modificarea culorii părului. Vag: iritare, senzație de arsură, manifestări alergice locale.

KETOPROFENUM

COD ATC: M02AA10
M01AE03

FASTUM GEL® *BERLIN-CHEMIE AG. MENARINI GROUP;* Gel ketoprofen 2,5%; ct. × 1 tub × 50 g ***(OTC)***

FLEXEN *LIFEPHARMA;* Pulb. pt. sol. inj. ketoprofen 100 mg; ct. × 6 f. × 100 mg + 6 f. solv. × 2,5 ml ***(P-RF)***

FLEXEN *LIFEPHARMA;* Cps. ketoprofen 50 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. ***(P-RF)***

FLEXEN *LIFEPHARMA;* Sup. ketoprofen 100 mg; ct. × 12 sup. ***(P-RF)***

FLEXEN *LIFEPHARMA;* Gel ketoprofen 2,5%; ct. × 1 tub × 50 g ***(OTC)***

KETALGON® 100 mg/2 ml *SICOMED SA;* Sol. inj. i.m./i.v. 100 mg/2 ml

KETONAL *LEK PHARMACEUTICALS;* Cpr. ret. 150 mg ketoprofen; ct. × 1 fl. × 20 cpr. ret. ***(P-RF)***

KETONAL *LEK PHARMACEUTICALS;* Sol. inj. ketoprofen 50 mg/1 ml; ct. × 2 blist. × 5 f. × 2 ml ***(P-RF)***

KETONAL *LEK PHARMACEUTICALS;* Sol. inj. ketoprofen 100 mg/2 ml

KETONAL *LEK PHARMACEUTICALS;* Sup. ketoprofen 100 mg; ct. × 2 blist. × 6 sup. ***(P-RF)***

KETONAL 2,5% GEL *LEK PHARMACEUTICALS;* Gel 2,5%

KETONAL DUO *LEK PHARMACEUTICALS;* Cps. 150 mg

KETONAL RETARD *LEK PHARMACEUTICALS;* Cpr. cu elib. prel. 150 mg

KETONAL FORTE *LEK PHARMACEUTICALS;* Cpr. film. 100 mg ketoprofen; ct. × 1 fl. × 20 cpr. film. ***(P-RF)***

KETOPROFEN *SLAVIA PHARM;* Gel ketoprofen 2,5 %; ct. × 1 tub × 45 g ***(OTC)***

KETOPROFEN SR 100 mg; 200 mg *TERAPIA SA;* Cps. elib. prel. ketoprofen 100 mg; ct. × 1 blist. × 10 cps. elib. prel. ***(P-RF)***

PROFENID *LAB AVENTIS PHARMA;* Cpr. ketoprofen 100 mg; ct. × 30 cpr. ***(P-RF)***

PROFENID *LAB AVENTIS PHARMA;* Gel ketoprofen 2,5%; ct. × 1 tub × 60 g ***(OTC)***

PROFENID 100 mg *LAB. AVENTIS PHARMA;* Pulb. pt. sol. inj. ketoprofen 100 mg; ct. × 1 fl. pulb. ***(P-RF)***

PROFENID LP *LAB. AVENTIS PHARMA;* Cpr. film. ketoprofen 200 mg; ct. × 14 cpr. film. ***(P-RF)***

PRONTOKET® *CSC PHARMACEUTICALS;* Aerosol cut. sol. ketoprofen 5%; ct. × 1 fl. × 20 ml + pompa dozat.; ct. × 1 fl. × 30 ml + pompa dozat.; ct. × 1 fl. × 50 ml + pompa dozat. ***(OTC)***

RUBIFEN® *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cpr. film. 100 mg, Gel 2,5%, Supoz. 100 mg

Ind: Trat. simptomatic al afecțiunilor reumatice inflamatorii, degenerative și metabolice; durere postoperatorie, dismenoree, durere osoasă din metastazele tumorale, durere posttraumatică, artrită reumatoidă, spondiloartrită seronegativă, gută, pseudogută, artroze, reumatism extraarticular. Trat. local simptomatic al durerilor musculare sau osteoarticulare de natură traumatică sau reumatice.
Dz: *Oral:* Doza uzuală este de 50-100 mg de 3 ori/zi. Doza uzuală pentru prep. cu elib. prel. este de 150 mg de 2 ori/zi. *I.m.* 100 mg de 1-2 ori/zi, maxim 300 mg. *Perf. i.v.* maxim 300 mg/zi. *Ext.* gelul se aplică pe piele de 1-2 ori/zi, masând ușor.
Cind: Hipersensibilitate la ketoprofen, la alte AINS sau la oricare dintre componentele produsului; ulcer peptic activ; copii.
A!: Prudență în antecedente de ulcer gastric sau duodenal, sângerări gastrointestinale; IH; IR; poate masca semnele și simptomele unei infecții acute; gel nu se adm. pe zone cu plăgi sau leziuni cutanate, mucoase și ochi; expunerea la soare sau ultraviolete; interacțiuni medicamentoase cu diuretice, warfarină sau litiu; sarcină și alăptare.
RA: Reacții alergice, crize astmatiforme.

KETOROLACUM TROMETHAMIN *COD ATC: M01AB15*

KETANOV *RANBAXY LABORATORIES Ltd.;* Sol. inj. 30 mg/ml (f. × 1 ml) ***(S)***

KETOROL *Dr. REDDY'S LAB.;* Cpr. film. ketorolac trometamină 10 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. film. ***(P-RF)***

KETOROL *Dr. REDDY'S LAB.;* Sol. inj. ketorolac trometamină 30 mg/ml; ct. × 10 blist. × 10 f. × 1 ml; ct. × 10 f. × 1 ml ***(S)***

KETRODROL *DEVA HOLDING.;* Sol. inj. ketorolac trometamină 30 mg/ml; ct. × 10 f. × 1 ml ***(S)***

TORADOL *HOFFMANN LA ROCHE;* Cpr. ketorolac trometamină 10 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

Ind: Trat. de scurtă durată al durerii acute, moderate sau severe.
Dz: *Adulți* i.m.: 10-60 mg, în funcție de severitatea durerii; doza max. 120 mg/zi; i.v.: 10-30 mg; oral: 10 mg la 4-6 ore. *Copii peste 2 ani* i.m.: 1,0 mg/kg; i.v.: 0,5-1,0 mg/kg. Se adm. maxim 5 zile.
Cind: Ulcer peptic activ sau antecedente, hemoragii gastrointestinale severe sau perforații, IR moderată sau severă, travaliu, hipersensibilitate la ketorolac sau la alte AINS, analgezie preoperatorie profilactică, intraoperator, hemoragie cerebrovasculară suspectată sau confirmată, operații cu risc crescut de hemoragie sau hemostază incompletă.

AI: Nu este indicat în afecțiuni dureroase cronice; prudență la vârstnici; pacienți debilitați; afectarea funcției renale; hipovolemie; IC; IH; astm; tulburări ale coagulării; HTA; asociere cu aspirină sau alte AINS, pentoxifilină, probenecid, metotrexat, litiu, anticoagulante, furosemid; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Durere/disconfort abdominal, anorexie, constipație, diaree, dispepsie, eructații, flatulență, hemoragii gastrointestinale, greață, esofagită, pancreatită, ulcerații și perforații gastrointestinale, stomatită, melenă; vise anormale, tulburări de gândire, anxietate, meningită aseptică, convulsii, depresie, somnolență, uscăciunea gurii, sete excesivă, halucinații, cefalee, hiperkinezie, insomnie, mialgii, nervozitate, parestezii, reacții psihotice, transpirații, vertij; IRA, durere în flancuri (cu sau fără hematurie și/sau azotemie), hiperkaliemie, hiposodemie, retenție urinară, nefrită interstițială, oligurie; bradicardie, înroșirea feței, HTA, paloare, palpitații, hTA, dureri toracice; astm, dispnee, edem pulmonar; anomalii ale probelor funcționale hepatice, hepatită, icter colestatic, IH; dermatită exfoliativă, urticarie; anafilaxie, bronhospasm, edem laringian, angioedem; purpură, trobocitopenie, epistaxis, hematoame, hemoragia plăgii postoperatorii, timp de sângerare crescut; tulburări ale gustului, tulburări de vedere, tinitus, hipoacuzie; edem, reacții la locul de injecție, febră.

KETOTIFENUM *COD ATC: R06AX17*

FRENASMA *FARAN LAB.;* Sirop ketotifen 1 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml ***(P-6L)***

H-KETOTIFEN *HELCOR SRL;* Cpr. ketotifen 1 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

KETO-GAL *PHARMAPLANT BIOGALENICA;* Sol. orală ketotifen 1 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml, Sol. orală 0,02% fl. × 100 ml ***(P-6L)***

KETOF *HEXAL AG;* Sol. orală. ketotifen 1 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml ***(P-6L)***

KETOF *HEXAL AG;* Cps. ketotifen 1 mg; ct. × 50 cps.; ct. × 2 blist. × 10 cps. ***(P-6L)***

KETOTIFEN LPH® 1 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. ketotifen 1 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-6L);*** ct. × 100 blist. × 10 cpr. ***(S)***

KETOTIFEN *NIHFI;* Cpr. ketotifen 1 mg; ct. × 30 cpr. ***(P-6L)***

KETOTIFEN *HEXAL AG;* Sirop ketotifen 1 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml ***(P-6L)***

PROFILAR *THE UNITED PHARMA.;* Sirop. ketotifen 1 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 120 ml ***(P-6L)***

ZADITEN *NOVARTIS PHARMA;* Cpr. ketotifen 1 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

ZADITEN *NOVARTIS PHARMA;* Sol. oft. ketotifen 0,025%; ct. × 1 fl. ***(P-6L)***

Ind: Prevenirea crizelor de astm bronșic, în special alergic; trat. afecțiunilor alergice: rinite, conjunctivite, dermatite și febra fânului.

Dz: *Adulți, tineri și copii peste 3 ani:* inițial 1 mg p.o, seara; apoi 1 mg de 2 ori/zi, dimineața și seara, maxim 4 mg/zi. *Copii 6 luni-3 ani:* 0,5 mg de 2 ori/zi, dimineața și seara.
Cind: Hipersensibilitate la ketotifen sau la oricare dintre celelalte componente ale produsului.
A!: Prudență la copii sub 6 luni, nu se indică în trat. crizelor acute de astm bronșic; asocierea cu alcool, parasimpatolitice, deprimante ale SNC, antidiabetice orale; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Oboseală, sedare, uscăciunea gurii, amețeală, cefalee, greață și constipație; creșterea greutății corporale, exanteme de natură alergică și urticarie; stări de excitație, iritabilitate, insomnie și nervozitate.

L

LACIDIPINUM

COD ATC: C08CA09

LACIPIL® 2 mg; LACIPIL® 4 mg *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. lacidipină 2 mg; 4 mg; ct. × 2 blist. × 7 cpr. film.; ct. × 4 blist. × 7 cpr. film. ***(P-6L)***

Ind: HTA.
Dz: Inițial 2 mg o dată/zi; doza poate fi crescută la 4 mg.
Cind: Hipersensibilitate la produs.
A!: Prudență la copii; pacienții cu tulburări preexistente la nivelul nodulilor SA și AV; rezervă cardiacă mult diminuată; angină pectorală instabilă sau infarct recent; asocieri cu diuretice, beta-blocante, IEC, cimetidină; suc de grapefruit; sarcină și alăptare.
RA: Cefalee, eritemul feței, edeme, amețeală și palpitații; astenie, tulburări gastrice, greață, poliurie și hiperplazie gingivală; agravarea anginei pectorale existente.

LACTULOSUM

COD ATC: A06AD11

DUPHALAC *SOLVAY PHARMACEUTICALS;* Sirop 67%; ct. × 10 plicuri × 15 ml ***(OTC)***

DUPHALAC® *SOLVAY PHARMACEUTICALS;* Sirop 67%; ct. × 1 fl. × 200 ml; ct. × 1 fl. × 300 ml; ct. × 1 fl. × 500 ml; ct. × 1 fl. × 1000 ml ***(P-6L)***

LACTULOSE *E.I.P.I.C.O.;* Sirop 65%; ct. × 1 fl. × 100 ml; ct. × 1 fl. × 300 ml ***(P-6L)***

LACTULOSE AL SIROP *ALIUD® PHARMA GmbH;* Sirop lactuloză 66,7 %; ct. × 1 fl. × 200 ml; ct. × 1 fl. × 500 ml; ct. × 1 fl. × 1000 ml ***(P-6L)***

LAEVOLAC® *FESENIUS KABI;* Sol. orală 67%; ct. × 1 fl. × 100 ml; ct. × 1 fl. × 200 ml; ct. × 1 fl. × 500 ml; ct. × 1 fl. × 1000 ml ***(P-6L)***

Ind: Constipație; pacienții la care se evită efortul de defecație; prevenirea/trat. encefalopatiei portale; eradicarea infecției la purtătorii sănătoși de Salmonella.
Dz: *Constipație: Adulți:* 5-10 g de 1-2 ori/zi. *Copii:* 3-6 g de 1-2 ori/zi. *Encefalopatie portală: Adulți:* inițial 5-10 g de 3 ori/zi; doza se crește până la 20-30 g de 3-4 ori/zi.
Cind: Ileus; intoleranță la galactoză; rectocolită ulcero-hemoragică, boala Crohn.
A!: Prudență în diabet, trat. lung în constipație; sugari și nou-născuți; asocierea cu diuretice, glucocorticoizi și amfotericină B; sarcină și alăptare.
RA: Dureri și meteorism abdominal; greață, vărsături și diaree; dezechilibre hidroelectrolitice după trat. de lungă durată.

LAMIVUDINUM

COD ATC: J05AF05

EPIVIR *GLAXO SMITHKLINE;* Sol. orală lamivudină 10 mg/ml; ct. × 1 fl. × 240 ml + seringă dozatoare ***(S/P-RF)***

EPIVIR *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. lamivudină 150 mg; ct. × 1 fl. × 60 cpr. film. ***(S/P-RF)***

ZEFFIX *GLAXO SMITHKLINE;* Sol. orală lamivudină 5 mg/ml; ct. × 1 fl. × 240 ml ***(S/P-RF)***

ZEFFIX *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. lamivudină 100 mg; ct. × 2 blist. × 28 cpr. film.; ct. × 6 blist. × 28 cpr. film. ***(S/P-RF)***

Ind: Hepatită cronică (tip B) la adulți și cu dovada replicării virale cu afecțiune hepatică decompensată sau cu inflamație hepatică activă.
Dz: Inițial 100 mg o dată pe zi, până când apare seroconversia AgHBe la două determinări serice consecutive sau până la apariția seroconversiei AgHBs.
Cind: Hipersensibilitate la produs.
A!: Prudență în coinfecții cu virusul hepatitic Delta, tip B precoce mutant sau cu hepatită de tip C; transplant de organe; monitorizare regulată; IR; asocierea cu trimetoprim, ranitidină, cimetidină, zidovudină; sarcină și alăptare.
RA: Disconfort, oboseală, infecții respiratorii, cefalee, dureri abdominale, greață, vărsături și diaree, acidoză lactică.

LAMOTRIGINUM

COD ATC: N03AX09

LAMICTAL *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. lamotrigină 50 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

LAMICTAL *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. mast. lamotrigină 5 mg; 100 mg; ct × 3 blist. × 10 cpr. mast. ***(P-6L)***

LAMICTAL 100 mg *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. lamotrigină 100 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

LAMICTAL *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. mast. lamotrigină 25 mg; ct. × 30 cpr. mast. ***(P-6L)***

LAMICTAL 25 mg *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. lamotrigină 25 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

LAMICTAL® 2 mg *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. mast./disp. lamotrigină 2 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. mast./disp. ***(P-6L)***

LAMOGINE 25 mg; LAMOGINE 50 mg; LAMOGINE 100 mg *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. 25 mg; 50 mg și 100 mg ***(P-6L)***

Ind: *Adulți:* adjuvant sau monoterapie în trat. epilepsiei, crizelor convulsive parțiale sau generalizate, convulsiile tonico-clonice și cele asociate sindromului Lennox-Gaustaut. *Copii:* adjuvant în trat. epilepsiei, al crizelor convulsive parțiale sau generalizate, inclusiv convulsiile tonice.
Dz: *Adulți* inițial 25 mg o dată/zi, timp de 2 săpt., apoi 50 mg o dată/zi, timp de 2 săpt. Doza de întreținere: 100-200 mg/zi, o dată sau divizată în 2 prize.
Cind: Hipersensibilitate la lamotrigină.
A!: Prudență la copii sub 2 ani; interferă în metabolismului acidului folic; IR; întreruperea bruscă poate provoca crize convulsive de rebound; asocierea cu contraceptive orale, valproați, carbamazepină; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Erupții cutanate, sd. Stevens-Johnson și necroliză epidermică toxică, cefalee, fatigabilitate, erupții, greață, diplopie, vedere neclară, conjunctivită, somnolență, manifestări gastro-intestinale, iritabilitate/agresivitate, tremor, confuzie, leucopenie și trombocitopenie.

LANREOTIDUM

COD ATC: H01CB

SOMATULINE® PR 30 mg *BEAUFOUR IPSEN;* Liof. pt. sol. inj. lanreotidă acetat 30 mg; ct. × 1 fl. pulb. + 1 f. solv. x 2 ml ***(S/P-RF)***

Ind: Acromegalie; trat. simptomelor clinice ale tumorilor carcinoide.
Dz: Înaintea începerii trat. se efectuează o inj. test pt. evaluarea calității răspunsului. *Acromegalie*: inițial 30 mg, o dată i.m. la 14 zile. În funcție de răspuns se poate crește frecvența: 30 mg la 10 zile. *În tumori carcinoide*: inițial 30 mg, o dată i.m. la 14 zile. În funcție de răspuns se poate crește frecvența: 30 mg la 10 zile.
Cind: Sarcină, alăptare; hipersensibilitate la produs.
A!: Precauții la diabetici, IH, IR; se adm. doar după excluderea unei tumori obstructive intestinale; este necesară efectuarea a unei ecografii a colecistului la fiecare 6 luni; asocierea cu ciclosporină, insulină.
RA: durere la locul de adm. eritem local; diaree sau steatoree, flatulență, anorexie, greață sau vărsături; tulburări ale metabolismului glucidic; litiază biliară.

LANSOPRAZOLUM

COD ATC: A02BC03

LANZAP *DR. REDDY'S LAB.;* Cps. gastrorez. lansoprazol 30 mg; ct. × 2 blist. × 7 cps. gastrorez. ***(P-RF)***

LANZUL *KRKA d.d.;* Cps. gastrorez. lansoprazol 30 mg; ct. × 2 blist. × 7 cps. gastrorez. ***(P-RF)***

LASOPROL 30 mg *AEGIS Ltd.;* Cps. gastrorez. lansoprazol 30 mg; ct. × 2 blist. × 7 cps. gastrorez. ***(P-RF)***

Ind: Ulcer gastric și duodenal (inclusiv cel indus de AINS), esofagită de reflux, sd. Zollinger-Ellison.
Dz: *Ulcer gastric:* 30 mg o dată/zi timp de 8 săpt., cazurile severe 60 mg o dată pe zi. *Esofagite de reflux:* 30 mg o dată/zi timp de 8 săpt. *Cazuri recidivante:* 60 mg o dată/zi. *Ulcer duodenal:* 30 mg o dată/zi timp de 2-4 săpt. *Sindromul Zollinger-Ellison:* 120 mg o dată/zi. *Terapia de întreținere:* 30-60 mg.
Cind: Hipersensibilitate la lansoprazol.
A!: Afecțiunile gastrice maligne trebuie excluse; prudență în adm. îndelungată; copii; asocierea cu diazepam, fenitoină, warfarină, digoxină, fer, ampicilină și ketoconazol.
RA: Diaree, cefalee, afecțiuni alergice cutanate.

LATANOPROSTUM *COD ATC: S01EX03*

XALATAN *PHARMACIA – Membru al Grupului PFIZER;* Sol. oft. latanoprost 50 µg/1 ml; ct. × 3 fl. × 2,5 ml; ct. × 1 fl. × 2,5 ml ***(P-RF)***

Ind: Trat. glaucomului și al hipertensiunii intraoculare.
Dz: 1 picătură o dată/zi, seara.
Cind: Hipersensibilitate la latanoprost.
A!: Prudență în sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Eritem, senzație de corp străin în ochi, modificarea culorii irisului și genelor, uneori o ușoară reducere a vederii, reacții alergice.

LEFLUNOMIDUM *COD ATC: L04AA13*

ARAVA *LAB. AVENTIS PHARMA;* Cpr. film. leflunomidă 10 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. film; ct. × 1 fl. × 100 cpr. film. ***(P-RF)***

ARAVA *LAB. AVENTIS PHARMA;* Cpr. film. leflunomidă 20 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. film. ct. × 1 fl. × 50 cpr. film.; ct. × 1 fl. × 100 cpr. film. ***(P-RF)***

ARAVA *LAB. AVENTIS PHARMA;* Cpr. film. leflunomidă 100 mg; ct. × 1 blist. × 3 cpr. film. ***(P-RF)***

Ind: Trat. poliartritei reumatoide la adulți.
Dz: Inițial 100 mg o dată/zi, timp de 3 zile. Doza de întreținere: 10-20 mg o dată/zi.
Cind: Hipersensibilitate la leflunomidă, stări imunodeficitare severe; depresia hematopoietică, anemie, leucopenie, neutropenie sau trombocitopenie datorate altor cauze decât poliartrita reumatoidă; infecții severe; IR moderată-severă; IH; hipoproteinemie severă; copii; sarcină și alăptare.

A!: În timpul trat. trebuie asigurată contracepția; monitorizare hepatică, hematologică și cardiovasculară; procedură de spălare când apar RA severe; interacțiuni medicamentoase cu fenitoină, warfarină, colestiramină, vaccinuri vii și tolbutamidă; șoferi și activități de precizie.
RA: HTA, diaree, greață, vărsături, anorexie, stomatită aftoasă, dureri abdominale, cefalee, parestezii, tenosinovite, căderea părului, eczeme, uscăciunea pielii, leucopenie; hipokaliemie, tulburări ale gustului, rupturi de tendon, anemie, trombocitopenie; tulburări severe ale funcției hepatice, eozinofilie, pancitopenie, hiperlipidemie; sd. Stevens-Johnson, necroliză epidermică toxică, eritem multiform, RA anafilactice severe, agranulocitoză, scădere reversibilă a concentrației spermatozoizilor și a motilității acestora.

LENOGRASTINUM *COD ATC: L03AA10*

GRANOCYTE *LAB. AVENTIS PHARMA;* Pulb. liof. pt. sol. inj. 13,4 milioane UI; 33,6 milioane UI; 47 milioane UI lenograstină; ct. × 10 fl. pulb. **(S/P-RF)**

Ind: Reducerea duratei neutropeniei și a incidenței neutropeniei febrile, la pacienții tratați cu citostatice pentru cancere nemieloide și a neutropeniei după terapie mieloablativă, urmată de transplant medular; neutropenie severă congenitală, ciclică sau idiopatică.
Dz: Perf. i.v. sau sc 5-12 µg/kg/zi, lent; 1 µg (0,1 milioane UI).
Cind: Hipersensibilitate la filgrastim; neutropenie congenitală severă cu citogenetică anormală.
A!: Prudență la pacienții cu mielodisplazie; malignități mieloide; afectare severă renală sau hepatică; sarcină și alăptare.
RA: Dureri osteo-musculare; tulburările urinare; hTA; creșterea reversibilă a LDH, FA, acidului uric, GPT; leucocitoză; tulburări vasculare; splenomegalie; trombocitopenie; cefalee; diaree, anemie; epistaxis; scăderea glicemiei; reacții la locul injecției, hepatomegalie, artralgie, alopecie, osteoporoză și rash.

LERCANIDIPINUM *COD ATC: C08CA13*

LERIDIP® *BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP;* Cpr. film. lercanidipină 9,4 mg (sub formă de 10 mg clorhidrat de lercanidipină); ct. × 1 blist. × 7 cpr. film.; ct. × 1 blist. × 14 cpr. film.; ct. × 2 blist. × 14 cpr. film. ***(P-6L)***

Ind: HTA esențiale, forme ușoare și moderate.
Dz: 10 mg oral o dată pe zi, cu cel puțin 15 min înainte de mese; doza poate fi crescută treptat la 20 mg, putând fi necesare 2 săpt. Se poate asocia lercanidipina la un tratament anterior cu: beta-blocant, diuretic sau IEC.
Cind: Hipersensibilitate la produs sau la alte dihidropiridine. Sarcină și alăptare, femei aflate la vârsta fertilă – cu excepția cazului în care este utilizată o metodă contraceptivă eficace, obstacol în ejecția din ventriculul stâng, IC congestivă netratată, angină pectorală instabilă, IR sau IH severe; în decurs de 1 lună de la IM.

A!: Atenție la pacienți cu boala nodului sinusal (dacă nu are un pacemaker); la pacienți cu insuf. ventriculară stângă, la pacienți cu ischemie miocardică. Asocierea cu ketoconazol, itraconazol, eritromicină și fluoxetină, fenitoină, carbamazepină, terfenadină, astemizol, ciclosporină, amiodaronă, chinidină.
RA: Înroșirea feței, edeme periferice, extrasistole, tahicardie, cefalee, amețeli, astenie, tulburările gastrointestinale, poliuria, erupțiile cutanate, somnolența și mialgiile, hTA, creșteri izolate și reversibile ale valorilor plasmatice ale transaminazelor hepatice.

LETROZOLUM *COD ATC: L02BG04*

FEMARA *NOVARTIS PHARMA;* Cpr. film. letrozol 2,5 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. film.; ct. × 3 blist. × 10 cpr. film. *(S/P-RF)*

Ind: Cancer de sân în stadiu avansat, la femei aflate în postmenopauză naturală sau indusă artificial, după recidivă sau progresia bolii, în caz de eșec al tratamentului cu antiestrogeni. Trat. preoperator al cancerului de sân localizat, la femei în postmenopauză cu status pozitiv la receptorii pentru estrogeni.
Dz: 2,5 mg p.o, zilnic. Trat. se continuă până la regresia evidentă a tumorii.
Cind: Hipersensibilitate la letrozol sau la oricare dintre excipienții produsului; premenopauză; sarcină și alăptare; copii.
A!: La pacienții cu insuficiență hepatică gravă (scor Child-Pugh C).
RA: Cefalee, greață, edeme periferice, oboseală, bufeuri, subțierea firului de păr, rash, vărsături, dispepsie, creșterea greutății corporale, dureri musculo-scheletale, anorexie, sângerări vaginale, leucoree, constipație, amețeli, creșterea apetitului, hipersudorație.

LEUPRORELINUM *COD ATC: L02AE02*

LUCRIN DEPOT, 3,75 mg *ABBOTT LABORATORIES Ltd.;* Liof. pt. sol. inj. acetat de leuprorelină 3,75 mg; ct. × 1 fl. microsfere liof. + 1 f. solv. × 2 ml *(S)*

LUCRIN DEPOT, 11,25 mg *ABBOTT LABORATORIES Ltd.;* Liof. pt. sol. inj. acetat de leuprorelină 11,25 mg; ct. × 1 fl. microsfere liof. + 1 f. solv. × 2 ml *(S)*

Ind: Trat. paleativ al carcinomului de prostată hormono-dependent în stadiu avansat, trat. leiomioamelor uterine pentru o perioadă de 6 luni.
Dz: 3,75 mg inj. i.m./s.c. o dată pe lună sau 11,25 mg inj. i.m./s.c. o dată la 3 luni.
Cind: Hipersensibilitate la produs, sarcină sau femei care pot rămâne însărcinate în timp ce primesc medicamentul.
A!: Uneori agravarea simptomelor în timpul primelor săpt. de trat. cu analogi ai gonadorelinelor; prudență în metastaze vertebrale și/sau obstrucție a tractului urinar; alăptare, șoferi și activități de precizie.

RA: Bufeuri/transpirații calde, diminuarea libidoului, nicturie, impotență, disurie, reducerea testiculelor, infecții urinare, creșterea în greutate, anorexie, RA la locul de injectare, dureri osoase, oboseală și slăbiciune musculară.

LEVAMISOLUM

COD ATC: P02CE01

DECARIS *GEDEON RICHTER Ltd.;* cpr. levamisol 50 mg; 150 mg; ct. × 1 blist. × 2 cpr. ***(P-RF)***

Ind: Infestări cu: Ascaris lumbricoides, Necator americanus, Strongyloides stercoralis, Trichostrongylus colubriformis și Ankylostoma duodenale.
Dz: *Adulți:* 150 mg, doză unică. *Copii:* 2,5 mg/kg. La nevoie, trat. se poate repeta după o pauză de 14 zile.
Cind: Hipersensibilitate la levamisol; alăptare.
A!: Interacțiuni cu mebendazol, alcool; prudență la copiii sub 3 ani; sarcină; șoferi și activități de precizie.
RA: Greață, vomă, cefalee, diaree, encefalopatie, leucopenie, agranulocitoză, eritem, nefropatie.

LEVETIRACETAMUM

COD ATC: N03AX14

KEPPRA® 250 mg *U.C.B.S.A;* Cpr. film. levetiracetam 250 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. film.; ct. × 3 blist. × 10 cpr. film.; ct. × 5 blist. × 10 cpr. film.; ct. × 6 blist. × 10 cpr. film.; ct. × 10 blist. × 10 cpr. film. ***(S/P-RF)***

KEPPRA® 500 mg *U.C.B.S.A;* Cpr. film. levetiracetam 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. film.; ct. × 2 blist. × 10 cpr. film.; ct. × 3 blist. × 10 cpr. film.; ct. × 5 blist. × 10 cpr. film.; ct. × 6 blist. × 10 cpr. film.; ct. × 10 blist. × 10 cpr. film.; ct. × 12 blist. × 10 cpr. film.; ct. × 20 blist. × 10 cpr. film. ***(S/P-RF)***

KEPPRA® 1000 mg *U.C.B.S.A;* Cpr. film. levetiracetam 1000 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. film.; ct. × 2 blist. × 10 cpr. film.; ct. × 3 blist. × 10 cpr. film.; ct. × 5 blist. × 10 cpr. film.; ct. × 6 blist. × 10 cpr. film.; ct. × 10 blist. × 10 cpr. film.; ct. × 20 blist. × 10 cpr. film. ***(S/P-RF)***

KEPPRA 250 mg; 500 mg; 1000 mg *FOURNIER SA; Cpr. film. 250 mg; 500 mg; 1000 mg* ***(S/P-RF)***

Ind: Terapia asociată tratamentul crizelor convulsive parțiale, cu/fără generalizare secundară la pacienții epileptici.
Dz: Inițial 500 mg de 2 ori pe zi. În funcție de răspunsul clinic, doza poate fi crescută până la 1500 mg de 2 ori pe zi. Doza poate fi schimbată prin creștere/diminuare cu 500 mg de 2 ori pe zi, la fiecare 2-4 săpt. IR: reducere cu 50% a dozei de întreținere atunci când clearance-ul creatininei este < 70 ml/min.
Cind: Hipersensibilitate la levetiracetam, la alți derivați de pirolidonă sau la oricare dintre excipienți. Adolescenți sub 16 ani.

A!: Nu se întrerupe brusc trat. Sarcină și alăptare.
RA: Somnolență, amnezie, ataxie, convulsii, amețeli, cefalee, tremor, depresie, labilitate emoțională, comportament anormal, anxietate, confuzie, halucinații, iritabilitate, diaree, dispepsie, greață, anorexie, vertij, diplopie, rash, leucopenie, neutropenie, pancitopenie, trombocitopenie.

LEVOCABASTINUM

COD ATC: R01AC02
S01GX02

LIVOSTIN *JANSSEN PHARMACEUTICA;* Sol. oft. levocabastină 0,5 mg/ml; ct. × 1 fl. × 4 ml ***(P-6L)***

LIVOSTIN *JANSSEN PHARMACEUTICA;* Aerosol levocabastină 0,5 mg/ml; ct. × 1 fl. × 100 ml ***(P-6L)***

Ind: *Adm oft:* Conjunctivită alergică. *Adm. nazală:* Rinită alergică.
Dz: *Oft.:* 1 picătură în fiecare ochi, de 2 ori/zi. Doza poate fi mărită la 1 picătură de 3-4 ori/zi. *Nazal:* 2 pulverizări în fiecare nară, de 2 ori/zi. Doza poate fi mărită la 2 pulverizări de 3-4 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la unul din componenții produselor.
A!: *Oft.:* lentile de contact moi. Prudență în sarcină; șoferi și activități de precizie.
RA: Iritație nazală slabă și tranzitorie, RA. alergice.

LEVOCETIRIZINUM

COD ATC: R06AE09

XYZAL *U.C.B.S.A;* Cpr. film. clorhidrat de levocetirizină 5 mg; ct. × 4 cpr. film.; ct. × 7 cpr. film.; ct. × 10 cpr. film.; ct. × 2 blist. × 10 cpr. film.; ct. × 10 blist. × 10 cpr. film. ***(P-6L)***
XYZAL *FOURNIER SA;* Cpr. film. 5 mg ***(P-6L)***

Ind: Rinite alergice sezoniere (inclusiv simptome oculare); rinite alergice perene; urticarie idiopatică cronică.
Dz: *Adulți și adolescenții peste 12 ani:* 5 mg; *copii 6-12 ani:* 5 mg; IR: 5 mg la 2-3 zile în funcție de clearance-ul de creatinină. Durata de adm. depinde de tipul, durata și evoluția simptomatologiei.
Cind: Hipersensibilitate la levocetirizină sau la oricare dintre excipienții produsului sau la oricare derivați de piperazină. IR severă (clearance-ul creatininei sub 10 ml/min). Copil sub 6 ani. Pacienți cu intoleranță ereditară la galactoză.
A!: Precauție la ingestia concomitentă de alcool. Sarcină și alăptare. Șoferi și activități de precizie.
RA: Cefalee, somnolență, oboseală și astenie; uscăciunea gurii.

LEVODOPUM + BENSERAZIDUM

COD ATC: N04BA02

MADOPAR *TERAPIA SA;* Cpr. cu 200 mg levodopa + 50 mg benserazidă; ct. × 1 fl. × 30 cpr. ***(P-6L)***

MADOPAR *HOFFMANN LA ROCHE*; Cpr. cu 200 mg levodopa + 50 mg benserazidă; ct. × 1 fl. × 30 cpr.; ct. × 1 fl. × 100 cpr. ***(P-6L)***

MADOPAR® HBS *HOFFMANN LA ROCHE*; Cps. cu elib. controlată; ct. × 1 fl. × 30 cpr.; ct. × 1 fl. × 100 cpr. ***(P-6L)***

Ind: Parkinson, cu excepția celui iatrogen. Cps. cu elib. prel. sunt indicate la pacienții cu fluctuații de orice tip privind răspunsul la trat., în special la cei cu fluctuații ale nivelelor plasmatice și pentru un mai bun control al simptomelor nocturne.
Dz: În stadiile inițiale: 62,5 mg de 3-4 ori/zi. În stadiile avansate doza este dublă. Dacă se confirmă tolerabilitatea planului terapeutic inițial, dozele pot fi crescute săptămânal, cu încă cel mult o doză/zi. Sub supraveghere strictă, doza se poate adapta la fiecare 2-3 zile. Efectul optimal se obține la doze de 400-800 mg levodopa + 100-200 mg benserazidă, adm. divizat în 3-4 doze/zi. Doza de întreținere este de 125 mg de 4-6 ori/zi. În cazul pacienților care prezintă fluctuații semnificative ale efectelor medicamentului în cursul zilei și la care se adm. doze mici, repetate, se preferă forma HBS, cu păstrarea aceleiași posologii, de la o zi la alta. După 2-3 zile dozele se cresc gradat cu până la 50%, datorită biodisponibilității acestei forme farmaceutice.
Cind: Asocierea cu IMAO (excepție selegilina). Pacienți cu decompensări grave, endocrine, renale, hepatice sau cardiace, cei cu psihoze sau nevroze psihice severe. Pacienți sub 25 de ani. Asocierea cu neuroleptice, vit. B_6. Sarcină și alăptare.
A!: Măsurarea presiunii intraoculare la pacienții cu glaucom. Controale periodice cardio-vasculare (inclusiv ECG) la pacienții care au în antecedente IMA, insuficiență coronariană sau aritmie cardiacă. Antecedente de ulcer gastric sau osteomalacie. Trat. va fi oprit cu cel puțin 12-14 ore înaintea unei anestezii generale. În cazurile de urgență, în care terapia nu a fost oprită, se evită anestezia cu ciclopropan sau halotan.
RA: Anorexie, greață, vomă; în stadiile tardive ale trat. mișcări involuntare de tip coreiform sau atetozic; insomnie, agitație, rareori psihoze și/sau reacții psihotice - în special la vârstnici; afectare hepatică sau renală.

LEVODOPUM + CARBIDOPUM *COD ATC: N04BA02*

LEVODOPA & CARBIDOPA *TEVA;* Cpr. 100 mg, 250 mg levodopa și 25 mg carbidopa; ct. × 1 fl. × 100 cpr. ***(P-6L)***

CREDANIL *REMEDICA;* Cpr. 250 mg levodopa + 25 mg carbidopa; ct. × 1 fl. × 100 cpr.; ct. × 20 cpr. ***(P-6L)***

ISICOM *DESITIN;* Cpr. 250 mg levodopa + 25 mg carbidopa; ct. × 3 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

NAKOM *LEK PHARMACEUTICAL;* Cpr. 250 mg levodopa + 25 mg carbidopa; ct. × 10 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

NAKOM MITE *LEK PHARMACEUTICAL;* Cpr. 100 mg levodopa + 25 mg carbidopa; ct. × 10 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

SINEMET CR® 50/200; SINEMET CR® 25/100 *MERCK SHARP & DOHME;* Cpr. cu elib. control., 50/200; 25/100 (reprezintă formularea de concentrație înjumătățită) ***(P-6L)***

ZIMOX *FARAN LAB.;* Cpr. 250 mg levodopa + 25 mg carbidopa; ct. × 3 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

Ind: Parkinson.
Dz: Inițial 1/2 cpr. 1-2 ori/zi, crescând cu câte 1/2 cpr./zi sau la două zile, până la obținerea efectul optim; doza max. 8 cpr./zi.
Cind: Glaucom, IC, IH, insuficiență pulmonară, endocrină și a măduvei osoase. Trat. cu IMAO, neuroleptice, simpatomimetice. Copii. Sarcină și alăptare.
A!: Depresie cu tendință de suicid sau manifestări antisociale. Examenul fundului de ochi la pacienți cu glaucom. Șoferi și activități de precizie.
RA: Pierderea apetitului, greață, hTA ortostatică.

LEVODROPROPIZINUM

COD ATC: R05DB27

LEVOPRONT SIROP *HEINRICH MACK NACHT;* Sirop 0,6% levodropropizină; ct. × 1 fl. × 120 ml ***(P-RF)***

LEVOPRONT SOLUȚIE ORALĂ ÎN PICĂTURI *HEINRICH MACK NACHT;* Sol. orală 0,6% levodropropizină; ct. × 1 fl. × 15 ml ***(P-RF)***

Ind: Trat. simptomatic al tusei neproductive.
Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* 60 mg oral, la cel puțin 6 ore de max. 3 ori pe zi. *Copii peste 2 ani:* 1 mg/kg, de cel mult 3 ori/zi, max. 3 mg/kg. Tratamentul poate fi continuat până la 7 zile.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului; hipersecreție traheobronșică; reducere a funcției mucociliare; IH gravă; sarcină; alăptare.
A!: IR gravă; pacienții cu diabet zaharat; siguranța și eficacitatea adm. la copiii sub 2 ani nu au fost stabilite; șoferi și activități de precizie.
RA: Greață, vărsături, pirozis, disconfort abdominal, diaree; lipotimie, somnolență, obnubilare, parestezii, amețeli, cefalee; palpitații.

LEVOFLOXACINUM

COD ATC: J01MA11

TAVANIC® *LAB. AVENTIS PHARMA;* Cpr. film. levofloxacină 250 mg sau 500 mg; Sol. perf. 5 mg/ml, fl. × 50 ml sau 100 ml ***(P-RF)***

Ind: Infecții cu germeni sensibili: sinuzite, bronșite cronice, pneumonie.
Dz: *Adulți* p.o.: sinuzită 500 mg/zi, în priză unică; bronșită cronică: 500 mg/zi, în priză unică; pneumonie: 500 mg, de 2 ori/zi (sau iv).
Cind: Copii sau adolescent în creștere. Hipersensibilitate la produs sau la chinolone. Epilepsie, deficit de G-6PDH, antecedente de tendinopatie.
A!: Precauție în miastenie, convulsii în antecedente, IR, prezența colitei pseudomembranoase. Se evită expunerea la lumină sau UV. Soferi și activități de precizie.
RA: Grețuri, diaree, anorexie, cefalee, amețeală, vertij. Rar enterocolită, melenă, colită pseudomembranoasă, hipoglicemie, erupții cutanate.

LEVONORGESTRELUM *COD ATC: G03AC03*

MIRENA® *LEIRAS OY – SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Dispozitiv intrauterin levonorgestrel 52 mg; ct. × 1 blist. × 1 disp. intrauterin + accesorii ***(P-RF)***

POSTINOR® 2 *GEDEON RICHTER Ltd.;* cpr. levonorgestrel 0,75 mg; ct. × 1 blist. × 2 cpr. ***(P-RF)***

Ind: *p.o:* contracepția orală, destinată femeilor cu contacte sexuale ocazionale și/sau neplanificate. *Intrauterin:* contracepție, menoragie idiopatică, profilaxia hiperplaziei endometriale în timpul trat. cu estrogeni.
Dz: *p.o.:* 0,75 mg, în decurs de o oră de la contactul sexual, max. 1-2 cpr.; lunar, maxim 4 cpr. *Intrauterin:* dispozitivul intrauterin se plasează în cavitatea uterină (viteza de eliberare este inițial de 20 µg/24 ore) pentru 5 ani.
Cind: Hipersensibilitate la produs; sarcină sau suspiciune de sarcină; inflamații pelvine; infecții genitale; endometrită postpartum; avort septic în ultimele 3 luni; cervicită; cancer cervical, de sân sau uterin; hemoragie uterină; anomalii uterine congenitale sau dobândite incluzând fibroame care deformează cavitatea uterină; condiții asociate cu creșterea sensibilității la infecții; afecțiuni hepatice acute sau tumori hepatice, afecțiuni renale.
A!: *p.o.:* Prudență în astm, IC, HTA, migrenă, epilepsie, disfuncții renale, diabet zaharat, hiperlipemie, depresie, tromboflebite, afecțiuni trombembolice și hemoragie cerebrală; vomă sau diaree. Asocierea cu ampicilină, rifampicină, tetracicline, cloramfenicol, neomicină, sulfonamide, barbiturice și fenilbutazonă. *Intrauterin:* Prudență în ischemie cerebrală trecătoare; cefalee foarte severă; icter; creșterea marcată a TA; neoplasm hormono-dependent, incluzând cancerul de sân; risc crescut de tromboembolie venoasă; afecțiuni cardiace congenitale sau valvulare cu risc de endocardită infecțioasă; alăptare.
RA: Grețuri, amețeli sau sângerare intermenstruală la 2-3 zile după adm., cefalee și senzație de tensiune în sâni.

LEVOSULPIRIDUM *COD ATC: N05AL07*

LEVOPRAID® *RAVIZZA FARMACEUTICI S. p. A,* cpr. x 50 mg levosulpirid, ct. × 2 blistere × 10 cpr.

LEVOPRAID® *RAVIZZA FARMACEUTICI S. p. A,* cpr. × 100 mg levosulpirid, ct. × 2 blistere × 10 cpr.

Ind: Depresii endogene și reactive. Schizofrenie acută și cronică.
Dz: *Adulți:* În depresii endogene și reactive se recomandă 50-150 mg levosulpiridă (1-3 comprimate Levopraid 50 mg) pe zi. În schizofrenia acută se recomandă 200-300 mg levosulpiridă (2-3 comprimate Levopraid 100 mg) pe zi. În schizofrenia cronică doza recomandată este de 150 mg levosulpiridă (3 comprimate Levopraid 50 mg) pe zi. Această doză poate fi redusă treptat în funcție de starea clinică. La vârstnici, doza trebuie stabilită cu atenție considerându-se o posibilă reducere a dozelor menționate mai sus.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la levosulpiridă sau la oricare dintre excipienții produsului; la pacienții cu feocromocitom, epilepsie, manii sau stadii maniacale ale psihozelor maniaco-depresive, pacienți cu mastopatie malignă.

A!: A fost raportat în timpul tratamentului un complex de simptome potențial letal cunoscut ca sindrom neuroleptic malign, cu semnele clinice: hiperpirexie, rigiditate musculară, achinezie, tulburări vegetative (variații ale pulsului și tensiunii arteriale, transpirații, tahicardie, aritmii) și alterări ale stării de conștiență care pot progresa până la letargie și comă. Tratamentul sindromului neuroleptic malign constă în: întreruperea imediată a administrării de medicamente antipsihotice și a altor medicamente neesențiale, precum și instituirea unui tratament simptomatic intensiv (o atenție specială se va acorda reducerii hipertermiei și corectării deshidratării). Nu trebuie administrat în prezența sângerărilor gastrointestinale, a obstrucțiilor mecanice sau a perforațiilor. Levopraid nu trebuie utilizate în timpul sarcinii presupuse sau confirmate și în timpul alăptării. La doze mai mari pot să apară: somnolență, parestezii și diskinezie; datorită pericolelor potențiale, pacienții aflați sub tratament cu Levopraid trebuie avertizați asupra acestor riscuri pentru a evita conducerea de vehicule sau folosirea de utilaje.

RA: Foarte rar au fost observate agitație psihomotorie, tulburări neurovegetative și reacții alergice; aceste reacții sunt ușoare și reversibile. După tratamente de lungă durată s-au observat cazuri izolate de creștere în greutate. În cazul administrării prelungite, tulburări cum sunt amenoreea, ginecomastia, galactoreea și alterarea libidoului, au fost observate în cazuri particulare.

LEVOTHYROXINUM *COD ATC: H03AA01*

EUTHYROX® 25 *MERCK KGaA;* Cpr. levotiroxină sodică 25 μg; ct. × 2 blist. × 25 cpr.; ct. × 4 blist. × 25 cpr. ***(P-6L)***

EUTHYROX® 100 *MERCK KGaA;* Cpr. levotiroxină sodică 100 μg; ct. × 2 blist. × 25 cpr.; ct. × 4 blist. × 25 cpr. ***(P-6L)***

EUTHYROX® 200 *MERCK KGaA;* Cpr. levotiroxină sodică 200 μg; ct. × 4 blist. × 25 cpr. ***(P-6L)***

L-THYROXIN-25 *BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP;* Cpr. levotiroxină sodică 25 μg; ct. × 2 blist. × 25 cpr.; ct. × 4 blist. × 25 cpr. ***(P-6L)***

L-THYROXIN-50 BERLIN CHEMIE *BERLIN-CHEMIE AG;* Cpr. levotiroxină sodică 50 μg; ct. × 2 blist. × 25 cpr.; ct. × 4 blist. × 25 cpr. ***(P-6L)***

L-THYROXIN-100 *BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP;* Cpr. levotiroxină sodică 100 μg; ct. × 2 blist. × 25 cpr.; ct. × 4 blist. × 25 cpr. ***(P-6L)***

L-THYROXIN-150 BERLIN-CHEMIE *BERLIN-CHEMIE AG;* Cpr. levotiroxină sodică 150 μg; ct. × 2 blist. × 25 cpr.; ct. × 4 blist. × 25 cpr. ***(P-6L)***

THYRO-4 *FARAN;* Cpr. levotiroxină sodică 100 μg, 200 μg, ct. × 1 fl. × 100 cpr. ***(P-6L)***

Ind: Trat. hipotiroidie și bolnavii cu hipertiroidism tratați cu antitiroidiene; profilaxia gușei după tiroidectomie la cei cu funcție tiroidiană păstrată; gușa benignă eutiroidiană; trat. supresor/substitutiv în carcinom tiroidian; test de supresie tiroidiană.

Dz: *Adulți:* În hipotiroidism: oral 25-300 μg/zi, crescând doza la 2-4 săpt.; doza de întreținere: 125-250 μg/ zi.Test de supresie tiroidiană: p.o. 200 μg/zi,

14 zile sau o doză unică de 3 mg cu 7 zile înaintea repetării scintigrafiei. *Copii:* 12,5-50 µg/zi crescând progresiv până la doza de întreținere de 100-150 µg/m^2 și zi.
Cind: Hipersensibilitate la levotiroxină; hipertiroidii netratate cu antitiroidiene; IMA recent; angină pectorală; miocardite; IC decompensată; insuficiență corticosuprarenală netratată.
A!: Monitorizarea nivelului plasmatic al tirotrofinei și al tiroxinei libere; prudență la vârstnici; cardiaci; forme grave de hipotiroidism; HTA; insuficiență hipofizară; anorexie cu denutriție; tbc; diabet zaharat; obezitate; interacțiuni medicamentoase cu insulina, antidiabetice orale, anticoagulante cumarinice, antidepresive triciclice, colestiramină, sucralfat, hidroxid de aluminiu, sulfat feros, fenitoină, carbamazepină, rifampicină, digitalice, amiodaronă; sarcină și alăptare.
RA: În caz de creștere rapidă a dozei: manifestări de hipertiroidism, în cazuri izolate RA. de hipersensibilitate (rash); creșterea riscului de crize convulsive la copiii epileptici; la sugari sau la copii poate să apară hipercalciurie.

LIDOCAINUM

COD ATC: N01BB02
C01BB01

DENTOCALMIN *BIOFARM SA;* Sol. dent. ***(STO)***

LIDOCAIN *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Sol. ext. lidocaină 10%; ct. × 1 fl. spay × 38 g ***(P-RF)***

LIDOCAIN HYDROCHLORID *ALKALOID AD;* Sol. inj. clorhidrat de lidocaină 20 mg/ml; ct. × 100 f. × 2 ml ***(S)***

PRESSICAINE FLUID *LAB. SPAD;* Sol. ext. lidocaină 12,5%; ct. × 1 fl. spay × 100 g ***(S/P-RF)***

XILINĂ *SICOMED SA;* Sol. inj. clorhidrat de lidocaină 1%; ct. × 10 f. × 5 ml ***(S/P-RF);*** ct. × 100 f. × 10 ml ***(S/P-RF)***

XILINĂ *SICOMED SA;* Sol. inj. clorhidrat de lidocaină 2%; ct. × 10 f. × 2 ml; ct. × 100 f. × 2 ml ***(S/P-RF)***

XILINĂ 4% *SICOMED SA;* Sol. inj. clorhidrat de lidocaină 4%; ct. × 5 f. × 2 ml; ct. × 10 f. × 2 ml; ct. × 100 f. × 2 ml ***(S/P-RF)***

XILINĂ UZ CARDIOLOGIC *SICOMED SA;* Sol inj. 1%, ct. × 10 f. × 5 ml; ct. × 100 f. × 5 ml ***(S/P-RF)*** *COD ATC: C01 BB01*

XYLESTESIN PUMPSPRAY *ESPE DENTAL MEDIZIN GmbH;* Aerosol lidocaină 16,8%; ct. × 1 fl. × 27 g ***(S/P-RF)***

XYLOCAINE 0,5% *ASTRAZENECA AB;* Sol. inj. clorhidrat de lidocaină 5 mg/ml; ct. × 5 fl. × 20 ml ***(S/P-RF)***

XYLOCAINE 1% *ASTRAZENECA AB;* Sol. inj. clorhidrat de lidocaină 10 mg/ml; ct. × 5 fl. × 20 ml; ct. × 5 fl. × 50 ml ***(S/P-RF)***

XYLOCAINE 2% *ASTRAZENECA AB;* Sol. inj. clorhidrat de lidocaină 20 mg/ml; ct. × 5 fl. × 20 ml ***(S/P-RF)***

XYLOCAINE 5% HEAVY *ASTRAZENECA AB;* Sol. inj. clorhidrat de lidocaină 50 mg/ml; ct. × 20 fl. × 2 ml ***(S/P-RF)***

XYLOCAINE JELLY *ASTRAZENECA;* Gel 2% lidocaină; ct. × 1 tub × 30 g ***(P-RF)***

XYLOCAINE 10% SPRAY *ASTRAZENECA;* Sol. ext. lidocaină 10%; ct. × 1 fl. × 50 ml ***(S/P-RF)***

XYLOCONTACT *PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND;* Cremă. pt. uz dentar lidocaină 7,48%; ct. × 1 tub ***(P-RF)***

XYLONOR *SPECIALITES SEPTODONT;* Sol. ext. lidocaină 15%; ct. × 1 fl. spay × 36 g ***(S/P-RF)***

Ind: Anestezie locală; trat. tahiaritmiilor ventriculare asociate infarctului miocardic; controlul fibrilației ventriculare în resuscitarea cardiopulmonară.
Dz: *Anestezie locală:* 5-300 mg. *Antiaritmic:* resuscitarea cardiopulmonară, controlul fibrilației ventriculare doză unică de 100 mg i.v.; alte ind.: doză de atac 1-1,5 mg/kg inj. i.v., urmată de perfuzie 1-4 mg/min până la max. 200-300 mg/oră.
Cind: Alergie la lidocaină sau alte anestezice amidice, IH, IR, miastenie, asociere cu anticoagulante, șoc hipovolemic, IC, hTA, bloc cardiac, bradicardie.
A!: Prudență în IMA, insuficiență respiratorie, antecedente convulsive; leziuni în regiunea aplicării; anestezie generală; riscul aspirației traheo-bronțice; interacțiuni medicamentoase cu tocainidă, cimetidină, propranolol, succinilcolină, antidepresive triciclice; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: hTA, bradicardie, cefalee, bloc spinal, deprimare cardio-vasculară, deprimare respiratorie; efecte toxice acute la nivelul SNC.

LINCOMYCINUM

COD ATC: J01FF02

LINCOCIN™ *PHARMACIA - Membru al Grupului PFIZER;* Sol. parent. lincomicină 300 mg/ml; ct. × 1 fl. × 2 ml ***(S/P-RF)***

LINCOCIN™ *PHARMACIA - Membru al Grupului PFIZER;* Cps. lincomicină 500 mg; ct. × 3 blist. × 4 cps. ***(P-RF)***

LINCODAR *DAR AL DAWA;* Cps. lincomicină 500 mg; ct. × 2 blist. × 8 cps. ***(P-RF)***

NELOREN *LEK;* Sol. inj. lincomicină 300 mg/ml; ct. × 10 f. × 2 ml ***(S/P-RF)***

Ind: Infecții severe produse de: stafilococi sensibili la meticilină, streptococi, Corynebacterium diphteriae, Campylobacter, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma sp., Chlamydia trachomatis, Clostridium perfringens, Actinomyces, Propionibacterium, Peptostreptococcus, Fusobacterium, Veillonella, inclusiv anaerobi - infecții ORL, bronhopulmonare, stomatologice, cutanate, osteo-articulare, infecții abdominale postchirurgicale, septicemii.
Dz: *Int.: Adulți:* 500 mg la 6-8 ore. *Copii (peste o lună):* În infecții grave: 30-60 mg/kg/zi divizate în 3 sau 4 doze egale. *Inj. i.m.: Adulți:* 600 mg la 12-24 ore. *Copii (peste o lună):* 10 mg/kg o dată/zi, la nevoie de 2-3 ori/zi. *Perf. i.v.: Adulți:* 600 mg la 8-12 ore. *Copii (peste o lună):* 10-20 mg/kg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la lincomicină sau clindamicină. Copiii sub o lună; prematuri.
A!: Nu este indicată în meningite; risc de colită pseudomembranoasă; prudență în antecedente de astm sau alergii; monitorizarea hemogramei, funcției

renale și hepatice; IR; IH; interacțiuni medicamentoase cu eritromicină, curarizante; sarcină și alăptare.
RA: Dureri abdominale, diaree persistentă inclusiv colită pseudomembranoasă, greață, vărsături, alergii, suprainfecții fungice, afectare hepatică, reacții la locul injectării.

LINEZOLIDUM *COD ATC: J01XX*

ZYVOXID® *PHARMACIA - Membru al Grupului PFIZER;* Cpr. film. linezolid 400 mg; 600 mg; ct. × 1 fl. × 10 cpr. film. ***(P-RF)***

ZYVOXID® *PHARMACIA - Membru al Grupului PFIZER;* Sol. perf. linezolid 2 mg/ml; ct. × 10 pungi × 300 ml ***(S)***

ZYVOXID® *PHARMACIA - Membru al Grupului PFIZER;* Gran. pt. susp. orală linezolid 100 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 66 gran. pt. 150 ml susp. ***(P-RF)***

Ind: Pneumonii nozocomiale și comunitare; infecții cutanate și ale țesuturilor moi; infecții enterococice. Dacă se suspectează coexistența unei bacterii patogene Gram negativ, se adm. asociat cu alt antibiotic.
Dz: *Adulți - Pneumonie nozocomială*: 600 mg i.v. sau p.o.; 10-14 zile; *Infecții cutanate și ale țesuturilor moi:* 400-600 mg oral sau 600 mg i.v.; 10-14 zile; *Infecții enterococice*: 600 mg i.v. sau p.o., 14-28 zile; *Copii sub 5 ani:* 10 mg/kg de 2 ori pe zi; doza max. 600 mg.
Cind: Hipersensibilitate la produs.
A!: În cazurile în care se suspectează colita pseudomembranoasă se întrerupe adm. Poate determina dezvoltarea microorganismelor rezistente. Monitorizarea plachetelor sanguine la cei cu trombocitopenie preexistentă, tratați concomitent cu medicamente ce le scad, sau care au fost tratați mai mult de 14 zile. Se evită ingerarea de cantități excesive de alimente și băuturi cu conținut ridicat de tiramină sau asocierea cu dopamină sau adenalină. Șoferi și activități de precizie.
RA: Cefalee, diaree, greață și vărsături, candidoză vaginală, gust metalic, creșterea bilirubinei totale, GOT, GPT, LDH, fosfatazei alcaline, creatinkinazei, lipazei, amilazei, sau a glicemiei; scăderea proteinelor totale, albuminei, sodiului sau calciului.

LISINOPRILUM *COD ATC: C09AA03*

MEDAPRIL 5; 10; 20 *MEDOCHEMIE Ltd.;* Cpr. 5 mg, 10 mg, 20 mg

RANOLIP *RANBAXY LAB.;* Cpr. 5 mg ***(P-6L)***

SINOPRYL *ANTIBIOTICE IAȘI* în colaborare cu *ECZACIBASI;* Cpr. lisinopril 10 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

TONOLYSIN 2,5 mg; 5 mg; 10 mg; 20 mg *GEDEON RICHTER Ltd.;* Cpr. lisinopril 2,5 mg; 5 mg; 10 mg; 20 mg ct. × 2 blist. × 14 cpr. ***(P-6L)***

Ind: HTA; IC.
Dz: *HTA:* 10-40 mg, o dată/zi (IR: scad doza). *IC*: inițial 2,5 mg/zi, doza de întreținere 5-20 mg, o dată/zi.

Cind: Hipersensibilitare la lisinopril sau alt IEC; sarcină și alăptare.
A!: Prudență în hTA; persoane cu pierderi de sodiu; cardiopatie ischemică; tulburări cerebrovasculare; monitorizarea potasemiei și HLG; vârstnici; IR; copii; interacțiuni medicamentoase cu indometacin; sarcină și alăptare.
RA: Vertij, cefalee, oboseală, diaree, tuse, disconfort la nivelul pieptului, febră, angină pectorală, hTA ortostatică, dureri abdominale, anorexie, constipație, gută, dureri de oase sau de șold, depresie, somnolență, insomnie, bronșită, sinuzită, oligurie, azotemie progresivă, IRA, infecții urinare, tulburări de vedere, prurit, vasculită, edeme angioneurotice, a glotei și/sau laringelui, creșteri minore ale uremiei și ale creatininei serice.

LITHII CARBONAS *COD ATC: N05AN01*

CARBONAT DE LITIU *SICOMED SA;* Cpr. carbonat de litiu 250 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. ***(P-RF)***

LITHIUM CARBONICUM *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. carbonat de litiu 250 mg; ct. × 60 cpr. ***(P-RF)***

Ind: Stări de excitație în manie sau hipomanie; psihoze ciclice maniaco-depresive; asociat cu un neuroleptic în schizofrenia cu tulburări afective, în psihozele delirante rebele. Profilactic pentru prevenirea recidivelor în psihozele maniaco-depresive.
Dz: În prima zi 500-750 mg, a 2-a și a 3-a zi 750-1000 mg, apoi în funcție de litemie (optimă 0,7-1 mEq/l).
Cind: IR, HTA, IC, aritmii, cardiopatie ischemică, boală Addison, hipotiroidism netratat, copii sub 12 ani, leziuni cerebrale severe, regim hiposodat; sarcină.
A!: Prudență în dieta hiposodată; monitorizarea litemiei; asocierea cu acid etacrinic, furosemid, indometacină, metildopa, fenitoină, piroxicam, tetraciclină, spironolactonă, carbamazepină, diazepam, haloperidol, clorpromazină, aminofilină, glucocorticoizi, estrogeni, fenilbutazonă, săruri de sodiu, antiacide; alăptare.
RA: Greață, diaree, slăbiciune, retenție hidrosalină; gușă, rareori hipotiroidism, diabet insipid nefrogen, tremor fin și oboseală musculară, leucocitoză, erupții psoriaziforme.

LITHII CITRAS *COD ATC: N05AN01*

LI-LIQUID *ROSEMONT PHARMACEUTICALS;* Sirop, citrat de litiu 1,018 g/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml ***(P-RF)***

Ind, Dz, Cind, A!, RA: Vezi carbonatul de litiu.

LODOXAMIDUM *COD ATC: S01GX05*

ALOMIDE *ALCON SRL;* Sol. oft. lodoxamidă 0,1%; ct. × 1 fl. × 5 ml ***(P-6L)***

Ind: Keratoconjunctivite sezoniere, conjunctivite giganto-papilare, keratite sezoniere.
Dz: 1-2 picături în fiecare ochi de 4 ori/zi, la intervale regulate.

Cind: Hipersensibilitate la produs.
A!: Prudență la copiii sub 4 ani; lentile de contact moi (hidrofilice); sarcină și alăptare.
RA: Senzație de arsură, înțepătură, prurit sau lăcrimare.

LOMEFLOXACINUM *COD ATC: J01MA07*

LOMADAY *DR. REDDY'S LAB. Ltd.;* Cpr. film., lomefloxacină 400 mg; ct. × 1 blist. × 5 cpr. film. ***(P-RF)***

MAXAQUIN *SEARLE.;* Cpr. film., lomefloxacină 400 mg; ct. × 1 blist. × 5 cpr. film. ***(P-RF)***

OKACIN *NOVARTIS PHARMA.;* Sol. oft. 0,3% lomefloxacină; ct. × 1 fl. × 5 ml; ct. × 1 fl. × 15 ml ***(P-RF)***

Ind: Infecții ale căilor respiratorii inf. și urinare, conform antibiogramei.
Dz: Oral 400 mg, o dată/zi.
Cind: Hipersensibilitate la lomefloxacină sau la derivați; sarcină și alăptare; la copii și adolescenți sub 18 ani.
A!: Se evită expunerile la soare sau UV; asocieri cu antiacidele care conțin aluminiu sau magneziu, cimetidină, AINS și probenecid.
RA: Greață, diaree, cefalee, amețeală, fotosensibilitate.

LOMUSTINUM *COD ATC: L01AD02*

NIPALKIN *SINDAN SRL;* Cps. lomustină 20 mg; ct. × 1 fl. × 20 cps.; ct. × 2 blist. × 10 cps. ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. tumorilor maligne cerebrale, primare și secundare; trat. limfoamelor maligne hodgkiniene și nonhodgkiniene, cancerelor bronhopulmonare, gastrice, colorectale, tumorilor maligne din sfera ORL, melanomului malign.
Dz: Oral 130 mg/m^2, în doză unică, la 6 săpt. La pacienții cu funcția medulară deprimată, 100 mg/m^2, la 6 săpt. O nouă cură de trat. se adm. numai după normalizarea funcției sanguine, în general după 6 săpt. Se adm. la interval de 6 săpt. datorită toxicității hematologice cumulative.
Cind: Hipersensibilitate la lomustină; sarcină și alăptare.
A!: Funcția sanguină se monitorizează săpt.; prudență la șoferi și activități de precizie.
RA: Mielotoxicitate: trombocitopenie, leucopenie, anemie; infiltrare și/sau fibroză pulmonară, grețuri și vărsături, hepatotoxicitate, tulburări renale, alopecie, stomatite, letargie, ataxie, disartrie.

LOPERAMIDUM *COD ATC: A07DA03*

DISSENTEN *S.p.A;* Cpr. loperamidă 2 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

ENTERAMID *MEDIPHARMA SERV SRL;* Cpr. loperamidă 2 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. ***(P-RF)***

IMODIUM *JANSSEN PHARMACEUTICA;* Cps. loperamidă 2 mg; ct. × 1 blist. × 6 cps.; ct. × 1 blist. × 20 cps. ***(P-RF)***

IMODIUM 2 mg *TERAPIA SA;* Cps. loperamidă 2 mg; ct. × 1 blist. × 6 cps. ***(P-RF)***

LOPERAMID *PHARMAPLANT BIOGALENICA;* Sol. orală 0,02%; ct. × 1 fl. × 100 ml ***(P-RF)***

LOPERAMID 2 mg *LABORMED SA;* Cps. loperamid 2 mg; ct. × 1 blist. × 10 cps. ***(P-RF)***; ct. × 100 blist. × 10 cps. ***(S)***

NEO-ENTEROSEPTOL® *SPECIFAR SA;* Cps. loperamidă 2 mg; ct. × 1 blist. × 6 cps. ***(P-RF)***

Ind: Diaree acută și cronică.
Dz: *Diaree acută: Adulți și copii peste 12 ani:* inițial 4 mg, apoi 2 mg după fiecare scaun diareic, maxim 16 mg/zi. *Copii 6-8 ani* - inițial 2 mg după primul scaun diareic și apoi 1 mg după fiecare scaun diareic, maxim 4 mg/zi. *Copii 9-11 ani* - inițial 2 mg după primul scaun diareic și apoi 1 mg după fiecare scaun diareic, maxim 6 mg/zi. *Diaree cronică. Adulți:* 2 mg de 1-3 ori/zi. *Copii peste 8 ani:* 1 mg de 1-2 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la loperamidă; acutizările rectocolitei ulcero-hemoragice.
A!: Este necesară rehidratarea; nu trebuie utilizată ca trat. de primă alegere în dizenteriile acute cu sânge în scaun și cu febră sau în colită pseudomembranoasă; prudență în IH; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Constipație, reacții de hipersensibilitate, dureri abdominale, balonări, vărsături, oboseală, somnolență, vertij, uscăciunea gurii.

LORATADINUM

COD ATC: R06AX13

CLARITINE *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Cpr. loratadină 10 mg; Sirop 1 mg/ml ***(P-6L)***

EROLIN *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Sirop loratadină 0,1%; ct × 1 fl. × 100 ml ***(P-6L)***

FLONIDAN 5 mg/5 ml suspensie orală *LEK PHARMACEUTICALS;* Susp. orală 5 mg/5 ml ***(P-6L)***

FLONIDAN 10 mg comprimate *LEK PHARMACEUTICALS;* Cpr. loratadină 10 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr.; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

FLONIDAN® *LEK PHARMACEUTICALS;* Susp. orală. loratadină 10 mg; ct. × 1 fl. × 120 ml + lg. × 2,5 ml sau 5 ml ***(P-6L)***

LORASTAMIN 10 mg *HELCOR SRL;* Cpr. loratadină 10 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr.; ct. × 100 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

LORATIN *PHARMAPLANT BIOGALENICA SRL;* Sol. orală. loratadină 5 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml + lg. dozatoare ***(P-6L)***

LORATADIN *LAROPHARM SRL;* Cpr. 10 mg ***(P-6L)***

LORATADINĂ LPH® 10 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. 10 mg; ct × 1 blist. × 10 cpr.; ct. × 50 blist. × 10 cpr. ***(S/P-6L)***

ROLETRA *RANBAXY LAB. Ltd.;* Cpr. loratadină 10 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr.; ct. × 3 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

SYMPHORAL 10 mg *ARMEDICA SA;* Cpr. loratadină 10 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

Ind: Rinite alergice sezoniere și perene; conjunctivite alergice; urticarie cronică idiopatică și alte dermatoze alergice.
Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* 10 mg, o dată/zi. *Copiii 2-12 ani cu greutate corporală peste 30 kg:* 10 mg, o dată/zi. *Copiii 2-12 ani cu greutate corporală sub 30 kg:* 5 mg, o dată/zi. *Copiii 1-2 ani:* 2,5 mg, o dată/zi. IH - la adulți 5 mg o dată/zi.
Cind: Hipersensibilitate la produs.
A!: Prudență în trat. de lungă durată; IH; adm. trebuie întreruptă cu cel puțin 2 zile înaintea testelor cutanate de hipersensibilitate; interacțiuni medicamentoase cu cimetidină, ketoconazol, fluconazol, eritromicină sau fluoxetină; sarcină și alăptare.
RA: Cefalee, amețeli, oboseală și somnolență, uscăciunea gurii, creșterea apetitului, greață, tuse, căderea părului, sincopă, anafilaxie, disfuncție hepatică și tahiaritmii supraventriculare.

LORAZEPAMUM

COD ATC: N05BA06

LORIVAN *ARMEDICA SA - DEXON Ltd.;* Cpr. lorazepam 1 mg; ct. × 2 blist. × 25 cpr. ***(P-RF)***

Ind: Anxietate, agitație, iritabilitate și insomnie asociate cu nevroze anxioase.
Dz: *Adulți:* 2-6 mg/zi divizat în câteva prize. *Vârstnici:* inițial 1-2 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la benzodiazepine; primul trimestru de sarcină, alăptare.
A!: Dependență cu sdr. de abstinență; prudență în IR; IH; insuficiență cardiorespiratorie; asocierea cu neurolepticele, antidepresivele, hipnoticele, analgezicele, anestezicele, alcoolul.
RA: Toropeală, oboseală, miorelaxare. Rar: hTA, tulburări gastro-intestinale, greață, modificări ale salivației, constipație, tulburări vizuale, urticarie, retenție urinară, cefalee, depresie, confuzie, tremor, modificări ale libidoului.

LORNOXICAM

COD ATC: M01AC05

XEFO *NYCOMED;* Cpr. lornoxicam 4 mg; 8 mg; ct. × 30 cpr. ***(P-6L)***

XEFO 8 mg *NYCOMED;* Liof. pt. sol. inj. lornoxicam 8 mg; ct. × 10 fl. liof. + 10 fl. solv. ***(P-6L)***

Ind: Trat. durerilor de intensitate medie și puternică, dureri articulare, reumatismale și artroze.
Dz: 16 mg, dacă este necesar se repetă adm. Doza de întreținere 16 mg zilnic.
Cind: Hipersensibilitate la lornoxicam, acid acetilsalicilic și alte AINS; hemoragii gastrointestinale, ulcere gastroduodenale; defecte de hemocitogeneză; sarcină, alăptare și la adolescenți sub vârsta de 18 ani.

A!: Monitorizarea TA și a HLG la vârstnici, obezi și HTA; prudență în afecțiuni gastrointestinale; infecții cronice respiratorii, astm sau febră; interacțiuni medicamentoase cu anticoagulante, antidiabetice, alte analgezice sau AINS, diuretice, antidepresive, litiu, metotrexat, cimetidină, digoxină, alcool; șoferi și activități de precizie.
RA: Dureri gastrice, diaree, amețeală, indigestie, greață și vărsături; constipație, disfagie, uscăciunea gurii, flatulență, gastrite, esofagita, hemoragii gastrointestinale, hemoroidale sau rectale, disfuncții hepatice, alopecie, reacții cutanate, icter, hipersudorație, disurie, edeme, crampe musculare, tremor, conjunctivite, inapetență, scădere în greutate, înroșirea pielii cu senzație de căldură, dispnee, urticarie, leucocitoză, prelungirea timpilor de coagulare, infecții ale căilor respiratorii superioare, oscilații tensionale, palpitații, creșterea frecvenței cardiace.

LOVASTATINUM *COD ATC: C10AA02*

HOLETAR® *KRKA d.d.;* Cpr. lovastatină 20 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. *(P-6L)*

LOVASTATIN 20 mg; 40 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. lovastatină 20 mg; 40 mg; ct. x 3 blist. x 10 cpr.; ct. x 100 blist. x 10 cpr. *(S/P-6L)*

MEDOSTATIN *MEDOCHEMIE Ltd.;* Cpr. lovastatină 20 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr.; ct. × 3 blist. × 10 cpr.; ct. × 10 blist. × 10 cpr. *(P-6L)*

MEVACOR® *MERCK SHARP & DOHME;* Cpr. lovastatină 20 mg; 40 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr. *(P-6L)*

Ind: Scăderea colesterolului total și ale LDL-colesterolului la pacienții cu hipercolesterolemie primară sau combinată cu hipertrigliceridemie, trat. încetinirii progresiei aterosclerozei coronariene.
Dz: *Hipercolesterolemie:* inițial 10-20 mg/zi, maxim de 80 mg zilnic. *Ateroscleroza coronariană:* 20-80 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la lovastatină; afectare hepatică activă sau creșteri persistente ale transaminazelor serice; sarcină și alăptare.
A!: Monitorizarea transaminazelor; creatin-fosfokinazei; prudență la imunodeprimați; trat. se întrerupe dacă se suspectează miopatie; copii; hipercolesterolemie familială homozigotă; asociere cu imunosupresoare, itraconazol, gemfibrozil, niacină, eritromicină, anticoagulante cumarinice.
RA: Flatulență, diaree, constipație, greață, anorexie, dispepsie, amețeală, vedere neclară, cefalee, mialgie, rash cutanat; oboseală, prurit, uscăciunea mucoasei bucale; miopatie și rabdomioliză; hepatită, icter colestatic, parestezii, neuropatie periferică, tulburări psihice, necroliză epidermică toxică și eritem multiform, inclusiv sd. Stevens-Johnson; șoc anafilactic, angioedem, polimialgii reumatice, vasculită, trombocitopenie, leucopenie, eozinofilie, anemie hemolitică, ANA pozitiv, creșteri ale VSH, artrită, artralgii, urticarie, fotosensibilitate, febră, dispnee; creșteri ale: transaminazelor serice, fosfatazei alcaline, bilirubinei și creatin-fosfokinazei.

LOZARTANUM *COD ATC: C09CA01*

COZAAR® *MERCK SHARP & DOHME;* Cpr. film. losartan 12,5 mg; ct. × 21 cpr. film.; ct. × 2 blist. × 14 cpr. film. ***(P-6L)***

COZAAR® *MERCK SHARP & DOHME IDEEA AG;* Cpr. film. losartan 50 mg; ct. × 1 blist. × 14 cpr. film.; ct. × 2 blist. × 14 cpr. film. ***(P-6L)***

Ind: HTA; IC.
Dz: Inițial 50 mg, o dată pe zi; efect maxim se obține la 3 săpt.; dacă după 6 săpt. posologia inițială nu se dovedește eficace se poate crește la 100 mg, o dată pe zi.
Cind: Hipersensibilitate la losartan; sarcină și alăptare; IH severă.
A!: Precauție în IH, stenoză bilaterală a arterei renale.
RA: Tuse uscată, exantem, mialgie, amețeală, edem angioneurotic.

LUTROPINUM ALFA *COD ATC: G03GA07*

LUVERIS 75 ui *ARES SERONO;* Pulb. pt. sol. inj. lutropină 75 UI; ct. × 1 fl. pulb. + 1 f. solv. × 2 ml; ct. × 3 fl. pulb. + 3 f. solv. × 2 ml; ct. × 10 fl. pulb. + 10 f. solv. × 2 ml. ***(P-RF)***

Ind: În asociere cu FSH pentru stimularea dezvoltării foliculare în caz de deficit sever de LH și FSH.
Dz: 75 UI lutropină + 75-150 UI FSH, adm. s.c.
Cind: Chist ovarial, carcinom ovarian, de sân, uter; hemoragii genitale; tumori active la nivel hipofizar sau hipotalamic. Sarcină și alăptare.
A!: Adm. numai sub supraveghere medicală.
RA: Cefalee, somnolență, greață, dureri abdominale, hiperstimulare ovariană, sarcini multiple, reacții la locul inj.

LYNESTRENOLUM *COD ATC: G03DC03*

EXLUTON *N. V. ORGANON;* Cpr. linestrenol 0,5 mg; ct. × 1 blist. × 28 cpr.; ct. × 3 blist. × 28 cpr. ***(P-6L)***

LINESTRENOL *TERAPIA SA;* Cpr. linestrenol 5 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. ***(P-6L)***

ORGAMETRIL *N. V. ORGANON;* Cpr. linestrenol 5 mg; ct. × 1 blist. × 30 cpr. ***(P-6L)***

Ind: Tulburările ciclului menstrual, dismenoree, endometrioză, amenoree, mastopatia chistică fibroasă și ca trat. adjuvant în cancerul de endometru și a metastazelor. Contraceptiv.
Dz: Meno- și metroragii, hemoragii juvenile: 10 mg/zi timp de 10 zile. În timpul celor 4 cicluri următoare, 5 mg/zi de la a 16-a până la a 26-a zi a ciclului inclusiv, prima zi a menstruației fiind prima zi a ciclului. Meno- și metroragii grave: 10 mg/zi timp de 10 zile, urmate de 5 mg/zi timp de 3 luni fără întrerupere. Polimenoree: 5 mg/zi timp de 20 zile, începând de la a 5-a zi a ciclului, repetându-se de 2-3 ori. Amenoree și dismenoree: 5 mg/zi timp de

10 zile începând de la prima zi a trat. cu estrogen. Oligomenoree: 5 mg/zi de la a 16-a zi la a 25-a zi a ciclului. Suprimarea ovulației: 5 mg/zi de la a 5-a zi a ciclului. Endometrioză, suprimarea menstruației, mastopatie chistică fibroasă: 5 mg/zi de la a 5-a zi a ciclului, prima zi a menstruației fiind prima zi a ciclului. Trat. adjuvant al cancerului de endometru și al metastazelor sale: 30-50 mg/zi, perioade prelungite. Contracepție: 10 mg/zi din ziua a 5-a până în ziua a 25-a a ciclului.
Cind: Sarcină sau suspiciune de sarcină; patologie hepatică severă, metastaze hepatice, sindrom Rotor sau sindrom Dubin-Johnson; sângerarea vaginală nediagnosticată; herpes gestațional, icter de sarcină, otoscleroză, prurit sever sau porfirie.
A!: Prudență în expunerea la lumina naturală sau artificială; examinarea medicală periodică; afecțiuni circulatorii; depresie severă; asocierea cu barbiturice, hidantoină, rifampicină, beta-blocante, cefalosporine, insulină.
RA: Sângerări intermenstruale, modificări ale libidoului, tulburări gastrointestinale și creșterea greutății corporale; cefalee, amețeli, nervozitate, depresie, transpirații, acnee, hirsutism, cloasmă, rash cutanat, prurit, icter, modificări în profilul lipoproteic, alterarea testelor hepatice, amenoree, ciclu menstrual neregulat, toleranța la glucoză redusă, mastodinie, edeme.

M

MACROGOLUM

COD ATC: A06AD15

FORLAX *BEAUFOUR IPSEN;* Pulb. susp. (ct. × 20 plicuri) ***(OTC)***

SICOLAX *SICOMED SA;* Gran. pt. sol. orală 60 g ***(OTC)***

Ind: Tratamentul simptomatic al constipației la adult.
Dz: *Adulți:* 1-2 plicuri pe zi, de preferință într-o singură priză, dimineața. Fiecare plic trebuie solubilizat într-un pahar cu apă. Efectul se manifestă în 24-48 ore de la administrare.
Cind: Colopatii organice, inflamatorii (rectocolita ulceroasă, maladia Crohn), sindrom ocluziv sau subocluziv, sindrom dureros abdominal de cauză nedeterminată. Intoleranță la macrogol 4000. Este de preferat să nu se adm. în timpul sarcinii.
RA: La doze mari poate apărea o diaree care încetează la cca 24-48 ore după încetarea adm. Trat. poate continua cu o doză inferioară. Dureri abdominale, în particular la pacienții suferind de manifestări funcționale intestinale. Cazuri rare de manifestări alergice: erupție, urticarie, edem. Extrem de rar s-a raportat șoc anafilactic.

MAGNESII CITRAS

COD ATC: A12CC04

MAGNESIUM DIASPORAL ORANGE 100 *PROTINA PHARMAZEUTISCHE GESSELSCHAFT GmbH;* Cpr. de supt 315 mg sare anhidră (16,12% Mg^{+2}) și 460 mg citrat de magneziu × 14 H_2O (echivalent a 610 mg sare anhidră = 98,6 mg = 4 mmol = 8 mEq Mg^{+2}); ct. × 2 blist. x 10 cpr. de supt ***(OTC)***

MAGNESIUM DIASPORAL 300 *PROTINA PHARMAZEUTISCHE GESSELSCHAFT GmbH;* Gran. pt. sol. orală citrat de magneziu anhidru 1830 mg, corespunzător la 295,7 mg magneziu (12 mmol = 24 mEq); ct. × 10; 20 sau 100 plicuri cu granule pt. sol. orală × 5 g ***(OTC)***

Ind: Deficit de magneziu.

Dz: Doza recomandată pentru *adulți și copii peste 6 ani* este de 295,8 mg magneziu, administrat de 3 ori pe zi.

Cind: Hipersensibilitate la componenții produsului. Insuficiență renală severă. Copii sub 6 ani.

A!: În cazul deficitului sever și al sindromului de malabsorbție, se recomandă începerea tratamentului cu preparate de magneziu administrate intravenos. În cazul asocierii deficitului de calciu, se recomandă corectarea deficitului de magneziu înaintea administrării calciului. Atenționare pentru *diabetici:* un comprimat de supt Magnesium Diasporal Orange 100 conține 0,1 g zaharoză, corespunzător la 0,01 UP. *Sarcină și alăptare:* Se va administra în timpul sarcinii doar dacă este absolut necesar. Deoarece magneziul se excretă în laptele matern, nu se recomandă administrarea produsului în timpul alăptării.

RA: Rar, la doze mari, pot să apară scaune moi sau diaree; tratamentul va fi întrerupt temporar, iar după dispariția acestor manifestări se poate continua cu doze mai mici.

MAGNESII OROTAS

COD ATC: A12CC09

MAGNEROT *WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.;* Cpr. 500 mg (corespunzător la 2,7 mEq, 1,35 mmol sau 32,8 mg Mg) ***(OTC)***

Ind: Profilaxia IMA și anginei pectorale, dacă acestea sunt determinate de un deficit de Mg. Ateroscleroză, stenocardie, arterită și arteriolită, tulburări ale metabolismului lipidic, crampe musculare.

Dz: Oral 1 g de 3 ori/zi timp de o săpt., apoi 1-1,5 g/zi. *Copii peste 6 ani:* 0,5 g de 3 ori/zi.

Cind: IR; diateză litiazică de tip Ca-Mg-amoniu-fosfat.

A!: Interacțiuni medicamentoase cu fier, tetracicline și fluorură de sodiu.

RA: Scaune moi sau diaree.

MAGNESII OXIDUM

COD ATC: A02AA02

MILK OF MAGNESIA (LAPTE Mg) *PHARMEX ROM IND.;* Cpr. 385 mg ***(OTC)***

Ind: Ulcer duodenal și ulcer gastric, gastrită hiperacidă, esofagită de reflux, constipație.

Dz: *Ca antiacid:* 600-1200 mg de 3-4 ori/zi, maxim 4800 mg/zi. *Ca laxativ: Copii 7-14 ani:* 600-1200 mg, seara la culcare. *Adulți:* 1200-2400 mg, seara, la culcare.

Cind: Abdomen acut, gastrită hipoacidă.

A!: Prudență în IR gravă; interacțiuni medicamentoase cu tetracicline; copii sub 14 ani; sarcină și alăptare.

RA: Hipercalciurie și nefrolitiază secundară.

MAGNESII SULFAS

COD ATC: B05XA05

SULFAT DE MAGNEZIU *SICOMED SA;* Sol. inj. 20% (f. × 10 ml) ***(S)***

Ind: Tulburări de irigație cerebrală, edem cerebral, encefalită, migrene, stări depresive. Cefalee histaminică, rinita fânului, edem Quincke, astm bronșic. Febră și frisoane după transfuzii. Intoxicații cu stricnină, tetanos, coree, nevralgii, tuse convulsivă. Colici hepatice, intestinale, renale. Tulburări de climacteriu.
Dz: *Adulți:* 2-6 g zilnic, în inj. i.v., în cazuri grave (eclampsie, tetanos) 0,2 ml/kg la 3-4 ore. *Copii:* 0,2-0,3 ml/kg și zi, i.m.
Cind: Boala Addison, intoxicații cu barbiturice, IR.

MALATHIONUM

COD ATC: P03AX03

PEDILIN *KRKA d.d.;* Șampon 0,5% (fl. × 100 ml) ***(OTC)***

Ind: Tratamentul pediculozei.
Dz: Se aplică pe părul ud de 2 ori, timp de câte 3 minute, 10 ml de șampon și se fricționează părul timp de 5 minute, după care se clătește cu apă. Cât timp părul este încă ud, se folosește un pieptene bun și se piaptănă părul pentru a înlătura păduchii și ouăle rămase. Este necesară repetarea procedurii după o săptămână. Se spală pieptenii și periile de păr cu șampon. Se schimbă prosoapele, așternutul și îmbrăcămintea. Preventiv, părul poate fi spălat din când în când cu șampon conținând malation. Pentru a preveni reapariția pediculozei, este optim ca toți membrii familiei să folosească șampon cu malation atunci când un membru al familiei este afectat.
A!: Se va evita contactul cu ochii, nasul și gura. Se va proteja fața cu un prosop. Atenție sporită când acest produs este folosit pentru copiii mici.

MANGAFODIPIRUM

COD ATC: V08CA05

TESLASCAN *NYCOMED;* Sol. perf. 6,91 mg/ml (fl. × 50 ml) ***(S/P-RF)***

Ind: Substanță de contrast pentru analiza RMN.

MANNITOLUM

COD ATC: B05BC01

MANITOL *SICOMED SA;* Sol. perf. 20% (pungi × 250 ml sau 500 ml) ***(S)***

MANITOL *HEMOFARM VRASC;* Sol. perf. 20% (fl. × 250 ml) ***(S)***

MANITOL 10% *INFOSINT;* Sol. perf. 10% (sac PVC × 250 ml sau 500 ml) ***(S)***

MANNITOL VIOSER *VIOSER SA;* Sol. perf. 20% (fl. × 500 ml) ***(S)***

Ind: Edem cerebral cu hipertensiune intracraniană, hipertensiune intracelulară.
Dz: 500 ml/zi sol. manitol 10% cu ritm de 60-70 picături/minut. *La copii:* 10 ml/kg și zi sol. manitol 10% cu ritm de 10-15 picături/10 kg și minut.

Cind: Hiperosmolaritate plasmatică preexistentă, deshidratare predominant intracelulară.
A!: Controlul diurezei și al electroliților serici; prudență în IC.

MAPROTILINUM *COD ATC: N06AA21*

LUDIOMIL *NOVARTIS;* Cpr. film. 10 mg, 25 mg, 75 mg ***(P-RF)***

LUDIOMIL *SICOMED SA - CIBA;* Cpr. film. 25 mg ***(P-RF)***

MAPROLU - 50 *HEXAL AG;* Cpr. film. 50 mg ***(P-RF)***

MAPROTILIN *PROMEDIC SRL;* Dj. 25 mg ***(P-RF)***

SIPROTILIN® *SICOMED SA;* Cpr. film. 25 mg ***(P-RF)***

Ind: Depresii endogene, tardive, psihologice, de epuizare, somatogene, alte distimii cu predominanță anxioasă, disforică sau iritabilitate, apatie, tulburări psihosomatice și somatice pe fond depresiv și/sau anxios. Depresii și distimii la copii și adolescenți.
Dz: 25 mg, oral, de 1-3 ori/zi, până la maxim 150 mg/zi; perf. i.v. de 25-100 mg/zi, până la maxim 150 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la maprotilină; epilepsie; prag convulsivant mic; IMA recent; BAV; glaucom cu unghi închis sau retenție urinară.
A!: Prudență în IR, IH, dificultăți de eliminare a urinei, antecedente de hipertensiune intraoculară, afecțiuni cardiace, vârstnici, tendință suicidară, hipertiroidism, hTA posturală, schizofrenie; interacțiuni medicamentoase cu guanetidina, betanidina, reserpina, metil-dopa, IMAO, simpatomimetice, alcool, deprimante nervos centrale, anticolinergice, levodopa, barbiturice, fenitoină, carbamazepină, fenitoină, benzodiazepine, propranolol, imipramină; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Cefalee, amețeli, convulsii, tulburări extrapiramidale, disartrie, slăbiciune, parestezie, oboseală pasageră, sedare diurnă, somnolență, tulburări ale somnului, agitație, anxietate, coșmaruri, stări de confuzie, delir, halucinații, hipomanie, manie, senzație de uscăciune a gurii, vedere tulbure, retenție urinară, stomatită, creșterea riscului apariției cariilor, erupții, urticarie, febră, vasculită cutanată, mâncărime, purpură, fotosensibilitate, edem, greață, vomă, constipație, hTA posturală, tahicardie, aritmie, BAV, palpitații, HTA, sincopă, alveolită alergică, mărirea sânilor, galactoree, creșterea transaminazelor serice, hepatită icterică sau anicterică, leucopenie, agranulocitoză, eozinofilie, tinitus, modificări ale gustului, transpirație, creștere în greutate, tulburări sexuale, înroșirea feței, alopecie.

MEBENDAZOLUM *COD ATC: P02CA01*

THELMOX *REMEDICA;* Cpr. 100 mg ***(P-RF)***

THELMOX 100 *REMEDICA;* Cpr. mast. 100 mg

VERMACARE *PHARMACARE;* Cpr. 100 mg ***(P-RF)***

VERMOX *JANSSEN;* Cpr. 100 mg ***(P-RF)***

Ind: Trat. infestărilor simple sau mixte cu Enterobius vermicularis (oxiuroza), Trichuris trichiura (tricocefaloza), Ascaris lumbricoides (ascaridioza), Ancylostoma duodenale, Necator americanus (ankilostomiaza), Strongyloides stercoralis (strongiloidioza), Taenia spp. (teniază).
Dz: Enterobiază: 100 mg în doză unică. Ascaridioză, tricocefaloză, ankilostomiază și infecții mixte: 100 mg de 2 ori/zi dimineața și seara timp de 3 zile consecutiv. Teniază și strongiloidioză: *Adulți:* 200 mg de 2 ori/zi timp de 3 zile consecutiv. *Copii:* 100 mg de 2 ori/zi timp de 3 zile consecutiv.
Cind: Hipersensibilitate la mebendazol.
A!: Copii sub 1 an; interacțiuni medicamentoase cu cimetidina; sarcină și alăptare.
RA: Dureri abdominale tranzitorii și diaree, reacții de hipersensibilitate: exantem, rash, urticarie și angioedem.

MEBEVERINUM *COD ATC: A03AA04*

COLOSPASMIN *E.I.P.I.C.O.;* Cpr. 100 mg ***(P-6L)***

DUSPATALIN 200 mg *SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.;* Cps. ret. 200 mg ***(P-6L)***

Ind: Sindrom de colon iritabil; iritarea colonului asociată leziunilor organice ale tractului gastrointestinal.
Dz: 100 mg de 4 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la clorhidrat de mebeverină.
A!: Sarcină și alăptare.

MECLOSULFONATUM *COD ATC: N06BXN2*

ROMENER *SINTOFARM SA;* Dj. 100 mg ***(P-6L)***

Ind: Creșterea randamentului intelectual, surmenaj intelectual, tulburări psihosomatice senile pe fond aterosclerotic, sechele după encefalopatii la copil și encefalopatii infantile cu sindroame hiperkinetice, micul rău epileptic, crize temporale psihomotorii, sindroame spasmofilice hipocalcemice și/sau hipomagnezice.
Dz: *Adulți:* 100-200 mg de 2-3 ori/zi; maxim 300 mg de 2-3 ori/zi. *Copii:* 100-200 mg de 2-3 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la meclosulfonat.

MECLOZINUM *COD ATC: R06AE05*

EMETOSTOP *SPECIFAR S.A. PHARMACEUTICALS;* Cpr. 30 mg clorhidrat de meclozină, ct. D7 10 cpr. ***(P-RF)***

Ind: Prevenirea și tratamentul răului de mișcare, sindrom Ménière sau alte tulburări labirintice.

Dz: Pentru rău de mișcare: 1-2 comprimate cu o oră înainte de plecare. La nevoie se repetă la 24 de ore. Pentru tulburări labirintice: 1-4 comprimate/zi în prize egale.
Cind: Hipersensibilitate la piperazine, copii sub 12 ani.
A!: Precauții la pacienți cu glaucom, astm, hipertrofie a prostatei, hipotensiune, stenoza pilorului sau duodenului, obstrucție a căilor uretrale; pentru pacienții care folosesc inhibitori ai MAO. La gravide administrarea se face numai dacă este absolut necesar. Interacțiuni cu alcoolul, anticolinergice, inhibitori MAO.
RA: Cele mai comune sunt: amețeală, vedere confuză, uscarea gurii și a faringelui, slăbiciune. Alte efecte nedorite: urticarie, coșuri pe față, nervozitate, stare euforică, insomine, vomă, excitare, halucinații, lipsa poftei de mâncare, greață, diaree, constipație, diplopie, amețeli, pulsații, hipotensiune, creșterea bătăilor inimii, disurie, reținerea urinei; în cazul în care s-a administrat doza în exces, stare de euforie sau depresie, convulsii, halucinații sau scăderea funcției respiratorii.

MEDAZEPAMUM

COD ATC: N05BA03

ANSILAN *LEK PHARMACEUTICALS;* Cps. 10 mg ***(P-RF)***

EUROZEPAM *EUROPHARM SA;* Cps. 10 mg ***(S/P-RF)***

EXODERIL 1% *LEK PHARMACEUTICALS;* Sol. cutanată 1% ***(P-RF)***

MEDAZEPAM 10 mg *LAROPHARM SRL;* Cpr. 10 mg ***(P-RF)***

MEDAZEPAM 10 mg *LAURMED SRL;* Cpr. 10 mg ***(P-RF)***

MEDAZEPAM 10 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. 10 mg ***(P-RF)***

RUDOTEL *AWD PHARMA GmbH & Co. KG;* Cpr. 10 mg ***(P-RF)***

RUSEDAL *BYK GULDEN;* Cpr. 10 mg ***(P-RF)***

Ind: Stări de anxietate de etiologie psihică și psihosomatică, acute și cronice; Stări de tensiune psihică și agitație.
Dz: 10-30 mg/zi, adm. oral în 2-3 prize sau ca doză unică seara, maxim 60 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la medazepam, alte benzodiazepine; dependențe medicamentoase sau non-medicamentoase (alcool etilic) în antecedente; miastenia gravis; insuficiență respiratorie decompensată.
A!: Copii și tineri; durata trat. nu trebuie să depășească 4 săpt.; prudență în: intoxicații acute cu alcool etilic, hipnotice, analgezice, neuroleptice, antidepresive și litiu; ataxie spinală și cerebeloasă, glaucom acut cu unghi închis, afecțiuni hepatice, apnee în timpul somnului, vârstnici, tarați, modificări organice la nivel cerebral, insuficiență circulatorie, insuficiență respiratorie, IH; risc de dependență psihică și fizică; monitorizarea tabloului sanguin și a funcției hepatice; interacțiuni medicamentoase cu psihotrope, hipnotice, analgezice, antihistaminice, alcool etilic, miorelaxantelor, cimetidină, disulfiram, omeprazol, teofilină, levodopa, fenitoină, fenobarbital, beta-blocante, anticoagulante, antidiabetice orale, glicozide cardiace și anticoncepționale; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Sedare marcată în timpul zilei, oboseală, somnolență, apatie, hipersomnie, timp de reacție prelungit, vertij, cefalee, ataxie, confuzie, amnezie anterogradă, tulburări de concentrare, oboseală reziduală, hipotonie musculară, greață, vomă, dureri epigastrice, constipație, diaree, icter, anurie, spasm glotic, dureri toracice, hTA, bradicardie, depresie, scăderea libidoului, tulburări menstruale, creșterea apetitului, uscăciunea gurii, RA alergice cutanate, deprimare respiratorie; tulburări de vorbire, de vedere (diplopie, nistagmus) și de echilibru, halucinații, stări acute de agitație, anxietate, tendință la suicid, insomnie, agresivitate și spasme musculare; dependență cu toleranță și sindrom de abstinență.

MEDROXYPROGESTERONUM

COD ATC: G03AC06
L02AB02

DEPO PROVERA® *PHARMACIA – Membru al grupului PFIZER;* Susp. inj. medroxiprogesteron acetat 150 mg/ml (fl. × 1 ml) ***(S/P-RF)***

FARLUTAL 500 mg *PHARMACIA – Membru al grupului PFIZER;* Cpr. 500 mg medroxiprogesteron acetat ***(S/P-RF)***

MEDROXIPROGESTERON ACETAT *TERAPIA SA;* Cpr. 10 mg ***(P-6L)***

MEGESTRON *N. V. ORGANON;* Susp. inj. 150 mg/ml (fl. × 1 ml) ***(S/P-RF)***

Ind: *Int.:* Menoragii uterine funcționale (anovulatorii), amenoree secundară și endometrioză (forme ușoare și moderate). Cancer mamar, cancer de endometru, cancer de prostată, cancer renal. Adenom de prostată. *Inj.:* Anticoncepțional.
Dz: *Int.:* Metroragii funcționale: 2,5-10 mg/zi între a 16-a și a 21-a zi a ciclului menstrual, repetat în 2-3 cicluri consecutive. Amenoree secundară: 2,5-10 mg/zi între a 16-a și a 21-a zi a ciclului menstrual, repetat 3 cicluri consecutive. Endometrioză: 10 mg de 3 ori/zi, timp de 90 zile consecutive. Neoplazii: 100-1000 mg/zi. *Inj.:* 150 mg im, repetat la 3 luni.
Cind: Tromboflebite, tromboembolii, afectarea severă a funcției hepatice, iminența de avort, hipercalcemia indusă de metastazele osoase, metroragii de etiologie necunoscută, hipersensibilitate la medroxiprogesteron acetat.
A!: Perioada de fertilitate revine între 4 și 24 luni de la ultima inj.; trat. trebuie întrerupt dacă apar anomalii ale funcțiilor hepatice sau icter; tulburări tromboembolice, pierderi bruște parțiale sau complete ale vederii, diplopie, edem papilar, leziuni vasculare ale retinei, migrenă; precauții la femeile tinere, IC, IR, epilepsie, migrenă, diabet; evitarea expunerii la soare; sarcină și alăptare.
RA: Perturbări ale ciclului menstrual: amenoree, hemoragii neregulate; creștere în greutate, ușoară cefalee, senzație neplăcută în abdomen, tensiune sau sâni dureroși, nervozitate, cloasmă, amețeli, grețuri și galactoree.

MEGESTROLUM

COD ATC: L02AB01

MEGACE *BRISTOL - MYERS SQUIBB;* Cpr. 160 mg (ct. × 100 cpr.); Susp. orală 40 mg/ml (fl. × 240 ml) ***(S/P-RF)***

MEGESIN *SINDAN SRL;* Cpr. 160 mg megestrol acetat (fl. × 30 sau 100 cpr.) ***(S/P-RF)***

MEGESIN 40 mg *SINDAN SRL;* Cpr. 40 mg (fl. × 30 sau 100 cpr.) ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. paliativ al carcinomului avansat de sân sau endometru.
Dz: Cancer de sân: 160 mg/zi. Cancer de endometru: 40-320 mg/zi.
Cind: Ca test de diagnostic pentru sarcină; hipersensibilitate la megestrol acetat.
A!: Supraveghere atentă; copii, precauție la pacienții cu antecedente de boli tromboembolice, diabet preexistent; sarcină și alăptare.
RA: Creștere în greutate, tromboflebite și embolie pulmonară, inhibiția suprarenalei, hTA, greață, vărsături, amețeli sau slăbiciune; IC, edeme, metroragii, reluarea creșterii tumorale (cu sau fără hipercalcemie), dispnee, hiperglicemie, intoleranță la glucoză, alopecie, HTA, sindrom de tunel carpian, bufeuri, transpirații și rash.

MELATONINUM

BIO-MELATONINĂ *PHARMA NORD;* Cpr. 3 mg melatonină ***(P-6L)***

Ind: Melatonina este o substanță cheie care reglează ritmul sezonier și diurn. Melatonina guvernează ritmurile circadiene cum ar fi zi-noapte și termoreglarea. Melatonina este cel mai eficient antioxidant nocturn. Indicată celor care călătoresc cu avionul, care lucrează în ture, sau în insomnia moderată.
Dz: O tabletă pe zi seara înainte de culcare.
Cind: Copii, sarcină și alăptare.
A!: Melatonina poate avea un potențial proconvulsivant la copiii cu invalidități neurologice.

MELOXICAMUM

COD ATC: M01AC06

MELOXICAM 7,5 mg; MELOXICAM 15 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. 7,5 mg; 15 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr.; ct. × 200 blist. × 10 cpr. ***(S/P-6L)***

MOVALIS *BOEHRINGER INGELHEIM;* Cpr. 7,5 mg sau 15 mg ***(P-6L)***

MOVALIS *BOEHRINGER INGELHEIM;* Sup. 7,5 mg, 15 mg ***(P-6L)***

MOVALIS *BOEHRINGER INGELHEIM;* Sol. inj. 15 mg/1,5 ml (f. × 1,5 ml) ***(P-RF)***

Ind: Trat. simptomatic al artritei reumatoide, osteoartritelor dureroase; alte stări inflamatorii.
Dz: 7,5-15 mg/zi. IR severă și dializă: maxim 7,5 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la meloxicam, acid acetilsalicilic sau alte AINS; astm, polipi nazali, angioedem sau urticarie după adm. de acid acetilsalicilic sau alt AINS; ulcer peptic activ, IH severă, IR severă nedializată, copii și adolescenți sub 15 ani; sarcină și alăptare.
A!: Precauții în antecedente de boală ale tractului gastrointestinal superior, leziuni ale rectului sau anusului; interacțiuni medicamentoase cu anticoagulante.

RA: Dispepsie, greață, vomă, dureri abdominale, constipație, flatulență, diaree, esofagită, ulcer gastrointestinal, sângerări gastrointestinale oculte sau macroscopice, anemie, tulburări ale valorilor sanguine, inclusiv ale leucocitelor, leucopenie, trombocitopenie, prurit, rash cutanat, stomatită, urticarie, fotosensibilitate, crize de astm la indivizi tratați în prealabil cu acid acetilsalicilic sau alte AINS, delir, cefalee, vertij, tinitus, toropeală, edem, HTA, palpații, flush.

MELPHALANUM *COD ATC: L01AA03*

ALKERAN *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. 2 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. mielomului multiplu, seminom și metastazele lui, reticulosarcom, angioendoteliom malign, tumori osoase și al adenocarcinomului ovarian avansat sau al ascitei dupa neoplasmele de ovar, carcinom de sân avansat; policitemia vera.
Dz: *Int.:* Mielom multiplu: 0,15 mg/kg și zi în doze divizate, pentru 4 zile, repetat la intervale de 6 săpt. Adenocarcinom ovarian: 0,2 mg/kg și zi timp de 5 zile, repetat la intervale de 4-8 săpt. Carcinom de sân avansat: 0,15 mg/kg sau de 6 mg/m^2 și zi timp de 5 zile, repetat la intervale de 6 săpt. Policitemia vera: inducția remisiunii 6-10 mg/zi timp de 5-7 zile, apoi 2-4 mg/zi, întreținere 2-6 mg pe săpt.
Cind: Hipersensibilitate la melphalan; stadiile terminale ale bolii; leucopenie; afecțiuni grave ale aparatului cardiovascular, hepatice sau renale.
A!: Copii; monitorizarea hemoleucogramei; precauție după radioterapie sau chimioterapie, afectare renală; risc leucemogen; interacțiuni medicamentoase cu acid nalidixic, ciclosporină; sarcină și alăptare.
RA: Depresia măduvei osoase, asociată cu leucopenie și trombocitopenie; greață și vărsături; stomatită, urticarie, edem, rash cutanat, reacții anafilactice, 2 cazuri de stop cardiac, fibroză pulmonară, anemie hemolitică, alopecie, amenoree.

MEMANTINUM *COD ATC: N06DX*

EXIBA 10 mg/g *H. LUNDBECK A/S;* Sol. orală în picături 10 mg/g

EXIBA 10 mg *H. LUNDBECK A/S;* Cpr. film. 10 mg

Ind: Produs indicat în tratamentul pacienților cu boala Alzheimer moderat severă până la severă.

MENOTROPINUM *COD ATC: G03GAN0*

HUMEGON *N.V. ORGANON;* Pulb. pt. sol. inj. menotropină 75 U.I./fl. ***(P-RF)***

MENOGON *FERING;* Pulb. liof. pt. sol. inj. 75 u.i. FSH/75 u.i. LH ***(P-RF)***

Ind: *Femei:* inducerea ovulației. *Bărbați:* stimularea spermatogenezei la bărbați cu hipogonadism hipogonadotrop primar sau secundar.

Dz: Inj. i.m. *Femei:* Schema 1: 3 doze echivalente de hCG în zile alternative. La o femeie cu menstruație, se adm. inițial în zilele 7, 8 și 9 ale ciclului. Schema 2: inj. zilnice cu hCG, până la obținerea unui răspuns adecvat. *Bărbați:* 75-150 ui de 3 ori/săpt., minimum 4 luni.
Cind: *Femei:* disgenezie ovariană, uter absent, menopauză precoce, ocluzie tubară. *Bărbați:* tumori testiculare și pituitare.
A!: Se monitorizează concentrația de estrogen plasmatic sau urinar; trebuie excluse anomaliile anatomice ale organelor genitale sau endocrinopatiile nongonadale; prudență în hipotiroidism, deficit androcortical, hiperprolactinemie sau tumori pituitare.
RA: La femei, reacție locală la locul inj., febră și artralgii. La bărbați, ginecomastie.

MEPARTRICINUM *COD ATC: G04CX03*

IPERTROFAN *S.P.A.;* Cpr. film. 50.000 u.i. ***(P-6L)***

IPERTROFAN 40 *S.P.A.;* Cpr. ent. 150.000 u.i. (40 mg) ***(P-6L)***

IPERTROFAN 40 *CSC PHARMACEUTICALS;* Cpr. ***(P-6L)***

Ind: Trat. tulburărilor funcționale care însoțesc hipertrofia benignă de prostată.
Dz: 40 mg/zi seara, în cicluri de 30 zile.
Cind: Hipersensibilitate la mepartricin.
RA: Foarte rar gastralgie, greață, vomă sau diaree.

MEPIVACAINUM *COD ATC: N01BB03*

MEPIVASTESIN 3% *ESPE DENTAL MEDIZIN GmbH;* Sol. inj. 30 mg/ml (f. cartuș × 1,7 ml) ***(S)***

OPTOCAIN 3% *MOLTENI DENTAL;* Sol. inj. 3% (cartușe × 1,8 ml) ***(S)***

SCANDONEST 3% PLAINE *SPECIALITES SEPTODONT;* Sol. inj. 3% (cartușe – seringă × 1,8 ml) ***(S)***

Ind: Anestezie locală în variate tratamente și intervenții chirurgicale stomatologice.
Dz: Doza uzuală: 1-2 ml soluție 3%, putând crește în funcție de intervenție (de exemplu în infiltrații sau pentru blocarea nervilor periferici). Soluția trebuie injectată lent, cu o viteză de aproximativ 1 ml/minut, după aspirație. Doza maximă zilnică este de 7 mg clorhidrat de mepivacaină/kg (fără a depăși 400 mg). La *copii,* doza se stabilește în funcție de greutate corporală și vârstă; doza recomandată este de 5 mg clorhidrat de mepivacaină/kg.
Cind: Hipersensibilitate la mepivacaină sau la oricare dintre excipienții produsului. Copii sub o lună. Porfirie hepatică. Epilepsie necontrolată prin tratament.
A!: Se recomandă evitarea administrării produsului la pacienții tratați cu anticoagulante. Administrarea unor doze mai mari decât cele recomandate sau injectarea intravenoasă accidentală rapidă pot provoca reacții toxice. Nu se recomandă administrarea prin infiltrație a anestezicelor locale în zonele infec-

tate sau inflamate. Prudență la pacienții cu insuficiență hepatică, hipoxie, hiperpotasiemie sau acidoză, precum și cu antecedente de hipertermie malignă. *Atenționare pentru sportivi:* produsul conține un principiu activ care poate determina o reacție pozitivă la testele antidoping.
Sarcină și alăptare: se recomandă evitarea administrării în timpul sarcinii; se excretă în laptele matern în cantități foarte mici, se recomandă prudență la administrarea produsului în perioada de alăptare. Poate afecta negativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
RA: Reacțiile adverse care pot să apară după administrarea mepivacainei sunt similare cu cele raportate la alte anestezice locale de tip amidic. Aceste reacții sunt, în general, dependente de doză: nervozitate, agitație, tremor, nistagmus, cefalee, logoree, greață, tahipnee, urmată de apnee, efect inotrop negativ și hipotensiune arterială. Dozele mari pot produce vasodilatație, colaps, tulburări de conducere, bradicardie, bloc atrio-ventricular, aritmii ventriculare. Reacțiile alergice, foarte rare, sunt reprezentate de erupții cutanate, prurit, edeme sau reacții de tip anafilactic.

MEPROBAMATUM *COD ATC: N05BC01*

MEPROBAMAT *SICOMED SA;* Cpr. meprobamat 400 mg ***(P-RF)***

Ind: Stări de anxietate și tensiune psihică, sindrom psihovegetativ; spasm muscular; hipnogen în hiposomnii.
Dz: *Adulți:* oral, 400-1200 mg/zi. *Copii: 3-7 ani:* 100-200 mg de 1-3 ori/zi; *7-15 ani:* 200-400 mg de 1-3 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la meprobamat, stări precomatoase și comatoase, intoxicații acute cu substanțe deprimante centrale, epilepsie, miastenie, porfirie, dependență la meprobamat sau la alte deprimante centrale (în antecedente); copii sub 3 ani.
A!: Prudență în IH, IR, bătrâni și debilitați; interacțiuni medicamentoase cu barbiturice, alte hipnotice, anticoagulante cumarinice, contraceptive orale, rifampicină și griseofulvină; sarcină și alăptare, șoferi și activități de precizie.
RA: Somnolență, deprimare a performanțelor (în special la doze mari), anorexie, greață, vomă, diaree, cefalee, hTA, reacții alergice (rar); convulsii; toleranță și dependență.

MEQUITAZINUM *COD ATC: R06AD07*

PRIMALAN *LAB. PIERRE FABRE;* Sirop 0,05% ***(P-RF)***

PRIMALAN 5 mg; PRIMALAN 10 mg *LAB. PIERRE FABRE;* Cpr. 5 mg sau 10 mg ***(P-RF)***

Ind: Trat. simptomatic al manifestărilor alergice: rinită (ex.: boala fânului, rinită nesezonieră), conjunctivită, urticarie.
Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* 5 mg dimineața și seara sau 10 mg seara. *Copii 6-10 ani:* 2,5 mg dimineața și seara sau 5 mg seara, *Copii 10-12 ani:* 2,5 mg dimineața și 5 mg seara sau 7,5 mg seara. *Copii sub 6 ani:* 1,25 mg/5 kg și zi.

Cind: Agranulocitoză cronică sau recentă, glaucom, tulburări de micțiune, alergie antihistaminice, asociere cu IMAO.
A!: Prudență în febră, afecțiune hepatică, vârstnici, epilepsie, expunere îndelungată la soare; interacțiuni medicamentoase cu deprimante ale SNC; șoferi și activități de precizie.
RA: Reacții alergice cutanate (eritem, eczeme, purpură, urticarie), edeme Quincke, fotosensibilizare, somnolență, scăderea vigilenței, confuzie, halucinație, uscăciunea gurii, tulburări de vedere, retenție de urină, constipație, palpitații, agitație, nervozitate, insomnie.

MERCAPTOPURINUM *COD ATC: L01BB02*

PURI-NETHOL *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. mercaptopurină 50 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. leucemiei acute: inducerea remisiunilor și în terapia de întreținere din leucemia limfoblastică acută și din leucemia mielocitară acută; trat. leucemiei granulocitare cronice.
Dz: 2,5 mg/kg și zi. Când se adm. simultan allopurinol și 6-mercaptopurină, este esențial ca doza de 6-mercaptopurină să se reducă la un sfert.
Cind: Având în vedere importanța trat., nu există Cind absolute.
A!: Monitorizarea hemoleucogramei și funcțiilor hepatice, la primul semn de scădere importantă a numărului leucocitelor și al trombocitelor trat. trebuie întrerupt imediat; monitorizarea nivelului acidului uric în sânge și urină; riscului carcinogenetic teoretic; interacțiuni medicamentoase cu allopurinol, warfarină; sarcină și alăptare.
RA: Supresia medulară cu leucopenie și trombocitopenie, necroză hepatică și stază biliară; anorexie, greață, vărsături; pancreatită; ulcerații la nivelul mucoasei bucale și rar ulcerații la nivelul mucoasei intestinale; febră medicamentoasă și rash.

MEROPENEMUM *COD ATC: J01DH02*

MERONEM *ASTRAZENECA;* Cpr. 500 mg și 1 g ***(S/P-RF)***

MERONEM (i.m.) *ASTRAZENECA;* Pulb. pt. sol. inj. 500 mg ***(S/P-RF)***

MERONEM (i.v.) *ASTRAZENECA;* Pulb. pt. sol. inj. 500 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Infecții produse de specii bacteriene sensibile la meropenem: pneumonii, infecții ale tractului urinar; infecții intraabdominale; infecții ginecologice; infecții cutanate și ale țesuturilor moi; meningite; septicemii.
Dz: *Adulți:* 500 mg i.v. la fiecare 8 ore în trat. pneumoniei, infecțiilor tractului urinar, infecțiilor ginecologice, infecțiilor cutanate și ale țesuturilor moi; 1 g i.v. la 8 ore în trat. pneumoniilor nosocomiale, peritonitei, infecțiilor suspectate la pacienții neutropenici și septicemiei. În meningită, 2 g la 8 ore. Pentru ajustarea dozelor în IR. *Copii:* 3 luni - 12 ani, 10-20 mg/kg la 8 ore i.v., în meningită 40 mg/kg la 8 ore.
Cind: Hipersensibilitate la meropenem.
A!: Hipersensibilitate încrucișată între alți carbapenemi și betalactamine, peniciline și cefalosporine; prudență în afecțiuni hepatice, colită, copii sub 3 luni,

copii cu funcție renală sau hepatică alterată; interacțiuni medicamentoase cu probenecid; sarcină și alăptare.
RA: Reacții la locul de injectare: inflamație, tromboflebită, durere; rash, prurit, urticarie; dureri abdominale, grețuri, vărsături, diaree; colita pseudo-membranoasă; trombocitemie reversibilă, eozinofilie, trombocitopenie și neutropenie; test Coombs, direct sau indirect, pozitiv; reducerea timpului parțial de tromboplastină; creșteri reversibile separate sau combinate ale concentrației serice de bilirubină, transaminaze, fosfatază alcalină și dehidrogenază lactică; cefalee, parestezii; convulsii; candidoză orală și vaginală.

MESALAZINUM

COD ATC: A07EC02

PENTASA *FERING;* Sup. 1 g; Cpr. ret. 500 mg ***(P-6L)***

SALOFALK-250, SALOFALK-500 *DR. FALK GmbH;* Dj. ent. 250 mg, 500 mg; Sup. 250 mg, 500 mg ***(P-6L)***

SALOFALK *EWOPHARMA;* Cpr. 250 mg și 500 mg; Sup. 250 mg și 500 mg; Clismă 4 g/60 ml ***(P-6L)***

SALOFALK 4 g ENEMAS *DR. FALK GmbH;* Susp. rectală 6,6% (fl. × 60 g susp.) ***(P-6L)***

SALOZINAL *PRO. MED. CS PRAHA;* Dj. 250 mg ***(P-6L)***

Ind: Colită ulceroasă și proctită în tratamentul episoadelor acute și pentru prevenirea recidivelor. Boala Crohn în tratamentul episoadelor acute. Inflamația canalului anal.
Dz: *Oral:* în inflamație acută se adm. cu suficient lichid câte 2 cp. de 250 mg sau câte 1 cp. de 500 mg, dimineața, la prânz și seara, cu o oră înaintea meselor. În formele severe ale bolii doza poate fi dublată. *Terapie de întreținere*: se administrează 250 mg dimineața, la prânz și seara. *Rectal:* câte 2 sup. de 250 mg dimineața, la prânz și seara, sau câte 1 sup. de 500 mg dimineața și la prânz. În momentul remisiei simptomelor acute doza trebuie redusă la 1 supozitor de 250 mg de trei ori pe zi pentru a preveni recidivele.
Cind: Acidul 5-aminosalicilic nu se va administra în caz de: hipersensibilitate la acidul salicilic și derivații săi. Tulburări hepatice și renale severe, ulcer gastroduodenal, diateză hemoragică (predispoziție a sângerare). De asemenea, nu va fi administrat sugarilor și copiilor mici datorită insuficientei experiențe la această grupă de vârstă.
A!: Trebuie efectuată o hemoleucogramă completă și examenul de urină. Ca o conduită generală, se recomandă teste cu 14 zile înainte de începerea tratamentului și apoi de 2-3 ori la intervale de 4 săptămâni. Dacă rezultatele sunt normale sunt necesare la fiecare 3 luni sau la apariția unor semne de boală următoarele teste: ureea serică (BUN) și nivelul creatininei ca și sedimentul urinar. Pacienții trebuie să fie monitorizați pentru creșterea valorilor methemoglobinei. La pacienții cu tulburări ale funcției pulmonare, în special astm bronșic, este necesară supravegherea dozei. La pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la sulfasalazină tratamentul cu mesalazină poate fi început numai sub strictă supraveghere medicală. Dacă apar semne acute de intoleranță: crampe, durere abdominală acută, febră, cefalee severă și urticarie, tratamentul trebuie întrerupt imediat.

Nu se va administra în primele trei luni de sarcină decât la indicația strictă a medicului. Dacă tratamentul este necesar, se va întrerupe alăptarea.
RA: Efecte adverse gastrointestinale: rar disconfort abdominal, diaree, flatulență, greață, vomă. Efecte adverse SNC: în cazuri izolate amețeli și dureri de cap. Reacții de hipersensibilitate: rar reacții de hipersensibilitate care nu sunt dependente de doză și sunt comune acidului salicilic și derivaților săi (rash alergic, febră medicamentoasă, bronhospasm, peri- și miocardită, pancreatită acută și nefrită interstițială). Sporadic cazuri de alveolită alergică și pancolită. Rar artralgii și mialgii, modificări ale hemoleucogramei (neutropenie și trombocitopenie, methemoglobinemie). Foarte rar creșterea transaminazelor.

MESNUM

COD ATC: V03AF01

UROMITEXAN 200 mg *ASTA MEDICA;* Sol. inj. 100 mg/ml (f. × 2 ml) ***(S)***

UROMITEXAN 400 mg *ASTA MEDICA;* Sol. inj. 100 mg/ml (f. × 4 ml) ***(S);*** Cpr. film. 400 mg ***(S/P-RF)***

UROMITEXAN 600 mg *ASTA MEDICA;* Cpr. film. 600 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Sistemic: Protecția împotriva leziunilor căilor urinare în terapia cu ifosfamidă, ciclofosfamidă și trofosfamidă. Inh./instilații: bronșite cronice obstructive, astmatiforme, emfizematoase, bronșiectazii, mucoviscidoză; pt. îngrijirea intensivă, în cadrul anesteziei și reanimării; sinuzita maxilară.
Dz: *Sistemic:* inj. i.v. 20% la debutul curei de citostatice, apoi 2, respectiv 6 ore, se adm. int. câte 40% din doză. *Inh./instilații:* aerosoli, 600-1200 mg de 1-4 ori/zi; instilații pe sondă endotraheală 60-120 mg.
Cind: *Sistemic:* hipersensibilitate la mesna. *Inh./instilații:* Astm fără stază a secrețiilor.
A!: Prudență în starea de rău astmatic, bolnavi slăbiți, copii, vârstnici; sarcină și alăptare.
RA: *Sistemic:* reacții anafilactice și hiperemice, rash cutanat, prurit, eritem cutanat și al mucoaselor, edem urticarian, exantem până la formarea de vezicule, enantem, creșteri tranzitorii ale transaminazelor hepatice, febră, torpoare, grețuri, vărsături, hTA, tahicardie. *Inh./instilații:* stază a secrețiilor fluidificate, poate favoriza bronhoconstricția la astmatici, senzație de arsură retrosternală, tuse iritativă, greață; poate colora dinții în galben.

METADOXINUM

COD ATC: N07BBN1

METADOXIL *LAB. BALDACCI;* Cpr. 500 mg; Sol. inj. 60 mg/ml (f. × 5 ml); Sol. orală 500 mg/15 ml (fl. × 15 ml) ***(S/P-RF)***

Ind: Degenerescența grasă a ficatului în alcoolism. Sindromul de abstinență în alcoolism.
Cind: Sarcină, alăptare.
A!: Boala Parkinson, tratament cu levodopa (favorizează decarboxilarea acesteia).

METAMIZOLUM NATRICUM

COD ATC: N02BB02

ALGOCALMIN *SICOMED SA;* Sol. inj. 500 mg/ml (f. × 2 ml) ***(P-RF)***

ALGOCALMIN 500 mg *SICOMED SA;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

ALGOCALMIN 1000 mg/2 ml *SICOMED SA;* Sol. inj. 1000 mg/2 ml ***(P-RF)***

ALGOCALMIN SAN 500 g *SANTA SA;* Cpr. 500 mg

ALGOZONE *OZONE LABORATORIES Ltd.;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

ANALGIN; ANALGIN 500 mg *EUROPHARM SA;* Cpr. 500 mg ***(S/OTC)***

METAMIZOL *HELCOR SRL;* Sup. 300 mg ***(OTC)***

METAMIZOL EFL *BIO EFL SRL;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

NEVRALGIN *PHARMAPLANT BIOGALENICA SRL;* Sol. orală 45% (fl. × 10 ml) ***(OTC)***

NOVALGIN *LAB. AVENTIS PHARMA;* Cpr. film. 500 mg ***(OTC)***; Sol. inj. 500 mg/ml (f. × 2 ml) ***(P-RF)***; Sirop 50 mg/ml (fl. × 100 ml) ***(OTC)***

NOVALMIN *FARMACOM SA;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

NOVOCALMIN *ANTIBIOTICE IAȘI;* Sup. 300 mg ***(OTC)***; Cpr. 500 mg ***(S/OTC)***

REMALGIN 500 mg *LAB. REMEDIA SRL;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

SINTOCALMIN *SINTOFARM SA;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

Ind: Trat. simptomatic al durerii de etiologii diverse (mai ales origine spastică), al febrei ce nu răspunde la alte antipiretice.
Dz: *Adulți:* oral 0,5-1 g de 1-2 ori/zi sau inj. i.m. 2-5 ml de 1-2 ori/zi sau i.rect. 1-3 g/zi. *Copii:* oral 0,125-0,75 mg/zi, după vârstă sau i.rect. 0,3-0,9 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la pirazolone și la AINS, antecedente de agranulocitoză, porfirie hepatică, deficiență congenitală în glucozo 6-fosfat-dehidrogenază.
A!: Prudență în astm bronșic, infecții frecvente ale căilor respiratorii superioare, rinite și rinosinuzite frecvente, teren atopic; interacțiuni medicamentoase cu ciclosporina, alcool; sarcină și alăptare.
RA: Leucopenie, trombocitopenie, granulocitopenie, agranulocitoză, tulburări ale funcției renale, manifestată prin oligurie, anurie, proteinurie și nefrită interstițială.

METANDIENONUM

COD ATC: A14AA03

NAPOSIM *TERAPIA SA;* Cpr. 5 mg (ct. × 2 sau 100 bilst. × 10 cpr.) ***(P-6L)***

Ind: Stimularea anabolismului protidic, creșterea masei și tonusului muscular, îmbunătățirea troficității sistemului osos. *Medicina generală:* sindroame de deficit protidic, astenii, stări cașectice de denutriție, stări de involuție caracteristice vârstei, convalescență, infecții acute și cronice, osteoporoză, sindroame hipercorticosuprarenale sau hipogonadice, tireotoxicoză, tratament prelungit cu cortizon, nefroză, insuficiență renală etc. *Pediatrie:* distrofii, convalescență, imaturitate și prematuritate, întârziere în creștere, osteogeneză imperfectă. *Chirurgie:* perioada de consolidare a fracturilor, tratament pre- și postoperator la bolnavi cu stare generală precară, arsuri și escare.

Dz: *Adulți:* doza de atac: în medie, 10-20 mg/zi; doza de întreținere: 5-10 mg/zi. *Copii: 0-2 ani:* 0,04 mg/kg corp/zi; *2-6 ani:* 0,5 mg/kg corp/zi; *6-14 ani:* 1 mg/kg corp/zi. În perioada de creștere, metandienona se administrează discontinuu, o dată la 2-3 zile, sau zilnic timp de 4 săptămâni și apoi 4-6 săptămâni pauză.

Cind: Cancer de prostată.

A!: Se utilizează la femei și copii numai cu indicație medicală strictă și cu multă prudență; atenție la bolnavii cu insuficiență cardiacă, hipotensiune arterială, insuficiență renală, epilepsie. Folosirea la sportivi este interzisă (reacție pozitivă la testele de control antidopaj). Nu se asociază cu deprimante ale sistemului nervos central. Nu se recomandă în sarcină.

RA: În cazul tratamentelor prelungite, metandienona poate determina la bărbați apariția unor efecte androgene reduse; la femei tulburări ale ciclului menstrual. Rarele cazuri de icter hepatotoxic semnalate impun efectuarea testelor de disproteinemie în cursul tratamentului cu metandienonă. Doze de peste 50 mg pot determina stări de neliniște, uneori euforie, valuri de căldură. Toate aceste simptome dispar la diminuarea dozei.

METFORMINUM *COD ATC: A10BA02*

DIAFORMIN *PROMEDIC SRL*; Cpr. 850 mg ***(P-6L)***

GLUCOPHAGE 500 mg; 850 mg; 1000 mg *MERK SANTE;* Cpr. film. 500 mg, 850 mg, 1000 mg ***(P-6L)***

MEGUAN 500 mg *ARMEDICA SA;* Cpr. 500 mg clorhidrat de metformină ***(S/P-6L)***

MEGUAN *SICOMED SA;* Cpr. 500 mg clorhidrat de metformină ***(P-6L)***

METFOGAMMA 500 *WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.;* Cpr. film. 500 mg clorhidrat de metformină ***(P-6L)***

METFOGAMMA 850 *WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.;* Cpr. film. clorhidrat de metformină 850 mg ***(P-6L)***

METFORMIN AL 500 *ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG;* Cpr. film. 500 mg ***(P-6L)***

METFORMIN AL 850 *ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG;* Cpr. film. 850 mg ***(P-6L)***

METFORMIN BMS *BRISTOL-MYERS SQUIBB (GEA);* Cpr. film. 500 mg sau 850 mg (ct. × 100 cpr. film.) ***(P-6L)***

METFORMIN BMS *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Cpr. film. 500 mg sau 850 mg (ct. × 300 sau 500 cpr. film.) ***(S)***

METFORMIN LPH® 500 mg; METFORMIN LPH® 850 mg; *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. film. 500 mg sau 850 mg (ct. × 3 blistere × 10 cpr.; ct. × 100 blistere × 10 cpr.;) ***(S)***

SIOFOR 500 *BERLIN-CHEMIE A.G. MENARINI GROUP;* Cpr. film. 500 mg (ct. × 3, 6 sau 12 blist. × 10 cpr. film.) ***(P-6L)***

SIOFOR 850 *BERLIN-CHEMIE A.G. MENARINI GROUP;* Cpr. film. 850 mg (ct. × 2, 4 sau 8 blist. × 15 cpr. film.) ***(P-6L)***

Ind: Diabet zaharat non insulino-dependent (de tip 2), în special la pacienții obezi, când nu se poate exercita un control metabolic eficient numai prin dietă și exercițiu fizic.
Dz: Inițial 0,5-1,0 g clorhidrat de metformină/zi; se crește treptat până la cel mult 3 g/zi.
Cind: Afectarea funcției renale; afectarea funcției hepatice; acidoza metabolică decompensată, precomă sau comă diabetică cetozică sau hiperosmolară; insuficiență funcțională cardiovasculară severă; boala arterială ocluzivă periferică; insuficiență respiratorie; stări hipoxice; retinopatie diabetică depășind stadiul 1; stări catabolice cum sunt cele datorate unor neoplazii; infecții acute sau cronice severe; alcoolism; hipersensibilitate la clorhidratul de metformină.
A!: Trat. se întrerupe: înaintea anesteziei generale, examinărilor radiologice cu substanțe de contrast, în diete de privare, în cazul programării unei sarcini sau în timpul sarcinii și al alăptării; prudență la vârstnici, IR, tulburări ale funcției hepatice; interacțiuni medicamentoase cu insulină, alte antidiabetice orale, antiinflamatorii nesteroidiene, IMAO, oxitetraciclină, IEC, fibrați, ciclofosfamidă, beta-blocante, simpatomimetice, cimetidina, glucocorticoizi; combinații estroprogestative, anticoncepționale orale, glucagon, hormoni tiroidieni, tiazide și diuretice de ansă, diazoxid, fenotiazine, acid nicotinic, colestiramina, fenprocumonă, alcool etilic; sarcină și alăptare.
RA: Grețuri, vărsături, dureri abdominale, flatulență, scădere în greutate, diaree, gust metalic, cefalee, vertij, fatigabilitate, reacții de hipersensibilitate cutanată, tulburări ale hematogenezei, acidoza lactică, hipoglicemie.

METHADONUM *COD ATC: N07BC02*

SINTALGON *SICOMED SA;* Cpr. clorhidrat de metadonă 2,5 mg ***(P-TS)***

Ind: Dureri traumatice; dureri reumatice; dureri neoplazice; colică saturnină, hepatică, renală. IMA, EPA; tuse convulsivă.
Dz: *Adulți:* 2,5-10 mg/zi, maxim 40 mg/zi. *Copii peste 4 ani:* 0,625-2,5 mg/zi, după vârstă.
Cind: Abdomen acut; stază bronșică; afecțiuni cardiace decompensate; IR, traumatisme cranio-cerebrale, stări septice; copii sub 4 ani.
A!: Prudență în analgezii obstetricale și ca anestezic de bază în narcoză; dependență; interacțiuni medicamentoase cu morfina; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Euforie, deprimarea respirației.

METHENAMINUM *COD ATC: J01XX05*

METENAMIN *SICOMED SA;* Cpr. metenamină 500 mg ***(P-RF)***

Ind: Infecții urinare acute (asociat cu antibiotice); profilaxia recidivelor în infecțiile urinare cronice în timpul unor manevre urologice sau intervenții chirurgicale și în tulburările vezicale neurogene; bacteriurie asimptomatică.

Dz: *Adulți:* oral – 1 g de 3-4 ori/zi. *Copii:* 3 luni - 3 ani – 0,125 g/zi; 3-5 ani: 0,125-0,25 g/zi; 6-12 ani: 0,25-0,50 g/zi.
Cind: Nefrite, cistite acute dureroase; boli renale cu insuficiență de concentrare a urinei; IH gravă; deshidratare severă, infecții cu Proteus.
A!: Interacțiuni medicamentoase cu sulfamide, antibiotice active în urina alcalină sau alcalinizante.
RA: Grețuri, vărsături, diaree; disurie, polakiurie, hematurie, proteinurie.

METHOTREXATUM

COD ATC: L01BA01

ABITREXATE *ABIC;* Sol. inj. 25 mg/ml (fl. × 20 ml); Sol. inj. 25 mg/ml (f. × 2 ml) ***(S)***

ANTIFOLAN 2,5 mg *SINDAN SRL;* Cpr. 2,5 mg ***(S/P-RF)***

ANTIFOLAN 50 mg *SINDAN SRL;* Liof. pt. sol. inj. 50 mg ***(S)***

METHOTREXAT "LEDERLE" 25; 50; 500; 1000, 5000 *WYETH LEDERLE PHARMA;* Sol. inj. 25 mg/ml (fl. × 1; 2; 20; 40 sau 200 ml) ***(S)***

METHOTREXAT "LEDERLE" *WYETH LEDERLE PHARMA;* Cpr. 2,5 mg sau 10 mg ***(S/P-RF)***

METHOTREXAT EBEWE *EBEWE PHARMA Ges.m.b.H.Nfg KG;* Conc. pt. sol. perf. 100 mg/ml (f. × 5 ml sau 10 ml; fl. × 50 ml) ***(S)***

METHOTREXAT EBEWE 5 mg; 10 mg; 50 mg *EBEWE PHARMA Ges.m.b.H.Nfg KG;* Conc. pt. sol. perf. 5 mg/ml (f. × 1 ml); 10 mg/ml (f. × 1 ml) sau 50 mg/ml (f. × 5 ml) ***(S)***

Ind: Trat. în coriocarcinom gestațional, corioadenom și molă hidatiformă; profilaxia meningitei leucemice; trat. în cancere de sân, cancerelor epidermoide ale capului și gâtului, micosis fungoid în stadiu avansat și cancer de plămân, îndeosebi tipul scuamos și cu celule mici. Trat. limfoamelor non-hodgkiniene în stadiu avansat. Prelungirea perioadelor de remisiune la pacienții cu osteosarcom nemetastazat. Psoriazis sever. Poliartrita reumatoidă: forme severe active.
Dz: Coriocarcinom și boli trofoblastice similare: oral, zilnic 5-30 mg pentru un ciclu de 5 zile, aceste cicluri se repetă, când este necesar, de 3-5 ori. După normalizarea hCG se adm. încă 1-2 cicluri de trat. Leucemie: inducția remisiunii 3,3 mg/m^2; întreținere 30 mg/m^2 săpt., în 2 prize. Meningita leucemică: la copii intratecal 12 mg/m^2 (maximum 15 mg). Limfoame: oral 10-25 mg/zi timp de 4-8 zile; stadiul III 0,625-2,5 mg/kg zilnic. Micosis fungoid: 2,5-10 mg zilnic, timp de săpt. sau luni. Osteosarcom: atac 12 g/m^2. Psoriazis și poliartrita reumatoidă: 5-15 mg pe săpt.
Cind: Sarcină și alăptare; alcoolici; hepatită alcoolică; sindroame de imunodeficiență; discrazii sanguine preexistente; hipersensibilitate la metotrexat.
A!: Prudență în osteosarcom, femei de vârstă fertilă, afectarea funcției renale, ulcer peptic, colită ulceroasă, leziuni hepatice preexistente, infecții active, radioterapie, vârstnici, copii; monitorizarea hemogramei, funcției renale și hepatice; interacțiuni medicamentoase cu AINS, fenitoină, sulfonamide, cisplatin, tetraciclină, cloramfenicol, acid folic, trimetoprim-sulfametoxazol, substanțe hepatotoxice.

RA: Stomatită, vărsături, diaree, deshidratare, anemie, leucopenie și/sau trombocitopenie, hepatotoxicitate, hipogamaglobulinemie, leucoencefalopatie, fenomene de arahnoiditā chimică, tuse seacă, pneumonie nespecifică, IR acută, gingivită, faringită, cefalee, amețeală, vedere încețoșată, afazie, hemipareză, pareză, convulsii, disfuncții cognitive, anorexie, greață, vărsături, diaree, hematemeză, ulcerații și sângerare gastrointestinală, enterită, rash eritematos, prurit, urticarie, fotosensibilitate, modificări pigmentare, alopecie, echimoze, telangiectazii, acnee, furunculoză, azotemie, cistită, hematurie, afectarea spermatogenezei și ovo-genezei, oligospermie tranzitorie, tulburări menstruale, leucoree, sterilitate, avort.

METHYLDOPUM

COD ATC: C02AB01

DOPEGYT *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd;* Cpr. metildopa 250 mg ***(P-6L)***

Ind: HTA.
Dz: Oral, inițial 250 mg de 2 ori/zi, întreținere 500 mg - 2 g/zi.
Cind: Boli hepatice active (hepatită acută, ciroză activă), stări depresive grave, feocromocitom, hipersensibilitate la metildopa, anemie hemolitică.
A!: Prudență la hepatici, anginoși, IR, bătrâni; se controlează probele hepatice și hemograma; interacțiuni medicamentoase cu alcool, litiu, alte antihipertensive, anestezice generale; sarcină și alăptare.
RA: Sedare, somnolență, oboseală, cefalee, pozitivarea testului Coombs, amețeli și alte simptome de hTA ortostatică, edeme și creștere în greutate, bradicardie, congestie nazală, greață, vomă, constipație sau diaree, flatulență, pancreatită, inflamația glandelor salivare, mărirea sânilor, galactoree, amenoree, diminuarea libidoului, impotență, erupții cutanate, artralgii, mialgii, parestezii, febră, eozinofilie, pozitivarea unor probe funcționale hepatice, icter; necroză hepatică gravă, anemie hemolitică, fenomene parkinsoniene, tulburări psihice.

METHYLERGOMETRINUM

COD ATC: G02AB01

METILERGOMETRINĂ MALEAT *SICOMED SA;* Dj. maleat de metilergometrină 0,125 mg ***(S)***

Ind: Menoragii, metroragii în afara sarcinii.
Dz: 0,125-0,25 mg, de 3 ori/zi.
Cind: Sarcină, travaliu (până la degajarea umărului), alăptare, toxemie, IH gravă.
A!: Prudență în HTA, bolile vasculare obliterante, infecții, boli hepatice și renale, deficit de pompă cardiacă; nu se asociază cu vasoconstrictoare.
RA: Greață, vomă, dureri pelviene, HTA trecătoare.

METHYLII NICOTINAS

COD ATC: M02AX10

UNGUENT CU NICOTINAT DE METIL *ARMEDICA SA;* Ung. 3% (tub × 50 g) ***(OTC)***

Ind: Dureri articulare reumatice cronice, mialgii, nevralgii, dureri traumatice articulare și musculare, furuncule și panariții în stadiu inițial; afecțiuni vasculospastice periferice; bronșite cronice; tendință la alopecie.
Dz: Aplicații cutanate de 2-3 ori/zi, cu masaj ușor.
Cind: Boli inflamatorii ale pielii, artrită obliterantă, microangiopatie diabetică gravă.
A!: Se va evita contactul cu ochii și mucoasele.
RA: Dozele excesive sau aplicarea pe regiuni sensibile pot fi cauză de iritație locală marcată.

METHYLPREDNISOLONUM *COD ATC: H02AB04*

DEPO-MEDROL *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Susp. inj. metilprednisolon acetat 40 mg/ml, 80 mg/2 ml (fl. × 1 ml) ***(S/P-RF)***

LEMOD SOLU 20 mg; 40 mg; 125 mg; 500 mg *HEMOFARM VRASC;* Liof. pt. sol. inj. 20 mg; 40 mg; 125 mg; 500 mg metilprednisolon succinat sodic ***(S/P-RF)***

MEDROL 4; 16; 32 *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Cpr. metilprednisolon 4 mg; 16 mg; 32 mg ***(S/P-RF)***

SOLU-MEDROL™ *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Liof. + Solv. pt. pulb. pt. sol. inj. 500 mg, 1000 mg, 2000 mg metilprednisolon succinat sodic ***(S/P-RF)***

SOLU-MEDROL™ ACT-O-VIAL™ *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Pulb. liof. pt. sol. inj. 40 mg/1 ml; 125 mg/2 ml; 250 mg/4 ml metilprednisolon succinat sodic (fl. bicompartimentat ACT-O-VIAL™ (compartiment inferior) pulb. 40 mg; 125 mg sau 250 mg + (compartiment superior) 1 ml; 2 ml sau 4 ml solvent pt. reconstituire ***(S/P-RF)***

Ind: Osteoartrita posttraumatică, sinovita din osteoartrită, poliartrita reumatoidă inclusiv poliartrita reumatoidă juvenilă, bursita acută și subacută, epicondilita, tenosinovita acută nespecifică, artrita gutoasă acută, artrita psoriazică, spondilita anchilopoietică. Anumite cazuri de lupus eritematos sistemic (și nefrită lupică), cardită reumatismală acută, dermatomiozită sistemică/polimiozită, poliarterită nodoasă, sindrom Goodpasture. Pemfigus, eritem multiform sever, dermatită exfoliativă, dermatită buloasă herpetiformă, dermatită seboreică severă, psoriazis sever, mycozis fungoides. Astmul bronșic, dermatita de contact, dermatita atopică, boala serului, rinita alergică sezonieră sau perenă, reacțiile de hipersensibilitate la medicamente, reacțiile urticariene posttransfuzionale, edemul laringian acut neinfecțios. Herpes zoster oftalmic, irită, iridociclită, corioretinită, uveită posterioară difuză și coroidită, nevrită optică, oftalmie simpatică, inflamația camerei anterioare, conjunctivită alergică, ulcere corneene marginale alergice, keratită. Colita ulceroasă, enterita regională. Sarcoidoză pulmonară simptomatică (activă), berilioză, tuberculoză pulmonară fulminantă sau miliară, sindrom Loeffler, pneumonie de aspirație. Transplant de organ, anemia hemolitică imună, purpura trombocitopenică idiopatică la adulți, trombocitopenia secundară la adulți, eritroblastopenia, anemia hipoplastică congenitală; trat. paleativ în leucemii și limfoame la adulți, leucemii acute la copii.

Provocarea diurezei sau înlăturarea proteinuriei din sindromul nefrotic fără uremie, de tip idiopatic sau din lupusul eritematos. Edem cerebral determinat de tumori primare sau metastatice și/sau asociat cu terapia chirurgicală, radioterapia sau determinat de traumatism cranian; episoade acute de scleroză multiplă; traumatism acut al măduvei; șocul din insuficiența corticosuprarenală; șocul hemoragic, traumatic și chirurgical, care nu răspunde la terapia standard. Meningita tbc cu blocaj subarahnoidian; profilaxia stărilor de greață și vomă provocate de chimioterapia antineoplazică. Insuficiență CSR cronică și acută; preoperator sau în cazul unor traumatisme sau boli severe la pacienți cu insuficiență CSR; hiperplazie congenitală a suprarenalei; tiroidită nesupurativă; hipercalcemie paraneoplazică. Terapie adjuvantă în: sinovita din osteoartrită; artrita reumatoidă; bursita acută și subacută; artrita gutoasă acută; epicondilita; tenosinovita acută nespecifică; osteoartrita posttraumatică. Cicatrice cheloide; leziuni localizate hipertrofice, infiltrate inflamatorii, lichen plan, placarde psoriazice, granulom anular și lichen simplex cronic (neurodermatită); lupus eritematos discoid; alopecia areată, tumori chistice sau în tendoane sau aponevroze. Colita ulcerativă. Trat. eczemei endogene, eczema de contact, degenerativă, dishidrotică, eczema vulgară, eczema la copii.

Dz: *Int.:* inițial 4-48 mg; scleroza multiplă 200 mg/zi; edem cerebral 200-1000 mg/zi; transplant de organe 7 mg/kg și zi (eventual terapia alternantă). *Inj.:* doza inițială variază de la 10 mg la 500 mg. Cazuri grave 30 mg/kg repetat la fiecare 4-6 ore, timp de 48 de ore. Cancer în stadiul terminal. 125 mg i.v. zilnic 8 săpt. Profilaxia stărilor de greață și vomă 250 mg i.v. Traumatism medular acut: inițial 30 mg/kg i.v. in bolus, apoi 5,4 mg/kg și oră. *Inj. local:* în funcție de mărimea articulației și de severitatea afecțiunii.

Cind: Infecții fungice sistemice, hipersensibilitate la metilprednisolon.

A!: Creșterea dozei în stres; poate masca semnele infecției; prudență în hipercreatininemie, infecții secundare, antecedente alergice la medicamente, vaccinare, herpes simplex ocular, copii mici, diabet zaharat, HTA, antecedente psihiatrice, tbc, colita ulceroasă; durata trat. trebuie să fie cât mai scurtă; întreruperea trat. se face lent; interacțiuni medicamentoase cu troleandomicina, eritromicina, ketoconazolul, rifampicina, neostigmina, piridostigmina, anticoagulantele orale și heparina, fenobarbitalul, fenitoina, insulina, glibenclamida, metformina, toate antihipertensivele, digoxina, diureticele care elimină potasiul, vaccinurile, metotrexatul, ciclosporina, pancuroniul, anxioliticele, antipsihoticele, salbutamolul; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Efecte mineralocorticoide, hipercalciurie, IC, pierdere de potasiu, alcaloză hipokaliemică, HTA, stare de oboseală musculară, miopatie cortizonică, osteoporoză, fracturi, necroză aseptică, ulcer cortizonic, hemoragie gastrică, pancreatită, esofagită, perforație intestinală, întârzierea cicatrizării plăgii, subțierea și fragilitatea pielii, peteșii și echimoze, hipertensiune intracraniană, pseudotumor cerebri, convulsii, vertij, euforie, insomnie, instabilitate afectivă, modificări de personalitate și depresie până la manifestări psihotice, ciclu menstrual neregulat, sindrom Cushing iatrogen, întârzierea sau oprirea creșterii la copii, supresia sistemului hipotalamo-hipofizo-corticosuprarenalian cu fenomene de corticodependență, scăderea toleranței la glucoză, diabet steroidic de novo, activarea diabetului zaharat latent, creșterea presiunii intraoculare, exoftalmie, cataractă, balanță azotată negativă, deprimarea imunității, infecții asimptomatice, activarea infecțiilor latente, infecții oportuniste, anafilaxie, aritmii, atrofie dermică și subdermică, orbire, hiperpigmentare sau hipopigmentare, prurit, arsură, eritem sau vezicule.

METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT *COD ATC: D07AC14*

ADVANTAN *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Cremă 0,1%; unguent 0,1% (tub × 15 g) ***(P-RF)***

ADVANTAN® MILK *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Emulsie cutanată 1% ***(P-RF)***

Ind: Eczemă endogenă (dermatită atopică, neurodermatită), eczemă de contact, degenerativă, dishidrotică, eczemă vulgară, eczemă la copii.
Dz: Se aplică o dată pe zi pe suprafața afectată; maxim 12 săptămâni la *adulți* și 4 săptămâni la *copii.*
Cind: Procese cutanate specifice tuberculoase sau sifilitice, boli virale; la gravide și la femeile care alăptează indicațiile clinice vor ține seama de raportul beneficiu-risc.
A!: Produsul nu trebuie să vină în contact cu ochii. Se va evita utilizarea pe suprafețe întinse și timp îndelungat.
RA: *Local:* prurit, arsură, eritem, vezicule; mai rar foliculită, hipertricoză, dermatită periorală, reacții alergice.

METIPRANOLOLUM *COD ATC: S01ED04*

TRIMEPRANOL *SPOFA;* Cpr. metipranolol 10 mg sau 40 mg ***(P-RF)***

Ind: Angină pectorală, stări postinfarct (profilaxia ischemiei), aritmii supraventriculare și ventriculare, HTA; sindrom hiperkinetic primar și secundar; miocardopatie hipertrofică, anxietate, tahicardie neuro-psihogenă, astenie neuro-circulatorie, tremor cauzat de terapia cu litiu.
Dz: 40-120 mg/zi. Pt. ind. neuro-psihice 10-30 mg/zi.
Cind: IC, bradicardie, BAV de grad înalt, hTA, BPOC, hipoglicemie, acidoză metabolică, arterioscleroză sistemică avansată, IMA recent, astm bronșic, alăptare.
A!: Prudență în sarcină.
RA: Greață, vărsături, diaree, bradicardie, hTA, fenomene Raynaud, depresii, halucinații, bronhospasm, retenție de fluide, creșteri în greutate, uscăciunea gurii, spasme musculare; risc de: EPA, IC. discrazii sanguine, sindrom oculocutanat.

METOCLOPRAMIDUM *COD ATC: A03FA01*

CERUCAL *AWD PHARMA GmbH & Co. KG;* Cpr. 10 mg ***(P-6L)***; Sol. inj. clorhidrat de metoclopramidă 5 mg/ml (f. × 2 ml) ***(P-RF)***

METOCLOPRAMID *SLAVIA PHARM SRL;* Cpr. clorhidrat de metoclopramidă 10 mg ***(P-6L)***

METOCLOPRAMID *TERAPIA SA;* Cpr. clorhidrat de metoclopramidă 10 mg ***(S/P-6L)***; Sol. inj. clorhidrat de metoclopramidă 5 mg/ml (f. × 2 ml) ***(S/P-RF)***

METOCLOPRAMID *BIOFARM SA;* Sol. orală 0,665% (fl. × 20 ml) ***(P-6L)***

METOCLOPRAMID *PROMEDIC SRL;* Cpr. 10 mg metoclopramid ***(P-6L)***

METOCLOPRAMID *LAROPHARM SRL;* Cpr. 10 mg ***(P-6L)***

METOCLOPRAMID *PHARMAPLANT BIOGALENICA SRL;* Sol. orală 0,7% (fl. × 20 ml) ***(P-6L)***

METOCLOPRAMID 10 mg *FARMEX COMPANY;* Cpr. 10 mg ***(P-6L)***

N-METOCLOPRAMID *NORDFARM PRODUCT;* Cpr. 10 mg ***(P-6L)***

PRAMIDIN 10; PRAMIDIN 20 *CSC PHARMACEUTICALS;* Aerosol nazal 10 mg/doză sau 20 mg/doză ***(P-6L)***

Ind: Profilaxia și trat. stărilor de greață și vomă; trat. tulburărilor de motilitate ale portiunii superioare a tractului gastrointestinal; trat. gastroparezei diabetice; facilitarea unor procedee diagnostice; trat. sughițului.
Dz: *Int.:* Sdr. cu hipomobilitate gastrică: 10 mg de 4 ori/zi. Esofagită de reflux: 10-15 mg 4 ori/zi. Sughiț: 10-20 mg de 4 ori/zi, timp de 7 zile. Pentru procedee diagnostice: 10-20 mg i.v. cu aproximativ 10 minute înaintea examinării. Antiemetic: 5-10 mg de 3 ori/zi. *Copii 5-14 ani:* 2,5-5 mg de 3 ori/zi. *Sugari și copii sub 3 ani:* 0,5-1 mg/kg și zi, în 3 prize. *Inj.:* Greață și vărsături, tulburări de motilitate, gastropareză diabetică 10 mg i.m. sau i.v. de 3-4 ori/zi. *Copii 3-14 ani:* 0,1 mg/kg și zi; maxim 0,5 mg/kg și zi. Greață și vărsături posttrat. cu citostatice: 2 mg/kg în perf. i.v.
Cind: Hipersensibilitate la metoclopramidă; feocromocitom; ileus mecanic, perforații intestinale și hemoragii gastro-intestinale; tumori dependente de prolactină; epilepsie, motorii extrapiramidale; copii sub 2 ani (inj.).
A!: Prudență la copii și tineri, vârstnici, IR, IH; interacțiuni medicamentoase cu levodopa (Cind), alcool etilic, antihipertensive, antidepresive triciclice, analgezice opioide, antihistaminice H1, barbiturice, benzodiazepine, neuroleptice, anticolinergice, digoxină, cimetidină; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Somnolență, nervozitate, oboseală, cefalee, amețeală, anxietate, neliniște, diaree, stări depresive, sindrom extrapiramidal, ginecomastie, galactoree, tulburări menstruale, tulburări parkinsoniene, diskinezie tardivă, methemoglobinemie, iritații locale.

METOPROLOLUM

COD ATC: C07AB

BETALOC *ASTRAZENECA;* Sol. inj. metoprolol tartrat 1 mg/ml (f. × 5 ml) ***(S)***

BETALOC ZOK *ASTRAZENECA;* Cpr. ret. metoprolol tartrat 50 mg, 100 mg sau 200 mg ***(S/P-6L)***

BETAPROL 50; 100 *HELCOR SRL;* Cpr. 50 mg sau 100 mg ***(P-6L)***

BLOXAN *KRKA d.d.;* Cpr. 100 mg ***(P-6L)***

EGILOK *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Cpr. 25 mg; 50 mg sau 100 mg ***(P-6L)***

METOPROLOL *INCDCF BUCUREȘTI;* Sol. inj. 1 mg/ml (f. × 5 ml) ***(S)***

METOPROLOL 50 mg *LAROPHARM SRL;* Cpr. 50 mg ***(P-6L)***

METOPROLOL 50 mg, METOPROLOL 100 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. 50 mg sau 100 mg ***(S/P-6L)***

METOPROLOL 50 mg; 100 mg *TERAPIA SA;* Cpr. 50 mg sau 100 mg ***(P-6L)***

METOPROLOL 100 mg *PROMEDIC SRL;* Cpr. 100 mg ***(P-6L)***

METOPROLOL AL 50; 100 *ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG;* Cpr. 50 mg sau 100 mg ***(P-6L)***

METOVIM 50; 100 *VIM SPECTRUM SRL;* Cpr. 50 mg sau 100 mg ***(P-6L)***

VASOCARDIN; VASOCARDIN 50; 100 *SLOVAKOFARMA;* Cpr. metoprolol tartrat 50 sau 100 mg ***(P-6L)***

Ind: HTA; profilaxia crizelor de angină de efort; IMA; eretism cardiac; aritmii supraventriculare (tahicardie, flutter și fibrilație atrială, tahicardie joncțională) și aritmii ventriculare (extrasistole ventriculare, tahicardie ventriculară).
Dz: *Oral:* 50-200 mg/zi. *Inj.:* Aritmii: inițial 5 mg i.v., repetat la 5 min, maxim 20 mg. IMA: 5 mg i.v. în bolus, de 3 ori la intervale de 5 minute.
Cind: Forme severe de astm bronșic și BPCO, IC care nu răspunde la trat., șoc cardiogen, BAV de gradul II sau III neinvestigat, angor Prinzmetal, boala nodului sinusal, bloc sinoatrial, bradicardie sinusală (sub 45-50 bătăi/min), forme severe de sindrom Raynaud și afecțiuni arteriale periferice, feocromocitom netratat, hTA, hipersensibilitate la metoprolol, antecedente de reacții anafilactice.
A!: Prudență la copii, IC, BAV gradul I, diabet zaharat, psoriazis, anestezie generală, tireotoxicoză, ciroză hepatică, IH, sportivi; monitorizarea TA; în cardiopatie ischemică trat. trebuie întrerupt gradat; interacțiuni medicamentoase cu amiodarona, anestezice generale, blocante ale canalelor de calciu, chinidină, disopiramidă, baclofen, cimetidina, lidocaină, antiacide, substanțe de contrast iodate, AINS, antidepresive triciclice, neuroleptice, glucocorticoizi, fenobarbital și rifampicină; sarcină și alăptare.
RA: Astenie, senzația de răceală în extremități, bradicardie, tulburări digestive (epigastralgii, greață, vărsături), insomnie, coșmar, încetinirea conducerii AV sau mărirea gradului unui BAV preexistent, IC, agravarea bronhospasmului, hipoglicemie, agravarea sdr. Raynaud, agravarea unei claudicații intermitente preexistente, erupții psoriaziforme, anticorpi antinucleari, manifestări clinice de tip sindrom lupic.

METRONIDAZOLUM

COD ATC: J01XD01
G01AF01
P01AB01

DEFLAMON - FLEBO *SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SpA;* Sol. perf. 5 mg/ml (fl. × 100 ml) ***(S)***

DEFLAMON - FLEBO *CSC PHARMACEUTICALS* ***(S)***

FLAGYL *LAB. AVENTIS PHARMA;* Ovule 500 mg (ct. × 2 blist. × 5 ovule); Cpr. film. 250 mg (ct. × 2 blist. × 5 cpr. film.) ***(P-RF)***

FLAGYL *SPECIA/RHÔNE-POULENC RORER;* Susp. orală 125 mg/5 ml (fl. × 120 ml) ***(P-RF)***

KLION 0,5% INFUSION *GEDEON RICHTER Ltd.;* Sol. perf. 0,5% (fl. × 100 ml) ***(S)***

METRONIDAZOL *SICOMED SA;* Cpr. 250 mg (ct. × 20 cpr.) ***(P-RF)***

METRONIDAZOL A; METRONIDAZOL B *SICOMED SA;* Sol. perf. A (în glucoză); Sol. perf. B (în clorură de sodiu) ***(S)*** **METRONIDAZOL B 0,5%** *SICOMED SA;* Sol. perf. 0,5% (fl. × 200 ml) ***(S)***

METRONIDAZOL 250 mg *ARENA GROUP SA;* Cpr. 250 mg (ct. × 20 cpr.) ***(P-RF)***

METRONIDAZOL 500 mg *B. BRAUN MELSUNGEN;* Sol. perf. 500 mg/ 100 ml (ct. × 10 fl. × 100 ml) ***(S)***

Ind: Trat. infecțiilor severe provocate de germeni sensibili la metronidazol: Bacteroides, inclusiv B. fragilis, coci gram-pozitiv anaerobi – Peptostreptococcus, majoritatea clostridiilor, inclusiv C. difficilis. Trat. cazurilor grave de amibiază cu localizare intestinală sau hepatică. Lambliază, trichomoniază urogenitală, vaginite nespecifice.
Dz: *Amibiaza. Adulți:* 1,5 g/zi, int., în 3 prize, timp de 7 zile consecutiv. *Copii:* 30-40 mg/kg și zi, int., în 3 prize, timp de 7 zile consecutiv. *Tricomoniaza. Femei* (uretrite și vaginite cu Trichomonas): doză unică 2 g, int., sau trat. mixt timp de 10 zile consecutiv, 500 mg/zi oral și i.vag. 500 mg/zi. Se va trata concomitent și partenerul. *Bărbați* (uretrite cu Trichomonas): doză unică 2 g/zi int. sau 500 mg/zi, int., timp de 10 zile consecutiv. *Lambliaza.* 5 zile consecutiv: *Adulți:* 750-1000 mg/zi, int. *Copii:* 2-5 ani: 250 mg/zi int. *5-10 ani:* 375 mg/zi int. *10-15 ani:* 500 mg/ zi, int. *Vaginite nespecifice.* 500 mg/zi int. și ivag. 500 mg/zi timp de 7 zile. Infecții cu germeni anaerobi. *Adulți:* 1-1,5 g/ zi. *Copii:* 20-30 mg/kg și zi. Inj. *Curativ: Adulți și copii peste 12 ani:* 500 mg de ori 2-3/zi, perf. i.v. *Copii sub 12 ani:* 7,5 mg/kg de 3 ori/zi. *Profilactic: Adulți și copii peste 12 ani:* Doza pentru o dată este de 500 mg. *Copii mai mici de 12 ani:* Doza pentru o dată este de 7,5 mg/kg. I.rect: *Adulți:* 1 g la 8 ore, timp de 5-10 zile. *Copii: 2-10 ani,* 0,5-1 g/zi, *10-15 ani,* 0,5 g la 8 ore timp de 5-10 zile.
Cind: Hipersensibilitate la metronidazol, la alți derivați de nitroimidazol; afecțiuni cerebrale organice; sarcină și alăptare.
A!: Prudență în IR severă, afecțiuni hepatice grave, trat. lungi; interacțiuni medicamentoase cu anticoagulante orale, fluorouracil, alcool etilic.
RA: Senzație de gust metalic, limbă saburală, anorexie, greață, varsături, dureri epigastrice, diaree, urticarie, prurit, bufeuri vasomotorii; tulburări neuropsihice-cefalee, vertij, ataxie, confuzie mintală, convulsii; pancreatită reversibilă; leucopenie, neuropatii senzitive periferice.

MEXILETINUM

COD ATC: C01BB02

MEXILETIN 200 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cps. clorhidrat de mexiletin 200 mg ***(S/P-RF)***

MEXITIL 200 mg *BOEHRINGER INGELHEIM;* Cps. 200 mg ***(P-RF)***

Ind: Aritmii ventriculare.
Dz: i.v: încărcare: 0,1 mg/kg și min; întreținere: 0,01 mg/kg și min. Int: încărcare: 400 mg; întreținere: 400-800 mg, până la 1200 mg/zi.

Cind: Primele 3 luni de sarcină, post-IMA, șoc cardiogen, BAV de gradul II-III, hipersensibilitatea la mexiletin sau la anestezice locale.
A!: Prudență în disfuncție sinusală, tulburări de conducere intracardiacă, bradicardie, hTA, IC, ciroză hepatică decompensată, IR severă; interacțiuni medicamentoase cu alte antiaritmice, opioide, inhibitori sau inductori enzimatici, teofilină, cafeină; alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Disconfort gastric, afectarea simțului gustativ, greață, vărsături, toropeală, disartrie, nistagmus, tulburări oculare de adaptare, ataxie, secuse musculare, parestezii, convulsii, cazuri izolate de stări confuzionale pasagere, agravarea aritmiei, erupții cutanate, ulcerații esofagiene.

MIANSERINUM

COD ATC: N06AX03

LERIVON 10 mg; LERIVON 30 mg *N.V. ORGANON;* Cpr. film. mianserină 10 mg sau 30 mg ***(P-RF)***

MIANSERIN *PROMEDIC SRL;* Dj. mianserină 10 mg și 30 mg ***(P-RF)***

MIANSERIN 10 DESITIN; MIANSERIN 30 DESITIN *DESITIN;* Cpr. film. 10 mg sau 30 mg ***(P-RF)***

Ind: Depresie.
Dz: *Adulți:* inițial 30-40 mg zilnic, întreținere 30-90 mg zilnic. *Vârstnici:* inițial maxim 30 mg zilnic.
Cind: Manie, hipersensibilitate la mianserină.
A!: Poate precipita hipomania; control hematologic, prudență în diabet, IC, IH, IR, glaucom cu unghi îngust, hipertrofie de prostată; interacțiuni medicamentoase cu alcool, betanidina, clonidina, metildopa, guanetidina sau propranololul; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Discrazii sanguine, convulsii, hipomanie, hTA, dereglări ale funcțiilor ficatului, artralgie, edem, ginecomastie, stare de toropeală, tulburări de vedere, gură uscată, constipație.

MICONAZOLUM

COD ATC: A01AB09
G01AF04
D01AC02

DAKTARIN *JANSSEN;* Gel oral 2% (tub × 40 g) ***(P-RF)***

DERMOZOL *PHARCO PHARMACEUTICALS;* Gel 2% ***(P-RF)***

GYNO-DAKTARIN *JANSSEN;* Cps. vag. miconazol nitrat 400 mg sau 1,2 g ***(P-RF)***

GYNOZOL *PHARCO PHARMACEUTICALS;* Cps. vag. moi miconazol nitrat 200 mg sau 400 mg ***(P-RF)***

MEDACTER *FARAN LABORATOIRES SA;* Cremă 2% (tub × 30 g); Cremă vag. 2% (tub × 78 g) ***(P-RF)***

MICONAL ECOBI *ECOBI PHARMACEUTICI;* Ovule 50 mg; Cremă vag. 2% (tub × 78 g + aplicator); Cremă 2% (tub × 30 g); Cps. vag. 1,2 g ***(P-RF)***

MICONAL ECOBI LAVANDA VAGINALĂ *ECOBI PHARMACEUTICI;* Sol. ext. 0,2% (ct. × 5 fl. × 150 ml + 5 canule) ***(P-RF)***

MICOTOP *EUROPHARM SA;* Cremă ***(P-RF)***

MICOTOP gel 2% *EUROPHARM SA;* Gel miconazol nitrat 2% (tub × 40 g) ***(P-RF)***

MONAZOLE 7 *TECHNILAB Inc.;* Cremă vag. 2% (tub × 50 g × 7 aplicatoare) ***(P-RF)***

MYCOHEAL *DAR AL DAWA;* Cremă vag. 2% nitrat de miconazol (tub × 50 g + aplicator) ***(P-RF)***

MYCOHEAL 200 *DAR AL DAWA;* Sup. vag. 200 mg ***(P-RF)***

Ind: Trat. vulvovaginitelor micotice (în special candidozice) suprainfectate sau nu de o floră bacteriană grampozitivă. Aplicat pe piele în trat. pitiriazisului și a dermoepidermitelor infecțioase; trat. acneei.
Dz: *Ext. vag:* 50-1200 mg, în funcție de starea clinică. *Cutanat:* se aplică de 2 ori/zi, dimineața și seara. *Int.:* 1 g de 1-3 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la miconazol nitrat, la alți derivați imidazolici.
A!: Prudență în sarcină și alăptare.
RA: *Ext.:* fenomene de sensibilizare sau iritații locale; *i.vag:* arsuri și iritație vaginală, crampe pelviene, erupții cutanate și cefalee. *Int.:* greață și diaree, rareori erupții cutanate pruriginoase.

MIDAZOLAMUM *COD ATC: N05CD08*

DORMICUM 7,5 mg *TERAPIA SA;* Cpr. film. midazolam 7,5 mg (ct. × 1 blist. × 10 cpr. film.) ***(P-RF)***

DORMICUM *HOFFMANN LA ROCHE;* Sol. inj. midazolam 1 mg/ml (f. × 5 ml) sau 5 mg/ml (f. × 1 ml) ***(S)***

DORMICUM *HOFFMANN LA ROCHE,* Cpr. film. midazolam 7,5 mg

FULSED INJECTION *RANBAXY LABORATORIES Ltd.;* Sol. inj. 1 mg/ml (fl. × 5 ml sau 10 ml); 5 mg/ml (f. × 1 ml) ***(S)***

Ind: *Int.:* Tulburări ale ritmului somnului și insomnie. *Inj.:* Preanestezie, înainte de procedurile diagnostice sau de operațiile efectuate sub anestezie locală. Sedare de durată în terapie intensivă. Inducția sau menținerea anesteziei.
Dz: *Int.: Adulți:* 7,5-15 mg. *Pacienți în vârstă, debilitați,* cu IR și/sau IH 7,5 mg. *Inj.: Adulți:* 0,07-0,01/kg; *Copii:* 0,15-0,20 mg/kg; *Bătrânii și tarați:* 0,025-0,05 mg/kg.
Cind: Hipersensibilitate la benzodiazepine.
A!: Nu este indicat în trat. primar al insomniei, în psihoze și în depresiile psihice severe; prudență în leziuni cerebrale organice, insuficiență respiratorie severă, miastenia gravis, boli obstructive pulmonare, IR, IC congestivă, prematuri și nou-născuți; interacțiuni medicamentoase cu cimetidină, eritromicină,

neuroleptice, tranchilizante, antidepresive, hipnotice, analgetice, anestezice, alcool, ciclosporină, amiodaronă, neuroleptice; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Fenomene de dependență, episoade amnezice, hTA, tahicardie, depresie respiratorie, apnee, stop respirator și/sau cardiac; hipersensibilitate generalizată, agitație, hiperactivitate și agresivitate, convulsii tonico-clonice și tremor muscular, amnezie anterogradă.

MIDODRINUM

COD ATC: C01CA17

GUTRON *NYCOMED;* Cpr. midodrină hidroclorică 2,5 mg sau 5 mg ***(P-6L)***

GUTRON *NYCOMED;* Sol. inj. midodrină hidroclorică 2,5 mg/ml (f. × 2 ml) ***(S/P-RF)***

GUTRON *NYCOMED;* Sol. orală 1% midodrină hidroclorică (fl. × 25 ml) ***(P-6L)***

Ind: Tulburări ale reglării circulației sanguine și tulburări circulatorii datorate acumulării unor mari cantități de sânge în venele extremităților inferioare, hTA. Incontinență urinară datorată insuficienței funcției sfincterului vezical, tulburări ale ejaculării.
Dz: Int.: 1,25-5 mg de 2-3 ori/zi; inj. i.v.: 5 mg de 1-2 ori/zi.
Cind: HTA, tumori medulo-suprarenale, nefrită acută, IR severă, glaucom, hipertrofie de prostată, obstrucție mecanică în micțiune, hipertiroidism.
A!: Prudență în modificări severe organice ale inimii și ale sistemului vascular, tulburări de ritm, IR; sarcină și alăptare.
RA: Aritmii, dureri precordiale, urticarie, piloerecție, bradicardie, senzații de frig și necesitate de a micționa.

MILNACIPRANUM

COD ATC: N06AX17

IXEL *LAB. PIERRE FABRE;* Cps. milnacipran clorhidrat 25 mg sau 50 mg ***(P-RF)***

Ind: Trat. episoadelor depresive majore.
Dz: 50 mg de 2 ori/zi; pt. ajustarea dozei în IR.
Cind: Hipersensibilitate la milnacipran, copii sub 15 ani, asociere cu IMAO.
A!: Prudență în obstacol la evacuarea vezicală, idei suicidare, IR, HTA, afecțiuni cardiace; interacțiuni medicamentoase cu IMAO, sumatriptan, simpatomimetice, digoxină; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Vertij, transpirație abundentă, anxietate, bufeuri, disurie, grețuri, vărsături, uscăciunea gurii, constipație, tremor, palpitații, sindrom serotoninergic, riscul suicidului.

MILTEFOSINUM

COD ATC: L01XX09

MILTEX *ASTA MEDICA;* Sol. ext. miltefosin 60 mg/ml (fl. × 10 ml + pipetă) ***(S/P-RF)***

Ind: Modificări cutanate maligne în cancerul de sân.
Dz: Sol. se aplică extern, la nivelul zonei afectate.

Cind: Iradiere concomitentă, noduli mari și în profunzime; sarcină și alăptare.
A!: Prudență în trat. lungi; controale oftalmologice.
RA: Iritații cutanate, prurit, eritem, uscăciunea pielii cu descuamare, arsură dureroasă, creștere ușoară a creatininei serice, transaminazelor, leucocitelor, trombocitelor.

MINOXIDILUM

COD ATC: D11AX01

ALOPEXY *LAB. PIERRE FABRE;* Sol. ext. 2% (fl. × 15 ml sau 60 ml + pipetă 1 ml) ***(OTC)***

HAIRGROW *DAR AL DAWA;* Sol. capilară 2% (fl. pulverizator × 50 ml) ***(OTC)***

MINOXITRIM *TRIMA;* Sol. ext. 2% (fl. × 80 ml) ***(OTC)***

REGAINE *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Sol. cut. 2% (fl. × 60 ml + 3 tipuri de aplicator-dozator) ***(OTC)***

Ind: Alopecie androgenică.
Dz: Se aplică 20 mg de 2 ori/zi pe aria afectată a scalpului, începând din centrul acesteia.
Cind: Hipersensibilitate la minoxidil.
A!: Prudență la copii sub 18 ani și la vârstnici peste 65 ani, alte afecțiuni dermatologice, supravegherea cardiovasculară; este lipsit de eficacitate în alopecie areata; interacțiuni medicamentoase cu minoxidil adm. oral; sarcină și alăptare.
RA: Descuamare, eritem, dermită, uscarea pielii, hipertricoză (apărută în alte regiuni), senzație de arsură, prurit, sensibilitate crescută a pielii, rinită, erupții cutanate, eritem generalizat, edem facial, vertij, parestezii, cefalee, senzație de oboseală, nevrită, edeme, alterări ale gustului, infecții auriculare (otită externă), tulburări de vedere, iritație la nivelul ochiului, alopecie neregulată, dureri toracice, modificări ale TA și pulsului, hepatită, litiază renală.

MIRTAZAPINUM

COD ATC: N06AX11

REMERON *N.V. ORGANON;* Cpr. film. mirtazapină 15 mg, 30 mg sau 45 mg ***(P-RF)***

Ind: Depresie.
Dz: Inițial 15 mg/zi, crescut treptat apoi.
Cind: Hipersensibilitate la mirtazapină.
A!: Prudență în epilepsie, afecțiuni hepatice, afecțiuni renale, afecțiuni cardiace, hTA, schizofrenie, depresie, diabet zaharat, glaucom, adenom de prostată; interacțiuni medicamentoase cu alcool; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Leucopenie, somnolență, creșterea apetitului; creștere ponderală; vertij, convulsii, criză maniacală, edeme la nivelul membrelor inferioare, colorație icterică a tegumentelor și mucoaselor, erupții cutanate.

MISOPROSTOLUM

COD ATC: A02BB01

CYTOTEC *SEARLE;* Cpr. 200 g ***(P-RF)***

Ind: Trat. ulcerului gastric sau duodenal evolutiv. Trat. leziunilor gastro-duodenale induse de AINS sau trat. preventiv (mai ales la vârstnici peste 65 ani, antecedente cu ulcer gastro-duodenal sau intoleranță la AINS), la pacienții la care continuarea tratamentului cu AINS este indispensabilă.
Dz: *Trat. ulcerului evolutiv și al leziunilor gastro-duodenale:* 1 cpr. 200 mg de 4 ori pe zi; durata trat. 4-8 săptămâni. *Trat. preventiv al leziunilor și complicațiilor gastro-duodenale:* ½ cpr. 200 mg de 4 ori pe zi sau 1 cpr. de 200 mg de 2 ori pe zi, timp de 10 zile. Apoi, dacă doza este tolerată, 1 cpr. de 200 mg de 4 ori pe zi. În caz de intoleranță (diaree) la doza crescută se revine la doza inițială de 400 mg/zi în două prize. Cpr. se adm. după masă și dacă este necesar, la culcare, cu o cantitate mare de apă.
Cind: Având acțiune intensă asupra contractilității musculaturii uterului, poate determina avort. Este contraindicat în timpul sarcinii. Utilizarea la femei în perioada fertilă, în absența unei contracepții eficace, este contraindicată. Nu se adm. în timpul alăptării. Hipersensibilitate la unul din constituenții produsului.
A!: În timpul tratamentului cu AINS trebuie supravegheată apariția unei simptomatologii digestive la nivel intestinal. În cazul unor efecte gastro-duodenale, regula este să se întrerupă tratamentul antiinflamator. Spre deosebire de alte prostaglandine de tip E, misoprostolul nu antrenează hTA la doze terapeutice. Totuși, el trebuie prescris cu precauție în afecțiuni unde apariția unei hTA poate provoca complicații. În caz de ulcer gastric, este recomandat să se verifice caracterul benign al leziunilor înaintea tratamentului.
RA: Frecvent: diaree moderată. Alte efecte: grețuri (tranzitorii și moderate), cefalee, vertij, dureri abdominale.

MITOMICINUM

COD ATC: L01DC03

MUTAMYCIN *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Pulb. liof. pt. sol. inj. mitomicină 5 mg; 20 mg sau 40 mg ***(S)***

Ind: Adenocarcinom gastric sau pancreatic metastatic.
Dz: 20 mg/m i.v. în doză unică, la interval de 6-8 săpt.
Cind: Hipersensibilitate la mitomicină, trombocitopenie, tulburări de coagulare, risc de hemoragie.
A!: Monitorizare a hemogramei; prudență în sarcină și alăptare.
RA: Trombocitopenie și/sau leucopenie, inflamație la locul injectării, stomatite, alopecie, rash, necroză cutanată, eritem tardiv și/sau ulcerații la locul injectării, hipercreatininemie, dispnee, tuse neproductivă, infiltrate pulmonare, insuficiență respiratorie acută, sdr. hemolitic-uremic, edem pulmonar, tulburările neurologice, HTA, IC congestivă, febră, anorexie, greață și vărsături, cefalee, tulburări de vedere, confuzie, amețeală, astenie, edeme, tromboflebită, hematemeză, diaree, dispnee acută și bronhospasm sever.

MITOXANTRONUM

COD ATC: L01DB07

NOVANTRONE *WYETH LEDERLE PHARMA GmbH;* Sol. perf. mitoxantronă bază 2 mg/ml (fl. × 5 ml; 10 ml; 12,5 ml sau 15 ml) ***(S)***

ONKOTRONE *ASTA MEDICA;* Sol. inj. mitoxantronă 2 mg/ml (fl. × 5 ml; 10 ml; 12,5 ml sau 15 ml) ***(S)***

Ind: Carcinom mamar, limfoame nehodgkiniene, leucemia acută mieloidă, carcinom hepatic primitiv.
Dz: i.v: inițial 14 mg/m^2, repetat după 21 zile. La pacienții cu depresie medulară sau stare generală alterată 12 mg/m^2. Leucemia acută: inducție 10-12 mg/m^2 și zi timp de 5 zile consecutiv. Doza cumulată maximă este de 200 mg/m^2.
Cind: Hipersensibilitate la mitoxantronă; sarcină și alăptare.
A!: Prudență în pancitopenie, infecții severe, IH sau IR gravă, antecedente de cardiopatie severă, trat. anterior cu antracicline și/sau iradiere mediastinală; monitorizare hematologică și hepatică; interacțiuni medicamentoase cu alte citostatice.
RA: Depresie medulară, leucopenie, trombocitopenie, anemie, grețuri și vărsături, alopecie, modificări tranzitorii ale ECG, scăderea fracției de ejecție a ventriculului stâng, IC, stomatită, mucozită, reacții de hipersensibilizare, inapetență, diaree, dureri abdominale, hemoragii gastrointestinale, astenie, amenoree, febră, dispnee, manifestări neurologice nespecifice.

MIVACURIUM *COD ATC: M03AC10*

MIVACRON *GLAXO SMITHKLINE;* Sol. inj. 2 mg/ml (f. × 5 ml sau 10 ml) ***(S)***

Ind: Adjuvant al anesteziei generale, pentru a facilita intubarea traheală și ventilația mecanică.
Dz: *Adulți:* inj. iv: 0,07-0,15 mg/kg - efectiv clinic de aproximativ 15 min. Perf. iv: 8-10 mg/kg și min. *Copiii 2-12 ani:* 0,07-0,1 mg/kg. Pt. ajustarea dozelor în funcție de vârstă, greutate, afectarea renală sau hepatică.
Cind: Hipersensibilitate la mivacurium, copii sub 2 ani, sarcină.
A!: Prudență în deficit de colinesterază plasmatică, astm, hipovolemie, miastenia gravis, cașectici; interacțiuni medicamentoase cu anestezice inhalatorii, aminoglicozide, polimixine, spectinomicina, tetracicline, lincomicina, clindamicina, propranolol, blocanți ai canalelor de calciu, lidocaină, procainamidă, chinidină, furosemid, manitol, acetazolamidă, săruri de magneziu, ketamină, săruri de litiu, trimetafan, hexametoniu, IMAO, ecotiophate iodide, pancuroniu, organofosforice, anticolinesterazice, anumiți hormoni, bambuterol, propranolol, oxprenolol, antiaritmice, clorochină, D-penicilinamină, trimetafan, clorpromazină, steroizi, fenitoină și litiu; alăptare.
RA: Eritem, urticarie, hTA, tahicardie trecătoare sau bronhospasm, reacții anafilactice sau anafilactoide.

MOLGRAMOSTIMUM *COD ATC: L03AA03*

LEUCOMAX® *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Liof. pt. sol. inj. molgramostim 150 µg sau 300 µg (fl. pulb. + 1 f. solvent × 1 ml) ***(S/P-RF)***

Ind: Reducerea severității neutropeniei după trat. cu efect mielosupresor, alte stări de insuficiență medulară, transplant autolog de măduvă osoasă (TMO),

la pacienții considerat cu risc crescut pentru neutropenie severă prelungită și la cei la care transplantul s-a soldat cu eșec.
Dz: *Chimioterapia anticanceroasă:* 5-10 µg/kg și zi, inj. s.c. (tratamentul se instituie numai la 24 ore după ultima doză de citostatic și continuă 7-10 zile). *Sindroame mielodisplazice/anemie aplastică:* 3 µg/kg o dată/zi. *TMO:* 10 µg/kg și zi perf. i.v. timp de 4-6 ore, maxim 30 zile, începând din ziua care urmează TMO.
Cind: Hipersensibilitate la rHuGM-CSF, neoplazii ale seriei mieloide. Utilizare concomitentă cu radioterapie cu câmp larg, deoarece pacienții tratați cu factor de stimulare a coloniilor de granulocite macrofage (GM-CSF) au prezentat incidența crescută a reacțiilor adverse pulmonare, inclusiv decese. În scopul creșterii intensității dozei de chimioterapic citotoxic dincolo de schemele stabilite. Purpură trombocitopenică idiopatică. Hemopatii mieloide (pacienții cu peste 5% mieloblaști în măduva osoasă și/sau în sângele periferic după încheierea chimioterapiei).
A!: Dacă apar reacții de hipersensibilitate acută gravă, trat. va fi întrerupt imediat și nu se va relua niciodată. Prudență în boală respiratorie preexistentă, istoric de afecțiune autoimună, copii; monitorizarea numărului de trombocite și a hematocritului; interacțiuni medicamentoase cu medicamentele care se fixează de albuminele serice în proporție mare; sarcină și alăptare.
RA: Febră, greață, dispnee, diaree, erupții cutanate, reacție la locul injectării (în cazul adm. subcutanate), vărsături, fatigabilitate, anorexie, durere osteomusculară, astenie, durere toracică nespecifică, stomatită, cefalee, hipersudorație, durere abdominală, prurit, amețeli, edeme ale extremităților, parestezii, mialgii, anafilaxie, bronhospasm, IC, aritmii supraventriculare, tulburări cerebrovasculare, confuzie, convulsii, hTA, tulburări de ritm, hipertensiune intracraniană, hidropericard, pericardită, hidrotorax, edem pulmonar și sincopă.

MOLSIDOMINUM

COD ATC: C01DX12

MOLSIHEXAL 1 mg; MOLSIHEXAL 4 mg *HEXAL AG;* Cpr. 1 mg, 4 mg ***(P-6L)***

MOLSIHEXAL RETARD *HEXAL AG;* Cpr. elib. prel. 8 mg ***(P-6L)***

Ind: Angină pectorală stabilă și instabilă însoțită de insuficiență ventriculară stângă; angină pectorală în stadiu acut de infarct miocardic (numai după stabilizarea circulației); angină pectorală atunci când alte medicamente nu sunt indicate, nu sunt tolerate sau nu au fost suficient de eficace, ca și la pacienții în vârstă.
Dz: Doza se stabilește în funcție de gravitatea afecțiunii și de răspunsul terapeutic al pacientului. Dacă nu este altfel prescris, la *adulți* 8 mg zilnic. În cazuri moderate ca gravitate este suficientă o doză de 4-6 mg molsidomin zilnic, în unele cazuri mai severe este indicată o doză de 16 mg/zi. O doză zilnică mai mare de 16 mg nu trebuie depășită. Comprimatele trebuie administrate nesfărâmate, cu cantități suficiente de lichid, independent de ora meselor.
Cind: Hipersensibilitate la molsidomin sau la celelalte componente inactive; insuficiență circulatorie sistemică acută (de ex. șoc, insuficiență ventriculară stângă cu presiune diastolică scăzută); infarct miocardic acut cu presiune diastolică scăzută; tensiune arterială patologic scăzută (hipotensiune severă, tensiune sistolică mai mică de 100 mmHg); afecțiuni pulmonare obstructive

însoțite de hipoxie (bronșită cronică sau astm bronșic asociat cu tulburări respiratorii). În cazul unui infarct miocardic acut, medicamentul poate fi administrat numai sub monitorizare continuă a parametrilor cardiovasculari. Molsidomina comprimate nu este indicată în crizele acute de angină pectorală.
A!: Administrarea concomitentă de alcool, antihipertensive, antagoniști de calciu, medicamente antihipertensive sau alte vasodilatatoare poate crește efectul hipotensiv al molsidominei. Molsidomina poate fi administrată în timpul sarcinii numai la recomandarea expresă a medicului. Poate afecta capacitatea de reacție astfel încât abilitatea de a conduce vehicule, de a folosi utilaje sau de a lucra în condiții nesigure este redusă.
RA: Ocazional, scăderea bruscă a tensiunii arteriale, tulburări ortostatice, tahicardie până la colaps circulator și șoc. La începutul tratamentului poate apărea ocazional cefaleea, dar care de obicei se atenuează pe parcursul tratamentului. În cazuri izolate pot apărea greața și vertijul. Reacții de hipersensibilitate: în cazuri izolate pot apărea reacții de hipersensibilitate (efecte adverse cutanate și astm). Potențial cancerigenic.

MOMETASONUM

COD ATC: D07XC03
R01AD09
R03BA07

ASMANEX TWISTHALER 200 µg; ASMANEX TWISTHALER 400 µg *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Pulb. inhal. 200 µg sau 400 µg

ELOCOM *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Cremă mometazonă furoat 0,1% (tub × 15 g); Ung. 0,1% (tub × 15 g); Sol. cut. 0,1% (fl. × 20 ml) ***(P-RF)***

NASONEX *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Aerosol 50 µg/doză (fl. × 120 doze) ***(P-RF)***

Ind: *Cutanat:* psoriazis și dermatite atopice. *Nazal:* rinita alergică sezonieră și perenă, episoade acute de sinuzită. *Pulb. inhal.:* Trat. de lungă durată al astmului bronșic persistent.
Dz: *Cutanat:* se aplică pe zona afectată, o dată/zi. *Nazal:* Rinita alergică sezonieră și perenă: *Adulți și adolescenți:* 100 (50-400) µg în fiecare nară, o dată/zi. *Copii 3-11 ani:* 50 µg în fiecare nară, o dată/zi. *Sinuzită: Adulți și adolescenți:* 100-200 mg de 2 ori/zi. *Pulb. inhal.:* Adm. exclusiv prin inhalare. Adulți și copii ≥ 12 ani. Astm bronșic ușor-moderat persistent: 400 µg o dată pe zi, seara sau în 12 prize de câte 200 µg. Astm bronșic sever: inițial 400 µg de 2 ori pe zi.
Cind: Hipersensibilitate la mometazonă furoat, la alți corticosteroizi, intoleranță la lactoză, intoleranță ereditară la galactoză, deficit Lapp de lactoză sau malabsorbție de glucoză-galactoză.
A!: *Cutanat:* pot apărea efectele secundare care au fost raportate la utilizarea sistemică a corticosteroizilor, prudență la copii. *Nazal:* prudență în intervenție chirurgicală recentă în sfera nazală, trat. de lungă durată, tbc pulmonară activă sau latentă, infecții fungice netratate, infecții bacteriene, infecții virale sistemice, infecții oculare cu *Herpes simplex*. Sarcină și alăptare. *Pulb inhal.:* Atenție în cazul pacienților care sunt transferați de la trat. cu glucocorticoizi adm. sistemic, la trat. cu furoat de mometazonă inhalator. Terapia nu se întrerupe brusc. Prudență în sarcină și alăptare.

RA: *Cutanat:* parestezii, prurit, semne de atrofie a pielii, arsuri, foliculită, reacție acneiformă, iritație, hipertricoză, hipopigmentare, dermatită periorală, dermatite alergice de contact, infecții secundare. *Nazal:* epistaxis, secreție mucoasă sanguinolentă sau striuri de sânge, faringite, senzație de arsură și iritație nazală. *Pulb. inhal.:* Candidoză, disfonie, faringită, cefalee, reacții de hipersensibilitate (rash, urticarie, prurit, eritem și edem la nivelul ochilor, feței, buzelor și gâtului).

MOMETASONUM + ACIDUM SALICILICUM

COD ATC: D07XC03

ELOSALIC *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Ung., furoat de mometazonă 1 mg + acid salicilic 50 mg (tub × 1,8 g, 15 g sau 45 g)

Ind: Tratamentul inițial al leziunilor psoriazice moderate-severe.
Dz: Un strat subțire pe zonele afectate o dată sau de două ori pe zi. Doza maximă zilnică este de 15 g, aplicată pe cel mult 30% din suprafața corporală.
Cind: Sarcină și alăptare.
A!: Ulcer, plăgi sau vergeturi. Psoriazis pustulos sau gutat. Copii mai mici de 12 ani. Evitarea contactului cu ochii, mucoasele și plăgile deschise.
RA: Senzația de arsură la locul aplicării, prurit, atrofie cutanată locală. Reacții mai puțin frecvente: cutanate (vergeturi, infecție secundară, dermatită papuloasă asemănătoare acneei juvenile, echimoze, foliculită), endocrine (depresie corticosuprarenaliană), cutanate (hipertricoză, sensibilizare, hipopigmentare).

MONTELUKASTUM

COD ATC: R03DC03

SINGULAIR *MERCK SHARP & DOHME;* Cpr. mast. 5 mg; Cpr. film. 10 mg ***(P-6L)***

SINGULAIR® *MERCK SHARP & DOHME;* Gran. 4 mg ***(P-6L)***

Ind: Profilaxia și tratamentul cronic al astmului bronșic la adult și copil. Profilaxia simptomelor diurne și nocturne ale astmului bronșic. Tratamentul pacienților cu astm bronșic indus de aspirină. Profilaxia bronhoconstricției indusă de efort. Ameliorarea simptomelor diurne și nocturne ale rinitei alergice sezoniere.
Dz: *Adulți ≥ 15 ani cu astm bronșic și/sau rinită alergică sezonieră:* doza zilnică 10 mg, adm. oral seara, la culcare. *Copii între 6 și 14 ani* cu astm bronșic și/sau rinită alergică sezonieră: doza zilnică 5 mg, adm. oral seara, la culcare. La această grupă de vârstă nu este necesară ajustarea dozei. *Copii între 2 și 5 ani* cu astm bronșic și/sau rinită alergică sezonieră: doza zilnică 4 mg, adm. oral seara, la culcare. Montelukast poate fi asociat unui regim de tratament deja existent.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului.
A!: Comprimatele nu trebuie folosite în tratamentul crizelor de astm. Pacienții trebuie sfătuiți să aibă la îndemână medicația de urgență corespunzătoare. Nu trebuie să înlocuiască brusc tratamentul cu glucocorticoizi administrați pe

cale inhalatorie sau orală. La pacienții tratați cu antiastmatice, inclusiv antagoniști ai receptorilor pentru leucotriene, reducerea dozei de glucocorticoizi administrați sistemic (monitorizare clinică) a fost urmată, în cazuri rare, de eozinofilie, vasculită cu rash, agravare a simptomatologiei pulmonare, complicații cardiace și/sau neuropatie, uneori diagnosticată ca sindrom Churg-Strauss și vasculită sistemică eozinofilică. *Sarcină și alăptare*: nu se administrează în timpul sarcinii și alăptării, decât dacă este absolut necesar.
RA: Rar reacții de hipersensibilitate (inclusiv reacții anafilactice, angioedem, prurit, rash, urticarie și, foarte rar, infiltrat eozinofilic hepatic), tulburări ale viselor și halucinații, somnolență, iritabilitate, agitație, insomnie și foarte rar, convulsii; greață, vărsături, dispepsie, diaree; mialgii, inclusiv crampe musculare, tendință accentuată la sângerare, tendință la hematoame și edeme.

MORNIFLUMATUM

COD ATC: M01AX22

NIFLURIL *LAB. UPSA;* Sup. 400 mg; 700 mg sau 800 mg ***(P-RF)***

Ind: Tratamentul simptomatic de lungă durată al poliartritei reumatoide juvenile și la adulți, anumite artroze dureroase și invalidante, tratamentul simptomatic de scurtă durată a puseelor acute ale artrozelor, tratamentul durerii pe durata manifestărilor inflamatorii în sfera ORL și stomatologică.
Dz: *Copii 6-30 luni*: ½ sup. (200 mg) de doua ori pe zi; *30 luni-12 ani:* 1 sup. 400 mg și zi fără a se depăși 3 sup. pe zi. În indicații ORL și stomatologice trat. nu trebuie să depășească 3-4 zile. *Pentru adulți și copii după vârsta de 12 ani:* 1 sup. de 700 mg de două ori pe zi.
Cind: *Absolute:* sensibilitate (alergie) la AINS, ulcer gastro-duodenal în evoluție, insuficiență hepatică severă și renală severă, copii mai mici de 6 luni (pentru sup. de 400 mg) și copii sub 12 ani (pentru sup. de 700 mg).
AI: Monitorizare atentă a pacienților aflați sub tratament cu anticoagulante. Utilizare cu precauție în afecțiuni de natură infecțioasă (poate masca simptomatologia).
RA: Tulb. gastro-intestinale (vărsături, diaree, dureri epigastrice, ulcere, perforații, colită hemoragică, hemoragii oculte); reacții de hipersensibilizare (tulb. dermatologice: rash, urticarie, prurit, purpura, cazuri rare de eritem polimorf și vezicule (sd. Stevens-Johnson, sd. Lyell), foarte rar fotosensibilizare). Tulb. respiratorii (crize de astm mai ales alergici la aspirină și alte AINS). Tulb. generale: hTA, șoc anafilactic. Efecte asupra SNC (vertij-rar). Efecte renale (insuficiență renală acută, nefrită interstițială, sd. nefrotic-rar). Efecte pe sist. osos (cazuri rare de fluoroză osoasă după trat. îndelungate cu doze crescute). Modif. ale constantelor biologice (în mod excepțional pot fi influențate testele hepatice și trombocitopenie).

MOROXYDINUM

COD ATC: J05AX01

MOROXIDIN *INCDCF BUCUREȘTI;* Cpr. moroxidin clorhidrat 100 mg ***(P-RF)***

Ind: Infecții herpetice, zona zoster.
Dz: Oral, la *adulți:* profilactic 200 mg de 3 ori/zi; curativ câte 300 mg de 3 ori/zi; la *copii:* câte 100-200 mg de 3 ori/zi.
RA: Tulburări ale vederii culorilor.

MORPHYNUM

COD ATC: N02AA01

DOLTARD *NYCOMED;* Cpr. ret. 30 mg; 60 mg sau 100 mg *(P-TS)*

DOLTARD-10 mg; DOLTARD-30 mg; DOLTARD-60 mg; DOLTARD-100 mg *NYCOMED;* Cpr. ret. 10 mg; 30 mg; 60 mg sau 100 mg *(P-TS)*

MORFINĂ *SICOMED SA;* Sol. inj. clorhidrat de morfină 20 mg/ml (f. × 1 ml) *(P-TS)*

MST CONTINUS 10 mg; MST CONTINUS 30 mg; MST CONTINUS 60 mg; MST CONTINUS 100 mg; MST CONTINUS 200 mg *MUNDIPHARMA;* Cpr. film. elib. mod. 10 mg; 30 mg; 60 mg; 100 mg sau 200 mg *(P-TS)*

SEVREDOL *LAB. NAPP;* Cpr. film. 10 mg sau 20 mg *(P-TS)*

SEVREDOL® *MUNDIPHARMA;* Cpr. cu elib. rapidă 10 și 20 mg *(P-TS)*

SKENAN LP *LAB. UPSA;* Cps. ret. 10 mg; 30 mg; 60 mg sau 100 mg *(P-TS)*

VENDAL RETARD *LANNACHER;* Cpr. film. ret. 10 mg, 30 mg, 60 mg sau 100 mg *(P-TS)*

Ind: *Int.* dureri acute și cronice intense și foarte intense, precum cele provocate de tumori, dureri miocardice și postoperatorii. *Inj.* dureri neoplazice și tabetice; intoxicație cu atropină; EPA, IMA.
Dz: *Int.:* inițial 30 mg de 2 ori/zi, crescut la nevoie la 200-300 mg/zi. *Inj.: Copii: 3-6 ani:* 1-2 mg de 1-2 ori/zi s.c.; *7-15 ani:* 3-7 mg de 1-2 ori/zi s.c. *Adulți:* 0,01-0,02 g pentru o dată, s.c.
Cind: Hipersensibilitate la morfină, dependență în antecedente, astm bronșic, stază bronșică, situații în care trebuie evitată depresia centrului respirator, porfirie hepatică acută, pancreatită, abdomen acut, stenoze ale tractului gastrointestinal, după colecistectomie, hipertensiune intracraniană, traumatisme cerebrale, feocromocitom, ileus paralitic, hipertrofie de prostată, colită ulceroasă cronică, hipermotilitatea colonului, epilepsii, intoxicații, copii mici.
A!: Prudență la copii, vârstnici, IR, IH, mixedem, IC, travaliu; risc de dependență cu toleranță; interacțiuni medicamentoase cu deprimante centrale, alcool, fenotiazine, IMAO, cimetidină, pentazocină; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Greață și vărsături, sedare, constipație, apatie, inhibarea centrului tusei, bronhospasm, spasm al sfincterului Oddi, sughiț, bradicardie, spasm piloric, hTA predominant ortostatică, mioză, urticarie, exantem, transpirație, uscăciunea mucoasei bucale, modificări ale libidoului și potenței, dificultăți la micțiune, deprimare respiratorie.

MOXIFLOXACINUM

COD ATC: J01MA14

AVELOX® *BAYER AG;* Cpr. film. 400 mg ***(P-RF)***

Ind: Tratamentul infecțiilor determinate de germeni sensibili: infecții ale tractului respirator: acutizarea bronșitelor cronice, pneumonia nozocomială, sinuzitele acute; infecții necomplicate ale tegumentelor și anexelor.
Dz: Durata tratamentului depinde de severitatea bolii și de rezultatul testelor clinice și bacteriologice; se recomandă administrarea timp de 5 zile în acutizarea bronșitelor cronice, 10 zile în pneumonia nozocomială, 7 zile în sinuzitele acute și 7 zile în infecțiile necomplicate ale tegumentelor și anexelor. Doza recomandată pentru toate indicațiile este de 400 mg moxifloxacină o dată pe zi; această doză nu trebuie depășită. Comprimatele trebuie înghițite întregi cu o cantitate suficientă de lichid, independent de orarul meselor. Nu este necesară ajustarea dozei la vârstnici, la cei cu insuficiență hepatică ușoara sau moderata, la cei cu insuficiența renala (inclusiv pentru clearance al creatininei 30 ml/min și 1,73 m^2). *Copii:* Administrarea moxifloxacinei la copii și adolescenți în perioada de creștere este contraindicată.
Cind: Hipersensibilitate la moxifloxacină, la alte chinolone sau la oricare dintre excipienți; sarcină și alăptare; copii și adolescenți. Moxifloxacina nu este recomandată la pacienții cu insuficiență hepatică severă.
A!: S-a demonstrat că moxifloxacina poate prelungi, la unii pacienți, intervalul QT. De aceea, acest medicament trebuie evitat la pacienții cu intervalul QT prelungit, cu hipokaliemie necorectată și la pacienții tratați cu antiaritmice din clasa IA (de ex. chinidină, procainamidă) sau clasa III (de ex. amiodaronă, sotalol), datorită lipsei de experiență. Nu trebuie exclus însă un efect aditiv al moxifloxacinei cu medicamentele ce prelungesc intervalul QT cum ar fi: cisapridă, eritromicină, antipsihotice și antidepresivele triciclice. În timpul terapiei cu chinolone pot să apară convulsii, inflamații și rupturi ale tendoanelor, în special la vârstnici și la pacienții tratați cu glucocorticoizi. Pacienții trebuie sfătuiți să evite expunerea excesivă la radiațiile ultraviolete și la soare. Administrarea moxifloxacinei la gravide și femei care alăptează este contraindicată. Pacienții trebuie avertizați că, înainte de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje, trebuie să-și testeze reactivitatea.
RA: Dureri abdominale, cefalee, greață, diaree, vărsături, dispepsie, tulburări ale gustului, amețeală.

MOXONIDINUM

COD ATC: C02AC05

CYNT® *SOLVAY PHARMACEUTICALS GmbH;* Cpr. moxonidină 0,2 mg; 0,3 mg sau 0,4 mg ***(P-6L)***

PHYSIOTENS 0,2; PHYSIOTENS 0,3; PHYSIOTENS 0,4 *SOLVAY PHARMACEUTICALS GmbH;* Cpr. film. 0,2 mg, 0,3 mg sau 0,4 mg ***(P-6L)***

Ind: HTA esențială sau primară.
Dz: Inițial 0,2 mg/zi, dimineața, apoi doza poate fi mărită la 0,4-0,6 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la moxonidină, sindromul de sinus bolnav, bloc sinoatrial, BAV de grad II sau III, bradicardie severă, IC gravă, afectare coronariană severă, IR severă.

A!: Prudență în IR moderată; trat. nu trebuie întrerupt brusc; interacțiuni medicamentoase cu betablocante și alte hipotensive, alcool, sedativelor, hipnotice, antidepresive triciclice, IMAO; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Cefalee și senzație de uscăciune a gurii, oboseală, astenie, amețeală, greață și tulburări ale somnului.

MUPIROCINUM

COD ATC: D06AX09
R01AX06

BACTROBAN *GLAXO SMITHKLINE;* Ung. nazal 2% (tub × 3 g); Ung. 2% (tub × 15 g); Cremă 2% (tub × 15 g sau 30 g) ***(P-RF)***

Ind: *Ung.:* Infecții bacteriene cutanate, de ex. impetigo, foliculite și furunculoze. *Ung. nazal:* Eliminarea stării de purtător nazal de stafilococi, inclusiv *Staphylococcus aureus* meticilino-rezistent (MRSA).
Dz: *Ung.:* se aplică pe zona afectată de 3 ori/zi, timp de 10 zile. *Ung. nazal:* se aplică în porțiunea anterioară a narinelor, de 2-3 ori/zi, timp de 5-7 zile.
Cind: Hipersensibilitate la mupirocină.
A!: *Ung.:* se evită contactul cu ochii; prudență în afecțiuni renale moderate sau severe. *Ung. nazal:* se evită contactul cu ochii. Sarcină și alăptare.
RA: Senzație de arsură, usturime și prurit la locul aplicării.

MYCOPHENOLATUM

COD ATC: L04AA06

CELLCEPT 1 g/5 ml *HOFFMANN LA ROCHE;* Pulb. pt. susp. orală 1 g/5 ml (fl. × 110 g) ***(S/P-RF)***

CELLCEPT 250 mg *HOFFMANN LA ROCHE;* Cps. 250 mg ***(S/P-RF)***

CELLCEPT 500 mg *HOFFMANN LA ROCHE;* Cpr. film. 500 mg; Pulb. conc. sol. perf. 500 mg/fl. ***(S/P-RF)***

Ind: Profilaxia rejecției de organ și trat. recidivei rejecției, la pacienții cu transplante renale alogene.
Dz: *Profilaxia rejecției:* 2 g/zi (1 g × 2 ori/zi). *Trat. recidivei rejecției:* 1,5 g de 2 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la mycofenolat mofetil sau la acid mycofenolic.
A!: Risc de dezvoltare a limfoamelor sau a altor neoplazii; susceptibilitate crescută la infecții; monitorizare hematologică; prudență la copii; interacțiuni medicamentoase cu acyclovir, antiacide, colestiramină, probenecid; sarcină și alăptare.
RA: Diareea, leucopenia, starea septică și voma, infecții, durere abdominală, febră, toracalgii, cefalee, lombalgie, astenie, anemie, leucopenie, trombocitopenie, anemie hipocromă, leucocitoză, infecții ale tractului urinar, necroză tubulară renală, hematurie, HTA, hiperpotasemie, hiperglicemie, hipofosfatemie, hipercolesterolemie, edeme periferice, constipație, greață, dispepsie, moniliază orală, dispnee, faringită, tuse frecventă, *Herpes simplex*, acnee, amețeli, insomnie, tremor.

N

N-ACETYL ASPARTYL GLUTAMAT DE MAGNEZIU

COD ATC: S01GXN1

NAAXIA *NOVARTIS PHARMA SERVICES;* Sol. oft. 38 mg/ml (fl. × 5 ml) *(P-6L)*

Ind: Conjunctivite alergice.
Dz: Instilații în sacul blefaro-conjunctival, 1 picătură de 4 ori/zi.
Cind: Alergie la produs.

NABUMETONUM

COD ATC: M01AX01

RELIFEX *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. 500 mg nabumetonă ***(P-RF)***

Ind: Osteoartrite, artrită reumatoidă și afecțiuni similare ce necesită un trat. antiinflamator.
Dz: *Adulți:* 1 g/zi priză unică, la culcare; la nevoie 500 mg - 1 g dimineața. *Vârstnici:* Doza zilnică maximă 1 g. În IR (Cl creatinină < 30 ml/min) se reduce doza.
Cind: Ulcer peptic activ, afecțiuni hepatice severe (ciroza hepatică), hipersensibilitate la nabumetonă. Copii.
A!: Ulcer peptic gastrointestinal activ sau în antecedente; IR severă (Cl creatinină < 30 ml/min): periodic, examene de laborator; astm bronșic, urticarie sau alte reacții de tip alergic induse de aspirină sau alte AINS; retenție de lichide, HTA și/sau IC. Sarcină și alăptare.
RA: *Gastrointestinale:* ulcer gastric, hemoragii gastrointestinale. *Dermatologice:* eritem multiform, sindrom Stevens-Johnson, necroliză toxică epidermică, fotosensibilitate. *Generale:* anafilaxie, reacții anafilactoide, angioedem. *Altele:* trombocitopenie, stare de confuzie.

NADROPARINUM

COD ATC: B01AB06

FRAXIPARINE 0,3 ml; 0,4 ml; 0,6 ml; 0,8 ml *SANOFI~SYNTHELABO;* Sol. inj. 2850 UI/0,3 ml; 3800 UI/0,4 ml; 5700 UI/0,6 ml; 7600 UI/0,8 ml (10 seringi preumplute × 0,3 ml; 0,4 ml; 0,6 ml sau 0,8 ml) ***(S/P-RF)***

Ind: Profilaxia tulburării tromboembolice în chirurgia generală sau ortopedică; la pacienții cu risc crescut (insuficiență respiratorie și/sau IC), spitalizați în serviciul de terapie intensivă. Trat. tulburărilor tromboembolice. Prevenția coagulării în timpul hemodializei. Trat. anginei instabile și al infarctului de miocard fără undă Q.
Dz: Inj. sc. în peretele abdominal antero-lateral, alternativ în partea dreaptă și stângă o dată pe zi. *Profilaxia tulburărilor tromboembolice: Chirurgie gene-*

rală: inițial 0,3 ml cu 12 ore înainte de intervenție, apoi 1 doză unică zilnică de 0,3 ml minimum 7 zile; profilaxia se continuă de-a lungul perioadei de risc și cel puțin până la externarea pacientului. *Chirurgie ortopedică:* inițial cu 12 ore înainte de intervenție și la 12 ore după terminarea ei, adaptate la greutatea corporală (sub 50 kg, 0,2 ml/zi preoperator și până în ziua a 3-a și 0,3 ml/zi din ziua a 4-a; între 50-69 kg, 0,3 ml/zi preoperator și până în ziua a 3-a și 0,4 ml/zi din ziua a 3-a; peste 70 kg, 0,4 ml/zi preoperator și 0,4 ml/zi din ziua a 4-a). Trat. trebuie continuat minim 10 zile sau de-a lungul perioadei de risc. *Pacienți internați în secții de terapie intensivă:* sub 70 kg - 0,4 ml/zi, peste 70 kg - 0,6 ml/zi. *Trat. tulburărilor tromboembolice:* inj. sc. de 2 ori pe zi (la 12 ore), de obicei timp de 10 zile, în doză ajustată la greutatea corporală (sub 50 kg - 0,4 ml/zi; 50-59 kg - 0,5 ml/zi; 60-69 kg - 0,6 ml/zi; 70-79 kg - 0,7 ml/zi; 80-89 kg - 0,8 ml/zi; peste 90 kg - 0,9 ml/zi). Trat. anticoagulant oral este inițiat cât mai curând posibil, dacă nu există nici o contraindicație și nu trebuie întrerupt înainte de a se atinge INR urmărit. *Prevenția coagulării în timpul hemodializei:* doză unică, în linia arterială, la începutul fiecărei ședințe. La pacienții fără risc hemoragic crescut, se dau ca doze inițiale: sub 50 kg - 0,3 ml; 50-69 kg - 0,4 ml; peste 70 kg - 0,6 ml. La pacienții cu risc hemoragic, ședințele de dializă pot fi efectuate cu dozele reduse la jumătate. În cazul ședințelor care durează mai mult de 4 ore, poate fi adm. în timpul dializei o doză suplimentară mai mică. *Trat. anginei instabile și al infarctului de miocard fără undă Q:* inj. sc. de 2 ori/zi (la 12 ore), în asociere cu aspirină în doză de până la 325 mg/zi. Doza inițială se dă în bolus i.v. de 86 UI anti-Xa/kg și este urmată de doze inj. s.c. de 86 UI anti-Xa/kg. Durata uzuală a trat. este 6 zile, iar doza ajustată în funcție de greutatea corporală (sub 50 kg - 0,4 ml; 50-59 kg - 0,5 ml; 60-69 kg - 0,6 ml; 70-79 kg - 0,7 ml; 80-89 kg - 0,8 ml; 90-99 kg - 0,9 ml; peste 100 kg - 1 ml).

Cind: Hipersensibilitate la nadroparină; antecedente de trombocitopenie datorată nadroparinei; sângerare în curs sau risc hemoragic crescut, corelate cu tulburări de hemostază, cu excepția coagulării intravasculare diseminate neindusă de heparină; leziuni organice susceptibile de sângerare (ulcerul peptic activ); AVC hemoragic; endocardită infecțioasă acută. Sarcină. Alăptare.

A!: Monitorizarea numărului de trombocite. Testele de agregare plachetară in vitro au doar o valoare limitată. IH, IR, HTA severă, tulburări vasculare ale coroidei și retinei, în perioada post-operatorie, consecutivă intervenției chirurgicale pe creier, măduva spinării sau ochi. Risc de hiperkaliemie, în special în diabetul zaharat, IR cronică, acidoză metabolică preexistentă, sau în trat. cu IEC sau AINS. Se monitorizează potasiul plasmatic. Risc crescut de hematoame spinale/epidurale în cazul utilizării de catetere epidurale, prin puncțiile epidurale sau spinale traumatice sau repetate. Monitorizare clinică neurologică. Atenție la utilizarea concomitentă de salicilați, antiagregante plachetare sau AINS.

RA: Manifestări hemoragice, mai frecvent la pacienții cu alți factori de risc asociați; trombocitopenie, uneori trombogenă. Rar mici hematoame, noduli de consistență fermă, chiar necroză cutanată, la locul injectării. Eozinofilie reversibilă; reacții generalizate de hipersensibilitate, inclusiv angioedem; creșterea tranzitorie a transaminazelor; priapism; hiperkaliemie reversibilă, în special la pacienții cu risc.

FRAXIPARINE FORTE 0,6 ml; 0,8 ml *SANOFI~SYNTHELABO;* Sol. inj. 11400 UI/0,6 ml; 15200 UI/0,8 ml (10 seringi preumplute × 0,6 ml sau 0,8 ml) ***(S/P-RF)***

Ind: Tromboze venoase profunde.
Dz: Inj. s.c. peretele abdominal antero-lateral, alternativ în partea dreaptă și stângă, o dată pe zi, timp de 10 zile. Doza se calculează în funcție de greutatea corporală (sub 50 kg - 0,4 ml; 50-59 kg - 0,5 ml; 60-69 kg - 0,6 ml; 70-79 kg - 0,7 ml; 80-89 kg - 0,8 ml; peste 90 kg - 0,9 ml). Trat. cu anticoagulante orale trebuie început cât mai curând posibil, dacă nu există Cind. Trat. cu nadroparină nu trebuie întrerupt înainte de a obține valoarea INR dorită.
Cind, A!, RA: *Vezi Cind, A!, RA de la Fraxiparine.*

NAFTIDROFURYLUM

COD ATC: C04AX21

ENELBIL 100 RETARD *LECIVA;* Cpr. cu elib. prel. 100 mg ***(P-6L)***

NAFTILONG *HEXAL AG;* Cps. ret. 200 mg naftidrofurilhidrogenooxalat ***(P-6L)***

Ind: Tulburări circulatorii periferice arteriale și venoase. Trat. trebuie să se efectueze numai în cazul în care nu sunt necesare alte măsuri terapeutice (un antrenament de mers și/sau măsuri de lărgirea lumenului vaselor).
Dz: 200 mg de 3 ori/zi, cu mult lichid.
Cind: IC decompensată (afectarea mușchiului cardiac); IMA; tulburări grave legate de efort la nivelul inimii; angina pectorală avansată (cu dureri toracice); hemoragii arteriale; hTA (TA sistolică sub 90 mmHg); tulburări în ortostatism (senzație de amețeală respectiv afazie la trecerea din clinostatism în ortostatism); AVC hemoragic recent; ischemie cerebrală tranzitorie (apariții temporare de insuficiență circulatorie cerebrală). Sarcină. Alăptare.
A! Pacienți cu tendință spre spasme cerebrale, crize spastice și diabet zaharat.
RA: Insomnii, neliniște, amețeli, tulburări gastrointestinale (greață și diaree), esofagită, hTA, tulburări în ortostatism (amețeli, respectiv pierderea cunoștinței prin schimbarea din poziția culcat în poziția în picioare), și/sau o creștere a glicemiei. Rareori: oboseală, amețeli, reacții alergice, parestezii și cefalee. În cazuri izolate au fost semnalate crize de angină pectorală, edeme, tulburări de micțiune, dereglări ale ritmului cardiac și necroza acută a celulelor hepatice.

NAFTIFINUM

COD ATC: D01AE22

EXODERIL *SANDOZ GmbH;* Cremă 1% (tub × 15 g); Sol. ext. 1% (fl. × 10 ml) ***(P-RF)***

Ind: Micoze cutanate (*Tinea corporis, Tinea inguinalis*); micoze interdigitale (*Tinea manum, Tinea pedum*); onicomicoze; candidoze cutanate; pityriasis versicolor; dermatomicoze inflamatorii.

Dz: Aplicații locale la nivelul tegumentelor sau unghiilor o dată/zi la nivelul zonei afectate, precum și a zonelor învecinate după ce în prealabil acestea au fost curățate și uscate. Pentru prevenirea recurențelor se adm. încă cel puțin 2 săpt. de la vindecarea clinică.
Cind: Hipersensibilitate la naftifină sau la alcool benzilic (conservant).
A!: A se evita contactul cu ochii a produsului Exoderil cremă.
RA: Sporadic, semne de iritație locală (senzație de uscăciune, căldură și apariția eritemului). Reacțiile secundare sunt întotdeauna reversibile și nu necesită întreruperea trat.

NALORPHINUM *COD ATC: V03AB02*

NALORPHINE *S.E.R.B.;* Sol. inj. 5 mg/ml (f. × 2 ml) ***(S)***

Ind: Antidot în intoxicația acută cu morfină, hidromorfonă, metadonă, petidină și alte opioide.
Dz: i.v. adulți 1-2 f., repetat la nevoie la fiecare 10-15 min, până la maxim 8 f. (în intoxicațiile grave); *copii nou-născuți:* 0,25-1 mg în vena ombilicală; *1-12 ani:* 0,2 mg/kg corp, maxim 10 mg i.v.; se poate inj. și s.c. sau i.m.
Cind: Alergie la nalorfină; morfinomanie și alte stări de dependență la opioizi (cu excepția dozelor mici, care pot fi adm. în scop diagnostic).
RA: Injectată fără legătură cu opioidele provoacă sedare, somnolență, ușoară deprimare respiratorie, uneori anxietate, chiar tulburări psihotice; adm. la morfinomani declanșează un sindrom de abstinență grav.

NALOXONUM *COD ATC: V03AB15*

NARCANTI *DUPONT;* Sol. inj. 0,4 mg/ml clorhidrat de naloxonă (f. × 1 ml) ***(S)***

Ind: Anulare completă sau parțială a acțiunii depresive asupra S.N.C., a derivaților din opiu și a pentazocinei în faza postoperatorie și în caz de supradozare. Diagnosticul diferențial în cazul suspiciunii deprimării respiratorii cauzate de derivații din opiu. Este ineficient față de deprimări respiratorii de altă natură.
Dz: Adm. i.v., i.m. sau s.c. La inj. i.v. se instalează acțiunea după 2 min, la inj. i.m. și s.c. puțin mai târziu, însă este de durată mult mai lungă. *În caz de supradozare a derivaților din opiu:* doza inițială la *adulți:* - 0,4 mg; la *copii* - 0,01 mg/kg, cu repetiție după 2-3 minute. Dacă adm. repetată de 2-3 ori rămâne fără efect, atunci deprimarea respiratorie nu este de natură opioidă. *În adm. postoperatorie:* se recomandă o adm. fracționată: *adulți* - 0,1-0,2 mg i.v.; *copii* - 0,001-0,002 mg/kg i.v. La intervale de 2-3 min se poate injecta aceeași doză, până ce pacientul respiră satisfăcător, este conștient, fără să aibă dureri sau să prezinte neliniște.
Cind: Hipersensibilitate la naloxonă.
A!: La pacienții care abuzează de derivați din opiu pot să apară fenomene acute de abstinență. Sarcină.
RA: Rareori: tremurături, transpirații, grețuri și vărsături. Ele pot constitui semnul unei prea rapide antagonizări a efectelor derivaților din opiu (sindrom de abstinență).

NANDROLOLUM

COD ATC: A14AB01
S01XA11

DECANOFORT 25 mg *TERAPIA SA;* Sol. inj. 25 mg/ml (f. x 1 ml) *(S/P-RF)*

KERATYL *LAB. CHAUVIN;* Sol. oft. 1% (fl. × 5 ml) ***(P-6L)***

Ind: Osteoporoză; trat. paliativ al unor cazuri selectate de carcinom mamar diseminat la femei; stări de cașexie și de denutriție la bătrâni, boli cronice debilitante, stare cașectică prin boală canceroasă, urmări ale intervențiilor chirurgicale majore, arsuri întinse, trat. cortizonic prelungit, radioterapie; în plăgile atone și consolidare întârziată a calusului osos; în hepatopatii cronice și uremie, în anemii prin hipoplazie medulară. Unele forme de nanism hipofizar; unele miopatii; retinopatie diabetică, cicatrizant în leziuni corneene.
Dz: *Inj. i.m. profund:* Osteoporoză: 25-100 mg o dată la 3-4 săpt. Pentru trat. paliativ al unor cazuri selectate de carcinom mamar diseminat la femei - 50 mg o dată la 2-3 săpt. Ca adjuvant la terapii specifice și măsuri de dietă în condiții patologice caracterizate de o balanță de nitrogen negativă: 25-50 mg o dată la 3 săpt. *Sol. oft.:* instilații 2 picături × 4-5 ori/zi.
Cind: Carcinom prostatic sau mamar la bărbat, IH, hepatită cronică sau recentă, nefroză sau nefrită gravă; adenom de prostată, prepubertate, femei tinere. Sarcină.
A!: Dacă apar semne de virilizare, se întrerupe trat. Pacienți cu IC latentă sau manifestă, disfuncție renală, HTA, epilepsie, metastaze scheletice ale carcinomului mamar. Copii. Folosirea steroizilor anabolizanți cu scopul de a crește capacitatea atletică poate presupune riscuri grave în ceea ce privește sănătatea consumatorului. Substanță dopantă.
RA: Dozele mari, trat. îndelungat și/sau adm. prea frecventă pot cauza: virilizare la femeile sensibile (răgușeală, acnee, hirsutism și creșterea libidoului, inhibarea menstruației și disovulație); la băieții la pubertate (erecții mai frecvente, mărirea penisului); la fete la pubertate (creșterea părului pubian și hipertrofie clitoridiană). Tulburări de creștere și dezvoltare sexuală la copii; uneori retenție hidrosalină (mai ales la malnutriți, anemici, în IC și IR). Utilizat în cancerul mamar cu metastaze osoase, la femeie, poate fi cauză de hipercalcemie, diminuează toleranța la glucide, poate crește trigliceridele în sânge. Retenție de sodiu, clor, apă, potasiu, fosfați, calciu etc.

NAPHAZOLINUM

COD ATC: S01GA01
R01AA08

NAFA-GAL *PHARMAPLANT BIOGALENICA SRL;* Sol. oft. 0,03% (fl. × 10 ml) ***(OTC)***

PROCULIN *ANKERPHARM GROUP CHAUVIN;* Sol. oft. 0,03% (fl. × 10 ml) ***(OTC)***

RINOFUG *MEDUMAN SA;* Sol. nazală 0,1% (fl. × 10 ml) ***(OTC)***

RINOGUT *PHARMAPLANT BIOGALENICA SRL;* Sol. nazală 0,1% (fl. × 10 ml) ***(OTC)***

Ind: Conjunctivitele acute și cronice nebacteriene, în special alergice, conjunctivite vechi, inflamații ale marginilor pleoapelor și în rinite.
Dz: De 2-3 ori/zi o pic. în sacul conjunctival, respectiv la nivelul mucoasei nazale. Utilizarea se încheie după 10 zile, sau se întrerupe pentru 5 zile.
Cind: Hipersensibilitate la substanțele din compoziția produsului.
A!: În timpul trat. cu aceste picături de ochi nu se poartă lentile de contact moi.

NAPROXENUM

COD ATC: M01AE02

NAPROREX 500 *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Cpr. 500 mg naproxen *(P-RF)*

NYCOPREN 250 mg; 500 mg *NYCOMED;* Cpr. film. 250 mg și 500 mg naproxen *(S/P-RF)*

REUXEN 250 mg; 500 mg *HELCOR SRL;* Cpr. 250 mg și 500 mg naproxen *(P-RF)*

Ind: Afecțiuni reumatice inflamatorii: artrite reumatoide, osteoartrite, spondilartrite anchilozante, sd. Fiessinger-Leroy-Reiter, reumatismul psoriazic, poliartrite reumatoide juvenile; afecțiuni reumatice degenerative: artroze dureroase și invalidante; afecțiuni reumatice extraarticulare: bursite, periartrite, tendinite, fibrozite, spondilite cervicale, sinovite; guta acută, pseudoguta, alte osteo-artropatii metabolice (boala Paget, sindrom Bartter etc.); dismenoree primară, durere post-partum; leziuni traumatice ale țesuturilor moi, luxații, întinderea/ruperea tendoanelor; diferite stări dureroase incluzând traume, intervenții chirurgicale; trat. adjuvant al manifestărilor inflamatorii ORL, ortodontostomatologice, pneumologice; febra (neinfecțioasă) în special la copii peste 2 ani.
Dz: *Adulți* – artrite reumatoide, osteoartrite, spondilartrite anchilozante: 250-500 mg × 2/zi, dimineața și seara; temporar 1500 mg/zi, pe durata puseelor acute. Guta acută: inițial 750 mg apoi 250 mg la 8 h până ce criza trece (24-48 h); dureri slabe - moderate, dismenoree primară, tendinite, bursite acute, alte indicații: inițial 500 mg apoi 250 mg, la 6-8 h, maxim 1250 mg/zi; criza de migrenă: inițial 750 mg; la nevoie 250-500 mg, la minim 30 min; profilaxia migrenei: 500 mg de 2 ori/zi; dacă nu apare nici un efect terapeutic după 4-6 săpt., trat. se întrerupe; *Copii* (peste 25 kg): artrite juvenile: 10 mg/kg/zi, dimineața și seara; ca analgezic și antipiretic: inițial 10 mg/kg urmată de 2,5-5,0 mg/kg, la 8 h. După prima zi, doza zilnică nu va fi mai mare de 15 mg/kg. Adm. se face în timpul sau după mese, preferabil cu lapte sau pansamente gastrice.
Cind: Hipersensibilitate la naproxen; reacții alergice demonstrate ca astm bronșic, rinite, la alte AINS în special aspirina; ulcer peptic activ, sângerări gastrointestinale; IH severă, IR sau IC. Copii sub 2 ani. Sarcină și lactație.
A!: Antecedente de ulcer peptic și/sau hemoragii digestive sau alți factori de risc cunoscuți a fi asociați ulcerului peptic (fumatul, alcoolismul etc.), mai ales la vârstnici și în cazul dozelor ridicate; IR: monitorizare creatinină serică și/sau Cl creatinină; când Cl creatinină < 20 ml/min nu se adm; IH (alcoolism cronic, ciroze): controlul periodic al testelor hepatice; HTA și/sau IC (atenție la edeme periferice); vârstnici (dozele minime eficiente); afecțiuni de natură infecțioasă sau care comportă un risc infecțios. Supraveghere timp de sângerare. Risc de sângerare gastrointestinală ce poate debuta brusc, fără semne

prealabile, cu posibilă perforare intestinală. Nu se adm. concomitent acid acetilsalicilic sau alte AINS datorită riscului crescut de RA. șoferi și activități de precizie.
RA: Mai grave la pacienții cu antecedente de ulcer peptic și/sau hemoragii gastrice. Frecvent reacții gastrointestinale: constipație, dureri abdominale, arsuri, greață; mai rar: anorexie, diaree, flatulență, stomatite; vomă, sângerări gastrointestinale și/sau perforații sau ulcerații peptice cu hemoragie sau perforări. Rareori reacții SNC: oboseală, cefalee, vertij, somnolență; reacții hepatice: alterarea testelor funcției hepatice; foarte rar: hepatita colestatică, citolitică sau mixtă, reversibile la întreruperea trat.; reacții renale: glomerulonefrite, nefrite interstițiale, creșterea uremiei și a creatininemiei, oligurie și IR acută, proteinurie; foarte rar: sindrom nefrotic; reacții dermatologice: rash, urticarie psoriaziformă, erupții cutanate, sd. Stevens-Johnson, angioedem; foarte rar: dermatite fotosensibile; reacții hematologice; anemie hemolitică, eozinofilie, granulocitopenie, leucopenie; foarte rar: trombocitopenie; reacții cardiovasculare: IC congestivă, edeme periferice, dispnee, palpitații; alte reacții: tinitus, vedere diminuată sau estompată, transpirații, reacții anafilactice, hiper- sau hipoglicemie.

NARATRIPTANUM

COD ATC: N02CC02

NARAMIG *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. 2,5 mg naratriptan ***(P-6L)***

Ind: Trat. migrenelor.
Dz: Un cpr. la primul semn al crizei migrenoase. Dacă după această primă doză simptomatologia persistă, se renunță la adm. compusului. Dacă migrena dispare dar simptomele reapar ulterior, se poate adm. încă un cpr. după minim 4 ore de la prima adm. Doza maximă permisă este de 5 mg în 24 ore.
Cind: Alergie la naratriptan sau la excipienți; la antibioticele sulfonamidice. Copii, adolescenți sau persoane peste 65 ani. Sarcină. Alăptare. Șoferi și activități de precizie.
A!: Se întrerupe adm. altor antimigrenoase (sumatriptan, zolmitriptan, ergotamină) cu minim 24 ore înaintea adm. naratriptanului. Precauție în HTA, afecțiuni hepatice sau renale. Risc crescut de afecțiuni cardio-vasculare la persoane cu: diabet, hipercolesterolemie, obezitate, angină, ATS coronariană, sau la fumători. Prudență în antecedente de AVC.
RA: Senzație de furnicătură, căldură, opresiune, constricție, durere la nivelul diferitelor regiuni ale corpului, inclusiv torace și gât. Tulburări de vedere. Tulburări de ritm cardiac, palpitații, oboseală. Amețeală, somnolență, greață, vărsături. Foarte rar - reacții alergice: erupții cutanate, edem la nivelul feței, limbii.

NATAMYCINUM

COD ATC: A07AA03
A01AB10
G01AA02
D01AA02

PIMAFUCIN *YAMANOUCHI EUROPE BV;* Cremă 2% (tub × 30 g) ***(P-RF)***

PIMAFUCIN *YAMANOUCHI EUROPE BV;* Susp. orală 2,5% (fl. × 20 ml); Ovule 100 mg; Dj. 100 mg ***(P-RF)***

Ind: *Cremă:* infecții ale pielii, unghiilor și ale patului unghial, intertrigo, infecție interdigitală cu *Candida albicans* și alte microorganisme sensibile la natamicină; în extinderea vaginitei candidozice la regiunea inghinală; rash-ul scutecelor. *Sol.:* candidozele dezvoltate în urma unui trat. prelungit cu antibiotice; otomicoze sau otite externe; candidoza unghiilor și a pielii. *Ovule:* vaginita produsă de *Candida albicans*. *Cpr.:* candidoza intestinală; trat. adjuvant celui topic în infecțiile pielii și unghiilor, produse de *Candida albicans* și *Trichomonas*.
Dz: *Cremă:* 1-4 aplicări/zi în regiunea afectată timp de 2-3 săpt. *Sol.* în otomicoze: 2-3 picături în ureche după o prealabilă curățire a acesteia; în dermatomicoze: 1-2 picături de 3-4 ori/zi. *Ovule:* seara înainte de culcare se introduce adânc în vagin un ovul, timp de 3-6 zile. Trat. se întrerupe în timpul ciclului menstrual și se reia după oprirea sângerării. *Cpr.:* candidoza intestinală: - *adulți:* 1 cpr. de 4 ori/zi timp de 7 zile; *copii:* 1 cpr. de 2 ori/zi timp de 7 zile; candidoza unghiilor: 1 cpr. de 4 ori/zi timp de 2-3 luni în asociere cu trat. local; candidoza extinsă a pielii: 1 cpr. de 4 ori/zi pentru adulți. Trat. se face până la o săpt. după completa dispariție a simptomelor clinice ca un adjuvant al terapiei. În cazurile rezistente de vaginită produsă de *Candida albicans*, trat. local cu ovule vaginale poate fi asociat cu un cpr. de 4 ori/zi timp de 10-20 de zile pentru adulți. La copii, în candidoza vaginală, se adm. 50 mg de 2-4 ori/zi.
Cind: Natamicină cremă, picături și tablete orale nu au Cind. Natamicină ovule vaginale: Preparatul conține și alcool etilic. În caz de hipersensibilitate la acest compus, trat. trebuie întrerupt.
RA: Crema nu are efecte adverse. *Picături:* Rareori ușoară iritație sau o senzație de arsură la nivelul mucoasei, pe locul aplicării. *Ovule:* Rareori hipersensibilizare la alcool etilic. O senzație ușoară de arsură locală după introducerea ovulului poate fi percepută, dar acest lucru nu împiedică continuarea terapiei. *Cpr.:* La începutul trat. pot surveni greață și diaree, care de obicei dispar odată cu continuarea terapiei.

NATRII AMIDOTRIZOAS *COD ATC: V08AA01*

GASTROGRAFIN® *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Sol. apoasă int. 37% (fl. × 100 ml corespunzând la 370 mg/ml iod, respectiv 370 g iod/fl.; 10 g sodiu/fl. și 66 g/fl. meglumina-midotrizoat) ***(S/P-RF)***

ODISTON *SICOMED SA;* Sol. inj. 75% (f. × 20 ml); soluție apoasă a acidului N-N'-diacetil-3,5-diamino-2,4,6-triiodbenzoic cu metilglucamină ***(S/P-RF)***

UROGRAFIN 76% *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Sol. inj. 760 mg/ml (f. × 20 ml); 1 ml soluție injectabilă 76% conține 0,10 g amidotrizoat de sodiu, 0,66 g megluminamidotrizoat în soluție apoasă (corespunzător la 370 mg iod/ml) ***(S/P-RF)***

Ind: *Sol. int.:* Evidențierea tractului gastro-intestinal. Diagnosticul precoce al unei perforații nevizibile radiologic sau al unei insuficiențe anastomotice la nivelul esofagului, al tractului gastro-intestinal, ca și pentru trat. unui ileus meconial. Tomografia computerizată a abdomenului. *Sol. inj.:* În urografia i.v. și retrogradă. În angiografie utilizând angiografia de substracție digitală (pentru coronarografie numai soluția 76%) și reprezentarea cavităților corporale.

Dz: Oral la *adulți și copii peste 10 ani:* 60-100 ml. Urografia i.v: la adulți și la tineri pentru fiecare kg de greutate corporală până la 1 ml sol. 76% (max. 100 ml). Viteza de inj. diferă după scopul urmărit: 1-2 min. în urografiile obișnuite, 15 secunde pentru urografia minutată, 10-15 min. în adm. în perf.
Cind: Hipertiroidie manifestă sau latentă, gușă nodulară. Hipersensibilitate față de substanțele de contrast ce conțin iod; tulburare funcțională gravă hepatică sau renală, IC, emfizem pulmonar, ATS cerebrală, diabet zaharat care necesită trat., o suferință cerebrală însoțită de convulsii, plasmocitom, pacienții deshidratați. Sarcină.
A!: Testarea sensibilității la iod (obligatorie). Echilibrarea prealabilă a unei tulburări hidroelectrolitice. Medicație cu alfa-blocanți datorită pericolului unor crize de HTA în feocromocitom. Sugari și copii mici.
RA: *Sol. orală:* Uneori diaree. Agravarea enterită sau colită preexistentă. În caz de aspirare, posibilitatea unui edem pulmonar. *Sol. inj.:* Rare reacții de intoleranță: bronhospasm, reacții anafilactoide, tulburări circulatorii acute; sunt necesare: hidrocortizon hemisuccinat, oxigen, acid epsilon-aminocaproic, antihistaminice, parasimpatolitice și stimulante cardiocirculatorii. Mai pot apărea: greață, vărsături, hipersalivație, sughiț, hiperemia feței, parestezii, dureri pe traiectul venei și erupții urticariene. Întrucât reacțiile adverse par a fi mai frecvente la bolnavii anxioși, agitați, se recomandă liniștirea psihicului bolnavului prin convingere sau premedicarea lui cu sedative sau tranchilizante.

NATRII AUROTHIOMALAS *COD ATC: M01CB01*

TAUREDON 10; 20; 50 *ALTANA PHARMA AG;* Sol. inj. 4,53 mg aur; 9,06 mg aur; 22,65 mg aur (f. × 0,5 ml) ***(P-RF)***

Ind: Poliartrite cronice, artrită reumatoidă juvenilă, artrită psoriazică.
Dz: Inj. i.m. profund (intragluteal) în 3 faze: de testare, de saturare și de menținere. *Adulți:* Inițial 3 f. a 10 mg, apoi 3 f. a 20 mg. Începând cu a 7-a f. se vor folosi 50 mg de 2 ori/săpt. Doza totală, cumulată de la începutul terapiei, va fi de 1600 mg (maxim 2000 mg) aurotiomalat de sodiu. După obținerea efectului terapiei doza de întreținere va fi 100 mg/lună (2 f. a 50 mg adm. odată, sau câte o f. a 50 mg la 2 săpt.). Terapia este de lungă durată (luni sau ani). *Copii:* Prima fază: 0,7-1 mg/kg/săpt.; faza de întreținere: 1 mg/kg de 1 sau 2 ori/lună. Doza de întreținere va fi de 1 mg/kg din 2 în 2 săpt., la 3-4 săpt., odată cu scăderea activității bolii. Terapia se întrerupe dacă după 6 (max. 9) luni nu se observă nici o ameliorare a bolii.
Cind: Discrazii sanguine, hipersensibilitate la sărurile de aur, tulburări ale funcției renale, afectare gravă a funcției hepatice, alergie la metale grele, tbc pulmonară activă, colagenoze (LED, panarterită nodoasă, sclerodermie, dermatomiozită), colită ulceroasă, diabet zaharat. Sarcină și alăptare. Menopauză.
A!: Se examinează periodic pielea și mucoasele. Înaintea începerii trat.: HLG și proteinuria. În primele 3 luni: examen de urină și număr de leucocite, iar din 2 în 2 săpt.: HLG, gamma-GT, fosfatază alcalină și creatinină. Imunogramă înainte de începerea terapiei și din 3 în 3 luni. La pacienții cu factor antinuclear pozitiv acesta se va controla la interval de 6 luni. Examenul radiologic pulmonar o dată pe an. Atenție la: prurit, erupții tegumentare, modificări ale mucoaselor, sângerări, metroragii, diaree, scăderea acuității vizuale, dispnee acută, tuse seacă însoțită sau nu de febră. Evitarea expunerii prelungite la radiații solare.

RA: Apar în principal pe tegumente și mucoase, în sistemul hematopoietic, rinichi, plămâni, tractul gastrointestinal și ochi. Frecvente: dermatite, stomatite, prurit, proteinurie, trombocitopenie, leucopenie, anemie. Ocazionale: probe biologice hepatice alterate, colestază, fotosensibilizare, căderea părului, simptome de pancreatită. Rare: forme severe evolutive de dermatită (ex. dermatită exfoliativă) și stomatită, nefropatie la sărurile de aur, afectarea hematopoiezei (anemie aplastică, pancitopenie). Extrem de rar (ocazional): enterocolite cu diaree apoasă, chiar sanguinolentă cu dureri abdominale colicative, bronșiolite, alveolite (cu dispnee acută), fibroză pulmonară, necroză hepatocitară, lichen rubra planus, conjunctivite, depozite de aur în cornee, ulcerații corneene, semne de imunosupresie cu scăderea imunoglobulinelor, anemie hemolitică cu sau fără icter, neuropatii periferice care se manifestă ca tulburări de sensibilitate, de coordonare (ataxie) sau cu mioclonii; afectarea nervilor cranieni (facial, abducens, trigemen) cu manifestări ca diplopia, hipotonia mușchilor feței și în special a pleoapei superioare și tulburări de sensibilitate la acest nivel, "encefalopatia la sărurile de aur" (depresie, anxietate, dezorientare, insomnie, tulburări de vorbire, halucinații), reacții neurotoxice la nivelul ochiului (afectarea nervului optic sau a retinei); la pacienți cu factor antinuclear prezent pot să apară manifestări similare LED cu vasculită și poliserozită. La începutul terapiei ocazional apar simptome cardiovasculare (reacții vasomotorii cu tahiaritmii, modificări EKG de tip ischemic, flush), cefalee, frison, hTA până la simptome de șoc, greață, dureri abdominale; stare febrilă trecătoare la câteva ore de la injectare. La doze mai mari, reacțiile adverse sunt mai frecvente. Reacțiile adverse pot să apară și la sfârșitul terapiei, datorită eliminării lente a aurului din organism.

NATRII CALCII EDETAS

COD ATC: V03AB03

EDETAMIN *TERAPIA SA;* Sol. inj. 10% (f. × 10 ml) ***(S)***

Ind: Intoxicație acută și cronică cu plumb; intoxicații cu crom, cobalt, cupru, fier, mangan, mercur, nichel, plutoniu, toriu, zinc.
Dz: Perf. i.v. lente cu sol. diluată izotonică de clorură de sodiu sau glucoză 0,3-0,5%, 30-50 mg/kg/zi, în cure de 2-3 zile, cu pauze de 2-3 zile; în encefalopatia din intoxicația cu plumb se inj. i.m. câte 25 mg, maxim 35 mg de 2 ori/zi, cu adaos de procaină.
Cind: Insuficiență renală.
A!: Datorită acțiunii sale iritante și riscului de tromboflebită, se inj. i.v. lent sau în perf. prelungită. Nu se adm. oral. Se adm. cu prudență în tbc și la cei cu bilanț deficitar în potasiu. Sarcină.
RA: Greață, diaree, colici abdominale, hTA, congestie nazală, mialgii; inj. i.v. rapidă provoacă uneori somnolență, cefalee, vertij, vomă, febră, iar în caz de edem cerebral poate fi cauză de accidente letale prin creșterea bruscă a presiunii intracraniene; trat. repetat poate provoca nefroză toxică sau dermatită; adm. i.v. de sol. concentrate poate determina tromboflebită.

NATRII CHLORIDUM

COD ATC: B05BB01
V07AB

CHLORURE DE SODIUM 0,9% *INFOSINT;* Sol. perf. 0,9% (sac PVC × 250 ml; 500 ml; 1000 ml) ***(S)***

CLORURÃ DE SODIU *SICOMED SA;* Sol. inj. 10% (f. × 10 ml); 20% (f. x 10 ml) ***(S)***

CLORURÃ DE SODIU 0,9% *SICOMED SA;* Sol. perf. 0,9% (pungi × 250 ml; 500 ml; 1000 ml; 2000 ml) ***(S)***

CLORURÃ DE SODIU 0,9% *SICOMED SA;* Sol. perf. 0,9% (saci × 500 ml; 1000 ml; 2000 ml) ***(S)***

CLORURÃ DE SODIU 0,9% *FRESENIUS KABI GmbH;* Sol. perf. 0,9% (fl. × 250 ml; 500 ml) ***(S)***

CLORURÃ DE SODIU 0,9% m/v *HELVETICA PROFARM SA;* Sol. perf. 0,9% (ct. × 10 fl. monobloc PLASCO® × 500 ml) ***(S)***

CLORURÃ DE SODIU 5,85% *B. BRAUN MELSUNGEN;* Conc. pt. sol. perf. (ct. × 20 fl. monobloc × 20 ml sau ct. × 20 fl. × 100 ml) ***(S)***

CLORURÃ DE SODIU / VIOSER *VIOSER SA;* Sol. perf. 0,9% (fl. × 1000 ml) ***(S)***

ISOTONE KOCHSALZ-LOSUNG *B. BRAUN MELSUNGEN;* Sol. perf. 0,9% (fl. × 500 ml) ***(S)***

NaCl INFUNDIBILE 0,9% *HEMOFARM;* Sol. perf. 0,9% 500 ml (fl. × 500 ml) ***(S)***

SER FIZIOLOGIC *SICOMED SA;* Sol. inj. 0,9% (f. × 10 ml) ***(S/OTC)*** *COD ATC: V07AB*

SODIO CLORURO *BIEFFE MEDITAL;* Sol. perf. 0,9% (fl. × 500 ml) ***(S)***

SODIUM CHLORIDE *BAXTER HEALT CARE;* Sol. perf. 0,9% (sac PVC × 500 ml; 1000 ml) ***(S)***

Ind: Trat. deshidratărilor izotone sau hipotone prin pierdere de lichid extracelular (diureză excesivă, gastroenterite, dietă cu restricție salină, vărsături frecvente, pareze intestinale postoperatorii, diaree profuză, arsuri întinse, boală Addison etc.). Solvent sau diluant pentru electroliți sau medicamente compatibile.
Dz: Perf. i.v. Concentrația și doza se stabilesc în funcție de vârsta, greutatea corporală, starea clinică a bolnavului și de necesarul de lichide și electroliți. Viteza de perfuzie 7,7 ml/kg și oră (180 pic./min și 70 kg). Doza zilnică medie este de 1000 ml/zi și 70 kg greutate.
Cind: Stări de hiperhidratare, hipernatremie, hipokaliemie, acidoză.
A!: Soluțiile perfuzabile de clorură de sodiu nu trebuie utilizate dacă soluția este tulbure, dacă ambalajul este perforat, sau există scurgeri de sol. Prudență în: IC și IR gravă, EPA, HTA, eclampsie, vârstnici, copii mici, sarcină. Se va evita adm. excesivă.
RA: Hipernatremie și hipercloremie. În caz de perfuzie prea rapidă poate produce diureză și diaree osmotică.

NATRII CYCLAMAS

COD ATC: V06AAN1

EDULCICLAM® *ARMEDICA SA;* Cpr. ciclamat de sodiu 100 mg ***(OTC)***

Ind: Ca înlocuitor de zahăr la diabetici și obezi.
Dz: Îndulcirea unor băuturi cum sunt: laptele, cafeaua, ceaiul; 100 mg pentru o ceașcă de cafea și 100-200 mg pentru o cană cu lapte sau ceai. Nu se descompune prin fierbere. Doza zilnică maximă este de 0,050 g/kg.
RA: În dozele recomandate, este lipsit de toxicitate.

NATRII FLUORIDUM

COD ATC: A01AA01
A12CD01
V07AS

CONCADEN *SICOMED SA;* Cpr. 0,25 mg fluorură de sodiu ***(OTC)***

FLUOCAL *SPECIALITES SEPTODONT;* Gel 2% (fl. × 125 ml) ***(OTC)***

FLUOROSTOM *INCDCF BUCUREȘTI;* Sol. bucală 0,275% (trusa = fl. × 250 ml sol. buc. + 25 pahare + recipient dozator 10 ml + 50 șervețele hârtie + pungă colectoare) ***(S)***

OSSIN *GRUNENTHAL GmbH;* Dj. ret. 40 mg ***(P-6L)***

PEDI-DENT *PHARMEX ROM IND;* Cpr. mast. 2,21 mg fluorură de sodiu, echivalent a 1 mg fluor ***(OTC)***

SENSODYNE BARBIE GEL *BLOCK DRUG COMPANY Inc.;* Gel 0,055% (tub × 30 ml) ***(OTC)***

ZIMAFLUOR *NOVARTIS CONSUMER HEALTH;* Cpr. 0,25 mg, 1 mg ***(OTC)***

Ind: Prevenirea cariei dentare.
Dz: Fluorura de sodiu trebuie adm. regulat, fără întreruperi, de la 2 săpt. la 18 ani, prin înghițire sau dizolvată într-un pahar de apă sau suc de fructe (însă nu lapte), o dată/zi, seara, în funcție de vârstă: *2 săpt.-2 ani:* 0,25 mg/zi; *2-3 ani:* 0,5 mg/zi; *4-5 ani:* 0,75 mg/zi; *peste 6 ani:* 1 mg/zi; *în timpul sarcinii* 1 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la unul din componenții fluorurii de sodiu.
A!: Trebuie avută în vedere posibilitatea unor surse adiționale de fluor pentru a preveni supradozarea. În zonele în care sarea de bucătărie sau apa sunt fluorinate (peste 0,7 mg/litru), fluorura de sodiu se recomandă a fi adm. doar în cursul sarcinii.
RA: Rareori iritație cutanată (eritem, urticarie), care dispare la întreruperea trat.

NATRII THIOSULFAS

COD ATC: R06AXN0

TIOSULFAT DE SODIU *SICOMED SA;* Sol. inj. 100 mg/ml (f. × 10 ml) ***(S)***

Ind: Manifestări alergice; neurodermite; prurit; în trat. intoxicației cu cianuri. Poate fi eficace singur în cazurile mai puțin severe, dar se folosește mai frecvent după adm. de nitrit de sodiu.

Dz: *Antialergic-antipruriginos:* Inj. i.v. lent: *adulți:* 5-20 ml sol. 10% pe zi; *copii:* 5 ml sol. 10% pe zi. Oral, în *formule magistrale: adulți:* 3-5 g/zi; *copii:* 1-1,5 g/ zi. În *intoxicația cu cianuri:* 10-14 g i.v. lent, în 10 min (după injectarea prealabilă a 10 ml sol. nitrit de sodiu 3%).
Cind: IR; copii sub 5 ani.
RA: Tulburări osmotice; soluțiile vechi inj. i.v. pot produce febră, frison, lipotimie.

NEBIVOLOLUM

COD ATC: C07AB12

NEBILET® *BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP;* Cpr. 5 mg nebivolol *(P-6L)*

Ind: HTA esențială.
Dz: *Adulți* 5 mg/zi. Efectul antihipertensiv devine evident după 1-2 săpt. de trat. În IR sau *peste 65 ani* 2,5 mg/zi. La nevoie, maxim 5 mg/zi, în timpul mesei, la aceeași oră a zilei.
Cind: Hipersensibilitate la nebivolol, tulburări ale funcției hepatice, în șoc cardiogen, IC netratată, sindrom de nod sinusal, tulburări în sistemul de conducere (bloc de sinus atrial, bloc AV de gradul 2 și 3), bronhospasm și astm bronșic în antecedente, tumoră netratată a glandei suprarenale (feocromocitom), bradicardie, sub 50 bătăi/min. Sarcină și alăptare. Copii.
A!: Pacienți peste 75 ani; în cardiopatia ischemică trat. se va întrerupe treptat timp de 1-2 săpt. Diabet: Nu infuențează nivelul glicemiei dar poate masca simptomele de hipoglicemie. Hipertiroidism: Poate fi mascată o frecvență cardiacă crescută.
RA: Foarte rar: cefalee, vertij, diaree, greață, edeme. Efectele adverse tipice ale β-blocantelor pot apărea doar în cazuri foarte rare: puls scăzut, scăderea TA, IC.

NEDOCROMIL SODIUM

COD ATC: R03BC03

TILADE® *FISONS-RHÔNE POULENC;* Aerosol susp. 2 mg/doză (fl. × 56 doze sau 112 doze + valvă și adaptor din plastic) ***(P-6L)***

TILADE® MINT *FISONS-RHÔNE POULENC;* Aerosol susp. 2 mg/doză (fl. × 56 doze sau 112 doze + valvă și adaptor din plastic) ***(P-6L)***

Ind: Trat. profilactic al astmului bronșic.
Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* Inițial, câte 2 doze de 4 ori/zi. Apoi doza de întreținere uzuală este de 2 doze de 2 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la oricare din componentele produsului.
A!: Nu se recomandă utilizarea nedocromilului în criza acută de astm. Sarcină. Alăptare.
RA: Cefalee și unele tulburări digestive (greață, vărsături, dispepsii, dureri abdominale). Tuse sau bronhospasm.

NELFINAVIRUM *COD ATC: J05AE04*

VIRACEPT *HOFFMANN LA ROCHE;* Cpr. 250 mg; Pulb. susp. 50 mg/g pulbere (fl. × 144 g pulb.) ***(S/P-RF)***

VIRACEPT® 250 mg *HOFFMANN LA ROCHE;* Cpr. film. 250 mg

Ind: În combinație cu analogi nucleozidici antiretrovirali, în trat. pacienților infectați cu HIV-1, adulți sau copii.
Dz: Oral, la mese. *Adulți și copii peste 13 ani:* 750 mg de 3 ori/zi. *Copii de 13 ani și mai mici:* 20-30 mg/kg pe doză, adm. de 3 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la nelfinavir sau la oricare din excipienți. Concomitent cu medicamente cu indice terapeutic îngust și care se metabolizează de către sistemul enzimatic CYP3A4. Prin inhibiție competitivă a metabolismului acestor medicamente, este posibil să apară efecte adverse serioase și/sau amenințătoare de viață ca aritmiile cardiace (ex. terfenadină, astemizol, cisaprid), sedare prelungită sau depresie respiratorie (ex. triazolam, midazolam). Sarcină. Alăptare.
A!: Disfuncție hepatică sau renală semnificativă. Copii sub 2 ani. Posibilități crescute de sângerare la pacienții hemofilici.
RA: Cel mai frecvent diaree. Mai rar: erupții cutanate, flatulență, greață, dureri abdominale, astenie. Parametrii de laborator: scăderea neutrofilelor, creșterea limfocitelor, creșterea creatinkinazei, creșterea ALT.

NEOSTIGMINI BROMIDUM *COD ATC: N07AA01*

MIOSTIN *LABORMED PHARMA;* Cpr.15 mg (ct. x 1 blist. x 20 cpr.; ct. x 100 blist. x 20 cpr.) ***(S/P-6L)***

MIOSTIN *SICOMED SA;* Sol. inj. 0,5 mg/ml (f. × 1 ml sau 5 ml) ***(S/P-RF)***

Ind: Miastenia gravis (test de diagnostic și trat. simptomatic). Antagonist al d-tubocurarinei și al derivatului său metil. Ileus paralitic postoperator. Retenție urinară postoperatorie. Tulburări vasculare periferice (sindrom Raynaud, trombangeita obliterantă). Poliomielita și alte boli cu tulburări neuromusculare. Adjuvant în: megacolon; hipertiroidism și miopie tireotoxică; migrene și prevenirea acceselor de tahicardie paroxistică; prevenirea trombozelor. Rinita atrofică.
Dz: Cpr: 15 mg oral la 2-4 ore. F: i.v. lent, cu atropină la îndemână. *Adulți:* miastenia gravis: 0,5-1 mg s.c. sau i.v. lent, de câteva ori pe zi (doza totală zilnică 5-20 mg); pentru decurarizare: 0,5-2,5 mg i.v. (împreună cu 0,5-1 mg atropină); ileus paralitic: 0,25-0,5 mg s.c., eventual i.v. lent la fiecare 4-6 ore. *Copii:* 0,125-1 mg inj.
Cind: Obstrucție mecanică intestinală sau urinară, astm bronșic, boala Parkinson; intoxicația cu suxametoniu și alte curarizante depolarizante. Alăptare.
A!: Epilepsie. Ulcer gastroduodenal, diaree. Bradicardie, infarct miocardic recent, IC. Hipotensiune. Tireotoxicoză. Sarcină.
RA: Crampe abdominale, spasme ale musculaturii striate, hipersalivație, mioză, uneori chiar stări de colaps. Toate aceste simptome pot fi prevenite și evitate prin adm. de 0,6 mg atropină sulfurică.

NETILMICINUM

COD ATC: J01GB07
S01AA23

NETROMYCINE *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Sol. inj. 25 mg/ml 100 mg/ml (fl. × 1,5 ml sau 2 ml) sau 25 mg/ml (fl. × 2 ml) ***(P-RF)***

NETTACIN *S.I.F.I.;* Sol. oft. 0,3% (fl. × 5 ml) ***(P-RF)***

Ind: *Adm. inj.:* trat. bacteriemiei, septicemiei (inclusiv cea neonatală), a infecțiilor grave ale căilor respiratorii, renale și ale tractului genito-urinar, cutanate și ale țesuturilor moi, a infecțiilor oaselor și ale articulațiilor, arsurilor, plăgilor și infecțiilor perioperatorii, abdominale (inclusiv peritonitei), ale tractului gastro-intestinal cauzate de: Escherichia coli, Klebsiella-Enterobacter-Serratia sp., Citrobacter sp., Proteus sp. (indol pozitiv și negativ), Pseudomonas aeruginosa și Staphylococcus sp. (coagulazo-pozitivi și negativi, inclusiv tulpini penicilino- și meticilino-rezistente) și Neisseria gonorrhoeae. Se poate asocia cu carbenicilina sau ticarcilina, în trat. infecțiilor cu Pseudomonas aeruginosa, sau cu o beta-lactamină în trat. endocarditei streptococice, precum și la nou-născuții cu septicemie sau cu pneumonie stafilococică. Este eficientă în trat. infecțiilor cauzate de microorganisme rezistente la alte aminoglicozide. *Adm. conjunctivală:* Infecții oculare externe și ale anexelor, produse de către germeni sensibili la netilmicină, inclusiv cei producători de enzime acetilante și fosforilante.

Dz: *Inj. i.v. sau i.m.* în 2-3 doze egale zilnice; concentrația maximă măsurată între 30 min. și o oră de la adm., se estimează a fi între 4 și 12 μg/ml; maxim 16 μg/ml. Durata uzuală a trat.: 7-14 zile. *Adulți cu funcție renală normală:* infecții urinare sau infecții sistemice care nu prezintă risc letal 4-6 mg/kg/zi, adm. în 2-3 doze egale, la 8-12 ore sau o dată/zi. În infecții cu risc letal 7,5 mg/kg/zi, în 3 doze egale, la 8 ore. *Prematuri sau nou-născuți la termen, în vârstă de până la o săpt.:* 6 mg/kg/zi (3,0 mg/kg, o dată la 12 ore). *Nou-născuți mai mari de o săpt. și sugari:* 7,5-9 mg/kg/zi (2,5-3 mg/kg, o dată la 8 ore). *Copii:* 6-7,5 mg/kg/zi (2-2,5 mg/kg, o dată la 8 ore). *Pacienți cu funcție renală alterată:* fie mărirea intervalului între doze prin multiplicarea nivelului creatininei serice (mg/100 ml) cu 8, fie micșorarea dozelor. După adm. dozei inițiale (încărcare), o metodă orientativă de determinare a dozelor adm. la interval de 8 ore este împărțirea dozei uzuale recomandate la nivelul creatininei serice. *Adm i.v.:* în IC congestivă, boli hematologice, arsuri grave sau bolnavi cu masă musculară redusă. Se diluează în 50-200 ml de ser fiziologic sau într-o sol. sterilă de glucoză 5%, cu perfuzare pe o durată de o jumătate de oră până la două ore sau inj. direct i.v. lent, în 3-5 min. Regimuri speciale de dozare: *Gonoreea,* la bărbați și femei: doză unică inj. i.m. de 300 mg, câte o jumătate de doză în fiecare fesă. *Infecții urinare necomplicate:* doză unică zilnică i.m. de 3 mg/kg, timp de 7-10 zile. *Hemodializați:* la sfârșitul fiecărei perioade de dializă 2 mg/kg. *Adm. conjunctivală:* se instilează 1-2 picături de 3 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitatea sau reacțiile toxice grave la netilmicină sau la alte aminoglicozide. Sarcină. Alăptare.

A!: Netilmicina nu va fi amestecată cu alte medicamente. Monitorizare funcție renală și acustică, mai ales la pacienții cu funcție renală alterată, la vârstnici sau la adm. de doze mari. Repetate examene de urină; dozarea periodică a azotemiei, a creatininei serice și clearance-ului la creatinină. Apariția ototoxicității sau a nefrotoxicității impune ajustarea dozelor sau întreruperea terapiei. Monitorizarea concentrațiilor serice de netilmicină – maxim 16 μg/l și minim

0,5-2 µg/ml. Atenție la pacienții cu arsuri pe suprafețe mari ale corpului. Vârsta înaintată și deshidratarea pot crește riscul reacțiilor adverse. Atenție la pacienții care primesc blocanți neuromusculari: succinilcolina, tubocurarina sau decametonium, anestezice sau transfuzii masive de sânge cu anticoagulant pe bază de citrat. În cazul în care apare blocada neuromusculară, se vor adm. săruri de calciu. Precauție în cazul pacienților cu afectări neuromusculare (miastenia gravis, parkinsonism sau botulinism la copii) – risc de agravare a afectării musculare datorită potențialelor efecte de tip curara asupra joncțiunii neuromusculare. La unii adulți și sugari tratați cu sulfat de netilmicină, s-a constatat apariția unui sindrom Fanconi-like, cu aminoacidurie și acidoză metabolică. Există alergie încrucișată între aminoglicozide. Pacienții vor fi bine hidratați în cursul trat. Există un risc de selectare a germenilor rezistenți la produs. Netilmicina conține metabisulfit de sodiu și sulfit de sodiu care pot produce reacții de tip alergic, inclusiv simptome de anafilaxie și episoade astmatice mai mult sau mai puțin severe la pacienții sensibili (astmatici).
RA: *Adm. sistemică:* Nefrotoxicitate și neurotoxicitate acustico-vestibulară: mai frecvent la bătrâni, pacienți cu afectare renală anterioară și la cei cu trat. mai lungi și în doze mai mari. Simptomele ototoxicității: amețeală, vertij, acufene, tinitus și pierderea auzului. Mai rar apar: cefalee, stare de disconfort, tulburări vizuale, tulburări de orientare, tahicardie, hTA, palpitații, parestezii, exantem, frisoane, febră, retenție de fluide, vomă și diaree. În cazuri foarte rare, anafilaxie. Modificările testelor de laborator: hiperglicemie, creșterea fosfatazei alcaline, creșterea AST sau ALT; creșterea bilirubinei, potasiului; nivel scăzut al Hb, leucocitelor și trombocitelor; eozinofilie și creșterea timpului de protrombină. Foarte rar durere la locul injecției sau reacții locale. *Adm. conjunctivală:* Folosirea îndelungată poate să inducă ocazional dezvoltarea unor microorganisme insensibile și rezistente, cum sunt fungii. Uneori apare iritație sau hipersensibilitate (edem, urticarie și usturime) la un component al produsului.

NEVIRAPINUM

COD ATC: J05AG01

VIRAMUNE® *BOEHRINGER INGELHEIM;* Susp. orală 50 mg/5 ml (fl. × 240 ml + seringă × 5 ml) ***(S/P-RF)***

VIRAMUNE® *BOEHRINGER INGELHEIM;* Cpr. 200 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Terapia combinată antivirală pentru pacienții infectați cu HIV-1 aflați în stadiu de imunodeficiență avansată sau progresivă.
Dz: *2 luni până la 8 ani:* 4 mg/kg o dată/zi timp de 2 săpt., urmată apoi de 7 mg/kg de 2 ori/zi. Doza zilnică totală maximă 400 mg/zi, indiferent de vârsta pacientului. *8-16 ani:* 4 mg/kg o dată/zi timp de 2 săpt., urmată apoi de 4 mg/kg de 2 ori/zi, maxim 400 mg/zi. *Peste 16 ani:* 200 mg o dată/zi, în primele 14 zile, urmată de 200 mg, de 2 ori/zi, în asociere cu cel puțin alte două produse antiretrovirale, care nu au mai fost adm. anterior pacientului. Pacienților cărora le-a apărut rash cutanat în timpul celor 14 zile de testare, în care li se adm. doza de 200 mg/zi (4 mg/kg/zi la copii), nu trebuie să li se mai mărească doza de nevirapină până la dispariția rash-ului. Pacienții care au întrerupt trat. cu nevirapină pentru o perioadă mai mare de 7 zile trebuie să reînceapă cu doza recomandată inițial, folosind 200 mg/zi (4 mg/kg/zi la copii) în primele 14 zile de testare, urmată de 200 mg de 2 ori/zi (4-7 mg/kg, de 2 ori/zi) la copii, funcție de vârstă.

Cind: Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți. IH și IR. Sarcină și alăptare.
A!: În cazul pacienților tratați cu nevirapină au apărut reacții cutanate grave și care au pus în pericol viața, inclusiv sindrom Stevens-Johnson și necroliză epidermică toxică, uneori fatale. Pacienții trebuie informați că cea mai importantă reacție adversă a nevirapinei este apariția oricărei forme de rash, mai ales în primele 6 săpt. de la începerea trat. Trat. trebuie întrerupt în cazul formelor grave de rash cutanat sau însoțit de febră, pustule, leziuni bucale, conjunctivită, edem facial, sudorație, mialgii sau artralgii, stare generală alterată. Au apărut cazuri de hepatotoxicitate gravă, inclusiv hepatită fulminantă fatală. Adm. trebuie întreruptă la cei cu modificări moderate sau severe ale testelor funcției hepatice și reluată cu prudență. Adm. trebuie întreruptă definitiv dacă la o nouă adm. reapar alterări moderate sau severe ale funcției hepatice. Se monitorizează ALT și AST, în special pe parcursul primelor 6 luni de trat. Adm. nevirapinei nu vindecă infecția HIV-1; pacienții pot să prezinte în continuare afecțiuni asociate cu infecția HIV-1 în stadiu avansat, inclusiv infecții oportuniste. Terapia cu nevirapină nu a redus riscul de transmitere a HIV-1 prin contact sexual sau prin contaminare sanguină. Contraceptivele orale și alte metode hormonale de contracepție nu trebuie folosite ca metode contraceptive unice la femeile cărora li se adm. nevirapină, deoarece există riscul unei sarcini. Șoferi și activități de precizie.
RA: Adulți: rash, greață, oboseală, febră, cefalee, somnolență, vărsături, diaree, dureri abdominale și mialgii. Creșterea ALT, AST, GGT, bilirubinei totale și fosfatazei alcaline. Uneori icter, hepatotoxicitate gravă, inclusiv cazuri letale de hepatită fulminantă. Erupții cutanate eritematoase maculopapuloase, cu sau fără prurit; reacții alergice (reacții anafilactice, edem angioneurotic și urticarie); uneori reacții cutanate grave ca sd. Stevens-Johnson și necroliză epidermică toxică. Marea majoritate a formelor grave de rash au apărut în primele 28 de zile de trat. Copii (sub 16 ani): similare cu cele observate la adulți; granulocitopenie mai frecventă.

NICERGOLINUM

COD ATC: C04AE02

NICERIUM-10 *HEXAL AG;* Dj. 10 mg nicergolină ***(P-6L)***

NICERIUM-15 *HEXAL AG;* Cps. cu elib. modif. 15 mg ***(P-6L)***

NICERIUM 30 uno *HEXAL AG;* Cps. cu elib. modif. ***(P-6L)***

SERMION® *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Dj. 10 mg și 30 mg ***(P-6L)***; Liof. pt. sol. inj. 4 mg (ct. × 4 fl. liof. + 4 f. solvent × 4 ml) ***(S/P-RF)***

SINERGOLIN 10 *SINTOFARM SA;* Dj. 10 ml ***(P-6L)***

Ind: Tulburări cerebrale vasculare sau metabolice acute și cronice (ATS cerebrală, tromboza și embolia cerebrală, ischemia cerebrală tranzitorie). Tulburări vasculare periferice acute și cronice (arteriopatie obliterantă a membrelor, sindrom Raynaud, alte sindroame de insuficiență circulatorie periferică). Cefalee. Adjuvant în trat. HTA, iar pe cale parenterală și în crizele hipertensive.
Dz: *Oral:* 5-10 mg de 3 ori/zi la intervale regulate pe perioade lungi de timp, între mese. *Inj. i.m.:* 2-4 mg de 2 ori/zi. *Perf. i.v. lentă:* 4-8 mg/doză în 100 ml

ser fiziologic sau glucoză. *Inj. intraarterial:* 4 mg/doză în 10 ml ser fiziologic, adm. timp de 2 min. Se poate începe trat. pe cale parenterală și continu pe cale orală.
Cind: Hipersensibilitate la nicergolină. Hemoragii acute, infarct miocardic recent, hTA severă.
A!: Nicergolina poate să potențeze efectul medicamentelor antihipertensive. După adm. parenterală este indicat ca pacientul să rămână în repaus câteva minute, mai ales la debutul trat. Sarcină. Alăptare. Șoferi și activități de precizie.
RA: Hipotensiune și vertij (după adm. parenterală), ușoare tulburări gastrice, senzație de căldură și roșeață cutanată, somnolență, insomnie.

NICLOSAMIDUM

COD ATC: P02DA01

NICLOSAMID *SICOMED SA;* Cpr. 500 mg niclosamid ***(P-RF)***

Ind: Teniază, botriocefaloză, himenolepidoză.
Dz: Oral, în doză unică de 2 g la *adulți și copiii mai mari de 6 ani,* 1 g la *copiii între 2 și 6 ani* și 0,5 g la cei *sub vârsta de 2 ani.* Cpr. se iau într-o singură priză, după micul dejun, bine sfărâmate sau prin desfacere în puțină apă. În caz de constipație, intestinul trebuie evacuat în prealabil printr-un purgativ salin adm. la 1-2 ore după antihelmintic, pentru eliminarea fragmentelor de parazit înainte de a fi digerate (evitând astfel cisticercoza). În himenolepidoză, după prima doză se adm. 6 zile consecutiv 1/2 din aceasta.
Cind: Este contraindicat consumul de alcool în timpul trat. cu niclosamid și cel puțin 2 zile după întreruperea lui.
A!: Pentru *Taenia solium* există pericolul dezvoltării cisticercozei.
RA: Tulburări digestive minore și trecătoare: epigastralgii, greață, vomă, dureri abdominale. Mai rar: cefalee, urticarie și alte erupții cutanate, prurit anal, vertij.

NICOTINUM

COD ATC: N07BA01

NICORETTE MINT *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Gumă de mestecat 2 mg sau 4 mg nicotină/pastilă (ct. × 30 buc.) ***(OTC)***

Ind: Terapie de substituție în perioada de renunțare la fumat.
Dz: *Adulți:* Concentrația gumei de mestecat trebuie aleasă în funcție de dependența de nicotină a fumătorului. Majoritatea fumătorilor au nevoie de 8-12 pastile pe zi. Durata trat. este individualizată, dar minim 3 luni. Doza de nicotină trebuie redusă treptat. Trat. trebuie oprit atunci când doza zilnică este redusă la 1-2 pastile. Pentru tehnica de mestecare.
Cind: Nu se utilizează pe perioade mai lungi de 1 an. Copii.
A!: Boală ulceroasă activă. Angină pectorală severă. Infarct miocardic recent. Esofagită. Afecțiuni ale articulației temporo-mandibulare. Sarcină. Alăptare.
RA: Majoritatea apar în prima săpt. de la începerea trat. și sunt datorate fie tehnicii incorecte de mestecare, fie efectelor farmacologice locale sau sistemice ale nicotinei. Simptome ca iritabilitate, tulburări ale somnului sau ușoare dureri de cap pot fi determinate de sindromul de abstinență datorită unor nivele

nicotinice reduse. S-au consemnat leziuni ale mucoasei bucale semnalate pe perioada renunțării la fumat. RA frecvente: amețeli, dureri de cap, grețuri, disconfort gastrointestinal, sughițuri, dureri musculare mandibulare, senzație de uscăciune la nivelul gâtului și gurii. Uneori se poate menține dependența nicotinică după renunțarea la fumat. Guma de mestecat se poate lipi și rareori poate afecta dantura. Mult mai rar pot apărea: palpitații, fibrilație atrială reversibilă, aritmii, urticarie, eritem.

NIFEDIPINUM

COD ATC: C08CA05

ADALAT CR 20; CR 30; CR 60 *BAYER AG;* Cpr. ret. gits 20 mg; 30 mg sau 60 mg nifedipină ***(P-6L)***

ADALAT RETARD *BAYER AG;* Cpr. ret. 20 mg nifedipină ***(P-6L)***

CORDIPIN *KRKA d.d.;* Cpr. 10 mg ***(P-6L)***

CORDIPIN RETARD *KRKA d.d.;* Cpr. ret. 20 mg ***(P-6L)***

CORINFAR 10 RETARD *AWD Pharma GmbH & Co. KG;* Cpr. ret. 10 mg nifedipină ***(S/P-6L)***

CORINFAR 20 RETARD *AWD Pharma GmbH & Co. KG;* Cpr. ret. 20 mg nifedipină ***(S/P-6L)***

EPILAT RETARD *E.I.P.I.C.O.;* Dj. 20 mg nifedipină ***(P-6L)***

NIFADIL *ALKALOID AD;* Cpr. film. 10 mg ***(S/P-6L)***

NIFECARD XL 60 mg *LEK PHARMACEUTICALS;* Cpr. film. cu elib. prel. 60 mg

NIFEDIPIN 10 mg *TERAPIA SA;* Dj. 10 mg nifedipină ***(S/P-6L)***

NIFEDIPIN RETARD 20 mg *TERAPIA SA;* Cpr. film. 20 mg nifedipină ***(P-6L)***

NIFEDIPIN *EUROPHARM SA;* Cps. 10 mg nifedipină ***(S/P-6L)***

NIFEDIPIN *LAROPHARM SRL;* Cpr. 10 mg nifedipină ***(P-6L)***

NIFEDIPIN *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Cpr. film. 10 mg ***(P-6L)***

NIFEDIPIN *PROMEDIC SRL;* Dj. 10 mg nifedipină ***(P-6L)***

NIFEDIPIN PHARMAVIT *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Cpr. film. 20 mg ***(P-6L)***

Ind: Angină vasospastică (angina Prinzmetal, angina variantă) – în monoterapie; angină pectorală cronică stabilă (angina de efort); HTA esențială.
Dz: Doza trebuie atinsă treptat, începând cu doze inițiale mici. *Angina pectorală vasospastică și angina cronică stabilă:* 20 mg de 2 ori/zi, posibil și 40 mg de 2 ori/zi. Doza zilnică maximă 80 mg. *HTA esențială:* 10 mg de 2 ori/zi, cu creștere treptată la 40 mg de 2 ori/zi. Doza zilnică 80 mg. Cpr. retard se adm. după mese. Intervalul între 2 adm. este de 12 ore (dimineața și seara). Dacă sunt necesare adm. mai frecvente, intervalul între două adm. nu va fi mai scurt de 4 ore.

Cind: Șocul cardiovascular; stenoza aortică severă; angina pectoră instabilă; IMA (în primele 4 săpt.); hipersensibilitate cunoscută la nifedipină. Sarcină. Alăptare.
A!: hTA (valori sistolice sub 90 mmHg); IC decompensată. Risc de hTA la pacienții dializați, cu hipertensiune malignă, IR ireversibilă și hipovolemie. Se reduce doza la cei cu funcție hepatică alterată și care prezintă concomitent afecțiuni severe cerebro-vasculare. Șoferi și activități de precizie.
RA: În primele săpt. de trat. poate să apară poliurie. În caz de IR se poate produce o înrăutățire temporară a funcției renale. La pacienții cu HTA sau afecțiuni coronariene, întreruperea bruscă a trat. poate declanșa criză hipertensivă sau ischemie miocardică ("fenomenul de rebound"). Mai ales la începutul trat. pot să apară cefalee, flush (congestia feței sau a pielii) și senzație de căldură, crize de angină pectorală. S-au semnalat: obnubilare, palpitații, tahicardie, scăderea TA, edeme ale membrelor inferioare, amețeală, fatigabilitate și parestezii. Rareori apar tulburări gastrointestinale: grețuri, flatulență și diaree; reacții cutanate ca prurit, urticarie, exantem, dermatită exfoliativă. În cazul unui trat. de lungă durată la pacienții vârstnici s-a semnalat ginecomastie reversibilă. Foarte rar modificări ale tabloului sanguin ca: anemie, leucopenie, trombocitopenie, purpură trombocitopenică și hiperglicemie tranzitorie. Cazuri izolate de IMA. La doze mari pot să apară mialgii, tremor și o modificare minoră, tranzitorie a percepției vizuale. În trat. de lungă durată pot să apară modificări gingivale reversibile (hiperplazia gingivală). Tulburări ale funcției hepatice: colestază intrahepatică, creșterea transaminazelor și o hepatită alergică.

NIFURATELUM *COD ATC: G01AX05*

MACMIROR *POLI IND. CHIMICĂ;* Dj. nifuratel 200 mg ***(P-RF)***

MACMIROR *CSC PHARMACEUTICALS;* Ovule ***(P-RF)***

MACMIROR COMPLEX *CSC PHARMACEUTICALS;* Ovule ***(P-RF)***

Ind: Infecții urinare – cistite, uretrite, prostatite, pielonefrite – și infecții vulvovaginale cu floră mixtă – *Trichomonas, Candida*, bacterii sensibile.
Dz: *Oral,* în vaginite 4 dj./zi timp de 10 zile (se recomandă și trat. partenerului); în infecțiile urinare 6 dj./zi, timp de 10 zile, la nevoie 8 dj./zi, 20 de zile; doza zilnică se adm. în 3-4 prize, la mese.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută nifuratel.
A!: Trat. prelungit poate induce sensibilizări, caz în care adm. trebuie să fie întreruptă. În timpul trat. se vor evita băuturile alcoolice (posibilitatea de reacții de tip disulfiram).
RA: Rareori greață, vomă, diaree, erupții cutanate alergice.

NIFUROXAZIDUM *COD ATC: A07AX03*

ERCEFURYL *SANOFI~SYNTHELABO;* Cps. 200 mg nifuroxazid ***(P-RF)***

Ind: Diaree acută de origine presupus bacteriană, în absența fenomenelor invazive. Trat. nu se substituie unei rehidratări.
Dz: *Adulți:* 4 cps./zi în 4 prize, maxim 7 zile.
Cind: Orice antecedent de reacție alergică la derivatele de nitrofuran. Prematuri și nou-născuți până la 1 lună.

A!: În caz de diaree infecțioasă cu manifestări clinice sugerând un fenomen invaziv, trebuie prevăzută o antibioticoterapie sistemică. Indicația nu justifică un trat. prelungit.
RA: Reacții alergice.

NIMESULIDUM

COD ATC: M01AX17

AULIN 100 *HELSINN BIREX;* Cpr. 100 mg nimesulid ***(P-RF)***

AULIN® 100 mg *HELSINN BIREX;* Gran. pt. susp. orală 100 mg/plic (ct. × 15 plicuri sau 30 plicuri) ***(P-RF)***

AULIN 100 Tablete *CSC PHARMACEUTICALS;* Tb. ***(P-RF)***

AULIN 100 Granule *CSC PHARMACEUTICALS;* Gran. ***(P-RF)***

LEMESIL *ANFARM HELLAS;* Cpr. 100 mg ***(P-RF)***

MESID® *BIOPROGRESS SPA;* Gran. susp. 100 mg/plic ***(P-RF)***

MESULENE *LFI;* Cpr. 100 mg; Pulb. susp. 100 mg/plic ***(P-RF)***

NIMESIL *LABORATORI GUIDOTTI SpA;* Gran. pt. susp. orală 100 mg/plic ***(P-RF)***

NIMESULID 100 mg *MAGISTRA C & C;* Cpr. 100 mg ***(P-RF)***

NIMESULID LPH 100 mg *LABORMED PHARMA;* Cpr. 100 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr.; ct. × 200 blist. × 10 cpr. ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. inflamațiilor articulare, bolilor reumatice, în procesele inflamatorii ale țesuturilor moi, în dureri și inflamații postoperatorii și posttraumatice. Pentru scăderea febrei și pentru atenuarea durerilor cauzate de inflamația acută a căilor respiratorii superioare, cavității bucale, tractului urogenital și durerilor menstruale.
Dz: Pentru *copiii mai mari de 12 ani și adulți,* 1 cpr. de 2 ori/zi, maxim 400 mg/zi.
Cind: Sensibilitate cunoscută la nimesulid. Ulcer gastric sau duodenal. Funcție hepatică alterată. Alăptare.
A!: La pacienții cu funcția renală alterată, se adm. numai în cazul în care Cl la creatinină este mai mare de 30 ml/min. Prudență la copiii mai mici de 12 ani, gravidele în ultimul trimestru de sarcină și bolnavii sensibili la alt AINS sau aspirină.
RA: Arsuri epigastrice trecătoare. În cazuri izolate pot să apară reacții alergice cutanate, cefalee, greață sau vărsături.

NIMODIPINUM

COD ATC: C08CA06

BRAINAL *LAB. ANDROMACO;* Cpr. film. 30 mg ***(P-6L)***; Sol. perf. 0,2 mg/ml (fl. × 50 ml + perfuzor) ***(S)***

DILCEREN comprimate; DILCEREN soluþie perfuzabilă *SLOVAKOFARMA;* Cpr. 30 mg ***(P-6L)***; Sol. perf. 10mg/50 ml ***(S)***

NEMOTAN *MEDOCHEMIE Ltd.;* Cpr. 30 mg nimodipin ***(P-6L)***

NIMODIPIN *LAROPHARM SRL;* Cpr. 30 mg ***(P-6L)***

NIMODIPIN *NICOFARM PROD SRL;* Cpr. 30 mg ***(P-6L)***

NIMOTOP *BAYER AG;* Sol. perf. 0,2 mg/ml (fl. × 50 ml + set perf.) ***(S)***

NIMOTOP® *BAYER AG;* Sol. perf. 10 mg/ml (fl. × 50 ml + set perf.) ***(S)***

NIMOTOP® *BAYER AG;* Cpr. film. 30 mg ***(P-6L)***

Ind: Prevenirea și trat. deficiențelor ischemice neurologice cauzate de spasme vasculare cerebrale, hemoragii subarahnoidiene de origine anevrismală sau traumatică. Trat. tulburărilor funcțiilor cerebrale la vârstnici cu simptome pronunțate cum ar fi pierderea memoriei, alterarea capacității de efort și concentrare și labilitate psihică
Dz: *În hemoragia subarahnoidiană de origine anevrismală:* 5-14 zile de trat. cu sol. perf., început la maxim 4 zile după hemoragie, apoi oral 6 × 60 mg/zi la 4 ore interval timp de 7 zile. *În hemoragia subarahnoidiană de origine traumatică:* 7-10 zile de trat. cu sol. perf. apoi oral 6 × 60 mg/zi la 4 ore interval timp de 11-14 zile. *Trat. tulburărilor cerebrale datorate vârstei:* oral timp de câteva luni. Nimodipinul sol. perf. se adm. în perf. continuă i.v. via cateter central folosind o pompă de perfuzie. *Instilații în ventriculii cerebrali:* intraoperator o sol. de nimodipin diluată proaspăt preparată (1 ml de nimodipin sol. perfuzabilă și 19 ml sol. Ringer lactat) încălzită la temperatura corpului (a sângelui) poate fi instilată intraventricular.
Cind: Alterare severă a funcțiilor hepatice (ciroză hepatică). Nu se adm. asociată cu medicamente antiepileptice (fenobarbital, fenitoină sau carbamazepină).
A!: Precauție în caz de edem cerebral generalizat sau o creștere marcată a presiunii intracraniene (HIC). La pacienții vârstnici cu afecțiuni multiple, în caz de alterare severă a funcției renale (rata filtrării glomerulare < 20 ml/min) și în caz de alterare severă a funcțiilor cardiovasculare, trebuie supraveghere atentă. Precauție la pacienții cu hTA (presiunea sistolică mai mică decât 100 mmHg). Sarcină. Șoferi și activități de precizie.
RA: Greață, rareori ileus paralitic (modificări de tranzit intestinal datorate parezei intestinale); amețeală, cefalee, senzație de slăbiciune; în rare cazuri pot apărea simptome de hiperactivitate a SNC caracterizate prin agitație motorie crescută, excitație, agresivitate sau transpirație. În cazuri izolate s-au observat hiperkinezie și stări depresive. Mai pot apărea: scădere marcată a TA, în special când valorile inițiale sunt crescute, flush, senzație de căldură, edeme periferice, bradicardie sau, mai rar, tahicardie. Foarte rar trombocitopenie.

NISOLDIPINUM *COD ATC: C08CA07*

BAYMYCARD® 5/10 *BAYER AG;* Cpr. film. 5 mg și 10 mg nisoldipină ***(P-6L)***

Ind: Angină pectorală cronică stabilă, HTA.
Dz: De 2 ori câte 5-10 mg/zi, în timpul meselor, pentru ambele indicații. Se poate crește treptat doza zilnică la 2 × 20 mg nisoldipină. Pentru întreruperea trat., doza se reduce treptat, în special când s-a ajuns la doze mari.
Cind: Risc de șoc la pacienții cărora li se adm. rifampicină sau fenitoină cronic. În caz de hipersensibilitate la orice component al tabletei. Nu se asociază cu suc de grapefruit. Sarcină și alăptare. Copii.

A!: La începutul trat. pot apărea foarte rar crize de angină sau chiar IMA. În caz de funcție hepatică diminuată activitatea nisoldipinei poate fi potențată și prelungită; se începe cu o doză cât mai mică (1 × 5-10 mg/zi), iar pacientul trebuie monitorizat pe durata trat. Siguranța nisoldipinei la pacienții cu IC nu a fost stabilită. Precauție la pacienții cu TA foarte scăzută (presiune sistolică mai mică decât 90 mmHg) și la pacienții cu stenoză aortică severă; șoferi și activități de precizie.
RA: Apar mai ales la începutul trat. sau în urma unor doze mari, dar sunt în general ușoare și tranzitorii: cefalee, vasodilatație, amețeală, palpitații, tahicardie, dispnee, durere toracică, angină pectorală, hTA, edeme periferice, astenie, greață, dispepsie, diaree, parestezii, rash și prurit, modificarea testelor hepatice. Foarte rar pot apărea: poliurie, hiperplazie gingivală, ginecomastie, dermatite fotosensibile.

NITRAZEPAMUM *COD ATC: N05CD02*

NITRAZEPAM 2,5 mg; NITRAZEPAM 5 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. 2,5 mg respectiv 5 mg ***(S/P-RF)***

NITRAZEPAM 5 mg *ARMEDICA SA;* Cpr. 5 mg nitrazepam ***(S/P-RF)***

Ind: Tulburări de somn - insomnie, somn agitat și neodihnitor, adormire dificilă - și stări de tensiune emoțională, suprasolicitare nervoasă, anxietate, depresii psihice, care sunt însoțite de tulburări ale ritmului normal veghe-somn. Tulburări de somn la bătrâni și copii.
Dz: Se va folosi doza minimă eficientă, pe o durată de maxim 4 săpt. și, dacă este posibil, intermitent. Nu se recomandă un trat. cronic, de lungă durată. Întreruperea unui trat. mai îndelungat se va face într-o perioadă mai lungă de timp. *Oral: Adulți:* 5 mg seara la culcare – la nevoie, până la 10 mg în condiții ambulatorii și 20 mg în staționar. *Vârstnici:* 2,5-5 mg/zi. *Copii 6-14 ani:* 5 mg/zi. *Copii 1-6 ani:* 1,25-2,5 mg/zi.
Cind: Alergie la benzodiazepine, insuficiență pulmonară acută, deprimare respiratorie, miastenie gravă, psihoză cronică, depresie, tulburări de personalitate.
A!: Prudență la bătrâni, bolnavi cu insuficiență respiratorie cronică și cu ATS cerebrală avansată (doze mici). Primul trimestru de sarcină. Șoferi și activități de precizie.
RA: Dereglează mai puțin ca hipnoticele barbiturice modelul fiziologic al somnului; uneori somnolență sau vertij la trezire (mai ales când se adm. repetat); bătrânii pot prezenta stări confuzionale (se recomandă doze mici); mai rar scăderea libidoului, hipotonie musculară, amețeli, artralgii (trat. îndelungat cu doze mari). Utilizarea abuzivă prelungită poate fi cauză de dependență de tip barbituric.

NITRENDIPINUM *COD ATC: C08CA08*

LUSOPRESS *LUSO FARMACO;* Cpr. 20 mg nitrendipină ***(P-6L)***

NITRENDIPIN 10 mg *INCDCF BUCUREȘTI;* Dj. 10 mg ***(P-6L)***

UNIPRES® 10 *KRKA d.d.;* Cpr. 10 mg nitrendipină ***(P-6L)***

UNIPRES® 20 *KRKA d.d.;* Cpr. 20 mg nitrendipină ***(P-6L)***

Ind: Trat. HTA.
Dz: 20 mg o dată/zi, eventual 10 mg de 2 ori/zi. La nevoie, se poate crește, treptat, până la 20 mg de 2 ori/zi. Doza zilnică maximă - 40 mg. La vârstnici și în IH se începe cu 10 mg o dată/zi, crescând, la nevoie, până la 20 mg o dată/zi sau 10 mg de 2 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la nitrendipină sau alți antagoniști de calciu cu structură dihidropiridinică, IMA în primele 4 săpt., angină pectorală instabilă, șoc cardiogen. Sarcină și alăptare.
A!: La vârstnici, în IH sau la cei ce primesc deja alte antihipertensive se începe cu doze mici. Prudență la pacienții cu hTA, IC decompensată și stenoză aortică marcată. Șoferi și activități de precizie.
RA: Frecvent: edeme ale gleznelor, amețeli, bufeuri și congestie facială, cefalee care dispare la adm. cronică, dar obligă la întreruperea trat. în 5-10% din cazuri. Mai rar tahicardie și palpitații, hTA ortostatică, oboseală, grețuri și prurit. Poate provoca creșterea natriurezei și diurezei în primele zile de trat. Uneori creșteri ale fosfatazelor alcaline. La coronarieni poate provoca dureri precordiale, care survin la 15-30 min. după adm. Această reacție adversă, rară, impune întreruperea trat.

NITROGLYCERINUM *COD ATC: C01DA02*

MINITRAN 5; MINITRAN 10 *3M MEDICA;* Sist. transderm 36 mg ***(P-6L)***

NITRO-MACK RETARD *HEINRICH MACK NACHF GmbH & Co.;* Cps. ret. 2,5 mg sau 5 mg ***(P-6L)***

NITRO 5 mg/ml (conc. perf.) *ORION;* Sol. perf. 5 mg/ml (f. × 5 ml) ***(S)***

NITRODERM TTS 5 *NOVARTIS PHARMA;* Sist. transderm 25 mg/ 10 cm ***(P-6L)***

NITROGLICERINĂ *SICOMED SA;* Cpr. 0,5 mg nitroglicerină ***(P-6L)***

NITROMINT RETARD *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Cpr. ret. 2,6 mg ***(P-6L)***

NITROMINT® sublingual *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Aerosol 0,4 mg/ doză (fl. × 10 g = 180 doze) ***(P-6L)***

TRINITROSAN *MERCK KGaA;* Sol. inj. 5 mg/ml nitroglicerină (f. × 1 ml) ***(S)***

Ind: *Cpr. obișnuite (bucale):* trat. crizelor de angină pectorală, trat. preventiv pe termen foarte scurt (sau precritic) al crizelor anginoase. Trat. profilactic al crizelor de angină pectorală. *Formele ret.:* Profilaxia și trat. anginei de efort și vasospastice. În insuficiența cardiacă pentru suplimentarea trat. digitalic și diuretic. Forma ret. nu se adm. în trat. atacului de angină pectorală. *Aerosol:* Prevenirea atacului anginos prin adm. înaintea efortului fizic. Terapia adjuventă în cazurile urgente de IC stângă (astm cardiac). Pentru scăderea presiunii de umplere în IMA. *Sol. inj.* IMA cu și fără insuficiență ventriculară stângă. Insuficiență ventriculară stângă cu EPA și subacut. Criză hipertensivă cu decompensare cardiacă.

Dz: *Cpr. bucale:* Perlingual câte 1/2-1 cpr. în timpul crizelor de angină pectorală sau imediat înaintea efortului provocator. Doza se poate repeta după 15 minute. Dacă după adm. a 3 doze sub formă de cpr. criza de angină nu cedează, se recomandă prezentarea la medic pentru suspiciune de IMA. *Dispozitive transdermice:* Se aplică pe piele într-o zonă sănătoasă, uscată și curată, cu pilozitate redusă. Se începe cu Nitroderm TTS 5, câte un sistem pe zi. Ulterior, în cazul unui răspuns nesatisfăcător, se poate trece la Nitroderm TTS 10, un sistem zilnic. Dacă apar fenomene de tahifilaxie, se folosește trat. intermitent, cu interval liber de 8-12 ore pe zi, mai ales în cursul nopții. *Cpr. ret.:* uzual 1 cpr. de 2 ori/zi înainte de masă (dimineață și la prânz). Dacă este necesar doza se poate crește la 2-3 cpr. de 2 ori/zi. În IC trebuie făcută o pauză de câteva zile după o perioadă de trat. de 1-2 săpt. *Aerosol:* în atac anginos se adm. 1-2 doze sublingual, în poziție șezândă. Dacă este necesar doza se poate majora la maximum 3 doze în decurs de 15 min. Pentru prevenire trebuie aplicată o doză cu 5-10 min înainte de exercițiul fizic. *Sol. inj.:* 0,75-8 mg nitroglicerină/oră; se va începe întotdeauna cu doze mici. Se monitorizează TA sistolică și diastolică, frecvența cardiacă și dacă este nevoie: presiunea arterială pulmonară sistolică și diastolică, presiunea de umplere a ventriculului stâng, debitul cardiac și EKG (măsurarea segmentului ST). Trinitrosan poate fi adm. numai sub formă de perfuzie. Diluția într-o sol. perfuzabilă compatibilă este de cel puțin 1:4, iar durata trat. se poate extinde la 3 zile sau mai mult.

Cind: IC, glaucom, tromboză coronariană acută, ramolisment cerebral, hTA posturală, hipertensiune intracraniană, idiosincrazie la Nitroglicerină; stări de șoc și colaps, anemii grave. Infarct miocardic cu presiune de umplere scăzută; insuficiență circulatorie (șoc, colaps); edem pulmonar toxic (adm. i.v.); cardiomiopatie hipertrofică obstructivă; hTA marcată. Sarcină și alăptare.

A!: Dacă apare cianoză, fără pneumopatie intercurentă, se dozează methemoglobina. Dispozitivele transdermice nu se recomandă în trat. crizei anginoase acute. În astfel de cazuri se vor asocia nitrați cu acțiune rapidă. În caz de IMA sau IC acută, trat. se va face numai sub strictă supraveghere medicală. În cazul unei hipoxii arteriale severe (anemii severe), se va trata mai întâi anemia și apoi se începe aplicarea sistemului transdermic. În cazul apariției unei crize anginoase în perioada “liberă de plasture” se va face un trat. antianginos concomitent. Se evită întreruperea bruscă a trat. datorită riscului unei crize anginoase. Nitrații pot decompensa o cardiomiopatie hipertrofică. Șoferi și activități de precizie, mai ales la începutul trat.

RA: Cefalee, tahicardie, scăderi ale TA (cu amețeli, slăbiciune), greață, vomă, roșeața feței, dezorientare. În cazuri izolate, poate apărea bradicardie la începutul adm.

NIZATIDINUM

COD ATC: A02BA04

AXID *ELI LILLY;* Cps. 150 mg ***(P-6L)***

AXID *ELI LILLY;* Cps. 300 mg ***(P-6L)***

AXID *ELI LILLY;* Sol. inj. 25 mg/ml (f. × 4 ml) ***(P-RF)***

NIZOTIN® 150 mg; NIZOTIN® 300 mg *SICOMED S.A.;* Cps. 150 mg sau 300 mg ***(P-6L)***

Ind: Trat. ulcerului duodenal și gastric benign activ, pentru o perioadă de 4-8 săpt. Terapia de întreținere în ulcerul duodenal cronic, după vindecarea ulcerului duodenal activ. Înainte de adm. trat. trebuie exclusă posibilitatea ulcerațiilor gastrice maligne. Trat. esofagitei diagnosticate endoscopic, inclusiv a esofagitei erozive și ulcerative și asociată cu pirozis datorat refluxului gastroesofagian pe o perioadă de 12 săpt. Diminuează pirozis-ul prezent la pacienții cu reflux gastroesofagian după prima zi de trat. Nizatidina adm. inj. este indicată, ca o alternativă de scurtă durată, pentru pacienții spitalizați aflați în imposibilitate de a primi medicație pe cale orală.
Dz: Terapeutic 300 mg/zi; profilactic 150 mg/zi. *Dozaj în IR moderată și severă:* Ulcer duodenal activ și ulcer gastric benign activ sau reflux gastro-esofagian: Cl creatinină 20-25 ml/min – 150 mg/zi; Cl creatinină < 20 ml/min – 150 mg odată la 2 zile. Pacienți cu reflux gastro-esofagian, pentru care sunt necesare doze mai mari: Cl creatinină 20-25 ml/min – 150 mg de 2 ori/zi; Cl creatinină < 20 ml/min – 150 mg/zi. Terapie de întreținere: Cl creatinină 20-50 ml/min – 150 mg o dată la 2 zile; Cl creatinină < 20 ml/min – 150 mg la 3 zile. Ajustarea dozei i.v.: Ulcer duodenal activ sau gastric benign activ: Cl creatinină 20-50 ml/min – 120-150 mg/zi; Cl creatinină < 20 ml/min – 75 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la nizatidină sau la alți antagoniști de receptori histaminici H2. Sarcină și alăptare.
A!: Răspunsul simptomatic la terapia cu nizatidină nu exclude existența unei formațiuni gastrice maligne. Prudență în IR sau IH.
RA: Rareori reacții de hipersensibilitate sau de șoc anafilactic. Cazuri rare de leziuni hepatice colestatice și/sau la nivel hepatocelular, reversibile la încetarea trat. Ocazional anemie, urticarie, dureri de cap, amețeală și transpirații.

NOMEGESTROLUM *COD ATC: G03DB04*

LUTENYL *LAB. THERAMEX;* Cpr. 5 mg nomegestrol acetat ***(P-RF)***

Ind: Corectează tulburările ginecologice determinate de insuficiența luteală – cicluri neregulate, amenoree secundară, menometroragii, hemoragii uterine funcționale (perimenopauză), sindrom premenstrual, dismenoree, mastodinie; hiperplazie endometrială, trat. menopauzei instalate (în asociere cu estrogeni).
Dz: 5 mg/zi timp de 10 zile pe ciclu (din ziua a 16-a până în ziua a 25-a inclusiv).
Cind: Primul trimestru de sarcină, antecedente tromboflebitice, alterări grave ale funcției hepatice.
A!: Pentru tratarea dismenoreei, hemoragiilor uterine, amenoreei este necesar să fie dovedit caracterul funcțional al acestor tulburări. Există riscuri tromboembolice. Trebuie întreruptă adm. produsului în caz de tulburări oculare așa cum ar fi pierderea unilaterală a vederii, diplopie, leziuni vasculare retiniene, accidente tromboembolice venoase sau trombotice simple, cefalee importantă. Prudență la bolnavii cu antecedente de infarct miocardic sau boli cerebrovasculare, HTA și diabet zaharat. Alăptare.
RA: Modificarea menstruației, amenoree, sângerări intercurente; excepțional: creștere în greutate, insomnie, pilozitate, tulburări gastrointestinale.

NONOXYNOLUM

COD ATC: G02BBN1

C-FILM LUCCHINI *LUCCHINI SA;* Folii vag. 72 mg (pliant × 10 blist. × 1 folie vag.) ***(OTC)***

Ind: Contracepție intravaginală, mai ales în cazul în care alte mijloace contraceptive sunt contraindicate (contraceptive orale, dispozitive intrauterine, post partum, premenopauza). Durata protecției cca. 2 ore.
Dz: Introducere intravaginală profundă cu 10 minute înaintea raportului sexual. Repetarea raportului sexual (chiar la scurt timp) necesită încă o administrare.
Cind: Alergie la unul din componenți, alăptare, folosirea concomitentă a altui produs cu acțiune locală, intravaginală.
A!: Nu se fac spălaturi vaginale 6-8 ore după raportul sexual; toaleta externă cu apă este posibilă.
RA: Rar hipersensibilitate la produs, senzație de căldură locală.

NORETHISTERONUM

COD ATC: G03AC01

NORIDAY® *SEARLE;* Cpr. 350 g ***(P-RF)***

Ind: Mastopatii chistice, terapie de substituție în tulburări de ciclu, sindrom premenstrual, diagnostic pentru amenoree primară sau secundară, metroragii disfuncționale, sindrom premenstrual, endometrioză, hiperplazie de endometru.
Dz: *Tulb. prin insuficiență de progesteron:* adm. ciclică, 5-10 mg/zi între ziua 16 și 25 a ciclului. *Hemoragii funcționale:* 10-20 mg/zi, 10 zile/ciclu. *Endometrioze:* trat. continuu 5-20 mg/zi.
Cind: Sarcină, alăptare, afecțiuni hepatice severe, icter colestamic, avort habitual, sângerări vaginale, cancer de sân.
A!: Precauție în tromboflebite, antecedente de herpes, accident cerebral, depresie, hipercolesterolemie, tulb. hepatice, renale, cardiace.
RA: Acnee, creștere ponderală, depresie, modificări ale libidoului, metroragii, hirsutism, alergii, oboseală, migrene, tulb. senzoriale, grețuri, vome, diaree, constipație, tulb. hepatice, edeme, dismenoree, mastopatie, galactoree, flebite, hipercoagulabilitate.

NORFLOXACINUM

COD ATC: J01MA06
S01AX12

EPINOR *E.I.P.I.C.O.;* Cpr. film. norfloxacină 400 mg ***(P-RF)***

GRENIS *GENEPHARM SA;* Cpr. film. 400 mg ***(P-RF)***

H-NORFLOXACIN 400 mg *HELCOR SRL;* Cpr. film. norfloxacină 400 mg ***(P-RF)***

NOLICIN® *KRKA d.d.;* Cpr. film. norfloxacină 400 mg ***(P-RF)***

NORFLOX *CIPLA;* Sol. oft. 0,3% (fl. × 5 ml) ***(P-RF)***

NORFLOX-400 *CIPLA;* Cpr film. norfloxacină 400 mg ***(P-RF)***

NORFLOX-400 *LEK PHARMATECH SRL;* Cpr. film. norfloxacină 400 mg ***(P-RF)***

NORFLOXACIN *ANTIBIOTICE IAȘI în colaborare cu GENEPHARM;* Cpr. film. norfloxacină 400 mg ***(P-RF)***

NORFLOXACIN 400 mg *LAROPHARM SRL;* Cpr. film. 400 mg ***(P-RF)***

NORFLOXACINĂ-400 *ARENA GROUP SA;* Cps. 400 mg ***(S/P-RF)***

UTIBID *LAB. LUPIN;* Cpr. film. 400 mg ***(P-RF)***

Ind: Trat. infecțiilor cu tulpini bacteriene sensibile la norfloxacină: infecții complicate și necomplicate ale aparatului urinar; gastroenterită; infecție gonococică endocervicală și uretrală; prostatită.
Dz: *Adulți:* uretrită gonococică 800 mg în priză unică. În prostatită uzual 400 mg la 12 ore, timp de 28 zile. În infecțiile necomplicate ale aparatului urinar câte 400 mg la 12 ore, timp de 3 zile. În cazul infecțiilor complicate ale aparatului urinar câte 400 mg la 12 ore, timp de 10-21 zile. În gastroenterita bacteriană câte 400 mg la 8-12 ore, timp de 5 zile. În caz de IR, pentru un Cl creatinină < 30 ml/min - 400 mg o dată/zi. Se adm. pe stomacul gol (cu o oră înainte sau cu 2 ore după masă).
Cind: Hipersensibilitate la norfloxacină sau la un alt chimioterapic din grupa chinolonelor sau la oricare dintre componenții produsului; tendinopatie provocată de fluorochinolone în antecedente. Copii. Sarcină. Alăptare.
A!: La doze mari (1200 și 1600 mg) și în caz de urină alcalină (pH > 7) s-a observat cristalurie. Cu toate că după dozele uzuale (câte 400 mg de 2 ori/zi la adult) nu s-a observat cristalurie, trebuie asigurată o hidratare adecvată, pentru menținerea unui debit urinar de 1200-1500 ml/zi. Precauție la pacienții cu accident vascular și boală cerebrovasculară gravă în antecedente. În timpul trat. pot să apară foarte rar tendinite, care pot evolua spre ruptură de tendon, îndeosebi a celui achilian. Apariția lor impune oprirea adm. produsului și instituirea unui trat. adecvat. Evitarea expunerii la soare sau la UV. În timpul trat. de lungă durată și/sau în cazul infecțiilor nozocomiale se pot selecta tulpini rezistente, în special dintre *Staphylococcus* și *Pseudomonas*. Prudență la pacienții cu miastenie gravis, la cei cu antecedente de convulsii sau în cazul prezenței factorilor care predispun la apariția convulsiilor.
RA: Arsuri retrosternale, dureri și crampe abdominale, greață, diaree, anorexie, colită pseudomembranoasă, pancreatită (rar); rash, prurit, fotosensibilizare, purpură vasculară, dermatită exfoliativă, eritem polimorf, sindrom Stevens-Johnson, foarte rar sindrom Lyell; mialgii și/sau artralgii, rar tendinită în special achiliană, care poate să apară în primele 48 de ore de la începutul trat. și poate deveni bilaterală, foarte rar ruptură de tendon; convulsii, stare de confuzie mentală, halucinații, cefalee, vertij, somnolență, insomnie, depresie, anxietate sau nervozitate, iritabilitate, euforie, acufene, parestezii, dezorientare, polineuropatie, agravarea miasteniei gravis; urticarie, foarte rar edem Quincke și șoc de tip anafilactic; creșterea uremiei și a creatininei serice; foarte rar nefropatie; creșterea transaminazelor, bilirubinei și fosfatazei alcaline, hepatită.

NYSTATINUM

COD ATC: A07AA02

NISTATIN (STAMICIN) *SICOMED SA;* Pulb. susp. 4 000 000 ui/g (ct. × 1 fl. × 6 g pulb. pt. 20 ml susp.) ***(P-RF)***

NISTATINĂ *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cpr. film. 500 000 ui ***(S/P-RF)***

STAMICIN® 500 000 U.I. *SICOMED SA;* Cpr. film. 500 000 U.I. ***(P-RF)***

NYSTATIN *ROSEMONT PHARMACEUTICALS;* Susp. orală 100 000 ui/ml (fl. × 30 ml) ***(P-RF)***

Ind: Tratamentul candidozelor digestive cu excepția candidozei esofagiene la imunodeprimați, pentru tratamentul candidozei vaginale și cutanate precum și pentru combaterea candidozei intestinale asociate, pentru profilaxia candidozei la grupele cu risc crescut: prematuri imunodeprimați în special în cazul administrării antibioticelor cu spectru larg sau metronidazol, pacienți tratați cu chimioterapice antineoplazice sau corticosteroizi timp îndelungat.
Dz: Pentru tratamentul *candidozelor digestive* sunt uzual recomandate următoarele doze. *Adulți:* 4 000 000-6 000 000 u.i. pe zi, fracționat în 3-4 prize. *Copii peste 6 ani:* 1 000 000-4 000 000 u.i. pe zi, fracționat în 3-4 prize. Se recomandă administrarea produsului între mese, evitându-se asocierea cu alimente. Tratamentul se continuă cel puțin 24 de ore după vindecarea clinică. În cazul candidozei bucofaringiene se recomandă sfărâmarea comprimatelor înaintea înghițirii lor și menținerea în cavitatea bucală cât mai mult timp pentru realizarea unui contact direct și prelungit cu leziunile. Pentru tratamentul *candidozelor cutaneo-mucoase* uzual sunt indicate 2-3 aplicații pe zi folosind unguente sau suspensii conținând 100 000 u.i./g.
Cind: Hipersensibilitate la nistatină și la alte antifungice polienice sau la oricare dintre componenții produsului.
A!: După stabilirea diagnosticului de certitudine este necesară identificarea și înlăturarea factorilor favorizanți pentru prevenirea recidivelor. *Sarcină și alăptare:* Nistatina se administrează în timpul sarcinii numai dacă este absolut necesar. Nu se cunoaște dacă nistatina se excretă în laptele matern. Deoarece practic nu se absoarbe din tractul digestiv, nistatina se poate administra în timpul alăptării, cu precauție însă, datorită posibilității apariției efectelor adverse la sugar (diaree etc.).
RA: Administrată local, tegumentar, nistatina este foarte bine suportată. În cazul administrării orale medicamentul poate produce uneori grețuri, vomă, diaree (la dozele mari), rareori reacții alergice (la nistatină sau la candidina eliberată prin distrugerea ciupercii).

O

OBIDOXIMI CHLORIDUM

COD ATC: V03AB13

TOXOGONIN® *MERCK KGaA;* Sol. inj. clorhidrat de obidoximă 250 mg/ml; ct. × 5 f. × 1 ml ***(S)***

Ind: Intoxicații cu compuși organofosforici.
Dz: Inițial atropină: 2-5 mg i.v. la 5-15 min. La *copii* - doză unică: 1-3 mg. După atropinizare se adm. i.v. 250 mg obidoximă, cu repetiție o dată sau de 2 ori la 2 ore. Nu se va adm. obidoxima mai târziu de 6 ore de la intoxicație. La copii - doze unice de 4-8 mg/kg.
CI: Intoxicații cu insecticide carbamice.

A!: Miastenia gravă (poate precipita criza). Trat. se va face întotdeauna sub protecție cu atropină.
RA: Senzație de tensiune și căldură la nivelul capului, după injecția i.m. Senzație de răceală a nasofaringelui, după inhalare și la nivelul pielii după atingere. Posibil amețeli, somnolență, tulburări de vedere, cefalee, greață, tahicardie, HTA, hiperventilație, parestezii, slăbiciune musculară; injectarea prea rapidă poate induce laringospasm și rigiditate musculară.

OCTREOTIDUM

COD ATC: H01CB02

SANDOSTATIN *NOVARTIS PHARMA;* Sol. inj. octreotidă 0,1 mg/ml; ct. × 5 f. × 1 ml ***(S/P-RF)***

Ind: Acromegalie. Ameliorarea simptomelor asociate cu tumorile endocrine gastroenteropancreatice: tumori carcinoide cu sindrom carcinoid; glucagonoame; gastrinoame, sindrom Zollinger-Ellison, în asociere cu anti H2 cu sau fără antiacide; HTA.
Dz: *Acromegalie:* Inițial 0,05-0,1 mg, sc la 8-12 ore. Dozarea va fi în funcție de nivelului GH și de simptomele clinice și toleranță. Doza zilnică optimă: 0,2-0,3 mg; doza max. 1,5 mg/zi. Dacă în decurs de 3 luni nu se obțin scăderi semnificative ale GH și nici o ameliorare a simptomelor, se întrerupe trat. *Tumori endocrine gastroenteropancreatice:* Inițial 0,05 mg 1-2 ori pe zi sc; doza poate fi crescută treptat până la 0,1-0,2 mg de trei ori pe zi. Dozele de întreținere trebuie ajustate individual.
Contraindicaþii: Hipersensibilitate la medicament. Sarcină și alăptare.
A!: Arsură, usturime la locul inj.; Anorexie, greață, diaree, meteorism. Apariția calculilor biliari, colestază.
RA: Reacțiile locale: durere, senzație de înțepătură, usturime și arsură la locul inj., cu hiperemie și edem. Efectele secundare gastrointestinale: disconfort abdominal, anorexie, greață, vomă, crampe abdominale, balonare abdominală, flatulență, scaune moi, diaree și steatoree. Adm. prelungită poate duce la formarea de calculi biliari. Rar, la adm. cronică, poate apărea hiperglicemie persistentă. Adm. i.v. prea rapidă poate determina flush și bradicardie.

OFLOXACINUM

COD ATC: J01MA01

NOVECIN *THE UNITED PHARMA.;* Cpr. film. ofloxacină 200 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

OFLOXACIN *ANTIBIOTICE IAȘI în colaborare cu GENEFARM;* Cpr. film. ofloxacină 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

OFLOXIN 200 *LECIVA;* Cpr. film. ofloxacină 200 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

OFLOXIN INF *LECIVA;* Sol. perf. 200 mg/100 ml ***(S)***

TARIVID *LAB. AVENTIS PHARMA;* Cpr. film. ofloxacină 200 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

TARIVID *LAB. AVENTIS PHARMA;* Cpr. film. ofloxacină 400 mg; ct. × 1 blist. × 5 cpr. ***(P-RF)***

TARIVID *LAB. AVENTIS PHARMA;* Sol. perf. ofloxacină 2 mg/ml; ct. × 1 fl. × 100 ml sol. perf. ***(S)***

ZANOCIN *RANBAXY LAB. Ltd.;* Cpr. film. ofloxacină 200 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

ZANOCIN OD *RANBAXY LAB. Ltd.;* Cpr. film. ofloxacină 200 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

Ind: Infecții urinare, uretrite gonococice și non-gonococice; prostatite; infecții ginecologice înalte; infecții osteoarticulare; infecții pulmonare: episoadele acute ale bronșitei cronice, exacerbările fibrozei chistice, pneumonii nosocomiale; infecții ORL - sinuzită cronică, suprainfectarea otitei cronice; profilaxia infecțiilor în chirurgia urechii medii; infecții cutanate și ale țesuturilor moi; infecții gastrointestinale: diareea călătorilor, salmonela, dizenterie bacilară acută, febra tifoidă; infecții intraabdominale; septicemie; prevenirea infecțiilor cu bacterii gramnegative la pacienții imunodeprimați; tbc pulmonară cu micobacterii rezistente, mai ales la pacienții imunodeficienți.
Dz: *Adulți:* 200-400 mg p.o. la 12 ore sau doză unică, cu 30 min - 1 oră înaintea mesei; în infecții severe 600-800 mg 7-10 zile. În trat. cistitei - 3 zile; în prostatite - câteva săpt.; în gonoree acută fără complicații - doză unică de 400 mg; în tbc pulmonară 400 mg la 12 ore, 3-12 luni, asociat cu alte antituberculoase. *Pacienți cu afectarea funcției renale:* Cl creatinină între 20 și 50 ml/min doza uzuală o dată pe zi; Cl creatinină sub 20 ml/min jumătate din doza uzuală o dată pe zi. *Copii:* Doza zilnică totală 7,5 mg/kg, maxim 15 mg/kg în 2 prize. În septicemii sau când adm. orală nu este posibilă se recomandă adm. i.v.
Cind: Hipersensibilitate la fluorochinolone, ofloxacină sau la oricare dintre componentele produsului; antecedente de tendinopatie asociată cu fluorochinolonele; epilepsie; deficit de G-6-PDH; copii; sarcină; alăptare.
A!: Copii (în infecții severe cu germeni sensibili). Antecedente de convulsii. Evitarea expunerii la soare sau la UV. Rezistență microbiană după trat. prelungit. Oprirea trat. și repaus în caz de tendinită. Miastenia gravis. Șoferi și activități de precizie.
RA: Tulburări gastrointestinale (greață, vomă, diaree, rar dureri abdominale, anorexie, uscăciunea gurii, meteorism, constipație), afectarea aparatului locomotor (mialgii, artralgii, tendinită și ruptura tendonului lui Ahile), tulburări nervos centrale (convulsii, cefalee, confuzie, insomnie, tulburări de vedere, amețeală, nervozitate, somnolență, halucinații, parestezii), erupții cutanate, prurit, reacții alergice. Leucopenie, eozinofilie, trombocitopenie; creșterea transaminazelor și creatininemiei.

OLANZAPINUM *COD ATC: N05AH03*

ZYPREXA *ELI LILLY;* Cpr. film. olanzapină 2,5 mg; ct. × 4 blist. × 7 cpr. film. ***(P-RF)***

ZYPREXA *ELI LILLY;* Cpr. film. olanzapină 5 mg; ct. × 4 blist. × 7 cpr. film. ***(P-RF)***

ZYPREXA *ELI LILLY;* Cpr. film. olanzapină 7,5 mg; ct. × 7 blist. × 8 cpr. film. ***(P-RF)***

ZYPREXA *ELI LILLY;* Cpr. film. olanzapină 10 mg; ct. × 4 blist. × 7 cpr. film. ***(P-RF)***

ZYPREXA *ELI LILLY;* Cpr. film. olanzapină 15 mg; ct. × 4 blist. × 7 cpr. film. *(P-RF)*

ZYPREXA *ELI LILLY;* Cpr. film. olanzapină 20 mg; ct. × 4 blist. × 7 cpr. film. *(P-RF)*

ZYPREXA *ELI LILLY;* Pulb. pt. sol. inj. olanzapină 10 mg; ct. x 1 fl. × 10 mg *(S/P-RF)*

Ind: Schizofrenie - trat. de întreținere la pacienții care au răspuns la trat. inițial. **Dz:** Doza inițială zilnică unică de 10 mg/zi, indiferent de orarul meselor. Ulterior, ajustare pe baza răspunsului clinic 5-20 mg/zi. Doză inițială mai mică (5 mg/zi) la peste 65 de ani, sex feminin, nefumători, IH. **Cind:** Hipersensibilitate la oricare din ingredientele produsului; glaucom cu unghi îngust. Alăptare. Șoferi și activități de precizie. **A!:** Hipertrofie de prostată sau ileus paralitic; ALT și/sau AST crescute, IH, trat. asociat cu medicamente cu potențial de hepatotoxicitate; scăderi ale leucocitelor și/sau neutrofilelor, hipereozinofilie, depresia măduvei osoase cauzată de boli concomitente, radioterapie sau chimioterapie, afecțiuni mieloproliferative, istoric de convulsii. Se întrerupe în caz de sindrom neuroleptic malign. Dacă apar semne de diskinezie tardivă, trebuie redusă doza. Asociere cu prudență cu alte medicamente cu acțiune centrală, cu alcool, sau cu substanțe care măresc intervalul QT, în special la vârstnici. HTA posturală rară. Sarcină. Copii sub 18 ani. **RA:** Frecvente: somnolență și creștere în greutate. Ocazionale: amețeală, apetit crescut, edeme periferice, hTA ortostatică și efecte anticolinergice tranzitorii, ușoare, creșteri asimptomatice ale transaminazelor hepatice. Rar: fotosensibilizare, ginecomastie, galactoree, mărirea sânilor; variații hematologice asimptomatice.

OLOPATADINUM *COD ATC: S01GX09*

OPATANOL® *ALCON LAB. Ltd.;* Sol. oft. 1 mg/ml olopatadină

Ind: Conjunctivite alergice. **Dz:** *Adult și copil peste 3 ani:* 1 picătură × 2 ori/zi. Durata maximă de trat. 4 luni. **Cind:** Hipersensibilitate la olopatadină sau la excipienții produsului. **RA:** Iritații, keratite, edem local, fotofobie, senzație de ochi sau nas uscat, cefalee, astenie, amețeală.

OMEPRAZOLUM *COD ATC: A02BC01*

BELMAZOL *LAB. BELMAC;* Cps. enter. omeprazol 20 mg; ct. × 1 fl. × 14 cps. enter. *(P-RF)*

EPIRAZOLE *E.I.P.I.C.O.;* Cps. enter. omeprazol 20 mg; ct. × 1 fl. × 16 cps. enter. *(P-RF)*

GLAVERAL *HELP PHARMACEUTICALS Ltd.;* Cps. enter. omeprazol 20 mg; ct. × 1 fl. × 14 cps. enter. *(P-RF)*

LOSEC *ASTRAZENECA;* Cps. enter. omeprazol 10 mg; ct. × 1 fl. × 14 cps. enter.; ct. × 1 fl. × 28 cps. enter. ***(P-RF)***

LOSEC *ASTRAZENECA;* Cps. enter. omeprazol 20 mg; ct. × 1 fl. × 7 cps. enter.; ct. × 1 fl. × 14 cps. enter.; ct. × 1 fl. × 28 cps. enter. ***(P-RF)***

LOSEC MUPS *ASTRAZENECA;* Pulb. liof. pt. sol. inj. omeprazol 40 mg; ct. × 5 fl. pulb. liof. ***(P-RF)***

LOSEC MUPS *ASTRAZENECA;* Cpr. film. gastrorez. omeprazol 10 mg; ct. × 1 fl. × 14 cpr. film. ***(P-RF)***

LOSEC MUPS *ASTRAZENECA;* Cpr. film. gastrorez. omeprazol 20 mg; 40 mg; ct. × 1 fl. × 7 cpr. film. ***(P-RF)***

ODASOL *GENEPHARM SA;* Cps. enter. omeprazol 20 mg; ct. × 1 fl. × 14 cps. enter. ***(P-RF)***

OMEPRAZOL *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cps. enter. omeprazol 20 mg; ct. × 1 fl. × 14 cps. enter.; ct. × 2 blist. × 10 cps. enter. ***(P-RF)***

OMEPRAZOL 20 mg *M/S LYKA LABS Ltd.;* Cps. enter. omeprazol 20 mg; ct. × 1 fl. × 14 cps. enter. ***(P-RF)***

OMERAN *EUROPHARM SA;* Cps. enter. omeprazol 20 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. enter. ***(P-RF)***; ct. × 50 blist. × 10 cps. enter. ***(S)***

OMEZ *DR. REDDY'S LAB. Ltd.;* Cps. enter. omeprazol 20 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. enter. ***(P-RF)***

ORTANOL® *LEK PHARMACEUTICALS;* Cps. gastrorez. omeprazol 20 mg; ct. × 1 fl. × 14 cps. gastrorez; Cps. gastrorez. 40 mg ***(P-RF)***

ORTANOL S 10 mg *LEK PHARMACEUTICALS;* Cps. gastrorez. ***(P-RF)***

RISEK *JULPHAR;* Cps. enter. omeprazol 20 mg; ct. × 10 cps. enter.; ct. × 14 cps. enter. ***(P-RF)***

ULTOP *KRKA d.d.;* Cps. enter. omeprazol 20 mg; ct. × 2 blist. × 7 cps. enter. ***(P-RF)***

Ind: Ulcer duodenal, gastric sau eroziuni gastro-duodenale asociate trat. cu AINS; eradicare Helicobacter pylori în ulcerul peptic; reflux gastro-esofagian simptomatic; dispepsie asociată hipersecreției acide; sindrom Zollinger-Ellison; pacienți cu risc de aspirație a conținutului gastric în timpul anesteziei generale. **Dz:** Cps. enter. se înghit întregi, o dată pe zi, dimineața, împreună cu lichid. *Ulcer duodenal:* 20 mg 2-4 săpt. În caz de răspuns terapeutic slab - 40 mg, 4 săpt. Pentru prevenirea recăderile 10 mg. La nevoie, se crește la 20-40 mg. *Ulcer gastric:* 20 mg, 4-8 săpt. În caz de răspuns terapeutic slab - 40 mg, 8 săpt. Pentru prevenirea recăderile - 20 mg. La nevoie, se crește la 40 mg. *Ulcer gastric, duodenal sau eroziuni gastro-duodenale asociate trat. cu AINS:* 20 mg, 4-8 săpt. Pentru prevenirea apariției se dau 20 mg. *Eradicarea Helicobacter pylori - Triplă terapie*: Omeprazol (**O**) 20 mg, amoxicilină (**A**) 1 g și claritromicină (**C**) 500 mg, de 2 ori/zi, 1 săpt.; sau **O**: 20 mg, **C**: 250 mg și metronidazol 400 mg (sau tinidazol 500 mg), de 2 ori/zi, 1 săpt.; sau **O**: 40 mg o dată/zi asociat cu **A**: 500 mg și metronidazol 400 mg ambele adm.

de 3 ori/zi 1 săpt. *Dublă terapie*: **O**: 40 mg de 1-2 ori/zi asociat cu **A**: 1,5 g/zi, sau cu **C**: 500 mg de 3 ori/zi, 2 săpt. *Esofagita de reflux:* 20 mg o dată pe zi 4-8 săpt. În esofagita de reflux severă - 40 mg, 8 săpt. Pentru trat. de lungă durată al pacienților cu esofagită de reflux vindecată - 10 mg. La nevoie, doza zilnică poate fi crescută la 20-40 mg. *Reflux gastro-esofagian simptomatic:* 10-20 mg, 4 săpt. *Dispepsie asociată hipersecreției acide:* 10-20 mg, 4 săpt. *Sindrom Zollinger-Ellison:* Inițial 60-120 mg zilnic. Dacă doza zilnică depășește 80 mg, aceasta se divide în 2 prize. *Profilaxia aspirației gastrice:* 40 mg în seara anterioară, apoi 40 mg în dimineața intervenției chirurgicale. *Funcție hepatică afectată:* 10-20 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la omeprazol sau la celelalte componente ale produsului. Sarcină, alăptare.

A!: Întâi se va exclude posibilitatea malignității leziunii, trat. putând atenua simptomele. Prudență în trat. cronic. Șoferi și activități de precizie.

RA: Rar: rash, prurit, fotosensibilitate, eritem multiform, alopecie, artralgii, slăbiciune musculară și mialgii, cefalee, amețeală, parestezii, somnolență, insomnie și vertij, agitație, depresie și halucinații, predominant la pacienții cu afecțiuni severe. Tot rar: diaree, constipație, dureri abdominale, flatulență, uscăciunea gurii, stomatită și candidoză gastrointestinală, creșterea enzimelor hepatice. Encefalopatie la pacienții cu afectare hepatică severă preexistentă, hepatită, icter, IH. Mai apar izolat: ginecomastie, leucopenie, trombocitopenie, agranulocitoză și pancitopenie, stare de rău, reacții de hipersensibilitate, urticarie, angioedem, febră, bronhospasm, nefrită interstițială. Uneori transpirații, vedere încețoșată, tulburări ale gustului.

ONDANSETRONUM *COD ATC: A04AA01*

DANOFRAN T3A 4 mg *T3A PHARMA GROUP;* Sol. inj. clorhidrat de ondansetron 2 mg/ml; ct. × 1 f. × 2 ml ***(S/P-RF)***

DANOFRAN T3A 8 mg *T3A PHARMA GROUP;* Sol. inj. clorhidrat de ondansetron 2 mg/ml; ct. × 1 f. × 4 ml ***(S/P-RF)***

EMESET *CIPLA.;* Sol. inj. clorhidrat de ondansetron 2 mg/ml; ct. × 5 f. × 2 ml; ct. × 5 f. × 4 ml ***(S/P-RF)***

OSETRON *DR. REDDY'S LAB. Ltd.;* Cpr. film. clorhidrat de ondansetron 4 mg; 8 mg; ct. × 10 cpr. film. ***(P-RF)***

OSETRON *DR. REDDY'S LAB. Ltd.;* Sol. inj. clorhidrat de ondansetron 2 mg/ml; ct. × 5 f. × 2 ml; ct. × 5 f. × 4 ml. ***(P-RF)***

ZOFRAN® *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. clorhidrat de ondansetron 4 mg; ct. × 1 blist. × 6 cpr.; Cpr. film. 8 mg; ct × 15 cpr. ***(P-RF)***

ZOFRAN® *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. clorhidrat de ondansetron 8 mg; ct. × 1 blist. × 6 cpr.; ct. × 15 cps.; ct. × 30 cps. ***(P-RF)***; ct. × 100 cps. ***(S)***

ZOFRAN® *GLAXO SMITHKLINE;* Sol. parent. clorhidrat de ondansetron 2 mg/ml; ct. × 5 f. × 2 ml; ct. × 5 f. × 4 ml ***(S/P-RF)***

Ind: Grețuri și vărsături produse de citostatice și radioterapie sau postoperatorii.

Dz: *Greață și vărsături produse de citostatice și radioterapie. Adulți:* 8 mg/zi adm. i.v. sau i.m. lent, înaintea chimio- sau radioterapiei. Pentru protejarea față de efectul emetic întârziat sau prelungit (după 24 de ore) se dă oral. Dozele între 8-32 mg se adm. în perf. i.v., diluată în 50-100 ml sol. salină izotonă adm. în cel puțin 15 min. Alternativ, se pot da 8 mg înaintea chimioterapiei, în inj. lentă i.v. sau i.m., urmată de 2 doze de 8 mg inj. i.v. sau i.m. la intervale de 2-4 ore sau în perf. continuă, 1 mg/oră, timp de până la 24 ore. Se poate asocia un glucocorticoid inj. i.v. înaintea chimioterapicului. *Copii:* doză unică i.v. de 5 mg/m^2 înaintea chimioterapiei. Se continuă adm. 5 zile după terminarea curei de citostatice. *Pentru prevenirea și trat. grețurilor și vărsăturilor post-operatorii. Adulți:* 4 mg inj. i.m. sau i.v. lent, în faza de inducție a anesteziei și postoperator. *Copii:* i.v. lent 0,1 mg/kg, maxim 4 mg, înainte sau după inducția anesteziei.
Cind: Hipersensibilitate la ondansetron sau la oricare dintre componenții produsului. Sarcină și alăptare.
A!: Pacienți cu afecțiuni hepatice: doza maximă 8 mg/zi. Hipersensibilitate la tropisetronă și alte antiserotoninice. În caz de obstrucție intestinală subacută.
RA: Frecvent cefalee, bufeuri, sughiț; ocazional creșteri asimptomatice ale transaminazelor; constipație; reacții de hipersensibilitate, chiar șoc anafilactic; tulburări vizuale tranzitorii și amețeli la adm. rapidă; reacții extrapiramidale, distonii, convulsii; dureri anginoase, aritmii, bradicardie, hTA; reacții locale la nivelul inj. i.v.

ORCIPRENALINUM *COD ATC: R03AB01*

ASTMOPENT *GLAXO SMITHKLINE;* Aerosol, 750 µg sulfat de orciprenalină/doză; ct. × 1 fl. × 20 ml ***(P-6L)***

Ind: Trat. crizelor de astm bronșic. În testul de bronhodilatație. Profilaxia bronhospasmului.
Dz: Profilaxia bronhospasm: 1-2 doze de 3 ori/zi; trat. criză de dispnee: 1-2 doze; în cazurile severe, după 5 min se pot adm. încă 1-2 doze; la nevoie, doza se poate repeta după 5 minute. Următoarea adm. nu mai devreme de 2 ore. La *copiii peste 3 ani* se recomandă o doză.
Cind: Hipertiroidism, stenoză subaortică hipertrofică idiopatică, tahiaritmii, alte aritmii, hipersensibilitate la componenții preparatului. Alăptare.
A!: IM recent și/sau tulburări cardiovasculare severe, HTA, boli coronariene, IC, diabet, hipertiroidism și epilepsie. Asocierea cu alte bronhodilatatoare simpatomimetice. Trat. concomitent sau recent cu IMAO. Sarcină.
RA: Tulburări gastrointestinale, dureri de cap și amețeală, creșterea TA, tahicardie, aritmii cardiace, hipokaliemie, hiperhidroză, tremor și contracții musculare; iritații sau reacții alergice; foarte rar tuse, bronhospasm paradoxal și intensificarea dispneei.

ORLISTATUM *COD ATC: A08AB01*

XENICAL *HOFFMANN LA ROCHE;* Cps. orlistat 120 mg; ct. × 1 blist. × 21 cps.; ct. × 2 blist. × 21 cps.; ct. × 4 blist. × 21 cps. ***(P-RF)***

Ind: Trat. obezității (se asociază cu un regim moderat hipocaloric).
Dz: 120 mg la cele trei mese principale ale zilei, înainte, în timpul sau până la o oră după masă. Trat. poate dura maxim 2 ani.

Cind: Sindrom de malabsorbție cronică, colestază, alergie la orlistat sau oricare dintre componentele preparatului. Copii. Sarcină și alăptare.
AI: Scăderea greutății poate necesita modificarea dozelor medicamentelor folosite pentru alte afecțiuni. Steatoree.
RA: Incontinență a fecalelor, flatulență, scaune grase sau uleioase.

ORNIDAZOLUM *COD ATC: J01XD03*

TIBERAL *HOFFMANN LA ROCHE;* Cpr. film ornidazol 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. film. ***(P-RF)***

Ind: Trichomoniază; amibiază intestinală și extraintestinală (în special abcesul amibian al ficatului); lambliază.
Dz: *Trichomoniază* (formă acută), doză unică: 3 cpr. seara. Trichomoniază (formă cronică), 5 zile, câte 1 cpr. dimineața și seara, după mese. Pentru evitarea reinfestării, partenerul trebuie supus aceluiași trat. La *copii,* 25 mg/kg/zi. *Amibiază și lambliază:* 5-10 zile câte un cpr. dimineața și seara (după mese); *copii până la un an:* 1/4 cpr. × 2/zi; *de la 1 la 6 ani:* 1/2 cpr. × 2/zi; *de la 7 la 12 ani:* 3/4 cpr. × 2/zi dimineața și seara, după mese. În cazuri grave dozele zilnice pot fi crescute și chiar dublate.
Cind: Afecțiuni neurologice și hipersensibilitate față de acest medicament. Primele luni de sarcină.
RA: Vertij, cefalee și tulburări gastrointestinale; rar reacții cutanate.

OSELTAMIVIRUM *COD ATC: J05AH02*

TAMIFLU 12 mg/ml *HOFFMANN LA ROCHE;* Pulb. pt. susp. orală 12 mg/ml ***(P-RF)***

TAMIFLU 75 mg *HOFFMANN LA ROCHE;* Cps. 75 mg oseltamivir ***(P-RF)***

Ind: Prevenția și tratamentul gripei. Se poate utiliza concomitent cu paracetamol, acid acetilsalicilic, ibuprofen. Nu modifică eficiența vaccinului anti-gripal.
Dz: *Cps.:* Pentru tratarea gripei se administrează o capsulă cât de repede după prescripție și apoi câte o capsulă de două ori pe zi (de obicei una dimineața și una seara timp de 5 zile). Este important ca acest ciclu de 5 zile să fie complet. Prevenția gripei: o doză dimineața la micul dejun (o dată pe zi). Capsulele se înghit întregi, cu apă.
Pulb. pt. susp. orală: Copii cu vârsta 1-3 ani: prescrierea se face în funcție de greutatea corporală: greutate mai mică sau egală cu 15 kg, 30 mg de două ori pe zi (timp de 5 zile); greutate mai mult de 15 kg și până la 23 kg, 45 mg de două ori pe zi (timp de 5 zile); greutate mai mare de 23 kg și până la 40 kg, 60 mg de două ori pe zi (timp de 5 zile); greutate mai mult de 40 kg, 75 mg zilnic (timp de 5 zile). *Copii cu vârsta de 13 ani și mai mare:* pentru tratament: 75 mg de două ori pe zi timp de cinci zile; pentru prevenție: 75 mg o dată pe zi. O doză de 75 mg necesită administrarea de două doze de suspensie orală: una de 30 mg și una de 45 mg.

Cind: Alergie la oseltamivir sau la oricare dintre excipienți.
A!: Alergie la alte medicamente, tratament cu alte medicamente concomitent, inclusiv cele cumpărate fără prescripție (excepție: paracetamol, ibuprofen sau acid acetilsalicilic), afecțiuni renale, intoleranță ereditară la fructoză. Acest medicament conține sorbitol, care este o formă de fructoză. Medicul trebuie atenționat în caz de sarcină sau alăptare.
RA:. Cele mai obișnuite sunt greața, vărsăturile și durerile de stomac. Aceste efecte adverse apar mai ales după prima doză de medicament și de obicei dispar pe măsura continuării tratamentului. Frecvența acestor efecte adverse este redusă dacă medicamentul va fi luat odată cu alimentele. Efectele adverse mai puțin frecvente la copii cu vârsta între 1 și 12 ani care pot fi cauzate și de gripă, sunt diareea, inflamația urechii, inflamarea plămânilor, sinuzita, bronșita, agravarea astmului pre-existent, sângerări ale nasului, tulburări la nivelul urechilor, inflamarea pielii, inflamarea ganglionilor limfatici și conjunctivita. Mai puțin frecvente la adulți și adolescenți (copii cu vârsta de 13 ani și mai mare): greață, diaree, bronșită, amețeală, stare de oboseală, dureri de cap și tulburări de somn. Trebuie informat medicul dacă adultul sau copilul se simt frecvent rău sau dacă simptomele gripei se accentuează și starea febrilă continuă.

OTILONIUM BROMIDUM *COD ATC: A03AB06*

SPASMOMEN *BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP*; Cpr. film. bromură de otilon 40 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. film. ***(P-6L)***

Ind: Afecțiuni spastice ale tractului gastrointestinal: sindrom de colon iritabil, gastrită, gastroduodenită, enterită, esofagită. Preparator inaintea investigației endoscopice.
Dz: 40 mg de 2-3 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la medicament.
A!: Glaucom, hipertrofie de prostată, stenoză pilorică. Sarcină și alăptare.

OXACILLINUM *COD ATC: J01CF04*

OXACILINĂ *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cps. oxacilină 250 mg; ct. × 1 blist × 10 cps.; ct. × 2 blist. × 10 cps. ***(P-RF)***; ct. × 100 blist. × 10 cps. ***(S)***

OXACILINĂ *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cps. oxacilină 500 mg; ct. × 1 blist × 10 cps. ***(P-RF)***; ct. x 100 blist. x 10 cps. ***(S)***

OXACILINĂ *SICOMED SA*; Cps. oxacilină 250 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. ***(P-RF)***

OXACILINĂ *EUROPHARM SA;* Cps. oxacilină 250 mg; ct. × 1 blist. × 12 cps. ***(P-RF)***; ct. × 100 blist. × 12 cps. ***(S)***

OXACILINĂ *FARMACOM SA;* Cps. oxacilină 250 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. ***(P-RF)***

OXACILINĂ *ARENA GROUP SA;* Cps. oxacilină 250 mg; ct. × 1 fl. × 20 cps. ***(P-RF)***

OXACILINĂ *OZONE LAB. Ltd.;* Cps. oxacilină 250 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. ***(P-RF)***

OXACILINĂ *LEK PHARMATECH;* Cps. oxacilină 250 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. ***(P-RF)***; ct. × 100 blist. × 10 cps. ***(S)***

OXACILINĂ *ANTIBIOTICE IAȘI;* Pulb. pt. sol. inj. oxacilină 250 mg; 500 mg; ct. × 50 fl.; ct. × 100 fl. ***(S/P-RF)***

OXACILINĂ *ANTIBIOTICE IAȘI;* Pulb. pt. sol. inj. oxacilină 1 g; fl. × 1 g ***(P-RF)***; ct. × 50 fl. ***(S/P-RF)***

OXACILINĂ *LEK PHARMATECH;* Pulb. pt. sol. inj. oxacilină 500 mg; ct. × 10 fl. ***(P-RF)***; fl. × 500 mg. ***(S)***

OXACILINĂ *LEK PHARMATECH;* Pulb. pt. sol. inj. oxacilină 1000 mg; ct. × 10 fl. ***(P-RF)***

OXACILINĂ 250 *PHARMEX ROM IND.;* Cps. oxacilină 250 mg; ct. × 1 fl. × 20 cps. ***(P-RF)***

OXACILINĂ 500 *PHARMEX ROM IND & STANLEY PHARMA.;* Cps. oxacilină 500 mg; ct. × 1 fl. × 20 cps. ***(P-RF)***

OXACILINĂ FORTE *LEK PHARMATECH;* Cps. oxacilină 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cps. ***(P-RF)***; ct. × 100 blist. × 10 cps. ***(S)***

OXALIN *EUROPHARM SA;* Cps. oxacilină 500 mg; ct. × 2 blist. × 6 cps. ***(P-RF)***; ct. × 50 blist. × 6 cps. ***(S)***

PROSTAPHLIN *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Pulb. pt. sol. inj. oxacilină 500 mg; ct. × 50 fl. pulb. ***(S/P-RF)***

PROSTAPHLIN *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Pulb. pt. sol. inj. oxacilină 1000 mg; ct. × 50 fl. pulb. ***(S/P-RF)***

Ind: Infecții provocate de germeni sensibili la oxacilină: ale aparatului respirator; ORL; cutanate; osoase. Septicemii și endocardite, în continuarea trat. parenteral.
Dz: *Oral: Adulți:* 500-1000 mg la 6 ore. *Copii:* 50-100 mg/kg/zi, fracționat, la 6 ore. Se adm. cu ½ oră înainte de masă. *Parenteral:* inj. i.m. sau i.v. 1 g la 12 ore. Maxim 12 g/zi. *Copii:* 50 mg/kg/zi fracționat în 4 prize. În infecții grave se poate crește până la 300 mg/kg/zi.
Cind: Alergie la oxacilină, la alte peniciline sau la oricare dintre componenții produsului.
A!: Anamneză atentă înaintea începerii trat. Risc de alergie încrucișată cu cefalosporinele. La nou-născuți risc de hiperbilirubinemie, chiar icter nuclear. Sarcină și alăptare.
RA: Relativ frecvent reacții alergice: febră, urticarie, eozinofilie, edem Quincke. Ocazional tulburări digestive: greață, vărsături, diaree. Rareori, enterocolită pseudomembranoasă, nefropatie interstițială acută imunoalergică, anemie, leucopenie și trombocitopenie reversibile, creșteri moderate ale valorilor serice ale transaminazelor. Foarte rar șoc anafilactic.

OXALIPLATINUM

COD ATC: L01XA03

ELOXATIN 5 mg/ml *SANOFI~SYNTHELABO;* Pulb. pt. sol. perf. 5 mg/ml ***(S)***

ELOXATIN® 50 mg *SANOFI~SYNTHELABO;* Pulb. liof. pt. sol. inj. oxaliplatină 50 mg; ct. × 1 fl. pulb. ***(S)***

ELOXATIN® 100 mg *SANOFI~SYNTHELABO;* Pulb. liof. pt. sol. inj. oxaliplatină 100 mg; ct. × 1 fl. pulb. ***(S)***

Ind: Trat. de primă linie al cancerului colorectal metastazat (asociat cu 5-fluorouracil și acid folinic).
Dz: *Numai la adulți* - 85 mg/m^2 perf. i.v., în timp de 2-6 ore, repetat la 2 săpt. Perfuzia de oxaliplatină o va preceda întotdeauna pe cea de 5-fluorouracil. În cazul unei extravazări, adm. se întrerupe imediat.
Cind: Hipersensibilitate la oxaliplatină, mielosupresie anterioară primei cure de trat., neuropatie senzitivă cu deficit funcțional, IR severă. Sarcină. Alăptare.
A!: Adm. numai sub supraveghere medicală. Afectarea funcției renale. Manifestări alergice la alți compuși ai platinei. Monitorizarea neurotoxicității, în special în cazul asocierii cu alte med. neurotoxice, cu reducerea dozajului de la 85 la 65 mg/m^2. În caz de diaree gravă sau neutropenie (neutrofile < 1,5 × 10^9/l/mm) sau trombocitopenie (trombocite < 50 × 10^9/l), în afara reducerii dozei uzuale de 5-fluorouracil, este necesară și reducerea cu 25% a dozei de oxaliplatină. Hemograma se va repeta înaintea fiecărei noi cure.
RA: În monoterapie (130 mg/m^2, la 3 săpt.) are o toxicitate hematologică redusă. Asociat cu 5-fluorouracil și acid folinic crește incidența apariției neutropeniei și trombocitopeniei. Greață, vărsături și diaree puțin severe. Creșterea enzimelor hepatice. Toxicitate neurologică frecventă: neuropatie periferică senzitivă cu disestezie și/sau parestezie a extremităților. Apariția durerilor și/sau a deficitului funcțional necesită scăderea dozei sau chiar întreruperea trat. Disestezie laringofaringiană acută în timpul perfuziei, accentuată de frig, dar ușor reversibilă. Rar reacții alergice. Foarte rar ototoxicitate, scăderea acuității vizuale, anomalii ale funcției renale, alopecie, inflamații locale.

OXELADINUM

COD ATC: R05DB09

PAXELADINE *BEAUFOUR IPSEN;* Sirop citrat de oxeladină 0,2%; ct. × 1 fl. × 250 ml ***(OTC)***

Ind: Tuse seacă și iritativă de diverse etiologii: gripală, rinofaringită, traheită, laringită, bronhopneumopatie, rujeolă, tuse convulsivă. Tuse spasmodică și reflexă.
Dz: *Adulți:* 2-5 lg/zi. *Copii:* sirop: 1 lg/10 kg/24 ore (până la 4 ani: 1-2 lg/zi, între 4-15 ani: 2-3 lg/zi).
A!: În cazul unei adm. masive, monitorizarea funcției respiratorie și cardiovasculară.

OXIGENUM

COD ATC: V03AN

OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT *LINDE GAZ SRL;* Gaz; butelie × 3 l; 5 l; 10 l; 20 l; 40 l; 50 l ***(S)***

OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT *LINDE GAZ;* Lichid; ambalaj fix-stocator criogenic *(S)*

OXIGEN NW 32 *MESSER GAZ SRL;* Gaz; cisternă criogenică; stocator criogenic *(S)*

Ind: Iminență de asfixie în: pneumonie, infarct pulmonar și cardiac, emfizem și scleroză pulmonară, astm bronșic, tetanos, EPA, anevrism arteriovenos, uremie, intoxicații cu monoxid de carbon, cianuri, hidrogen sulfurat, nitriți, clorați.
Dz: Dependentă de indicația medicului.
Cind: Adm. în cazul unui pacient aflat sub chimioterapie (în special bleomicină).
A!: Se păstrează în cilindri de oțel, vopsiți în albastru.
RA: Pneumotorax, nevrita optică, sinuzită acută, ruptura traumatică a timpanului, convulsii; explozie și incendiu.

OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM *COD ATC: S01HA02*

NOVESINE 0,4% *NOVARTIS PHARMA;* Sol. oft. 0,4% clorhidrat de oxibuprocaină; ct. × 1 fl. × 10 ml *(S)*

Ind: Anestezia de suprafață a corneei în extracția corpilor străini corneeni superficiali și profunzi, în tonometrie, gonioscopie și alte examinări cu scop diagnostic, precum și în chirurgia oculară.
Dz: *Anestezia superficială a corneei:* extracția corpilor străini corneeni superficiali: 3 picături timp de 5 min; extracția corpilor străini corneeni profunzi: 5-10 picături la 30-60 secunde; tonometrie, gonioscopie: 1-6 picături. *Anestezia locală:* 3 picături în 5 minute. Aplicarea picăturilor trebuie să se limiteze strict la pregătirea intervențiilor chirurgicale oftalmologice sau a examinărilor diagnostice.
Cind: Hipersensibilitate la oxibuprocaină.
A!: Nu este compatibil cu soluția de fluoresceină cu care precipită. Administrare strict sub supraveghere medicală.
RA: Ușoară senzație pasageră de arsură. Rar hiperemie tranzitorie. Aplicarea necontrolată poate produce în scurt timp leziuni ale epiteliului corneean.

OXYBUTYNINUM *COD ATC: G04BD04*

DRIPTANE *LAB. DEBAT;* Cpr. 5 mg clorhidrat de oxibutinină; ct. × 2 blist. × 30 cpr. ***(P-RF)***

DRIPTANE *LAB. FOURNIER SA;* Cpr. diviz. 5 mg ***(P-RF)***

Ind: Adulți: senzație imperioasă de urinare la femei, în cazurile de vezică instabilă, cu excepția incontinenței urinare de efort - vezică neurologică spastică. Copii peste 5 ani: Enurezis prin imaturitate vezicală (prezența tulburărilor urinare diurne). Vezică spastică neurogenă.
Dz: *Adulți:* 5 mg de 2-3 ori/zi. Pentru *vârstnici tarați:* 5 mg de 2 ori/zi. *Copii peste 5 ani:* Vezică neurologică: 5 mg de 2 ori/zi. Enurezis nocturn: 5 mg de 2-3 ori/zi. Ultima doză adm. seara înainte de culcare.

Cind: Glaucom, disurie datorată unui sindrom obstructiv, miastenie severă, dificultăți de formare a jetului urinar datorate adenomului de prostată, boli intestinale (inclusiv obstrucții intestinale și colite), hipertiroidie. Copii sub vârsta de 5 ani. Sarcină, alăptare și perioadă de preconcepție.
A!: Poate fi necesară întreruperea trat. sau ajustarea dozei la copii. Șoferi și activități de precizie.
RA: De tip anticolinergic: uscăciunea gurii, constipație, vedere încețoșată, senzație de rău, arsuri gastrice, înroșirea feței (în special la copii) și dificultăți în formarea jetului urinar. Mai rar pot apărea toropeală, amețeală, palpitații, piele uscată, senzație de golire incompletă a vezicii.

OXYCODONUM

COD ATC: N02AA05

OXYCONTIN® 10 mg; OXYCONTIN® 20 mg; OXYCONTIN® 40 mg; OXYCONTIN® 80 mg *MUNDIPHARMA;* Cpr. film. cu elib. modif. 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg ct. × 56 cpr. ***(P-TS)***

Ind: Tratamentul durerilor moderate și severe.
Dz: Comprimatele se înghit întregi, nu se mestecă. *Adulți, vârstnici* și *copii peste 12 ani:* doza inițială uzuală pentru pacienți cu durere severă și care nu poate fi controlată de opioide ușoare este de 10 mg la fiecare 12 ore. Pentru pacienții care au primit morfină orală înainte de terapie se va respecta următoarea schemă echianalgezică: 10 mg de oxicodonă orală sunt echivalente cu 20 mg morfină orală. La pacienți cu insuficiență hepatică și renală, doza inițială va fi administrată cu prudență. *Copii sub 12 ani:* nu se recomandă.
Cind: Depresie respiratorie, traumatisme craniene, ileus paralitic, abdomen acut, evacuare gastrică întârziată, obstrucții respiratorii severe, astm bronșic, hipercarbie, sensibilitate la oxicodonă, boli hepatice acute sau insuficiență hepatică, insuficiență renală, tratament concomitent cu IMAO sau mai puțin de 2 săptămâni de la întreruperea lui. Nu se recomandă administrarea preoperator sau în primele 24 de ore postoperator.
A!: Se reduce doza în hipotiroidism. Precauții în utilizarea la pacienți dependenți de opioide, cu presiune intracraniană crescută, hipotensiune, hipovolemie, boli ale tractului biliar, pancreatită, boli inflamatorii intestinale, hipertrofie a prostatei, insuficiență adrenocorticală, alcoolism acut, boli renale sau hepatice cronice, pacienți tarați. Nu se administrează la pacienți cu ileus paralitic, iar dacă acesta apare în cursul tratamentului se va întrerupe imediat administrarea. Nu se administrează cu 24 ore înaintea unei intervenții chirurgicale. Se utilizează cu precauție după intervenții chirurgicale pe abdomen. Interacțiuni cu: tranchilizante, sedative, anestezice, hipnotice, alcool, relaxante musculare și antihipertensive, IMAO, cimetidină. Nu se recomandă administrarea în sarcină și la femei care alaptează. Poate afecta capacitatea de a conduce și de a mânui utilaje.
RA: Reacții adverse comune: constipație, greață, amețeală, vărsături, cefalee, uscăciunea gurii, transpirație, astenie, urticarie, prurit. Pot apărea toleranță și dependență (toleranța este minimală). La unii pacienți pot apărea: vertij, dezorientare, schimbări de dispoziție, palpitații, halucinații, bronhospasm și colici, disurie, spasme ureterale sau biliare. Foarte rar s-a observat hipotensiune sau bradicardie relevantă.

Intoxicația se manifestă prin: pupile punctiforme, depresie respiratorie și hipotensiune. În cazuri severe, pot apărea colaps circulator și comă profundă. Tratament în supradozarea masivă: naloxonă 0,8 mg intravenos. Se repetă la intervale de 2-3 minute, dacă este necesar, sau în perfuzie - 2 mg la 500 ml de soluție salină sau 5% dextroză (0,004 mg/ml). Supradozare mai puțin severă: naloxonă 0,2 mg intravenos urmată de creșteri de 0,1 mg la 2 minute dacă este necesar.

OXYMETAZOLINUM

COD ATC: R01AA05

AFRIN® *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Aerosol, clorhidrat de oximetazolină 0,05%; ct. × 1 fl. × 15 ml; ct. × 1 fl. × 20 ml ***(OTC)***

NAFAZIN *JUPHAR;* Sol. nazală, clorhidrat de oximetazolină 0,025%; 0,05%; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(OTC)***

NASAL SPRAY *PERRIGO;* Sol. ext. clorhidrat de oximetazolină 0,05%; ct. × 1 fl. spray × 30 ml ***(OTC)***

NASIVIN 0,01% *MERCK KGaA;* Sol. nazală, clorhidrat de oximetazolină 0,01%; ct. × 1 fl. × 5 ml ***(OTC)***

NASIVIN 0,025% *MERCK KGaA;* Sol. nazală, clorhidrat de oximetazolină 0,025%; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(OTC)***

NASIVIN® *MERCK KGaA;* Sol. ext. clorhidrat de oximetazolină 0,05%; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(OTC)***

NASIVIN® *MERCK KGaA;* Aerosol nazal clorhidrat de oximetazolină 0,05%; fl. de PE + nebulizator × 10 ml ***(OTC)***

RINOXIN *TIS FARMACEUTIC SA;* Sol. ext. clorhidrat de oximetazolină 0,025%; 0,05%; ct. × 1 fl. × 10 ml ***(OTC)***

WICK SINEX *PROCTER & GAMBLE;* Aerosol nazal clorhidrat de oximetazolină 0,05%; fl. × 15 ml ***(OTC)***

Ind: Trat. simptomatic al congestiei nazale în: rinita non-alergică, rinita alergică sezonieră și perenă, afecțiuni sinuzale (prin facilitarea eliminării secrețiilor), otita medie (ca adjuvant). Nu se utilizează ca trat. de întreținere.
Dz: *Adulți și copii peste 6 ani:* 2-3 pic., în fiecare nară, de 2 ori/zi, dimineața și seara.
Cind: Hipersensibilitate la unul din componenți. Glaucom cu unghi închis; pacienți în trat. cu IMAO; rinită uscată sau atrofică; după hipofizectomie transsfenoidală sau după o intervenție la nivel nazal sau bucal cu afectarea durei mater. Sarcină și alăptare.
A!: HTA, afecțiuni coronariene, hipertiroidism sau diabet zaharat. Pacienți care reacționează puternic la adrenergice (insomnie, vertij, tremurături, aritmie cardiacă). Se adm. maxim 3-5 zile; utilizarea prelungită și excesivă conduce la hiperemie secundară și rinită cronică.
RA: Locale: Ocazional, senzație de arsură și iritare la nivelul nasului și gâtului. În utilizare excesivă și prelungită: uscăciunea mucoasei nazale, hiperemie secundară și o rinită iatrogenă. Generale: Greață, cefalee, insomnie, bradicar-

die și rareori palpitații. Izolat manifestări alergice sistemice și tulburări pasagere ale vederii.

OXYTOCINUM

COD ATC: H01BB02

OXITOCINĂ S *BIOFARM SA;* Sol. parent. oxitocină sintetică 1 UI/ml; ct. × 100 f. × 2 ml ***(S)***

OXYTOCIN *FERRING LECIVA;* Sol. inj. oxitocină sintetică 2 UI/ml; 5 UI/ml; ct. × 5 f. × 1 ml ***(S)***

Ind: Declanșarea travaliului, în caz de inerție uterină sau când sarcina implică riscuri majore pentru mamă și copil; expulzia placentei și controlul hemoragiilor post-partum sau postabortum; în cadrul operației cezariene; pentru efectuarea "testului de provocare" prin oxitocină.
Dz: Declanșarea travaliului - perf. i.v. 5 u.i. în 500 ml sol. glucozată 5% - inițial 2-4 pic./min și, dacă răspunsul uterin este insuficient după 15-20 min, se crește progresiv cu 2-4 pic/min, până la cel mult 40 pic. (sau 20 miliunități)/min; se poate inj. și i.m. 0,5-1 UI la 1/2-1 oră. Pentru controlul metroragiei post-partum se inj. s.c., i.m. sau i.v. (lent, cu prudență) 2-4 UI. În operația cezariană se inj. i.m. 4-12 UI (după extragerea copilului).
Cind: Hipertonie uterină, intervenție cezariană în antecedente sau alte cicatrice uterine mari, multipare, placenta praevia, disproporție cefalo-pelvină importantă, malpoziție fetală, suferință fetală evidentă, toxemie severă.
A!: HTA; toxemie gravidică. Inj. i.v. necesită prudență.
RA: Contracția tetanică a miometrului (cu suferință fetală, ruptură uterină); cefalee, amețeli, tahicardie, dureri anginoase, edeme.

P

PACLITAXELUM

COD ATC: L01CD01

PAXENE *IVAX PHARMACEUTICALS;* Sol. perf. 6 mg/ml × 5 ml; 6 mg/ml × 16,7; 6 mg/ml × 25 ml; 6 mg/ml × 50 ml ***(S)***

SINDAXEL® 100 mg/16,67 ml *SINDAN SRL;* Conc. pt. sol. perf. 6 mg/ml; fl. × 16,67 ml ***(S)***

SINDAXEL® 260 mg/43,33 ml *SINDAN SRL;* Conc. pt. sol. perf. 6 mg/ml; fl. × 43,33 ml ***(S)***

SINDAXEL® 30 mg/ml *SINDAN SRL;* Conc. pt. sol. perf. 6 mg/ml; fl. × 5 ml ***(S)***

TAXOL® *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Conc. pt. sol. perf. 6 mg/ml; fl. × 5 ml ***(S)***

Ind: Cancerul pulmonar non-microcelular (cu celule "non small" NSCLC). Cancerul ovarian. Cancerul mamar. Sarcomul Kaposi la pacienții cu sindrom de imunodeficiență.

Dz: Premedicație: dexametazonă 20 mg oral (sau echivalentul) cu 12 și 6 ore înainte de paclitaxel, difenhidramină 50 mg i.v. cu 30-60 min înainte și cimetidină (300 mg) sau ranitidină (50 mg) i.v. cu 30-60 min înainte. Trat. de primă linie al cancerului ovarian: 135 mg/m^2, în perfuzie 24 h, urmat de cisplatin 75 mg/m^2, la 3 săpt. Trat. de linia a doua al cancerului ovarian și mamar: 175 mg/m^2 în perfuzie 3 h la un interval de 3 săpt. Trat. de primă linie al NSCLC: 175 mg/m^2 în perfuzie de 3 h, urmată de un compus de platină, la un interval de 3 săpt. Trat. sarcomului Kaposi la pacienții cu sindrom de imunodeficiență: 135 mg/m^2 în perfuzie de 3 h la un interval de 3 săpt. sau 100 mg/m^2 în perfuzie de 3 h la interval de 2 săpt.
Cind: Reacții de hipersensibilitate severă la paclitaxel. Neutropenie, sub 1500/mm^3 (sub 1000/mm^3 la pacienții cu sarcom Kaposi). Sarcină și alăptare.
A!: Adm. sub supraveghere medicală, cu trusă anti-șoc la îndemână. În cazul reacțiilor grave de hipersensibilitate, se va întrerupe imediat perfuzia și se va începe trat. simptomatic. Examene hematologice frecvente; nu se adm. dacă neutrofilele < 1500/mm^3 și trombocitele sub 100 000/mm^3. În caz de neutropenie severă sau neuropatie periferică severă dozele se reduc cu 20%.
RA: Neutropenie severă cel puțin 7 zile, infecții oportuniste. Trombocitopenie. Anemie. Reacții de hipersensibilitate severă cu posibilă evoluție letală. Modificări ale ECG. HTA, manifestări trombotice severe, hTA asociată cu șoc septic, cardiomiopatie și tahicardie asociate cu febră. Crize epileptice, encefalopatie, tulburări de vedere, neuropatie vegetativă și motorie cu ileus paralitic. Alopecie. Greață, vărsături, diaree și mucozite, obstrucție intenstinală, perforații și tromboză mezenterică. Creșteri marcante ale GOT, fosfatazei alcaline sau bilirubinei. Necroză și encefalopatie hepatică. Creștere reversibilă a creatininei serice. Reacții locale – edem, durere, eritem și indurație; ocazional, extravazarea poate duce la celulită.

PANCURONII BROMIDUM

COD ATC: M03AC01

PAVULON *N.V. ORGANON;* Sol. inj., 4 mg/ml bromură de pancuroniu (f. × 2 ml) ***(S)***

Ind: Miorelaxant (adjuvant al anesteziei generale și în vederea ușurării ventilației mecanice); oprirea convulsiilor în tetanos.
Dz: I.v. inițial la *adulți* 50-100 µg/kg, apoi 10-20 µg/kg. *Copil:* inițial 60-100 µg/kg, apoi 10-20 µg/kg.
Cind: Hipersensibilitate la produs.
A!: În situații care cresc intensitatea și durata efectului curarizant: hipokaliemie, hipermagneziemie, hipocalcemie, IR, deshidratare, acidoză metabolică, hipoproteinemie, cașexie, miastenie gravă, distrofie miotonică, după poliomielită, cancer (îndeosebi cancer pulmonar); hipotermia scade efectul curarizant, reîncălzirea îl crește. Prudență la hepatici, hipertensivi, sarcină, icterul obstructiv.
RA: Paralizia musculară durabilă sau apnee, tahicardie, hipersecreții, rareori HTA, bronhospasm, erupții cutanate.

PANTOPRAZOLUM

COD ATC: A02BC02

CONTROLOC *ALTANA PHARMA AG;* Cpr. gastrorez., 40 mg ***(P-RF)***

CONTROLOC 20 mg *ALTANA PHARMA AG;* Cpr. film. gastrorez., 20 mg ***(P-RF)***

CONTROLOC® I.V. *ALTANA PHARMA AG;* Liof. pt.. sol. inj., 40 mg ***(P-RF)***

Ind: Trat. ulcerului duodenal; ulcerului gastric; refluxului esofagian și al simptomelor asociate; trat. si profilaxia esofagitei de reflux.
Dz: Adm. internă: Trat. ulcerului duodenal: 20 mg/zi, 4 săptămâni. Trat. ulcerului gastric: 20 mg/zi, 4-8 săptămâni. Trat. refluxului esofagian: 20 mg/zi; deși simptomele pot să dispară după 2-4 săptămâni, pentru vindecarea leziunilor poate fi nevoie de 4-8 săptămâni de trat. Trat. și profilaxia esofagitei de reflux: 20 mg/zi; dacă apar recăderi, doza poate fi crescută la 40 mg/zi; se recomandă revenirea la doza inițială după ameliorarea simptomelor. Durata trat. nu trebuie să depășească 1 an. La pacienții cu IH nu trebuie depășită doza de 20 mg/zi. *Adm. i.v.:* se recomandă numai dacă adm. pe cale orală a antisecretorilor nu este posibilă. Doza recomandată: 40 mg/zi. Soluția (ca atare sau după diluare cu 100 ml soluție salină izotonă sau cu glucoză 5% sau 10%) se va adm. în timp de 2-15 minute. Imediat ce este posibilă adm. orală, trat. i.v. trebuie întrerupt, administrându-se 40 mg po. Durata trat. nu trebuie să depășească 8 săptămâni. Pacienți cu IH gravă: 20 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la pantoprazol sau la oricare dintre excipienții produsului; femei care alăptează.
A!: *Adm. internă:* Nu se recomandă în trat. tulburărilor gastrointestinale ușoare. Înaintea începerii tratamentului, se impune excluderea malignității leziunii cu localizare gastrică sau esofagiană. Diagnosticul de esofagită de reflux trebuie confirmat endoscopic. Trebuie avut în vedere riscul de dezvoltare a bacteriilor la nivelul stomacului în timpul trat. cu antisecretorii. În IH sunt necesare monitorizarea funcției hepatice și, eventual, ajustarea dozelor. Nu au fost stabilite siguranța și eficacitatea produsului la copii. *Adm. i.v.:* Numai dacă nu este posibilă administrarea pe cale orală. La vârstnici sau la pacienții cu IR nu se vor administra doze mai mari de 40 mg/zi. La pacienții cu IH trebuie monitorizate valorile enzimelor hepatice. În cazul creșterii enzimelor hepatice trat. cu pantoprazol i.v. trebuie întrerupt. Atenție în sarcină și alăptare.
RA: *Adm. internă:* cefalee, diaree, constipație, flatulență, prurit și reacții alergice. Rareori greață, amețeală și tulburări de vedere. S-au raportat cazuri de edeme periferice, febră, mialgii, depresie și creșteri ale enzimelor hepatice și ale trigliceridelor. *Adm. i.v.:* ocazional cefalee sau diaree. Rareori greață, durere în etajul abdominal superior, flatulență, rash cutanat, prurit și amețeală. S-au raportat cazuri de edem, febră, tromboflebită, depresie și tulburări de vedere.

PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM *COD ATC: A03AD01*

CLORHIDRAT DE PAPAVERINĂ *FABIOL SA;* Cpr. 100 mg clorhidrat de papaverină ***(P-6L)***

PAPAVERINĂ *SICOMED SA;* Sol. inj. 40 mg/ml (f. × 1 ml) ***(S/P-RF)***

PAPAVERINĂ *GALENIC FARM SRL;* Cpr. 50 mg; cpr. 100 mg ***(OTC)***

PAPAVERINĂ *OZONE LAB. Ltd.;* Cpr. 100 mg ***(P-6L)***

PAPAVERINĂ *FARMACOM SA;* Cpr. 200 mg ***(P-6L)***

PAPAVERINĂ 100 mg *LAROPHARM SRL;* Cpr. 100 mg ***(P-6L)***

PAPAVERINĂ 100 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. 100 mg ***(S/P-6L)***

PAPAVERINĂ 100 mg *SICOMED SA;* Cpr. 100 mg ***(P-6L)***

PAPAVERINĂ 100 mg *AESCULAP SRL;* Cpr. 100 mg ***(S/P-6L)***

PAPAVERINĂ CLORHIDRAT *SINTOFARM SA;* Cpr. 100 mg ***(P-6L)***

Ind: Colici intestinale, biliare și ureterale; dismenoree. Tulburări circulatorii cerebrale și periferice.
Dz: Oral 100 mg de 2-4 ori/zi. Inj. i.m. sau s.c (diluat și lent, în 2-3 minute) 40-80 mg la 6 ore. În perf. i.v. (în soluție clorurată sau glucozată izotonă, la pH max 6), 40-200 mg o dată.
Cind: Hipersensibilitate la papaverină. BAV. Hipertensiune intracraniană. Sarcină și alăptare.
A!: Bolnavi cu tahicardie, glaucom, adenom de prostată și vârstnici predispuși la constipație cronică. Șoferi și activități de precizie.
RA: Tahicardie, congestia feței, somnolență, constipație. Rar, în trat. prelungit pot crește transaminazele și fosfataza alcalină. Inj. i.v. poate produce aritmii, BAV, colaps, deprimare respiratorie.

PARACETAMOLUM *COD ATC: N02BE01*

ADOL *JUPHAR;* Sirop 120 mg/5 ml (fl. × 60 ml) ***(OTC)***

ALDOLOR *CTS CHEMICAL IND.;* Sol. orală 100 mg/ml (fl. × 20 ml) ***(OTC)***

CALPOL® ºase plus suspensie *GLAXO SMITKLINE;* Susp. orală 250 mg/5 ml (fl. × 100 ml) ***(OTC)***

CALPOL® suspensie pt. copii mici *GLAXO SMITKLINE;* Susp. orală 120 mg/5 ml (fl. × 100 ml; fl. × 140 ml) ***(OTC)***

CHILDREN'S TYLENOL *Mc NEIL CONSUMER HEALTHCARE*; Susp. orală 120 mg/5 ml (fl. × 120 ml); Cpr. mast. 80 mg ***(OTC)***

EFFERALGAN JEUNE ENFANT *LAB. UPSA;* Supoz., 150 mg ***(OTC)***

EFFERALGAN NOURRISSONS *LAB. UPSA;* Supoz., 80 mg ***(OTC)***

EFFERALGAN pt. copii *LAB. UPSA;* Sol. orală, 60 mg/2 ml (fl. × 90 ml) ***(OTC)***

EFFERALGAN® 500 *LAB. UPSA;* Cpr. eff., 500 mg ***(OTC)***

EXTRA STRENGTH NON ASPIRIN *LEINER HEALTH PRODUCTS;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

FEBRICET *HEMOFARM VRASC;* Sirop 120 mg/5 ml (fl. × 100 ml) ***(OTC)***

INFANT'S TYLENOL *Mc NEIL CONSUMER HEALTHCARE*; Sol. orală 80 mg/ 0,8 ml (fl. × 15 ml) ***(OTC)***

INFANT'S TYLENOL ACETAM. *Mc NEIL CONSUMER HEALTHCARE*; Susp. orală 80 mg/0,8 ml (fl. × 15 ml) ***(OTC)***

N-PARACETAMOL *NORDFARM PRODUCT;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

NON ASPIRIN CHILDREN'S CH *LEINER HEALTH PRODUCTS;* Cpr. mast. 80 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. mast. ***(OTC)***

PANADOL *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. 500 mg ***(S/OTC)***

PANADOL® *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. eff. 500 mg ***(S/OTC)***

PANADOL BABY *GLAXO SMITHKLINE;* Susp. orală 120 mg/5 ml (fl. × 100 ml; fl. × 300 ml) ***(OTC)***

PANADOL RAPIDE *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

PARACETAMOL *BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP;* Susp. orală 120 mg/5 ml (fl. × 60 ml) ***(OTC)***

PARACETAMOL *ANTIBIOTICE IAȘI;* Sup. sugari 125 mg; Sup. copii 250 mg ***(OTC)***

PARACETAMOL 125 supoz. *EUROPHARM SA;* Sup. sugari, copii mici 125 mg ***(S/OTC)***

PARACETAMOL 250 supoz. *EUROPHARM SA;* Sup. copii peste 3 ani 125 mg ***(S/OTC)***

PARACETAMOL *FARMEX COMPANY;* Cpr. 500 mg ***(S/OTC)***

PARACETAMOL *SICOMED;* Cpr. 500 mg ***(S/OTC)***

PARACETAMOL *OMEGA PHARMA SA;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

PARACETAMOL *EUROPHARM SA;* Cpr. 250; 500 mg ***(OTC)***

PARACETAMOL *ARENA GROUP SA;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

PARACETAMOL *NORDFARM PRODUCT;* Sup. 250 mg; 125 mg ***(OTC)***

PARACETAMOL *FARMADEF;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

PARACETAMOL *SANTA SA;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

PARACETAMOL *FABIOL;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

PARACETAMOL *HELCOR;* Sup. 125 mg; 250 mg ***(OTC)***

PARACETAMOL *OZONE LAB. Ltd.;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

PARACETAMOL *SINTOFARM;* Cpr. 100 mg ***(OTC)***

PARACETAMOL *FLORILEX PHARMAMIT;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

PARACETAMOL *PROMEDIC;* Cpr. 100 mg ***(OTC)***

PARACETAMOL *ARGEȘFARM;* Sup. 125 mg, 250 mg ***(OTC)***

PARACETAMOL *SINTOFARM;* Sup. 500 mg ***(OTC)***

PARACETAMOL *LAB. REMEDIA SRL;* Sup. 125 mg, 250 mg ***(OTC)***

PARACETAMOL *SINTOFARM SA;* Cpr. 500 mg ***(S/OTC)***

PARACETAMOL *SANTA SA;* Sup. 125 mg, sup. 250 mg ***(OTC)***

PARACETAMOL *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cpr. 500 mg ***(S/OTC)***

PARACETAMOL 250 mg *EUROPHARM SA;* Sup. 250 mg ***(S/OTC)***

PARACETAMOL LPH® 500 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. 500 mg ***(S/OTC)***

PARACETAMOL PT. COPII *PHARMAPLANT BIOGALENICA SRL;* Sol. orală 120 mg/5 ml (fl. × 100 ml) ***(OTC)***

PARACETOL *TIS FARMACEUTIC SA;* Sol. orală 2,4% (fl. × 100 ml) ***(OTC)***

PARAMIDOL *PHARMEX ROM IND.;* Cpr. mast. 80 mg ***(OTC)***

PARAMOL *FARMACOM SA;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

SANADOR *LAROPHARM SRL;* Cpr. 500 mg ***(OTC)***

TYLENOL EXTRA STRENGHT *Mc NEIL CONSUMER HEALTHCARE;* Cpr. film. 800 mg ***(OTC)***

Ind: Durere ușoară și medie. Febră.
Dz: *Oral: Adulți și copii peste 15 ani:* 500-1000 mg la 4 ore, maxim 4 g/zi în trat. pe termen scurt și 2,5 g/24 ore în cel pe termen lung. *Copii:* 60 mg/kg; se poate repeta la 6 ore; *5-8 ani* (17-24 kg): 250 mg de 3-4 ori/zi, maxim 1 g/zi; *8-12 ani* (24-35 kg): 250-500 mg de 3-4 ori/zi maxim 2 g /zi; *12-15 ani* (35-50 kg): 250-750 mg de 3-4 ori/zi maxim 3 g/zi. Dacă clearance-ul creatininei < 10 ml/min, 2 doze se dau la minim 8 ore. *Intrarectal: Copii de 6-12 luni:* câte 125 mg, de 3 ori/zi; *copii de 1-3 ani:* câte 125 mg, de 3 ori/zi; *copii de 3-7 ani:* câte 250 mg de 1-2 ori/zi; *copii de 7-15 ani:* câte 250 mg de 1-3 ori/zi. Durata trat. maxim 10 zile. *Adulți:* 1 sup. de 2 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate (alergie sau idiosincrazie) la paracetamol; IH; deficit de G-6-PDH.
A!: Alcoolism și afecțiuni hepatice, incluzând hepatita virală. IR gravă (numai în trat. de lungă durată cu doze mari). Monitorizarea funcțiilor hepatice în cazul trat. de lungă durată și cu doze mari la pacienții cu leziuni hepatice preexistente. Asocierea cu AINS.
RA: Rar reacții alergice (rash cutanat, parestezii sau prurit), trombocitopenie (asimptomatică, rar sângerări sau hematoame, sânge în urină și fecale, pete roșii pe tegumente), agranulocitoză, dermatită, hepatită, colică renală, IR. La doze mari și trat. prelungit afectarea funcției renale până la IRC.

PARECOXIBUM *COD ATC: M01AH*

DYNASTAT *PHARMACIA - Membru al Grupului PFIZER;* Pulb. + solv. pt. sol. inj. 20 mg; Pulb. + solv. pt. sol. inj. 20 mg ***(P-RF)***

DYNASTAT *PHARMACIA* - Membru al Grupului PFIZER; Pulb. pt. sol. inj. 20 mg; Pulb. pt. sol. inj. 40 mg ***(P-RF)***

Ind: Trat. pe termen scurt al durerilor post-operatorii.
Dz: 40 mg i.v. în bolus sau i.m. profund; apoi 20-40 mg la 6-12 ore; doza maximă 80 mg/zi. La *vârstnici < 50 kg și IH moderată:* ½ din doza normală.
Cind: Antecedente de bronhospasm, rinită, edem angioneurotic, urticarie provocată de AINS. Sarcină. IH severă. Ulcer gastroduodenal. IC congestivă.
RA: HTA sau hTA; dureri lombare; edeme; dispepsie, flatulență; agitație, insomnie, prurit; oligurie.

PAROXETINUM

COD ATC: N06AB05

PAROXAT *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. 20 mg

SEROXAT *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. 20 mg, 30 mg *(P-RF)*

SEROXAT LIQUID *GLAXO SMITHKLINE;* Susp. orală 20 mg/ml (fl. × 150 ml) *(P-RF)*

Ind: Depresie, inclusiv depresia severă și reactivă și depresia însoțită de anxietate. Efect începând din a 2-a săpt. de trat. Tulburări obsesiv-compulsive. Atacuri de panică cu sau fără agorafobie. Anxietate socială/fobie socială.
Dz: *Depresie:* 20 mg/zi; se poate crește cu 10 mg/zi, până la maximum 50 mg/zi. *Tulburări obsesiv-compulsive:* 40 mg/zi, maximum 60 mg/zi. *Atacuri de panică:* 40 mg/zi, maximum 60 mg/zi. Inițial se adm. o doză minimă pt. a reduce posibilitatea agravării simptomatologiei. *Anxietate socială/fobie socială:* 20 mg/zi, maximum 50 mg/zi. Se adm. odată pe zi dimineața, la masă. *Vârstnici:* maximum 40 mg/zi. La pacienții cu IR severă și IH se adm. doza minimă recomandată.
Cind: Hipersensibilitate la paroxetină. Copii. Asocierea cu alcool.
A!: Nu se asociază inhibitori de MAO, medicație pe bază de triptofan. Prudență la asocierea cu neuroleptice. Precauție în caz de manie, afecțiuni cardiace, epilepsie, convulsii, glaucom. Sarcină. Alăptare. Șoferi și activități de precizie.
RA: Grețuri, somnolență, transpirații, tremurături, astenie, uscarea mucoasei bucale, insomnie, disfuncții sexuale, constipație, diaree și diminuarea apetitului. Rar: amețeli, rash, glaucom acut, retenție urinară, trombocitopenie, sindrom serotoninergic (agitație, confuzie, diaforeză, halucinații, hiperreflexie, mioclonus, tahicardie, tremurături) și simptome sugestive pentru hiperprolactinemie (galactoree); hiponatriemie reversibilă mai ales la vârstnici. Creșterea enzimelor hepatice cu rare anomalii hepatice severe. Rareori tulburări de sângerare, variații tensionale, confuzie, convulsii și reacții de fotosensibilizare. Ocazional tulburări extrapiramidale la pacienți cu tulburări de fond ale funcțiilor motorii sau cu medicație neuroleptică. Întreruperea bruscă a trat.: amețeli, tulburări senzoriale, tulburări de somn, agitație sau anxietate, grețuri și transpirații.

PEFLOXACINUM

COD ATC: J01MA03

ABAKTAL *LEK PHARMACEUTICALS;* Cpr. film. 400 mg mesilat de pefloxacină; Sol. inj. 80 mg/ml (f. × 5 ml) ***(P-RF);*** Sol. inj. i.v. 400 mg/5 ml *(P-RF)*

PEFLACINE *RHÔNE-POULENC RORER;* Cpr. film. 400 mg; Sol. inj. 80 mg/ml (f. × 5 ml) *(P-RF)*

PROFLOX *CIPLA;* Sol. oft. 0,3% mesilat de pefloxacină (fl. × 5 ml) *(P-RF)*

Ind: La adult, în infecții severe cu bacili gram-negativ și cu stafilococi: septicemie și endocardită; meningită; infecții respiratorii și din sfera ORL, renale, ginecologice, abdominale și hepato-biliare, osteo-articulare, cutanate; uretrita gonococică și nespecifică.
Dz: 800 mg/zi oral în 2 prize, dimineața și seara, în timpul meselor. Uretritele gonococice - 800 mg în doză unică. Calea i.v.: perf. lent (peste o oră), după

diluarea în 250 ml de glucoză 5% de 2 ori/zi, dimineața și seara. Nu se va dilua în soluție hidrosalină sau altă soluție ce conține ioni clorură. Nu se amestecă în perfuzie cu alte medicamente. Adm. i.v. 8 mg/kg: de 2 ori/zi în absența ascitei sau a sindromului icteric; o dată/zi în prezența sindromului icteric; o dată la 36 ore în caz de ascită; o data la 48 ore când coexistă ascita cu sindromul icteric; la vârstnici 400 mg/zi, la 12 ore.
Cind: Alergie la chinolone; deficit de G-6-PDH; copii; sarcină și alăptare.
A!: Se va evita expunerea la radiații solare sau UV. Se reduce efortul fizic, se preferă repausul la pat pe durata trat. Miastenia gravis; IH severă; vârstnici; predispoziție la tendinite induse de chinolone; pacienții sub trat. cronic cu corticosteroizi și cei cu predispoziție la convulsii.
RA: Reacții cutanate alergice și de fotosensibilizare la radiații solare sau UV. Dureri articulare și musculare, tendinite. Trombocitopenie, rar neutropenie. Tulburări neurologice: cefalee, insomnie, convulsii și tulburări de conștiență. Tulburări digestive: gastralgii, vărsături. În caz de durere sau inflamarea tendonului lui Achile se oprește adm. și se recomandă repaus la pat.

PEGINTERFERON alfa-2a

COD ATC: L03AB11

PEGASYS® 135 *µg*; 180 *µg* *HOFFMANN LA ROCHE;* Sol. inj. 135 µg/ml; 180 µg/ml; seringă preumplută × 0,5 ml ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. hepatitei cronice tip C confirmată histologic la pacienții adulți cu valori crescute ale transaminazelor și cu ARN-VHC seric pozitiv, precum și la pacienții cu ciroză compensată (în asociere cu ribavirină). Această asociere este indicată atât la pacienții care nu au urmat un trat. anterior, cât și la cei care au fost tratați și au răspuns inițial la trat. cu interferon alfa, dar la care boala a recidivat după oprirea trat. Monoterapie îndeosebi în caz de intoleranță sau contraindicație a tratamentului cu ribavirină.
Dz: Tratamentul trebuie inițiat doar de către un medic cu experiență în trat. Doza recomandată: 180 µg, o dată pe săpt. s.c. la nivelul abdomenului sau coapsei în asociere cu ribavirină administrată oral sau în monoterapie. Ribavirina trebuie administrată în timpul mesei. IR: doza inițială de 135 µg; se reduce în cazul apariției RA.
Cind: Hipersensibilitate la substanța activă, interferoni sau la oricare dintre excipienții produsului; hepatită autoimună; disfuncție hepatică severă sau ciroză hepatică decompensată; nou-născuți și copii până la 3 ani; antecedente de afecțiune cardiacă severă, incluzând afecțiune cardiacă instabilă sau necontrolată în ultimele 6 luni; afecțiuni psihice severe preexistente, depresie; sarcină și alăptare.
A!: În cazul asocierii cu ribavirină, se efectuează teste de lab. înaintea inițierii și în timpul trat. Trat. se poate institui în cazul următoarelor valori inițiale: nr. trombocite > 90000/ mm^3; nr. absolut de neutrofile > 1500/mm^3. Testele hematologice trebuie repetate după 2 și 4 săptămâni, iar testele biochimice trebuie efectuate la 4 săptămâni. Prudență la pacienții cu istoric de depresie. Se recomandă ca la pacienții cu disfuncții cardiace preexistente să se efectueze ECG înaintea începerii trat. Dacă apar modificări ale statusului cardiovascular, tratamentul trebuie suspendat sau întrerupt. Apariția anemiei la pacienții cu boli cardiovasculare poate necesita reducerea dozei sau întreruperea adm. Se întrerupe adm. la pacienții la care apar semne de decompensare hepatică în timpul trat.

RA: Generale - sindrom pseudogripal, letargie, frison, bufeuri, slăbiciune, herpes simplex. Neuropsihice - afectarea memoriei, disgeuzie, parestezii, hipoestezie, tremor, tulburări emoționale, tulburări ale dispoziției, nervozitate, agresivitate, scăderea libidoului, impotență sexuală. Musculo-scheletice - dureri osoase, lombalgii, cervicalgii. Cutanate - erupții cutanate, eczemă, psoriazis, urticarie, fotosensibilitate, hipersudorație. Cardiovasculare - palpitații. Respiratorii - infecții ale căilor respiratorii, rinită, rinofaringită, congestia sinusurilor, congestie pulmonară, dispnee de efort. Gastrointestinale - vărsături, dispepsie, gastrită, flatulență, uscăciunea gurii, ulcerații orale. Oftalmologice - xeroftalmie, inflamația globului ocular, dureri oculare. Hematologice - limfadenopatie, anemie.

PEGINTERFERON alfa-2b *COD ATC: L03AB10*

PEGINTRON *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Pulb. + solv. pt. sol. inj., 50 µg/0,5 ml; pulb. + solv. pt. sol. inj., 80 µg/0,5 ml; pulb. + solv. pt. sol. inj., 100 µg/ 0,5 ml; pulb. + solv. pt. sol. inj., 120 µg/0,5 ml; pulb. + solv. pt. sol. inj., 150 µg/0,5 ml. Pen cu 50 µg/0,5 ml; 80 µg/0,5 ml; 100 µg/0,5 ml; 120 µg/0,5 ml; 150 µg/0,5 ml ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. hepatitei cronice C (în asociere cu ribavirină). Această combinație este indicată la pacienții naivi ca și la pacienții care au răspuns la tratament cu interferon alfa-2b în monoterapie, dar care au recăzut ulterior. Monoterapie, în special în caz de intoleranță sau contraindicație la ribavirină.

Dz: Adm. s.c. săptămânal. Doza se stabilește în funcție de utilizarea sa în combinație cu ribavirină sau în monoterapie. *Terapie combinată:* Pegintron 1,5 µg/kg/săptămână + ribavirină cps. de 2 ori/zi. În fucție de greutatea corporală: sub 40 kg: Pegintron 50 µg/săpt. + 800 mg ribavirină/zi; 40-50 kg: Pegintron 80 µg/săpt. + 800 mg ribavirină/zi; 51-64 kg: Pegintron 80 µg/săpt. + 800 mg ribavirină/zi; 65-75 kg: Pegintron 100 µg/săpt. + 1000 mg ribavirină/zi; 76-85 kg: Pegintron 120 µg/săpt. + 1000 mg ribavirină/zi; peste 85 kg: Pegintron 150 µg/săpt. + 1200 mg ribavirină/zi. *Monoterapie:* 0,5-1,0 µg/kg/săptămână. Durata tratamentului: Se recomandă ca pacienții să fie tratați inițial 6 luni.

Cind: Hipersensibilitate la substanța activă sau orice tip de interferon sau la oricare dintre excipienți; femei gravide; femei care alăptează; afecțiuni psihice severe, tentativă de suicid; istoric de afecțiune cardiacă preexistentă severă, inclusiv afecțiune cardiacă instabilă sau necontrolată, în ultimele șase luni; afecțiuni medicale severe debilitante, inclusiv IRC; hepatită autoimună; disfuncție hepatică severă sau ciroză hepatică decompensată; afecțiune tiroidiană preexistentă, dacă aceasta nu poate fi controlată prin terapie convențională; epilepsie.

A!: Atenție la pacienții care sunt predispuși să dezvolte tulburări autoimune. Precauție la cei cu tulburări oftalmologice, incluzând hemoragiile retiniene, scotoamele și obstrucția arterei sau venei retiniene; diabet zaharat sau HTA, ICC în antecedente; tulburări psihice, în special depresie, tentativ suicid.

RA: La nivelul întregului corp: sindrom pseudogripal – cefalee, oboseală, frison, astenie, febră, durere toracică, durere în CSD, stare de rău. Gastrointestinale: greață, anorexie, dispepsie. Musculoscheletale: mialgii, artralgii. Psihice: depresie, iritabilitate, insomnie, anxietate, agitație. Respirator: tuse neproductivă, rinită, dispnee. Hematologic: anemie, leucopenie. Reproducător: hemoragii, tulburări menstruale. Endocrin: hipotiroidism. Sistem nervos: parestezii. Cardiovascular: tahicardie, palpitații. Tegumente și anexe: Transpirație abundentă, prurit, erupții. Altele: amețeală, senzație de gură uscată.

PENCICLOVIRUM *COD ATC: D06BB06*

VECTAVIR *NOVARTIS PHARMA AG;* Cremă 1% (tub × 5 g) ***(P-RF)***

Ind: Trat. herpesului labial.
Dz: *Adulți (peste 16 ani):* aplicații la 2 ore, timp de 4 zile; aplicații cât mai devreme posibil după apariția primelor semne de infecție.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la penciclovir sau alți constituenți ai produsului.
A!: Aplicare exclusivă pe veziculele labiale sau în jurul orificiului bucal, nu pe mucoase sau în apropierea ochilor. Copii. Sarcină. Alăptare.
RA: Rar, senzații pasagere de arsură, usturime, amorțeală.

PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS *COD ATC: C01DA05*

NITROPECTOR *TERAPIA SA;* Cpr. 20 mg pentaeritril tetranitrat ***(S/P-6L)***

PECTONIT *OZONE LAB.;* Cpr. 20 mg pentaeritril tetranitrat ***(P-6L)***

PENTALONG *ISIS PHARMA;* Cpr. 50 mg pentaeritril tetranitrat ***(P-6L)***

Ind: Profilaxia și trat. de lungă durată al anginei pectorale.
Dz: *Adulți:* 50 mg de 2-3 ori/zi; maximum 240 mg zilnic, cu 30 min înaintea meselor.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută față de nitroderivați; insuficiență circulatorie acută (șoc, colaps circulator); hTA severă; șoc cardiogen; IMA. Trat. crizelor de angină pectorală. Sarcină. Alăptare.
A!: Cardiomiopatie obstructivă hipertrofică, pericardită constrictivă, tamponadă cardiacă; IC stângă; hTA cu valori sistolice sub 90 mmHg; predispoziție la tulburări circulatorii ortostatice; stenoză aortică și/sau mitrală; afecțiuni cu hipertensiune intracraniană. Șoferi și activități de precizie.
RA: La începutul trat. pot apărea presiune temporală și cefalee, care dispar la câteva zile de trat. Ocazional hTA ortostatică asociată cu obnubilare, vertij și astenie, tahicardie reflexă. Rareori tulburări gastrointestinale, reacții alergice cutanate. Rar, stare de colaps cu bradicardie și sincope, ca și hTA marcată cu accentuarea simptomelor de angină pectorală. Risc de dezvoltare a toleranței.

PENTAZOCINUM *COD ATC: N02AD03 N02AD01*

FORTRAL *KRKA d.d.;* Cpr. 50 mg clorhidrat de pentazocină ***(S/P-RF)***; Sol inj. 30 mg/ml pentazocină lactat ***(S/P-RF)***

FORTWIN® *RANBAXY LABORATOIRES Ltd.;* Sol. inj. 30 mg/ml ***(S/P-RF)***;

SALDOREN® *SICOMED SA;* Sol. inj. 30 mg/ml × 1 ml ***(P-RF)***
COD ATC: N02AD01

Ind: Dureri moderate sau severe, acute sau cronice, în traumatisme, după intervenții chirurgicale, în IMA, în colici (ureterală, biliară); ca medicație preanestezică și pentru suplimentarea anesteziei chirurgicale.

Dz: Oral, 50-100 mg (după mese), la 3-5 ore; în durerile puternice se inj. s.c., i.m. sau i.v. 30 mg la 3-4 ore, maximum 1 mg/kg o dată pt. inj. s.c. sau i.m. și 0,5 mg/kg pt. inj. i.v.
Cind: Alergie la pentazocină, traumatisme craniene, leziuni ale creierului, hipertensiune intracraniană, stări convulsive, insuficiență respiratorie, sindrom abdominal acut de cauză necunoscută, IH gravă, intoxicație acută cu alcool, delirium tremens; copii mai mici de 12 ani. Alăptare.
A!: Bătrâni; astm bronșic, IH și IR, colecistită acută, pancreatită; bolnavi cu infarct de miocard care prezintă greață și vomă; în intervențiile pe căile biliare; instabilitate emoțională sau farmacodependență în antecedente. Se vor evita băuturile alcoolice. Substanță dopantă. Sarcină.
RA: Frecvent greață, vomă, amețeli, sedare, euforie, cefalee, sudorație; rareori anorexie, constipație sau diaree, tinitus, tulburări de vedere, coșmaruri, insomnie, hTA, tahicardie, deprimare respiratorie, erupții cutanate alergice, eozinofilie, granulocitopenie. Injectarea repetată poate provoca local indurație și scleroză. Potențialul de a dezvolta dependență este moderat pentru calea parenterală și slab pentru calea orală; poate declanșa sindromul de abstinență la morfinomani.

PENTOXIFYLLINUM *COD ATC: C04AD03*

AGAPURIN 600 RETARD *SLOVAKOFARMA;* Cpr. ret. 600 mg ***(P-6L)***

AGAPURIN R RETARD *SLOVAKOFARMA;* Cpr. ret. 400 mg ***(P-6L)***

ANGIOPENT 400 EP; ANGIOPENT 600 EP *HELCOR SRL;* Cpr. film. cu elib. prel. ***(P-6L)***

DARTELIN *LEK PHARMACEUTICALS;* Cpr. film. 400 mg ***(P-6L)***

PENTOXIFILIN *TERAPIA SA;* Dj. 100 mg ***(S/P-6L)***; Sol. inj. 20 mg/ml (f. × 5 ml) ***(S/P-RF)***

PENTOXI RETARD 400 mg *TERAPIA SA;* Cpr. film cu elib. prel. 400 mg ***(P-6L)***

TRENTAL *HOECHST MARION RUSSEL;* Conc. pt. sol. perf. 20 mg/ml; dj. 400 mg ***(P-6L)***

VASONIT RETARD 600 *TERAPIA SA;* Cpr. ret. 600 mg ***(P-6L)***

Ind: Tulburări circulatorii periferice arteriale și venoase de natură aterosclerotică sau diabetică; arteriopatie cronică obliterantă (stadiul II); tulburări trofice în sindromul post-trombotic, ulcer de gambă, gangrenă, degerături. Tulburări ale circulației cerebrale: sindrom ischemic, vertij, cefalee, tulburări de memorie și atenție, diminuarea capacității intelectuale. Tulburări circulatorii la nivel ocular și al urechii interne.
Dz: Oral sau combinat. Oral: 200-1200 mg/zi, doză de întreținere în timpul sau după mesele principale. Parenteral: Inițial se testează reacția pacientului, prin adm. a 2,5 ml sol. inj. diluată cu 7,5 ml ser fiziologic. În perf. i.v. inițial o fiolă în 250-500 ml sol. perf. (NaCl 9‰, levuloză 5%, glucoză sau înlocuitori ai masei sanguine), în 90-180 min. În zilele următoare, dozele pot fi crescute

cu câte 50 mg (2,5 ml sol. inj.), până la max. 300 mg (15 ml)/zi. În caz de tulburări grave de circulație se pot face 2 perfuzii pe zi.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la derivați xantinici. IM recent, hemoragii masive, scleroză cerebrală și coronariană cu hipertensiune. Sarcină. Alăptare.
A!: La bolnavii hipertensivi cu labilitate vasculară se dau doze progresive; în insuficiență cardiacă, adm. se va face în volume mici. În IR, maximum 800 mg/zi; în caz de hemoragie oculară, trat. va fi întrerupt imediat; în doze mari la diabetici poate crește secreția de insulină. Șoferi și activități de precizie.
RA: Frecvente tulburări gastro-intestinale (greață, vomă, arsuri, dureri epigastrice, diaree) și erupții pruriginoase. Rar, la doze mari, tahicardie, scăderea tensiunii arteriale, angină pectorală, senzație de căldură. În cazuri izolate, trombocitopenie, hemoragii cutanate și ale tractului digestiv.

PERINDOPRILUM

COD ATC: C09AA04

PRESTARIUM *LAB. SERVIER IND.;* Cpr. 4 mg perindopril ***(P-6L)***

Ind: Trat. HTA și IC.
Dz: *HTA:* 4 mg, o dată, dimineața, maximum 8 mg. *IC:* se începe cu 2 mg dimineața, putând crește până la 4 mg după o lună de trat. La *vârstnici* se începe cu 2 mg dimineața, putând crește până la 4 mg după o lună de trat. În *IR:* posologia va fi ajustată în funcție de Cl creatinină: 30-60 ml/min, doză de 2 mg/zi; între 15- 30 ml/min, doză de 2 mg, o dată la 2 zile; 15 ml/min, doză de 2 mg în ziua de dializă.
Cind: Sarcină, alăptare, copii.
A!: Asocierea cu diuretice.
RA: Tulburări digestive, vertij, crampe, erupții cutanate; uneori, tuse seacă.

PERMETHRINUM

COD ATC: P03AC04

NIX *GLAXO SMITHKLINE;* Cremă 1% permetrin (tub × 30 g) ***(P-RF)***

Ind: Trat. împotriva păduchilor de cap.
Dz: Utilizare după spălarea, limpezirea și uscarea părului. Cantitatea aplicată, după agitarea flaconului, trebuie să satureze întregul păr și scalpul (în special în spatele urechilor și pe ceafă). Se lasă pe păr 10 minute apoi se limpezește cu apă. Reluarea trat. este necesară dacă se observă păduchi vii la 7 zile sau mai mult după prima aplicare. Păduchii de cap se îndepărtează cu un pieptene adecvat.
Cind: Copii sub 2 luni.
A!: Întreruperea utilizării în caz de iritarea pielii sau de infecții. Nu se aplică în apropierea ochilor și în contact cu mucoasele. Sarcină. Alăptare.
RA: Mâncărimea, înroșirea sau inflamarea scalpului; manifestări astmatiforme.

PETHIDINUM

COD ATC: N02AB02

MIALGIN *SICOMED SA;* Sol. inj. 50 mg/ml clorhidrat de petidină ***(P-TS)***

Ind: Dureri puternice în colici, IMA, cancer, dureri postoperatorii, pregătirea anesteziei generale și a intervențiilor chirurgicale, analgezia obstetricală (în special în prezența contracțiilor uterine); EPA.

Dz: *Analgezic: Adulți:* s.c. sau i.m. 25-100 mg sau 25-50 mg inj. i.v. lent. La copii, 0,5-2 mg i.m. *Analgezie în obstetrică:* 50-100 mg i.m. sau s.c. (odată cu apariția contracțiilor uterine la intervale regulate); se poate repeta după 1-3 ore. *Medicație preoperatorie:* 50-100 mg i.m. sau s.c. cu 1 oră înainte de operație; la *copii* 0,5-2 mg/kg. *Ca adjuvant în anestezia generală:* 10-25 mg inj. i.v. lent. *Doze recomandate:* 100 mg o dată și 300 mg/zi.
Cind: Alergie, deprimare respiratorie marcată, traumatisme craniene și hipertensiune intracraniană, intoxicație acută cu alcool și delirium tremens, mixedem. Copii sub 3 ani.
A!: Copii peste 3 ani; sarcină (depresie respiratorie la nou-născut); bătrâni și bolnavi cu afecțiuni hepatice și renale; șoc, hipotiroidism, hipertrofie de prostată, pacienți cu tahicardie supraventriculară sau antecedente de convulsii.
RA: Doze terapeutice: slăbiciune, amețeli, sudorație, uscăciunea gurii, uneori greață și vomă, rareori hTA ortostatică, deprimare respiratorie, retenție de urină; în IR - tremor, mioclonus, convulsii. Doze mari (peste 200 mg): fenomene de excitație centrală. Risc de dependență, dar toleranța apare mai lent; sindromul de abstinență apare mai repede, este de durată mai scurtă, iar manifestările sunt mai slabe. Midriază.

PHENOBARBITALUM *COD ATC: N03AA*

FENOBARBITAL *SICOMED SA;* Cpr. 15 mg, 100 mg fenobarbital; Sol. inj. 4% (f. × 1 ml) sau 10% (f. × 2 ml) ***(S/P-RF);*** Sol. inj. 200 mg/2 ml ***(P-RF)***

Ind: Sedativ în stări de hiperexcitabilitate, afecțiuni medicale sau chirurgicale care necesită sedare, insomnii, epilepsie (marele rău epileptic), convulsii la sugari, copii și adulți; în cadrul medicației prenarcotice, adjuvant al fototerapiei în icterul neo-natal.
Dz: *Adulți,* sedativ, 15 mg la 4 ore; hipnotic: 100 mg seara (în insomniile grave și la agitați 300 mg/zi); în boala Basedow 50 mg/zi; anticonvulsivant, în intoxicațiile cu stricnină, în tetanos 2-3 f./zi i.m.; în epilepsie inițial 50 mg de 2-3 ori/zi, apoi 200-300 mg/zi fracționat până la dispariția convulsiilor; maximum 300 mg o dată și 600 mg/zi; *copii:* sedativ 6 mg/kg/zi în 3 prize oral sau i.m., anticonvulsivant 3-5 mg/kg, oral sau i.m.; maximum 300 mg.
Cind: Stări precomatoase și comatoase, Parkinson, intoleranță la fenobarbital, IR, IC, IH gravă, diabet, porfirie latentă..
A!: Nu se injectează i.v. datorită solventului.
RA: Fenomene paradoxale de excitație nervoasă și urticarie.

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM *COD ATC: J01CE02*

CLIACIL *LAB. AVENTIS PHARMA;* Cpr. film. 1200000 UI; Pulb. susp. 300000 UI/ 5 ml ***(P-RF)***

OSPEN 500, OSPEN 1000, OSPEN 1500 *SANDOZ GmbH;* Cpr. film. 500000 UI, 1000000 UI, 1500000 UI fenoximetilpenicilină sare de potasiu ***(S/P-RF)***

OSPEN 400 *SANDOZ GmbH;* Sirop, Gran. susp. 400000 UI./5 ml (f. × 60 ml) ***(S/P-RF)***

PENHEXAL SAFT *HEXAL AG;* Pulb. susp. 400000 UI/5 ml ***(P-RF)***

PENICILINĂ V *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cpr. 400000 UI, 1000000 UI ***(S/P-RF)***

PENICILINĂ V 400000, PENICILINĂ V 1000000 *EUROPHARM SA;* Cpr. 400000 UI, Cpr. 1000000 UI ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. curativ infecții ușoare sau moderate cu germeni sensibili: respiratorii, ORL, stomatologice și cutanate. Profilaxia recidivelor RAA.
Dz: *Adulți:* 2-4 milioane UI pe zi, oral, fracționat în 3-4 prize; *Copii:* 50000-100000 UI/kg/zi, oral, fracționat în 3-4 prize.
Cind: Alergie la peniciline și la cefalosporine, hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului.
A!: Manifestările alergice apărute impun întreruperea trat. Foarte rar, reacții anafilactice severe, uneori fatale. Prescrierea se face după o anamneză atentă (antecedentele de reacții alergice la peniciline și cefalosporine). În IRA, doza se adaptează în funcție de creatininemie și de Cl creatinină. Atenție la conținutul în potasiu al produsului. Sarcină. Alăptare.
RA: Reacții alergice: febră, urticarie, eozinofilie, edem Quincke, foarte rar șoc anafilactic; digestive: greață, vărsături, diaree; hematologice: anemie, trombocitopenie, leucopenie, tulburări de coagulare.

PHENYLBUTAZONUM *COD ATC: M01AA01*

FENILBUTAZONĂ *EUROPHARM SA;* Sup. 250 mg ***(P-RF)***

FENILBUTAZONĂ *ARGEȘFARM;* Sup. 250 mg ***(P-RF)***

FENILBUTAZONĂ *SINTOFARM SA;* Sup. 250 mg ***(P-RF)***

FENILBUTAZONĂ *EUROPHARM SA;* Sup. 250 mg; 50 blist. × 5 sup. ***(S)***

FENILBUTAZONĂ *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cremă 4% (tub × 20 g) ***(OTC)***

FENILBUTAZONĂ *ARMEDICA SA;* Ung. 4% (tub × 45 g) ***(OTC)***

Ind: Trat. de scurtă durată (sub 7 zile), al puseelor acute de reumatism abarticular și al radiculalgiilor severe. Trat. de lungă durată în spondilartrita ankilopoietică și alte afecțiuni inflamatorii cronice înrudite. Trat. crizei de gută.
Dz: *Intrarectal: Adulți și copii peste 15 ani:* În puseele acute de reumatism abarticular: 250 mg de 2-3 ori/zi,1-2 zile, apoi 250mg/zi, maximum 7 zile. În spondilartrita ankilopoietică: 250 mg/zi. În criza de gută: inițial 500 mg, apoi 250 mg la 6 ore, maximum 3 zile. *Topic:* Pe tegumente, de 2-3 ori/zi, fricționând zona interesată. Înaintea primei aplicări se testează sensibilitatea pe o zonă cutanată restrânsă.
Cind: Alergie la fenilbutazonă și la alți compuși derivați de pirazolonă. Manifestări de tip idiosincrazic la acidul acetilsalicilic și la alte AINS. Ulcer gastroduodenal. IH severă. IR severă. IC. HTA necontrolată medicamentos. Diateze hemoragice, hemopatii în antecedente sau manifeste. Afecțiuni tiroidiene. LED. Antecedente recente de rectite sau de rectoragii. Adm. topică este contraindicată în diverse dermatite sau ulcerații; supurații (abcese, flegmoane); sensibilizare la fenilbutazonă și la anticoagulante de tip heparinic. Sarcină. Alăptare. Vârstnici. Copii.
A!: Reacții hematologice grave, uneori letale (agranulocitoza). Apariția febrei, anginei, hemoragiilor cutanate spontane impune oprirea trat. și verificarea for-

mulei sanguine. Monitorizarea formulei sanguine înainte de începere și pe parcursul trat. cronic (la 2-4 săpt.). În cazul scăderii numărului de leucocite, trombocite sau eritrocite se întrerupe trat. Trat. se întrerupe în caz de: reacții alergice, anafilactoide; iritație gastrică și/sau intestinală; creșterea enzimelor hepatice. Datorită retenției hidrosaline se supraveghează volumul diurezei, funcția renală și starea aparatului cardiovascular. Atenție la dozele mari și în condițiile folosirii îndelungate. Intrarectal afectează mucoasa; nu se adm. prelungit. Șoferi și activități de precizie.

RA: *Cardiovasculare:* rar edeme, HTA, IC congestivă. *Gastro-intestinale:* greață, vărsături, epigastralgii, gastrită, dureri abdominale, diaree; posibile ulcerații gastrice, uneori activarea ulcerului. *Reacții de hipersensibilitate:* rareori reacții anafilactice sau anafilactoide, edem Quincke, dispnee și agravarea astmului, vasculite. *Neuropsihice:* rareori cefalee, somnolență, vertij, tulburări senzoriale, vizuale, tinitus. *Cutanate:* rareori erupții, prurit, urticarie, purpură, fotosensibilizare, eritem. *Hematologice:* rareori anemie, trombocitopenie, neutropenie; foarte rar pancitopenie, aplazie medulară cu evoluție letală posibilă. *Hepatice:* rareori creșterea transaminazelor, hepatită cu icter; foarte rar hepatită fulminantă. *Renale:* frecvent retenție hidrică, uneori cu edeme; rareori hematurie, proteinurie, sindrom nefrotic, IRA, anurie. *Endocrine:* rareori hipotiroidie și gușă. *Efecte locale:* iritație, senzație de arsură la nivel anorectal; foarte rar rectoragie, colită necrozantă.

PHENYLEPHRINUM *COD ATC: S01FB01*

MYD FRIN *ALCON SRL;* Sol. oft. 2,5% clorhidrat de fenilefrină (f. × 3 ml; f. × 5 ml) ***(P-RF)***

NILEFRIN soluþie oftalmică 5% *PHARMAPLANT BIOGALENICA;* Sol. oft. 5% ***(P-RF)***

Ind: Vasoconstrictor, decongestionant și midriatic în oftalmologice (dilatație pupilară în uveite, diverse proceduri chirurgicale, refracție fără cicloplegie, fundoscopie și alte proceduri diagnostice).

Dz: Vasoconstricție și dilatație pupilară: după o pic. de anestezic local, o pic. sol. pe limbul superior dă o dilatație rapidă și puternică a pupilei cu reducerea congestiei în patul capilar. Se poate repeta instilația peste o oră. Uveite: sinechii posterioare: se asociază cu atropină o pic. sol. pe suprafața superioară a corneei, cu repetiție la o oră. Glaucom: la pacienții miotici cu glaucom cu unghi deschis. Chirurgie: cu 30-60 min preoperator. Refracție: se adm. la 5 min după cicloplegice (homatropină, ciclopentolat, tropicamidă, atropină). Examinare oftalmoscopică: o pic. sol. instilată în fiecare ochi, cu midriază în 15-30 min. Dilatația durează 1-3 ore. Proceduri diagnostice: Testul de provocare a închiderii unghiului în glaucom. Retinoscopie: Testul albirii: 1-2 pic sol. în ochiul injectat. După 5 min se examinează albirea perilimbică.

Cind: Unghi îngust anatomic; glaucom cu unghi îngust. Copii cu greutate mică la naștere și bătrâni cu boli grave cardiovasculare sau cerebrale. În timpul intervențiilor chirurgicale când bariera epitelială corneeană a fost deranjată. Hipersensibilitate cunoscută la fenilefrină.

A!: Glaucom. Dilaterea pupilei la pacienții vârstnici după dezlipire de retină sau chirurgie a cataractei. La vârstnici pot apărea flocoane pigmentare tranzitorii în umoarea apoasă. Expunerea prelungită la aer sau lumină puternică poate cauza degradarea (soluția este brună sau conține precipitați).

PHENYLHYDRARGYRI BORAS

COD ATC: R02AAN0

FENOSEPT 0,3 mg *TERAPIA SA;* Cpr. 300 mg amestec de hidroxid și borat fenilmercuric ***(OTC)***

Ind: Profilaxia și trat. infecțiilor buco-faringiene (stomatită, faringită, laringită, gingivită, parodontită); după intervenții chirurgicale, extracții dentare; pentru dezodorizarea cavității bucale.
Dz: *Adulți:* 1 cpr. la 2 ore în faza acută, apoi 1 cpr. de 3-4 ori/zi (cel mult 4 săpt.). *Copii (peste 2 ani):* 1 cpr. de 3-4 ori/zi.
Cind: Copii sub 2 ani; persoane cu alergie la produs.
A!: Cpr. nu se înghit, ci se lasă să se dizolve lent în gură. Sarcină și alăptare.
RA: Rar, fenomene de iritație locală.

PHENYTOINUM

COD ATC: N03AB02

FENITOIN 100 mg *ARMEDICA SA;* Cpr. 100 mg fenitoină; fl. × 20 cpr.; ct. × 2 blist. ***(P-6L)***; ct. × 100 blist. ***(S)***

PHENYDAN *DESITIN;* Sol. inj. 50 mg/ml (f. × 5 ml) ***(P-RF)***

Ind: Epilepsie majoră, crize focale corticale și unele cazuri de epilepsie psihomotorie; migrenă, nevralgie de trigemen și glosofaringian; aritmii digitalice, tahicardii paroxistice, boală Bouveret.
Dz: Oral: profilaxia crizelor de epilepsie: la adult 100 mg de 2 ori/zi, crescând progresiv până la doza eficace, obișnuit 200-400 mg/zi, cel mult 600 mg/zi (o singură priză, pe nemâncate sau 2 prize, după mese, în caz de iritație gastrică); la copil 5-8 mg/kg/zi (1-2 prize); trat. nevralgiilor: la adult 100 mg de 2-4 ori/zi. Ca antiaritmic: doză de întreținere 100 mg/zi de 3-4 ori.
Cind: Alergie sau intoleranță la fenitoină, leucopenie și anemie marcată, hTA marcată, BAV de gradul II și III. Sarcină - primul trimestru.
A!: IH, IR, IC, insuficiență respiratorie, bolnavi cu accidente cerebro-vasculare în antecedente, cei care primesc hormoni tiroidieni; în epilepsie se dau doze cât mai mici între zilele 20-40 de sarcină.
RA: Anorexie, greață, vomă, epigastralgii, gingivită hipertrofică, hirsutism și acnee, erupții alergice, foarte rar sindroame de tip colagenoză, sd. Stevens-Johnson, LED, icter colestatic, necroză hepatică, hiperglicemie, osteomalacie, hemoragii la nou-născut, leucopenie, agranulocitoză, trombocitopenie, anemie aplastică sau megaloblastică, limfadenopatie. Oprirea bruscă a trat. la epileptici poate declanșa o stare de rău epileptic.

PHYTOMENADIONUM

COD ATC: B02BA01

FITOMENADIONĂ *TERAPIA SA;* 10 mg/ml fitomenadionă (Vit. K1); f. × 1 ml ***(S/P-RF)***

Ind: Hipoprotrombinemia congenitală sau consecutivă adm. unor preparate de tip cumarinic; carența de vit. K din IH și icterul obstructiv; tulburările de ab-

sorbție intestinală după trat. oral de lungă durată cu antibiotice, sulfamide sau salicilați; intoxicațiile cu warfarină; boala hemoragică a nou-născutului.
Dz: *Adulți:* în urgențe i.v., foarte lent, 2-10 mg/zi; în intoxicația acută cu derivate cumarinice maxim 40 mg/zi; curativ i.m., 5-40 mg/zi. *Nou-născuți și sugari cu boală hemoragică:* profilactic, i.m. 0,5-2 mg/zi sau oral 1-2 mg/zi; curativ, i.m. 1-2 mg/zi.
Cind: Intoleranță la fitomenadionă.
A!: De obicei hipoprotrombinemia din bolile hepatocelulare răspunde slab sau deloc la trat. Nou-născuți și sugari.
RA: Inj. i.v. rapidă: sudorație, congestia feței, dispnee, cianoză, tahicardie, colaps vascular periferic, sau chiar accidente letale; la nou-născuți, în cazuri rare: hiperbilirubinemie; la pacienții cu afecțiuni hepatice, inj. i.m. repetată - modificări locale cutanate și subcutanate.

PILOCARPINUM

COD ATC: S01EB01

APICARPIN *AMMAN PHARM. IND.;* Sol. oft. 2% sau 4% clorhidrat de pilocarpină (fl. × 10 ml) ***(P-6L)***

BOROCARPIN-S *DR. WINZER;* Sol. oft. 4% (fl. × 10 ml) ***(P-6L)***

DROPIL *BRUSCHETTINI;* Sol. oft. 2% (fl. × 10 ml) ***(P-6L)***

ISOPTO CARPINE 2% *ALCON SRL;* Sol. oft. 2% (fl. × 15 ml) ***(P-6L)***

PILOCARPIN *PHARMAPLANT BIOGALENICA SRL;* Sol. oft. 2% (fl. × 10 ml) ***(P-6L)***

PILOGEL HS *ALCON SRL;* Gel oft. 4% (tub × 5 g) ***(P-6L)***

Ind: Glaucom cronic simplu; glaucom acut cu unghi închis; diagnosticul etiologic al midriazei.
Dz: În funcție de valorile presiunii intraoculare și de tipul de glaucom. O dată - 1 pic. sol. 2% sau gel 4% în sacul conjunctival.
Cind: Hipersensibilitate la componentele produsului; iridociclite și alte afecțiuni în care trebuie evitată mioza. Sarcină. Alăptare.
A!: Instilarea repetată și/sau timp îndelungat duce o absorbție semnificativă în circulația sistemică. Nu se adm. la pacienții cu miopie decât după un control al stării retinei periferice. Șoferi și activități de precizie.
RA: Spasm ciliar, hiperemie conjunctivală, lăcrimare, mioză, dificultăți de acomodare în condiții de întuneric; dezlipire de retină și opacități cristaliniene în cazul utilizării îndelungate.

PIMOZIDUM

COD ATC: N05AG02

ORAP FORTE *JANSSEN;* Cpr. 4 mg pimozid; ct. × 30 cpr. ***(P-RF)***

Ind: Schizofrenie (fară agitație); nevroze cronice.
Dz: Doza inițială: 1-2 mg, o dată; doza de întreținere: 2-6 mg/zi, o dată.
Cind: Depresie endogenă, agitație psihomotorie, stări anxioase.
RA: Rar, sindrom extrapiramidal.

PIOGLITAZONUM

COD ATC: A10BG03

ACTOS® *ELLI LILLY;* Cpr. pioglitazonă clorhidrat 15 mg, 30 mg sau 45 mg *(P-6L)*

Ind: Diabet zaharat de tip 2 (non-insulinodependent): ca monoterapie, la pacienți la care dieta și exercițiile fizice nu controlează adecvat glicemia; asociat insulinei sau unui antidiabetic oral la pacienți la care dieta, exercițiile fizice și antidiabeticul folosit nu controlează adecvat glicemia.
Dz: *Ca monoterapie:* Inițial 15-30 mg o dată/zi, independent de orarul meselor. La nevoie se crește până la 45 mg o dată/zi. *În asociație cu alte antidiabetice:* Sulfoniluree 15-30 mg o dată/zi, fără a modifica doza de sulfoniluree. Dacă pacientul face hipoglicemie, doza de sulfoniluree se scade. Metformină 15-30 mg o dată/zi, fără a modifica doza de metformină. Insulină 15-30 mg o dată/zi, fără a modifica doza de insulină. Atunci când glicemia scade sub 100 mg/100 ml sau apar simptome de hipoglicemie, doza de insulină poate fi scăzută cu 10-25%.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută față de produs. Bolnavi cu diabet de tip 1. Cetoacidoză diabetică. Boală hepatică activă sau nivele crescute ale transaminazelor. Pacienți sub 18 ani. Alăptare.
A!: Monitorizarea valorilor glicemiei și ale HbA1c. Risc de hipoglicemie în caz de asociere cu alte antidiabetice. La pacientele în premenopauză cu anovulație poate determina reluarea ovulației; sunt necesare măsuri contraceptive. Poate provoca scăderea valorilor Hb (cu 2-4%) și ale Ht, începând cu primele 4-12 săpt. de trat.. Edeme ușoare-moderate, expasiunea volumului plasmatic și hipertrofie cardiacă prin creșterea presarcinii. Prudență în prezența retenției hidrosaline și CI la pacienții cu statut cardiac NYHA (clasele III-IV). Controlul enzimelor hepatice înainte de instituirea trat., la 2 luni în primul an de trat., apoi periodic și atunci când apar simptome care sugerează afectarea hepatică. În situații de stres (febră, traumatisme, infecții, intervenții chirurgicale) se ajustează doza. Sarcină.
RA: Infecții ale căilor aeriene superioare, cefalee, sinuzită, mialgii, agravarea diabetului zaharat, faringită. Edeme mai frecvente la asocierea cu insulină. Hipoglicemie ușoară - moderată. Creșteri ale transaminazelor serice și sporadice și trecătoare ale CPK.

PIPECURONII BROMIDUM

COD ATC: M03AC06

ARDUAN *GEDEON RICHTER;* Pulb. pt. sol. inj. 4 mg bromură de pipecuroniu și solvent (2 ml) sol. clorură de sodiu 0,9% ***(S)***

Ind: Miorelaxant în anestezia generală, în intervenții chirurgicale unde efectul miorelaxant trebuie să dureze mai mult de 30 min.
Dz: *Adulți,* i.v., în intervențiile chirurgicale de durată medie sau lungă: pentru intubație și miorelaxare 0,06-0,08 mg/kg; în cazul intubației cu succinilcolină 0,04-0,06 mg/kg; în IR - maximum 0,04 mg/kg. Dozele mai mari pot produce un efect prelungit.
Cind: Miastenia gravis.
A!: Adm. numai în unitățile de terapie intensivă bine echipate. Se folosesc numai soluțiile proaspăt preparate.

RA: Bradicardie, mai ales la pacienții care au primit și halotan sau fentanil, concomitent sau în timpul inducerii anesteziei.

PIPERACILINUM

COD ATC: J01CA12

PIPRIL *WYETH LEDERLE PHARMA;* Pulb. liof. pt. sol. inj. 2 g (fl. inj)/ 4 g piperacilină (fl. perf.) ***(S/P-RF)***

Ind: Infecții sistemice și locale date de bacterii sensibile, gram-negative și gram-pozitive aerobe și anaerobe; infecții mixte; terapia empirică a infecțiilor grave cauzate de germeni patogeni sensibili la piperacilină; în profilaxia preoperatorie; infecții grave cu Pseudomonas aeruginosa; infecții produse de organisme rezistente la alte peniciline, anumite aminoglicozide și cefalosporine; infecții sistemice severe, incluzând septicemie bacteriană și endocardită; infecții ale tractului genitourinar; infecții ale tractului respirator; infecții în sfera ORL și ale cavității orale; infecții abdominale, incluzând cele ale tractului biliar; plăgi infectate și arsuri; infecții ale osului și articulațiilor. Terapia în asociere cu alte antibiotice: Aminoglicozide - în infecții grave cu Klebsiella, Proteus indol-pozitiv, Pseudomonas și Serratia, cât și la pacienți cu afectarea statusului imun. Peniciline rezistente la β-lactamaze - în infecții mixte produse de Staphylococcus aureus producător de β-lactamaze și de organisme sensibile la piperacilină. Cefalosporine - nu se asociază cu Cefoxitin când este infecție cu Pseudomonas. Metronidazol - infecții mixte aerobe/anaerobe. Profilaxia perioperatorie: pentru proceduri intraabdominale, histerectomie (pe cale vaginală și abdominală) și intervenție cezariană. Profilaxia se întrerupe în 24 ore după terminarea intervenției.

Dz: În infecțiile grave și complicate, se adm. i.v.; în infecții necomplicate și moderate, i.m. și i.v. *Adulți cu funcție renală normală* - i.v.: Infecții necomplicate și moderate: 100-200 mg/kg/zi (2 g la 6-8 ore, sau 4 g la 12 ore). Doza totală zilnică: 6-8 g. Infecții grave și complicate: 200-300 mg/kg/zi (4 g la 6-8 ore). Doza totală zilnică: 12-16 g. Doza maximă: 24 g/zi. - i.m.: 4-6 g/zi. Gonoree acută: doză unică 2 g i.m.. *Adulți cu afectare renală:* în funcție de Cl creatinină: Cl 40-80 ml/min - doza maximă/zi 16 g (4g la 6 ore); Cl 20-40 ml/min - doza maximă/zi 12 g (4 g la 8 ore); Cl < 20 ml/min - doza maximă/zi 8 g (4 g la 12 ore); pacienți cu hemodializă - doza maximă/zi 6 g (2 g la 8 ore). *Profilaxie perioperatorie:* I doză - perf 2 g timp de 20-30 min, 1 oră înaintea operației; a II-a doză - la 4-6 ore după I doză; a III-a doză - la 4-6 ore după a II-a doză.

Sugari și copii fără afectare renală: Infecții moderate și necomplicate: 100-200 mg/kg/zi, i.v., în 3-4 doze fracționate. Infecții grave și complicate: 200-300 mg/kg/zi, în 3-4 doze fracționate. Nou-născuți (0-1 lună): 150 mg/kg/zi, i.v., în 3 doze fracționate pentru nou-născuți sub 2000 g; 300 mg/kg/zi i.v., în 3 sau 4 doze pentru nou-născuți peste 7 zile și peste 2000 g. *Sugari (peste 1 lună) și copii (până la 12 ani) cu afectare renală:* în funcție de Cl creatinină: Cl 20-40 ml/min: în infecții complicate ale tractului urinar - 150 mg/kg/zi; în infecții sistemice grave - 200 mg/kg/zi; Cl < 20 ml/min: în infecții complicate ale tractului urinar - 100 mg/kg/zi; în infecții sistemice grave - 133 mg/kg/zi. Durata terapiei: infecții acute - minim 48-72 ore după ce pacientul devine asimptomatic; infecții cu streptococ grup A β-hemolitic - 10 zile.

Cind: Reacții de hipersensibilizare la orice penicilină sau cefalosporină.

A!: În timpul trat. prelungit monitorizare periodică: hemoleucogramă, teste renale și hepatice; potasemie. În doze mari: manifestări hemoragice, cu sau fără modificări ale testelor de coagulare, mai ales la cei cu afectare renală; excitabilitate neuromusculară, convulsii. Apariția rezistenței microbiene în cursul trat. prelungit. Atenție la pacienții cu mononucleoză. În caz de colită pseudomembranoasă trat. cu fluide și electroliți, suplimentarea cu proteine și un antibacterian oral activ pe Clostridium difficile (ex. Teicoplanin sau Vancomicină oral). Piperacilina se adm. separat de alte antibiotice asociate. Sarcină. Alăptare.
RA: *Locale:* Durere, eritem și/sau indurație la locul injecției. Mai rar echimoze, tromboză venoasă profundă și hematoame. Tromboflebită asociată adm. i.v. *Hipersensibilitate:* rar, reacții anafilactoide, rash și febră; prurit, erupții veziculare și test Coombs pozitiv, eritem multiform și sindrom Stevens-Johnson. *Gastrointestinale:* Scaun moale și diaree; rar greață, vomă, diaree cu sânge, colită pseudomembranoasă. *Hepatice:* Creșteri ale enzimelor hepatice, hiperbilirubinemie, icter colestatic. *Renale:* Creșteri ale creatininei și ureei și rar, nefrită interstițială. *Hematologice și limfatice:* Leucopenie tranzitorie, neutropenie, trombocitopenie și/sau eozinofilie, rar manifestări hemoragice. *Hipokaliemie:* mai ales la cei cu afectări hepatice și la cei tratați cu agenți citotoxici sau diuretice. *SNC:* Cefalee, amețeală sau astenie; convulsii la doze mari. *Musculare:* Relaxare musculară prelungită. *Altele:* Suprainfecții, incluzând candidoză.

PIPERAZINUM *COD ATC: P02CB01*

NEMATOCTON *BIOFARM SA;* Sirop 20% piperazină (f. × 100 ml) ***(P-RF)***

Ind: Ascaridiază, oxiurază, trichinoză.
Dz: *Ascaridiază: adulți* - doză unică 4,8 g dimineața; *copii* - 120 mg/kg până la doza de 4,8 g. La copii se mai pot adm. câte 75 mg/kg/zi în 2 zile succesiv, până la 4,2 g. *În trichinoză și oxiurază* timp de 7 zile, eventual în 2 serii de 7 zile, cu pauză de 10 zile: *adulți* și *copiii peste 12 ani* zilnic, 2,4 g în priză unică; *copii 5-12 ani:* 1,8 g, în priză unică; *copii 2-4 ani:* 0,9 g, în priză unică.
Cind: Epilepsie, IR, sarcină.
A!: Epilepsie latentă, tulburări neurologice, funcție renală sau hepatică alterate.
RA: Rare: greață, vomă, diaree, dureri abdominale, cefalee, urticarie; somnolență, amețeli, nistagmus, lipsă de coordonare musculară, ataxie, contracții mioclonice, tremor și mișcări coreice, convulsii și pierderea reflexelor, tulburări de vedere.

PIRACETAMUM *COD ATC: N06BX03*

CELEBRYL *F. JOH KWIZDQ GmbH;* Cpr. film. 800 mg, respectiv 1200 mg piracetam ***(P-6L)***

LUCETAM *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Cpr. film. 400 mg, respectiv 800 mg ***(P-6L)***

LUCETAM® 1 g *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Sol. inj. 200 mg/ml (f. × 5 ml) ***(P-RF)***

LUCETAM® 3 g *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Sol. inj. 200 mg/ml (f. × 5 ml) ***(P-RF)***

LUCETAM® 1200 mg *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Cpr. film. 1200 mg ***(P-6L)***

MEMOTAL® 1 g/5 ml *SICOMED SA;* Sol. inj. 200 mg/ml (f. × 5 ml) ***(P-RF)***

MEMOTAL® 400 mg *SICOMED SA;* Cpr. 400 mg ***(P-6L)***

N-PIRACETAM *NORD FARM PRODUCT;* Cpr. 400 mg ***(P-6L)***

NEUROSTIM 400 mg, NEUROSTIM 800 mg *HELCOR SRL;* Cpr. film. 400 mg, 800 mg ***(P-6L)***

NOOTROPIL® *U.C.B. GROUP;* Cps. 400 mg ***(P-6L)***; Sol. inj. 200 mg/ml (f. × 5 ml) ***(P-RF)***; Sol. perf. 200 mg/ml (f. × 60 ml) ***(S)***

NOOTROPIL® 800 mg, NOOTROPIL® 1200 mg *U.C.B. GROUP;* Cps. film. 800 mg, 1200 mg ***(P-6L)***

NOOTROPIL® 800 mg, NOOTROPIL® 1200 mg *LAB FOURNIER SA;* Cps. film. 800 mg, 1200 mg ***(P-6L)***;

PIRACETAM *MAGISTRA C&C.;* Cpr. piracetam 400 mg ***(P-6L)***

PIRACETAM *FARMADEF*; Cpr. 400 mg ***(P-6L)***

PIRACETAM *OZONE LAB. Ltd.*; Cpr. 400 mg ***(S/P-6L)***

PIRACETAM *ARENA GROUP SA*; Cpr. 400 mg ***(P-6L)***

PIRACETAM *SINTOFARM SA;* Cpr. 400 mg; 800 mg piracetam ***(S/P-6L)***

PIRACETAM *SLAVIA PHARM SRL;* Cpr. 400 mg ***(S/P-6L)***

PIRACETAM *FABIOL SA;* Cpr. piracetam 400 mg ***(P-6L)***

PIRACETAM *FARMEX COMPANY;* Cpr. 400 mg ***(P-6L)***

PIRACETAM 400 mg *PROMEDIC SRL;* Cpr. piracetam 400 mg ***(S/P-6L)***

PIRACETAM 400 mg *REMEDIA SA;* Cpr. piracetam 400 mg ***(S/P-6L)***

PIRACETAM 400 mg *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cpr. piracetam 400 mg ***(S/P-6L)***

PIRACETAM 400 mg *LAROPHARM SA;* Cpr. piracetam 400 mg ***(S/P-6L)***

PIRACETAM 400 mg *ARMEDICA SA;* Cpr. piracetam 400 mg ***(S/P-6L)***

PIRACETAM 800 mg *ALIUD® PHARMA GmbH;* Cpr. film. piracetam 800 mg ***(P-6L)***

STAMIN *FARAN;* Cpr. film. piracetam 400 mg ***(P-6L)***

Ind: Deficite cognitive și neurosenzoriale cronice la vârstnici (cu excepția stărilor de demență); vertij; adjuvat în dislexie la copiii peste 9 ani; mioclonii corticale postanoxice. Propus ca trat. al urmărilor AVC ischemice.
Dz: În stări de deficite cognitive și neurosenzoriale cronice la vârstnici și în vertij - oral, după mese 2,4 g/zi în 2-3 prize. În AVC ischemice - oral 2,4 g/zi, maximum 4,8 g/zi în 2-3 prize; la nevoie se adm. parenteral 3-12 g/zi. În

mioclonii corticale postanoxice se începe cu 6-8 g/zi, maxim 24 g/zi. În dislexie la copii - 50 mg/kg și zi în 3 prize. Injecțiile se pot adm. i.v. in bolus sau în perf sau i.m. În insuficiența renală, doza de piracetam se ajustează în funcție Cl. creatinină: Cl 40-60 ml/min: 1/2 din doza uzuală; Cl 20-40 ml/min: 1/4 din doza uzuală; Cl < 20 ml/min: CI.
Cind: Hipersensibilitate la piracetam sau la oricare din componenții produsului; IR severă (Cl < 20 ml/min). Sarcină. Alăptare.
A!: IR ușoară sau moderată. Șoferi și activități de precizie.
RA: Nervozitate, iritabilitate, insomnie, anxietate, tremor și agitație; rareori oboseală și somnolență. Rareori tulburări gastrointestinale, cefalee și vertij. Apar mai ales la vârstnicii tratați cu doze mai mari de 2,4 g/zi.

PIRENZEPINUM

COD ATC: A02BX03

PIREHEXAL 25, PIREHEXAL 50 *HEXAL AG;* Cpr. 25 mg, 50 mg clorhidrat de pirenzepină ***(P-6L)***

Ind: Forme cronice și acute ale ulcerului gastric și duodenal, gastrite hiperacide, afecțiuni gastrice cauzate de medicamente, sd. Zollinger-Ellison.
Dz: Dimineața și seara oral câte 50 mg cu 1/2 oră înaintea meselor, minim 4 săpt.
Cind: Hipersensibilitate la pirenzepină sau la oricare dintre excipienți. Primele trei luni de sarcină.
A!: Glaucom și hipertrofie de prostată în caz de doze mari.
RA: Creșterea apetitului. În doze mari, la începutul trat., senzație de uscăciune a gurii și ușoare tulburări de acomodare vizuală.

PIRIBEDILUM

COD ATC: N04BC

PRONORAN® 50 mg *LAB. SERVIER IND;* Dj. cu elib. prel. 50 mg ***(P-6L)***

Ind: Tratamentul bolii Parkinson (îndeosebi în formele clinice cu tremor), atât în monoterapie, cât și în asociere cu levodopa; tratament adjuvant la pacienții vârstnici cu deficit patologic cronic cognitiv și neurosenzorial (cu excepția bolii Alzheimer și a altor demențe); tratament adjuvant în claudicația intermitentă din arteriopatia cronică obliterantă.
Dz: Tratamentul bolii Parkinson: Doza inițială este de 50 mg/zi, crescând cu câte 50 mg la 3 zile, până la atingerea dozei de întreținere: în monoterapie: doza de întreținere: 150-250 mg/zi, fracționată în 3-5 prize; în asociere cu levodopa: doza de întreținere este de 100-150 mg/zi, fracționată în 2-3 prize. Pentru celelalte indicații: Doza de întreținere uzuală este de 50-100 mg/zi, fracționată în 1-2 prize.
Cind: Hipersensibilitate la piribedil sau la oricare dintre excipienții produsului. Colaps cardiovascular. Infarct miocardic acut.
A!: Nu se întrerupe adm. antihipertensivelor la pacienții cu HTA dacă primesc și piribetil. La pacienții cu sindrom neuroleptic, administrarea piribedilului nu se recomandată (se va utiliza un anticolinergic central). Este contraindicată asocierea piribedil cu antagoniști dopaminergici – neuroleptice (cu excepția

clozapinei) și antiemetice cu efecte extrapiramidale. Nu se recomandă utilizarea piribedil în timpul sarcinii sau alăptării.
RA: Rareori, tulburări digestive minore (greață, vărsături, flatulență) care pot să dispară la ajustarea dozei; foarte rar, stări de confuzie sau de agitație; excepțional hTA ortostatică.

PIROXICAMUM

COD ATC: M01AC01
M02AA07

BRUXICAM 0,5% *BRUSCHETTINI;* Sol. oft. 0,5% (fl. × 10 ml) ***(P-6L)***

CALMOPYROL *FARAN;* Cps. piroxicam 20 mg ***(P-6L)***

FELDENE *PFIZER;* Cps. piroxicam 10 mg ***(P-6L);*** Gel 0,5% (tub × 25 g); Sol. inj. 20 mg/ml piroxicam ***(P-RF)***

FINAGEL® *BOEHRINGER INGELHEIM;* Gel 5% (tub × 35 g; tub × 50 g) ***(OTC)***

HOTEMIN *EGIS PHARMACEUTICALS;* Sol. inj. 20 mg/ml (f. × 1 ml) ***(P-RF)***; Cremă 1% (tub × 50 g) ***(OTC)***; Cps. 10 mg sau 20 mg; Sup. 10 mg sau 20 mg ***(P-6L)***

MED-PIROXICAM *MEDIPHARMA SERV.;* Ung. 3% (tub × 40 g) ***(OTC)***; Cpr. 20 mg ***(P-6L)***

N-PIROXICAM 20 mg *NORDFARM;* Cpr. 20 mg piroxicam ***(P-6L)***

PIROXICAM *PROMEDIC SRL;* Cpr. 20 mg piroxicam ***(P-6L)***

PIROXICAM *TERAPIA SA;* Cpr. 20 mg piroxicam ***(P-6L)***

PIROXICAM *ANTIBIOTICE IAȘI;* Sup. 20 mg și 40 mg piroxicam ***(P-6L)***; Cremă 3% (tub × 35 g) ***(OTC);*** *Gel 0,5%*

PIROXICAM *HELCOR;* Sup. 40 mg piroxicam ***(P-6L)***

PIROXICAM *MARK INT;* Ung. 3% (tub × 35 g) ***(OTC)***

PIROXICAM *ARENA GROUP SA;* Cpr. 20 mg piroxicam ***(P-6L)***

PIROXICAM *OZONE LAB.;* Cpr. 20 mg piroxicam ***(P-6L)***

PIROXICAM *FABIOL SA;* Cpr. 20 mg piroxicam ***(P-6L)***

PIROXICAM *LAROPHARM SRL;* Cpr. 20 mg piroxicam ***(P-6L)***

PIROXICAM *LABORMED PHARMA;* Cpr. 20 mg piroxicam ***(S/P-6L)***

PIROXICAM 20 mg *HELCOR SRL;* Cpr. 20 mg piroxicam ***(S/P-6L)***

PIROXICAM 20 mg *SINTOFARM SA;* Cpr. 20 mg piroxicam ***(P-6L)***

PIROXIGEL *MEDIPHARMA SERV SRL;* Gel 0,5% (tub × 40 g) ***(OTC)***

PIROXSAL® *SLAVIA PHARM SRL;* Cpr. 20 mg piroxicam ***(P-6L)***

PIROXSAL® GEL 0,5% *SLAVIA PHARM SRL;* Gel 0,5% (tub × 40 g) *(OTC)*

REUMADOR® *SLOVAKOFARMA;* Gel 0,5% (tub × 58 g) ***(OTC)***

SOTILEN 20 *MEDOCHEMIE Ltd;* Cps 20 mg

Ind: *Sistemic:* poliartrită reumatoidă, poliartrită reumatoidă juvenilă, osteoartroză, spondilită anchilozantă, afecțiuni musculo-scheletice acute, criză de gută, dureri post-operatorii și post-traumatice acute, dismenoree primară la paciente cu vârsta peste 12 ani; ameliorarea febrei și durerii asociate cu inflamațiile acute ale tractului respirator superior. *Local:* tendinite, tenosinovită; umăr dureros; contuzii, entorse, luxații.

Dz: *Sistemic la adulți: Poliartrită reumatoidă, osteoartroză, spondilită anchilozantă:* 20 mg/zi, priză unică. Dozele zilnice: 10-30 mg. *Criză de gută:* inițial 40 mg; în următoarele 4-6 zile 40 mg/zi, în priză unică sau fracționat. *Afecțiuni musculo-scheletice acute:* 40 mg/zi în primele 2 zile, în doză unică sau fracționat. În următoarele 7-14 zile de trat., se dau 20 mg/zi. *Dureri post-operatorii și post-traumatice:* inițial 20 mg/zi, în priză unică. Se poate începe cu 40 mg/zi în primele 2 zile, în doză unică sau fracționat, apoi 20 mg/zi. *Dismenoree:* inițial 40 mg/zi în priză unică, în primele 2 zile; în următoarele 1-3 zile, doză zilnică unică de 20 mg. *Inflamații ale tractului respirator superior:* 10-20 mg oral o dată pe zi. Se poate începe cu 40 mg/zi în doză unică, în primele 2 zile; în următoarele 3-5 zile se continuă cu 10-20 mg/zi. *Doze la copii peste 15 ani: Poliartrită reumatoidă juvenilă:* 26-45 kg - 15 mg/zi; > 46 kg - 20 mg/zi. *Inj im:* pentru inițierea trat. în afecțiunile acute și reacutizările afecțiunilor cronice; se continuă cu adm. orală. Pe cale inj. dozele sunt identice cu cele pentru calea orală. *Adm. combinată:* oral și i.m. în doze zilnice totale recomandate anterior. *Intrarectal:* câte un sup. seara la culcare; în guta acută doza poate fi crescută. Se poate asocia cu trat. oral fără ca doza zilnică să depășească 40 mg/zi. *Topic:* maximum 1 g gel (corespunzând mărimii unei alune), de 3-4 ori pe zi și se întinde ușor pe piele. *Durata trat.:* între 2-3 săpt. în tendinită, tenosinovită, umăr dureros și 1-2 săpt. în traumatismele sportive.

Cind: Ulcer gastro-duodenal activ; hipersensibilitate la piroxicam, la acidul acetilsalicilic și alte AINS sau la oricare dintre componenții produsului; IH severă; IR severă; trat. cronic al gutei. Copii sub 14 ani. Trimestrul III de sarcină. Alăptare.

A!: Afecțiuni gastrointestinale în antecedente. Pacienți cu perfuzie renală sau volumul sanguin scăzute (IC congestivă, ciroză hepatică, sindrom nefrotic sau boală renală manifestă); risc de precipitare a decompensării renale. În caz de tulburări vizuale - examen oftalmologic. Șoferi și activități de precizie.

RA: Gastrointestinale, mai ales în adm. de lungă durată > 30 mg/zi: stomatită, greață, anorexie, constipație, disconfort abdominal, diaree, dureri abdominale; uneori hemoragii gastrointestinale, perforații și ulcerații intestinale. Edeme, mai ales ale gleznelor. Rar, reacții nervos centrale: amețeli, cefalee, somnolență, insomnie, depresie, nervozitate, halucinații, vise anormale, confuzie mentală, parestezii și vertij, tulburări de vedere, edem palpebral și iritații oculare; tinitus. Reacții de hipersensibilitate cutanată (rash și prurit, veziculo-bule); afectări ale unghiilor și alopecie; reacții fotoalergice; sd. Stevens-Johnson. Rareori reacții anafilactice, bronhospasm, urticarie, edem angioneurotic. Creșteri reversibile ale ureei și creatininei. Scăderi ale Hb și Ht neasociate cu hemoragii gastrointestinale evidente. Uneori anemie, trombocitopenie, purpură netrombocitară, leucopenie și eozinofilie; rar anemie aplastică, anemie hemolitică, epistaxis. Creșteri ale transaminazelor și rar reacții hepatice severe, inclusiv icter și hepatită fatală. La locul inj. uneori apar dureri tranzitorii, senzație de arsură, sau formarea de abcese sterile și necroza țesutului adipos. În aplicare locală ocazional se pot observa: inflamație, eritem, urticarie, prurit, descuamare etc.

PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM *COD ATC: M01AC01 M02AA07*

FLAMEXIN® *LAB. FOURNIER PHARMA;* Cpr. 20 mg piroxicam; ct. × 1 blist. × 10 cpr.; ct. × 2 blist. × 10 cpr.; ct. × 3 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

FLAMEXIN® *LAB. FOURNIER PHARMA;* Pulb. pt. sol. de uz oral, plic dublu compartimentat; ct. × 20 plicuri dublu compartimentate × 3 g pulbere ***(P-6L)***

Ind.: Tratamentul simptomatic al afecțiunilor reumatismale inflamatorii cronice: poliartrita reumatoidă, spondilartrita anchilozantă și sindroame înrudite (Fissinger-Leroy-Reiter, reumatism psoriazic), cazuri selecționate de artroze dureroase și invalidante. Tratamentul simptomatic de scurtă durată al episoadelor acute de: periartrită scapulo-humerală, tendinite, bursite, radiculalgii severe, afecțiuni post-traumatice ale aparatului locomotor, artrită microcristalină (criză de gută), artroze cu componentă inflamatorie marcată. Dismenoree.
Dz: Administrare orală, la sfârșitul mesei, cu multă apă. Doza obișnuită este de 20 mg pe zi (1 comprimat sau 1 plic). Nu se vor depăși 40 mg/zi. Reumatism inflamator cronic: 20 mg pe zi (1 comprimat sau 1 plic), într-o singură priză. Doza poate fi mărită temporar la 30 mg pe zi (1½ comprimate sau 1½ plic), In doză unică sau fracționată sau poate fi redusă la 10 mg pe zi (½ comprimat sau ½ plic). Tratamentul se face timp de 1-2 săptămâni sau mai mult la nevoie, în funcție de starea clinică. Episoade acute (periartrită scapulo-humerală, tendinite, bursite, radiculalgii severe, afecțiuni post-traumatice ale aparatului locomotor, artroze cu componentă inflamatorie marcată) și dismenoree: 40 mg pe zi (2 comprimate sau 2 plicuri) în doză unică sau fracționată, timp de 2 zile, după care se continuă cu 20 mg pe zi, în zilele următoare, dacă este nevoie. Artrită microcristalină: 40 mg pe zi (2 comprimate sau 2 plicuri), preferabil în doză unică, cel mult 4-6 zile.
Cind: Alergie la piroxicam sau alte substanțe înrudite. Antecedente de astm bronșic, rinite, angioedeme sau urticarie provocate de acidul acetilsalicilic sau alt antiinflamator nesteroidian. Ulcer gastroduodenal. Insuficiență hepatică severă. Insuficiență renală severă. Copii sub 15 ani. Trimestrul trei de sarcină și perioada de alăptare.
A!: Prudență la pacienți cu: antecedente digestive (ulcer gastroduodenal, hernie hiatală, hemoragie digestivă), insuficiență cardiacă, hipertensiune arterială, ciroză hepatică, nefropatii cronice, afecțiuni hematologice, tratament diuretic după intervenții chirurgicale, antrenând hipovolemie, tratament cu anticoagulante. La acești bolnavi se vor controla volumul diurezei și funcțiile renale. Prudență la diabetici; în fenilcetonurie se administrează numai pulbere de piroxicam. Se evită consumul băuturilor alcoolice în timpul tratamentului. Interacțiuni cu: anticoagulante orale, heparine, antiagregante plachetare și trombolitice, antiinflamatoare nesteroidiene inclusiv salicilați, metotrexat, beta-blocante adrenergice, digoxină, ciclosporină, diuretice, inhibitori ai enzimei de conversie și alte antihipertensive, zidovudină. În sarcină se poate administra numai

în primele 5 luni, cu prudență, la indicația medicului. Se evită utilizarea în timpul alăptării. Conducătorii auto și cei care folosesc utilaje trebuie preveniți asupra posibilității apariției amețelilor în timpul tratamentului.
RA: Digestive: anorexie, grețuri, dureri abdominale, constipație, flatulență, diaree, ulcere, perforații, hemoragii digestive. Alergice: cutaneo-mucoase (erupție, rush, prurit, rareori fotosensibilitate, eritem polimorf, ectodermoză periorificială sau necroliză epidermică), crize de astm bronșic, edeme ale membrelor inferioare, mai rar edem Quincke, șoc anafilactic, vascularită sau boală serică. Agravarea insuficienței cardiace sau renale și a hipertensiunii arteriale. SNC: cefalee, amețeli, somnolență. Rar : creșterea reversibilă a ureei și a creatininei sanguine, creșterea reversibilă a transaminazelor și a bilirubinei, hiperpotasemie, scăderea gradului de agregare plachetară și alungirea timpului de sângerare, scăderea hemoglobinei și a hematocritului, anemie, trombocitopenie și purpură netrombocitopenică, leucopenie, eozinofilie, aplazie medulară.

PODOPHYLLOTOXINUM

COD ATC: D06BB04

CONDYLINE *YAMANOUCHI EUROPE B.V.;* Sol. ext. 5 mg/ml podofilotoxină (fl. × 3,5 ml) ***(P-RF)***

WARTEC 0,15% *STIEFEL LAB. Ltd.;* Cremă 0,15% (tub × 5 g; 10 g) ***(P-RF)***

Ind: Condiloamele acuminate externe.
Dz: De 2 ori/zi pe condiloame cu ajutorul unui aplicator inclus în pachet; se repetă timp de 3 zile consecutiv. Se poate repeta maximum 5 săpt. succesive. Nu se pune în contact cu pielea sănătoasă.
Cind: Copii. Asocierea cu alte preparate de podofilină.
A!: După aplicarea soluției, se lasă să se usuce bine pentru evitarea producerii intertrigo-ului. Evitarea contactului cu ochii; dacă totuși s-a produs accidental, ochii se vor clăti foarte bine cu apă. Perilezional se aplică un strat protector de cremă (vaselină, unguent cu zinc). Aplicarea preparatului pe zone extinse de mucoase poate duce la reacții generale. Sarcină. Alăptare.
RA: În ziua a doua și a treia de trat.: eritem dureros și/sau ulcerația superficială a epiteliului din zona tratată. Durere în timpul aplicării. Edem și balanopostită la pacienții cu vegetații mari în pliul prepuțial. Aceste efecte locale se estompează după câteva zile de terapie antiinflamatorie topică.

POVIDON-IODINE

COD ATC: D08AG02
G01AX11

BETADINE® ovule vaginale *EGIS PHARMACEUTICALS;* Ovule cu 200 mg de polivinil-pirolidonă ***(OTC)***

BETADINE® unguent *EGIS PHARMACEUTICALS;* Ung. 10% (tub × 20 g) ***(OTC)***

BETADINE® soluție *EGIS PHARMACEUTICALS;* Sol. ext. 10% (fl. × 30 ml; 120 ml; 1000 ml) ***(OTC)***

BETADINE® săpun chirurgical *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Săpun chirurgical cu 75 mg/ ml (fl. × 120 ml; 1000 ml) ***(OTC)***

IODINĂ 10% *TIS FARMACEUTIC;* Sol. ext. 10% (fl. × 125 ml) ***(OTC)***

IODIS-T 10% *TIS FARMACEUTIC;* Sol. vaginală 10% (fl. × 125 ml) ***(OTC)***

IODISOL *SPOFA;* Sol. ext. 0,37% (fl. spray × 35 gl) ***(OTC)***

IODISEPT *PHARCO PHARMACEUTICALS;* Ung. 10% (tub × 20 g) ***(OTC)***

IODISOL SOLUDEIDE *DENTAL AS;* Sol. pt. gargară 0,3% (fl. × 80 g; 360 g; 760 g) ***(OTC)***

IODOSEPT *ARMEDICA SA;* Sol. ext. 10% (fl. × 40 l) ***(OTC)***

OCULOTECT® FLUID *NOVARTIS PHARMA;* Sol. oft. 5% (fl. × 10 ml) ***(OTC)***

SICOSEPT® *SICOMED SA;* Sol. cut. 10% (fl. × 100 ml) ***(OTC)***

Ind: *Ovulele vaginale:* vaginite acute și cronice, infecții mixte, specifice și nespecifice (Gardnerella, Trichomonas, Candida). Pregătirea preoperatorie. *Soluția:* dezinfecția pielii și mucoaselor; trat. plăgilor aseptice, infecțiilor cutanate bacteriene și fungice; dezinfecția preoperatorie corporală totală sau parțială. *Săpunul:* dezinfecția mâinilor; igiena personalului medical și auxiliar; în laboratoare după contactul cu exsudate și secreții; asepsia preoperatorie a mâinilor. *Unguentul:* arsuri, răni septice și aseptice, ulcere trofice, escare și alte infecții cutanate și dermatoze suprainfectate.

Dz: Un *ovul* pe zi, 7-14 zile, profund în vagin, seara la culcare; se pot adm. 2 ovule/zi și pentru o perioadă mai lungă. Preoperator, un ovul pe zi, câteva zile înainte de operație. *Soluția* nediluată, sau în diluție de 1/10 în funcție de aplicație. Pentru trat. rănilor, arsurilor, infecțiilor cutanate și ale mucoaselor - diluție 1/10; pentru băile preoperatorii - diluție 1/100 (expunere minimum 2 minute). Diluțiile se prepară ex tempore. *Săpunul* se folosește numai nediluat; pentru practica medicală curentă 5 ml, minim 1 minut, cu clătire abundentă cu apă caldă; preoperator 10 ml timp de 2,5 minute; operația se repetă după spălarea abundentă a mâinilor cu apă sterilă (în total 20 ml polividonă 5 min). *Unguentul:* pe tegumente curate și uscate.

Cind: Alergie la iod, hipertiroidie, dermatită herpetiformă Duhring, înaintea trat. cu iod radioactiv; IR gravă; nou-născuți.

A!: Patologiile tiroidiene (hiperfuncții). Culoarea brună a polividonei îi indică eficacitatea; diminuarea sau dispariția culorii indică scăderea activității antimicrobiene. Polividona se descompune sub influența luminii sau la temperaturi mai mari de 40 de grade. Efectul antimicrobian se exercită la un pH 2-7. Nu se asociază cu preparate topice enzimatice sau pe bază de mercur, sau cu alte antiseptice. Complexul PVP-iod este incompatibil cu agenții reducători, sărurile alcaline și acizii. În cazul săpunului, se testează sensibilitatea în prealabil. Atenție la unguent în patologiile tiroidiene, la vârstnici, la nou-născuți, copii mici, gravide și în perioada alăptării.

RA: În caz de sensibilitate la iod, uneori iritații locale cu caracter tranzitoriu.

PRAMIPEXOLUM *COD ATC: N04BC05*

MIRAPEXIN™ *BOEHRINGER INGELHEIM* – Cpr. 0,25 mg respectiv 1 mg pramipexol ***(P-RF)***

Ind: Boala Parkinson idiopatică, ca monoterapie în stadiul incipient al bolii, și în asociere cu levodopa în stadiul avansat al afecțiunii.
Dz: *Trat. inițial.* Dozele se cresc treptat, la fiecare 5-7 zile, de la 0,375 mg/zi adm. în 3 prize egale, până la atingerea efectului terapeutic optim. Orarul de creștere a dozelor: Săpt. I - 0,375 mg/zi; săpt. II - 0,75 mg/zi; săpt. III - 1,5 mg/zi; săpt. IV -2,25 mg/zi; săpt. V - 3 mg/zi; săpt. VI - 3,75 mg/zi; săpt. VII - 4,50 mg/zi. *Trat. de întreținere.* 1,5-4,5 mg/zi, cu sau fără levodopa. În asociere, se reduce doza de levodopa (cu 27%). Pacienți cu disfuncții renale: Cl creatinină 20-50 ml/min, doză inițială de 0,25 mg/zi (în două prize de 0,125 mg).; Cl creatinină < 20 ml/min, 0,125 mg/zi. *Întreruperea trat.* – gradat, în decurs de o săpt.
Cind: Hipersensibilitatea la pramipexol sau la oricare dintre componentele produsului. Alăptare.
A!: hTA ortostatică la care apare toleranță în cazul titrării gradate a dozei adm. Potențarea efectelor secundare de tip dopaminergic ale levodopa (diskinezii). Monitorizarea oftalmologică la intervale regulate, sau când apar anomalii ale vederii. Pacienți sub 18 ani. Ajustarea dozei la pacienții cu afectare renală. Sarcină. Șoferi și activități de precizie.
RA: hTA ortostatică, greață, diskinezie, insomnie, somnolență, halucinații, cefalee, constipație, anormalități onirice și confuzie.

PRAMIRACETAMUM *COD ATC: N06BX16*

PRAMISTAR® *BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP;* Cpr. film. 600 mg pramiracetam ***(P-6L)***

Ind: Tulburări de memorie și de concentrare la vârstnici, de origine degenerativă sau vasculară.
Dz: 600 mg de 2 ori/zi, dimineața și seara. Efect relevant se obține după 4-8 săpt. de trat.
Cind: Hipersensibilitate la pramiracetam sau la celelalte componente ale produsului. IR severă. Sarcină. Alăptare.
A!: IR moderată, ajustarea dozelor. Șoferi și activități de precizie.
RA: Agitație psihomotorie, insomnie, disforie, indigestie, epigastralgii. Ocazional: amețeli, tremor, incontinență urinară și fecală, confuzie, greață, uscăciunea gurii, crampe musculare.

PRAVASTATINUM *COD ATC: C10AA03*

LIPOSTAT® *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Cpr. 10 mg sau 20 mg pravastatină sodică ***(P-6L)***

PRALIP *LEK PHARMACEUTICALS;* Cpr. 10 mg, 20 mg, 40 mg

Ind: Boala vasculară aterosclerotică datorată hipercolesterolemiei (în asociere cu o dietă hipolipidică). Reducerea riscului IM recurent și a atacului ischemic tranzitoriu (TIA). Reducerea hiperlipidemiilor totale.

Dz: 10-40 mg o dată/zi la culcare, în afara meselor sau în doze divizate Doza inițială: 10-20 mg. Dacă colesterolul seric este peste 300 mg/dl se adm. inițial 40 mg zilnic. Efectul maximal unei doze este evident după 4 săpt. În caz de asociere cu ciclosporină se adm. inițial 10 mg/zi, maximum 20 mg/zi. Dacă se asociază cu o rășină, pravastatin trebuie adm. cu minim 1 oră înainte de masă sau minim 4 ore după rășină.
Cind: Hipersensibilitatea la orice component al medicamentului. Afectarea funcțiilor hepatice. Sarcină și alăptare.
A!: Funcția hepatică: La începutul terapiei - creșterea enzimelor hepatice; testarea funcției hepatice. Oprirea trat. când GOT și GPT sunt egale sau depășesc de 3 ori limita normală superioară și persistă. Pacienți cu afecțiuni hepatice în antecedente sau alcoolici. Pacienți sub 18 ani.
RA: Urticarie.

PRAZIQUANTELUM *COD ATC: P02BA01*

CESOL® *MERCK KGaA;* Cpr. film. 150 mg praziquantel ***(P-RF)***

Ind: Infecții determinate de Taenia saginata, Taenia solium, Hymenolepsis nana, Diphyllobothrium pacificum.
Dz: Doză unică cu mult lichid în timpul uneia dintre mese. În infecțiile cu Taenia saginata, Taenia solium și Diphyllobothrium pacificum: 10 mg/kg. În infecțiile cu Hymenolepsis nana: 15 mg/kg.
Cind: Hipersensibilitate la preparat, cisticercoză intraoculară.
A!: IR și IH. Primele 3 luni de sarcină și alăptare. Șoferi și activități de precizie.
RA: La scurt timp de la ingestie pot apărea dureri abdominale, cefalee, somnolență, amețeli, greață și prurit.

PRAZOSINUM *COD ATC: C02CA01*

MINIPRESS *PFIZER H.C.P. CORPORATION;* Cpr. 1 mg, 2 mg prazosin; ct. × 3 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

Ind: HTA singur, sau în combinație cu un diuretic sau alte antihipertensive. Poate fi folosit la pacienții cu funcție renală compromisă. Trat. insuficienței ventriculare stângi. Fenomenul și maladia Raynaud. Hiperplazia benignă de prostată; trat. simptomatic al obstrucției urinare cauzate de hipertrofia benignă de prostată.
Dz: Se începe cu o doză mai mică, care se crește progresiv până la un răspuns optim. *HTA:* doza totală zilnică 20 mg adm. de 2-3 ori/zi, asociat cu un diuretic sau un beta-blocant. Ca monoterapie: inițial 0,5 mg seara la culcare, apoi 0,5 mg de 2-3 de ori/zi pentru 3-7 zile. Se crește la 1 mg de 2-3 ori/zi pentru 3-7 zile, dacă nu apar reacții adverse. Apoi, doza va fi mărită gradat până la o doză totală zilnică de 20 mg adm. divizat. Doza de întreținere: 3-20 mg în doze divizate. *Insuficiența ventriculară stângă:* Doza inițială 0,5 mg de 2, 3 sau 4 ori/zi, cu creșteri până la doza 4 -20 mg/zi în doze divizate. *Fenomenul și maladia Raynaud:* Doza inițială 0,5 mg de 2 ori/zi, 3-

7 zile. Doza întreținere 1-2 mg de 2-3 ori/zi. *Hiperplazia benignă de prostată:* Doza inițială 0,5 mg de 2 ori/zi, 3-7 zile. Doza întreținere 2 mg de 2 ori/zi.
Cind: Sensibilitate cunoscută la chinazoline. Trat. insuficienței ventriculare stângi datorate obstrucției mecanice (stenoza aortică, stenoza mitrală, embolismul pulmonar și pericardita constrictivă). Copii sub 12 ani.
AI: *HTA:* hTA posturală sau pierderi de conștiență în special la începutul trat. Se dă o doză inițială scăzută, cu o creștere ușoară în prima și a doua săpt. de trat. *Insuficiență ventriculară stângă:* în caz de adm. la pacienți care au primit trat. diuretic energic sau trat. vasodilatator, poate apărea scăderea presiunii de umplere a ventriculului stâng și o scădere semnificativă a debitului cardiac și a tensiunii arteriale. *Fenomenul și maladia Raynaud, hiperplazia benignă de prostată:* monitorizarea tensiunii arteriale.
RA: Amețeli, cefalee, somnolență, slăbiciune, palpitații și greață, care au dispărut frecvent în cazul continuării trat. Rar vărsături, diaree sau constipație, disconfort abdominal, alterări ale funcției hepatice, pancreatită, edeme, hTA ortostatică, dispnee, leșin, tahicardie, nervozitate, vertij, halucinații, depresie, parestezii, rash, prurit, alopecie, lichen plan, polachiurie, impotență, incontinență, priapism, tulburări de vedere, epistaxis, tinitus, uscăciune a gurii, congestie nazală, transpirații, febră, artralgii. În asociere cu glicozide cardiace și diuretice: somnolență, amețeală, hTA posturală, tulburări de vedere, edeme, uscăciunea gurii, palpitații, greață, diaree, impotență, cefalee și congestie nazală. În trat. maladiei și fenomenului Raynaud frecvent somnolență.

PREDNICABATUM *COD ATC: D07AC01*

DERMATOP *AVENTIS PHARMA;* Cremă 0,25% (tub × 30 g) ***(P-RF)***

Ind: Inflamații ale pielii care răspund la corticosteroizi topici.
Dz: Aplicații locale, o dată pe zi, maxim 4 săpt.
Cind: Hipersensibilitate la produs.
RA: Prurit, iritație tegumentară, foliculite.

PREDNISOLONUM *COD ATC: H02AB06*

SOLU-DECORTIN H 50; H 250 *MERK KGaA;* Pulb. pt. sol. inj. 50 mg, 250 mg prednisolon; ct. × 3 fl. pulb. + 3 f. solv. × 2 ml ***(P-RF)***

SUPERCORTIZOL *BIOFARM SA;* Susp. inj. 25 mg/ml (f. × 1 ml) ***(P-RF)***

ULTRACORTENOL *NOVARTIS PHARMA;* Sol. oft. 0,5% (fl. × 5 ml) ***(P-RF)***

Ind: *Afecțiuni reumatologice:* injecții intraarticulare în artrite inflamatorii, acutizări ale artrozelor; injecții periarticulare în tendinite și bursite; injecții la nivelul părților moi în sindromul de tunel carpian, boala Dupuytren; injecții epidurale în radiculalgii; injecții intradurale în radiculalgiile refractare la alte tratamente sau cu ocazia recoltării unei probe de lichid cefalorahidian. *Afecțiuni dermatologice:* cicatrice cheloidă; Afecțiuni neoplazice: meningite leucemice și tumorale; *Afecțiuni oftalmologice:* se injectează periocular în boli inflamatorii ale po-

lului anterior al globului ocular. *Afecțiuni ORL:* irigații intrasinusale la pacienții cu sinuzite subacute sau cronice, atunci când se impune drenajul cavităților sinusale.
Dz: În funcție de afecțiunea tratată, se injectează local 12,5-50 mg. Nu se inj. i.v.
Cind: Hipersensibilitate la produs. Tulburări severe ale coagulării. Tratament anticoagulant concomitent. Infecții locale sau sistemice.
A!: Deși se injectează local și absorbția în circulația sistemică este mică, se impun aceleași precauții ca și în cazul glucocorticoizilor administrați sistemic. Au risc mare de RA (inclusiv corticodependență). Tratamentul se face sub control medical și, în măsura posibilului, se va evita administrarea timp îndelungat a dozelor mari. Oprirea bruscă a adm. poate determina exacerbarea simptomelor bolii tratate, chiar fenomene de insuficiență suprarenală de aceea se va face prin diminuarea progresivă a dozelor. În situații de stres (intervenții chirurgicale, traumatisme, infecții) se crește doza. Ulcerul gastroduodenal activ reprezintă o contraindicație relativă a corticoterapiei; atunci când adm. glucocorticoizilor este indispensabilă, se recomandă asocierea cu inhibitori ai secreției gastrice acide și evitarea tratamentului prelungit. Dacă apare o infecție în timpul adm., este obligatorie instituirea tratamentului antiinfecțios specific. Pot beneficia de tratament cu glucocorticoizi infecțiile grave însoțite de șoc, formele grave de tuberculoză, encefalitele virale acute. Glucocorticoizii favorizează dezvoltarea osteoporozei. La copii pot întârzia creșterea. Acest efect poate fi minimalizat prin evitarea tratamentului îndelungat cu doze mari. Glucocorticoizii pot provoca fenomene de excitație centrală, chiar fenomene psihotice. Diabetul zaharat manifest este o contraindicație relativă. Doze mari și tratament îndelungat pot provoca hipokaliemie. Administrarea glucocorticoizilor necesită prudență la vârstnici, la pacienți cu colită ulceroasă, anastomoze intestinale recente, IR, IH, miastenia gravis. Sportivii trebuie atenționați că glucocorticoizii sistemici sunt incluși pe lista substanțelor dopante. În general, glucocorticoizii trebuie folosiți în timpul sarcinii numai la indicația și sub supravegherea medicului. Deoarece glucocorticoizii se excretă în lapte, alăptarea trebuie evitată în timpul tratamentului.
RA: Infecții locale la locul injecării: artrite, meningite etc. Atrofie localizată a țesuturilor musculare, subcutanate și cutanate. Ruptură de tendon în cazul injectării intratendinoase. Calcificări locale. Reacții alergice locale sau sistemice. Cefalee și bufeuri vasomotorii, care dispar în 1-2 zile.

PREDNISONUM

COD ATC: H02AB06

N-PREDNISON *NORDFARM PRODUCT SRL;* Cpr. prednison 5 mg; fl. × 30 cpr. ***(P-RF)***

PREDNISON *MAGISTRA C&C;* Cpr. 5 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr.; fl. × 30 cpr. ***(P-RF)***

PREDNISON *LAB. REMEDIA;* Cpr. prednison 5 mg ***(P-RF)***

PREDNISON *ARENA GROUP SA;* Cpr. 5 mg; fl. × 30 cpr. ***(P-RF)***

PREDNISON 5 mg *SINTOFARM SA;* Cpr. 5 mg ***(P-RF)***

PREDNISON 5 mg *ANTIBIOTICE SA;* Cpr. 5 mg; ct. × 2 blist.; ct. × 150 blist. ***(S/P-RF)***

PREDNISON ARMEDICA *ARMEDICA SA;* Cpr. 5 mg; fl. × 30 cpr. ***(P-RF)***

Ind: Colagenoze: pusee evolutive ale bolilor de sistem: LES, vasculite, polimiozite, sarcoidoză viscerală. Afecțiuni dermatologice: lupus eritematos, pemfigus și pemfigoid bulos, psoriazis grav rezistent la alte trat., forme severe de urticarie acută. Afecțiuni digestive: forme grave de rectocolită hemoragică și boală Crohn, hepatită cronică activă autoimună, hepatită alcoolică acută severă. Afecțiuni endocrine: tiroidită, cazuri selecționate de hipercalcemie. Afecțiuni hematologice: purpură trombocitopenică imunologică severă, anemie hemolitică autoimună, eritroblastopenie, hemopatii maligne limfoide-leucemie limfocitară acută sau cronică, limfoame Hodgkiniene sau non-Hodgkiniene (în asociații polichimioterapice). Afecțiuni neoplazice: pt. combaterea unor efecte secundare dezvoltării neoplaziei și pentru împiedicarea unor reacții adverse la citostatice. Afecțiuni renale: sindrom nefrotic cu leziuni glomerulare minime sau cu hialinoză segmentară și focală primitive, nefropatie lupică stadiile III-IV, sarcoidoză granulomatoasă intrarenală, vasculite cu afectare renală, glomerulonefrite extracapilare primitive. Afecțiuni neurologice: edem cerebral de etiologie tumorală, poliradiculonevrită cronică idiopatică inflamatorie, spasme infantile, scleroză multiplă în puseu, miastenie gravă, meningită tbc (asociat chimioterapiei specifice, ca medicație adjuvantă). Afecțiuni oftalmologice: uveită anterioară și posterioară severă, exoftalmie edematoasă, nevrită optică confirmată (în continuarea unui glucocorticoid intravenos). Afecțiuni ORL: polipi nazali, cazuri selecționate de otită seroasă și de sinuzită, rinite alergice sezoniere (cure scurte), laringită acută severă la copii. Afecțiuni respiratorii: astm bronșic cronic - forme rezistente la medicația uzuală, inclusiv glucocorticoizi inhalatori, pusee acute de astm bronșic (cure scurte), stare de rău astmatic (în continuarea unui glucocorticoid intravenos); BPCO, sarcoidoză evolutivă, fibroză pulmonară interstițială difuză. Afecțiuni reumatologice: forme severe de poliartrită reumatoidă, pusee acute ale bolii artrozice, RAA, nevralgie cervico-brahială severă rebelă. Transplant de organe și măduvă osoasă: profilaxia și trat. rejetului de grefă și a reacției grefă contra gazdă.

Dz: În situații acute se începe cu doze mari, 30-80 mg/zi, oral la adult și 1-3 mg/kg/zi la copii. În afecțiunile severe cu evoluție prelungită, trat. se continuă cu doza de întreținere, obișnuit 10 mg zilnic (5-15 mg), într-o singură priză, dimineața la sculare. Se încearcă schema de trat. alternativ, o dată la 2 zile. Întreruperea medicației se face prin reducerea progresivă a dozei - cu 1 mg la 1-2 săpt. În boli cronice evolutive se începe cu o doză mică, 5-10 mg/zi la adult, 0,25-0,5 mg/kg/zi la copii, care se crește progresiv până la realizarea beneficiului terapeutic. Apoi doza se reduce treptat până la doza minimă eficace. Durata trat. depinde de situația clinică.

Cind: Nu există contraindicații absolute ale glucocorticoizilor, atunci când adm. acestora este de importanță vitală. Ulcer gastroduodenal, osteoporoză, psihoze, anumite stări infecțioase, herpes, varicelă, zona zoster, atunci când riscurile depășesc beneficiile.

A!: Prescrierea trebuie făcută cu judiciozitate; se va evita trat. îndelungat cu doze mari. În doze mari prelungite deprimă funcția CSR, cu fenomene de hipocorticism endogen, și dependență de trat. hormonal, precum și fenomene de insuficiență CSR la oprirea bruscă a trat. Oprirea trat. se face prin diminuarea progresivă a dozelor. Se crește doza zilnică în situații de stres (intervenții chirurgicale, traumatisme, infecții). În ulcerul gastroduodenal activ se asociază cu antisecretorii gastrice. Favorizează dezvoltarea infecțiilor - reactivare tbc, exacerbare micoze, viroze, parazitoze. Cind în caz de infecții care nu pot fi controlate prin trat. specific. Dacă survine o infecție în timpul corticoterapiei se instituie trat. antiinfecțios specific. Folosirea vaccinurilor vii în timpul corticoterapiei este interzisă. Pot beneficia însă de glucocorticoizi infecțiile grave însoțite de șoc, formele grave de tbc, encefalitele virale acute sub acoperire cu antibiotice/chimioterapice specifice. Pentru profilaxia osteoporozei cortizonice se folosesc doze cât mai mici, o dietă bogată în proteine și trat. specific. La copii, glucocorticoizii inhibă maturarea osoasă și pot întârzia creșterea; se evită trat. îndelungat cu doze mari. Datorită riscului de fenomene psihotice se indică la bolnavii cu antecedente psihotice numai în situații de excepție. Prin efectul hiperglicemiant este contraindicat relativ în diabetul manifest și se reevaluează trat. antidiabetic. Se folosește cu grijă în cazurile în care retenția hidrosalină poate fi dăunătoare - IC, HTA, epilepsie și se evită consumului excesiv de sare. Risc de hipokaliemie. Prudență la vârstnici, la pacienți cu colită ulceroasă, anastomoze intestinale recente, IR, IH, miastenie gravă. Prednisonul și alți glucocorticoizi sistemici sunt cuprinși în lista substanțelor dopante, interzise la sportivi. Sarcină. Alăptare.

RA: Apar în general în cazul trat. prelungit cu doze mari. Tulburări hidroelectrolitice: retenție hidrosalină, hipokaliemie cu risc crescut de aritmii. Tulburări endocrine și metabolice: sd. Cushing iatrogen, hipocorticism endogen chiar atrofia CSR cu corticodependență definitivă; scăderea toleranței la glucoză, activarea diabetului latent sau agravarea diabetului manifest; întârzierea creșterii la copii; menstruații neregulate. Tulburări musculoscheletice: atrofie musculară precedată de astenie; osteoporoză, fracturi pe os patologic. Tulburări digestive: ulcerații ale mucoasei gastroduodenale, perforații și hemoragii digestive. Manifestări cutanate: acnee, purpură, echimoze, hipertricoză, întârzierea cicatrizării. Tulburări neuropsihice: euforie, stare de excitație, insomnie; tulburări psihotice de tip maniacal, stări confuzionale, stare depresivă. Tulburări oculare: glaucom, cataractă.

PRIMIDONUM *COD ATC: N03AA03*

PRIMIDON *SICOMED SA;* Cpr. 250 mg primidonă ***(P-6L)***

Ind: Epilepsie majoră (cazuri rezistente la fenobarbital și fenitoină), epilepsie psihomotorie.

Dz: *Adulți și copii peste 9 ani:* 125 mg dimineața și seara, crescându-se treptat până la 250 mg de 3 ori/zi; *copii sub 9 ani:* 5-30 mg/kg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la primidonă și barbiturice, porfirie.

A!: IH, IR și în caz de deprimare respiratorie. Atenție la asocierea cu alte deprimante centrale. Bătrâni și copii (doze mici). Sarcină și alăptare. Șoferi și activități de precizie.

RA: Oboseală, somnolență, ataxie, vertij, iritabilitate, tulburări vizuale, anorexie, greață, vomă, uneori erupții cutanate, tulburări de coagulare la nou-născut când mama a fost tratată cu anticonvulsivante în timpul sarcinii (profilaxie cu fitomenadionă); rareori tulburări afective, agitație (la copii cu sindrom hiperkinetic), fenomene psihotice, diplopie, nistagmus, edeme, sete, poliurie, impotență sexuală, limfadenopatie, leucopenie, foarte rar osteomalacie (se adm. vit. D), anemie megaloblastică (reversibilă la adm. de acid folic).

PRISNAMICINUM

COD ATC: J01FG01

PYOSTACINE 250 mg; PYOSTACINE 500 mg *LAB. AVENTIS PHARMA;* Cpr. film. 250 mg, 500 mg *(P-RF)*

Ind: Tratamentul infecțiilor cu germeni sensibili: infecții ORL; infecții bronho-pulmonare (în special pneumoniile comunitare); infecții genitale; infecții ale pielii și țesuturilor moi; infecții osteo-articulare. În cazul existenței alergiei la antibiotice beta-lactamice, pristinamicina este indicată pentru prevenirea endocarditei bacteriene în cursul tratamentelor stomatologice și în intervențiile ambulatorii.
Dz: *Adulți:* 2-3 g/zi, în 2-3 prize, în timpul meselor. Doza se poate crește până la 4 g/zi. *Copii:* 50 mg/kg/zi, în 2-3 prize. În cazul infecțiilor severe, doza se poate crește până la 100 mg/kg/zi. Profilaxia enocarditei infecțioase: Doză unică, adm. cu o oră înainte de intervenție; la adulți 1 g iar la copii 25 mg/kg.
Cind: Hipersensibilitate la pristinamicină și/sau virginiamicină sau la oricare dintre excipienții produselor. Antecedente de erupție pustuloasă la pristinamicină. Hipersensibilitate sau intoleranță la gluten, datorită prezenței amidonului de grâu.
A!: La începutul trat. eritem febril generalizat, asociat cu pustule, ce impune întreruperea trat. și Cind orice adm. ulterioară. Este posibilă o sensibilizare anterioară la virginiamicină. Atenție la asocierea cu ciclosporină.
RA: Tulburări gastrointestinale, greață, diaree, rar colită pseudomembranoasă, colită acută hemoragică; hipersensibilitate cutanată: rash, urticarie, foarte rar anigoedem; cazuri izolate de pustuloză exantematică acută generalizată.

PROCAINUM

COD ATC: N01BA02

CLORHIDRAT DE PROCAINĂ *SICOMED SA;* Sol. inj. 10 mg/ml (f. × 20 ml); Sol. inj. 4 mg/ml (f. × 2 ml) ***(S/P-RF)***

Ind: Anestezie locală (toate tipurile: de infiltrație, conducere tronculară, rahianestezie; cu excepția celei de suprafață); spasmolitic și antihipertensiv.
Dz: În funcție de indicație, inj. sau infiltrații locale, în cant. variate.
Cind: Alergie la procaină, IH, hTA, șoc, miastenie, hipertiroidie, epilepsie, rahianestezie în meningită, septicemie.
A!: Antagonism cu sulfamide (prin PABA). *Potențial alergizant mare!*
RA: Datorate stimulării SNC: agitație, tremor, tahipnee, convulsii; hTA cu tahicardie reflexă.

PROCARBAZINUM

COD ATC: L01XB01

NATULAN *HOFFMANN LA ROCHE;* Cps. 50 mg procarbazină; fl. × 50 cps. ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. bolii Hodgkin, producând în majoritatea cazurilor, remisiuni parțiale sau complete; alte neoplasme (reticuloză malignă, limfomul histiocitar, macroglobulinemia Waldenström, limfomul limfocitic, boala Brill-Symmers, policitemia rubra vera).
Dz: Strict sub supraveghere medicală. Se începe cu doze mici, care sunt crescute gradat până la o doză maximă zilnică de 250-300 mg. Schema de dozaj inițial: Ziua 1: 50 mg; ziua 2: 100 mg; ziua 3: 150 mg; ziua 4: 200 mg; ziua 5: 250 mg; ziua 6 și zilele următoare: 250-300 mg. Continuarea trat.: 250-

300 mg/zi, până ce remisia este cât mai completă cu putință, după care se trece la doza de întreținere. Dacă, în cursul trat. inițial, numărul de leucocite scade sub 3000/μl sau cel al trombocitelor scade sub 80000/μl, trat. trebuie suspendat temporar până la refacerea leucocitelor și trombocitelor, când se reia cu doza de întreținere. Doza de întreținere: 50-150 mg/zi. Se dă o doză totală de cel puțin 6 g. Se poate asocia cu alte citostatice.
Cind: Leucopenie sau trombocitopenie severă preexistentă; leziuni renale și hepatice grave. Reacții alergice cutanate. Sarcină. Alăptare.
RA: Mai des tulburări gastrointestinale și depresie medulară. Pierderea apetitului, greață, vomă. Leucopenie și trombocitopenie reversibile. Căderea reversibilă a părului. Tulburări neurologice (cefalee, parestezii, neuropatie, ataxie), icter colestatic, reacții alergice cutanate (exantem, urticarie, prurit); rareori azoospermie.

PROCHLORPERAZINUM *COD ATC: N05AB04*

EMETIRAL® *SICOMED SA;* Dj. 5 mg maleat de proclorperazină; fl. × 20 dj. ***(P-RF)***

Ind: Prevenirea și trat. vărsăturilor: postoperatorii și postanestezice, în uremie, în boala de iradiere, în gastroenterite, ca și în vărsăturile datorate diferitelor medicamente; migrenă, sindrom Ménière; schizofrenie; ca adjuvant pentru trat. de scurtă durată al stărilor de anxietate.
Dz: *Adulți:* antiemetic: 5-10 mg de 2-4 ori/zi; vertij: 15-30 mg/zi, fracționat; după câteva săpt. doza se poate reduce la 5-10 mg/zi; afecțiuni psihotice: câte 10 mg de 2 ori/zi o săpt., apoi se crește treptat până la 75-100 mg/zi, în funcție de răspuns; anxietate: 5 mg de 3-4 ori/zi, maxim 2 săpt. *Copii peste 6 ani:* 5 mg de 2 ori/zi. *Vârstnici:* doze inițiale mici, care se cresc treptat; maxim 40 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la proclorperazină și alte fenotiazine; coma barbiturică și etilică; stări de deprimare ale SNC; stări de deprimare a hematopoiezei; glaucom; adenom de prostată; feocromocitom. Copii sub 6 ani. Sarcină. Alăptare.
A!: Voma morfinică sau postanestezică. Accidentele alergice, icterele grave, sindromul malign impun oprirea medicației. Prudență în ateroscleroză avansată și accidentele cerebrovasculare în antecedente, la vârstnici, la cei cu afecțiuni cardiovasculare grave. Agravează parkinsonismul și epilepsia. Doze mai mici în afecțiuni hepatice și renale. Prudență în hipotiroidie, miastenia gravis, diabet zaharat. Șoferi și activități de precizie.
RA: Sedare, somnolență, tulburări extrapiramidale, hTA ortostatică, întârzierea ejaculării, fenomene atropinice (uscăciunea gurii, constipație, tulburări ale vederii, retenție urinară). Uneori tulburări endocrine: impotență, frigiditate, amenoree, galactoree, ginecomastie, creștere în greutate. Rareori icter colestatic, fotosensibilizare, erupții cutanate alergice.

PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI) *COD ATC: C05CAX*

ENDOTELON 50 mg; ENDOTELON 150 mg *SANOFI~SYNTHELABO;* Dj. gastrorez. 50 mg, 150 mg extract purificat din sâmburi de struguri (standardizat în oligomeri procianidolici); blist. × 20 dj. gastrorez. ***(OTC)***

Ind: Trat tulburărilor circulatorii din insuficiența veno-limfatică (picioare grele, dureri sau senzații dureroase de picioare obosite înainte de culcare). Trat. unic

sau adjuvant al limfedemului și tensiunii cutanate consecutive trat. radiochirurgical al sânului; trat. tulburărilor circulatorii retiniene sau care afectează coroida.
Dz: Insuficiența veno-limfatică: 300 mg/zi în 2 prize dimineața și seara, 20 de zile/lună; limfedem: 300 mg/zi, în trat. continuu; în oftalmologie: 100-150 mg/zi. Cpr. se iau între mese.
Cind: Hipersensibilitate la oligomeri procianidolici sau la unul dintre excipienți. Sarcină. Alăptare.
A!: Evitarea expunerilor la soare, a căldurii excesive, a ortostatismului prelungit, a excesului ponderal. Sunt favorabile: mersul pe jos și utilizarea de ciorapi compresivi adecvați. Dacă simptomele locale persistă sau apar noi manifestări ce ar putea fi legate de o patologie vasculară nediagnosticată (echimoze, purpură etc.), conduita terapeutică trebuie reevaluată.
RA: Manifestări alergice: urticarie, rash cu sau fără prurit, fotosensibilizare, eczemă. Rar angioedem, gastralgii, greață, diaree, cefalee.

PROGESTERONUM

COD ATC: G03DA04

PROGESTERON *TERAPIA SA;* Sol. inj. 12,5 mg/ml progesteronă (f. × 2 ml) ***(S/P-RF)***

PROGESTOGEL *LAB. BESINS INTERNATIONAL;* Gel 1% (tub × 80 g) ***(P-6L)***

UTROGESTAN *LAB. BESINS INTERNATIONAL;* Cps. moi 100 mg; progesteron micronizat; ct. × 30; 2 blist. × 15 ***(P-RF)***

Ind: Metroragii funcționale (hiperplazie glandulochistică a mucoasei uterine); fibromatoză uterină cu polimenoree; dismenoree, hiper-, hipo- sau oligomenoree funcțională; amenoree primară sau secundară prin exces sau deficit de hormoni estrogeni (se va asocia trat. cu estrogeni); avort habitual, iminență de avort, sterilitate prin insuficiența luteală.
Dz: I.m., profund. Amenoree, hipo- sau oligomenoree funcțională: 25 mg, la 2 zile în a treia săpt. a ciclului (după pregătire estrogenică). Hipermenoree, dismenoree, sterilitate prin insuficiență luteală: 25 mg în a 5-a și a 3-a zi dinaintea menstruației. Avort habitual: câte 12,5 mg, de 2 ori pe săpt., în primele 4 luni de sarcină. Iminență de avort: 12,5-25 mg/zi, 4 zile, apoi 12,5-25 mg de 2 ori/săpt. până în luna a 4-a de sarcină. Doza maximă 200 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la progesteron, sângerări vaginale nediagnosticate, carcinom mamar sau genital, afecțiuni tromboembolice active sau în antecedente, tromboflebită, avort incomplet, hemoragii cerebrale, disfuncții hepatice. Pentru diagnosticarea sarcinii. Alăptare.
A!: Pacienți cu HTA, afecțiuni cardiovasculare, renale, epilepsie, stări depresive, diabet, disfuncții hepatice, porfirie intermitentă acută, migrenă sau sensibilitate la lumină. Trat. va fi întrerupt dacă se instalează o pierdere parțială sau completă a vederii, diplopie, exoftalmie, edem papilar, leziuni vasculare retiniene sau migrene. Poate afecta acuratețea testelor de laborator pentru funcțiile hepatice și/sau endocrine. Sarcină.
RA: Acnee, seboree, reacții alergice și urticarie, prurit vulvar, retenție hidrosalină, tumefacția sânilor, tulburări menstruale, sângerări, greață, vomă, stomatită, icter colestatic, pirexie, insomnie, somnolență, stare depresivă, hirsutism, reacții dureroase la locul injecției.

PROMESTRIENUM

COD ATC: G03CA09

COLPOTROPHINE® *LAB. THERAMEX;* Cps. vag. 10 mg promestrien; cremă vag. 1% (tub × 15 g) ***(P-RF)***

Ind: Atrofie vaginală prin carenţă estrogenică (dispareunie, prurit), întârzierea cicatrizărilor cervico-vaginale şi vulvare după naştere, intervenţii chirurgicale, radioterapie.
Dz: 1 cps. vag./zi, timp de 20 zile. Cremă: 1-2 aplicaţii pe zi, urmate de masaj lejer. Curele de întreţinere sunt necesare dacă persistă cauza (menopauză, castrare, anticoncepţionale estroprogestative, iradieri).
Cind: Antecedente de cancer estrogenodependent.

PROMETHAZINUM

COD ATC: R06AD02

ROMERGAN *BIOFARM SA;* Sirop 0,124% (fl. × 50 ml) ***(P-RF)***

ROMERGAN *SICOMED SA;* Sol inj. 25 mg/ml clorhidrat de prometazină (f. × 2 ml) ***(S/P-RF)***

ROMERGAN 30 mg *TERAPIA SA;* Cpr. film. 30 mg maleat de prometazină ***(P-RF)***

Ind: Afecţiuni alergice ale tractului respirator superior, pielii, ochiului sau tractului digestiv; intoleranţe alimentare şi medicamentoase; boala serului; reacţii anafilactice sau transfuzionale; stări de apatie şi insomnie în cursul bolii hipertonice; tulburări de climax; vărsături azotemice; sindrom neurotoxic; encefalite acute; insomnie; adjuvant în sedarea preoperatorie; sedativ în pediatrie.
Dz: *Adulţi:* 30 mg, la culcare; maxim 60-120 mg/zi. *Copii:* 1-1,5 mg/kg/zi în 2-3 prize, maxim seara. Durata: adulţi: câteva zile - săpt.; copii: 5-7 zile.
Cind: Hipersensibilitate la fenotiazine, depresii ale SNC, comă, nou-născuţi, prematuri. Sarcină. Alăptare. Şoferi şi activităţi de precizie.
A!: Pacienţi cu astm, bronşită, bronşiectazii, afecţiuni coronariene grave, glaucom cu unghi îngust, epilepsie, IR, IH, afecţiuni uretro-prostatice, obstrucţii piloro-intestinale. Poate masca semnele intoxicaţiei cu salicilaţi, ale obstrucţiei intestinale sau ale presiunii intracraniene crescute (prin suprimarea vomei). Se evită expunerea la soare pe durata trat. (risc de fotosensibilitate cutanată). Nu se va adm. bolnavilor trataţi cu IMAO în ultimele 14 zile.
RA: Somnolenţă diurnă, torpoare, ameţeli, stări de nelinişte, dureri de cap, coşmaruri, dezorientare, creşterea vâscozităţii secreţiei bronşice, uscăciunea gurii, anorexie, iritaţie gastrică, palpitaţii, hTA, spasme musculare, mişcări involuntare ale capului şi feţei, constipaţie, retenţie urinară, reacţii de fotosensibilizare cutanată, confuzie mintală sau excitabilitate la pacienţii vârstnici, hiperexcitabilitate paradoxală la unii copii. Rareori, în adm. de lungă durată: icter, diskinezie tardivă, anemie hemolitică, leucopenie şi agranulocitoză.

PROPAFENONUM

COD ATC: C01BC03

PROPAFENON AL 150 *ALIUD PHARMA GmbH;* Cpr. film. 150 mg ***(P-6L)***

PROPAFENONĂ *ARENA GROUP SA;* Cpr. 150 mg; fl. × 20 cpr. ***(P-6L)***

RYTMONORM® *KNOLL A.G.;* Sol. inj. 3,5 mg/ml clorhidrat de propafenonă (f. × 20 ml) ***(P-RF)***

RYTMONORM® *ABBOTT GmbH & Co. KG;* Cpr. film. 150 mg ***(P-RF)***

Ind: Tahiaritmii supraventriculare simptomatice și care necesită trat.: tahicardii AV și joncționale, tahicardii supraventriculare în sindromul WPW sau fibrilația atrială paroxistică. Tahiaritmii ventriculare simptomatice severe.
Dz: Doza medie orală zilnică de inițiere și cea de întreținere: 450-600 mg fracționată de 2-3 ori/zi, maxim 900 mg/zi. Dozele se reduc în IR sau IH, la vârstnici sau cu afectări masive ale miocardului. Cpr. se înghit întregi, după masă. *Pentru forma inj:* doză unică de 1 mg/kg i.v. lent în 3-5 minute. Se poate crește la 2 mg/kg. Intervalul între 2 injecții va fi de 90-120 min. Se va evita amestecul cu ser fiziologic.
Cind: IC manifestă, șoc cardiogen (cu excepția celui produs de aritmie), bradicardie gravă simptomatică; în primele 3 luni după infarctul de miocard sau în caz de insuficiență contractilă, cu excepția pacienților cu tulburări de ritm ventriculare amenințătoare de viață; tulburări de conducere sinoatriale, ASV și intraventriculare de grad înalt; boala nodului sinusal, hTA severă; tulburări electrolitice manifeste (metabolismul potasic); boli pulmonare obstructive grave; miastenia gravis; hipersensibilitate la substanța activă. Sarcină (primele 3 luni). Alăptare.
A!: Sub control cardiologic și ECG, - creșterea duratei complexelor QRS cu mai mult de 20% față de ECG inițială, a intervalului QT cu mai mult de 25%, sau a intervalului PQ cu mai mult de 50% impune reducerea sau oprirea trat. până la normalizarea ECG. Se poate modifica unda de pacing și cea de sensing ale stimulatorului cardiac (se va testa și reprograma funcția stimulatorului cardiac). Supraveghere cardiologică în tulburări de ritm. Atenție la cei cu limitare a funcției ventriculului stâng, cu maladii miocardice structurale. Șoferi și activități de precizie.
RA: Tulburări gastrointestinale (inapetență, senzație de sațietate, greață, vomă, gust amar, senzație de amorțeală în gură), constipație; parestezii, tulburări de vedere, senzație de amețeală și, foarte rar, oboseală, dureri de cap, senzație de neliniște, coșmaruri, tulburări de somn, tulburări psihice cu anxietate și confuzie, ca și simptome extrapiramidale - în special după o doză inițială crescută. Rareori alergii cutanate. Îndeosebi la vârstnici - tulburări ale reglării circulatorii, cu hTA în ortostatism. Efecte mai rare: bradicardie, bloc SA, bloc AV, tulburări ale excitabilității. Efecte deprimante asupra excitabilității și contractilității miocardice. Agravarea IC preexistente. Rareori accelerarea ritmului cardiac, fibrilație și flutter ventricular. Foarte rar colestază prin mecanism de tip hiperergic - alergic; creșterea anticorpilor antinucleari și un sindrom lupus eritematos; leucopenie, trombopenie reversibile. La doze mari diminuarea libidoului și reducerea numărului de spermatozoizi.

PROPARACAINUM *COD ATC: S01HAN1*

ALCAINE *ALCON SRL;* Sol. oft. 0,5% clorhidrat de proparacaină (fl. × 15 ml + picurător) ***(S/P-RF)***

Ind: Anestezia de suprafață în procedurile oftalmologice: măsurarea tonometrică a presiunii intraoculare; îndepărtarea corpilor străini și a firelor de sutură; prelevarea de frotiu conjunctival și cornean, examinări gonioscopice etc.
Dz: Pentru procedurile de scurtă durată și măsurători tonometrice, instilare 1-2 pic. înaintea testului. Îndepărtarea corpilor străini sau a firelor de sutură: 1-

2 pic. la 5-10 minute, de maximum 3 ori. În anestezia de lungă durată în operația de extracție a cataractei, 1-2 pic. la 5-10 minute, de 3-5 ori.
Cind: Hipersensibilitate la proparacaină.
A!: Utilizarea îndelungată poate duce la afectare corneană, pierderea vederii și întârzierea procesului de vindecare. Precauție în bolile cardiace și hipertiroidism.
RA: Reacții de sensibilizare.

PROPIVERINUM *COD ATC: G04BD06*

DETRUNORM *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG*; Dj. 15 mg; ct. × 28 dj; ct. × 56 dj. *(P-RF)*

Ind: Incontinență vezicală idiopatică, hiperflexia detrusorului datorată leziunilor măduvei spinării cu: incontinență urinară; senzația de micțiune imperioasă și frecvență urinară crescută.
Dz: *Adulți:* 1 dj. de 2-4 ori/zi. *Vârstnici fragili:* doză mai scăzută.
Cind: Hipersensibilitate la preparat; obstrucția intestinului gros; megacolon toxic; obstrucție vezicală cu posibilă retenție urinară; miastenia gravis; atonie intestinală; colită ulcerativă severă; glaucom; afecțiuni hepatice, renale severe. Copii. Sarcină. Alăptare.
A!: Neuropatie autonomă. Se pot agrava: hipertiroidismul, afecțiunile coronariene, IC congestivă severă, aritmiile, tahicardia, hipertrofia prostatei, hernia hiatală cu reflux esofagian. Monitorizarea enzimelor hepatice. Atenție dacă apar dureri inexplicabile sau stări generale proaste prelungite - cu greață, vomă și cefalee. Fenomene alergice mai des întâlnite la persoanele cunoscute cu alergie la aspirină. Șoferi și activități de precizie.
RA: Frecvent: uscarea gurii, vedere încețoșată la adulți; câteodată: tulburări ale funcției gastrointestinale, scăderea TA asociată cu sedare, creșterea ușoară a gradului de retenție urinară, oboseală; erupții datorate idiosincraziei (la propiverină) sau hipersensibilitate; agitație, iritare, senzație de căldură, tahicardie.

PROPOFOLUM *COD ATC: N01AX10*

DIPRIVAN *ASTRAZENECA*; Emulsie inj. 10 mg/ml (f. × 20 ml) *(S)*

DIPRIVAN 1% *ASTRAZENECA*; Emulsie inj. 10 mg/ml (seringă preumplută × 50 ml) *(S)*

DIPRIVAN 2% *ASTRAZENECA*; Emulsie inj. 20 mg/ml (fl. × 50 ml) *(S)*

PROPOFOL 1% "FRESINIUS" *FRESENIUS KABI;* Emulsie perf./inj. 1% propofol (fl. × 20 ml; 50 ml; 100 ml) *(S)*

PROPOFOL 2% "FRESINIUS" *FRESENIUS KABI;* Emulsie perf./inj. 2% propofol (fl. × 20 ml; 50 ml; 100 ml) *(S)*

PROPOFOL ABBOTT *ABBOTT LAB.;* Emulsie inj. 10 mg/ml (fl. × 20 ml; 50 ml; 100 ml) *(S)*

RECOFOL *LEIRAS OY – SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Emulsie 10 mg/ml (f. × 20 ml; fl. × 50 ml, 100 ml) *(S)*

Ind: Sedarea pacienților adulți cu ventilație asistată supuși terapiei intensive. Sedarea conștientă în cursul intervențiilor chirurgicale sau cu scop diagnostic.

Dz: Este necesară asocierea agenților analgezici suplimentari. *Adulți:* Inducerea anesteziei generale - inj. lentă în bolus sau în perfuzie 40 mg la fiecare 10 secunde, până când semnele clinice arată instalarea anesteziei. Majoritatea pacienților adulți sub 55 ani necesită 1,5-2,5 mg/kg. Doza totală necesară poate fi redusă prin scăderea ritmului de adm. (20-50 mg/min). Menținerea anesteziei generale - adm. în perfuzie continuă sau injectare în bolus repetat. Perfuzia continuă: 4-12 mg/kg/oră; injectarea repetată în bolus: creșteri ale dozei cu 25 mg (2,5 ml) până la 50 mg (5 ml). Sedarea în cursul terapiei intensive: perfuzie continuă 0,3-4,0 mg/kg/oră. Sedarea conștientă în cursul intervențiilor chirurgicale sau cu scop diagnostic: 0,5-1 mg/kg, 1-5 min pentru inițierea sedării. Menținerea sedării cu perfuzie: 1,5-4,5 mg/kg/oră. Adițional perfuziei, se adm. în bolus 10-20 mg când e necesară o creștere rapidă a profunzimii sedării. *Vârstnici:* doze mai scăzute. *Copii:* Inducerea anesteziei generale: *Copii peste 8 ani:* 2,5 mg/kg. Menținerea anesteziei generale: perfuzie sau inj. în bolus repetat 9-15 mg/kg/oră. Sedarea conștientă în cursul intervențiilor chirurgicale sau cu scop diagnostic sau al terapiei intensive: Cind la copii.
Cind: Alergie cunoscută la substanță. Copii sub 3 ani. Sarcină. Alăptare.
A!: Adm. de către personalul medical specializat în anestezie cu monitorizare constantă și asigurarea unei ventilație corespunzătoare și aparate pentru resuscitare. Înaintea externării, pacienților trebuie să li se asigure o perioadă adecvată în scopul revenirii totale după anestezia generală. Atenție la pacienții cu afecțiuni cardiace, respiratorii, renale sau hepatice, hipovolemici sau debilitați. Poate apărea bradicardie și asistolie (se adm. un anticolinergic înaintea inducției sau în cursul menținerii anesteziei). Risc convulsiv la pacienți epileptici. Atenție la cei cu afectarea metabolismului lipidic. Dacă pacientul primește în același timp și alte lipide i.v., trebuie redusă cantitatea luând în considerare totalul lipidelor perfuzate odată cu propofol: 1,0 ml propofol conține aprox 0,1 g lipide. Șoferi și activități de precizie.
RA: *Generale:* în perioada de inducție hTA și apnee tranzitorie, mișcări epileptiforme, convulsii și opistotonus în funcție de doza adm. și de folosirea premedicației. În cursul fazei de revenire, rareori grețuri, vărsături, cefalee. Rareori angioedem, bronhospasm, eritem. Edem pulmonar. Febră. Dezinhibiție sexuală. Decolorarea urinii. *Locale:* Durere locală, rar tromboză și flebită.

PROPRANOLOLUM *COD ATC: C07AA05*

N-PROPRANOLOL 10 mg *NORDFARM PRODUCT;* Cpr. 10 mg; fl. × 50 cpr. ***(P-6L)***

PROPRANOLOL *AESCULAP SRL;* Cpr. 10 mg; fl. × 50 cpr. ***(S)***

PROPRANOLOL 10 mg; 40 mg *BIO-EEL SRL;* Cpr. 10 mg; ct. × 2 blist. × 25 cpr.; Cpr. 40 mg; fl. × 50 cpr. ***(P-6L)***

PROPRANOLOL *ARENA GROUP SA;* Cpr. 40 mg; fl. × 50 cpr. ***(P-6L)***

PROPRANOLOL *LAB. REMEDIA;* Cpr. 10 mg sau 40 mg; fl. × 100 cpr. ***(P-6L)***

PROPRANOLOL *SICOMED SA;* Cpr. 10 mg sau 40 mg ***(P-6L)***; Sol. inj. 1 mg/ml (f. × 5 ml) ***(S/P-RF)***

PROPRANOLOL *SINTOFARM SA;* Cpr. 10 mg sau 40 mg; fl. × 50 cpr. ***(P-6L)***

PROPRANOLOL *NICOFARM PROD SRL;* Cpr. 10 mg sau 40 mg *(S/P-6L)*

Ind: Angină pectorală, îndeosebi angină cronică stabilă (ca trat. de fond) și pentru profilaxia pe termen lung după perioada acută a infarctului miocardic; aritmii cardiace supraventriculare, tahiaritmii digitalice; cardiomiopatie obstructivă; HTA esențială, mai ales forme cu circulație hiperkinetică și debit cardiac crescut, forme cu hiperreninemie sau asociat hipopresolului și nefrixului; profilaxia migrenelor; tireotoxicoză; înaintea și în timpul intervențiilor chirurgicale pentru feocromocitom (se asociază obligatoriu un α–blocant); stări anxioase (cu tulburări cardiace), tremor esențial; profilaxia hemoragiilor digestive la cirotici (cu excepția IH severe, cu icter, ascită mare, encefalopatie).
Dz: Se începe cu doze mici, care se cresc progresiv până la obținerea răspunsului terapeutic dorit. În general, 10-40 mg de 3-4 ori/zi. *Copii:* HTA: 1 mg/kg/zi în mai multe doze, până la 2-4 mg/kg/zi. Aritmii, feocromocitom, tireotoxicoză: 250-500 μg/kg de 3-4 ori/zi. Migrenă: (copii sub 12 ani) 20 mg de 2-3 ori/zi; i.v., 25-50 μg/kg, lent, de 3-4 ori/zi. *Adulți:* Afecțiuni cardiace: angina pectorală (de efort, instabilă, angor intricat): 40 mg de 2-3 ori/zi, crescându-se la intervale săptămânale până la 120-140 mg/zi, maxim 320 mg/zi; prevenirea secundară a IMA: în zilele 5-21 post-infarct 40 mg de 4 ori/zi, 2-3 zile apoi 80 mg de 2 ori/zi, max. 180-240 mg/zi în mai multe prize; aritmii cardiace: fibrilație și flutter atrial (în asociere cu digitalice), tahiaritmii cu extrasistole atriale/ventriculare, sincopa; 30-160 mg/zi, maximum 320 mg/zi în mai multe prize. În trat. de urgență al aritmiilor cardiace, i.v. lent, 1 mg/min, repetat la fiecare 2 minute până la maxim 10 mg (la pacienții conștienți) și 5 mg (la pacienții sub anestezie); HTA: de elecție la tineri, cu nivele crescute de renină, în asociere cu diuretice; hipertensiune indusă de sarcină, anevrism aortic disecant: inițial 40-80 mg de 2 ori/zi, apoi se crește până la 160-320 mg/zi, maximum 640 mg/zi. Nu se utilizează pe cale i.v. în urgențele hipertensive. Hipertiroidism: eficace pentru palpitații, tremor, anxietate; util în trat. preoperator, în tireotoxicoza neonatală; 10-40 mg de 3-4 ori/zi. În tireotoxicoză și crize tirotoxice i.v. 1 mg/min, repetat la 2 minute, până la obținerea răspunsului sau până la o doză maximă de 10 mg (la pacienții conștienți) și 5 mg (la pacienții sub anestezie). Feocromocitom: în asociere cu un α-blocant (tolazolina sau fenoxibenzamina); util în trat. preoperator; 60 mg/zi, 3 zile preoperator în asociere cu alfa-blocant; dacă tumora este inoperabilă, se poate face trat. prelungit cu 30 mg/zi. Stenoza subaortică hipertrofică: medicament de primă alegere: 10-40 mg de 3-4 ori/zi. Hipertensiune portală: trat. profilactic al sângerărilor eso-gastro-intestinale, prevenirea recidivelor hemoragice: 40 mg de 2 ori/zi maximum 160 mg de 2 ori/zi. Migrenă: trat. profilactic, în doze crescânde până la obținerea remisiunii: 40 mg de 2-3 ori/zi, se poate crește până la 160-240 mg/zi. Tremor: eficace în special la pacienți de peste 60 de ani (tremor esențial); se poate asocia cu primidona; 40 mg de 2-3 ori/ zi, se poate crește săptămânal până la 160-320 mg/zi. Anxietate: în reacții acute de stres, în special cu manifestări de anxietate somatică; în tulburări de sevraj de benzodiazepine, opioide sau alcool: 40 mg/zi până la 40 mg de 2-3 ori/zi.
Cind: Astm bronșic, bronșită astmatiformă, insuficiență respiratorie cu bronhospasm; IC congestivă (neasociat cu digitalice); bradicardie sinusală; bloc AV, HTA pulmonară severă; hipoglicemie (la diabetici trebuie reduse dozele); acidoza metabolică; IR; în IH se adm. după ajustarea dozelor; tulburări ale metabolismului lipidic.
A!: În timpul injectării se urmărește TA și traseul ECG. Când frecvența cardiacă scade sub 45-50/minut, se va adm. atropină 0,5 mg.

RA: Majore: IC, bloc AV, bronhospasm. Altele: bradicardie, hTA, fenomene Raynaud, claudicație intermitentă, neuropatii periferice, tulburări gastrointestinale, oboseală, tulburări ale somnului, depresie, hiperlipidemie. După adm. prelungită, trat. nu se va întrerupe brusc, datorită efectului de "rebound" putând apărea exacerbări ale anginei, cu IMA, până la moarte subită.

PROPYPHENAZONUM *COD ATC: N02BB04*

PROPIFENAZONA *ANTIBIOTICE IAȘI;* Sup. 100 mg propifenazonă; ct. × 2 plachete × 3 sup. ***(OTC)***

PROPIFENAZONA *SICOMED SA;* Cps. 100 mg sau 300 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. ***(OTC)***

PROPIFENAZONA *ARENA GROUP SA;* Cps. 300 mg; fl. × 20 cps. ***(OTC)***

Ind: Febră, dureri ușoare și medii (cefalee, nevralgii dentare, sciatică, dismenoree etc.).
Dz: *Sugari:* intrarectal 100 mg de 2 ori/zi; *copii mici:* 100 mg de 3 ori/zi; *copii peste 6 ani:* 200 mg de 3 ori/zi; *adolescenți* și *adulți:* 300 mg de 3-4 ori/zi.
Cind: În primul trimestru și ultimele 3 săpt. de sarcină.
RA: Reacții alergice.

PROTAMINI SULFAS *COD ATC: V03AB14*

PROTAMIN SULFAT *GALENIKA a.d;* Sol. inj. 10 mg/ml (f. × 5 ml) ***(S)***

PROTAMINE SULFATE *KAMADA Ltd.;* Sol. inj. 10 mg/ml (fl. × 5 ml) ***(S)***

Ind: Neutralizează instantaneu acțiunea anticoagulantă a Heparinei standard și a Fraxiparinei.
Dz: 1 ml neutralizează 1000 UI heparină standard, iar 0,6 ml neutralizează aproximativ 0,1 ml (950 UI Axa) de Fraxiparine. Se ține seama de heparinemia constatată numai pentru calculul dozei de sulfat de protamină ce urmează a fi injectată. Se adm. i.v. lent.
A!: Determinarea timpului de protrombină, pentru siguranța că neutralizarea a fost suficientă; dacă nu mai există heparină în circulație, acest timp trebuie să fie normal.
RA: Persistența hemoragiei după adm. de protamină, prin supradozarea protaminei. hTA și de bradicardie.

PROTEIN SUCCINILAT DE FER *COD ATC: B03AB09*

FERPLEX® *ITALFARMACO;* Sol. orală 800 mg/15 ml (fl. monodoză × 15 ml) ***(P-6L)***

Ind: Anemie prin aport deficitar, absorbție scăzută, pierderi acute sau cronice de sânge, infecții. Profilaxia anemiei feriprive din sarcină și alăptare.
Cind: Anemie aplastică sau hemolitică. Pancreatită cronică, ciroză hepatică.
RA: Grețuri, diaree, dureri epigastrice.

PROTIONAMIDUM

COD ATC: J04AD01

PROMID *BIOFARM SA;* Dj. 250 mg protinamidă; ct. × 4 blist. × 10 dj. ***(S/P-RF)***

EKTEBIN *SANAVITA GESUNDHEITSMITTEL GmbH & Co. KG;* Cpr. film. 250 mg protionamidă; fl. × 50 cpr. film. ***(S/P-RF)***

EKTEBIN® *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cpr. film. 250 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. tbc, în caz de rezistență la agenții antituberculoși de primă linie sau când aceștia nu pot fi folosiți din cauza reacțiilor toxice.
Dz: *Adulți:* 750 mg - 1 g/zi, în priză unică la masa de seară sau fracționat, la mese. Se asociază vit. B_6 (50-100 mg/zi) pentru prevenirea polinevritei. *Copii:* 4-5 mg/kg la 8 ore, maxim 750 mg/zi. La hepatici se folosesc doze mai mici. La copii trebuie redusă doza zilnică la aproximativ 1/2 din doza recomandată, atunci când se asociază cu izoniazida.
Cind: Alergie la produs, la etionamidă, izoniazidă, pirazinamidă și acid nicotinic; IH severă; IR severă; afecțiuni convulsivante; psihoze; nevrite periferice, nevrită optică. Sarcină. Alăptare.
A!: Asocierea chimioterapicelor este obligatorie. Gastrita acută, ulcerul gastrointestinal și afecțiunile intestinale ulcerative sunt Cind relative. Prudență la bolnavii cu antecedente depresive sau psihotice, în IR sau IH ușoare-moderate. Poate îngreuna controlul diabetului. Periodic teste hepatice, oftalmologice și examen neurologic. Șoferi și activități de precizie.
RA: Amețeli, cefalee, nevrite, stare de excitație, depresie și alte tulburări psihotice, convulsii; gust metalic, anorexie, greață, dureri epigastrice, senzație de plenitudine, creșterea transaminazelor, uscăciunea pielii și reacții pelagroide. Ocazional ginecomastie, hipoglicemie la diabetici. Rareori hepatită și icter, tulburări menstruale, impotență, hipotiroidism, afectarea măduvei hematopoietice, reacții alergice.

PROTOXID DE AZOT

COD ATC: N01AX13

PROTOXID DE AZOT *SICOMED SA;* Gaz inhal. recipient × 10 L și 40 L cu protoxid de azot lichefiat ***(S)***

Ind: Chirurgie (80% protoxid de azot + 20% oxigen): în anestezie generală. Obstetrică (50% protoxid de azot + 50% aer sau oxigen): pentru analgezia nașterii. Alte indicații (35% protoxid de azot în aer sau oxigen): bronhoscopie, debridarea plăgilor, cauterizări, incizări de abcese, schimbarea pansamentelor, analgezie postoperatorie, în trat. tetanosului.
Dz: În chirurgie, în faza de inducție, se adm. după o premedicație adecvată (barbituric cu durată de acțiune scurtă); narcoza chirurgicală se obține cu un anestezic volatil (eter, tricloretilen sau halotan), eventual cu un analgezic narcotic. Pentru miorelaxare se utilizează d-tubocurarina sau alte miorelaxante.
RA: Vărsături, în special la copii. În caz de nerespectare a proporției celor două gaze în amestecul anestezic, apare hipoxia (anoxia) cerebrală. Adm. prelungite duc la afectare medulară până la aplazie.

PSEUDOEFEDRINUM *COD ATC: R01BA02*

PSEUDOEPHEDRINE *LEINER HEALTH PRODUCT;* Cpr. 30 mg clorhidrat de pseudoefedrină; fl. × 100 cpr. ***(OTC)***

SUDAFED *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. 60 mg clorhidrat de pseudoefedrină; blist. × 12 cpr. film. ***(OTC)***

Ind: Trat. congestiei din afecțiunile căilor respiratorii superioare (răceală, febra fânului sau nas "înfundat").
Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* 60 mg de 3-4 ori/zi. *Copii (6-12 ani):* 30 mg de 3-4 ori/zi.
Cind: Copii sub 6 ani. Hipersensibilitate la pseudoefedrină.
A!: Alergie; infecție bacteriană; HTA sau alte afecțiuni cardiace; diabet; afecțiuni oculare. Atenționare pentru sportivi: produs dopant. Sarcină și alăptare.
RA: Tulburări de somn și foarte rar halucinații. Erupții cutanate. Neliniște. Bărbați - dificultăți la urinat.

PYGEUM AFRICANUM *COD ATC: G04CX01*

TADENAN 50 mg *LAB. DEBAT;* Cps. 50 mg extract de Pygeum africanum; ct. × 3 blist.; ct. × 6 blist. ***(P-6L)***

TADENAN 50 mg *LAB. FOURNIER SA;* Cps. 50 mg ***(P-6L)***

Ind: Trat. unor forme de disurii care pot apărea în hipertrofia benignă a prostatei.
Dz: 50 mg dimineața și seara, înainte de mese, 6-8 săpt.
A!: Utilizarea acestui medicament nu se dispensează de examenul medical uzual al prostatei și nu poate înlocui intervenția chirurgicală dacă aceasta este necesară.
RA: Posibile tulburări digestive.

PYRANTELUM *COD ATC: P02CB01*

HELMINTOX 125 *INNOTECH INTERNAT.;* Cpr. 125 mg; ct. × 6 cpr. ***(P-RF)***

HELMINTOX 250 *INNOTECH INTERNAT.;* Cpr. 250 mg; ct. × 3 cpr. ***(P-RF)***

HELMINTOX® *INNOTECH INTERNAT.;* Susp. orală 125 mg/2,5 ml (fl. × 15 ml) ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. infestării cu: Enterobius vermicularis (oxiuri); Ascaris lumbricoides (limbrici); Ankilostoma duodenale; Necator americanus; Trichostrongilus colubriformis și T. Orientalis la adulți și la copii. Se adm. întregii familii sau colectivității odată cu dezinfecția riguroasă a spațiilor de locuit și a îmbrăcămintii.
Dz: 10 mg/kg, doză unică (maxim 1 g). Infestări severe cu Necator americanus: 20 mg/kg o dată pe zi, 2 zile consecutiv, sau 10 mg/kg, o dată pe zi, 3 zile consecutiv. Infestările doar cu Ascaris lumbricoides: doză unică de 5 mg/kg.
Cind: Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre componente. Copii sub 6 luni. Sarcină. Alăptare.
A!: Afecțiuni hepatice preexistente.
RA: Anorexie, crampe abdominale, grețuri, vărsături și diaree; cefalee, somnolență, insomnie și rash. Creșteri minore și tranzitorii ale TGO.

PYRAZINAMIDUM

COD ATC: J04AK01

PIRAZINAMIDĂ *SICOMED SA;* Cpr. 500 mg pirazinamidă; fl. × 20 cpr. ***(S/P-RF)***

PIRAZINAMIDĂ *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cpr. 500 mg pirazinamidă; ct. × 2 blist.; ct. × 150 blist. ***(S/P-RF)***

Ind: tbc pulmonară și extrapulmonară cu germeni rezistenți la isoniazidă și/sau rifampicină în asociere cu antituberculoase majore pentru a se evita instalarea rapidă a rezistenței.
Dz: Oral *adulți* 1,5-2 g /zi sau 30 mg/kg, în 3-4 prize postprandial și 60 mg/kg, max. 4 g când se adm. bisăpt. *Copii:* 20 mg/kg/zi.
A!: Monitorizarea enzimelor hepatice și funcție renală. Asocierea cu rifampicină și isoniazidă poate da tulburări grave ale funcței hepatice, mai ales la pacienții cu IH. Prudență la bolnavii cu afecțiuni renale, cu hiperuricemie, diabet zaharat. Șoferi și activități de precizie. Se evită expunerea la soare.
RA: Reversibile. Tulburările funcțiilor hepatice dependente de doză; tulburarea metabolismului purinei cu hiperuricemie. Tulburări gastro-intestinale: inapetență, indispoziții epigastrice, vărsături și crampe abdominale. Tulburări de hematopoieză, anemii sideroblastice, trombocitopenie sau porfirie. SNC: cefalee, amețeli, excitații și insomnii. Prin scăderea glicemiei, la diabetici apar dificultăți de echilibrare a insulinei.

PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM

COD ATC: N07AA02

DOSTIRAV 30 mg; DOSTIRAV 60 mg *PROMEDIC SRL;* Cpr. 30 mg, 60 mg ***(S/P-6L)***

MESTINON *ICN HUNGARY Co Ltd.;* Dj. 60 mg bromură de piridostigmină; fl. × 60 dj. ***(P-6L)***

Ind: Miastenia gravis; atonie intestinală.
Dz: Adult, în miastemie: 120-900 mg/zi, în 3-4 reprize, la 6-8 ore.
Cind: Astm, Parkinson, obstruație mecanică digestivă și urinară.
A!: Sarcină (primele 3 luni).

PYRIDOXINUM

COD ATC: A11HA02

SICOVIT® B_6 250 mg *SICOMED SA;* Cpr. 250 mg ***(P-6L)***

SICOVIT® B_6 50 mg/2 ml *SICOMED SA;* Sol. inj. ***(S/P-RF)***

SICOVIT® B_6 250 mg/5 ml *SICOMED SA;* Sol. inj. ***(S/P-RF)***

VITAMINA B_6 *SICOMED SA;* Cpr. 250 mg clorhidrat de piridoxină ***(P-6L)***; Sol. inj. 25 mg/ml (f. × 2 ml) sau 50 mg/ml (f. × 5 ml) ***(S/P-RF)***

VITAMINA B_6 *TERAPIA SA;* Sol. inj. 250 mg/5 ml (f. × 5 ml) ***(P-RF)***

VITAMINA B_6 50 mg *TERAPIA SA;* Sol. inj. 50 mg/2 ml (f. × 2 ml) ***(P-RF)***

Ind: Anemii aplastice și eritroblastice; anemii hipocrome (rezistente la trat. cu fer); granulopenie de origine toxică sau medicamentoasă; afecțiuni ale SNC cu etiologie aterosclerotică sau encefalitică; trat. preventiv și curativ al polinevritelor de origine toxică sau medicamentoasă, mai ales cea hidrazidică; crampe, hipertonie musculară, miopatie, acrodinie; vărsături, mai ales gravidice, postanestezice sau postroentgenterapice; tremurături idiopatice, senile sau de origine toxică, boala Parkinson, parkinsonism aterosclerotic; etilism acut; dermatită seboreică, acnee, dermite ușoare postroentgeniene; boală aterosclerotică.
Dz: *Adulți:* 50-250 mg/zi, 15-20 zile, oral sau inj. i.m. sau i.v. *Copii:* 20-50 mg, după vârstă și gravitatea cazului.

PYRITHIONUM ZINCICUM *COD ATC: D11AX12*

SKIN CAP *CHEMINOVA INT.;* Șampon 1% (fl. × 150 ml); Cremă 0,2% (tub × 50 g) ***(OTC)***

Ind: Controlul dermatitei seboreice a pielii capului și a mătreții; trat. pitiriazis.
Dz: Perioada de aplicare este de aprox. 1 lună. Șamponul se aplică de 3 ori pe săpt. Primele rezultate apar după 1 săpt.
A!: Se evită contactul cu ochii și mucoasele; leziunile sau eritemul tegumentelor pot favoriza absorbția.
RA: Absența virtuală a efectelor secundare.

PYRITINOLUM *COD ATC: N06BX02*

ENCEPHABOL *MERCK KGaA;* Dj. 100 mg clorhidrat de piritinol; Susp. orală 80,5 mg/ml (fl. × 200 ml) ***(P-6L)***

ENCEPHABOL FORTE *MERCK KGaA;* Dj. 200 mg; ct. × 5 blist. × 10 dj. ***(P-6L)***

ENERBOL *PLIVA KRAKOW;* Dj. 100 mg; ct. × 1 blist; ct. × 5 blist. × 20 dj. ***(P-6L)***

PIRITINOL *TERAPIA SA;* Dj. 100 mg; ct. × 3 folii; ct. × 100 folii × 10 dj. ***(S/P-6L)***

Ind: Insuficiență cerebrală datorată tulburărilor metabolice și circulatorii ale creierului. Tulburări în dezvoltarea creierului la copii ca o consecință a stresului perinatal. Status postraumatism cranio-cerebral, atacuri cerebrale vasculare, intoxicații sau encefalite.
Dz: *Adulți* 600 mg/zi. *Copii:* 50-300 mg/zi cel puțin 6-8 săpt.
Cind: Artrită reumatoidă cu tulburări funcționale severe ale rinichilor și ficatului; modificări importante hematologice; boli autoimune: lupus eritematos, miastenie, pemfigus.
A!: Pentru a evita tulburările de somn, la copii ultima doză nu se adm. după-amiaza târziu sau seara.
RA: Rar - reacții alergice, în special eritem cutanat; febră; tulburări gastroin-

testinale și hepatice; modificări ale gustului; simptome de supraexcitabilitate; rar, reacții cutanate tip pemfigus sau lichen plan. La pacienți cu artrită reumatoidă, rar, reacții secundare specifice medicației tip penicilamină (proteinurie, reducerea numărului de trombocite și leucocite). Este indicată efectuarea periodică a analizei sângelui și urinei.

PYRVINII CHLORIDUM

COD ATC: P02CX01

VERMIGAL *BIOFARM SA;* Susp. orală 1% (fl. × 22,8 ml) ***(P-RF)***

Ind: Infecții intestinale cu Enterobius vermicularis (oxiuri) și Strongyloides stercoralis.
Dz: Oral, în oxiurază doză unică de 5 mg/kg, maxim 250 mg; se repetă după 10-20 zile; în strongiloidoză 5 mg/kg/zi, 7 zile.
A!: Prudență în afecțiuni renale și hepatice.
RA: Iritație gastrointestinală cu greață, vomă, dureri abdominale; rar reacții de fotosensibilizare; colorează scaunele și pătează în roșu.

Q

QUETIAPINUM

COD ATC: N05AH04

SEROQUEL; SEROQUEL "4 DAY STARTER PACK" *ASTRAZENECA;* Cpr. film. 25, 100 mg (ct. × 6 blistere × 10 cpr. film.); 200 mg (ct. × 6 blistere × 10 cpr. film) ***(P-RF)***

Ind: Tratamentul schizofreniei. Tratamentul episoadelor maniacale din psihoza bipolară.
Dz: Oral, de două ori pe zi, înainte sau după mese. *Adulți, în tratamentul schizofreniei:* doza pentru primele 4 zile de tratament este de 50 mg quetiapină în prima zi, 100 mg quetiapină în a doua zi, 200 mg quetiapină în a treia zi și 300 mg quetiapină în a patra zi. Din a patra zi, doza se crește treptat până la doza eficace uzuală cuprinsă între 300 - 450 mg pe zi. Aceasta poate fi ajustată în funcție de răspunsul clinic și de tolerabilitatea individuală, cu limite cuprinse între 150-750 mg quetiapină pe zi. În tratamentul episoadelor maniacale din psihoza bipolară: ca monoterapie sau ca terapie adjuvantă în stabilizarea dispoziției, doza totală zilnică în primele patru zile de tratament este de 100 mg (ziua 1), 200 mg (ziua 2), 300 mg (ziua 3), 400 mg (ziua 4). Creșterea ulterioară a dozei până la 800 mg pe zi până în ziua a 6-a nu trebuie să depășească 200 mg pe zi. Doza poate fi ajustată în funcție de răspunsul clinic și de tolerabilitatea fiecărui pacient între 200 mg și 800 mg pe zi. Doza eficace uzuală este cuprinsă între 400 și 800 mg pe zi.
La *vârstnici* se începe cu 25 mg pe zi. Doza trebuie crescută zilnic cu 25 - 50 mg pe zi până la doza eficace, care va fi mai mică față de cea a pacienților tineri. La pacienții cu insuficiență renală sau hepatică, se începe cu 25 mg pe zi și se crește zilnic cu 25 - 50 mg până la doza terapeutică eficace.

Aulin®
MAI EFICIENT
MAI BINE TOLERAT
MAI MULT DECÂT
UN INHIBITOR SELECTIV...
Aulin®
Aulin® 100
HELSINN birex
Plicuri
100 mg
Tablete
100 mg
Alfabetul începe cu A
Analgezia începe cu Aulin®

CSC PHARMACEUTICALS - Reprezentanța în România, Calea Șerban Vodă nr. 95-101, sector 4, București
Tel.: +4021-337.3281 Fax: + 4021-336.5190

MICROSER®
În sindromul vertiginos de orice etiologie,
INSTAUREAZĂ ECHILIBRUL!
CSC PHARMACEUTICALS
Calea Şerban Vodă nr. 95-101, sector 4, Bucureşti
Tel: +4021-337.3281; Fax: +4021-336.5190; e-mail: csc@fx.r

PIASCLEDINE® 300

Multiple beneficii în BOALA ARTROZICĂ:

- Efect trofic asupra cartilajului articular
- Diminuarea handicapului şi durerii
- Diminuarea consumului de AINS


PIASCLEDINE® 300
15 CAPSULES
LABORATOIRES PHARMASCIENCE
PIASCLEDINE 300

Prelungeşte mişcarea

1 capsulă pe zi - 6 luni de tratament

CSC

CSC PHARMACEUTICALS - Reprezentanţa în România, Calea Şerban Vodă nr. 95-101, sector 4, Bucureşti
Tel.: +4021-337.3281 Fax: + 4021-336.5190

HYALGAN®

Hialu nat de sodiu

4X4

Eficacitatea integrală în artroză

Mecanism de acţiune dual (farmacologic şi de lubrefiere)

Menţinerea efectului pe termen lung (12-24[1,2,3] luni)

Modificator de structură

Tratament local bine tolerat

1 injecţie intraarticulară pe săptămână, timp de 5 săptămâni

ESE
PHARMACEUTICALS
Tel: +4021 377 3281

1. Dougados M et al. High molecular weight sodium hyaluronate (hyalectin) in osteoarthritis of the knee: a 1 year placebo-controlled trial. Osteoarthritis Cartilage 1993;1: 97-103. 2. Kolarz G, Kotz R and Hochmayer I. Long-term benefits and repeated treatment cycles of intra-articular sodium hyaluronate (Hyalgan®) in patients with osteoarthritis of the knee. Semin Arthritis Rheum 2003; 32: 310-319. 3. Long-term efficacy and safety of intra-articular sodium hyaluronate (Hyalgan) in patient with osteoartritis of the knee. D.H. Neustadt Clinical and Experimental Rheumatology 2003; 21:307-311.

PharmaFerrum®

Protejează familia

CERTIFICAT GMP GOOD MANUFACTURING PRACTICE

pentru toate [illegible] de producție

Complex polimaltozat de hidroxid de fier (III)

pharmaplant biogalenica

Splaiul Unirii 313, Bucuresti, România

PharmaFerrum

Picături orale, soluție 5% - 50 ml

Fier (III) 5g sub formă de complex: hidroxid de fier (III) - polimaltoză

Soluție orală 5% - 50 ml

Aromă de ciocolată și vanilie

În tratamentul și prevenţia anemiei feriprive la copil și adult

pharmaplant biogalenica

Companie certificată GMP

TAZIDIL®
pentru inima ta

TAZIDIL® 20 mg

CERTIFICAT GMP GOOD MANUFACTURING PRACTICE
pentru toate liniile de producţie

trimetazidină diHCL
(de 3 ori pe zi)

- *Conservarea funcţiei contractile miocardice prin inhibarea selectivă a 3-CAT*
- *Creşte rezerva coronariană întârziind instalarea ischemiei indusă de efort*
- *Scade frecvenţa crizelor de angină pectorală*
- *Scade consumul de nitroglicerină*

COMPENSAT
compensat
COMPENSAT

Promedic
Splaiul Unirii 313, Sector 3, Bucureşti
Tel./Fax: 40 21 346.48.49; Tel.: 40 21 346.48.48
Companie certificată GMP

TUSOSEDAL®

butamirat citrat

În tratamentul **TUSEI IRITATIVE** la copii și adulți

CERTIFICAT
GMP
GOOD MANUFACTURING PRACTICE
pentru toate liniile de producție

CONTROL

la înălțime cu

pharmaplant
biogalenica

Companie certificată GMP

Splaiul Unirii 313, corp H, et. 4, sector 3, București
Tel: 021-346.48.18, tel/fax: 021-346.48.08, e-mail: pharmaplant@ines.ro, www.pharmaplant.ro

VICHY
LABORATOIRES

La originea porilor dilataţi, microchisturilor, coşurilor :
o dezorganizare masivă a epidermei.

NORMADERM

Cremă hidratantă antiimperfecţiuni cu Zincadone A®

Reorganizează celulele pentru
o piele sănătoasă
în 4 săptămâni.

Coşuri : -77%*
Pori dilataţi : -72%*
Microchisturi: -74%*

Eficacitate demonstrată
sub control dermatologic.

NOU
Brevete depuse
VICHY
NORMADERM
SOIN HYDRATANT ANTI-IMPERFECTIONS
ANTI-IMPERFECTION HYDRATING CARE
50 ml

Hipoalergenic. Cu Apă Termală Vichy.

VICHY. SĂNĂTATEA E VITALĂ. ÎNCEPEŢI CU PIELEA DUMNEAVOASTRĂ

www.normaderm.com

*Test public realizat pe 130 femei

Cind: Hipersensibilitate la quetiapină sau la oricare dintre excipienții produsului.
Al: Prudență în administrarea la pacienți cu afecțiuni cardiovasculare cunoscute, boli cerebrovasculare, convulsii în antecedente, vârstnici. La apariția semnelor de diskinezie tardivă, de sindrom neuroleptic malign, se întrerupe tratamentul. La întreruperea bruscă a tratamentului cu doze mari, pot apărea: greață, vărsături, insomnie, recurența simptomelor psihotice, mișcări involuntare patologice, de aceea, tratamentul se întrerupe treptat. Interacțiuni cu: carbamazepină, antifungice azolice, antibiotice macrolide. În sarcină se utilizează numai când beneficiul depășește riscurile potențiale. Femeile care alăptează trebuie să întrerupă administrarea în timpul tratamentului. Produce somnolență și afectează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.
RA: Frecvent: somnolență, amețeli, uscăciunea gurii, astenie ușoară, constipație, tahicardie, hipotensiune ortostatică și dispepsie. Alte reacții adverse rare, comune antipsihoticelor: sincope, sidrom neuroleptic malign, leucopenie, neutropenie și edeme periferice.

QUINAPRILUM

COD ATC: C09AA06

ACCUPRO® 5; 10; 20 *PFIZER H.C.P.CO.;* Cpr. film. 5 mg; 10 mg; 20 mg, 3 blist. × 10 cpr. film. ***(P-6L)***

Ind: HTA; IC (adjuvant).
Dz: *HTA:* inițial 5 mg/zi; doza de întreținere: 20-40 mg/zi, în 2 prize; IR, *vârstnici:* inițial 2,5 mg/zi. *IC:* inițial 2,5 mg/zi; doza de intreținere: 10-20 mg/zi, în 2 prize.
Cind: Hipersensibilitate la produs sau la alți IEC; sarcină.
RA: Cefalee, amețeli, astenie, erupții, edem angioneurotic, tuse.

R

RABEPRAZOLUM

COD ATC: A02BC04

PARIET *JANSSEN PHARMACEUTICA;* Cpr. film. gastrorez. a 20 mg rabeprazol ***(P-RF)***

Ind: Ulcerul duodenal activ; ulcerul gastric activ; esofagită de reflux. În asociere cu un trat. antibacterian adecvat în eradicarea Helicobacter pylori.
Dz: *Adulți și vârstnici: Ulcer duodenal activ și ulcer gastric activ:* 20 mg, o dată pe zi, dimineața, 2-4 săpt. *Esofagită de reflux:* 20 mg, o dată pe zi, 4-8 săpt. *Eradicarea H. pylori:* asocierile următoare, timp de 7 zile: 20 mg rabeprazol de 2 ori/zi, claritromicină 500 mg de 2 ori/zi și amoxicilină 1 g de 2 ori/zi; 20 mg rabeprazol de 2 ori/ zi, claritromicină 500 mg de 2 ori/zi și metronidazol 400 mg de 2 ori/zi. Cpr. film. gastrorezistente nu se mestecă sau sfărâmă, ci se înghit întregi.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la rabeprazol, la derivați de benzimidazol sau la oricare dintre componentele produsului; sarcină și alăptare.
A!: Posibilitatea existenței unui proces malign trebuie exclusă înaintea începerii tratamentului. IH severă.
RA: Cefalee, diaree, durere abdominală, astenie, flatulență, rash-ul și uscăciunea gurii.

RACECADOTRILUM *COD ATC: A07XA04*

HIDRASEC *LAB. FOURNIER SA;* Cps. 100 mg racecadotril, ct. × 1 blister a 10 cps., ct. × 2 blistere a 10 cps., ct. × 3 blistere a 10 cps; Pulb. orală 10 mg racecadotril; ct. × 10 plicuri a 1 g pulb., ct. × 16 plicuri a 1 g pulb., ct. × 20 plicuri a 1 g pulb., ct. × 30 plicuri a 1 g pulb., ct. × 50 plicuri a 1 g pulb., ct. × 100 plicuri a 1 g pulb., 30 mg racecadotril, ct. × 10 plicuri a 3 g pulb, ct. × 20 plicuri a 3 g pulb., ct. × 30 plicuri a 3 g pulb., ct. × 60 plicuri a 3 g pulb., ct. × 100 plicuri a 3 g pulb.

Ind: Tratamentul simptomatic al diareei acute la sugari și copii mici, în asociere cu rehidratarea orală.
Dz: Oral, în funcție de greutatea corporală. Doza inițială pentru o dată este de 1,5 mg/kg, care se administrează de 4 ori pe zi. Doza zilnică recomandată este de aproximativ 6 mg /kg, adică aproximativ 42 mg racecadotril/kg pentru o săptămână de tratament. *Sugari de la 1 lună la 9 luni* (până la aproximativ 9 kg): prima zi: 10 mg racecadotril (1 plic de 10 mg) de 4 ori pe zi. Zilele următoare: 10 mg racecadotril (1 plic de 10 mg) de 3 ori pe zi. *Sugari de la 9 luni la 30 luni* (între 9 și 13 kg): prima zi: 20 mg racecadotril (2 plicuri de 10 mg) de 4 ori pe zi. Zilele următoare: 20 mg racecadotril (2 plicuri de 10 mg) de 3 ori pe zi. *Copii de la 30 luni la 9 ani* (între 13-27 kg): prima zi: 30 mg racecadotril (1 plic de 30 mg) de 4 ori pe zi. Zilele următoare: 30 mg racecadotril (1 plic de 30 mg) de 3 ori pe zi. *Copii peste 9 ani* (peste 27 kg): prima zi: 60 mg racecadotril (2 plicuri de 30 mg) de 4 ori pe zi. Zilele următoare: 60 mg racecadotril (2 plicuri de 30 mg) de 3 ori pe zi. *Adulți:* 100 mg racecadotril (o capsulă de 100 mg) administrate inițial și apoi câte 100 mg racecadotril (o capsulă de 100 mg) la începutul meselor principale. Tratamentul va fi urmat până la primul scaun normal, fără a se depăși 7 zile.
Cind: Insuficiență renală sau hepatică, în absența datelor.
A!: Datorită prezenței zaharozei, acest medicament este contraindicat în caz de intoleranță la fructoză, sindrom de malabsorbție a glucozei și galactozei sau deficit de sucrază-izomaltază. Prudență în diabet zaharat (produsul conține 0,966 g de zaharoză per plic de 1 g de pulbere). Nu trebuie administrat ca tratament de primă intenție în dizenteria acută, cu prezența de sânge în scaun și febră mare și în diaree ce survine în timpul antibioterapiei cu spectru larg.

RALOXIFENUM *COD ATC: G03XC01*

EVISTA *ELI LILLY;* Cpr. film. a 60 mg raloxifen; ct. × 14 cpr. film.; ct. × 28 cpr. film. ***(P-6L)***

Ind: Tratamentul și profilaxia osteoporozei la femeile aflate în post-menopauză.
Dz: 60 mg/zi. Adm. pe termen lung. Se recomandă suplimentarea dietei cu calciu și vitamina D.

Cind: La femeile cu potențial fertil. Tromboză venoasă profundă, embolie pulmonară și tromboză venoasă retiniană, în prezent sau în antecedente. Hipersensibilitate la raloxifen. IH, inclusiv colestaza. IR severă. Hemoragii uterine de etiologie necunoscută. La pacientele cu simptome de cancer endometrial.
A!: La pacientele cu risc de evenimente tromboembolice venoase de orice etiologie trebuie avut în vedere raportul risc/beneficiu. Prudență la pacientele cu antecedente de hipertrigliceridemie (> 5,6 mmol/l) indusă de estrogenii adm. oral, IH, asocierea cu colestiramină.
RA: Tromboză venoasă profundă, embolie pulmonară și tromboza venelor retiniene; bufeuri; crampe la nivelul membrelor inferioare; trombocitopenie ușoară. Foarte rar: greață, vărsături, durere abdominală și dispepsie; rash; creșterea tensiunii arteriale; cefalee, inclusiv migrenă; sindrom gripal.

RAMIPRILUM

COD ATC: C09AA05

TRITACE 2,5 *AVENTIS PHARMA;* Cpr. a 2,5 mg ramipril ***(P-6L)***

TRITACE 5 *AVENTIS PHARMA;* Cpr. a 5 mg ramipril ***(P-6L)***

TRITACE® 10 mg *AVENTIS PHARMA;* Cpr. a 10 mg ramipril ***(P-6L)***

Ind: HTA; IC congestivă; Reducerea mortalității post IMA.
Dz: HTA: Inițial 2,5 mg/zi. Doza se crește cu 1,25 mg la 2-3 săpt. Doza de întreținere: 2,5-5 mg/zi, doza maximă admisă 10 mg/zi. La pacienții cu IR, doza se ajustează în funcție de clearance-ul la creatinină.
Cind: Hipersensibilitate la produs; istoric de edem angioneurotic; stenoză de arteră renală bilateral sau unilateral pe rinichi unic; stenoza aortică sau mitrală; hTA; în cursul dializelor cu membrane poliacrilonitrilice. Sarcină și alăptare.
A!: IC severă (NYHA IV) imediat după IMA. Asocierea cu diuretice. Monitorizare atentă în: HTA severă; IC severă; pacienți pretratați cu diuretice; hipovolemie, hipopotasemie, hiponatriemie; stenoză arterială renală relevantă hemodinamic; pacienți cu risc de hTA ortostatică, IH. Când se adm. simultan cu AINS trebuie anticipate atât scăderea efectului antihipertensiv cât și posibilitatea apariției IR acute. Ș oferi și activități de precizie.
RA: hTA ortostatică; amețeli, fatigabilitate, slăbiciune, tahicardie, greață, transpirații, tinitus, tulburări vizuale, dureri de cap, anxietate.

RANITIDINUM

COD ATC: A02BA02

ARNETIN *MEDOCHEMIE Ltd.;* Sol. inj. 25 mg/ml, 50 mg/2 ml (f. × 2 ml) ***(P-RF)***

GERTOCALM *FARAN LAB.;* Cpr. film. 150 mg sau 300 mg ***(P-6L)***

HISTAC 75 *RANBAXY LAB. Ltd.;* Cpr. film. 75 mg; ct. × 1 blist sau 2 blist. × 6 cpr. film. ***(OTC)***

HISTAC EVT *RANBAXY LAB. Ltd.;* Cpr. eff. 150 mg; fl. × 10 cpr. eff. ***(P-6L)***

LUMAREN *ELPEN SA;* Sol. inj. 25 mg/ml (f. × 2 ml) ***(S/P-RF)***

MED-RANITIDIN *MEDIPHARMA SERV.;* Cpr. 150 mg; fl. × 20 cpr. ***(P-6L)***

N-RANITIDIN *NORDFARM PRODUCT;* Cpr. 150 mg; fl. × 60 cpr. ***(P-6L)***

NOVO-RANITIDINE *NOVOPHARM Ltd.;* Cpr. film. 150 mg sau 300 mg; fl. × 100 cpr. film. ***(P-6L)***

PYLORID *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. 400 mg ranitidină-citrat de bismut ***(P-6L)***

RANIBERL *BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP;* Cpr. film. 150 mg ***(P-6L)***

RANITAL® 150 mg *LEK PHARMACEUTICALS;* Cpr. film. 150 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. film. ***(P-6L)***

RANITIDIN *ARENA GROUP SA;* Cpr. 150 mg; fl. × 20 cpr. ***(P-6L)***; fl. × 1000 cpr. ***(S)***

RANITIDIN *SLAVIA PHARM SRL;* Cpr. 150 mg; fl. × 20 cpr. ***(P-6L)***

RANITIDIN *PHARMEX ROM IND.* Cpr. 150 mg; fl. × 20 cpr. ***(P-6L)***

RANITIDIN *OZONE LAB. Ltd.;* Cpr. 150 mg ***(P-6L)***

RANITIDIN 150 mg *AC HELCOR SRL;* Cpr. film.150 mg ***(P-6L)***

RANITIDIN 300 mg *AC HELCOR SRL;* Cpr. film. 300 mg ***(P-6L)***

RANITIDIN 150 mg *FABIOL SA;* Cpr. 150 mg × 20 ***(P-6L)***

RANITIDINĂ *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cpr. film. 150 mg; ct. × 2 blist. sau 120 blist. × 10 cpr. film. ***(S/P-6L)***

RANITIDINĂ *MAGISTRA C&C;* Cpr. 150 mg ***(P-6L)***

RANITIDINĂ *ANTIBIOTICE IAȘI în cooperare cu SANAVITA GERM.;* Cpr. film. 150 mg ***(P-6L)***

RANITIN 150, 300 *TORRENT PHARMA Ltd.;* Cpr. film. 150 mg sau 300 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

RANITIN® 150; RANITIN® 300; *LABORMED PHARMA SA în cooperare cu TORRENT LTD.;* Cpr. film. 150 și 300 mg ***(S/P-6L)***

ROMATIDINE® 150 mg *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cpr. film. 150 mg

ULCORAN *EUROPHARM SA;* Cps. 150 mg; ct. × 2 blist. sau 30 blist. × 10 cps. ***(S/P-6L)***

ULCORAN FORTE *EUROPHARM SA;* Cps. 300 mg; ct. × 2 blist. sau 30 blist. × 10 cps. ***(S/P-6L)***

ZANTAC *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. 150 mg sau 300 mg; Cpr. eff. 150 mg ***(P-6L)***; Sol. inj. 25 mg/ml (f. × 2 ml) ***(S/P-RF)***

ZANTAC-75 *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. 75 mg; ct. × 1 blist. × 6 cpr. film. ***(OTC)***

Ind: Trat. ulcer duodenal și ulcer gastric benign, inclusiv cel indus de AINS. Prevenirea ulcerelor la bolnavii care sunt trat. cu AINS (inclusiv aspirină) și în special la bolnavii cu boală ulceroasă în antecedente. Ulcer postoperator. Eso-

fagita de reflux. Sindrom Zollinger-Ellison. Dispepsie cronică episodică. Profilaxia ulcerului de stres; recurențelor hemoragice după boală ulceroasă; sd. Mendelson.
Dz: *Adm. orală: Adulți:* Ulcerul duodenal și ulcerul gastric benign. Trat. acut: 150 mg de 2 ori pe zi sau 300 mg seara. Vindecarea apare după 4 săpt. de trat. sau după alte 4 săpt. la cei care nu au fost vindecați după primele 4 săpt. În ulcerul duodenal: 300 mg de 2 ori pe zi, 4 săpt. Tratamentul pe termen lung: 150 mg seara. Pentru fumători: 300 mg seara. În ulcerele induse de AINS: 8-12 săpt. de trat. cu 150 mg de 2 ori pe zi sau 300 de mg seara. Profilaxie: 150 mg de 2 ori pe zi, adm. concomitent cu AINS. Ulcer postoperator: 150 mg de două ori pe zi, timp de 4 săpt. Sindrom Zollinger-Ellison: inițial 150 mg de 3 ori pe zi. Dozele peste 6 g/zi sunt bine tolerate. Dispepsie cronică episodică: 150 mg de 2 ori pe zi, cel puțin 6 săptămâni. Profilaxia hemoragiilor datorate ulcerelor de stres: 150 mg de 2 ori pe zi. IR severă: 150 mg.
Adm. inj.: Adulți: i.v. lent (peste 2 minute), 50 mg/20 ml, la 6-8 ore; sau perfuzie 25 mg/oră timp de 2 ore, perfuzia repetându-se la 6-8 ore; fie i.m. 50 mg, la 6-8 ore.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la produs.
A!: Excluderea posibilității existenței unei afecțiuni gastrice maligne înaintea începerii trat., deoarece ranitidina poate masca simptomatologia carcinomului gastric. Prudență în IR severă, pacienții cu fenilcetonurie. Ranitidina se evită la pacienții cu porfirie acută în antecedente. Sarcină și alăptare.
RA: Ocazional hepatită (cu sau fără icter), pancreatită acută. Modificări ale tabloului sanguin (leucopenie, trombocitopenie) reversibile, rar granulocitoză și pancitopenie, uneori asociată cu hipoplazie sau aplazie medulară. Reacții de hipersensibilitate (urticarie, edem angioneurotic, febră, bronhospasm, hTA, șoc anafilactic, dureri toracice). Rare cazuri de confuzie mentală, depresie și halucinații reversibile mai ales la pacienții în vârstă și cu boli severe. Au fost raportate tulburări de vedere, cu precădere modificări de acomodare, erupții cutanate.

REBOXETINUM *COD ATC: N06AX18*

EDRONAX® *PHARMACIA - Membru al Grupului PFIZER;* Cpr. 4 mg reboxetină; fl. × 60 cpr.; ct. × 1 blist. sau 3 blist. × 20 cpr. ***(P-RF)***

Ind: Trat. pacienților cu stări depresive.
Dz: 8 mg/zi, adm. în 2 prize. Doza zilnică maximă 12 mg.
A!: Precauție la adm. la pacienți cu afecțiuni hepatice, renale, glaucom, epileptic, cu IMA recent sau hipotensiv. Atenție la asocieri cu: antidepresive triciclice, SSRI, litiu și IMAO, eritromicină, fluvoxamină; fluconazol; flecainidă; ciclosporină. Șoferi și activități de precizie.
RA: Senzație de uscăciune a gurii sau constipație, transpirații abundente, insomnie. La unii bărbați pot apărea disfuncții sexuale. Disurie, sau dureri la urinare, creșterea frecvenței cardiace, înțepături precordiale, amețeli sau leșin la trecerea din clino- în ortostatism.

REPAGLINIDUM *COD ATC: A10BX02*

NOVO NORM® *NOVO NORDISK A/S;* Cpr. a 0,5 mg; 1 mg sau 2 mg repaglinidă; ct. × 1 blist. × 90 cpr. ***(P-6L)***

Ind: Diabet tip 2 (diabet zaharat insulino-independent) a căror glicemie nu mai poate fi controlată satisfăcător prin dietă, scăderea în greutate și exer-

cițiu fizic. În combinație cu metformin pentru pacienții cu diabet tip 2, atunci când metforminul singur nu permite un control satisfăcător.
Dz: Inițial 0,5 mg. Dacă pacienții sunt transferați de la un alt agent oral hipoglicemic, doza inițială este de 1 mg. Doza maximă recomandată este de 4 mg înainte de mesele principale. Doza maximă totală 16 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la produs, diabet zaharat tip 1, cetoacidoza diabetică, sarcină și alăptare, tulburări severe renale sau hepatice, copii sub 12 ani, vârstnici peste 75 de ani. Asocierea cu: ketoconazol, itraconazol, eritromicină, fluconazol; rifampicină, fenitoină.
A!: Precauție la asocierea cu: IMAO, beta-blocante neselective, IEC, salicilați, octreotide, alcoolul și steroizii anabolizanți, anticoncepționalele orale, tiazidele, corticosteroizii, hormonii tiroidieni și simpatomimetice.
RA: Hipoglicemia ușoară, tulburări vizuale tranzitorii și tulburări gastrointestinale (diaree, greață). Cazuri izolate de creșteri ușoare și tranzitorii ale nivelelor enzimelor hepatice și reacții alergice.

RESERPINUM *COD ATC: C02AA02*

RAUNERVIL *SICOMED SA;* Sol. inj. 2,5 mg/ml (f. × 1 ml) ***(P-RF)***

Ind: HTA formă ușoară sau medie, însoțită de tahicardie, tulburări vegetative; HTA din cursul sarcinii; tulburări vegetative, în special cu manifestări de hipertonie simpatică; stări de hiperexcitabilitate nervoasă, anxietate; toxicomanii, tireotoxicoză; adjuvant în trat. psihozelor însoțite de agitație maniacală; delirium tremens.
Dz: *Adulți:* 0,25-1 mg/zi, în 1-3 prize; *Copii* (3-15 ani): 0,125-0,375 mg/zi în 3 prize; se începe cu doze mici, crescându-se treptat.
Cind: Hipersensibilitate la alcaloizii din *Rauwolfia sp.*; depresie; ulcer; gastroenterocolită acută; epilepsie și parkinsonism; bradicardii accentuate, BAV, IM, IC și IR. Prudență în cursul sarcinii. Trat. se întrerupe cu 2 săptămâni înainte de intervenții chirurgicale sau electroșoc. Nu se adm. copiilor sub 3 ani.
RA: Congestia mucoasei nazale, senzația de greutate în membrele inferioare, greață, diaree, somnolență, cefalee, amețeli, diminuarea libidoului. Administrarea prelungită poate produce stări depresive, activarea bolii ulceroase (ceea ce impune oprirea tratamentului).

RETEPLASUM *COD ATC: B01AD07*

RAPILYSIN® 10 U *HOFFMANN LA ROCHE;* Pulb. pt. sol. inj. 10 U reteplază ***(S)***

Ind: Terapia trombolitică a IMA (în răstimp de 12 ore după instalarea simptomelor IMA).
Dz: Trat. trebuie inițiat imediat ce se instalează simptomele de IMA. Doză dublă de injecții de 2 × 10 U în bolus. Fiecare doză este adm. i.v. lent în timp de mai puțin de 2 minute. A doua doză se adm. la 30 minute după începerea injectării primei doze. Heparina și acidul acetilsalicilic se vor administra concomitent, pentru a reduce riscul de tromboză. Heparină 5000 UI inj. în bolus și urmată de o perfuzie de 1000 UI/oră, începând de la terminarea

celei de-a doua doze de reteplase. Se va administra cel puțin 24 ore. Acidul acetilsalicilic: 75-350 mg/zi de la începutul terapiei trombolitice și cel puțin până la externare.

Cind: În decurs de 3 luni de la hemoragii sau traumatisme severe, de la intervenție chirurgicală majoră, neoplasm intracranian, malformații arteriovenoase sau anevrism; diateză hemoragică cunoscută; HTA severă necontrolată; ulcerație peptică activă, varice esofagiene și alte contraindicații cunoscute pentru terapia fibrinolitică (pancreatită acută, pericardită acută, endocardită bacteriană, retinopatie diabetică hemoragică, sau la pacienți aflați sub tratament cu anticoagulante orale).

A!: Prudență în: maladii cerebrovasculare, hemoragii recente gastrointestinale sau genitourinare (în ultimele 10 zile), masaj cardiac prelungit sau viguros; stenoză mitrală cu fibrilație atrială, deficiențe hemostatice datorate maladiilor hepatice sau renale severe. Neoplasme cu risc crescut de sângerare, sarcină, tromboflebită septică sau canulă arteriovenoasă ocluzionată la situsuri cu infecție puternică, vârstă înaintată, peste 75 ani. Atenție la asocierea cu: heparină, antagoniștii vitaminei K, medicamente care modifică funcțiile plachetare (cresc riscului de hemoragie).

RA: Frecvent hemoragie, predominant la situsul de injectare și numai ocazional hemoragie gastrointestinală, gingivală sau genitourinară; rar sângerare retroperitoneală, hemoragie cerebrală și epistaxis. Cardiovascular: aritmii cardiace, tahicardie ventriculară, extrasistole și hTA. Rareori, s-au raportat reacții alergice.

RETINOLUM

COD ATC: A11CA01
S01XA02

OCULOTEC *NOVARTIS PHARMA;* Gel oft. 1000 UI/g (tub × 10 g) ***(P-6L)***

SICOVIT® A 10000 UI *SICOMED SA;* Dj. 10 000 UI; fl. × 50 dj. ***(P-6L)***

SICOVIT® A 300000 UI/1 ml *SICOMED SA;* Sol. inj. uleioasă 300 000 UI/ml - 1 ml ***(P-RF)***

VITAMINA A 50000 UI *PHARCO PHARMACEUTICALS;* Cps. 50 000 UI; ct. × 2 blist. sau 4 blist. × 6 cps. ***(P-6L)***

VITAMINA A *BIOFARM SA;* Sol. orală 1 500 000 UI/g (fl. × 10 ml) ***(P-6L)***

VITAMINA A *BIOFARM SA;* Perle

VITAMINA A FORTE *BIOFARM SA;* Cps. moi 50 000 UI; ct. × 3 blist. × 10 cps. moi ***(P-6L)***

VITAMINA A HIDROSOLUBILĂ *SICOMED SA;* Sol. inj. 20 000 UI/ml (f. × 2 ml); ct. × 5 f. sau 100 f. ***(S/P-RF)***

VITAMINA A inj. 300000 UI *SICOMED SA;* Sol. inj. 300 000 UI/ml (f. × 1 ml); ct. × 10 f. sau 100 f. ***(S/P-RF)***

Ind: Carențe specifice, stări de hipo- sau avitaminoză în steatoree, obstrucție biliară, la copilul mic, în sarcină, în perioada de alăptare; unele boli de piele: diskeratoză, boală Darier, psoriazis etc. (tratament local și general); afecțiuni cronice cu modificări structurale și funcționale ale unor epitelii: ozenă, bronșită cronică, stomatite, glosite, gastrită atrofică, rectocolite, litiază renală; prurit vul-

var și anal; hemeralopie, xeroftalmie; sindrom premenstrual prin insuficiență luteinică (ca medicație adjuvantă).
Dz: *Oral*, în stări carențiale, la *adulți și copii mai mari de 8 ani*, 100000 UI/zi, 3 zile, apoi 50000 UI/zi, 2 săptămâni; doze de întreținere: 10000-20000 UI/zi, 2 luni; *copii până la 2 ani:* 1000-10000 UI/zi; *copii 2-8 ani:* 3000-30000UI/zi, 15 zile; pentru alte indicații, la *adult:* 100000-300000 UI/zi, la *copii:* 50000-150000 UI/zi; în sd. premenstrual 150000 UI/zi, 10 zile înaintea menstruației. *Inj.:* i.m. profund, 150000-300000 UI o dată pe săptămână în deficitul de vitamină A, o dată pe lună ca trat. de întreținere, la 2-6 luni pentru profilaxie; la copiii sub 1 an: 1/2 din doza menționată.
Cind: Hipervitaminoză A.
A!: Se evită sau prudență multă în timpul sarcinii (max. 10000 UI/zi) și în IR. Formele de uz oral nu se absorb la bolnavi cu obstrucție biliară și cu insuficiență a pancreasului exocrin – se recomandă prodrog (palmitat). Absorbția poate fi micșorată când se administrează concomitent neomicină, colestiramină; contraceptivele orale pot crește concentrația plasmatică a vitaminei A.
RA: Trat. îndelungat cu doze mari (100 000 UI) provoacă anorexie, greață, cefalee, iritabilitate, uscarea și descuamarea pielii, prurit, rărirea părului, hepato-splenomegalie, tumefacția dureroasă a oaselor lungi și osteoporoză, hipertensiune intracraniană, tensiunea fontanelei.

REVIPARINUM

COD ATC: B01AB08

CLIVARIN® *ABBOTT GmbH;* Sol. inj. 1432 UI/0,25 ml sau 3436 UI/0,6 ml; ct. × 5 seringi preumplute ***(P-6L)***

Ind: Profilaxia trombozelor și tromboembolismului (inclusiv la cei cu risc mare). Trat. tromboembolismului venos. Împiedicarea coagulării în cursul hemodializei și a circulației extracorporale.
Dz: *Profilaxia tromboembolismului venos:* 1432 UI/zi, inj. sc. Prima inj. cu 2 ore înaintea operației. Durata trat.: 7-14 zile. *Profilaxia primară a trombozelor și embolismului* la pacienții cu risc crescut de tromboembolism (protezare totală de șold sau genunchi): 3436 UI. Prima inj. cu 12 ore înainte de operație și se va adm. până la mobilizarea totală a pacientului, cel puțin 14 zile. *Trat. tromboembolismului venos* (tromboză venoasă profundă și embolism pulmonar): 3436 UI, de 2 ori pe zi, 5-7 zile.
Cind: Alergie cunoscută la reviparină sodică și/sau alergii la heparină, inclusiv trombocitopenii condiționate alergic.
A!: Diateze hemoragice, endocardită bacteriană, ulcer gastric activ, gută, AVC hemoragic, chirurgie spinală sau oftalmologică, pacienți aflați sub terapie concomitentă cu alte anticoagulante sau inhibitori plachetari. Reviparina nu este interschimbabil cu heparină nefracționată și nici cu alte heparine cu masa moleculară mică. Nu se adm. i.m. (risc de hematoame). Atenție la asocieri cu: AINS, salicilați, anticoagulante orale, dextran. Sarcină și alăptare.
RA: Hemoragii, îndeosebi la nivelul pielii, plăgilor, tractului gastrointestinal și uro-genital. Rar trombocitopenie, necroze cutanate în sfera inj., creșterea transaminazelor serice, LDH și a lipazei. Rar hipersensibilitate sau reacții anafilactice. Folosirea îndelungată induce osteoporoză, mai ales la pacienții cu predispoziție. Foarte rar hipoaldosteronism asociat cu hiperapotasemie și acidoză metabolică, mai ales la pacienții cu IR și diabet zaharat. Reacții tisulare la locul inj. (indurări, înroșiri și mici hematoame).

RIBAVIRINUM

COD ATC: J05AB04

REBETOL *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Cps. 200 mg ***(P-RF)***

COPEGUS® *HOFFMANN LA ROCHE;* Cpr. film. 200 mg ***(P-RF)***

Ind: Trat. adulților cu hepatită cronică C (în asociere cu interferon), care au răspuns în prealabil la tratamentul cu interferon alfa, dar care au prezentat ulterior recădere; trat. hepatitei cronice C evidențiată histologic, netratată anterior, fără decompensare hepatică, cu valori ridicate ale ALT, cu ARN-VHC seric și care prezintă fibroză sau activitate inflamatorie marcată.
Dz: 1000-1200 mg/zi, în două prize, în timpul mesei, în asociație cu interferon alfa-2b (adm. s.c.) 3 milioane UI de 3 ori pe săptămână. Pacienții cu un clearance al creatininei < 50 ml/min nu trebuie tratați cu ribavirină. Nu se recomandă tratamentul cu ribavirină la copii și adolescenți sub 18 ani.
Cind: Hipersensibilitate la ribavirină sau la oricare dintre excipienți. Sarcină. Perioadă de alăptare. Afecțiuni cardiace severe în antecedente, cardiopatie instabilă sau necontrolată, în ultimele 6 luni. Hemoglobinopatii (de ex.: talasemie, siclemie). IRC sau clearance al creatininei < 50 ml/min. Antecedente de boală psihică severă. Disfuncție hepatică severă sau ciroză hepatică decompensată. Afecțiune tiroidiană preexistentă, dacă nu poate fi controlată prin tratament convențional. Sarcină și alăptare.
A!: Potențial teratogen și/sau embriocid semnificativ. În timpul trat. și 4 luni după oprirea acestuia femeile cu potențial fertil și partenerii trebuie să folosească mijloace contraceptive eficace. Pacienții de sex masculin ale căror partenere sunt însărcinate trebuie să folosească prezervativul pentru a minimaliza pătrunderea de ribavirină în vagin. Monitorizarea funcției cardiace, deoarece anemia asociată cu utilizarea de ribavirină poate determina deteriorarea funcției cardiace sau exacerbarea simptomelor coronariene. Atenție la pacienții cu tulburări psihice sau ale SNC, inclusiv depresie clinică; la cei cu HIV care sunt tratați cu zidovudină sau stavudină (asocierea determină o viremie HIV crescută). Ș oferi și activități de precizie.
RA: Anemie. Hemoliză asociată cu valori crescute ale acidului uric și ale bilirubinei indirecte. Tulburări psihice grave (ideație suicidală). Afectarea funcției tiroidiene.

RIBOFLAVINUM

COD ATC: A11HA04

RIBOFLAVIN FOSFAT *SICOMED SA;* Sol. inj. 7 mg/ml (f. × 2 ml); ct. × 5 f. sau 100 f. ***(S/P-RF)***

Ind: Tulburări de creștere, hemeralopie, keratite, conjunctivite, steatoree, stomatită angulară, cheiloze, glosite, seboree, acnee rozacee, crampe musculare, migrene, hipogalactie.
Dz: Doza profilactică *la adulți:* 2-10 mg/zi, iar cea terapeutică: 10-15 mg/zi. La *copiii sub 2½ ani:* 0,5-2,5 mg/zi; *2½-15 ani* 2,5-10 mg/zi (inj. i.m. profund).

RIFABUTINUM

COD ATC: J04AB04

MYCOBUTIN *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Cps. 150 mg; ct. × 2 blist. × 15 cps. ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. infecțiilor cauzate de: M. tuberculosis, M. avium intracellulare complex (MAC), precum și de alte micobacterii atipice. Profilaxia infecțiilor cu MAC

la pacienții imunodeficitari. În trat. tbc pulmonare recent diagnosticate sau cronice, multi-rezistente, cu sușe de M. tuberculosis rezistente la rifampicină.
Dz: *Monoterapie:* profilaxia infecțiilor cu MAC la pacienții imunodeficitari: 300 mg. *Terapie combinată:* infecții micobacteriene netuberculoase: 450-600 mg/zi, până la 6 luni din momentul negativării culturilor; tbc pulmonară cronică, rezistentă la antibiotice: 300-450 mg timp de până la 6 luni din momentul negativării culturilor din spută; tbc pulmonară diagnosticată recent: 150 mg, 6 luni.
Cind: Hipersensibilitate la rifabutină sau alte rifamicine. În perioada de sarcină și alăptare.
A!: Poate colora roșu-portocaliu urina, tegumentele și secrețiile. Nu se indică purtarea lentilor de contact moi. Atenție în IH sau IR severă (se scad dozele cu 50%). Verificarea periodică a numărului de leucocite și trombocite, precum și a enzimelor hepatice. În timpul tratamentului contracepția orală poate fi ineficientă, pacientele fiind sfătuite să utilizeze alte metode contraceptive.
RA: Sistem digestiv: greață, vărsături, creșterea transaminazelor hepatice, icter. Sistem sanguin și limfatic: leucopenie, trombocitopenie și anemie (mai ales la asocierea cu HIN). Aparat locomotor: artralgii și mialgii. Uneori: febră, erupții cutanate și, ocazional șoc, eozinofilie, bronhospasm.

RIFAMPICINUM *COD ATC: J04AB02*

EREMFAT 450 *FATOL ARZENEIMITTEL GmbH;* Cpr. film. 450 mg rifampicină; fl. × 100 cpr. film. ***(P-RF)***

EREMFAT 600 *FATOL ARZENEIMITTEL GmbH;* Cpr. film. 600 mg rifampicină; fl. × 100 cpr. film. ***(P-RF)***

R-CIN *LAB. LUPIN;* Susp. orală 100 mg/5 ml (fl. × 200 ml) ***(P-RF)***

RIFAMPICIN *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cps. 150 mg sau 300 mg ***(S/P-RF)***

RIFAMPICINĂ *ARENA GROUP IAȘI;* Cps. 150 mg ***(P-RF)***

RIFAMPICINĂ *EUROPHARM SA;* Cps. 150 mg sau 300 mg; ct. × 2 blist. sau 50 blist. × 10 cps. ***(S/P-RF)***

RIFAN® 150 mg *SICOMED SA;* Cps. 150 mg ***(P-RF)***

SINERDOL *SICOMED SA;* Cps. 150 mg; ct. × 2 blist. sau 10 blist. × 10 cps. ***(P-RF)***

SINERDOL® *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cps. 150 sau 300 mg ***(P-RF)***

Ind: Trat. tbc pulmonare și extrapulmonare. De elecție în boala extensivă sau cavitară, asociată cu cel puțin un antituberculos major. Infecții cu M. avium complex și M. kansasii (în asociere cu alte substanțe antimicobacteriene). Trat. leprei, forma lepromatoasă sau tuberculoidă, asociat cu un alt medicament antilepros. Infecții cu stafilococul auriu sau S. epidermidis, inclusiv germenii rezistenți la meticilină, enterococi, pneumonia cu Legionella (asociată cu eritromicina). Profilaxia meningitei meningococice, pentru sterilizarea purtătorilor asimptomatici.
Dz: Trat. tbc pulmonare active: *Regim continuu* (zilnic): Izoniazidă (300 mg/zi la adult; 10-20 mg/kg/zi la copii) + rifampicină (600 mg/zi la adult, 10-20 mg/

kg/zi la copii, fără a depăși 600 mg), 9 luni. *Regim intermitent strict supravegheat*: Schema standardizată aplicată în România (administrare bisăptămânală timp de 9 luni): Izoniazidă (15 mg/kg) + rifampicină (750 mg pentru cei cu greutatea < 60 kg, 900 mg peste 60 kg) + etambutol (40-50 mg/kg), 3 luni, apoi izoniazidă + etambutol sau streptomicină, timp de 6 luni. Alte infecții cauzate de microorganisme sensibile: 15-20 mg/kg/zi, repartizate în două prize. Se asociază cu un alt agent antibacterian pentru a preveni dezvoltarea tulpinilor rezistente. Profilaxia infecțiilor meningococice: la *adulți* 600 mg la 12 ore, 2 zile; la *copiii de peste un an:* 10 mg/kg la 12 ore, 2 zile.
Cind: Hipersensibilitate la rifampicine, porfirie, IH severă.
A!: Adm. în IH doar în caz de absolută necesitate. Tratamentul intermitent se efectuează sub strictă supraveghere medicală, datorită posibilității apariției reacțiilor imunoalergice. Sarcină și alăptare. Fiind inductor enzimatic, poate reduce eficacitatea: glucocorticoizi, sulfamide antidiabetice, anticoagulante orale, digoxină, combinațiilor estro-progestative, barbiturice, cloramfenicol (se cresc dozele). Crește hepatotoxicitatea izoniazidei. Interferă în determinările microbiologice standard ale acidul folic și vitaminei B_{12}.
RA: Hepatotoxicitatea (hepatită cu icter). Tulburări digestive (greață, vărsături, dureri abdominale, diaree), erupții alergice, prurit, febră, leucopenie, oboseală, somnolență, cefalee, confuzie. Sd. pseudogripal (mecanism imunologic). Scăderea presiunii arteriale, anemie hemolitică acută; IRA, datorată unei necroze tubulare sau unei nefrite interstițiale. S-au semnalat și cazuri de trombocitopenie cu sau fără purpură, reversibilă. Rifampicina colorează în roșu urina, sputa și saliva sau lentilele de contact.

RIFAXIMINUM

COD ATC: A07AA11

NORMIX *ALFA WASSERMANN SpA;* Cpr. film 200 mg; Pulb. susp. 2% (fl. × 60 g); Ung. 5% (tub × 30 g) ***(P-RF)***

NORMIX *CSC PHARMACEUTICALS* ***(P-RF)***

Ind: Infecții digestive, profilaxia infecțiilor în chirurgia tubului digestiv, encefalopatia hepatică.
Dz: Pe cale internă: 10-15 mg/kg/zi. Local: unguent 5%.
Cind, A!, RA: Antibiotic din grupul rifampicinei, cu efecte asemănătoare acesteia.

RILMENIDINUM

COD ATC: C02AC06

TENAXUM *LAB. SERVIER IND.;* Cpr. 1 mg rilmenidină; ct. × 2 blist. × 15 cpr. ***(P-6L)***

Ind: HTA esențiale.
Dz: 1 mg/zi, dimineața. După o lună, doza poate fi crescută la 2 mg/zi, în 2 prize (dimineața și seara), în timpul mesei. Întreruperea tratamentului prin scăderea progresivă a dozei.
Cind: Hipersensibilitate la rilmenidină sau la oricare dintre excipienți. Depresie severă. IR severă, ca o precauție în absența unor date suficiente. Copii.

A!: Pacienții cu IM sau AVC recent, necesită monitorizare medicală periodică. Nu se recomandă consumul de băuturi alcoolice sau asocierea cu IMAO. Prudență în asocierea cu antidepresivele triciclice, deoarece activitatea antihipertensivă a rilmenidinei poate fi parțial antagonizată. Sarcină și alăptare. Șoferi și activități de precizie.
RA: Astenie, palpitații, insomnie, somnolență, oboseală, gastralgii, uscăciunea gurii, diaree, erupții cutanate; în mod excepțional: senzație de rece în extremități, hTA ortostatică, tulburări sexuale, anxietate, depresie, prurit, edeme, crampe musculare, greață, constipație, bufeuri.

RILUZOLUM

COD ATC: N07XX02

RILUTEK *LAB. AVENTIS PHARMA SA;* Cpr. 50 mg riluzol; ct. × 4 blist. × 14 cpr. ***(P-RF)***

Ind: Prelungirea vieții sau a timpului până la necesitatea de ventilare mecanică la pacienții cu scleroză laterală amiotrofică. Nu s-a dovedit a fi eficace în stadiile avansate ale ALS și nici în alte boli neuromotorii.
Dz: 100 mg/zi (50 mg la 12 ore).
Cind: Hipersensibilitate la produși. Boli hepatice. Paciente gravide sau care alăptează.
A!: Siguranța și eficacitatea în orice proces neurodegenerativ la copii sau adolescenți, nu au fost stabilite.
RA: Astenia, greața și creșterea valorilor testelor funcțiilor hepatice. Ocazional, neutropenie, asociată uneori cu febră.

RISPERIDONUM

COD ATC: N05AX08

RISPOLEPT *JANSSEN PHARMACEUTICA;* Cpr. 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg risperidonă; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***; Sol. orală 1 mg/ml (fl. × 30 ml sau 100 ml) ***(P-6L)***

Ind: Trat. schizofreniei, incluzând primul episod psihotic acut, recăderile, schizofrenia cronică și alte stări. Trat. pe termen lung pentru prevenirea recăderilor în schizofrenia cronică. Trat. tulburărilor de comportament la pacienții cu demență.
Dz: Schizofrenie: *Adulți:* doza de start 2 mg/zi; doza de întreținere: 4-6 mg. *Vârstnici:* doza de start 0,5 mg, de 2 ori/zi; apoi creșteri de 0,5 mg de 2 ori/zi până la 1-2 mg de 2 ori/zi. *Boli renale și hepatice:* doza de start 0,5 mg de 2 ori pe zi; doza de menținere: 1-2 mg de 2 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la produs. Șoferi și activități de precizie. Alăptare.
A!: Precauție la pacienți cu afecțiuni cardiovasculare cunoscute (IC, IMA, tulburări de conducere, hipovolemie sau boli cerebrovasculare). În cazul în care apare hipotensiunea, trebuie luată în considerare reducerea dozei. Se recomandă precauție în administrarea risperidonei la pacienții cu boala Parkinson, epilepsie.
RA: Comune: insomnie, agitație, anxietate, cefalee. Rare: somnolență, oboseală, greutate în concentrare, constipație, dispepsie, greață/vomă, dureri abdominale, tulburări de vedere, disfuncții sexuale, incontinență urinară, rinită, rash.

Simptome extrapiramidale: tremor, rigiditate, hipersalivație, bradikinezie, akatisie, distonie acută. Ocazional, hTA ortostatică sau HTA, tahicardie reflexă, galactoree, ginecomastie, dereglări ale ciclului menstrual și amenoree, edeme, diskinezie tardivă, sindrom neuroleptic malign, dezechilibre în temperatura corporală și convulsii.

RITONAVIR

COD ATC: J05AE03

NORVIR *ABBOTT LAB. Ltd.;* Cps. 100 mg; fl. × 84 cps.; Sol orală 80 mg/ml (fl. × 90 ml sau 225 ml) ***(P-RF)***

Ind: În asociere cu analogii nucleozidici antiretrovirali în trat. pacienților infectați cu HIV-1, cu imunodeficiență severă sau progresivă.
Dz: *Adulți:* 600 mg de 2 ori/zi, cps., oral. *Copii (peste 2 ani):* 350 mg/m^2 sol. orală, de 2 ori/zi, max. 600 mg de 2 ori/zi. Pentru copiii mai mari se poate încerca adm. cps. ca doză de întreținere.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la produs. IH severă. Asocierea cu: rifabutină, amiodaronă, astemizol, bepridil, bupropionă, chinidină, cisapridă, clozapină, dihidroergotamină, encainidă, ergotamină, flecainidă, meperidină, pimozid, piroxicam, propafenonă, propoxifen, benzodiazepine, terfenadină și zolpidem. Sarcină și alăptare.
A!: Prudență la pacienții cu afectări ale funcției hepatice sau renale, pacienții cu hemofilie A și B, pacienții cu hepatită virală de tip B sau de tip C. Șoferi și activități de precizie.
RA: Tulburări digestive: greață, diaree, dispepsie, anorexie, iritație locală la nivelul gâtului, flatulență, uscăciunea gurii, ulcerații bucale. Sistem nervos: amețeală, parestezii, hiperestezie, somnolență, insomnie, anxietate. Piele: rash, prurit, transpirație. Aparat respirator: faringită, agravarea tusei. Aparat cardiovascular: vasodilatație. Sistem musculo-scheletic: mai ales în cazul asocierii cu analogi nucleozidici, valori crescute ale creatininfosfokinazei, mialgii, miozită rar, rabdomioliză. Alte reacții: hiperlipidemie, mialgii, scăderea tiroxinei libere și totale, cazuri rare de anafilaxie.

RITUXIMABUM

COD ATC: L01CX02

MABTHERA *HOFFMANN LA ROCHE;* Conc. pt. sol. perf. 10 mg/ml (fl. × 10 ml sau 50 ml) ***(S)***

Ind: Trat. limfoamelor foliculare stadiul III-IV, chimiorezistente sau care au recidivat de două sau mai multe ori după chimioterapie.
Dz: 375 mg/m^2 suprafață corporală, în perfuzie i.v. o dată pe săptămână, 4 săptămâni. Se instituie o premedicație (analgezic + antihistaminic). Viteza de perfuzie inițială 50 mg/oră; după primele 30 minute, poate fi mărită cu 50 mg/oră, la fiecare 30 minute, doza maximă 400 mg/oră. Perfuzii ulterioare: viteza inițială 100 mg/oră, apoi mărită cu 100 mg/oră, la fiecare 30 minute, doza maximă 400 mg/oră.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre componentele acestui produs sau la proteinele murine.

A!: Pacienții cu un număr mare de celule maligne circulante (> 50000 mm^3) sau cu o tumoră mare, prezintă un risc crescut de manifestare a unui sindrom sever de eliberare de citokine, de aceea vor fi tratați numai atunci când altă alternativă terapeutică a fost epuizată. Acest sindrom se caracterizează prin: dispnee marcată, bronhospasm, hipoxie și de asemenea de febră, frison, rigiditate, urticarie și angioedem. Precauție la pacienții cu insuficiență respiratorie, afecțiuni cardiace.
RA: Sindromul de eliberare de citokine (50% dintre pacienți) cu febră, frisoane și rigiditate; angioedem, greață, urticarie, astenie, cefalee, rinită, vărsături și dureri la nivelul tumorii, hTA și bronhospasm (10% din cazuri). Agravarea afecțiunilor cardiace preexistente, tulburări hematologice (trombocitopenie, neutropenie, anemie gravă).

RIVASTIGMINUM

COD ATC: N06DA03

EXELON *NOVARTIS;* Cps. 1,5 mg; 3 mg; 4,5 mg; 6 mg rivastigmină; Sol. orală 2 mg/ml (fl. × 120 ml) ***(P-RF)***

Ind: Trat. simptomatic al formelor ușoare și medii de boală Alzheimer.
Dz:. Doza inițială 1,5 mg de 2 ori/zi; după 2 săpt., poate fi crescută la 3 mg de 3 ori/zi. Doza de întreținere: 3-6 mg de 2 ori/zi; maximum 6 mg de 2 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la rivastigmină sau la alți carbamați; IH severă; copii.
A!: Precauție la pacienții cu sindrom de sinus bolnav sau tulburări de conducere cardiacă (bloc sinoatrial, ȘV), cu ulcer gastroduodenal activ sau cu predispoziție la aceste afecțiuni, la pacienții cu astm bronșic sau afecțiuni pulmonare obstructive. Nu trebuie asociat cu alte colinomimetice. Ș oferi și activități de precizie. Sarcină și alăptare.
RA: Oboseală, astenie, amețeli, greață, vărsături și somnolență; greața, pierderea apetitului, pierderea în greutate; dureri abdominale, traume accidentale, agitație, confuzie, depresie, diaree, dispepsie, insomnie, infecții ale tractului respirator superior și ale tractului urinar. Uneori: transpirație abundentă, indispoziție, tremor.

RIZATRIPTANUM

COD ATC: N02CC04

MAXALT-RPD 5 mg *MERCK SHARP & DOHME;* Liof. oral 5 mg ***(P-6L)***

MAXALT-RPD 10 mg *MERCK SHARP & DOHME;* Liof. oral 10 mg rizatriptan ***(P-6L)***

MAXALT® 10 mg *MERCK SHARP & DOHME;* Cpr. 10 mg ***(P-6L)***

MAXALT® 5 mg *MERCK SHARP & DOHME;* Cpr. 5 mg ***(P-6L)***

Ind: Trat. crizelor de migrenă, cu sau fără aură (nu în scop profilactic).
Dz: *Adulți:* 10 mg; readministrare la minim 2 ore; max. 30 mg în 24 de ore. Pacienți tratați cu propranolol: 5 mg, maxim 3 doze/zi.

Cind: Hipersensibilitate la rizatriptan sau la oricare dintre componentele produsului; asocierea cu IMAO sau adm. în interval de 2 săptămâni după întreruperea trat. cu IMAO; HTA necontrolată prin trat.; coronaropatii, inclusiv cardiopatie ischemică cronică, cardiopatie ischemică sau angină Prinzmetal. Asocierea cu sumatriptan. Migrenă bazilară sau hemiplegică.
A!: Nu trebuie utilizat pentru trat. cefaleei "atipice", care poate fi asociată cu afecțiuni potențial severe (de ex. accident vascular cerebral, ruptură de anevrism), la care vasoconstricția cerebrovasculară poate fi un factor agravant. Șoferi și activități de precizie. Precauție în HTA sau la asocierea cu inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (risc HTA și vasoconstricție coronariană).
RA: Dureri toracice sau abdominale; palpitații, tahicardie, bufeuri; greață, vomă, uscăciunea gurii, diaree, dispepsie, senzație de sete; dureri occipitale, senzație de greutate sau de tensiune locală, slăbiciune musculară; cefalee, parestezii, scăderea acuității intelectuale, insomnie, hiperestezie, tremor, ataxie, nervozitate, dezorientare; disconfort faringian, dispnee; angioedem, wheezing, urticarie, rash, necroliză toxică epidermică; disgeuzie.

ROCURONIUM BROMIDE

COD ATC: M03AC09

ESMERON® 100 mg *N.V.ORGANON;* Sol. inj. 10 mg/ml (f. × 10 ml) *(S)*

ESMERON® 250 mg *N.V.ORGANON;* Sol. inj. 10 mg/ml (f. × 25 ml) *(S)*

ESMERON® 50 mg *N.V.ORGANON;* Sol. inj. 10 mg/ml (f. × 5 ml) *(S)*

Ind: Adjuvant în anestezia generală (facilitează intubarea trahealǎ și asigură relaxarea musculaturii scheletice). Adjuvant în A.T.I. pentru a facilita intubarea și ventilația mecanică.
Dz: *Intubație trahealǎ:* 0,6 mg/kg; doza de întreținere 0,15 mg/kg. Vârstnici, pacienți cu boli hepatice și/renale: doza pentru intubație 0,6 mg/kg. *Utilizarea în secția A.T.I.:* Intubație trahealǎ: aceleași doze descrise anterior. Facilitarea ventilației mecanice: 0,6 mg/kg, după care se adm. în perfuzie 0,2-0,5 mg/kg/oră. *Pacienți supraponderali sau obezi* (cu greutatea peste 30% din greutatea ideală): dozele trebuie reduse. Rocuroniul se adm. i.v., în bolus sau în perfuzie continuă.
Cind: Antecedente de reacții anafilactice la produs. Șoferi și activități de precizie. Nou-născuți.
A!: Este esențial să se asigure o ventilație asistată, iar transmisia neuromusculară să fie monitorizată continuu. Precauție în cazul pacienților cu hipotermie, afecțiuni cardiovasculare, IRA, boli hepato-biliare, miastenia gravis, arsuri, obezi. Condiții care pot potența efectul rocuroniului: hipokaliemia, hipermagneziemia, hipocalcemia, hipoproteinemia, deshidratarea, acidoza, hipercapnia, cașexia. *Potențează efectele:* halotanului, eterului, enfluranului, isofluranului, ciclopropanului, dozelor mari de tiopenal, metohexital, ketamină, fentanil, gamahidroxibutirat, etomidat și propofol sau a altor curarizante antidepolarizante; antibiotice aminoglicozidice, doze mari de metronidazol, diuretice, tiamină, IMAO, chinidină, săruri de magneziu. *Diminuează efectele:* edrofoniului, piridostigminei, aminopiridinei, adm. cronică anterioară de glucocorticoizi, fenitoinei sau carbamazepinei, azatioprinei, teofilinei, clorurii de calciu. Sarcină și alăptare.
RA: Reacții anafilactice, dureri la injectare, mai ales în cazul când s-a folosit propofol pentru inducția anesteziei.

ROPINIROLUM

COD ATC: N04BC04

REQUIP *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. 0,25 mg; 1 mg; 2 mg; 5 mg *(P-RF)*

Ind: Tratamentul bolii Parkinson (monoterapie). Asociat cu levodopa pentru a menține sub control posibilele fluctuații și a reduce doza zilnică de levodopa.
Dz: Doza inițială 0,25 mg de 3 ori/zi; creștere săptămânală a dozei până la 3 mg/zi. Când este asociat cu L-dopa, doza de L-dopa poate fi redusă treptat cu 20%.
Cind: Hipersensibilitate la ropinirole. În cursul sarcinii și alăptării.
A!: Precauție la pacienții cu boli cardio-vasculare severe. Pacienții cu tulburări psihotice majore vor fi trat. dacă rap. posibilele avantaje/riscuri > 1. Șoferi și activități de precizie.
RA: Somnolență, edeme gambiere, durere abdominală, vomă, sincopă, dispepsie și halucinații, diskinezie, hTA, bradicardie.

ROPIVACAINUM

COD ATC: N01BB09

NAROPIN *ASTRAZENECA AB;* Sol. inj. 7,5 mg/ml (f. × 10 ml; 20 ml); Sol. inj. 2 mg/ml (f. × 10 ml; 20 ml; 100 ml; 200 ml); Sol. inj. 10 mg/ml (f. × 10 ml; 20 ml) ***(S)***

Ind: Anestezia chirurgicală: bloc peridural, inclusiv cezariană; bloc regional. Trat. acut al durerii: perfuzie peridurală continuă sau adm. în bolus, în durerea postoperatorie sau în timpul travaliului.
Dz: Anestezie chirurgicală, bloc regional: 5-30 ml sol. 7,5 mg/ml; Trat. durerii postoperatorii, analgezia în travaliu: 10-20 ml sol. 2 mg/ml.
Cind: Sensibilitate cunoscută la anestezice locale de tip amidic. Copii sub 12 ani. Șoferi și activități de precizie.
A!: Procedurile de anestezie regională vor fi efectuate exclusiv în secții dotate cu echipament corespunzător. Precauție la pacienții cu disfuncție hepatică sau renală severă, cu șV parțial sau complet, vârstnici. Sarcină și alăptare.
RA: Reacțiile alergice (uneori foarte grave), neuropatii și disfuncții ale măduvei spinării (sindrom arterial spinal anterior, arahnoidită, cauda equina), toxicitatea sistemică, convulsii, hTA, grețuri, bradicardie, vărsături, parestezii, hipertermie, retenție urinară, obnubilare, rigor, tahicardie, anxietate, hipoestezie.

ROSIGLITAZONUM

COD ATC: A10BG02

AVANDIA® 1 mg; 2 mg *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. 1 mg; 2 mg *(P-6L)*

AVANDIA® 4 mg; 8 mg *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. 4 mg; 8 mg *(P-6L)*

Ind: Numai în asociere, pentru trat. diabetului zaharat de tip 2, la pacienții la care monoterapia cu metformină sau sulfoniluree nu controlează suficient glicemia (în asociere cu metformina la pacienții cu obezitate; în asociere cu o sulfoniluree la pacienții care prezintă intoleranță la metformină sau la care metformina este Cind).

Dz: *Asociat cu metformină:* inițial 4 mg/zi; după 8 săptămâni, doza poate fi crescută la 8 mg/zi. *Asociat cu sulfoniluree:* 4 mg, 1-2 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la produs; IC sau antecedente de IC (stadii NYHA I-IV); IH, asociere cu insulina. Sarcină și alăptare.

A!: Poate provoca retenție hidrică, care poate exacerba sau declanșa IC. Prudență la pacienții cu afecțiuni hepatice, asocierea cu paclitaxel.

RA: Anemie; metabolice (hipoglicemie, hiperglicemie); cefalee; diaree, flatulență, greață, dureri abdominale, dispepsie; fatigabilitate (în asociere cu metformina). În asociere cu sulfonilureea: hipoglicemie, hiperglicemie, creșterea greutății corporale, tulburări de coagulare, hiperlipidemie.

ROSUVASTATINUM *COD ATC: C10AA07*

CRESTOR *ASTRAZENECA;* Cpr. film. 10 mg rosuvastatină, ct. × 2 blistere × 14 cpr. film.

CRESTOR *ASTRAZENECA;* Cpr. film. 20 mg rosuvastatină, ct. × 7, 14, 15, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 98, 100 cpr. film. În blist.; ct. × 1 flac. × 30 cpr. film.; ct. × 1 flac. × 100 cpr. film.

CRESTOR *ASTRAZENECA;* Cpr. film., 40 mg rosuvastatină, ct. × 7, 14, 15, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 98, 100 cpr. film. În blist.; ct. × 1 fl. × 30 cpr. film.; ct. × 1 fl. × 100 cpr. film.

Ind: Hipercolesterolemie primară (tip IIa, care include si hipercolesterolemia familială - forma heterozigotă) sau dislipidemie mixtă (tip IIb), ca adjuvant al dietei la pacienții care nu răspund adecvat numai la dietă și la alte metode de tratament non-farmacologic (cum sunt exercițiile fizice, scăderea în greutate). Hipercolesterolemie familială - forma homozigotă, ca tratament adjuvant al dietei și al altor metode de scădere a lipidemiei (de exemplu afereza LDL) sau în cazurile în care aceste tratamente nu sunt adecvate.

Dz: Tratamentul se face individualizat. Doza inițială recomandată este de 10 mg administrată oral, o dată pe zi. Doza poate fi crescută după 4 săptămâni la 20 mg. Doza de 40 mg se utilizează pentru pacienții cu hipercolesterolemie severă, care au un risc cardiovascular crescut.

Cind: Pacienți cu hipersensibilitate la rosuvastatină sau excipienții produsului, boală hepatică activă, incluzând creșterea inexplicabilă, persistentă, a transaminazelor plasmatice și orice creștere a transaminazelor plasmatice care depășește de 3 ori limita superioară a normalului; insuficiență renală severă (clearance al creatininei < 30 ml/min); miopatie; tratament concomitent cu ciclosporina. În timpul sarcinii și alăptării și la femei aflate în perioada fertilă care nu utilizează măsuri contraceptive corespunzătoare.

A!: A fost evidențiată proteinurie; se evaluează funcția renală la pacienți tratați cu doze de 40 mg. S-au raportat: mialgie necomplicată și miopatie. La doze de 80 mg a fost raportată rabdomioliza. Nu se face tratament cu rosuvastatină în cazul în care valorile CK sunt > 5 ori decât limita superioară normală. Înainte de începerea tratamentului: prudența la pacienți cu insuficiență renală, hipotiroidie, antecedente personale sau heredocolaterale de afecțiuni musculare ereditare, -antecedente de toxicitate musculară la administrarea altor inhibitori ai

HMG-CoA reductazei sau a fibraților, abuz de alcool etilic, vârstă > 70 ani. În timpul tratamentului pacienții trebuie să raporteze: durerile musculare inexplicabile, hipotonia musculară, crampele (tratamentul se întrerupe dacă conc. CK sunt > 5 ori limita superioară a normalului). Prudența la asocierea cu gemfibrozil, ciclosporină, acid nicotinic, antifungice azolice, inhibitori ai proteazelor și antibiotice macrolidice, warfarină, contraceptive orale și medicație de substituție hormonală, antiacide. Nu se utilizează la pacienți cu afecțiuni acute, sugestive, severe pentru miopatie sau cu predispoziție de a dezvolta insuficiența renală secundară rabdomiolizei (de exemplu sepsis, hipotensiune arterială, intervenție chirurgicală majoră, traumatisme, tulburări severe metabolice, endocrine și electrolitice; crize convulsive necontrolate). Atenție la conducători auto și care utilizează utilaje.

RA: Reacțiile adverse sunt clasificate în funcție de frecvență astfel: frecvente (>1/100, <1/10); mai puțin frecvente (>1/1000, <1/100); rare (>1/10000, < 1/1000). *Frecvente:* cefalee, amețeli, constipație, greață, dureri abdominale, mialgie, astenie. *Rare:* miopatie, reacții de hipersensibilitate, incluzând inclusiv angioedem. *Mai puțin frecvente:* prurit, rash, urticarie.

ROXITHROMYCINUM *COD ATC: J01FA06*

ROKSOLIT *ECZACIBASI ILAC;* Cpr. film. 150 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. film. ***(P-RF)***

RULID *LAB. ROUSSEL DIAMANT;* Cpr. disp. 50 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. disp. ***(P-RF)***

RULID 150 *LAB. ROUSSEL DIAMANT;* Cpr. film. 150 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. film. ***(P-RF)***

RULID 300 *ROUSSEL PHARMA;* Cpr. film. 300 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. film. ***(P-RF)***

Ind: Infecțiile provocate de germeni sensibili: angină (când tratamentul de elecție cu penicilină nu se poate adm.); sinuzită acută, atunci când nu se pot adm. antibiotice α-lactamice; suprainfectări ale bronșitei acute; acutizări ale bronșitei cronice; pneumopatii, fără semne severe de infecție și în absența simptomelor care să sugereze o etiologie pneumococică; infecții cutanate benigne: dermatoze de tip impetigo, ectima, erizipel, eritrasma; infecții genitale non-gonococice.

Dz: *Adulți:* 150 mg, la 12 ore (dimineața și seara), înainte de masă.

Cind: Alergie la roxitromicină sau la alte macrolide; hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului. Asocierea cu alcaloizi ergotaminici vasoconstrictori: ergotamina, dihidroergotamina; cisapridă.

A!: În IH adm. se va face numai dacă este absolut necesar; în acest caz se monitorizează funcția hepatică cu ajustarea dozei. Atenție la asocierea cu benzodiazepine, ciclosporină, teofilină. Perioada de sarcină sau alăptare. Șoferi și activități de precizie.

RA: Vărsături, epigastralgii și diaree - foarte rar sanguinolentă; vertij, cefalee, parestezii; creșteri tranzitorii ale transaminazelor, foarte rar hepatită colestatică sau citoliză hepatică; reacții de hipersensibilitate: rash, urticarie, purpură, foarte rar edem Quincke, bronhospasm, reacții anafilactoide.

S

SACCHARINUM

COD ATC: V06AAN0

ZAHARINĂ *SICOMED SA;* Cpr. 19 mg zaharină sodică ***(OTC)***

Ind: Diabetici, obezi, precum și în alte situații în care nu se recomandă ingestia de zaharuri.
Dz: Dozele acceptate pentru consumul zilnic sunt de cca 2,5 mg/kg corp până la 5 mg/kg corp. Un comprimat echivalează cu 2 bucăți de zahăr. Fiind termolabilă, se adaugă în alimente după prepararea lor termică.
Cind: Dispepsii.
RA: Tulburări gastrointestinale în urma administrării îndelungate. S-au semnalat rar reacții de hipersensibilizare și fotosensibilizare.

SALBUTAMOLUM

COD ATC: RO3AC02

SALAMOL® EASI-BRETHE *IVAX PHARMACEUTICALS;* Aerosol susp. inhal. 100 μg/ doză salbutamol (ct. × 1 fl. × 200 doze) ***(P-6L)***

SALAMOL® INHALER *IVAX PHARMACEUTICALS;* Aerosol susp. inhal. 100 μg/doză salbutamol (ct. × 1 fl. × 200 doze) ***(P-6L)***

SALBUTAMOL *GLAXO SMITHKLINE;* Aerosol. 100 μg/ doză salbutamol (fl. × 10 ml × 200 doze) ***(P-6L)***

SALBUTAMOL *E.I.P.I.C.O.;* Sirop 2 mg/5 ml salbutamol (fl. × 125 ml) ***(P-6L)***

SALBUTAMOL *MAGISTRA C & C;* Cpr. 4 mg salbutamol ***(P-6L)***

SALBUTAMOL *PHARMAPLANT BIOGALENICA SRL;* Sol. orală 0,04% (fl. × 100 ml) ***(P-6L)***

SALBUTAMOL *SOPHARMA.;* Sirop 2 mg/5 ml (fl. × 100 ml) ***(P-6L)***

SALBUTAMOL *SICOMED SA;* Cpr. 2 mg sau 4 mg salbutamol ***(P-6L)***

SALBUTAMOL T *TIS FARMACEUTIC;* Sol. orală 0,04% (fl. × 100 ml) ***(P-6L)***

VENTOLIN *GLAXO SMITHKLINE;* Aerosol 100 μg/doză (fl. × 200 doze) ***(P-6L)***

VENTOLIN *GLAXO SMITHKLINE;* Aerosol 5 mg/ml (fl. × 20 ml) ***(P-6L)***

VENTOLIN *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. 2 mg sau 4 mg salbutamol ***(P-6L)***

VENTOLIN ACCUHALER *GLAXO SMITHKLINE;* Pulb. inhal. 200 μg/doză (1 disp. inhal. × 60 doze) ***(P-6L)***

VENTOLIN® *GLAXO SMITHKLINE;* Sirop 2 mg/5 ml (fl. × 150 ml × linguriță dozatoare dublă × 2,5 ml respectiv 5 ml) ***(P-6L)***

VENTOLIN® INHALER CFC-FREE *GLAXO SMITHKLINE;* Aerosol susp. inhal. 100 µg/doză (fl. presurizat prevăzut cu valvă dozatoare × 200 doze + dispozitiv de administrare) ***(P-6L)***

Ind: *Inhalator:* trat. de urgență și de întreținere precum și profilaxia astmului bronșic, bronșitei și emfizemului. *Oral:* trat. și profilaxia crizelor de astm, bronșitei și emfizemului.
Dz: *Inhalator adulți:* bronhospasm acut și episoade intermitente de astm 1-2 inhalări în doză unică. Profilaxie sau trat. de întreținere: 2 inhalări de 3-4 ori/zi. Prevenirea bronhospasmului indus de exercițiu: 2 inhalări înainte de efort. *Copii:* bronhospasm acut, accesele astmatice episodice sau înainte de efort 1 inhalație. Trat. de întreținere sau profilaxie: 1-2 inhalații de 3-4 ori/zi. *Oral adulți:* 4-8 mg salbutamol de 3-4 ori/zi. *Copii 2-6 ani:* 2,5-5 ml sirop (1-2 mg salbutamol) de 3-4 ori/zi. *Copii 6-12 ani:* 5 ml sirop (2 mg salbutamol) de 3-4 ori/zi. *Copii peste 12 ani:* 5-10 ml sirop (2-4 mg salbutamol) de 3-4 ori/zi.
Cind: Antecedente de hipersensibilitate la oricare din componenți. Produsul inhalator nu se utilizează în trat. amenințării de naștere prematură. Trat. amenințării de avort în primul sau al doilea trimestru de sarcină.
A!: *Inhalator:* tireotoxicoză. Nu se va asocia cu beta-blocante neselective. Hipokaliemie, cu monitorizarea potasemiei. *Oral:* Trat. pe termen lung cu salbutamol sirop crește riscul cariei dentare.
RA: Tremor fin al mușchilor scheletici, mai ales mâinile. Ocazional dureri de cap, vasodilatație periferică cu creștere compensatorie a frecvenței cardiace. Reacții de hipersensibilitate (angioedem, urticarie, bronhospasm, hTA și colaps foarte rar). Crampe musculare. Agitație la copii. Tahicardie foarte rar.

SALMETEROLUM *COD ATC: RO3AC12*

SALMETER *DR. REDDY'S LAB. Ltd.;* Aerosol 25 µg/doză (fl. × 120 doze) ***(P-6L)***

SEREVENT *GLAXO SMITHKLINE;* Aerosol 25 µg/doză (fl. × 60 doze; 120 doze sau 400 doze) ***(P-6L)***

Ind: Trat. de lungă durată al obstrucției reversibile a căilor respiratorii din astmul bronșic, bronșita cronică și emfizemul pulmonar; profilaxia de lungă durată a bronhospasmului indus de efortul fizic.
Dz: *Adulți:* 2 inhal. de 2 ori/zi; maxim 4 inhal. de 2 ori/zi. *Copii peste 4 ani:* 2 inhal. de 2 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre ingredienți. Copii sub 4 ani.
A!: Salmeterol nu este un înlocuitor pentru corticosteroizii orali sau inhalanți; el trebuie folosit complementar cu ei. La pacienții cu risc trebuie monitorizat zilnic VEMS-ul. Salmeterolul nu este activ în trat. simptomelor acute ale astmului. Precauție la pacienții cu tireotoxicoză. Sarcină. Alăptare.
RA: Tremor, palpitații subiective și cefalee, tranzitorii. Uneori tahicardie. Bronhospasm paradoxal cu o creștere imediată în intensitate a wheezing-ului după adm. (este necesar un bronhodilatator inhalator cu acțiune scurtă). Rare cazuri de artralgie și reacții de hipersensibilitate (urticarie, edem și angioedem), crampe musculare, aritmii cardiace (fibrilație atrială, tahicardie supraventriculară și extrasistole).

SALMETEROLUM + FLUTICASONUM *COD ATC: R03AK06*

SERETIDE® 25/50 µg INHALER CFC FREE; SERETIDE® 25/125 µg INHALER CFC FREE; SERETIDE® 25/250 µg INHALER CFC FREE *GLAXO SMITHKLINE;* Aerosol susp. inhal. 25/50 µg, 25/125 µg și 25/250 µg ***(P-6L)***

SERETIDE DISKUS 50/100; SERETIDE DISKUS 50/250; SERETIDE DISKUS 50/500 *GLAXO SMITHKLINE;* Pulb. inhal. 50/100, 50/250, 50/500 ***(P-RF)***

Ind: Tratamentul cronic al bolii obstructive reversibile a căilor aeriene, incluzând astmul bronșic la copii și adulți, în cazurile în care este adecvată utilizarea unei asociații medicamentoase (bronhodilatator și glucocorticoid inhalator). Acestea pot include: pacienți tratați cu doze de întreținere de agoniști ß2-adrenergici cu acțiune de lungă durată și glucocorticoizi inhalatori; pacienți simptomatici în tratament curent cu glucocorticoizi inhalatori; pacienți tratați regulat cu bronhodilatatoare, care necesită glucocorticoizi inhalatori.
Dz: Inhalator. *Adulți și adolescenți peste 12 ani:* doza uzuală, 2 pufuri a 25 µg salmeterol și 50 µg propionat de fluticazonă de 2 ori pe zi; 2 pufuri a 25 µg salmeterol și 125 µg propionat de fluticazonă de 2 ori pe zi; 2 pufuri a 25 µg salmeterol și 250 µg propionat de fluticazonă de 2 ori pe zi. *Copii cu vârsta între 4-12 ani:* doza uzuală, 2 pufuri a 25 µg salmeterol și 50 µg propionat de fluticazonă de 2 ori pe zi. Nu se ajustează dozele la vârstnici, pacienți cu insuficiență renală sau hepatică.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului.
A!: Nu este eficace pentru înlăturarea simptomelor acute. Tratamentul nu se întrerupe brusc. Se administrează cu prudență la pacienții cu tireotoxicoză, tuberculoză pulmonară activă sau latentă. La doze mari, utilizate timp îndelungat pot apărea efecte sistemice ale glucocorticoidului: supresia glandei corticosuprarenale, întârzierea creșterii la copii și adolescenți, scăderea densității minerale osoase, cataractă și glaucom. La copii tratați timp îndelungat cu glucocorticoizi inhalatori, se recomandă măsurarea periodică a înălțimii. La trecerea de la tratament oral cu glucocorticosteroizi, la tratament inhalator, se monitorizează funcția corticosuprarenaliană. Interacțiuni cu: blocante beta adrenergice selective și neselective; prudență la asocierea cu inhibitori enzimatici: ketoconazol, ritonavir. în sarcină și alăptare se administrează numai dacă beneficiul terapeutic pentru mamă depășește riscul potențial pentru făt sau sugar.
RA: Produse de salmeterol: tremor, palpitații, cefalee (diminuă pe parcursul tratamentului), aritmii cardiace, reacții de hipersensibilitate: erupții, edeme și edem angioneurotic, artralgii, crampe musculare. Produse de propionat de fluticazonă: disfonie, candidoză orală și faringiană; rar: edem facial și orofaringian; bronhospasm paradoxal. Asocierea salmeterol propionat de fluticazonă: răgușeală/disfonie, iritație faringiană, cefalee, candidoză bucală și faringiană, palpitații.

SAQUINAVIRUM *COD ATC: J05AE01*

FORTOVASE *HOFFMAN LA ROCHE;* Cps. 200 mg ***(S/P-RF)***

INVIRASE® *HOFFMAN LA ROCHE;* Cps. 200 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. pacienților adulți infectați cu HIV-1 în combinație cu agenții retrovirali.
Dz: *Adulți și copii peste 16 ani:* 1200 mg de 3 ori/zi, în decurs de 2 ore după o masă.
Cind: Hipersensibilitate la substanță sau la oricare dintre celelalte componente conținute în capsulă. Nu se asociază cu terfenadină, astemizol și cisapridă (risc de aritmii cardiace serioase și/sau amenințătoare de viață). Alăptare.
A!: Saquinavirul nu determină vindecarea infecției cu HIV. Prudență în afectarea hepatică și renală. Pacienți sub 16 și peste 60 de ani. Pacienți cu hemofilie: sângerare crescută, incluzând hematoame cutanate spontane și hemartroze cu necesitatea admin. de factor VIII. Diabet zaharat și hiperglicemie: cazuri de diabet zaharat nou-debutat, hiperglicemie sau exacerbări ale unui diabet zaharat preexistent. Combinația ritornavir - saquinavir trebuie folosită cu prudență. Sarcină.
RA: Cel mai frecvent: diaree, greață, vărsături, disconfort abdominal și dispepsie, flatulență, cefalee, astenie, depresie. Mai rar: constipație, insomnie, anxietate, tulburări ale libidoului, alterarea gustului, dureri musculoscheletale și veruci; confuzie, ataxie, slăbiciune; tentativă de suicid; leucemie acută mieloblastică; anemie hemolitică; creșterea testelor funcționale hepatice, icter, ascită, trombocitopenie și hemoragie intracraniană; febră medicamentoasă; erupție cutanată buloasă, chiar sd. Stevens-Johnson, ulcerații ale mucoasei bucale și rash (erupții cutanate); poliartrită; nefrolitiază; pancreatită; obstrucție intestinală; hipertensiune portală; vasoconstricție periferică; neuropatie periferică, convulsii, reacții alergice, diabet zaharat. Anomalii semnificative ale testelor de laborator clinic: scăderea glicemiei, creșterea CPK, gama-glutamiltransferazei, ALT, AST, creșterea potasemiei și neutropenie.

SELEGILINUM

COD ATC: NO4BD01

COGNITIV® 5 mg; COGNITIV® 10 mg *EBEWE PHARMA Ges.m.b.H. Nfg. KG;* Cpr. 5 mg sau 10 mg ***(P-RF)***

JUMEX 5 mg *CHINOIN - Membru al SANOFI~SYNTHELABO GROUP;* Cpr. 5 mg selegilină ***(P-RF)***

SELECIM® 5 mg *CIMEX Ltd.;* Cpr. 5 mg ***(P-RF)***

SELEGILINE TEVA *TEVA;* Cpr. 5 mg ***(P-RF)***

SELEGOS *MEDOCHEMIE Ltd.;* Cpr. 5 mg selegilină ***(P-RF)***

Ind: Monoterapie în stadiile precoce ale parkinsonismului. Potențează și prelungește efectul levodopa. Boala Alzheimer și demența de tip Alzheimer ușoară și moderată.
Dz: Boala Parkinson, doză inițială zilnică: 5-10 mg dimineața. În boala Alzheimer și SDAT, doza zilnică inițială 5 mg dimineața, maxim 10 mg/zi.
Cind: Sindroame extrapiramidale ce nu sunt însoțite de deficiență de dopamină (tremor esențial, coree Huntington); hipersensibilitate la selegilină.
A!: În prezența bolilor asociate: ulcer gastric și duodenal, hipertensiune oscilantă, aritmii, angină pectorală severă sau psihoză. În asociație cu levodopa se recomandă control medical strict. La doze peste 20 mg, crește riscul reacțiilor hipertensive, în special în cazul consumării alimentelor bogate în tiramină (brânzeturi, vin roșu, ficat de pasăre etc.). Tulburări gastrointestinale la pacienții cu intoleranță la lactoză.

RA: Rareori, în monoterapie: uscăciunea gurii, tulburări moderate ale somnului, vedere încețoșată.

SELENIUM

COD ATC: D11AC03

SELSUN® *ABBOTT;* Susp. cutanată 2,5% (fl. × 120 ml sau 240 ml) ***(OTC)***

Ind: Pitiriazis versicolor. Dermatită seboreică a scalpului.
Dz: *Pitiriazis versicolor.* După spălarea și uscarea întregului corp se aplică pe suprafețele cutanate și se îndepărtează prin clătire cu multă apă după 15 minute. Se repetă de 2 ori pe săpt. timp de 2 săpt. *Dermatită seboreică a scalpului.* Inițial se udă scalpul cu apă caldă, apoi se aplică pe toată suprafața scalpului un volum de suspensie corespunzător la 2-3 lingurițe cu un masaj energic. După 3 minute se îndepărtează prin clătire cu multă apă, apoi se repetă operațiunile de mai sus.
Cind: Hipersensibilitate la sulfura de seleniu sau la oricare dintre componenții produsului. Aplicații pe tegumentele inflamate, cu excoriații sau fisuri. Copii sub 5 ani. Primele trei luni de sarcină și în timpul alăptării.
A!: Se evită contactul cu ochii și cu mucoasele.
RA: Iritație cutanată. Rareori, prurit și înroșirea scalpului, care necesită întreruperea trat. Alopecie, seboree reactivă (după utilizare îndelungată), decolorarea părului.

SERTACONAZOLUM

COD ATC: D01AC14

ZALAIN *GLAXO SMITHKLINE;* Cremă 2% (tub × 20 g) ***(P-RF)***

Ind: Trat. local al micozelor cutanate superficiale (Tinea pedis-piciorul de atlet, Tinea cruris-eczema Hebra, Tinea corporis-herpesul circinat, Tinea barbae-micoza bărbii și Tinea manus), candidiazelor (moniliaza) și Pityriasis versicolor (Pityrosporum orbiculare, inițial Malassezia furfur).
Dz: Se aplică de 1-2 ori/zi, zilnic (preferabil seara, sau dimineața și seara), căutând să se acopere și o arie suplimentară de aproximativ 1 cm diametru de piele aparent sănătoasă din jurul leziunii. Durata de trat.: 2-4 săpt.
Cind: Alergie la produs sau la unul din constituenți.
A!: Nu se folosește în trat. oftalmologic. Sarcină. Alăptare.

SERTRALINUM

COD ATC: N06AB06

SERLIFT *RANBAXY LAB.;* Cpr. film. 50 mg, 100 mg ***(P-RF)***

ZOLOFT 50 mg; ZOLOFT 100 mg *PFIZER H.C.P. CORPORATION;* Cpr. film. 50 mg sau 100 mg sertralină ; Sol. orală 20 mg/ml ***(P-RF)***

Ind: Simptomele tulburărilor depresive, inclusiv depresia acompaniată de anxietate, la pacienți cu sau fără manifestări maniacale în antecedente. Sindromul obsesiv-compulsiv (OCD). Atacul de panică, cu sau fără agorafobie.

Dz: O dată/zi, dimineața sau seara indiferent de orarul meselor. Depresie – 50 mg/ zi. Sindrom obsesiv-compulsiv și atac de panică – doza minimă 50 mg/ zi. Se începe cu 25 mg/zi și se crește la 50 mg/zi după o săpt. Doza zilnică pentru toate indicațiile poate fi crescută cu 50 mg în decurs de câteva săpt. Doza maximă 200 mg/zi.
Cind: Pacienți în trat. cu IMAO sau la mai puțin de 14 zile de la întreruperea trat. cu un IMAO. Hipersensibilitate cunoscută la sertralină.
A!: IMAO asociate - RA majore, uneori fatale, cum ar fi: hipertermie, rigiditate, mioclonii, instabilitate autonomică cu posibile fluctuații rapide ale semnelor vitale, modificări ale statusului mental incluzând confuzie, iritabilitate și agitație extremă, cu evoluție progresivă spre delir și comă. Precauție în asocierea cu alte medicamente serotoninergice: triptofanul sau fenfluramina. Precauție când se decide schimbarea trat. cu agenți cu acțiune prelungită (ex. fluoxetina). Activarea maniei/hipomaniei. Convulsii (se evită la pacienții cu epilepsie instabilă iar cei cu epilepsie aflată sub control vor fi monitorizați atent). Medicația se va întrerupe în caz de convulsii. Suicidul. Supraveghere atentă la începutul trat. În IH risc de creștere a nivelurilor plasmatice. Sarcină. Alăptare. Șoferi și activități de precizie.
RA: Greață, diaree/scaune moi, anorexie, dispepsie, tremor, amețeală, insomnie, somnolență, transpirații, uscăciunea mucoasei bucale și disfuncții sexuale (mai ales întârzierea ejaculării). S-au mai descris: vărsături, dureri abdominale, tulburări de motilitate (ca de exemplu simptome extrapiramidale și tulburări de mers), convulsii, tulburări menstruale, hiperprolactinemie, galactoree, rash (inclusiv cazuri rare de eritem polimorf) și, rar, pancreatită și tulburări hepatice (inclusiv hepatită, icter și insuficiență hepatică). Rareori: parestezii, hipoestezii, simptome depresive, halucinații, reacții agresive, agitație, anxietate, psihoze, creșteri asimptomatice ale transaminazelor serice (TGO și TGP), hiponatriemie, sd. de secreție inadecvată de hormon antidiuretic, alterarea funcției plachetare.

SEVELAMER

COD ATC: V03AE02

RENAGEL® *GENZYME EUROPE B.V.;* Cpr. film. 400 mg sau 800 mg; Cps. 403 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Controlul hiperfosfatemiei la pacienți hemodializati. Se adm. în trat. multiplu, cu supliment de calciu, vitamina D_3 sau un analog, pentru controlul evoluției formei osoase a bolii renale.
Dz: *Adulți:* Doza medie 800-1600 mg. Doza se stabilește în funcție de nivelul fosfatului seric (valoarea sa trebuie menținută la cel mult 1,94 mmol/l. Determinarea fosfatului seric se face la 2-3 săptămâni.
Cind: Copii sub 18 ani. Hipofosfatemie. Obstrucție intestinală.
RA: Diaree, grețuri, vome, constipație, infecții, cefalee, tuse, hTA, amețeli, dispnee, tromboze, edeme periferice, febră, prurit.

SEVOFLURANUM

COD ATC: N01AB08

SEVORANE® *ABBOTT;* Sol. inhal. 99,975% (fl. × 250 ml) ***(S)***

Ind: Inducerea și menținerea anesteziei generale, la adulți și copii.
Dz: Valorile concentrației alveolare minime (M.A.C.) ale sevofluranului scad cu vârsta și prin adăugare de protoxid de azot. *Inducția:* se realizează în asociere

cu oxigen sau cu mixturi oxigen/protoxid de azot (concentrații inspirate de până la 8% sevofluran provoacă anestezie chirurgicală în mai puțin de 2 minute la adulți și copii). *Menținerea:* anestezia necesară se menține cu 0,5-3% sevofluran, cu sau fără folosirea concomitentă de oxid azotos. *Revenirea din anestezie:* timpul de trezire este în general scurt. *Vârstnici:* MAC scade cu înaintarea în vârstă. Concentrația medie de sevofluran pentru a realiza MAC la vârsta de 80 ani este 50% din cea necesară pentru vârsta de 20 ani. *IH:* eficace și bine suportat de pacienții cu IH clasele Child-Plugh A și B. *IR:* nu provoacă o deteriorare suplimentară a funcției renale.

CInd: Hipersensibilitate la sevofluran sau la alte hidrocarburi halogenate. Hipertermie malignă genetică diagnosticată sau suspectată.

A!: Se adm. numai prin vaporizatoare specific calibrate pentru anestezic. Hipotensiunea arterială și deprimarea respirației cresc pe măsură ce anestezia devine mai profundă. Hipertermia malignă este mai frecventă la persoanele susceptibile, cu apariția de hipercapnie, rigiditate musculară, tahicardie, tahipnee, cianoză, aritmii și/sau TA instabilă. Se întrerupe adm. anestezicului și se adm. i.v. dantrolen și trat. de susținere a funcțiilor vitale. Se monitorizează diureza. Prudență în IR și în caz de HT intracraniană. Performanțele activităților care necesită vigilență și atenție pot fi reduse o anumită perioadă după anestezia generală. Sarcină. Alăptare.

RA: Deprimare cardiorespiratorie în funcție de doză. Greață și vărsături, tuse, hTA, tahicardie sau bradicardie, agitație, somnolență, frisoane, amețeli, sialoree, tulburări respiratorii, spasme laringiene, febră. Creșteri tranzitorii ale glicemiei și a numărului de leucocite. Creșterea tranzitorie a nivelului plasmatic de fluorură anorganică în timpul și după anestezia cu sevofluran. Modificări trecătoare ale testelor funcționale hepatice, rare cazuri de hepatită postoperatorie. Tulburări motorii de tip distonic cu revenire spontană la copii. Hipertermie malignă.

SIBUTRAMINUM *COD ATC: A08AA10*

REDUCTIL® 10 mg; REDUCTIL® 15 mg *KNOLL AG;* Cps. 10 mg sau 15 mg ***(P-RF)***

Ind: Trat. adjuvant în combaterea obezității, pentru: pacienți cu obezitate datorată unui dezechilibru energetic, al căror indice de masă corporală (IMC) este de 30 kg/m^2 sau mai mare sau cu IMC egal cu 27 kg/m^2 sau mai mare și la care sunt prezenți factori de risc pentru obezitate, cum sunt diabetul zaharat de tip 2 sau dislipidemia.

Dz: *Adulți:* inițial 10 mg o dată/zi, dimineața, indiferent de programul meselor, maxim 15 mg/zi. Se întrerupe la pacienții care nu au răspuns adecvat la sibutramină (au scăzut în greutate mai puțin de 2 kg în 4 săpt.). Durata trat.: maxim 1 an.

CInd: Hipersensibilitate cunoscută la sibutramină sau la oricare dintre componenții produsului; obezitate de cauză organică; dezechilibre alimentare majore (anorexia nervoasă și bulimia nervoasă în antecedente); boli psihice; sindrom Gilles de la Tourette; adm. concomitentă sau în ultimele 2 săpt. de IMAO sau alte medicamente cu acțiune centrală folosite în trat. afecțiunilor psihice (antidepresive, antipsihotice), al tulburărilor de somn (triptofan) sau pentru scăderea greutății corporale; antecedente de afecțiuni coronariene, IC con-

gestivă, tahicardie, afecțiuni ocluzive ale arterelor membrelor inferioare, aritmii sau afecțiuni cerebrovasculare (AVC sau atac ischemic tranzitor); HTA inadecvat controlată (> 145/90 mmHg); hipertiroidie; IR sau IH severă; adenom de prostată cu retenție urinară; feocromocitom; glaucom cu unghi îngust; abuz de droguri, medicamente sau de alcool etilic în antecedente; sarcină și alăptare; copii și tineri până la 18 ani; pacienți peste 65 ani.
A!: Supraveghere TA și frecvență cardiacă. Precauție în asociere cu medicamente care prelungesc intervalul QTc (astemizol, terfenadină, unele antiaritmice-amiodaronă, chinidină, flecainidă, mexiletină, propafenonă, sotalol, cisapridă, pimozidă, sertindol și antidepresive triciclice) sau la cei cu risc de prelungire a intervalului QTc (depleție de potasiu, de magneziu). Atenție în caz de simptome ca dispnee progresivă, junghi toracic și edeme ale gleznei. Prudență în epilepsie, antecedente familiale de ticuri motorii sau verbale, în IH sau IR ușoară-moderată. Se prescrie doar pacienților care nu au răspuns corespunzător la un regim adecvat de scădere în greutate (care au pierdut în greutate mai puțin de 5 kg în decurs de 3 luni). Șoferi și activități de precizie.
RA: Majoritatea în primele 4 săpt. de trat. și scad cu timpul. Aparat cardiovascular: tahicardie, extrasistole, HTA, vasodilatație; Tract gastrointestinal: anorexie, constipație, greață, agravarea hemoroizilor; SNC: uscăciunea gurii, insomnie, amețeli, parestezii, cefalee, anxietate; Piele: transpirații; Funcții senzoriale: alterarea gustului. Izolat: nefrită interstițială acută; glomerulonefrită mezangiocapilară; purpură Henoch-Schoenlein; convulsii; trombocitopenie; creșterea reversibilă a enzimelor hepatice; rareori manifestări de sevraj, sub formă de cefalee și creșterea apetitului.

SILDENAFILUM

COD ATC: G04BE03

VIAGRA *PFIZER H.C.P. CORPORATION;* Cpr. film. 25 mg, 50 mg, respectiv 100 mg sildenafil citrat ***(P-RF)***

Ind: Trat. disfuncției erectile, care reprezintă incapacitatea de a obține și/sau menține o erecție suficientă pentru un act sexual satisfăcător. Pentru ca sildenafilul să fie eficient este necesară stimularea sexuală.
Dz: *Oral la adulți:* 50 mg cu o oră înainte de activitatea sexuală, maxim 100 mg și minim 25 mg, maxim 1 dată/zi. *Vârstnici:* doza inițială 25 mg, maxim 50-100 mg. *IR:* ușoară sau moderată (Cl creatinină 30-80 ml/min) aceleași doze ca la adulți; severă (Cl creatinină < 30 ml/min) doza inițială 25 mg, maxim 50-100 mg. *IH:* Doza inițială 25 mg, maxim 50-100 mg.
Cind: Trat. concomitent cu donori de oxid de azot (nitritul de amil) sau orice formă de nitrați. Bărbați la care activitatea sexuală este contraindicată (tulburări severe cardiovasculare - angina instabilă sau IC severă). Hipersensibilitate cunoscută la oricare component din cpr. Femei. Persoane sub 18 ani.
A!: IH gravă, hTA (TA < 90/50 mmHg), antecedente recente de AVC sau infarct miocardic recent, boli ereditare degenerative, cunoscute, ale retinei (retinita pigmentară). Antecedentele medicale și examenul fizic sunt necesare în vederea stabilirii diagnosticului și a cauzelor posibile de disfuncție erectilă, precum și evaluarea stării aparatului cardiovascular al pacienților înainte de instituirea unui trat. adecvat. Precauție la pacienții cu deformații anatomice ale penisului (angulația, fibroza cavernoasă sau boala Peyronie) și la cei cu pre-

dispoziție la priapism (ca de exemplu anemia falciformă, mielom multiplu sau leucemie). Nu se asociază cu alte trat. pentru disfuncția erectilă, cu ritonavir. Prudență la tulburări de sângerare sau ulcerul peptic activ. Șoferi și activități de precizie.
RA: Cefalee, flush, amețeli, dispepsie, congestie nazală, modificări ușoare și tranzitorii ale vederii, vedere predominant nuanțată a culorilor, creșterea percepției luminii sau vedere încețoșată. Rare cazuri de priapism.

SILIBINUM

COD ATC: A05BA03

CARSIL *SOPHARMA;* Dj. 35 mg ***(P-6L)***

LAGOSA® *WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.;* Dj. 150 mg ***(P-6L)***

LEGALON 70 mg *LABORATORIES MADAUS;* Dj. 70 mg ***(P-6L)***

SILIBINUM *ARENA GROUP SA;* Cpr. 35 mg ***(P-6L)***

SILIMARINĂ *BIOFARM SA;* Cpr. 35 mg silimarină ***(P-6L)***

SILMARINĂ *AESCULAP SRL;* Cpr. 35 mg ***(P-6L)***

SILMARINĂ *FABIOL SA;* Cpr. 35 mg ***(P-6L)***

SILYMARIN INSTANT *SEDICO;* Pulb. eferv. 140 mg/plic (ct. × 10 plicuri × 4,5 g) ***(P-6L)***

SILYMARIN LFM *PHARMASOL;* Dj. 70 mg ***(P-6L)***

Ind: Hepatite cronice (inclusiv cele agresive) de etiologie virală, hepatite toxice (mai ales etilice), ciroze compensate, IH; profilactic - în timpul adm. unor substanțe potențial hepatotoxice.
Dz: Câte 140 mg de 3 ori/zi, timp de 3-6 săpt. Curele vor fi repetate după o pauză de 1-2 săpt.
Cind: Alergie la silimarină.
RA: Rareori epigastralgii, diaree, reacții alergice.

SIMETHICONUM

COD ATC: A03AX13

CEOLAT *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Cpr. mast. 80 mg ***(OTC)***

ESPUMISAN® *BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP;* Cps. 40 mg ***(OTC)***

ESPUMISAN® L *BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP;* Emulsie orală 40 mg (fl. × 30 ml sau 250 ml) ***(OTC)***

SAB SIMPLEX *PFIZER H.C.P. CORPORATION;* Susp. orală 69,19 % (fl. cu picurător × 30 ml); Cpr. mast. 80 mg; Susp. orală 69,19 % (fl. cu picurător × 30 ml sau ct. × 50 plicuri × 15 ml) ***(OTC)***

Ind: Tratament simptomatic al tulburărilor gastrointestinale determinate de acumulări de gaze (de exemplu meteorism, flatulență, aerofagie, dispepsie, sin-

drom gastrocardiac, distensie gazoasă postoperatorie). Tratament adjuvant pentru pregătirea cavității abdominale pentru radiografie, ecografie și gastroscopie. **Dz:** Tulb. gastrointestinale determinate de acumulări de gaze, inclusiv postoperator: *Adulți și copii peste 6 ani*: doza uzuală este de 80 mg simeticonă oral, de 3-5 ori pe zi. Trat. adjuvant pentru pregătirea cavității abdominale pentru radiografie, ecografie și gastroscopie: doza uzuală este de 80 mg simeticonă administrată oral de 3 ori pe zi în ziua anterioară examinării și 80 mg simeticonă în dimineața zilei în care se face examinarea. Simeticona se va administra în timpul mesei, după masă sau dacă este necesar seara înainte de culcare. Simeticona se poate administra în timpul sarcinii și alăptării.
Cind: Hipersensibilitate la simeticonă sau la excipienți.

SIMVASTATINUM *COD ATC: C10AA0*

MIVASTIN® 10 mg; MIVASTIN® 20 mg *SICOMED SA*, Cpr. film. 10 mg și 20 mg ***(P-6L)***

SIMVACARD 10 mg; SIMVACARD 20 mg; SIMVACARD 40 mg *LECIVA;* Cpr. film. 10 mg, 20 mg, 40 mg ***(P-6L)***

SIMVASTATIN 10 mg; SIMVASTATIN 20 mg *SICOMED SA;* Cpr. film. 10 mg sau 20 mg ***(P-6L)***

SIMVOR 5 mg; SIMVOR 10 mg; SIMVOR 20 mg; SIMVOR 40 mg *RANBAXY LABORATORIES Ltd.;* Cpr. film. 5 mg; 10 mg; 20 mg sau 40 mg ***(P-6L)***

VASILIP 10 mg; VASILIP 20 mg *KRKA d.d.;* Cpr. film. 10 mg sau 20 mg ***(P-6L)***

ZEPLAN® 10 mg; ZEPLAN® 20 mg *ARMEDICA SA;* Cpr. film. 10 mg sau 20 mg ***(P-6L)***

ZOCOR; *MERCK SHARP & DOHME;* Cpr. film. 10 mg, 20 mg sau 80 mg simvastatin ***(P-6L)***

ZOCOR FORTE 40 mg *MERCK SHARP & DOHME;* Cpr. film. 40 mg simvastatin ***(P-6L)***

Ind: Hipercolesterolemie: când răspunsul la dietă sau alte măsuri nefarmacologice a fost insuficient; combinată cu hipertrigliceridemie. Cardiopatie ischemică: reducerea riscului mortalității; încetinirea dezvoltării aterosclerozei coronariene, inclusiv reducerea dezvoltării de noi leziuni și noi ocluzii totale.
Dz: Dieta hipocolesterolemiantă standard se continuă în timpul trat. cu simvastatin. Hipercolesterolemie: 5-10 mg/zi seara, doză unică; maxim 40 mg/zi. Se reduce doza dacă nivelul colesterolului - LDL scade sub 75 mg/dl (1,94 mmol/l) sau dacă nivelul colesterolului total scade sub 140 mg/dl (3,6 mmol/l). Cardiopatia ischemică: doză de atac de 20 mg/zi, în priză unică, seara. IR severă (Cl creatinină sub 30 ml/min) doze sub 10 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele acestui produs. Afecțiuni hepatice active sau creșteri persistente inexplicabile ale transaminazelor serice. Sarcină și alăptare. Copii.
A!: Creșteri importante și persistente ale transaminazelor serice (de peste 3 ori limita superioară a normalului) – se întrerupe trat. Se determină testele

hepatice periodic. Precauție la cei care consumă alcool în cantități mari și/sau au prezentat afecțiuni hepatice în antecedente. Frecvent creșteri tranzitorii ale creatin-kinazei (CK) și miopatie (sub 0,1%); atenție în caz de mialgii difuze, sensibilitate sau slăbiciune musculară și/sau creșteri importante ale CK (peste 10 ori limita superioară a normalului). Se întrerupe terapia în caz de creșteri importante ale CK sau de miopatie. Risc în asocierea cu imunosupresoare, fibrați sau acid nicotinic, agenți antifungici derivați de azol. Nu dă rezultate la pacienții cu hipercolesterolemie familială homozigotă, care nu au receptori LDL funcționali.

RA: Dureri abdominale, constipație și flatulență, astenie și cefalee, miopatie; greață, dispepsie, vomă, diaree, rash, prurit, alopecie, pancreatită, vertij, crampe musculare, mialgii, parestezii, neuropatie periferică, anemie. Rareori rabdomioliză și hepatită/icter; sd. de hipersensibilitate: angioedem, sindrom lupic, polimialgii reumatice, vasculite, urticarie, fotosensibilitate, hiperemie, trombocitopenie, eozinofilie, VSH crescut, artrite, artralgii, febră, dispnee și stare generală alterată. Rar creșteri importante și persistente ale transaminazelor serice și ale nivelului creatin-kinazei (CK).

SIROLIMUS

COD ATC: L04AA10

RAPAMUNE *WYETH LEDERLE PHARMA GmbH;* Sol. orală 1 mg/ml (ct. × 30 plicuri × 1 ml, 2 ml sau 5 ml; fl. × 60 ml sau 150 ml); Cpr. film. 1 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Profilaxia rejecției de organ la pacienții adulți cu transplant renal și risc imunologic mic sau moderat.

Dz: *Adulți:* trat. inițial (2-3 luni după transplant): doză inițială 6 mg apoi 2 g/zi. Trat. de întreținere: Ciclosporina trebuie întreruptă progresiv, în decurs de 4-8 săpt. și doza de sirolimus trebuie ajustată pentru a obține o concentrație înaintea dozei următoare de 12-20 ng/ml.

Cind: Hipersensibilitate la sirolimus sau la oricare dintre excipienți. Sarcină. Alăptare.

A!: Se adm. doar oral. Pacienți cu un risc imunologic ridicat. IH severă. Imunosupresia poate determina o susceptibilitate crescută la infecție și dezvoltarea de limfoame sau alte malignități, în special la nivelul pielii. Se limitează expunerea la lumina solară și radiații UV. În primele 12 luni de la transplant, se face profilaxia pentru pneumonia cu Pneumocistis carinii și pentru virusul citomegalic (CMV). Monitorizarea lipidelor plasmatice. Supraveghere funcție renală în asociere cu ciclosporină sau cu alte medicamente nefrotoxice. Copii și adolescenți.

RA: Limfocel, infecții fungice, virale sau bacteriene (infecții micobacteriene, cu virus Epstein-Barr, cu CMV, Herpes zoster, Herples simplex; sepsis), tahicardie, dureri abdominale, diaree, stomatită, pancreatită, anemie, leucopenie, trombocitopenie, purpură trombotică trombocitopenică/sindrom uremic hemolitic, limfom, tulburări limfoproliferative post-transplant, artralgii, necroză osoasă, epistaxis, pneumonie, acnee, erupții cutanate, infecții tract urinar, pielonefrită.

SODIUM DICARBONICUM

COD ATC: B05XA02
B05ZAN1

BICARBONAT DE SODIU 8,4% *B. BRAUN MELSUNGEN;* Sol. perf. 8,4 % (fl. sticlă × 100 ml sau 250 ml) ***(S)***

GRANUDIAL ACETAT AT 11 *FRESENIUS MEDICAL CARE GmbH;* Gran. sol. hemodial. (ct. × 4 saci × 9,794 kg granule) ***(S)***

GRANUDIAL BICARBONAT BI84 *FRESENIUS MEDICAL CARE GmbH;* Gran. sol. hemodial. (ct. × 4 saci × 8,4 kg granule) ***(S)***

SOLUDIAL BICARBONATE 750 g *SOLUDIA;* Pulb. hemodial. (ct. × 12 cartușe × 750 g) ***(S)***

Ind: Acidoză metabolică, hiperkaliemie.
Dz: Dozele se stabilesc în funcție de etiologie.
Cind: Acidoza respiratorie.
A!: Adm. strict i.v. lent. Supravegherea echilibrului hidroelectrolitic și acidobazic. În caz de hipokaliemie se asociază o sare de potasiu.
RA: Alcaloză metabolică, hipokaliemie. Risc de încărcare sodică în cazul unei eliminări renale sau extrarenale insuficiente.

SODIUM HYALURONATE

COD ATC: S01KA01

BIOLON *SIFI;* Sol. inj. 10 mg/ml (seringă × 0,5 ml sau 1 ml) ***(S)***

Ind: Adjuvant în microchirurgia oftalmologică.
Dz: Adm. inj. în camera anterioară.
Cind: Hipersensibilitate.
RA: Creșterea reversibilă a tensiunii intraoculare.

SODIUM PICOSULFAT

COD ATC: A06AB08

DULCOPIC® *BOEHRINGER INGELHEIM,* Sol. orală, pic.; 100 ml sol. orală conțin picosulfat de sodiu monohidrat 0,75 g; ct. × un flac. 15 ml sol. orală

Ind: Constipație și situații care necesită evacuarea conținutului colonului.
Dz: *Adulți și copii peste 10 ani:* 10-20 picături (5-10 mg picosulfat de sodiu) la nevoie. *Copii între 4 și 10 ani:* 5-10 picături (2,5 -5 mg picosulfat de sodiu) la nevoie. *Copii sub 4 ani:* 250 µg picosulfat de sodiu/kg (1/2 picătură soluție/kg). Trebuie administrat seara, efectul apărând în dimineața următoare. *Notă:* 1 ml soluție (15 picături) conține 7,5 mg picosulfat de sodiu.
Cind: Pacienții care suferă de ileus, ocluzie intestinală, cu abdomen acut chirurgical (inclusiv apendicite), afecțiuni inflamatorii intestinale acute, în stări de deshidratare severă, colită toxică, megacolon toxic, greață și vărsături, insuficiență cardiacă congestivă, stază gastrică. Pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la picosulfat de sodiu sau la oricare dintre excipienții produsului.
A!: Nu se adm. continuu perioadă îndelungată. Precauție la pacienții cu afecțiuni renale sau cardiace, boală inflamatorie cronică a colonului, intervenții chirurgicale pe tractul gastro-intestinal. Pe parcursul tratamentului trebuie asigurat un aport optim de apă și electroliți. La copii se administrează doar la recomandarea medicului. Interacțiuni cu: diuretice și glucocorticoizi. Nu se recomandă adm. în timpul alăptării.

RA: Foarte rar, s-a raportat disconfort abdominal sau diaree. Poate determina cefalee, oboseală, greață, dureri și usturimi anale. Cazuri izolate de reacții anafilactice, vărsături și diaree severă care pot determina hiponatiemie și convulsii în absența aportului adecvat de sare.

SOMATROPINUM

COD ATC: H01AC01

GENOTROPIN 16 ui; GENOTROPIN 36 ui *PHARMACIA-Membru al grupului PFIZER;* Pulb. liof. pt. sol. inj. 16 ui sau 36 ui ***(P-RF)***

GENOTROPIN *PHARMACIA-Membru al GRUPULUI PFIZER;* Pulb. și sol. pt. sol. inj. 5,3 mg, 12 mg ***(P-RF)***

GENOTROPIN PEN 5,3; 12 *PHARMACIA-Membru al GRUPULUI PFIZER;* Dispozitiv ***(P-RF)***

NORDITROPIN *NOVO NORDISK A/S;* Pulb. pt. sol. inj. 12 ui ***(P-RF)***

NORDITROPIN PEN-SET *NOVO NORDISK A/S;* Pulb. pt. sol. inj. 12 ui ***(P-RF)***

NORDITROPIN PEN-SET *NOVO NORDISK A/S;* Liof. pt. sol. inj. 12 ui (4 mg) ***(P-RF)***

NORDITROPIN SIMPLEX × *NOVO NORDISK A/S;* Sol. inj. 3,3 mg/ml (cartuș × 1,5 ml) ***(P-6L)***

ZOMACTON *FERING;* Liof. pt. sol. inj. 4 ui sau 12 ui ***(P-RF)***

Ind: Deficit statural datorat secreției inadecvate de hormon de creștere endogen. Deficit statural la pacienți cu disgenezie gonadală.
Dz: *Deficit statural datorat secreției inadecvate de hormon de creștere:* 12 UI/mp suprafață corporală/săpt. sau 0,6 UI/kg/săpt., maxim 20 UI/mp suprafață corporală/săpt. sau 0,8 UI/kg/săpt. *Adm. i.m.* - doza/săpt. va fi divizată în 3 adm. succesive a câte 4 UI/mp suprafață corporală sau 0,2 UI/kg; *adm. s.c.:* doza/săpt. poate fi divizată în 6 sau 7 adm. succesive (2 sau 1,7 UI/mp suprafață corporală) sau în 3 adm. succesive (0,2 UI/kg). *Deficit statural datorat disgeneziei gonadale (sindrom Tuner)* 18 UI/mp suprafață corporală sau 0,6-0,7 UI/kg/săpt., cu creștere în al doilea an de trat. până la 24 UI/mp suprafață corporală sau 0,8-1,0 UI/kg/săpt. Doza/săpt. va fi divizată în 7 adm., sc. (2,6 UI/mp suprafață corporală sau 0,09-0,1 UI/kg), preferabil seara. Trat. va fi întrerupt când pacientul a atins statura unui adult sau când cartilajele de creștere s-au osificat.
Cind: Tumori cerebrale evolutive. Pacienții cu cartilaje de creștere osificate. Sarcină. Alăptare.
A!: Diabet zaharat (monitorizarea intoleranței la glucoză). Risc de apariție a hipotiroidiei (periodic teste hormonale tiroidiene). În caz de cefalee severă sau recurentă, tulburări de vedere, greață și/sau vărsături, se recomandă efectuarea examenului de fund de ochi, pentru depistarea unui eventual edem papilar (HT intracraniană) - se întrerupe trat. Locul de injectare trebuie schimbat zilnic pentru prevenirea lipodistrofiei. Alcoolul benzilic, sub formă de agent prezervant în soluție injectabilă de clorură de sodiu bacteriostatică, a fost asociat cu fenomenele de toxicitate la nou-născuți.

SORBITOLUM

COD ATC: B05BA03

SORBITOL 50 g/l *SICOMED SA;* Sol. perf. 5% (pungă × 500 ml sau 2000 ml) ***(S)***

Ind: Substrat energetico-calorigen, singur sau asociat cu soluții perfuzabile de aminoacizi, în cadrul alimentației parenterale, la bolnavi la care ingestia alimentelor nu este posibilă.
Dz: Perf. i.v., 1 g/kg și oră.

SOTALOLUM

COD ATC: C07AA07

ALS-SOTALOL *ALSIFCOM INTERMED SRL;* Cpr. 80 mg clorhidrat de sotalol; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

ALS-SOTALOL *ALSIFCOM INTERMED SRL,* Cpr. 160 mg clorhidrat de sotalol; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-6L)***

DAROB *ABBOTT GmbH & Co. KG;* Cpr. 80 mg sau 160 mg clorhidrat de sotalol ***(P-6L)***

GILUCOR, GILUCOR MITE *SOLVAY PHARMACEUTICALS GmbH;* Cpr. 80 mg (Gilucor mite) sau 160 mg (Gilucor) ***(P-6L)***

SOTAGAMMA 80; SOTAGAMMA 160 *WÖRWAG PHARMA GmbH & Co;* Cpr. de 80 mg și 160 mg clorhidrat de sotalol ***(P-6L)***

SOTALOL *SICOMED SA;* Cpr. 80 mg ***(P-6L)***

SOTALOL AL 160; SOTALOL AL 80 *ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG;* Cpr. 160 mg sau 80 mg sotalol ***(P-6L)***

Ind: Tahiaritmii simptomatice și care necesită trat.: tahicardia joncțională, tahicardia supraventriculară în cadrul sd. WPW, fibrilația atrială paroxistică. Trat. și profilaxia tahiaritmiilor ventriculare severe.
Dz: *Tahiaritmii:* 40 mg de 2-3 ori/zi, ajungând până la 3 × 160 mg, la intervale regulate, înainte de masă. *În IR:* Cl creatinină de 10-30 ml/min (creatinina serică 2-5 mg/dl) reducerea dozei la 1/2; Cl creatinină sub 10 ml/min (creatinina serică peste 5 mg/dl) reducerea dozei la 1/4. *Adm. i.v.* - inițial 20 mg în decurs de 5 minute. După 20 minute se pot adm. i.v. lent alte 20 mg (1 mg/min) după diluare dar nu mai mult de 1,5 mg/kg. În cadrul stimulării electrice programate se perf. uniform 1-1,5 mg/kg în 5 până la 15 minute, cu minim 6 ore între 2 doze.
Cind: IC (clasele NYHA a III-a și a IV-a), IC decompensată, șoc, blocuri AV de gradele II și III, bloc sinoatrial, boala nodului sinusal, bradicardie (sub 50/min), prelungire preexistentă a intervalului QT, hipopotasemie, hTA, afecțiuni circulatorii periferice avansate, boli respiratorii obstructive, acidoză metabolică, edem glotic, rinită alergică severă, sensibilitate cunoscută la sotalol sau sulfonamide.
A!: În feocromocitom se asociază cu blocanți alfa. Contraindicată adm i.v. concomitentă de blocante de calciu (verapamil sau diltiazem). La pacienții cu infarct miocardic în antecedente sau cu insuficiență ventriculară există riscul

agravării aritmiei (efect proaritmogen); monitorizarea cardiacă atentă, cu echipament necesar urgențelor cardiace. Atenție la pacienții cu antecedente patologice sau heredo-colaterale de psoriazis. Poate agrava sensibilitatea la alergeni și reacțiile anafilactice. Atenție la pacienții cu antecedente de hipersensibilitate severă și la cei care urmează trat. de desensibilizare (pentru reacții anafilactice severe). Sarcină. Alăptare. Șoferi și activități de precizie.
RA: Oboseală, vertij, amețeli, cefalee, parestezii și senzații de răceală la nivelul membrelor. Rareori: tulburări gastrointestinale, tulburări ventilatorii obstructive, reacții tegumentare, conjunctivită, tulburări de somn, agravarea IC, bradicardie, tulburări de conducere AV sau hTA. Mai pot apărea: agravarea tulburărilor circulatorii periferice, reducerea secreției lacrimale, hipoglicemie, depresie, confuzie, halucinații, uscăciunea gurii, spasme musculare sau astenie musculară și tulburări de erecție. Uneori agravarea crizelor de angină pectorală sau a aritmiilor cardiace (efect proaritmogen), până la stop cardiac. În cazuri rare, după trat. cu sotalol, au fost semnalate sincope, tulburări de vedere și keratoconjunctivită. Poate induce psoriazisul, îi poate agrava simptomele sau poate determina exantem psoriaziform.

SPARFLOXACINUM

COD ATC: J01MA09

ZAGAM *RHÔNE-POULENC RORER;* Cpr. film. 100 mg sau 200 mg ***(P-RF)***

Ind: Chinolonă antibacteriană cu spectru asem. norfloxacinei.
Dz: Inițial: 400 mg/zi oral în prima zi, apoi 200 mg/zi oral. Trat. maxim 1-2 săptămâni.
Cind: Alergii, insuf. renală severă.
A!: Prudență la copii mici (afectarea cartilajelor de creștere).
RA: Digestive, cefalee, insomnie, rar halucinații, psihoze, convulsii, prurit, fotosensibilizare.

SPARTEINUM

COD ATC: C01BA04

SULFAT DE SPARTEINĂ *BIOFARM SA;* Sol. inj. 20 mg/ml (f. × 1 ml) ***(S/P-RF)***

Ind: Tahicardie sinusală de natură vegetativă; inducerea travaliului la termen.
Dz: Inj. s.c. sau i.m., câte 40-140 mg o dată, se poate repeta după o oră, apoi 1 dată/zi; maxim 150 mg o dată și 600 mg/24 de ore.
Cind: Miocardită, IC, bloc AV, bloc de ramură complet; hipertonie sau contracții excesive ale uterului. Sarcină.
RA: Dozele mari pot provoca cefalee, amețeli, tulburări de vedere, tulburări gastrointestinale.

SPECTINOMYCINUM

COD ATC: J01XX04

KIRIN *MEDOCHEMIE Ltd.;* Pulb. pt. sol. inj. 2 g ***(S/P-RF)***

Ind: Infecțiile gonococice necomplicate (gonoreea uretrală, endocervicală, rectală) sau diseminate.

Dz: Doză unică, de 2-4 g, i.m. profund, în cadranul superoextern al mușchiului gluteal.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la spectinomicină.
A!: Adm. sa poate masca un lues în faza de incubație. Se efectuează și testele serologice pentru lues.
RA: Rar, jenă la locul injectării, urticarie, greață, frisoane, amețeală, febră, insomnie, scăderea Hb, a Ht și a Cl creatinină, creșterea fosfatazei alcaline, a azotului liber urinar și a TGP.

SPIRAMICINUM

COD ATC: J01FA02

ROVAMYCINE *RHÔNE-POULENC RORER;* Cpr. 1,5 Mui sau 3 Mui; Gran. susp. 1,5 Mui; 0,75 Mui sau 0,375 Mui ***(P-RF)***

Ind: Angine, sinuzite, rinofaringite, otite. Bronșite acute și cronice, infecții pulmonare acute. Terapia profilactică și curativă a complicațiilor respiratorii ale gripei și bolilor eruptive. Toxoplasmoza femeii gravide și fătului. Profilaxia meningitei meningococice (la contacți). Profilaxia recidivelor de RAA.
Dz: *Adulți:* 6-9 Mui de 2-3 ori/zi. *Copii și sugari:* 0,75 Mui pentru fiecare 5 kg din greutatea corporală, de 2-3 ori/zi.
Cind: Alergie la spiramicină. Alăptare.
RA: Rareori, fenomene digestive și manifestări de tip alergic.

SPIRONOLACTONUM

COD ATC: C03DA01

ALDACTONE® *HOFFMANN LA ROCHE;* Dj. 50 mg; Cps. 100 mg ***(P-6L)***; Sol. inj. 20 mg/ml (f. × 10 ml) ***(S/P-RF)***

SPIRONOLACTONĂ 25 mg *TERAPIA SA;* Cpr. film. 25 mg spironolactonă ***(P-6L)***

SPIRONOLACTONĂ 25 mg *BIO EEL SRL;* Cpr. 25 mg spironolactonă ***(P-6L)***

VEROSPIRON *GEDEON RICHTER Ltd.;* Cps. 50 mg sau 100 mg ***(P-6L)***

Ind: Retenții hidrosaline cu hiperaldosteronism secundar: edemele din IC congestivă, edemele și ascita din ciroza hepatică, sindrom nefrotic, edeme idiopatice, ascite neoplazice, HTA esențială, miastenia gravis și în diagnosticul hiperaldosteronismului primar.
Dz: *În retențiile hidrosaline cu hiperaldosteronism secundar,* 100 mg/zi 1 dj. la 6 ore), maxim 400 mg/zi. *La copii:* 3 mg/kg/zi, în doze fracționate, la 6 ore. *HTA esențială,* inițial 50-100 mg/zi, aprox. 2 săpt. până se obține efectul hipotensor dorit, apoi doză de întreținere.
Cind: IR acută, IH gravă, alterarea rapidă, progresivă a funcției renale, anurie și hiperkaliemie. Alăptare.
A!: IR cronică, acidoză, ciroză, diabet. Nu se asociază cu săruri de potasiu sau cu alte diuretice care economisesc potasiul.

RA: Hiperkaliemie, hiponatriemie, somnolență, erupții cutanate maculo-papuloase sau eritematoase, stupoare, ataxie, comă hepatică tranzitorie, ginecomastie sau efecte androgenice moderate, amenoree, greață, dureri abdominale, diaree.

SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM

COD ATC: C03DA01
C03CA01

DIUREX 100 *TERAPIA SA;* Cps. 100 mg; o capsulă conține spironolactonă 100 mg și furosemidă 20 mg; ct. × 2 blist. a 10 cps. ***(P-6L)***

DIUREX 50 *TERAPIA SA;* Cps. 50 mg; o capsulă conține spironolactonă 50 mg și furosemidă 20 mg; ct. × 3 blist. a 10 cps. ***(P-6L)***

Ind: Tratamentul edemelor rezistente (mai ales al celor asociate cu hiperaldosteronism secundar) din cadrul insuficienței cardiace congestive cronice și cirozei hepatice.

Dz: Doza zilnică recomandată este de 1-4 capsule de 50 mg. În cazurile grave se recomandă doza de 1-4 capsule de 100 mg.

Cind: Hipersensibilitate la furosemidă, spironolactonă, sulfonamide sau la oricare dintre excipienții produselor. Insuficiență renală severă (clearance al creatininei < 30 ml/minut sau creatininemia > 1,8-2 mg/100 ml) sau acută, anurie, hiperpotasiemie, encefalopatie hepatică, hipovolemie sau deshidratare, hiponatriemie, obstacol pe căile urinare, sarcină și alăptare.

A!: Asocierea va fi utilizată numai după ce eficiența fiecărui diuretic va fi verificată prin administrare separată. Monitorizarea ionogramei este necesară la începutul tratamentului și în cazurile grave. Atenționare pentru sportivi: produsele pot determina reacție pozitivă la testele de control antidoping. Interacțiuni: nu se recomandă administrarea concomitentă cu inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (IEC), triamteren, amilorid, săruri de potasiu, inhibitori ai receptorilor pentru angiotensina II, antiinflamatoare nesteroidiene, heparine, ciclosporină, tacrolimus și trimetoprim datorită riscului de hiperpotasiemie. Prudență la asocierea cu digitalice, antihipertensive, insulină, glucocorticoizi, fenitoină, baclofen, metformină, substanțe de contrast iodate, antidepresive triciclice și neuroleptice. Se evită asocierea cu medicamente care produc torsada vârfurilor (astemizol, bepridil, difemanil, eritromicină i.v., halofantrină, pentamidină, sparfloxacină, sultopridă, vincamină, amiodaronă, disopiramidă, sotalol). Prudență la pacienți cu: hipertrofie benignă de prostată, tulburări de micțiune, afecțiuni hepatice, vârstnici, diabet zaharat latent sau manifest, gută. Influențează negativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

RA: Furosemida: tratamentul prelungit însoțit de o dietă desodată strictă poate provoca dezechilibru hidroelectrolitic și acido-bazic manifestat prin: deshidratare, hiperazotemie, hiponatriemie, hipokaliemie, hipovolemie cu hipotensiune ortostatică. În prezența insuficienței hepatice, furosemida poate provoca encefalopatie hepatică. Dozele mari de furosemidă sau administrarea în ciroză, în denutriție, diaree cronică sau în insuficiența cardiacă pot provoca hipokaliemie cu sau fară alcaloză metabolică și cu posibilitatea antrenării unor tulburări de ritm grave, mai ales ventriculare. Poate crește: uricemia, glicemia, colesterolul. S-au semnalat cazuri rare de pancreatită, nefrită interstițială, erupții alergice cutanate, leucopenie, trombopenie, dureri lombare. Rar, surditate trecătoare sau definitivă. Riscul

crește când furosemida este administrată în doze mari la bolnavii cu insuficiență renală.
Spironolactona: la doze mari de spironolactonă și tratament îndelungat poate apărea ginecomastie, obișnuit reversibilă. Alte reacții adverse, obișnuit rare și reversibile sunt: impotență sexuală, tulburări menstruale, intoleranță digestivă, erupții cutanate, somnolență. Diureticul poate crește moderat potasiemia. La pacienții cu insuficiență renală, atunci când sunt asociate săruri de potasiu și la cei sub tratament cu IEC se pot produce creșteri marcate ale potasiemiei - se întrerupe administrarea spironolactonei și se corectează acest dezechilibru electrolitic. Au fost semnalate cazuri de carcinom mamar, la pacienții tratați cu spironolactonă, dar relația cauzală nu a fost stabilită. Supradozare: tulburări electrolitice grave (hiperpotasemie și hiponatremie), deshidratere (prin diureză excesivă).

STAVUDINUM

CODATC: J05AF04

ZERIT™ *BRISTOL-MYERS SQUIBB;* Pulb. susp. 1 mg/ml (fl. × 200 ml); Cps. 15 mg; 20 mg; 30 mg sau 40 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Tratamentul în HIV-infectat la adulți și copii cu imunodeficiență progresivă sau avansată.
Dz: *Adulți.* Doza inițială recomandată este de 30 mg de două ori pe zi (la fiecare 12 ore) pentru pacienți cu greutate sub 60 kg și de 40 mg de două ori pe zi pentru pacienți cu greutate peste 60 kg. *Copii peste vârsta de 3 luni.* Doza inițială recomandată este de 1 mg/kg de două ori pe zi (la fiecare 12 ore) pentru copii cu greutate sub 30 kg; pentru copii cu greutate peste 30 kg se folosesc dozele de la adult. Pentru absorbția optimă, stavudina trebuie administrată pe stomacul gol (de exemplu cu cel puțin 1 oră înainte de mese) dar, dacă aceasta nu este posibil, el poate fi luat cu o masă ușoară. Stavudina poate fi de asemenea administrată prin deschiderea prudentă a capsulei și omogenizarea conținutului cu alimente.
Cind: Hipersensibilitate la stavudină sau la unul din excipienți. Nu se asociază cu zidovudina. Sarcină și alăptare.
A!: Monitorizare atentă în caz de neuropatie periferică în antecedente sau pancreatită în antecedente.
RA: Neuropatia periferică dependentă de doză, care necesită modificarea dozei. Reacții adverse potențiale: dureri de cap, răceli/febră, disconfort, diaree, constipație, dispepsie, astenie, anorexie, greață/vomă, pneumonie, durere în piept, durere abdominală și durere în spate, mialgie, artralgie, insomnie, depresie, anxietate, sindrom de gripă, transpirație, amețeală, dispnee, reacție alergică, urticarie, prurit, neoplasme cutanate benigne, limfadenopatie și neoplasme.

STREPTOKINASUM

COD ATC: B01AD01

STREPTASE® *BEHRINGWERKE;* Liof. pt. sol. perf. 250 000 U.I., 750 000 U.I. sau 1 500 000 U.I. streptokinază ***(S)***

Ind: IMA, tromboze venoase profunde, embolism pulmonar, tromboze arteriale periferice acute/subacute, boli ocluzive arteriale cronice, ocluzia arterei sau venei centrale a retinei.

Dz: Sistemic sau local. Pentru tromboliza de durată lungă - inițial 250 000 U.I. perf. i.v. în 30 min urmată de o doză de întreținere de 100 000 U.I./oră (max. 5 zile). Pentru tromboliza de scurtă durată cu doze înalte - 1,5 mil UI/oră (timp de 1 oră în IMA și de 6 ore în ocluziile periferice).
Cind: Hemoragii interne, AVC recent, intervenții chirurgicale intracraniene sau intraspinale, neoplasm intracranian, HTA severă necontrolabilă, tulburări de coagulare necontrolabile, alergie la streptokinază în antecedente.
A!: Situații în care există risc de sângerare masiv/dificil de stăpânit: hemoragii gastrointestinale recente, puncția arterelor mari sau a altor vase necompresibile, intervenții chirurgicale recente, traumatisme severe recente; situații în care există riscul unui embolism cerebral: endocardită bacteriană subacută, defect valvular mitral, fibrilație atrială; afecțiuni cerebrovasculare, afectare hepatică/renală severă, afecțiuni pulmonare cu caverne (ex. TBC activ), pancreatită acută, diabet sever, afecțiuni trombotice, septice. Sarcină, mai ales în primele 18 săpt.
RA: Febră, frisoane, cefalee, simptomatologie gastrointestinală, exantem generalizat, dureri musculo-scheletale precoce post-adm. Reacții de tip alergic. Hemoragii: minore sau chiar hemoragii interne severe (gastrointestinale, hepatice, urogenitale, retroperitonale), hemoragii intracerebrale. În cazul apariției de hemoragii severe, trat. se va întrerupe și după caz se va adm. un inhibitor de proteinază (aprotinină). Alte reacții posibile: tulburări de ritm, aritmii de reperfuzie, creșterea tranzitorie a transaminazelor serice și a bilirubinei.

STREPTOMYCINUM *COD ATC: J01GA01*

STREPTOMICINĂ SULFAT *ANTIBIOTICE IAȘI;* Pulb. pt. sol. inj. flac. 1 g sau 5 g streptomicină sulfat ***(S)***

STREVITAL® pulb. pt. sol. inj. *ANTIBIOTICE IAȘI;* Pulb. pt. sol. inj. 1 g și 5 g

Ind: TBC (în asociație cu alte antituberculoase); septicemie și endocardite cu streptococ viridans sau enterococ; pestă.
Dz: *Adulți: în tbc* i.m. 1 g de 2 ori/săpt. (la nevoie 1 g/zi), *în alte infecții;* 1-2 g/zi (fracționat la 4-12 ore); *copii:* 20-30 mg/kg/zi.
Cind: Boli ale urechii (otită medie supurată, tulburări labirintice), miastenie gravă, alergie la streptomicină.
A!: IH, IR (în condiții de anurie, la adult, 0,5 g o dată la 4-6 zile), insuficiența circulatorie și la bătrâni.

STRONTIUM CLORIDE *COD ATC: V10BX01*

METASTRON *AMERSHAM PLC;* Sol. inj. 35 MGq/ml ***(S)***

Ind: Adjuvant și alternativă la radioterapia externă paliativă a durerii provocate de metastazele osoase secundare carcinomului de prostată în cazul eșecului terapiei hormonale.
Dz: Inj. i.v. 150 MBq (4 mCi) per injecție. La *vârstnici* 2 MBq (55 bCi)/kg. Nu se repetă înainte de 3 luni.
Cind: Afectare severă a funcției măduvei hematopoietice (neutropenie, trombocitopenie), decât dacă se consideră că beneficiul potențial al trat. depășește riscul. Trat. de primă alegere în compresiile medulare secundare metastazelor

spinale când este necesar un trat. mai rapid. Copii. Pacienți cu speranță de viață foarte scurtă.
A! Pacienții cu incontinență urinară semnificativă; pentru minimalizarea riscului contaminării radioactive, este necesară cateterizarea urinară. Monitorizare hematologică. Se poate adm. un agent citotoxic cu condiția ca parametrii hematologici să fie stabili și în limite normale, la un interval de 12 săpt. între cele două trat. Timpul necesar ameliorării durerii este de 10-20 zile după adm. de Metastron.
RA: Exacerbarea durerii în primele zile după adm. Toxicitate hematologică (trombocitopenie și leucopenie).

SUCRALFATUM

COD ATC: A02BX02

GASTROFAIT *E.I.P.I.C.O.;* Cpr. 1 g sucralfat ***(P-6L)***

SUCRALAN *LANNACHER;* Cpr. 1 g sucralfat ***(P-6L)***

SUCRAPHIL-1000 *PHILOPHARM GmbH;* Cpr. 1 g sucralfat ***(P-6L)***

VENTER *KRKA d.d.;* Granule; 1 plic conține 1 g sucralfat ***(P-6L)***

Ind: Trat. și profilaxia ulcerului gastric și duodenal.
Dz: Plicul se adm. după dizolvarea într-o jumătate pahar cu apă. Ulcer duodenal: de 2 ori câte 2 g sau de 4 ori câte 1 g/zi, pe stomacul gol. Ulcer gastric: de 4 ori câte 1 g/zi, pe stomacul gol. Durata trat.: 4-6, chiar 12 săpt. Profilaxia recidivelor de ulcer gastric sau duodenal: de 2 ori câte 1 g/zi, dimineața și seara. Trat. se poate prelungi 6-12 luni.
Cind: Hipersensibilitate la sucralfat.
A!: Înainte de începerea trat. pentru ulcer gastric, trebuie eliminată posibilitatea unei tumori maligne gastrice. Evitarea unui trat. prelungit și în doze mari în IR, mai ales la cei cu dializă, în maladia Alzheimer și în alte forme de tulburări funcționale cerebrale. Sarcină. Alăptare.
RA: Constipații ușoare și tulburări nespecifice ca: exantem, greață, vertij, uscăciunea gurii.

SULBUTIAMINUM

COD ATC: A11DA02

ENERION® *LAB. SERVIER IND.;* Dj. 200 mg ***(OTC)***

Ind: Tratament simptomatic al asteniei funcționale.
Dz: Oral 400-600 mg sulbutiamină pe zi; max. 4 săptămâni. Produs destinat exclusiv adulților.
Cind: Hipersensibilitate la sulbutiamină sau la oricare dintre excipienții produsului. Sarcină și alăptare.
RA: Reacții alergice cutanate. Rar, a fost raportată o ușoară agitație psihomotorie la vârstnici.

SULFADIAZINUM

COD ATC: D06BA01

DERMAZIN® *LEK PHARMACEUTICALS;* Cremă 1% (tub × 50 g sau borcan × 250 g) ***(P-RF)***

Ind: Trat. și profilaxia arsurilor infectate și a rănilor suprainfectate, inclusiv escare și răni adânci netratate.

Dz: După curățarea zonei, se aplică 1 dată/zi într-un strat de 2-4 mm grosime pe suprafața arsurii sau pe un tifon steril peste rană, pe o durată de la câteva zile la maxim o lună.
Cind: Copii prematuri și nou-născuți. Sarcină.
A!: Hipersensibilitate la sulfamide, insuficiență congenitală de G-6-PDH, tulburări hepatice și renale. După adm. prelungită pe suprafețe mari se va controla numărul leucocitelor. Creșterea temperaturii corporale, la copii, în primele zile de trat. nu este urmarea adm. sulfadiazinei și nu trebuie să conducă la întreruperea terapiei.
RA: În trat. prelungit pe suprafețe corporale mari, concentrația sulfonamidelor din sânge poate atinge un nivel egal cu cel al trat. sistemic.

SULFAFURAZOLUM

COD ATC: J01EB0

NEOXAZOL® *SICOMED SA;* Cpr. 500 mg sulfafurazol ***(P-RF)***

SULFAFURAZOL *ARENA GROUP SA;* Cpr. 500 mg sulfafurazol ***(P-RF)***

Ind: Infecții urinare acute cu germeni sensibili, meningită meningococică, nocardioză, trahom, limfogranulomatoză veneriană, dermatită herpetiformă, toxoplasmoză.
Dz: *Adulți:* oral, în infecții urinare inițial 2 g, apoi câte 1 g la 6 ore; în infecții sistemice inițial 3 g, apoi câte 1g la 4 ore; *copii:* inițial 50 mg/kg, apoi câte 25 mg/kg la 6 ore.
Cind: Alergie sau intoleranță la sulfamide, porfirie, IR sau IH gravă, hemopatii cu leucopenie, eritem exsudativ multiform, sarcină (primul trimestru și ultimele săpt.), nou-născuți (în prima săpt.), alăptare.
RA: Erupții cutanate, febră, cefalee, greață, vomă, diaree; rareori hepatită, colestază, pancreatită, leucopenie, trombocitopenie, agranulocitoză, anemie aplastică, nevrite, fotosensibilizare, sindrom Lyell sau Stevens-Johnson, congestie conjunctivală, purpură, hematurie, cristalurie.

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

COD ATC: J01EE01

BACTRIM *HOFFMANN LA ROCHE;* Sirop 200 mg + 40 mg 5 ml (fl. × 100 ml); Cpr. 400 mg + 80 mg ***(P-RF)***

BACTRIM FORTE *HOFFMANN LA ROCHE;* Cpr. 800 mg + 160 mg ***(P-RF)***

BERLOCID 240 *BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP;* Susp. orală 200 mg + 40 mg/5 ml (fl. × 100 ml) ***(P-RF)***

BERLOCID 960 *BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP;* Cpr. sulfametoxazol 800 mg, trimetoprim 160 mg ***(P-RF)***

BISEPTOL *POLFA;* Sol. inj. 400 mg + 80 mg/5 ml ***(S/P-RF)***

BISEPTOL *MEDANA PHARMA TERPOL GROUP;* Susp. orală 200 mg + 40 mg/5 ml (fl. × 80 ml) ***(P-RF)***

BISEPTOL 480 *POLFA;* Cpr. 400 mg + 80 mg ***(P-RF)***

BISEPTRIN *EUROPHARM SA;* Cpr. 400 mg + 80 mg ***(S/P-RF)***

BLEXON *FARAN LABORATORIES SA;* Cpr. 400 mg + 80 mg ***(P-RF)***

CO-TRIM *BIO EEL SRL;* Cpr. 400 mg + 80 mg ***(P-RF)***

CO-TRIM MITE *BIO EEL SRL;* Cpr. 200 mg + 40 mg ***(P-RF)***

EPITRIM *E.I.P.I.C.O.;* Susp. orală 200 mg + 40 mg/5 ml (fl. × 100 ml) *(P-RF)*

SEPTRIN *GLAXO SMITHKLINE;* Sol. inj. 400 mg + 80 mg/5 ml (f. × 5 ml) *(S/P-RF)*

SULOTRIM *BELUPO;* Cpr. 400 mg + 80 mg; Susp. orală 200 mg + 40 mg/5 ml (fl. × 100 ml) ***(P-RF)***

SUMETROLIM *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Cpr. 400 mg + 80 mg; Sirop 125 mg + 25 mg/5 ml (fl. × 100 ml) ***(P-RF)***

TAGREMIN *SICOMED SA;* Cpr. 400 mg + 80 mg ***(P-RF)***

TAGREMIN® 480 mg *SICOMED SA;* Cpr. 480 mg ***(P-RF)***

TAGREMIN® FORTE *SICOMED SA;* Cpr. 800 mg + 160 mg ***(P-RF)***

TRIMIDAR – M *DAR AL DAWA;* Cpr. 400 mg + 80 mg ***(P-RF)***

TRIMIDAR® M *DAR AL DAWA;* Susp. orală 200 mg + 40 mg (fl. × 100 ml) ***(P-RF)***

Ind: Infecții cauzate de germeni sensibili: infecții ale căilor respiratorii (incluzând pneumonia cu Pneumocystis carinii); infecții din sfera ORL (exceptând tonsilitele produse de streptococi betahemolitici), infecții ale căilor urinare și rinichilor incluzând și profilaxia infecțiilor recurente; infecții ale organelor genitale inclusiv prostatitele și unele boli venerice (nu este activ în sifilis); uretrită gonococică, ulcus molle, granulomatoză veneriană; infecții ale tractului digestiv: febra tifoidă, paratifoidă A și B, purtător cronic de bacil tific, shigeloze, diareea călătorilor; în bruceloze, nocardioze.
Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* 160-320 mg/zi, în 2 prize, în cazuri grave 240-480 mg/zi. Profilaxia de lungă durată a recidivei infecției urinare: adulți: 160 mg/zi, seara. *Copii sub 12 ani:* 6-8 mg/kg și zi, în 2 prize. *IR:* dozele se ajustează în funcție de clearance-ul creatininei.
Cind: Hipersensibilitate la sulfamide, trimetoprim și analogi ai trimetoprimului; eritem exsudativ multiform; trombocitopenie, granulocitopenie, anemie megaloblastică, deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază, anomalii ale hemoglobinei (Hb Köln și Hb Zürich), IR gravă; IH, hepatită acută, porfirie acută, copii sub 6 ani. Tratament cu ciclosporină. Sarcină. Șoferi și activități de precizie.
A!: Afecțiuni renale și hepatice ușoare, afecțiuni ale tiroidei, hipersensibilitate crescută la antidiabetice și diuretice sulfamidice, deficit de ac folic, cromozom X fragil la copii cu retardare psihică. Monitorizarea tabloului sanguin (în special pentru trombocite în caz de tratament prelungit). Alăptare.
RA: Tulburări gastrointestinale, glosită, gingivită și stomatită, reacții de hipersensibilitate cu purpură, fotodermatoză, eritem nodos, cefalee, artralgii. Rareori: hepatoză colestatică, hipopotasemie, tinitus, reacții de hipersensibilitate severe ca sindrom Lyell, sindrom Stevens-Johnson sau dermatită exfoliativă. Foarte rar: creșterea incidenței infecțiilor cu Candida albicans, miopie reversibilă.

SULFASALAZINUM

COD ATC: A07EC01

SALAZIDIN 500 mg *HELCOR SRL;* Cpr. film. 500 mg sulfasalazină ***(P-6L)***

SALAZOPYRIN *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Cpr. film. 500 mg sulfasalazină ***(P-6L)***

SALAZOPYRIN-EN *PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER;* Cpr. ent. 500 mg sulfasalazină ***(P-6L)***

SULFASALAZIN-EN *KRKA d.d.;* Cpr. ent. 500 mg sulfasalazină ***(P-6L)***

Ind: *Colita ulceroasă:* formă medie și moderată; terapie adjuvantă în colita ulcerativă severă. Trat. de întreținere a remisiunii colitelor ulceroase. *Boala Crohn:* forma activă, în special la pacienții cu afectare colonică.
Dz: Se admin. la intervale regulate, în timpul meselor, cu creștere progresivă în primele săpt. *Bolile inflamatorii intestinale - Atacurile acute: Adulți:* atacurile severe: 1-2 g de 3-4 ori/zi; *formele moderate și blânde:* 1 g de 3-4 ori/zi. *Copii:* 40-60 mg/kg/zi divizat în 3-6 doze. *Profilaxia recăderilor: Adulți:* 1 g de 2-3 ori /zi ca doză de întreținere. În cazul agravării, se crește la 1-2 g de câte 3-4 ori /zi. *Copii:* 20-30 mg/kg/zi divizat în 3-6 doze. *Poliartrita reumatoidă: Adulți:* 1 g de 2 ori/zi, astfel: prima săpt. 0,5 g seara; a doua săpt. 0,5 dimineața și 0,5 g seara; a treia săpt. 0,5 g dimineața și 1 g seara și a patra săpt. (și după aceasta) câte 1 g dimineața și seara. Dacă nu apare un răspuns după 2 luni, doza poate fi crescută la 3 g/zi.
Cind: Hipersensibilitate la sulfonamidă sau salicilați. Porfirie acută intermitentă. Artrita cronică juvenilă
A!: Depresie medulară și leucopenie, de obicei în primele trei luni de trat. Funcție hepatică sau renală redusă. Control regulat HLG, teste funcționale hepatice și sumar de urină. În caz de reacție toxică severă sau hipersensibilitate, se va întrerupe imediat trat. Atenție la cei cu defict de G-6-PDH - risc de anemie hemolitică. Alăptare.
RA: Greață; anorexie; creșterea temperaturii; eritem și prurit; cefalee. Reacții hematologice: anemie hemolitică, macrocitoză, depresie medulară cu leucopenie, agranulocitoză sau trombocitopenie, cianoză. Reacții gastrointestinale: tulburări gastrice și dureri abdominale, hepatită, pancreatită. Reacții SNC: amețeală și tinitus, neuropatie periferică, meningită aseptică. Reacții renale: proteinurie și hematurie. Reacții dermatologice: piele galbenă, exantem, urticarie, eritem multiform/sindrom Stevens-Johnson, dermatită exfoliativă, sindrom Lyell, fotosensibilitate. Reacții pulmonare: alveolită fibroasă cu dispnee, tuse, febră, eozinofilie. Afectarea funcțiilor genitale: oligospermie cu infertilitate.

SULODEXIDUM

CODATC:B01AB11

VESSEL DUE F *SCHIAPPARELLI;* Cps. 250 LSU; Sol. inj. 600 LSU/2 ml (f. × 2 ml) ***(P-RF)***

VESSEL DUE F capsule; VESSEL DUE F fiole *CSC PHARMACEUTICALS;* Cps.250 LSU; Sol. inj. 600 LSU ***(P-RF)***

VESSEL DUE F *ALFA WASSERMAN SpA*; Cps. 250 LSU; Sol. inj. 600 LSU/ 2 ml ***(P-RF)***

Ind: Patologia vasculară cu risc crescut de tromboză.
Dz: 1 cps. de 2 ori/zi, între mese sau 1 f./zi i.m. sau i.v. Se începe cu forma injectabilă 15-20 de zile, după care se continuă cu adm. orală timp de 30-40 de zile. Ciclul complet de trat. se repetă de cel puțin 2 ori/an.
Cind: Hipersensibilitate fată de produs, de heparină sau heparinoizi. Diateze hemoragice. Sarcină.
A!: Când este în curs de adm. și un trat. anticoagulant, parametrii coagulării trebuie monitorizați periodic.
RA: *Cps:* greață, vomă, epigastralgii. *F.:* durere, arsură sau hematom la locul de inj. Foarte rar, manifestări de sensibilizare.

SULPIRIDUM *COD ATC: N05AL01*

EGLONYL 50 mg *SANOFI~SYNTHELABO;* Cps. 50 mg ***(P-RF)***

EGLONYL 200 mg *SANOFI~SYNTHELABO;* Cpr. 200 mg ***(P-RF)***

EGLONYL 100 mg/2 ml *SANOFI~SYNTHELABO;* Sol. inj. 100 mg/2 ml (f. × 2 ml) ***(P-RF)***

Ind: Trat. de scurtă durată al stărilor de agitație și agresivitate din psihozele acute și cronice (schizofrenie și deliruri cronice non-schizofrenice).
Dz: Inj. i.m. 400-800 mg/zi, timp de 2 săpt. Oral 200-1000 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la sulpiridă sau la oricare dintre componenții produsului; feocromocitom diagnosticat sau suspectat; asociere cu medicamente antiparkinsoniene dopaminergice. *Copii.* În cazul cpr. care conțin lactoză, CI în galactozemia congenitală, sindromul de malabsorbție a glucozei sau galactozei, precum și în caz de deficit de lactază. Nu se ingeră băuturi alcoolice. Alăptare.
A!: Întreruperea trat. în caz de hipertermie (risc de sd. malign cu paloare, hipertermie, tulburări vegetative, alterări ale stării de conștiență, rigiditate musculară). Poate fi precedat de simptome de disfuncție vegetativă (transpirație și TA labilă). Prelungire dependentă de doză a intervalului QT cu risc de torsada vârfurilor favorizată de bradicardie, hipokaliemie sau de un medicament care prelungește intervalul QT. ECG pretrat. Atenție la pacienții cu boală Parkinson. În IR se micșorează dozele. Atenție sporită la: epileptici, vârstnici. Sarcină. Șoferi și activități de precizie.
RA: Tulburări neuropsihice: diskinezie precoce (torticolis spasmodic, crize oculogire, trismus); sindrom extrapiramidal: akinezie, cu sau fără hipertonie; sindrom excito-motor hiperkinetic - hiperton; acatisie; diskinezie tardivă. Tulburări endocrine și metabolice: hiperprolactinemie tranzitorie, reversibilă, cu amenoree, galactoree, ginecomastie, impotență sau frigiditate; creștere în greutate. Tulburări cardiace: prelungirea intervalului QT; rareori torsada vârfurilor. Tulburări vegetative: hTA ortostatică. Sindrom neuroleptic malign.

SULTAMICILLINUM *COD ATC: J01CR01*

AMPISID *MUSTAFA NEVZAT ILAC;* Cpr. 375 mg ***(P-RF)***

UNASYN ORAL *PFIZER H.C.P CORPORATION;* Cpr. film. 375 mg sultamicilină; Pulb. susp. orală 250 mg sultamicilină/5 ml ***(P-RF)***

Ind: Infecții ale căilor respiratorii superioare (sinuzite, otite medii și tonsilite); infecții ale căilor respiratorii inferioare (pneumonii bacteriene și bronșite); infecții ale tractului urinar și pielonefrite; infecții cutanate, ale țesuturilor moi și infecții gonococice.
Dz: *Adulți* (inclusiv *vârstnici*) și *copii de peste 30 kg:* 375-750 mg de 2 ori/zi. *Copii sub 30 kg:* 25-50 mg/kg/zi în 2 prize timp de 5-14 zile. În trat. gonoreei necomplicate, oral, doză unică de 2,25 g și teste serologice pentru sifilis. Adm. concomitentă de 1 g probenecid. La Cl creatinină 30 ml/min, adm. se face mai rar.
Cind: Reacții alergice la peniciline în antecedente. Mononucleoza infecțioasă
A!: Persoane cu antecedente de hipersensibilizare la peniciline și/sau la alergeni multipli. Risc de suprainfecții oportuniste; se întrerupe trat. și/sau se instituie terapie corespunzătoare. Verificarea funcțiilor renale, hepatice și hematopoietice. Atenție la nou-născuți. Suspensia orală reconstituită trebuie păstrată la frigider și aruncată după 14 zile. Sarcină. Alăptare.
RA: Diaree/scaune moi; greață, vărsături, disconfort abdominal și dureri/crampe abdominale. Rar enterocolite și colite pseudomembranoase; rash și prurit; somnolență/sedare, oboseală, indispoziție și cefalee.

SUMATRIPTANUM

COD ATC: N02CC01

IMIGRAN SPRAY NAZAL *GLAXO SMITHKLINE;* Aerosol nazal 20 mg/doză ***(P-6L)***

IMIGRAN® 50 mg; IMIGRAN® 100 mg; *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. 50 mg sau și cpr. 100 mg ***(P-6L)***

Ind: Calmarea rapidă a atacurilor de migrenă cu sau fără aură. Nu se va folosi profilactic.
Dz: *Migrenă: Adulți:* oral 50-100 mg. Se poate repeta în următoarele 24 de ore, maxim 300 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la orice component al preparatului. Afecțiuni vasculare periferice; semne și simptome de afecțiuni cardiace ischemice; antecedente de AVC sau atacuri ischemice tranzitorii, IH severă sau HT necontrolată, cardiopatie ischemică dureroasă, infarct miocardic în antecedente, angina Prinzmetal. Trat. migrenei hemiplegice, bazilare sau oftalmoplegice. Asocierea cu methysergide, ergotamină sau IMAO. Copii. Pacienții peste 65 de ani.
A!: Dureri și tensiune toracică. În cazul în care aceste simptome sugerează o afecțiune cardiacă ischemică se va face evaluarea pacientului. Somnolența poate fi rezultatul migrenei sau al trat. cu sumatriptan. Pacienți cu HT controlată sau IR sau IH. Sarcină. Alăptare. Șoferi și activități de precizie.
RA: Senzație de parestezie, căldură, presiune sau greutate în orice parte a corpului, eritem, amețeală și senzație de slăbiciune, oboseală și somnolență.

SUXAMETHONII CHLORIDUM

COD ATC: M03AB01

LYSTENON *NYCOMED;* Pulb. pt. sol. inj. 20 mg/ml (f. × 5 ml) ***(S)***

LYSTHENON 2% *NYCOMED;* Sol. inj. 0,1 g/5 ml ***(S)***

Ind: Medicație adjuvantă a anesteziei generale, pentru a ușura intubația traheală, ventilație mecanică. Relaxarea mușchilor scheletici în timpul intervențiilor chirurgicale, reducerii fracturilor și dislocărilor articulare, diminuarea contracțiilor în timpul terapiei prin electroșoc și tetanos.

Dz: *i.v.* 0,05 mg/kg pentru a determina răspunsul individual la începutul intervenției chirurgicale. 0,1 mg/kg produc o relaxare a mușchilor scheletici fără acțiune pe funcția respiratorie. 0,2-1 mg/kg conduc la relaxarea totală a peretelui abdominal și a mușchilor scheletici și la reducerea sau încetarea completă a respirației spontane. *i.m.* până la 2,5 mg/kg, maxim 150 mg. *Copii* (doar în urgențe): 1-2 mg/kg i.v. sau până la 2,5 mg/kg i.m. *Perf. continuă: adulți* 0,5-5 mg/min, i.v., sol. 0,1-0,2%. În tetanos, sol. 0,1% în perf. 0,1-0,3 mg/min, cu adm. simultană de O_2 hiperbaric.

Cind: Hipersensibilitate față de clorura de suxametoniu; disfuncții hepatice severe; edem pulmonar; hipertermie malignă (hiperpirexie), deficit de colinesterază, hiperkaliemie; boli neuromusculare și tulburări neurologice, rigiditate musculară; pacienți cu leziuni sau arsuri grave. Pacienți cu uremie. Sarcină. Alăptare.

A!: Afecțiuni cardiace, copii și adolescenți (doar în urgențe). Adm. numai de medici experimentați în respirație artificială și intubare orotraheală, cu acces la echipamentul pentru respirație susținută, numai după inițierea anesteziei. Atropină înainte de suxametoniu, pentru a evita bradicardia excesivă, secreția bronșică sau alte efecte de tip muscarinic. Injecțiile i.m. pot provoca o ușoară creștere inițială a tonicității musculare.

RA: În caz de supradozare sau predispoziție specială: tahicardie sau bradicardie, aritmie, fibrilație ventriculară, creșterea sau scăderea TA, creșterea tensiunii intraoculare, spasme bronșice sau laringiene, sialoree, mioglobinurie; rigiditate musculară (risc de hipertermie malignă), dureri musculare după intervenția chirurgicală. Relaxarea prelungită, cu posibilă apnee, poate fi cauzată de colinesteraza serică "atipică" sau deficiența ereditară de colinesterază serică. Scăderea temporară a colinesterazei serice apare în: boli severe ale ficatului, anemie severă, după post îndelungat, cașexie, deshidratare, stări febrile, după otrăviri acute, după expunere cronică la/sau ingerare de insecticide inhibitoare de colinesterază sau medicamente (fosfolin, demecarium, neostigmină, fizostigmină, distigmină) și adm. simultană de medicamente care intră în competiție pentru enzimă cu succinilcolina (procaină i.v.).

T

TACROLIMUS

COD ATC: L04AA05

PROGRAF® *FUJISAWA GmbH;* Conc. pt. sol. perf. 5 mg/ml (f. x 1 ml) ***(S)***

PROGRAF® 1 mg; PROGRAF® 5 mg *FUJISAWA GmbH;* Cps. 1 mg sau 5 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Imunosupresie primară la pacienții cu alogrefă hepatică și renală; reacție de rejet la pacienții cu alogrefă hepatică și renală rezistentă la regimurile imunosupresive convenționale.

Dz: *Transplant hepatic: doza inițială i.v.:* la cca. 6 ore după terminarea intervenției chirurgicale, 0,01-0,05 mg/kg și zi, în perfuzie continuă. Totuși, doza se adaptează individual. Nu se adm. nediluat. Adm. orală este de preferat

ulterior. Conținutul capsulei poate fi adm. prin sonda nazogastrică. *Oral:* 0,1-0,2 mg/kg și zi, în două prize. *Transplant renal: oral:* 0,15-0,4 mg/kg și zi, în două prize. *Copii:* Doze de 1,5-2 ori mai mari decat la adulți. Terapia de întreținere se stabilește individual.
Cind: Hipersensibilitate la tacrolimus, la alte macrolide sau la excipienții produsului (ulei de ricin polietoxilat). Sarcină și alăptare.
A!: Nu se adm. simultan cu ciclosporina A. Atenție la asocierea cu medicamente nefrotoxice sau hepatotoxice (aminoglicozide, inhibitori ai girazei, vancomicină, cotrimoxazol, AINS, ganciclovir, aciclovir). Risc crescut de infecții (virale, bacteriene, fungice sau parazitare).
RA: Frecvente: HTA, diaree, greață și/sau vărsături, alterarea funcției renale (creșterea conc. creatininei), hiperglicemie, hiperpotasemie, diabet zaharat, tremor, cefalee, insomnie, dureri localizate (artralgii), reacții alergice și anafilactice.

TADALAFILUM

COD ATC: G04BE08

CIALIS® *ELI LILLY;* Cpr. film. 10 mg sau 20 mg ***(P-RF)***

Ind: Tratamentul disfuncției erectile.
Dz: Oral 10 mg cu 30 min-12 ore înaintea activității sexuale. Eficacitatea poate persista 24 ore de la administrare. Dacă doza de 10 mg nu produce un efect adecvat atunci se poate încerca doza de 20 mg. Produsul se adm. maxim o dată pe zi. IR și IH: doza recomandată este de 10 mg. Nu sunt necesare ajustări ale dozei la diabetici.
Cind: Boli cardiovasculare preexistente, tratament cu nitrați (le crește efectul hipotensor). Hipersensibilitate la substanța activă sau excipienții produsului. Persoane sub 18 ani: nu este recomandată utilizarea de către femei.
A!: Nu este recomandată utilizarea zilnică.
RA: Cefalee, dispepsie, amețeli, hiperemie, congestie nazală, dureri lombare, mialgii.

TALINOLOLUM

COD ATC: C07AB13

CORDANUM *AWD PHARMA GmbH & Co. KG;* Dj. 100 mg sau 50 mg ***(P-6L)***

Ind: Beta-blocant selectiv; antihipertensiv.
Dz: Oral 50-100 mg de 1-2 ori pe zi.

TAMOXIFENUM

COD ATC: L02BA01

NOLVADEX *ASTRAZENECA;* Cpr. 10 mg ***(S/P-6L)***
TAMONEPRIN *SINDAN SRL;* Cpr. 10 mg ***(S/P-6L)***
TAMOXIFEN *HEXAL AG;* Cpr. 10 mg ***(S/P-6L)***
ZITAZONIUM *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Cpr. 10 mg ***(S/P-6L)***

Ind: Trat. cancerului mamar.
Dz: *Adulți* (inclusiv *vârstnici*): 20-40 mg/zi, int., în două prize/zi, sau în priză unică.
Cind: Sarcină.
A!: Poate suprima menstruația la femei la premenopauză. Precauție cînd se asociază cu anticoagulante de tip cumarinic sau cu agenți citotoxici. Orice pacientă care raportează sângerare vaginală anormală trebuie investigată prompt. În perioada de lactație.
RA: Valuri de căldură, metroragii, secreție vaginală și prurit vulvar, intoleranță gastrointestinală, mărirea formațiunilor tumorale, amețeli, reacții cutanate eritematoase și, ocazional, retenție lichidiană, alopecie, hipercalcemie, tulburări ale vederii, incluzând alterări corneene, cataractă și retinopatie, fibrom uterin, creșterea volumului chisturilor ovariene, leucopenie, anemie, trombocitopenie, neutropenie, accidente tromboembolice, modificări ale nivelului enzimelor hepatice, rareori anomalii hepatice cum ar fi degenerescență grasă hepatică, colestază și hepatită.

TAMSULOSINUM *COD ATC: G04CA02*

OMNIC *YAMANOUCHI EUROPE BV;* Cps. ced. mod. 0,4 mg tamsulosin *(P-6L)*

Ind: Trat. simptomelor funcționale ale hiperplaziei benigne de prostată (HBP).
Dz: Int. 0,4 mg/zi, după micul dejun.
Cind: Hipersensibilitate la oricare component al produsului. hTA ortostatică. IH severă.
A!: În timpul trat. se poate instala hTA, cu apariția sincopelor. La primele semne de hTA ortostatică, pacientul se va așeza sau se va culca până la dispariția simptomelor. Tușeul rectal și determinarea Antigenului Specific al Prostatei (PSA) trebuie făcute înainte de inițierea trat. și, ulterior, la intervale regulate. Precauție în cazul pacienților cu IR. Precauție în cazul asocierii cu: cimetidină, furosemid, diclofenac, warfarină, alți alfa1-blocanți. Precauție la șoferi și persoane cu activități de precizie.
RA: Amețeli, ejaculare retrogradă, cefalee, astenie, hTA ortostatică, palpitații, greață, vărsături, diaree sau constipație, reacții de hipersensibilitate (rash, prurit, urticarie), angioedem, sincope.

TEICOPLANINUM *COD ATC: J01XA02*

TARGOCID *AVENTIS PHARMA Ltd.;* Pulb. pt. sol. inj. 200 mg sau 400 mg *(P-RF)*

Ind: Infecții potențial severe cu germeni gram-pozitivi; în cazurile în care penicilinele și cefalosporinele nu sunt eficiente.
Dz: Adm. i.m. sau i.v. în bolus 30 minute. Se recomandă 1-2 administrari pe zi în funcție de gravitate. În endocardite și osteomielite se recomandă ca tratamentul să dureze minim 3 săptămâni. Profilactic 400 mg în doză unică, înaintea intervenției chirurgicale. *Copii peste 12 ani:* 10 mg/kg corp la 12 ore

(primele 3 doze) apoi 10 mg/kg corp pe zi i.v. sau i.m. în doză unică. *Nou-născuți:* doza de atac 16 mg/kg corp în prima zi, apoi doza de întreținere 8 mg/kg corp o dată pe zi. IR: nu este necesară ajustarea dozelor în primele 4 zile de tratament. La un clearance de 40-60 ml/min doza se va reduce la jumătate.
Cind: Hipersensibilitate în antecedente la substanță activă. Sarcină și alăptare.
A!: Teicoplaninul nu se elimină prin dializă. Hipersensibilitate încrucișată cu vancomicină. Testarea funcției renale și hepatice în cursul tratamentului.
RA: Locale: eritem, durere, tromboflebită, abces; hipersensibilitate (rash, prurit, febră, bronhospasm, reacții anafilactice, șoc anafilactic, contractură, urticarie, angioedem); digestive (greață, varsături, diaree); sânge: eozinofilie, leucopenie, trombocitopenie, trombocitoză, neutropenie; sistem nervos: amețeli, cefalee.

TELITRAMICINUM

COD ATC: J01BA01

KETEK *LAB. AVENTIS PHARMA;* Cpr. film. 400 mg telitramicină ***(P-RF)***

Ind: Trat. următoarelor infecții, la pacienți peste 18 ani: pneumonii comunitare, ușoare sau moderate, acutizări ale bronșitelor cronice, sinuzite acute, tonsilite/faringite provocate de Streptococci beta de grup A. La pacienți între 12 și 18 ani: Tonsilite/faringite provocate de Streptococci beta de grup A.
Dz: Int. 800 mg o dată/zi.
Cind: Hipersensibilitate la telitramicină, la oricare alți agenți antibacterieni din clasa macrolidelor, sau la oricare dintre excipienți. Adm. concomitentă cu: cisapridă, derivați ai alcaloizilor ergotaminici, pimozidă, astemizol, terfenadină, simvastatină, atorvastatină, lovastatină. Antecedente personale sau familiale de sd. QT prelungit și la pacienții cu sindrom QT prelungit dobândit. Pacienții cu intoleranță congenitală la galactoză, deficiență de lactază Lapp sau malabsorbție la glucoză-galactoză. Alăptare.
A!: Prudență la pacienții cu boală coronariană, cu antecedente de aritmii ventriculare, cu hipokaliemie și/sau hipomagneziemie necorectate, cu bradicardie (< 50 bătăi/min) sau în timpul adm. concomitente cu agenți care prelungesc intervalul QT sau cu inhibitori puternici ai CYP 3A4 (rifampicina, fenitoina, carbamazepina, extractul de sunătoare). Diareea, mai ales cea severă, persistentă și/sau sanguinolentă, apărută în timpul trat. poate fi produsă de colita pseudomembranoasă. Prudență la pacienții cu IH. Prudență atunci când agentul patogen suspectat este S. aureus și când există probabilitatea rezistenței la eritromicină. Prudență în cazul asocierii cu: derivați ai alcaloizilor ergotaminici, statine, benzodiazepine, ciclosporină, tacrolimus, sirolimus, digoxină, teofilină, warfarină, itraconazol, ketoconazol, ritornavir. Prudență la femei însărcinate; la șoferi și activități de precizie.
RA: Tulburări gastrointestinale: diaree, greață, vărsături, dureri gastrointestinale, flatulență, constipație, anorexie, moniliază orală, stomatită. Tulburări hepatobiliare: Creșterea enzimelor hepatice (AST, ALT, fosfataza alcalină), icter colestatic. Tulburări ale sistemului nervos: amețeli, cefalee, somnolență, insomnie, nervozitate, parestezii. Tulburări ale sângelui și sistemului limfatic: eozinofilie. Tulburări ale ochilor și organelor senzoriale: tulburări ale gustului, vedere încețoșată. Tulburări ale aparatului reproducător: moniliaza vaginală. Tulburări cutanate: rash, urticarie, prurit, eczeme. Tulburări cardiovasculare: înroșirea feței, palpitații, aritmii atriale, hTA, bradicardie. Următoarele RA au fost semnalate izolat: colita pseudomembranoasă, hepatita, eritemul multiform, parosmia, edemul facial, crampele musculare.

TELMISARTANUM *COD ATC: C09CA07*

MICARDIS *BOEHRINGER INGELHEIM;* Cpr. 20 mg; 40 mg sau 80 mg ***(P-6L)***

PRITOR *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. 20 mg, 40 mg, 80 mg ***(S/P-6L)***

Ind: HTA esențială.
Dz: *Adulți:* 20-80 mg o dată, zilnic. La pacienții cu afectare hepatică ușoară-moderată doza nu trebuie să depășească 40 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți; sarcină și alăptare; afecțiuni biliare obstructive; afectare hepatică severă; afectare renală severă.
A!: Atenție în caz de: hipertensiune renovasculară; afecțiuni renale și transplant renal; depleția volumului intravascular; alte situații asociate cu stimularea sistemului renină-angiotensină-aldosteron; hiperaldosteronism primar; stenoza aortică și mitrală, cardiomiopatie hipertrofică obstructivă; hiperpotasemie; afectare hepatică ușoară până la moderată; ulcer gastric sau duodenal activ, alte afecțiuni gastrointestinale; pacienții cu intoleranță ereditară la fructoză; antagoniștii angiotensinei sunt mai puțin eficace ca antihipertensive la populația neagră; reducerea excesivă a presiunii sanguine la pacienții cu cardiopatie ischemică sau ateroscleroză avansată poate provoca IM sau accident vascular cerebral. Precauție în cazul asocierii cu digoxină sau cu litiu. Precauție la șoferi și persoane cu activități de precizie.
RA: Cefalee, infecții ale tractului respirator superior, amețeli, durere, durere de spate, fatigabilitate, diaree, sinuzită, simptome de tip gripal, dispepsie, mialgie, tuse, durere toracică, infecția tractului urinar, greață, faringită, durere abdominală, bronșită, insomnie, artralgie, anxietate, depresie, palpitații, crampe musculare (la extremitățile inferioare), rash, angioedem, scăderea hemoglobinei sau creșterea acidului uric, creșterea creatininei sau a enzimelor hepatice.

TEMOZOLOMIDUM *COD ATC: L01AX03*

TEMODAL *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Cps. 5 mg, 20 mg, 100 mg sau 250 mg temozolomidă ***(S/P-RF)***

Ind: Gliom malign (glioblastom multiform sau astrocitom anaplazic care prezintă recurentă sau progresie după adm. terapiei standard).
Dz: *Oral. Adulți.* Pacienți care nu au fost trat. anterior cu chimioterapie: 200 mg/m^2, o dată/zi, timp de 5 zile, repetându-se în cicluri de 28 de zile. Pacienți care au primit anterior chimioterapie: inițial, 150 mg/m^2, o dată/zi, crescut la 200 mg/m^2/zi în cel de-al doilea ciclu. *Copii în vârstă de 3 ani sau mai mari:* 200 mg/m^2, o dată/zi, timp de 5 zile, repetându-se în cicluri a 28 de zile. Pacienților copii care au primit anterior chimioterapie, li se va adm. o doză inițială de 150 mg/m^2, o dată/zi, timp de 5 zile, urmând ca doza să fie crescută la 200 mg/m^2, o dată/zi, în cursul ciclului următor, dacă nu apar manifestări toxice hematologice.
Cind: Hipersensibilitate la componenții produsului sau la dacarbazină. La pacienți cu mielosupresie severă; la femei gravide sau care alăptează.
A!: Înaintea fiecărui ciclu de trat., valoarea parametrilor de laborator trebuie să fie după cum urmează: număr absolut de neutrofile > 1,5 × 10^9/l și număr

de trombocite > 100 × 10^9/l. În ziua a 22-a trebuie să se efectueze o numărătoare completă a celulelor sanguine (la 21 zile de la prima doză) sau în decursul următoarelor 48 de ore după ziua 21, apoi săptămânal, până în momentul în care NAN depășește 1,5 × 10^9/l, iar numărul de trombocite depășește 100 × 10^9/l. Dacă NAN scade sub 1,0 × 10^9/l sau numărul de trombocite este < 50 × 10^9/l, în cursul oricăruia dintre ciclurile terapeutice, în următorul ciclu doza se va reduce cu un nivel. Nivelurile dozelor sunt 100 mg/m^2, 150 mg/m^2 și 200 mg/m^2. Doza minimă recomandată este de 100 mg/m^2. Nu există experiență clinică privind utilizarea la copii cu vârste sub 3 ani. Precauție la pacienții vârstnici (> 70 ani). Pacienții vor fi sfătuiți să utilizeze metode contraceptive în cursul trat. și până la 6 luni de la încheierea acestuia. Prudență în cazul asocierii cu acid valproic și cu alte mielosupresoare. Nu se va adm. concomitent cu alimentele. Prudență la șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Grețuri, vărsături, constipație, diaree, anorexie, rash, febră, oboseală, somnolență, cefalee, astenie, algii (dureri abdominale), amețeli, scădere în greutate, dispnee, dispepsie, alopecie, rigiditate, prurit, stare de rău, pervertirea gustului, parestezii, trombocitopenie și neutropenie (gradele 3-4).

TENECTEPLASUM *COD ATC: B01AD11*

METALYSE® 6000 U, METALYSE® 8000 U, METALYSE® 10000 U *BOEHRINGER INGELHEIM;* Pulb. + Solv. pt. sol. inj. 30 mg (pt. 6000 U), 40 mg (pt. 8000 U), 50 mg (pt. 10000 U) ***(S/P-RF)***

Ind: Tratamentul trombombolitic al infarctului miocardic acut (IMA).

Dz: Administrare în funcție de greutatea corporală: < 60: 6000 U (30 mg tenecteplază; volum soluție reconstituită, 6 ml); ≥ 60 la < 70: 7000 U (35 mg tenecteplază; volum soluție reconstituită, 7 ml); ≥ 70 la < 80: 8000 U (40 mg tenecteplază; volum soluție reconstituită, 8 ml); ≥ 80 la < 90: 9000 U (45 mg tenecteplază; volum soluție reconstituită, 9 ml); ≥ 90: 10000 U (50 mg tenecteplază; volum soluție reconstituită, 10 ml). Adm. în bolus i.v. unic în decurs de 5-10 secunde (linia i.v se spală după administrarea tenecteplazei pentru o administrare corespunzătoare). Se poate adm. o linie i.v pe care s-a administrat clorură de sodiu. Nu se asociază cu alte produse în sol. inj. sau la linia de perfuzie. Incompatibilă cu sol. de glucoză.

Cind: Hipersensibilitate la tenecteplază sau excipienții produsului. Nu se administrează în caz de: tulburări hemoragice semnificative actuale sau în ultimele 6 luni, diateză hemoragică cunoscută; pacienții care urmează curent tratament anticoagulant oral (INR > 1,3); antecedente de leziuni ale sistemului nervos central (de exemplu, neoplasm, anevrism, intervenții chirurgicale intracraniene sau la nivelul coloanei vertebrale); hipertensiune arterială severă necontrolată; intervenții chirurgicale majore, biopsie a unui organ parenchimatos sau leziuni semnificative în ultimele 2 luni (inclusiv orice leziuni asociate cu IMA), leziuni recente la cap sau craniu; resuscitare cardiopulmonară prelungită (>2 minute) sau traumatică în ultimele 2 săptămâni; disfuncții hepatice severe, inclusiv insuficiență hepatică, ciroză hepatică, hipertensiune portală (varice esofagiene) și hepatită activă; retinopatie diabetică hemoragică sau alte condiții de hemoragie oftalmică; ulcer peptic activ; anevrism arterial și malformații arteriale/venoase cunoscute; neoplasm cu risc hemoragic crescut; pericardită acută și/sau endocardită bacteriană subacută; pancreatită acută.

A!: Tratamentul se monitorizează de către medicii specialiști. Risc mare de sângerare, mai ales la asocierea cu anticoagulante, heparină. Frecvența hemoragiilor este mai mare la locul de injectare; ocazional: la nivel genito-urinar și gingival. Prudență la administrare în situațiile: tensiune arterială sistolică > 160 mmHg; antecedent cunoscut sau suspicionat de accident vascular cerebral sau atac ischemic tranzitor; sângerare gastrointestinală sau genitourinară recentă (în ultimele 10 zile); injecție i.m recentă (în ultimele 2 zile) cunoscută; vârstă avansată, peste 75 ani; greutate corporală mică < 60 kg; afecțiune cerebrovasculară. Crește riscul accidentelor tromboembolice la pacienți cu stenoză mitrală sau fibrilație atrială..
RA: Sângerări superficiale, în mod normal la locul de injectare, sângerări interne la nivelul tractului gastrointestinal sau urinar, hemopericard, hemoragii pulmonare, sângerări retroperitoneale și hemoragii cerebrale (inclusiv simptomele neurologice respective, cum sunt somnolență, afazie, convulsii). La pacienții care au suferit un accident vascular cerebral (inclusiv sângerări cerebrale) sau alte episoade grave de sângerare s-au raportat cazuri de deces sau de invaliditate permanentă. Alte reacții adverse frecvente: hemoragii intracraniene, echimoze, epistaxis, sângerări la nivelul tractului urogenital, creșterea temperaturii. RA foarte frecvente: sângerări superficiale, de regulă, de la puncții sau vase de sânge lezate, aritmii de reperfuzie, sângerări, scăderea presiunii sanguine. RA mai puțin frecvente: tromboembolism, hemoragii pulmonare, sângerări la nivelul tractului gastrointestinal, greață, vărsături, sângerări retroperitoneale, reacții anafilactice (incluzând erupții cutanate, urticarie, bronhospasm, edem laringian).

TENONITROZOLUM COD ATC: P01AX08

ATRICAN 250 *LAB. INNOTECH INTERNATIONAL;* Cps. 250 mg ***(P-RF)***

Ind: Tricomonas urogenital.
Dz: *Adulți:* 1 cps. dimineața și seara, în timpul meselor, timp de 4 zile. Urmează tratamentul și partenerul indiferent dacă prezintă sau nu semnele clinice.
Cind: Hipersensibilitate, IH. Asocierea cu alcool. Sarcină și alăptare.
A!: Nu se utilizează lentile de contact pe durata tratamentului.
RA: Greață, senzație de greutate gastrică, inapetență, colorarea în galben a lentilelor de contact.

TENOXICAMUM COD ATC: M01AC02

NEO ENDUSIX *ANFARM HELLAS;* Cpr. film. 20 mg ***(P-6L)***; Pulb. pt. sol. inj. 20 mg (fl. pulb. + fiolă solv. 2 ml) ***(P-RF)***

TENOXICAM *ARENA GROUP SA;* Cpr. 20 mg tenoxicam ***(P-6L)***

TENOXICAM 20 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cps. 20 mg tenoxicam ***(S/P-6L)***

TENOXICAM *SICOMED SA*; Cpr. film. 20 mg ***(P-6L)***

TILCOTIL *HOFFMANN-LA ROCHE;* Cpr. film. 20 mg ***(P-6L)***; Pulb. liof. pt. sol. inj. 20 mg (5 fl. pulb. + 5 fiole solv. × 2 ml) ***(P-RF)***

Ind: Afecțiuni inflamatorii și degenerative dureroase ale sistemului osteomuscular: artrită reumatoidă; osteoartrită; artroză; spondilită anchilopoietică; afecțiuni

extra-articulare, de exemplu tendinită, bursită, periartrită umerală sau de șold, întinderi ligamentare, entorse; gută acută; durere postoperatorie; dismenoree primară. **Dz:** Toate indicațiile (în afară de dismenoree primară, durere postoperatorie și gută acută): 20 mg/zi. Dismenoree primară: 20-40 mg/zi. Dureri postoperatorii: 40 mg/zi, max. 5 zile. Crizele acute de artrită cauzată de gută: 40 mg/zi, 2 zile, urmată de 2 mg/zi, 5 zile. Trat. poate fi instaurat prin adm. i.v. sau i.m. o dată pe zi timp de 1-2 zile și continuat apoi pe cale orală sau rectală.
Cind: Hipersensibilitate la medicament sau alte AINS; celor care suferă sau au suferit de afecțiuni ale tractului gastrointestinal superior, cum ar fi gastrite, ulcer gastric și duodenal. Al treilea trimestru de sarcină. Perioada de alăptare.
A!: Este necesar să se monitorizeze în special funcțiile cardiacă și renală. Inhibă agregarea plachetară și poate afecta hemostaza. Pacienții cu tulburări de coagulare sau care beneficiază de trat. medicamentos care afectează hemostaza vor trebui supravegheați cu atenție. Pacienții care prezintă simptome gastrointestinale vor fi monitorizați cu atenție. Dacă se manifestă reacții cutanate severe (sindromul Lyell sau Stevens-Johnson), trat. va fi întrerupt imediat. Se recomandă efectuarea unor controale oftalmologice în cazul pacienților care dezvoltă tulburări de vedere. Precauție atunci când nivelele albuminei plasmatice sunt reduse semnificativ. Poate masca simptomele comune ale infecției. Atenție în cazul trat. asociat cu salicilat sau cu alte AINS, metotrexat, litiu, diuretice care cruță potasiul, blocanți alfa-adrenergici și IEC, anticoagulante sau antidiabetice orale.
RA: Tract gastrointestinal: disconfort gastric, epigastric și abdominal, dipepsie, greață, constipație, diaree, stomatită, gastrită, vomă, sângerare gastrointestinală, ulcer, melenă, perforare a tractului gastrointestinal. SNC: amețeală, cefalee, fatigabilitate, tulburări ale somnului, pierderea poftei de mâncare, uscăciune a gurii, vertij, tulburări de vedere. Piele: prurit, eritem, exantem, rash, urticarie, sindromul Stevens-Johnson și Lyell, reacții de fotosensibilitate, vasculită. Tractul urinar și rinichi: Creștere a ureei sanguine sau a creatininei, edem. Ficat și tractul biliar: Creștere a activității enzimatice a ficatului, hepatită. Sistemul cardiovascular: palpitații, HTA. Sânge: Anemie, agranulocitoză, leucopenie, trombocitopenie. Reacții de hipersensibilitate: Dispnee, astm, reacții anafilactice, angioedem.

TERAZOSINUM

COD ATC: G04CA03
C02CA05

HYTRIN *ABBOTT LABORATORIES Ltd.;* Cpr. 1 mg + 2 mg; 2 mg; 5 mg; 10 mg ***(P-6L)***

HYTRIN STARTER PACK *ABBOTT LABORATORIES Ltd.;* Cpr. 1 mg + 2 mg ***(P-6L)***

TERAZOSIN *EGIS PHARSMACEUTICALS Ltd.;* Cpr. 1 mg, 2 mg, 5 mg, 10 mg ***(P-6L)***

Ind: HTA; trat. simptomatic al adenomului de prostată.
Dz: Int. *Adulți:* HTA: Inițial 1-5 mg/zi, seara la culcare. Adenom de prostată: În prima zi: 1 mg seara la culcare, se continuă cu 2 mg/zi timp de o săpt., apoi se crește până la 5-10 mg/zi, ca doză de întreținere. Doza max. 20 mg.
Cind: Hipersensibilitate la terazosin sau la alți antagoniști alfa-adrenergici cu structură chimică asemănătoare.

A!: Se pot produce scăderi marcate ale TA, cu caracter predominant ortostatic, care pot fi însoțite de tahicardie. Simptomele clinice constau în amețeli, cădere, chiar pierderea trecătoare a conștienței. *Atenție!* căderea poate fi cauză de accidente traumatice. În caz de sincopă pacientul trebuie menținut în poziție culcată. Trebuie adm. cu precauție persoanelor cu predispoziție cunoscută la hTA ortostatică, în caz de cardiopatie ischemică, ateroscleroză cerebrală avansată sau alte tulburări cerebrovasculare, diabet zaharat insulino-dependent, IH sau IR. Nu este recomandabil în caz de carcinom de prostată. TA a pacienților cu adenom de prostată trebuie controlată la începutul trat. și atunci când se cresc dozele. Adm. la copii nu este recomandată. Prudență când se asociază cu alte antihipertensive sau cu diuretice. Prudență la femeile însărcinate sau la cele care alăptează. Prudență la șoferi și persoane cu activități de precizie.
RA: Hipotensiune de primă doză, hTA ortostatică, vertij, stare de slăbiciune, edeme periferice, tahicardie, palpitații, angină pectorală, creștere în greutate, dispnee, mialgii, tulburări de vedere, congestie nazală, greață, vărsături sau alte tulburări gastro-intestinale, cefalee, scăderea libidoului și impotență.

TERBINAFINUM

COD ATC: D01AE15
D01BA02

LAMISIL® *NOVARTIS PHARMA SERVICES;* Cpr. 250 mg; Cremă 1% (tub × 15 g) ***(OTC)***

TERBISIL® 250 mg *GEDEON RICHTER;* Cpr. 250 mg ***(P-RF)***

TERBISIL® cremă 1% *GEDEON RICHTER;* Cremă ***(OTC)***

TERBISIL® KID *GEDEON RICHTER;* Cpr. 125 mg ***(P-RF)***

Ind: Infecții fungice ale pielii produse de dermatofiți (Trichophyton, Microsporum canis și Epidermophyton floccosum). Infecții ale pielii produse de levuri, în special din genul Candida. Pityriasis versicolor (numai forma topică).
Dz: *Int.* 250 mg, o dată pe zi. Durata trat. variază, în funcție de indicație și de severitatea infecției, între 2-6 săpt și pînă la 6 luni. *Adm. topică:* 1-2 aplicații/zi. Durata trat.: 1-4 săpt.
Cind: Hipersensibilitate la terbinafină sau la oricare dintre excipienții conținuți în cremă. Perioada de alăptare.
A!: Pacienții cu disfuncție hepatică preexistentă stabilă sau cu funcție renală afectată trebuie să primească 1/2 din doza int. obișnuită. Crema este destinată numai uzului ext. Trebuie evitat contactul cu ochii. Când este necesară adm. int. concomitentă cu medicamente inductoare ale metabolismului sau medicamente care inhibă citocromul P450a, poate fi necesară ajustarea dozei. Prudență la femei însărcinate (în cazul adm. int.).
RA: *După adm. int.*: simptomele gastrointestinale (senzație de plenitudine, inapetență, greață, dureri abdominale ușoare, diaree), reacții cutanate (erupții, urticarie, sindrom Stevens-Johnson, necroliză epidermică toxică), tulburări ale funcției gustative, disfuncție hepato-biliară. *După adm. topică:* eritem local, prurit sau senzație de usturime, reacții alergice.

TERBUTALINUM

COD ATC: R03AC03
R03CC03

AIRONYL *SEDICO;* Sirop 1,5 mg/5 ml sulfat de terbutalină (fl. × 120 ml) ***(P-6L)***

BRICANYL *ASTRAZENECA;* Cpr. 2,5 mg sau 5 mg ***(P-6L)***

BRICANYL *ASTRAZENECA;* Sol. inhal. 2,5 mg/ml (fl. × 2 ml) ***(P-6L)***

BRICANYL *ASTRAZENECA;* Sol. inj. 0,5 mg/ml (f. × 1 ml) ***(P-RF)***

BRICANYL TURBUHALER *ASTRAZENECA;* Pulb. inhal. 0,5 mg/doză (fl. disp. × 200 doze) ***(P-6L)***

Ind: Astm bronșic; bronșită cronică; emfizem; alte afecțiuni respiratorii cu bronhospasm ca factor de complicație.
Dz: *Inhalator: Adulți și copii peste 12 ani:* 0,25-0,5 mg la nevoie. În cazuri severe, se pot adm. 1,5 mg o dată. Doza totală în 24 h nu trebuie să depășească 6 mg. *Copii între 3-12 ani:* 0,25-0,5 mg la nevoie. În cazuri severe se poate adm. 1 mg o dată. Doza totală în 24 h nu trebuie să depășească 4 mg. *Int.: Adulți:* În primele 1-2 săpt.: 2,5 mg de 3 ori/zi. Ulterior, dacă este necesar, doza poate fi crescută la 5 mg de 3 ori/zi. *Copii:* 0,075 mg/kg de 3 ori/zi. Dacă nu s-a obținut răspunsul adecvat, doza poate fi dublată.
Cind: Hipersensibilitate la terbutalină sau la oricare dintre ingrediente. HTA severă, IC, cardiomiopatie hipertrofică, hipertiroidism, cei sensibili la aminele simpatomimetice, eclampsie, preeclampsie, hemoragie uterină.
A!: Prudență la pacienții cu susceptibilitate crescută la aminele simpatomimetice. La pacienții astmatici cu diabet concomitent, aflați la începutul trat. cu terbutalină, se recomandă teste adiționale ale glicemiei. Prudență în cazul trat. concomitent cu derivați xantinici, steroizi, diuretice sau de hipoxie (trebuie monitorizate nivelele serice de potasiu). Prudență în primul trimestru de sarcină.
RA: *Adm. inhalator:* tremor, cefalee, crampe musculo-tonice, palpitații, urticarie și exantem, tulburări de somn și tulburări comportamentale (agitație, hiperactivitate, stare de neliniște), bronhospasm. *Adm. int.:* tremor, cefalee, vertij, crampe musculo-tonice, palpitații, tahicardie, greață, vărsături, urticarie și exantem, la copii s-au observat tulburări de somn și tulburări comportamentale, pot să apară reacții alergice.

TERFENADINUM

COD ATC: R06AX12

TERIDIN *KRKA d.d.;* Susp. orală 30 mg/5 ml (fl. × 100 ml); Cpr. 60 mg ***(P-6L)***

TERIDIN FORTE *KRKA d.d.;* Cpr. 120 mg ***(P-6L)***

Ind: Trat. simptomelor unor afecțiuni alergice: rinite alergice; febra fânului; afecțiuni dermatologice alergice - urticarie, prurigo, mușcături sau înțepături de insecte, edem angioneurotic, dermatite atopice sau eczeme; prevenirea și trat. reacțiilor alergice la transfuzia de sânge sau a reacțiilor la substanțele de contrast parenterale.

Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* 60 mg de 2 ori/zi; *copii între 6-12 ani:* 30 mg de 2 ori/zi; *copii sub 5 ani:* 15 mg de 2 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la produs; în cursul sarcinii.
RA: Cefalee, creșterea apetitului, discrete tulburări gastrointestinale.

TERIPARATIDUM

COD ATC: H05AA02

FORSTEO® *ELI LILLY;* Sol. inj. 20 µg/80 µl preumplut × 3 ml; conține 750 µg teriparatidă (corespunzând la 250 µg/ml).

Ind: Tratamentul osteoporozei stabilite la femeile în postmenopauză.
Dz: 20 µg/zi prin injecție s.c. în coapsă sau abdomen. Durata max. a trat. 18 luni. Pacientele trebuie să primească suplimente de calciu și de vitamina D dacă aportul prin dietă este inadecvat. Nu este necesară ajustarea dozelor în funcție de vârstă.
Cind: IR severă. Prudență la pacientele cu deficit renal moderat. Forsteo nu trebuie folosit la copii sau la adulții tineri cu epifize deschise. Hipersensibilitate la teriparatid sau la oricare din excipienții săi. Hipercalcemie preexistentă. Boală osoasă metabolică, alta decât osteoporoza primară (inclusiv hiperparatiroidia și boala Paget a oaselor). Creșteri neexplicate ale fosfatazei alcaline. Radioterapie scheletală anterioară. Litiază renală/urinară activă sau recentă. Forsteo nu trebuie folosit în cursul sarcinii sau de către femeile care alăptează.
A!: La pacientele normocalcemice, în urma adm. teriparatid s-au observat creșteri ușoare și tranzitorii ale concentrațiilor calciului seric. Concentrațiile calciului seric ating maximum la 4 până la 6 ore și revin la valorile inițiale la 16 până la 24 ore după fiecare doză de teriparatid. În cursul terapiei nu este necesară monitorizarea de rutină a calciului. În consecință, dacă de la pacientă se recoltează orice fel de probe de sânge, acest lucru trebuie făcut după cel puțin 16 ore de la injecția cea mai recentă. Forsteo poate să cauzeze mici creșteri ale excreției urinare de calciu, dar incidența hipercalciuriei nu a diferit față de cea de la pacientele tratate cu placebo în studiile clinice. Crește concentrațiile serice ale acidului uric.
RA: S-au observat episoade izolate de hTA ortostatică tranzitorie și amețeli. Evenimentul începe în decurs de 4 ore de la adm. și se rezolvă în câteva minute până la câteva ore. Cele mai frecvente RA sunt greața, durerile membrelor, cefaleea și amețeala.

TERLIPRESSINUM

COD ATC: H01BA04

REMESTYP *FERING LECIVA;* Sol. inj. 100 µg/ml (f. x 2 ml; 5 ml sau 10 ml) ***(P-RF)***

Ind: Hemoragii ale tractului gastro-intestinal și hemoragii genito-urinare (varice esofagiene, ulcer gastric cu hemoragie și operații în sfera abdominală și genito-urinară).
Dz: *Perf.:* i.v. in bolus 1 mg. Durata de acțiune este de 2-8 ore, doza putând fi repetată până la de 3 ori/zi. *Adulți:* 5-20 mg/kg/8 ore. Stabilirea dozei se

face în funcție de rata sângerării, durata sângerării și cantitatea de sânge pierdut, în prezența simptomelor de HTA sau șoc. În operațiile în sfera abdominală complicate cu hemoragie intraoperatorie se adm. încet 4 fiole i.v., astfel încât efectul să se mențină pe toată durata operației. Durata trat. variază de la o doză unică la 7 zile de trat.
Cind: Primele 2-3 săpt. de sarcină, epilepsie.
A!: Boli cardiace, ischemie, HTA severă, aritmii și astm bronșic. Vârstnici.
RA: Paloare, contracții uterine, intensificarea peristaltismului intestinal până la colici abdominale, eructații, greață, variații ale TA, dispnee, necroză la locul inj.

TERTATOLOLUM *COD ATC: C07AA16*

EVARTAN *LAB. SERVIER IND.;* Cpr. 5 mg ***(P-6L)***

Ind: Beta-blocant neselectiv.
Dz: Oral 5 mg/zi într-o priză, dimineața.

TESTOSTERONUM *COD ATC: G03BA03*

TESTOLENT *SICOMED SA;* Sol. inj. 100 mg/ml (f. × 1 ml) ***(S/P-RF)***

TESTOSTERON *SICOMED SA;* Sol. inj. 25 mg/ml (f. × 1 ml) ***(S/P-RF)***

UNDESTOR (ANDRIOL) *N.V. ORGANON;* Cps. 40 mg testosteron ***(P-RF)***

Ind: *La bărbați:* eunucoidism, impotență sau sterilitate prin deficit androgenic; criptorhidie post-pubertală cu hipogonadism; ca medicație adjuvantă în stări de deficit proteic. *La femei:* tulburări de climacterium, dismenoree, sângerări uterine funcționale, mastită cronică; pt. prevenirea tumefacției dureroase a sânilor post-partum și pt. suprimarea lactației; ca trat. paliativ în cancerul mamar progresiv și cancerul endometrial.
Dz: *Inj. i.m.* 10-50 mg de 2-3 ori/săpt., în hipogonadism masculin; 50-75 mg/zi, timp de 2-3 zile, pentru suprimarea lactației; 50-100 mg de 3 ori/săpt., în cancerul mamar la femei. *Int. bărbați:* 10-50 mg/zi; *femei:* 50-200 mg/zi; *copii:* 10-30 mg/zi sau la 2-3 zile, pe o durată limitată, de 4-6 luni. Este de preferat ca 1/2 din doză să fie luată dimineața și 1/2 seara.
Cind: Alergie la androgeni, policitemie, suspiciune sau diagnostic de carcinom de prostată, adenom de prostată, carcinom mamar la bărbați, boli hepatice grave, nefroză. În sarcină și în perioada de alăptare.
A!: Prudență la bolnavi cu IC, HTA, afecțiuni hepatice și renale, ateroscleroză avansată, migrenă, epilepsie sau alte afecțiuni în care retenția salină este dăunătoare, hipertrofie prostatică. La pacienții cu cancer mamar, trat. cu androgeni poate cauza hipercalcemie prin osteoliză. Adm. prelungită de doze mari se poate asocia cu hepatită și icter și, în cazuri mai grave, cu neoplasm hepatic. Precauție la adm. testosteronului în pubertatea întârziată. Figurează pe lista substanțelor dopante (interzise la sportivi). Precauție în cazul asocierii cu: barbiturice, fenilbutazonă, anticoagulante cumarinice, sulfamide antidiabetice.
RA: Endocrinologice și urogenital: femei - amenoree și alte dereglări menstruale, inhibarea secreției de gonadotropină, virilizare, virilizarea fătului femi-

nin în cazul adm. la gravide; bărbați - ginecomastie, oligospermie, priapism. Cutanate: schimbări de culoare ale pielii, hirsutism, acnee. Electroliți și fluide: retenție de sodiu, potasiu, calciu, cloruri, fosfați anorganici și apă. Gastrointestinale și hepatice: greață, icter colestatic, alterarea probelor hepatice, rar neoplasm celular. Sanguine: hemoragii la pacienții aflați sub trat. cu anticoagulante, policitemie. SNC: creșterea sau diminuarea libidoului, dureri de cap, anxietate, depresie, parestezie generalizată. Metabolice: bilanț pozitiv al azotului, colesterol seric crescut. În cazuri rare, poate apărea o reacție anafilactică.

TETRACOSACTIDUM

CODATC:H01AA02

SYNACHTEN DEPOT *NOVARTIS PHARMA SERVICES;* Susp. inj. 1 mg/ml (f. x 1 ml) ***(P-RF)***

Ind: *Boli neurologice:* exacerbări acute la pacienții cu scleroză multiplă; encefalopatie mioclonică infantilă. *Boli reumatice:* ca trat. de scurtă durată în situațiile care indică trat. cu glucocorticoizi. *Boli cutanate:* pemfigus, eczeme cronice severe, forme eritrodermale sau pustuloase de psoriazis. *Boli ale tractului gastrointestinal:* colită ulceroasă și enterita regională. Oncologie: creșterea toleranței la chimioterapie.
Dz: *Adulți:* inițial, 1 mg i.m./zi; în cazurile acute sau în indicațiile oncologice, se poate adm. 1 mg la 12 ore. După atenuarea manifestărilor acute: 1 mg o dată la 2-3 zile; în cazul unui răspuns bun la trat., doza se va reduce la 0,5 mg la 2-3 zile, sau 1 mg pe săpt. *Nou-născuți:* inițial este de 0,25 mg i.m. zilnic; doza de întreținere este de 0,25 mg la 2-8 zile. *Copii mici:* inițial: 0,25-0,50 mg i.m. zilnic; doza de întreținere: 0,25-0,50 mg la 2-8 zile. *Copii de vârstă școlară:* inițial: 0,25-1 mg i.m. zilnic; doza de întreținere: 0,25-1 mg la 2-8 zile.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la tetracosactid și/sau ACTH de origine animală, psihoze acute, boli infecțioase, ulcer peptic, IC refractară, sindrom Cushing, insuficiență corticosuprarenală, sindrom adrenogenital, sarcină și lactație, în trat. astmului sau altor afecțiuni alergice, la nou-născuți.
A!: Înaintea utilizării, trebuie să ne asigurăm că pacientul nu suferă de o afecțiune alergică și că nu este în general susceptibil la alergii. Apariția reacțiilor locale sau sistemice de hipersensibilizare în timpul sau după o injecție impune oprirea adm. Poate fi necesară, ocazional, substituția cu potasiu. Creșterea staturală a copiilor tratați timp îndelungat trebuie monitorizată. La sugarii și copiii mici tratați cu tetracosactid trebuie efectuate regulat ecocardiografii. Precauție în cazul pacienților cu herpes ocular. Precauție în cazul pacienților cu tuberculoză latentă sau reactivitate la tuberculină. Precauție la șoferi și persoane cu activități de precizie.
RA: Reacții de hipersensibilitate: reacții cutanate la locul injecției; amețeală, greață, vărsături, urticarie, prurit, flushing, dispnee, edem angioneurotic sau edem Quinke. Sistemul musculoscheletal: osteoporoză, oboseală musculară, miopatie steroidică, pierderea masei musculare, fracturi prin compresie vertebrală, necroză aseptică de cap femural sau humeral, fractură patologică a oaselor lungi, rupturi tendinoase. Gastrointestinal: Ulcer peptic cu posibilă perforare și hemoragie, pancreatită, flatulență, esofagită ulcerativă. Piele și mucoase: piele subțire, peteșii și echimoze, eritem facial, supresia răspunsului la testele alergice cutanate, acnee, pigmentarea pielii. SNC: convulsii, creș-

terea presiunii intracraniene cu edem papilar, vertij, cefalee, tulburări psihice. Endocrin: retenție lichidiană, pierderea potasiului și calciului, alcaloză hipokaliemică, modificări ale ciclului menstrual, sindrom Cushing, încetarea procesului de creștere la copii, scăderea toleranței la glucoză, hiperglicemie, manifestarea diabetului latent, hirsutism. Ochi: cataractă posterioară subcapsulară, creșterea presiunii intraoculare, glaucom, cataractă. Cardiovascular: creșterea TA, IC congestivă; hipertrofia miocardică reversibilă poate apărea în cazuri izolate la nou-născuții și copiii tratați cu doze mari pt. o perioadă îndelungată. Alte reacții adverse: abcese, tromboembolism, scădere ponderală, creșterea apetitului, leucocitoză, creșterea riscului la infecții.

TETRACYCLINUM

COD ATC: J01AA07
D06AA04

TETRACICLINĂ *FARMACOM SA;* Cps. 250 mg ***(P-RF)***

TETRACICLINĂ *LEK PHARMATECH;* Cps. 250 mg ***(S/P-RF)***

TETRACICLINĂ *SICOMED SA;* Cps. 250 mg ***(P-RF)***

TETRACICLINĂ *ARENA GROUP SA;* Cps. 250 mg ***(P-RF)***

TETRACICLINĂ 250 mg *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cps. 250 mg ***(S/P-RF)***

TETRACICLINĂ 250 mg *EUROPHARM SA;* Cps. 250 mg ***(S/P-RF)***

TETRACICLINĂ CLORHIDRAT *ANTIBIOTICE IAȘI;* Ung. 3% (tub × 12 g) ***(P-RF)***

Ind: Rickettsioze, infecții respiratorii și urinare cu germeni sensibili, limfogranuloza benignă, febră recurentă, șancru moale, pestă, bruceloză; ca medicație de rezervă în gonoree, lues, actinomicoză ș.a., infecții cu microorganisme rezistente la penicilină; adjuvant util în amoebiaza intestinală acută și acnee severă, în trahom ș.a. Ca trat. local în acnee și în infecții ale pielii cu streptococi, stafilococi și alți germeni sensibili la tetraciclină. Unguentul oftalmic este indicat în trat. infecțiilor oculare externe ca: blefarite acute și cronice, conjunctivite purulente acute și cronice, hordeolum, blefaroconjunctivite, ulcere ale corneei, infecții secundare la pacienții cu Herpex corneae și tracom; în prevenirea infecțiilor ca urmare a unei intervenții chirurgicale oftalmice.

Dz: *Adm. sistemică: Adulți:* 1-2 g/zi, în 4 prize egale la 6 ore. *Copii (peste 7 ani):* 25-50 mg/kg/zi, în 4 prize egale la 6 ore. La pacienții cu afecțiuni renale se adm. în doze mai mici sau mai rare. Tetraciclina se adm. cu 1 h înainte sau 2 h după masă. *Aplicații cutanate:* în strat subțire, pe întreaga suprafață afectată, de 1-2 ori/zi. Ung. oft. se va aplica în sacul conjunctival inferior la fiecare 2 ore. Ung. se răspândește imediat, prin clipire. Durata trat. depinde de severitatea infecției. Trat. se va aplica încă 2-3 zile de la dispariția simptomelor.

Cind: Alergie cunoscută la tetracicline sau la oricare din componenții produsului. În a doua jumătate a sarcinii și la copii sub 7 ani. Adm. concomitentă cu peniciline sau cefalosporine.

A!: Unguentul cu tetraciclină nu este indicat pentru trat. piodermitelor, furunculozei, ulcerului varicos, infecțiilor cutanate cu bacterii rezistente la antibiotic și micozelor cutanate. Folosirea pentru profilaxia infecțiilor cutanate superficiale nu este recomandabilă. Unguentul nu trebuie aplicat pe înțepături, plăgi

adânci sau arsuri fără avizul medicului. Se recomandă respectarea unui interval de o oră până la aplicarea altui medicament topic pentru acnee. Precauție în cazul asocierii cu: retinoizi, anticoagulante orale, săruri de fier, săruri și oxizi de aluminiu și magneziu. Poate pozitiva fals glucoza urinară, interferă cu dozarea prin fluorescență a catecolaminelor urinare.
RA: Fenomene gastrice: greață, vomă, diaree, colici abdominale, pancreatită; tulburări pe mucoase: stomatite, glosite, vaginite, rectite, erupții cutanate; creșterea ureei în sânge la cei cu IR; pigmentarea dinților, carii; depuneri în oase, chiar tulburări de creștere; reacții alergice, fotosensibilizare. Reacții locale: durere, eritem cutanat, edem sau semne de iritație locală. Sunt posibile modificarea sensibilității germenilor și suprainfecții locale, inclusiv micotice.

TETRAZEPAMUM

COD ATC: M03BX07

MYOBLASTAN 50 mg *SANOFI~SYNTHELABO;* Cpr. film. 50 mg ***(P-RF)***

RELAXAM *AC HELCOR SRL;* Cpr. film. 50 mg ***(P-RF)***

Ind: Contracturi musculare.
Dz: *Adulți:* 50-150 mg/zi (repartizate în 2-3 prize zilnice). La *vârstnici* se recomandă diminuarea dozei. Durata trat. este de câteva zile. Întreruperea trat. trebuie să se facă progresiv.
Cind: Alergie la benzodiazepine, insuficiență respiratorie, miastenie.
A!: Poate antrena dependență fizică și psihică. Prudență în afecțiuni hepatice, renale sau musculare; în sarcină și alăptare; la șoferi și persoane cu activități de precizie.
RA: Somnolență, tulburări de memorie, erupții cutanate, amețeli.

TETROFOSMINUM

COD ATC: V09GA02

MYOVIEW *NYCOMED AMERSHAM;* Liof. pt. sol. inj. 0,23 mg (trusă × 2 fl. sau 5 fl.) ***(S)***

Ind: Adjuvant în diagnosticul și localizarea ischemiei miocardice și/sau a IMA.
Dz: Pt. diagnosticul și localizarea ischemiei miocardice procedura recomandată implică două inj. i.v. de ^{99m}Tc-tetrofosmin. *Adulți și vârstnici:* se adm. 185-250 MBq în momentul efortului maxim, apoi 500-750 MBq în repaus după aproximativ 4 ore. Doza adm. trebuie limitată la 1000 MBq/zi. Ca adjuvant în diagnosticul și localizarea IM, este suficientă o singură inj. de ^{99m}Tc-tetrofosmin (185-250 MBq) în repaus.
Cind: În sarcină și la pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la tetrofosmin sau la oricare din excipienți.
A!: Conținutul fl. trebuie folosit doar la prepararea sol. inj. radioactive technețiu-^{99m}. Asocierea cu medicamente care influențează funcția miocardului și/sau fluxul sanguin, de exemplu, blocantele beta-adrenergice, blocantele canalelor calciului sau nitrații, pot duce la rezultate fals negative în diagnosticul bolilor coronariene. Precauție în cazul femeilor care alăptează.
RA: Senzație de căldură generalizată, vomă, dureri de cap, amețeală, un gust metalic pasager, perturbări ale mirosului sau o senzație ușoară de arsură în

gură după injectare. Reacții de hipersensibilitate, incluzând flush-ul, senzații de usturime, rash urticarian sau eritematos, edem facial, hTA și dispnee. Creșteri pasagere ale numărului leucocitelor. Cazuri izolate de reacții anafilactice.

TETRYZOLINUM

COD ATC: R01AA06
S01GA02
S01GAN0

DEMETIL *FARMILA FARMACEUTICI;* Sol. oft. 0,1% (fl. x 10 ml) ***(OTC)***

TYZINE® *PFIZER H.C.P. CORPORATION;* Sol. naz. 0,05% sau 0,1% (fl. × 10 ml) ***(OTC)***

VISINE® *PFIZER H.C.P. CORPORATION;* Sol. oft. 0,05% (fl. × 15 ml) ***(OTC)***

Ind: Decongestionant; la pacienții cu rinită, rinită alergică, faringită, sinuzită; în scop diagnostic; la pacienții cu iritații oculare, la pacienții cu inflamații alergice.
Dz: *Adm. nazală: adulți și copii peste 6 ani:* 2-4 pic. (sol. 0,1%) o dată; *copii între 2-6 ani:* 2-3 pic. (sol. 0,05%) o dată. Se repetă la nevoie, la intervale de max. 4 h. Max. 3-5 zile. *Adm. oft.:* 1-2 pic. în fiecare ochi afectat de 2-3 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la tetrizolină sau la oricare dintre componenții produsului; rinită atrofică; afecțiuni cardiovasculare severe; copii sub 2 ani, glaucom cu unghi închis.
A!: Nu trebuie utilizată timp îndelungat. Prudență la pacienții cu angină pectorală, tahiaritmii, HTA, feocromocitom, hipertiroidie, ateroscleroză, glaucom cu unghi închis, afecțiuni metabolice. Sol. naz. 0,1% nu se va adm. copiilor între 2 și 6 ani. Prudență în cazul asocierii cu: IMAO, anestezice generale, insulină, atropină, propranolol, guanetidină, rezerpină. Prudență în perioada sarcinii și alăptării. În cazul adm. oft., prudență la șoferi și persoane cu activități de precizie.
RA: Reacții sistemice (extrasistole, cefalee, tremor, oboseală, transpirație, HTA), hiperemie reactivă, senzație de arsură la nivelul mucoasei, congestie nazală cronică, afectarea epiteliului mucoasei nazale cu inhibarea activității ciliare sau cu apariția rinitei atrofice. În cazul aplicării conjunctivale: înțepături oculare, arsuri, hiperemie reactivă, vedere neclară, iritație conjunctivală, midriază.

THEOPHYLLINUM

COD ATC: R03DA04

TEOFILINĂ SR 50 mg; TEOFILINĂ SR 100 mg; TEOFILINĂ SR 200 mg; TEOFILINĂ SR 300 mg *ETHYPHARM ambalat de TERAPIA SA;* Cps. elib. prel. 50 mg, 100 mg, 200 mg sau 300 mg ***(P-6L)***

TEOTARD-350 *KRKA d.d.;* Cps. ret. 350 mg ***(P-6L)***

TEOTARD®-200 *KRKA d.d.;* Cps. ret. 200 mg ***(P-6L)***

THEO SR 100; THEO SR 200; THEO SR 300 *GLAXO SMITHKLINE;* Cps. elib. prel. 100 mg, 200 mg sau 300 mg teofilină ***(P-6L)***

UNI-DUR *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Cpr. ret. 400 mg sau 600 mg ***(P-6L)***

Ind: Prevenirea și trat. dispneei datorate bronho-spasmului din BPOC.
Dz: Optim, dozarea se va face în funcție de concentrația plasmatică a teofilinei (8-20 µg/ml). *Adulți:* doza de întreținere, 11-13 mg/kg/zi. *Copii: 8-12 ani* (25-40 kg): max. 20 mg/kg/zi. *Tineri: 12-16 ani* (40-60 kg): max. 18 mg/kg/zi. Se va lua după mese, nemestecată.
Cind: IM recent, tahiaritmii acute.
A!: Precauție în caz de: angină instabilă, predispoziție la tahiaritmii, HTA severă, cardiomiopatie hipertrofică obstructivă severă, hipertireoză, crize epileptice, ulcer gastroduodenal, porfirie, disfuncții hepatice sau renale ca și la vârste înaintate. Nivelele serice ale teofilinei trebuie monitorizate periodic. Precauție în cazul asocierii cu: cafeină, beta-2-simpatomimetice, barbiturice, carbamazepină, fenitoină, rifampicină, primidon, sulfinpirazon, isoproterenol, hidroxid de magneziu, contraceptive orale, antibiotice macrolide, antagoniști de calciu, cimetidină, hidrazină, alopurinol, propranolol, propafenonă, interferon, ranitidină, ciprofloxacilină, enoxacină, carbonat de litiu, beta-blocanților, halotan. Precauție în cursul sarcinii și în perioada de alăptare.
RA: Cefalee, agitație, tremurături ale membrelor, neliniște, insomnii, frecvență cardiacă crescută, ritm cardiac neregulat, palpitații, hTA, tulburări gastrointestinale, senzație de greață, vomă, diaree, creșterea diurezei, modificări ale nivelului seric al electroliților (în special hipopotasemie, creșterea calciului seric și al creatininei serice, hiperglicemie și hiperuricemie), reflux gastroesofagian, dispnee nocturnă prin aspirarea conținutului gastric, agravarea mastozei fibrochistice; în cazul supradozării pot apărea: spasme, hTA brutală, aritmii ventriculare ca și tulburări gastrointestinale grave (hemoragii digestive).

THIAMAZOLUM *COD ATC: H03BB02*

METHIMAZOL *PHILOPHARM GmbH;* Cpr. 5 mg ***(P-6L)***

THYROZOL®5 *MERCK KGaA;* Cpr. film. 5 mg tiamazol ***(P-6L)***

THYROZOL®10 *MERCK KGaA;* Cpr. film. 10 mg tiamazol ***(P-6L)***

THYROZOL®20 *MERCK KGaA;* Cpr. film. 20 mg tiamazol ***(P-6L)***

Ind: Trat. hipertiroidiei (conservator, preoperator, anterior terapiei cu iod radioactiv). Trat. profilactic al hipertiroidiei latente, al gușei hipertiroidizate sau în cazurile cu hipertiroidie în antecedente, înainte de expunerea la iod.
Dz: *Int.* 20-40 mg/zi, timp de 3-6 săpt. Doza poate fi redusă apoi la o doză de întreținere de 20-10-5 mg/zi. În sarcină se va adm. într-o doză minimă - 2,5-10 mg/zi. Trat. va dura în general între 6 luni și 2 ani.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la tiamazol sau la tionamide. Afectări în antecedente ale măduvei osoase după carbimazol sau tiamazol.
A!: Atenție în caz de reacții alergice cutanate precoce. Gușile voluminoase care determină compresiuni asupra traheei se tratează cu tiamazol doar pe o durată scurtă (în combinație cu levotiroxină). Deficitul de iod crește răspunsul la tiamazol, excesul de iod îl scade. Doze minime (până la 10 mg tiamazol/zi) în perioada de alăptare.
RA: Alergii cutanate (prurit, exantem, urticarie), febră medicamentoasă, hipogeuzie, agranulocitoză, artrită, icter (colestatic), hepatită toxică, limfadenopatie generalizată, edem acut al glandelor salivare, trombocitopenie, neurită, polineuropatii, LED, hipotiroidism clinic sau subclinic, mărire a gușei.

THIAMINUM

COD ATC: A11DA01

SICOVIT®B$_1$ 10 mg *SICOMED SA;* Cpr. 10 mg ***(P-6L)***

SICOVIT®B$_1$ 100 mg/2 ml *SICOMED SA;* Sol. inj. 50 mg/ml (f. × 2 ml) ***(S/P-RF)***

Ind: Boala beri-beri, dietă restrictivă, convalescență, anorexie, hepatite, boli digestive cu tulburări de absorbție, hipovitaminoze cu febră mare, migrene, algii reumatismale, nevrite, polinevrite, nevralgii, paralizii postdifterice și postpoliomielitice, mieloze, encefalopatie Wernicke, nevrite, auto-intoxicații, grețuri și vărsături în sarcină, tulburări de nutriție, spasmofilie, întârzieri în creștere la copii, zona zoster, dermatoze, arsuri întinse, diabet zaharat, hipertiroidie.
Dz: *Adulți:* s.c., i.m., i.v.: 20-40 mg/zi sau la 2 zile, până la 100-300 mg/zi sau la 2 zile în carențele grave. *Copii:* s.c., i.m.: 5-20 mg/zi; nu se adm. i.v.; oral: 10-40 mg/zi curativ; 5-10 mg/zi pt. profilaxie.
Cind: Intoleranță sau alergie la tiamină; incompatibilitate cu vitamina B$_2$ și cu benzpenicilina.
A!: Dozele mari pot interfera acțiunea altor vitamine din complexul B cu fenomene carențiale consecutive.
RA: Rar, mai ales la injectarea i.v. - șoc tiaminic.

THIETHYLPERAZINUM

COD ATC: R06AD03

TORECAN *NOVARTIS PHARMA;* Dj. 6,5 mg ***(P-RF)***

Ind: Greață și vomă asociate cu tulburări gastrointestinale, intoleranță la medicamente, traume cerebrale și presiune intracraniană crescută, după radioterapie și postoperator. Vertij asociat cu ateroscleroză, în sd. Ménière și alte boli sau leziuni care afectează aparatul vestibular, procese expansive intracraniene, după traumatisme craniene. Rău de mișcare.
Dz: Oral 6,5 mg de 1-3 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la fenotiazine, stări comatoase. Copii sub 15 ani.
A!: Pacienții în vârstă nu trebuie tratați cu tietilperazină mai mult de 2 luni și trebuie monitorizați cu atenție. Poate potența efectele sedativelor SNC, inclusiv ale benzodiazepinelor, opiaceelor și alcoolului. Prudență la femei însărcinate sau care alăptează; la șoferi și persoane cu activități de precizie.
RA: Uscăciunea gurii, astenie, somnolență, tahicardie, hipotensiune, anomalii ale funcției hepatice și apariția sindromului malign neuroleptic. Poate provoca simptome extrapiramidale (crize oculogire, tulburări de deglutiție și vorbire, spasme musculare).

THIOPENTALUM

COD ATC: N01AF03

THIOPENTAL *SANDOZ GmbH;* Pulb. pt. sol. inj. 0,5 g sau 1 g ***(S)***

THIOPENTAL SODIUM *E.I.P.I.C.O.;* Pulb. pt. sol. inj. 500 mg sau 1 g ***(S)***

Ind: Anestezie generală de scurtă durată; Inducția anesteziei generale; Controlul stărilor convulsive; in psihiatrie, psihoanaliza și hipnoza induse narcotic.
Dz: *Inj. i.v.* Mod de întrebuințare: Se recomandă soluții 2,5-5% în apă distilată. Pentru inducția anesteziei generale: *adulți:* 2-5 mg/kg. Doza max.: 1 g. *Copii peste 5 ani,* 2-7 mg/kg i.v. Stări convulsive: 75-250 mg. Psihoanaliza și hipnoza induse narcotic: 100 mg/min prin inj. lentă.
Cind: Hipersensibilitate la tiopental sau la alte barbiturice. Intoxicații acute cu alcool, soporifice, analgezice sau medicamente psihotrope. Miastenia gravis, insuficiență respiratorie sau vagotonie, stare de rău astmatic, dispnee severă, miocardopatii severe, aritmii cardiace, șoc sever, porfirie hepatică acută, IH sau IR severă, disfuncții metabolice severe.
A!: Aparatura necesară ventilației de urgență trebuie să fie la îndemână. Căile respiratorii trebuie menținute libere. Nu trebuie adm. persoanelor neînsoțite, neinternate. Prudență la șoferi și persoane cu activități de precizie. Prudență în cazul asocierii cu: alcool, antihistaminice, substanțe deprimante ale SNC; barbiturice, fenotiazine, rezerpină, alți agenți hipotensivi, acid valproic, tranilcipromină, metotrexat, depresoare circulatorii, aminofilină.
RA: În timpul inducției: tuse, strănut, sughiț, laringospasm, bronhospasm, depresie respiratorie centrală și apnee, depresia activității cardiace. La scurt timp după inj. se pot observa reflexe de hiperexcitabilitate. Reacții alergice variind de la manifestări minore și șoc anafilactic, depresie respiratorie sau circulatorie și aritmii cardiace. Anemie hemolitică prin mecanism imun cu IR și paralizie a nervului radial. În timpul revenirii sau după anestezie: contracturi musculare, frisoane, hipotermie, somnolență, confuzie și amnezie. Vărsăturile postoperatorii sunt rare. Inj. i.v. poate produce durere la locul inj., tromboflebite.

THIORIDAZINUM *COD ATC: N05AC02*

TIORIDAZIN 5 mg; TIORIDAZIN 50 mg *SICOMED SA;* Dj. 5 mg și 50 mg clorhidrat de tioridazin ***(P-RF)***

Ind: Ca antipsihotic în: schizofrenie, manii, psihoze endo- și exogene, nevroze și psihopatii. Ca tranchilizant în: stări anxioase, stări de tensiune și agitație, tulburări de somn, tendință la stări depresive, tulburări psihosomatice, stări dureroase rebele la trat. obișnuit; dificultăți de concentrare, tulburări ale comportamentului și somnului la școlari.
Dz: *Ind. psihiatrice: adulți:* inițial 500-600 mg/zi, în mai multe prize; întreținere 100-200 mg/zi. *Ca tranchilizant și anxiolitic:* 0,030 g/zi la *adulți* și 0,001 g/kg/zi la *copii.*
Cind: Stări comatoase, bolnavi cu leucopenie, cu disfuncție hepatică, în cazurile de insuficiență sau tahiaritmie cardiacă.
A!: Precauție în ateroscleroză, sindroame cardiovasculare și la bolnavii cu fenomene convulsivante în antecedente.
RA: Somnolență, xerostomie, paloare, cefalee, constipație alternativă cu diaree, poliurie, hipertermie, tahicardie, insomnie, fotosensibilizare, erupții cutanate, hTA posturală, colorarea în purpuriu a urinei, icter de tip obstructiv, rareori discrazii sanguine, inclusiv agranulocitoză, sindroame de tip parkinsonian, creștere ponderală, amenoree, galactoree.

TIANEPTINUM *COD ATC: N06AX14*

COAXIL *LAB. SERVIER IND.;* Cpr. film. tianeptină sodică 12,5 mg ***(P-RF)***

Ind: Trat. stărilor depresive, stărilor anxio-depresive cu tulburări digestive, stărilor anxio-depresive la alcoolici, în special în perioada de sevraj.
Dz: 37,5 mg pe zi; *vârstnici* și IR: 25 mg pe zi.
Cind: Sarcină și alăptare; copiii sub 15 ani; asociere cu IMAO.
A!: Prudență în anestezie generală; nu se oprește brusc trat.; șoferi și activități de precizie.
RA: Dureri abdominale, greșuri, vărsături, constipație, uscăciunea gurii, pierderea apetitului, insomnie, somnolență, oboseală, palpitații, cefalee, vertij, amețeli, jenă respiratorie, dureri musculare sau articulare.

TIAPRIDUM *COD ATC: N05AL03*

TIAPRIDAL 100 mg *SANOFI~SYNTHELABO;* Cpr. clorhidrat de tiaprid 100 mg ***(P-RF)***

TIAPRIDAL 100 mg/2 ml *SANOFI~SYNTHELABO;* Sol. inj. clorhidrat de tiaprid 100 mg/2 ml (f. × 2 ml) ***(P-RF)***

Ind: Stare de agitație și de agresivitate, mai ales la subiectul etilic. Dureri intense și rebele. Mișcări anormale de tip coreic.
Dz: *Adulți:* Stări de agitație și agresivitate: 200-300 mg/zi, int. timp de 2 luni. Delir și predelir: 400-1200 mg/zi inj i.m. sau i.v. Mișcări anormale: 300-800 mg/zi, int. În diskineziile provocate de levodopa: 75-150 mg/zi. Dureri intense și rebele: 200-400 mg/zi, int. sau inj. *Copii peste 7 ani:* 100-150 mg/zi.
Cind: Feocromocitom.
A!: Dacă apare sd. neuroleptic malign se întrerupe trat.; prudență la epileptici, vârstnici, cardiaci, IR, parkinsonieni; interacțiuni medicamentoase cu alcool, levodopa, antihipertensive, antidepresive, opioide, antihistaminice H1, barbiturice, benzodiazepine, clonidină, IEC; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Sd. neuroleptic malign: sedare sau somnolență, diskinezii precoce, sd. extrapiramidal, diskinezii tardive, hTA ortostatică, impotență, frigiditate, amenoree, ginecomastie, hiperprolactinemie, creștere în greutate.

TICARCILLINUM *COD ATC: J01CR03*

TIMENTIN *GLAXO SMITHKLINE;* Pulb. pt. sol. inj. 1,6 g sau 3,2 g ***(S)***

Ind: Infecții severe cu microorganisme sensibile: septicemii, bacteriemii, peritonite; infecții intra-abdominale; infecții post-chirurgicale; infecții osteo-articulare; infecții cutanate și ale părților moi; infecții dovedite sau presupuse, la pacienții cu apărare antiinfecțioasă afectată; infecții ale tractului respirator; infecții renale grave sau complicate (ex. pielonefrite); infecții ale sferei ORL.
Dz: *Adulți* (inclusiv vârstnici): 1,6-3,2 g i.v. la 6-8 ore, în concordanță cu greutatea corporală, max. 3,2 g la 4 ore. În afecțiunile renale: ușoare: (clearance creatinină > 30 ml/min) - 3,2 g i.v. la 8 ore; moderate (clearance creatinină 10-30 ml/min) - 1,6 g i.v. la 8 ore; severe: (clearance creatinină < 10 ml/min)

- 1,6 g i.v. la 12 ore. *Copii:* 80 mg/kg corp i.v. la 6-8 ore. Pentru copiii prematuri și cei născuți la termen, în perioada perinatală, doza este de 80 mg/kg corp i.v. la 12 ore, ulterior se crește frecvența adm. la 8 ore.
Cind: Hipersensibilitate la peniciline.
A!: La unii pacienți a fost observată modificarea parametrilor funcționali hepatici; se recomandă prudență la pacienții cu disfuncții hepatice manifeste. La pacienții cu afecțiuni renale moderate sau severe dozele trebuie ajustate. Tulburările hemoragipare asociate anomaliilor de coagulare sunt mai posibile la pacienții cu afecțiuni renale. În cazul apariției tulburărilor hemoragipare trat. trebuie întrerupt. Sarcină și alăptare.
RA: *Reacții de hipersensibilitate:* reacții buloase, eritem multiform, sindrom Stevens-Johnson, necroliză toxică epidermică. *Reacții gastro-intestinale:* greață, vărsături, diaree, colită pseudomembranoasă. *Reacții hepatice:* creșterea moderată a AST sau/și ALT, hepatită și icter colestatic. *Reacții renale:* hipokaliemie. *SNC:* convulsii, mai ales la pacienți cu afecțiuni renale sau la cei tratați cu doze crescute. *Reacții hematologice:* trombocitopenie, tulburări hemoragipare. *Reacții locale:* tromboflebită în cazul adm. intravenoase.

TICLOPIDINUM

COD ATC: B01AC05

IPATON *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Cpr. film. clorhidrat de ticlopidină 250 mg ***(P-6L)***

TICLID 250 mg *SANOFI~SYNTHELABO;* Cpr. film. ticlopidină 250 mg ***(P-6L)***

TICLODIN *HELCOR SRL;* Cpr. film. 250 mg ***(P-6L)***

TICLOPIDINE POLI *POLI IND. CHIMICA;* Cpr. film. 250 mg ***(P-6L)***

Ind: Profilaxia riscului de accident vascular cerebral și tulburări ischemice (trombotice) ale creierului; stări precursoare ale accidentelor vasculare. Profilaxia insuficienței circulatorii cu ocluzie trombotică la nivelul membrelor. Corectarea tulburărilor plachetare determinate de intervenții chirurgicale sau hemodializă cronică.
Dz: 250 mg de 2 ori/zi, în timpul mesei. În IH și/sau IR moderată, dozele trebuie micșorate.
Cind: Hipersensibilitate la ticlopidină; diateze hemoragice, leziuni organice cu potențial hemoragic; boli hematologice cu timp de sângerare crescut; IH sau IR severe, agranulocitoză în antecedente, leucopenie, trombocitopenie.
A!: Ticlopidina nu este indicată pentru profilaxia trombozei la persoane sănătoase; monitorizare hematologică; prudență în risc de sângerare, intervenții chirurgicale, IH, IR severă; interacțiuni medicamentoase cu AINS, antiagregante plachetare, anticoagulante orale, heparină, salicilați și/sau derivați salicilici, trombolitice, teofilină, fenitoină, antiacide; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Hemoragii, greață și diaree ușoară, neutropenie, aplazie medulară, pancitopenie, purpură trombocitopenică, anemie hemolitică, rash maculopapular sau urticarie, prurit, hepatită, icter colestatic, vertij, cefalee, slăbiciune, pierderea apetitului, somnolență, tinitus, palpitații, nervozitate.

TIMOLOLUM

COD ATC: S01ED01

ARUTIMOL *ANKERPHARM GROUP CHAUVAIN;* Sol. oft. timolol 0,25% sau 0,5% (fl. × 5 ml) ***(P-RF)***

NYOLOL GEL® *NOVARTIS PHARMA SERVICES;* Gel. oft. 0,1% (fl. × 5 g + dop picurător) ***(P-RF)***

OPHTAMOLOL® 0,5% *DAR AL DAWA;* Sol. oft. 0,5% (fl. × 5 ml) ***(P-RF)***

TIMO-GAL *PHARMAPLANT BIOGALENICA SRL;* Sol. oft. 0,5% (fl. × 10 ml) ***(P-6L)***

TIMOLOL *E.I.P.I.C.O.;* Sol. oft. 0,25% (fl. × 5 ml) ***(P-RF)***

TIMOLOL MALEATE *E.I.P.I.C.O.;* Sol. oft. timolol 0,5% (fl. × 5 ml) ***(P-RF)***

TIMOLOL CHAUVIN 0,25%; TIMOLOL CHAUVIN 0,5% *LAB. CHAUVIN;* Sol. oft. 0,25% sau 0,5% (fl. × 5 ml) ***(P-RF)***

TIMOPTIC *MERCK SHARP & DOHME;* Sol. oft. timolol 0,25% sau 0,5% (fl. x 5 ml) ***(P-RF)***

Ind: Reducerea presiunii intraoculare crescute la pacienții cu: hipertensiune oculară, glaucom cronic cu unghi deschis, afakie cu glaucom, unele cazuri de glaucom secundar. Glaucom cu unghi închis sau antecedente de glaucom cu unghi închis, apărut spontan sau indus iatrogen, la ochiul neafectat, dacă este necesară reducerea presiunii intraoculare. Terapie concomitentă la pacienții cu glaucom congenital.
Dz: Inițial 1 pic. sol. 0,25%, de 2 ori/zi; doza poate fi crescută la 1 pic. sol. 0,5%, de 2 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la timolol; astm bronșic, BPCO, bradicardie sinusală, BAV de gradul II - III, IC manifestă, șoc cardiogen.
A!: Prudență în IC, afecțiuni cardiace severe în antecedente, prematuri sau nou-născuți, lentile de contact moi; interacțiuni medicamentoase cu adrenalină, chinidină, blocante ale canalelor de calciu, inhibitori ai terminațiilor simpatice, beta-blocante; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Iritație oculară, arsuri și înțepături oculare, conjunctivite, blefarite, keratite, scăderea sensibilității corneene, uscăciune oculară, tulburări vizuale, diplopie, ptoză palpebrală, detașare a coroidei, tinitus, bradicardie, aritmii, hTA, sincopă, blocuri, accident vascular cerebral, ischemie cerebrală, IC congestivă, palpitații, stop cardiac, edeme, claudicații intermitente, fenomene Raynaud, extremități reci, bronhospasm, insuficiență respiratorie, dispnee, tuse, cefalee, astenie, oboseală, dureri toracice, alopecie, rash psoriaziform sau exacerbare a psoriazisului, reacții alergice, urticarie, rash localizat sau generalizat, vertij, depresie, insomnie, coșmaruri, pierderea memoriei, accentuarea semnelor și simptomelor de miastenia gravis, parestezii, greață, diaree, dispepsie, uscăciunea gurii, scăderea libidoului, boală Peyronie, lupus eritematos sistemic.

TINIDAZOLUM

COD ATC: P01AB02
J01XD02

FASIGYN *PFIZER H.C.P. CORPORATION;* Cpr. filmate tinidazol 500 mg ***(P-RF)***

TINIZOL® 500 mg *SICOMED SA;* Cpr. filmate tinidazol 500 mg *(P-RF)*

TINIZOL® *SICOMED SA;* Sol. perf. tinidazol 0,2% (fl. × 250 ml) *(S)*

TIPROGYN 500 mg *AC HELCOR SRL;* Cpr. filmate tinidazol 500 mg *(P-RF)*

Ind: Profilaxia infecțiilor postoperatorii cauzate de bacterii anaerobe, în special celor asociate chirurgiei colonului, gastrointestinale și ginecologice. Trat. infecțiilor intraperitoneale, ginecologice, ale plăgilor postoperatorii, ale tegumentelor și țesuturilor moi, ale tractului respirator superior și inferior, septicemiilor. Vaginită nespecifică. Gingivită ulcerativă acută. Tricomoniază urogenitală. Giardioză. Amebioză intestinală. Amebioză hepatică.
Dz: Doza variază între 0,45-12 g/zi, în funcție de indicație. *Oral, adulți:* prevenirea infecțiilor post-operatorii: 2 g o dată, cu 12 ore înaintea intervenției chirurgicale; infecții cu germeni anaerobi: 2 g în prima zi, apoi 1 g/zi (în 1-2 prize) timp de 5-6 zile; vaginită nespecifică, gingivită ulcerativă, tricomoniază urogenitală, amebioză intestinală, giardioză 2 g/zi doză unică; amebiaza hepatică: 4,5-12 g/zi timp de 3 zile. *Copii:* 50-75 mg/kg corp în doză unică. *Adm. i.v.:* în infecții cu germeni anaerobi: doză de atac 800 mg, apoi 400 mg la 12 ore și se continuă cu doze orale (dacă este posibil) 1,5-2 g.
Cind: Hipersensibilitate la tinidazol, afecțiuni neurologice organice, discrazii sanguine, sarcină și alăptare.
A!: Băuturile alcoolice trebuie evitate; dacă apar semne neurologice anormale, trat. trebuie întrerupt. În tricomoniaza urogenitală se impune și tratamentul concomitent al partenerului.
RA: Greață, vărsături, anorexie, diaree, gust metalic, dureri abdominale, reacții de hipersensibilizare, leucopenie, cefalee, oboseală, limbă încărcată și urina închisă la culoare.

TINZAPARINUM *COD ATC: B01AB10*

INNOHEP *LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS;* Sol. inj. tinzaparină sodică corespunzător la 10 000 UI antifactor Xa/ml sau 20 000 UI antifactor Xa/ml *(P-RF)*

Ind: Trat. curativ al trombozei venoase profunde și al emboliei pulmonare; profilaxia trombozei venoase profunde la pacienții supuși unor intervenții chirurgicale generale sau ortopedice; prevenirea coagulării în circuitul circulației extracorporale sau pentru hemodializă.
Dz: Trat. trombozei venoase profunde și al emboliei pulmonare: 175 UI/kg inj. s.c., o dată pe zi. Profilaxia trombozei venoase: în ziua intervenției chirurgicale 3500-4500 UI inj. s.c. cu 2 ore înaintea intervenției și postoperator 3500 UI o dată pe zi, timp de 7-10 zile. Hemodializa pe perioadă scurtă: 2000-2500 UI în linia arterială a circuitului de dializă (sau i.v.), la începutul dializei. Hemodializa pe perioadă lungă: 2500 UI în linia arterială a circuitului de dializă (sau i.v.), la începutul dializei, apoi perf. 750 UI/oră.
Cind: Hipersensibilitate la tinzaparină, la alte preparate de heparină; trombocitopenie produsă de heparină; risc crescut de hemoragii.
A!: Prudență la pacienții cu risc de complicații hemoragice, IR, nou-născuți; monitorizarea hematologică; nu se inj. i.m.; interacțiuni medicamentoase cu acid acetilsalicilic, alte AINS, antiagregante plachetare, anticoagulante cumarinice, dextran; sarcină și alăptare.

RA: Hemoragii, mici echimoze la locul injecției, creșteri temporare ale transaminazelor, erupții cutanate, urticarie, angioedem, trombocitopenie, priapism, reacțiile anafilactice.

TIOGUANINUM *COD ATC: L01BB03*

LANVIS *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. thioguanină 40 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. leucemiilor acute, în mod special al leucemiilor mielocitare acute și al leucemiilor limfoblastice acute; trat. leucemiilor granulocitare cronice.
Dz: Inducție: 100-200 mg/m^2 și zi, timp de 5-20 zile. Întreținere: 60-200 mg/m^2, zilnic sau intermitent.
Cind: Având în vedere importanța indicațiilor, nu există Cind absolute.
A!: Monitorizarea hemoleucogramei; evitarea hiperuricemiei și/sau hiperuricozuriei; prudență în IR, IH, sdr. Lesch-Nyhan; interacțiuni medicamentoase cu busulfan; sarcină și alăptare.
RA: Intoleranță gastrointestinală, stomatite, necroză intestinală cu perforație, disfuncții hepatice, icter, ocluzia venei hepatice.

TIOTROPIUM *COD ATC: R03BB04*

SPIRIVA®18 µg *BOEHRINGER INGELHEIM;* Cps. cu pulb. inhal. 18 µg + dispozitiv HandiHaler ***(P-6L)***

Ind: Bronhodilatator indicat în tratamentul de întreținere al bronhopneumopatiei cronice obstructive (BPCO).
Dz: O dată pe zi, zilnic, la aceeași oră.
Cind: Pacienți sub 18 ani. Hipersensibilitate la tiotropină, ipratropină, oxitropină sau atropină. Nu se folosește în urgențe, în terapia de inițiere.
A!: Glaucom cu unghi îngust. Sarcină și alăptare.
RA: Reacții alergice, uscăciunea gurii, constipație, tahicardie, moniliază, sinuzită, faringită, dificultăți de micțiune.

TIROFIBANUM *COD ATC: B01AC17*

AGGRASTAT *MERCK SHARP & DOHME;* Conc. pt. sol. perf. 0,25 mg/ml (fl. × 50 ml) ***(S)***

Ind: Prevenirea infarctului miocardic precoce la pacienții cu angină instabilă sau infarct miocardic non-Q cu ultimul episod dureros precordial apărut în ultimele 12 ore și cu modificări ECG și/sau cu valori crescute ale enzimelor cardiace. Se utilizează împreună cu acid acetilsalicilic și heparină nefracționată.
Dz: Adm. i.v. cu un debit inițial de 0,4 µg/kg corp și minut timp de 30 min., apoi perf. de întreținere cu debit de 0,1 µg/kg corp și minut. IR severă: doza se ajustează la jumătate.
Cind: Hipersensibilitate; antecedente de accident cerebral în ultimele 30 de zile; afecțiuni intracraniene (neoplasm, anevrism, malformație arterio-venoasă);

hemoragii; HTA malignă; intervenții chirurgicale majore în ultimele 6 săptămâni; IH severă. Copii.
A!: Nu se recomandă adm. fără heparină nefracționată. Sarcină.
RA: Hemoragii, greață, febră, cefalee.

TIXOCORTOLUM

COD ATC: R01AD07

PIVALONE *LAB. JOUVEINAL;* Sol. nazală 1% (fl. × 10 ml) ***(P-RF)***

PIVALONE 1% *PARKE-DAVIS;* Susp. nazală 1% (fl. × 10 ml) ***(P-RF)***

Ind: Manifestări inflamatorii și alergice rinofaringiene: rinite alergice, rinite congestive acute și cronice.
Dz: 1-2 pulverizări în fiecare nară de 2 până la 4 ori pe zi.
Cind: Hipersensibilitate la pivalat de tixocortol; epistaxis.
RA: Reacții de intoleranță locală, senzație de urscăciune a mucoasei nazale, reacții alergice.

TOBRAMYCINUM

COD ATC: J01GB01
S01AA12

BRULAMYCIN *BIOGAL PHARMACEUTICAL WORKS;* Sol. oft. 0,3% (fl. × 5 ml + picurător); Sol. inj. 40 mg/ml (f. × 1 ml sau 2 ml) ***(P-RF)***

IKOBEL *RAFARM SA;* Sol. oft. 0,3% (fl. × 5 ml) ***(P-RF)***

TOBREX® *ALCON SRL;* Ung. oft. tobramicină 0,3% (tub × 3,5 g); Sol. oft. 0,3% (fl. × 5 ml + picurător) ***(P-RF)***

TOBRIN *E.I.P.I.C.O.;* Sol. oft. 0,3% (fl. × 5 ml) ***(P-RF)***

Ind: *Local:* infecțiile externe ale ochiului și anexelor, produse de germeni sensibili; otită externă provocată de microbi sensibili. *Sistemic:* infecții bacteriene grave cauzate de tulpini sensibile în septicemie, infecții ale tractului respirator inferior, meningită, infecții intraabdominale, infecții osoase și tegumentare, infecții ale tractului urinar.
Dz: *Local:* 1,5 cm ung. sau 1-2 pic. colir în sacul conjunctival inferior al ochiului afectat de 2-3 ori pe zi sau la fiecare 3-4 ore în infecțiile severe. *Sistemic: Adulți:* 3-5 mg/kg și zi inj. i.m. sau i.v. *Copii:* 6-7,5 mg/kg și zi. *Nou-născuți la termen sau prematurii care au o săpt. sau mai puțin:* până la 4 mg/kg și zi în două doze egale, la 12 ore.
Cind: Hipersensibilitate la tobramicină și la aminoglicozide; utilizarea auriculară la bolnavii cu timpanul perforat.
A!: Urmărirea atentă a evoluției afecțiunii; risc de rezistență, prudență în IR; interacțiuni medicamentoase cu alte aminoglicozide, sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: *Local:* hipersensibilitate, prurit, edem palpebral, eritem conjunctival. *Sistemic:* Neurotoxicitate asupra ramurilor vestibulare și acustice ale nervului VIII, amețeală, vertij, tinitus, zgomote puternice în urechi, pierderea auzului, nefro-

toxicitate, anemie, granulocitopenie și trombocitopenie, febră, erupții, dermatită exfoliativă, prurit, urticarie, greață, vărsături, diaree, cefalee, letargie, durere la locul de injectare, confuzie mentală și dezorientare.

TOCOPHEROLUM *COD ATC: A11HA03*

SICOVIT E 100 mg *SICOMED SA;* Cps. tocoferol 100 mg ***(OTC)***

VITAMINA E *SICOMED SA;* Sol. inj. tocoferol 30 mg/ml (f. × 1 ml) ***(P-RF)***

VITAMINA E *PHARCO PHARMACEUTICALS;* Cps. gelatinoase moi 100 mg; ct. × 24 cps. ***(OTC)***

VITAMINA E FORTE *BIOFARM SA;* Cps. tocoferol 100 mg ***(OTC)***

VITAMIN E 100; VITAMIN E 200; VITAMIN E 400 *SLOVAKOFARMA;* Cps. moi 100 mg, 200 mg sau 400 mg ***(OTC)***

Ind: Trat. și prevenirea carențelor în Vit. E: sindromul neurologic al bolnavilor cu malabsorbție; avort habitual, sterilitate; distrofii musculare; afecțiuni cardiovasculare; incontinența urinară la femei; retinopatia prematurilor; profilaxia fibroplaziei retrolentale la nou-născuții cărora li se adm. cantități mari de oxigen.
Dz: Oral, 100-300 mg/zi (fracționat); inj. i.m. 30-300 mg/zi (mai mult în arterite - până la 600 mg).
Cind: Hipersensibilitate la Vitamina E.
A!: Interacțiuni medicamentoase cu anticoagulante cumarinice.
RA: Tulburări gastrointestinale: diaree, dureri abdominale; oligo- și azoospermie, involuția ovarelor, tulburări menstruale.

TOFISOPAMUM *COD ATC: N05BA23*

GRANDAXIN *EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.;* Cpr. tofisopam 50 mg ***(P-RF)***

Ind: Tulburări vegetative, anxietate, lipsă de motivație, oboseală, apatie, nevroze, depresie reactivă, neurastenie; ameliorarea simptomelor nevrotice secundare; amendarea simptomelor produse de tulburările de climacteriu; sdr. de abstinență la alcoolici; miastenia gravis, miopatie, neuropatie, atrofie musculară.
Dz: 50-300 mg/zi, în 1-3 prize.
Cind: Psihopatii agresive.
A!: Prudență în sarcină și alăptare.
RA: Grețuri, dureri epigastrice, rash, hiperactivitate, agresivitate, tulburări de somn.

TOLBUTAMIDUM *COD ATC: A10BB03*

TOLBUTAMID 500 *SICOMED SA;* Cpr. tolbutamidă 500 mg ***(P-6L)***

TOLBUTAMID *SINTOFARM SA;* Cpr. tolbutamidă 500 mg ***(S/P-6L)***

Ind: Diabet non-insulinodependent, stabil, la adultul cu greutate normală.
Dz: 400-800 mg în prima zi; 300-600 mg în a doua zi; 300-500 mg în a treia zi; 100-300 mg în zilele următoare, ca trat. de întreținere. Adm. se face după mese, în 2 sau 3 prize pe zi.
Cind: Hipersensibilitate la tolbutamidă, diabet juvenil, diabet instabil, diabet cu acidoză, cetoză sau comă, diabet în prezența febrei, traumatismelor grave sau infecțiilor, IH gravă, insuficiența tiroidiană gravă, porfirie hepatică, sarcină.
A!: Prudență în IH; interacțiuni medicamentoase cu diureticele tiazidice și alte saluretice, glucocorticoizii, asociațiile estro-progestative, barbituricele, acidul nicotinic, hormonii tiroidieni, simpatomimeticele, clorpromazina, insulina, metformina, unele sulfamide antibacteriene, cloramfenicolul, tetraciclina, fenilbutazona, aminofenazona și alți pirazoli, clofibratul, blocantele beta-adrenergice, anticoagulantele cumarinice, salicilații, probenecidul, ciclofosfamida, alcoolul.
RA: Microgranuloame în diferite țesuturi, inclusiv în miocard.

TOLNAFTATUM *COD ATC: D01AE18*

MICONAFT *EUROPHARM SA;* Cremă tolnaftat 1% (tub × 40 g) ***(P-RF)***

Ind: Dermatofițiile pielii glabre, Tinea pedis, Tinea cruris, Tinea circinata corporis, Tinea unguium, Pitiriazis versicolor.
Dz: Se aplică în strat subțire, pe zona afectată a pielii și pe zona perilezională, de 2-3 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la tolnaftat.
A!: Nu este eficient în candidomicoze; prudență la sugari, dermatofiții pe suprafețe extinse, se evită contactul cu ochii.
RA: Iritație sau sensibilizare locală.

TOLPERISONUM *COD ATC: M03BX04*

MYDOCALM *GEDEON RICHTER Ltd.;* Sol. inj. 100 mg/ml (f. × 1 ml); Cpr. film. 50 mg sau 150 mg ***(P-RF)***

TOLPERISON 50 mg *PROMEDIC SRL;* Dj. 50 mg ***(P-RF)***

Ind: Hipertonie musculară, spasme musculare și contractură musculară asociată afecțiunilor locomotorii. Reabilitarea postoperatorie în ortopedie și traumatologie. Bolile vasculare obliterante și tulburări cauzate de lezarea inervației vasculare. Boala Little și alte encefalopatii asociate cu distonie.
Dz: *Adulți:* oral 150-450 mg/zi, inj. i.m. 100 mg de 2 ori/zi, inj. i.v. 200 mg/zi. *Copii:* oral 5 mg/k/zi.
Cind: Hipersensibilitate la tolperisonă. Miastenia gravis.
A!: Interacțiuni medicamentoase cu acid niflumic; prudență în sarcină și alăptare.
RA: Hipotonie musculară, cefalee, hTA, greață, vomă, disconfort abdominal, reacții de hipersensibilitate (prurit, eritem, urticarie, edem angioneurotic, șoc anafilactic, dispnee).

TOLTERODINUM

COD ATC: G04BD07

DETRUSITOL® *PHARMACIA – Membru al grupului PFIZER;* Cpr. film. L-tartrat de tolterodină 1 mg sau 2 mg ***(P-6L)***

DETRUSITOL SR *PHARMACIA – Membru al grupului PFIZER;* Cps. cu elib. prel. 2 mg, 4 mg ***(P-6L)***

Ind: Tratamentul simptomelor vezicii urinare hiperreactive cum sunt polakiuria, senzația imperioasă de micțiune sau incontinența urinară.
Dz: 2 mg tolterodină de 2 ori/zi; în IH 1 mg de 2 ori/zi. La copii siguranța și eficacitatea medicamentului nu au fost încă stabilite. De aceea, până la obținerea mai multor informații, tolterodina nu este recomandată la copii.
Cind: Hipersensibilitate la tolterodină; retenție urinară; glaucom cu unghi îngust, necontrolat prin trat.; miastenia gravis; forme grave de colită ulceroasă; megacolon toxic.
A!: Prudență în obstrucție urinară postvezicală importantă cu risc de retenție urinară; afecțiuni obstructive gastrointestinale; afecțiuni renale; afecțiuni hepatice; neuropatii vegetative; hernie hiatală; copii. Înainte de inițierea trat. cu tolterodină trebuie excluse cauzele organice ale polakiuriei și micțiunilor imperioase; interacțiuni medicamentoase cu antimuscarinice, agoniști ai receptorilor muscarinici, metoclopramidă, cisapridă; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Uscăciunea gurii, dispepsie, constipație, dureri abdominale, flatulență, vărsături, cefalee, parestezii, somnolență, nervozitate, xeroftalmie, piele uscată, tulburări ale acomodării, durere toracică, retenție urinară, confuzie.

TOPIRAMATUM

COD ATC: N03AX11

TOPAMAX *CILAG AG;* Cpr. 300 mg sau 400 mg; Cps. cu microsfere 15 mg ***(P-6L)***

TOPAMAX 25; TOPAMAX 50; TOPAMAX 100; TOPAMAX 200 *CILAG AG;* Cpr. film. 25 mg; 50 mg; 100 mg sau 200 mg ***(P-6L)***

Ind: Terapie asociată sau monoterapie, la adulți și copii cu epilepsie, pentru tratamentul crizelor parțiale (crize focale) și convulsiilor tonico-clonice generalizate. Terapie asociată în tratamentul convulsiilor asociate sindromului Lennox-Gastaut.
Dz: *Terapie asociată, adulți:* inițial: 25-50 mg/zi seara, timp de o săptămână, apoi doza se crește la 1-2 săptămâni cu 25-50 mg/zi. Doza totală zilnică se divide în două prize. Doza minimă eficace este de cca 200 mg/zi. Doza totală zilnică este de cca 200-400 mg/zi. *Terapie asociată, copii peste 2 ani:* Doza zilnică totală 5-9 mg/kg corp/zi în două prize. Se începe cu 25 mg seara timp de o săptămână. Ulterior doza se crește la 1-2 săptămâni cu 1-3 mg/kg corp/zi până la obținerea răspunsului clinic optim.
Monoterapie, adulți: Inițial 25 mg seara timp de 1 săptămână; la 1-2 săptămâni se crește doza cu 25-50 mg/zi. Doza zilnică maximă 500 mg în două prize. *Monoterapie, copii peste 2 ani:* inițial 1-3 mg/kg corp/zi seara, timp de o săptămână; apoi se crește cu 1-3 mg/kg corp/zi la 1-2 săptămâni. Doza totală 3-6 mg/kg corp/zi. Se poate ajunge la 500 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate.
A!: Întreruperea tratamentului se face treptat (cu cca 100 mg pe zi, săptămânal). Risc de formare a calculilor renali (mai ales la cei cu predispoziție la nefrolitiază); se recomandă hidratare adecvată. Șoferi și activități de precizie.
RA: În monoterapie: parestezii, cefalee, amețeală, oboseală, somnolență, pierdere în greutate, greață și diaree.

TOPOTECAMUM *COD ATC: L01XX17*

HYCAMTIN *GLAXO SMITHKLINE;* Pulb. pt. sol. inj. topotecan 1 mg sau 4 mg ***(S)***

Ind: Trat. în carcinom pulmonar cu celule mici; carcinom ovarian metastatic după eșecul terapiei de debut sau al celei ulterioare.
Dz: Doza inițială i.v.: 1,5 mg/m^2 și zi, timp de 5 zile consecutiv. Doza de întreținere: 1,25 mg/m^2 și zi.
Cind: Hipersensibilitate la topotecan; depresie medulară severă; sarcină și alăptare.
A!: Nu se adm. decât dacă numărul de neutrofile este peste 1,5 × 10^9/l, cel de trombocite peste 100 × 10^9/l; readm. se face dacă numărul de neutrofile este de minim 10^9/l și cel al trobocitelor de minim 100 × 10^9/l, iar valoarea hemoglobinei este de minim 9 g/dl; prudență la pacienții cu o stare generală alterată, IR, IH; șoferi și activități de precizie.
RA: Neutropenie, febră, infecții, septicemie, leucopenie, trombocitopenie, anemie, grețuri, vărsături, diaree, stomatită, constipație, dureri abdominale, oboseală, astenie, alopecie, anorexie, rash, indispoziție, hiperbilirubinemie.

TOREMIFENUM *COD ATC: L02BA02*

FARESTON *SCHERING-PLOUGH EUROPE AG;* Cpr. toremifen 60 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Tumori mamare la femei aflate la menopauză.
Dz: 60 mg zilnic.
Cind: Hipersensibilitate la toremifen, endometrioză, IH, sarcină și alăptare.
A!: Prudență în IC, angină pectorală, tulburări osoase, hipercalcemie, diabet, coagulopatii; interacțiuni medicamentoase cu tiazide, anticoagulante cumarinice, carbamazepină, fenitoină, fenobarbital, ketoconazol, eritromicină, troleandomicină.
RA: Bufeuri, transpirații, leucoree, grețuri, amețeli, edeme, dureri, vărsături, sângerări vaginale, dureri toracice, oboseală, dureri de spate, dureri de cap, decolorarea pielii, creștere în greutate, insomnie, constipație, dispnee, tremor, prurit, anorexie, tulburări de vedere reversibile și stare de slăbiciune.

TRAMADOLUM *COD ATC: N02AX02*

IZOFEN® 50 mg *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cps. 50 mg ***(P-RF)***

K-ALMA *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cps. 50 mg ***(P-RF)***

MABRON *MEDOCHEMIE Ltd.;* Sol. inj. tramadol 50 mg/ml (f. × 2 ml) ***(P-RF);*** Cps. tramadol 50 mg ***(S/P-RF)***

TRADOLAN® *LANNACHER HEILLMITTEL;* Sol. inj. tramadol 50 mg/ml (f. × 1 ml sau 2 ml); Sol. orală 100 mg/ml (fl. × 10 ml); Supoz. 100 mg; Cpr. film. 50 mg ***(P-RF)***

TRAMADOL *KRKA d.d.;* Supoz. 100 mg; Sol. inj. 50 mg/ml (f. × 1 ml sau 2 ml); Cps. 50 mg ***(P-RF)***

TRAMADOL 50 SLOVAKOFARMA® *SLOVAKOFARMA;* Cps. 50 mg ***(P-RF)***

TRAMADOL AL *ALIUD® PHARMA GmbH & Co.KG;* Sol. orală 100 mg/ml (fl. × 10 ml sau 20 ml) ***(P-RF)***

TRAMADOL AL 100 *ALIUD® PHARMA GmbH & Co.KG;* Sol. inj. 50 mg/ml (f. × 2 ml) ***(P-RF)***

TRAMADOL AL 50 *ALIUD® PHARMA GmbH & Co.KG;* Cps. 50 mg ***(P-RF)***

TRAMADOL EEL *BIO EEL SRL;* Cpr. 50 mg ***(P-RF)***

TRAMADOL LPH® 50 mg; *LABORMED PHARMA;* Cps. 50 mg (ct. × 2 blist. × 10 cps.; ct. × 100 blist. × 10 cps.) ***(S/P-RF)***

TRAMAGIT *JENAPHARM GmbH & Co.KG;* Sol. inj. 50 mg/ml (f. × 2 ml); Sol. orală 100 mg/ml (fl. × 10 ml); Cpr. 50 mg ***(P-RF)***

TRAMAL *GRUNENTHAL GmbH;* Supoz. 100 mg; Sol. orală 100 mg/ml (fl. × 10 ml); Sol. inj. 50 mg/ml (f. × 1 ml sau 2 ml); Cps. 50 mg ***(P-RF)***

TRAMAL RETARD 100 mg; TRAMAL RETARD 150 mg; TRAMAL RETARD 200 mg; *GRUNENTHAL GmbH;* Cpr. film. ret. 100 mg; Cpr. ret. 150 mg; Cpr. ret. 200 mg ***(P-RF)***

URGENDOL *WIN MEDICARE Ltd.;* Cps. 50 mg; Sol. inj. 50 mg/ml (f. ×1 ml sau 2 ml) ***(P-RF)***

Ind: Trat. durerilor de intensitate moderată - severă, acute și cronice.
Dz: *Int.: La adulți și adolescenți peste 14 ani:* 50 mg, eventual se repetă la 30-60 min; maxim 400 mg/zi. *Inj.:* i.v. lent, perf. i.v., i.m. sau s.c., inițial 100 mg; după o oră 50 mg la intervale de 10-20 de min, maxim 250 mg. La vârstnici: creșterea intervalului dintre doze. În IH și IR reducerea dozei sau mărirea intervalului dintre doze.
Cind: Hipersensibilitate la tramadol; intoxicație acută cu alte deprimante ale sistemului nervos; sdr. de abstinență la opioide; tulburări ale stării de conștiență de cauză necunoscută; insuficiență respiratorie severă sau deprimare a centrului respirator; trat. concomitent sau recent (mai puțin de 14 zile) cu IMAO; IH severă; copii sub 14 ani.
A!: Nu previne apariția sdr. de abstinență la morfină; risc mic de dependență; prudență în alcoolism, convulsii, epilepsie, dureri abdominale acute nediagnosticate, hipertensiune intracraniană, traumatisme craniene, vârstnici, IH, IR; interacțiuni medicamentoase cu IMAO, hipnotice, sedative, anxiolitice, alte opioide analgezice sau antitusive, antihistaminice H1, opioizi agoniști - antagoniști, inductori enzimatici, medicamente care scad pragul convulsivant, alcool etilic; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Urticarie, edem Quincke, bronhospasm, șoc anafilactic, risc convulsivant, greață, vărsături, somnolență, cefalee, amețeli, hipersudorație, uscăciunea gurii, constipație, dureri abdominale, rash, astenie, euforie, tulburări minore de vedere, deprimarea respirației, disforie și alterarea funcției cognitive.

TRAMAZOLINUM *COD ATC: R01AA09*

MUCONASAL® PLUS *BOEHRINGER INGELHEIM;* Sol. nazală 1,18 mg/ml (ct. × fl. × 10 ml + pompa dozatoare + aplicator nazal) ***(OTC)***

Ind: Inflamații ale mucoasei nazale (congestie nazală) asociate cu răceală comună și rinită alergică. Facilitarea drenajului secrețiilor în sinuzite și otite medii (ocluzia trompei lui Eustachio).
Dz: *Adulți:* 1 puf (0,0826 mg clorhidrat de tramazolin) de max. 4 ori pe zi, în fiecare nară. *Copii (6-12 ani):* 1 puf de max. 2 ori pe zi, în fiecare nară.
Cind: Copii sub 6 ani. Rinită uscată. Hipersensibilitate la substanța activă sau la excipienți.
A!: Produsul poate produce amețeli (atenție în cazul șoferilor sau activităților de precizie). Utilizarea prelungită poate duce la inflamație cronică prin tahifilaxie și la atrofia mucoasei nazale. Asocierea cu IMAO sau antidepresive triciclice poate determina HTA. Atenție la pacienții cu glaucom cu unghi închis. Se va evita contactul cu ochii. Precauție în sarcină și alăptare.
RA: Edem al mocoasei (hiperemie reactivă), senzație de arsură nazală la pacienții sensibili. Rar cazuri severe de greață, vărsături, amețeli, cefalee, secreții nazale, tulburări ale gustului. Este posibil să apară efecte cardiovasculare (palpitații, modificări ale frecvenței cardiace sau HTA).

TRANDOLAPRILUM *COD ATC: C09AA10*

GOPTEN® *ABBOTT GmbH & Co.KG;* Cps. trandolapril 0,5 mg sau 2 mg ***(P-6L)***

Ind: HTA esențială. Disfuncție ventriculară stângă după IMA.
Dz: 2 mg/zi într-o singură priză. Dacă Cl creatininei este 10-30 ml/min doza inițială este de 0,5 mg și se poate crește, dacă este necesar, la 1 mg. Dacă Cl creatininei este <10 ml/min doza este 0,5 mg o dată/zi.
Cind: Hipersensibilitate la trandolapril sau la un alt IEC; antecedente de angiodem asociat cu terapie anterioară cu IEC; edem angioneurotic sau ereditar; sarcină și alăptare.
A!: Monitorizarea funcției renale și a potasemiei în prima săpt. de trat.; prudență în IR, IH, deficiență hidrosalină, HTA severă, IC, vârstnici, stenoza de arteră renală; nu se va efectua dializă sau hemofiltrare; interacțiuni medicamentoase cu sare de bucătărie, hipotensoare, AINS, potasiu, diuretice economisitoare de potasiu, litiu, alcool, hipnotice, allopurinol, imunodepresive, citostatice, corticoizi, procainamidă; șoferi și activități de precizie.
RA: IC, HTA severă, amețeli, slăbiciuni, tulburări de vedere, tahicardie, palpitații, tulburări de ritm, angină pectorală, IMA, accidente ischemice tranzitorii, tulburări ale funcției renale, proteinurie, tuse iritativă uscată și bronșită, dispnee, sinuzite, rinite, bronhospasm, glosită, uscăciunea gurii, edem angio-neu-

rotic, greață, diaree, vărsături, constipație, inapetență, icter colestatic, IH, pancreatită, ileus, exantem, urticarie, febră, mialgii, artralgii, vasculite, eozinofilie, tulburări psoriaziforme, foto-sensibilitate, alopecie, onikoliză, sindrom Raynaud, cefalee, oboseală, depresii, tulburări de somn, impotență, parastezii, tulburări de echilibru, confuzii, vertij, vedere încețoșată, tulburări gustative sau pierderea trecătoare a gustului.

TRASTUZUMABUM

COD ATC: L01XC03

HERCEPTIN® 150 mg *HOFFMANN LA ROCHE;* Liof. Conc. sol. perf. 150 mg/fl. ***(S)***

Ind: Trat. neoplasmului de sân metastatic cu HER2 amplificat, ca monoterapie sau în asociere.
Dz: Inițial 4 mg/kg, apoi 2 mg/kg/săpt.
Cind: Hipersensibilitate la trastuzumab sau proteine murine, dispnee severă de repaus datorată complicațiilor afecțiunii maligne avansate sau care necesită terapie suplimentară cu oxigen, copii.
A!: Testarea HER2 este obligatorie înainte de începerea trat.; dacă apare o reacție severă la perf., aceasta trebuie întreruptă și pacienta trebuie monitorizată, prudență în dispnee de repaus, IC manifestă, HTA în antecedente sau boală coronariană dovedită; monitorizare cardiacă; sarcină și alăptare.
RA: Dureri abdominale, astenie, dureri toracice, frisoane, febră, cefalee, algii, diaree, greață, vărsături, artralgii, mialgii, rash, sindrom de tip gripal, lombalgie, infecții, dureri cervicale, senzație de disconfort, reacții alergice, mastită, pierdere în greutate, vasodilatație, tahicardie, hTA, IC, cardiomiopatie, palpitații, anorexie, constipație, dispepsie, sensibilitate hepatică, senzație de gură uscată, tulburări rectale (hemoroizi), leucopenie, echimoze, edeme, dureri osoase, crampe musculare, artrită, anxietate, depresie, amețeli, insomnie, parestezii, somnolență, hipertonie, neuropatii, tremor, astm, accentuarea tusei, dispnee, epistaxis, afecțiuni pulmonare, faringită, rinită, sinuzită, infectii ale tractului urinar, prurit, transpirație, modificări ale unghiilor, tegumente uscate, alopecie, acnee, rash maculopapular, modificarea gustului, reacții alergice, anafilaxie și șoc anafilactic, angioedem, ataxie, sepsis, febră, frisoane și febră, astenie, rigiditate, cefalee, pareză, dureri toracice, oboseală, simptome legate de perfuzie, edeme periferice, dureri osoase, comă, meningită, edem cerebral, tulburări de gândire, progresia neoplaziei, cardiomiopatie, descreșterea fracției de ejecție, revărsat pericardic, bradicardie, tulburări cerebro-vasculare, hepatită, sensibilitate hepatică, pancreatită, IH, icter, leucemie, neutropenie febrilă, neutropenie, trombocitopenie, anemie, hipoprotrombinemie, hiperkalemie, mialgii, degenerescență cerebeloasă paraneoplazică, glomerulonefrită membranoasă, IR, bronhospasm, detresă respiratorie, EPA, insuficiență respiratorie, dispnee, hipoxie, edem laringian, detresă respiratorie acută, sindrom de detresă respiratorie la adult, respirație Cheyne-Stokes, infiltrate pulmonare, pneumonie, edem papilar, lăcrimare anormală, hemoragie retiniană, surditate.

TRAVOPROSTUM

COD ATC: S01EX

TRAVATAN® *ALCON SRL;* Sol. oft. 40 µg/ml (fl. × 2,5 ml) ***(P-RF)***

Ind: Hipertensiune intraoculară sau glaucom cu unghi deschis (monoterapie sau terapie complementară).

Dz: 1 picătură în sacul conjunctival, o dată pe zi. Recomandabil a se adm. seara.
Cind: Persoane sub 18 ani. Hipersensibilitate. Sarcină și alăptare.
A!: Poate modifica culoarea irisului prin cresterea numărului de melanozomi în melanocite.
RA: *Local:* hiperemie oculară, prurit ocular, durere sau senzație de arsură, senzație de corp străin, modificarea culorii irisului, fotofobie, reacție celulară, keratită și congestie. *Efecte sistemice:* cefalee.

TRAZODONUM

COD ATC: N06AX05

TRITTICO AC 75 mg; TRITTICO AC 150 mg *CSC PHARMACEUTICALS/ ANGELINI FRANCESCO S.p.A.;* Cpr. elib. prel. 75 mg sau 150 mg ***(P-RF)***

Ind: Trat. depresiei, însoțită sau nu de anxietate.
Dz: *Int.* Inițial, 150 mg/zi; doza se poate crește la intervale de 3-4 zile, până la max. 450 mg pe zi.
Cind: Hipersensibilitate la clorhidrat de trazodonă sau la celelalte componente ale produsului.
A!: Prudență la pacienți cu afectări hepatice și renale grave. Adm. concomitentă de antihipertensive necesită reducerea dozei de antihipertensiv. Prudență la cardiaci. Dacă apar tulburări de erecție trat. trebuie imediat oprit. Hemograma este necesară dacă apar febră sau alte semne și simptome de infecție. În primele săpt. de trat. pacienții trebuie urmăriți atent. Nu se recomandă adm. la copii. Prudență în cazul asocierii cu alte medicamente psihotrope, digoxină, fenitoină, IMAO, warfarină. Terapia concomitentă cu electroșoc trebuie evitată în timpul trat. cu trazodonă. Prudență în timpul sarcinii și la femeile ce alăptează; la șoferi și activități de precizie.
RA: Somnolență, cefalee, astenie, vertij și episoade de hTA. Rar, tulburări digestive: greață, vărsături, scăderea apetitului. Priapism.

TRETINOINUM

COD ATC: D10AD01
L01XX14

AIROL®; AIROL® cremă *LAB. PIERRE FABRE;* Sol. cut. 0,05% (fl. × 50 ml); Cremă 0,05% (tub × 20 g) ***(P-RF)***

DIAMALIN 25 mg *SINDAN SRL;* Dj. 25 mg tretinoin ***(S/P-RF)***

RETIN-A® *CILAG AG;* Cremă 0,05% tretinoin (tub × 30 g) ***(P-RF)***

SMOODERM *DAR AL DAWA;* Cremă 0,05% (tub × 30 g) ***(P-RF)***

VESANOID *HOFFMANN LA ROCHE;* Cps. 10 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Adm. sistemic este indicat în trat. adjuvant al neoplaziilor, în leziuni preneoplazice și în afecțiuni dermatologice. Adm. topic este util în trat. acneei vulgare.
Dz: *Adm. int.:* 25-75 mg timp de 3-4 săpt. Nr. de cicluri de trat. și doza totală se ajustează în funcție de tolerabilitate și de rezultatele terapeutice. *Crema* trebuie aplicată o dată pe zi. Se acoperă cu un strat subțire de cremă

numai zona afectată (nu și în jurul acestei zone). Rezultatele terapiei apar după 1 1/2 - 3 luni de trat.

Cind: Hipersensibilitate la unul din componenții produsului. În sarcină și în timpul alăptării, hipervitaminoză A, IRA.

AI: Trat. trebuie întrerupt dacă apar semne de hipersensibilitate la tretinoin sau alte componente ale produsului. Pe parcursul trat. se vor urmări probele funcționale hepatice și renale. Există posibilitatea agravării acneei în primele 2-3 săpt. de trat. Pacienții cu hipersensibilitate la etretinat, isotretinoina sau alți derivați de vitamina A pot prezenta hipersensibilitate și la tretinoină. Precauție în cazul asocierii cu: agenți de curățire, descuamanți sau abrazivi; benzoil peroxid; minoxidil; medicamente fotosensibilizante.

RA: Semne și simptome ale hipervitaminozei A. Piele: uscăciune, eritem și rash, prurit, hipersudorație, scăderea pilozității. Membranele mucoase: cheilită, uscăciune a gurii, nasului, conjunctivei sau altor membrane, cu sau fără simptome inflamatorii. Sistemul nervos central: cefalee, pseudotumoră cerebrală (în special la copii), febră, tremor, amețeli, anxietate, parestezii, confuzie, depresie, insomnie, stare de rău. Simțuri: tulburări de vedere și auditive. Sistemul musculo-osos: dureri osoase, toracalgii. Tractul gastrointestinal: greață, vomă, durere abdominală, constipație, diaree, anorexie. Disfuncții metabolice, hepatice și renale: hipertrigliceridemie, hipercolesterolemie, creșterea transaminazelor și edeme. Aparatul respirator: dispnee, insuficiență respiratorie, pleurezie, raluri, wheezing. Aparatul cardio-vascular: aritmii, fibrilații. "Sindromul acidului retinoic" la pacienții cu LAP. Teratogenitate.

TRIAMCINOLONUM

COD ATC: R03BA06
H02AB08
R01AD11
D07AB09

AZMACORT INHALER *RHÔNE-POULENC RORER;* Sol. pt. aerosol 200 mg/ doză (fl. × 240 doze + „SPACE" dispozitiv) ***(P-6L)***

BERLICORT *BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP;* Cpr. 4 mg ***(P-RF)***

NASACORT® AQ *LAB. AVENTIS PHARMA;* Aerosol susp. nazală 55 μg/ doză (fl. × 120 doze) ***(P-RF)***

POLCORTOLONE *POLFA;* Cpr. 4 mg ***(P-RF)***

TRIAMCINOLON ACETONID *ANTIBIOTICE IAȘI;* Cremă 0,1% (tub × 12 g) ***(P-RF)***

Ind: *Sistemic:* astm bronșic, bronșită cronică cu emfizem, rinită alergică, reacții alergice cutanate, dermatită de contact, dermatită atopică, pemfigus vulgar, psoriazis, dermatita herpetiformă, dermatita atopică, exfoliativă, eczematoasă, boala serului, polimialgie reumatoidă, colagenoze în faza pasivă, poliartrite cronice, artrita juvenilă, dermatite alergice, fibroză pulmonară, sarcoidoză, sindrom nefrotic, leucemie limfatică, limfosarcom, limfogranulomatoză, purpură trombopenică, anemie hemolitică. *Local:* intraarticular în afecțiuni articulare inflamatorii cronice, artrită exsudativă în gută și pseudo-gută, artroză activată, hidrops articular intermitent, umăr blocat cu atrofia sinovialei; inflamații cronice ale sinovialei; intrafocal în bursite, periostite și adenopatii; intralezional în focare izolate de psoriazis, lichen plan, lichen cronic simplu, alopecie cu zone

circumscrise, lupus cronic diseminat discoid și pentru cheloide. *Inhalator:* în astm bronșic.
Dz: *Sistemic:* Oral: inițial la 24-40 mg/zi, doza de întreținere este de 2-8 mg/zi. *Copii:* 1/3-1/2 din doza unui adult. Inj. i.m.: 40-80 mg la interval de cel puțin 4 săpt. *Local.* Intraarticular 10-40 mg la interval de cel puțin 2 săpt. Intralezional 40 mg la interval de cel puțin 2 săpt. *Inhalator: Adulți:* 400 µg de 3-4 ori/zi. *Copii 6-12 ani:* 200-400 µg de 3-4 ori/zi.
Cind: *Sistemic:* ulcer gastric și duodenal, osteoporoză, tulburări psihice, infecții produse de viruși, varicelă, amibiază, micoze sistemice, poliomielită, cu 8 săpt. înainte și 2 săpt. după o vaccinare, cataractă. *Local:* varicelă, reacții postvaccinare, procese cutanate tbc sau luetice, micoze, piodermite, keilite, acnee rozacee, infecții respiratorii. *Inhal.:* Trat. primar al status asthmaticus sau al altor episoade astmatice acute ce impun terapia intensivă; hipersensibilitate la triamcinolonă.
A!: Corticoterapia nu se întrerupe brusc; prudență în ulcer gastroduodenal, diverticulită, anastomoze intestinale recente, miozită, tendință la tromboză și embolie, carcinoame cu metastaze, diabet zaharat, boli renale, glomerulonefrită acută, nefrită cronică, limfadenită consecutivă vaccinării B.C.G., copii, TBC în antecedente; nu va fi utilizată pentru trat. crizei de astm; interacțiuni medicamentoase cu digitalice, diuretice, antidiabetice, anticoagulante cumarinice, rifampicină, fenitoină, barbiturice, AINS; sarcină și alăptare.
RA: *Sistemic:* față “în lună plină”, adipozitate, miopatie, atrofie, osteoporoză, scăderea toleranței la glucoză, activarea sau agravarea diabetului, tulburări ale secreției hormonilor sexuali, teleangiectazii, peteșii, echimoze cutanate, acnee, pierderi de potasiu, tulburări gastrointestinale, ulcer gastroduodenal, creșterea riscului la infecții, scăderea capacității de apărare a organismului, întârzierea procesului de vindecare a rănilor sau de sudare a oaselor, tulburări de creștere la copii, necroze osoase aseptice, cefalee, HTA, transpirație excesivă, amețeli, glaucom, cataractă, tendință la tromboză, pancreatită, inactivarea sau atrofierea corticosuprarenalei, depresie. *Local:* necroze aseptice ale oaselor, senzație de căldură, modificări ale pielii, dilatarea capilarelor, acnee steroidiană, vezicule la nivelul pielii, hipertricoză, foliculită, modificări pigmentare și inflamația tegumentului perioral. *Inhalator:* candidoză bucală, orofaringiană, senzație de uscăciune în gât, wheezing, tuse.

TRIETANOLAMINUM *COD ATC: D11AXN4*

BIAFINE *LAB. MEDIX;* Emulsie; tub × 93 g sau 186 g ***(P-RF)***

Ind: Eritem secundar radioterapiei; arsuri de gradul I-II; plăgi neinfectate.
Dz: Eritem secundar radioterapiei: 2-3 aplicații/zi. Arsuri de gradul II și alte plăgi cutanate neinfectate: după curățarea plăgii, se aplică un strat gros care să depășească mult suprafața leziunii și se repetă adm. pentru a menține permanent un excedent de emulsie la nivelul leziunii. Arsuri de gradul I: se aplică un strat gros până când pielea nu mai absoarbe emulsia. Se masează ușor zona afectată. Se repetă adm. de 2-4 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre excipienții produsului; plăgi hemoragice; leziuni infectate.
A!: Produsul nu asigură protecție împotriva arsurilor solare. Sarcina și alăptarea.
RA: Dureri moderate și tranzitorii la locul aplicării. Rar au fost semnalate reacții alergice.

TRIFLUOPERAZINUM *COD ATC: N05AB06*

TRIFLUOPERAZIN *SICOMED SA;* Sol. inj. trifluoperazină 2 mg/ml (f. × 1 ml) ***(S/P-RF)***

Ind: Schizofrenii acute și cronice, psihoze maniaco-depresive, encefalopatii cronice, delirium tremens, psihoze de involuție; nevroze în care predomină componenta anxioasă, anumite sindroame psihosomatice; vărsăturile postoperatorii sau cele de sarcină; kinetoze; cefalee și migrenă.
Dz: *Adulți:* 0,004-0,060 g/zi, în funcție de indicație. *Copii 6-12 ani:* 0,002-0,015 g/zi.
Cind: Stări comatoase; intoxicații acute cu alcool, barbiturice; discrazii sanguine, deprimarea măduvei hematogene, leziuni hepatice sau renale severe preexistente; copii sub 6 ani.
A!: Prudență la cardiaci, modificări retiniene, IR, IH; interacțiuni medicamentoase cu anestezice, barbiturice; sarcină și alăptare.
RA: Fenomene extrapiramidale de tip akinetic - hiperton sau hiperkinetic - diston, insomnie, oboseală musculară, anorexie, galactoree, tulburări de acomodație, erupții cutanate, hepatită toxică, agranulocitoză, hTA, hipotermie.

TRIFLUSALUM *COD ATC: B01AC18*

AFLEN® *SICOMED SA;* Cps. 300 mg triflusal; ct. × 5 blist. × 10 cps. ***(P-RF)***

Ind: Profilaxia accidentelor tromboembolice. Tratamentul complicațiilor trombotice.
Dz: Oral, 300-600 mg triflusal (1-2 capsule) pe zi, în funcție de situația clinică. Capsulele se înghit întregi în timpul sau la sfârșitul meselor. În cazuri particulare, se recomandă următoarele doze: pacienți cu risc crescut de episoade trombotice: 900 mg triflusal (3 capsule) pe zi, iar ca doză de întreținere, 600 mg triflusal (2 capsule) pe zi; profilaxia accidentelor tromboembolice: 300 mg triflusal (1 capsulă) zilnic sau la 2 zile.
Cind: Hipersensibilitate la triflusal, la salicilați sau excipienții produsului. Leziuni gastrointestinale active (de exemplu, gastrite erozive, ulcer gastroduodenal activ) sau antecedente de leziuni gastrointestinale recurente. Accidente hemoragice cerebrovasculare acute. Hepatopatie severă. Diateze hemoragice. Trimestrul III de sarcină.
A!: În timpul tratamentului pe termen lung sunt necesare controale hematologice regulate. Prudență la pacienții cu insuficiență renală cronică severă. Nu se recomandă în cursul primelor 6 luni de sarcină și în cursul alăptării. Precauții la asocierea cu anticoagulante orale și antidiabetice orale.
RA: Reacții adverse gastrointestinale, la pacienții predispuși. La supradozare apar: stimulare sau deprimare a SNC, tulburări ale aparatului respirator, circulator și ale echilibrului electrolitic, hemoragii gastrointestinale și diaree. Tratament: cărbune activat, evacuarea conținutului gastric prin lavaj gastric, corectarea echilibrului electrolitic și tratament simptomatic.

TRIHEXYPHENIDYLUM *COD ATC: N04AA01*

ROMPARKIN *ARMEDICA SA;* Cpr. 2 mg ***(P-6L)***

ROMPARKIN® 2 mg *TERAPIA SA;* Cpr. 2 mg ***(P-6L)***

Ind: Boala Parkinson, în special în formele incipiente; parkinsonism provocat de neuroleptice.
Dz: *Adulți:* În boala Parkinson 4-10 mg/zi (în 2-3 prize, după mese) eventual în asociere cu levodopa; în sd. extrapiramidal produs de neuroleptice 4-14 mg/zi, maxim 10 mg/zi la bătrâni. *Copii:* 2-6 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la trihexifenidil, glaucom cu unghi îngust, hipertrofie de prostată cu retenție urinară, stenoză pilorică, epilepsie, atonie intestinală și vezicală, tahiaritmii supraventriculare, fibrilație atrială.
A!: Prudență în sensibilitate crescută la parasimpaticolitice, hipertensivi, IMA, IC, IH și IR; trat. nu se întrerupe brusc; interacțiuni medicamentoase cu amantadină, chinidină, antidepresive triciclice, imipramină, desipramină; sarcină și alăptare.
RA: Uscăciunea gurii, tulburări de vedere, hipotonie oculară, tahicardie, greutate în micțiune, constipație, greață, vomă, amețeli.

TRIMEBUTINUM *COD ATC: A03AA05*

COLOBUTINE *LAB. FOURNIER SA;* Cpr. 100 mg ***(P-6L)***

DEBRIDAT *PARKE-DAVIS;* Gran. pt. susp. orală 24 mg/5 ml (fl. cu gran. pt. 250 ml susp. + măsura dozatoare), 1,2 g/250 ml ***(P-6L)***

DEBRIDAT 100 mg *PARKE-DAVIS - GROUPE PFIZER;* Cpr. film. 100 mg ***(P-6L)***

IBUTIN® *SICOMED SA;* Cpr. film. cu elib prel.

PROMEBUTIN *PROMEDIC SRL;* Cpr. 100 mg

Ind: Sdr. de colon iritabil sau tulburări digestive funcționale (dureri, crampe abdominale, spasme, balonări, diaree și/sau constipație. La copii în colici, abdomen cronic dureros și tulburări de tranzit intestinal (se poate adm. din prima săptămână de viață).
Dz: *Adulți: Cpr. film.* 100-200 mg de 3 ori pe zi. *Susp.* (adăugare de apă fiartă și răcită) 1-2 lingurițe de 3 ori/zi. *Copii:* 1 ml/kg corp și zi divizat în 2-3 prize; *sugari sub 6 luni:* 1/2 linguriță de 2-3 ori/zi; *sugari 6 luni - 1 an:* 1 linguriță de 2 ori/zi; *1-5 ani:* 1 linguriță de 3 ori/zi; *peste 5 ani:* 2 lingurițe de 3 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la trimebutină.
RA: Reacții cutanate.

TRIMETAZIDINUM *COD ATC: C01EB15*

DILATAN 20 mg *TERAPIA SA;* Cpr. film. 20 mg ***(P-6L)***

PREDUCTAL® *LAB. SERVIER IND.;* Cpr. film. 20 mg ***(P-6L)***

PREDUCTAL® MR *LAB. SERVIER IND.;* Cpr. film. elib. mod. 35 mg ***(P-6L)***

TAZIDIL® 20 mg *PROMEDIC SRL;* Dj. 20 mg ***(P-6L)***

TRIMETAZIDINĂ 35 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. film. cu elib. modif. 3,5 mg ***(S/P-6L)***

Ind: Trat. pe termen lung al ischemiei coronariene, prevenirea crizei de angor în caz de insuficiență coronariană cronică; afecțiuni vasculare corio-retiniene; vertij de origine vasculară, vertij Ménière, acufene.

Dz: 20 mg de 3 ori/zi, în timpul meselor.
Cind: Hipersensibilitate la trimetazidină.
A!: Prudență în IR; sarcină și alăptare.
RA: Tulburări gastrointestinale cu grețuri și vărsături.

TRIPHOSPHADENINUM *COD ATC: C01EBN1*

FOSFOBION *SICOMED SA;* Sol. inj. 10 mg/ml sarea disodică a acidului adenozintrifosforic (ATP) (f. × 1 ml) ***(S/P-RF)***

Ind: Procese distrofice și atrofice musculare, insuficiență coronariană cronică și miodistrofii post-IMA, sdr. de ischemie periferică, tahicardii paroxistice supraventriculare, poliomielită și scleroză multiplă.
Dz: Inj. i.m., i.v. sau intraarterial, 1-3 ml/zi timp de 15-20 zile, putându-se relua după o pauză de 10-15 zile. În ischemiile cronice, 20-30 ml în 200-300 ml ser fiziologic în perf. intraarterială pe cateter în artera femurală.
Cind: IMA recent.
RA: Cefalee, amețeli, dureri precordiale, bradicardie, dispnee, poliurie.

TRIPTORELINUM *COD ATC: L02AE04*

DIPHERELINE 0,1 mg *IPSEN BIOTECH;* Pulb. și solv. pt. sol. inj. triptorelină 0,1 mg/fl. ***(S/P-RF)***

DIPHERELINE® 3,75 mg *BEAUFOUR IPSEN INT.;* Pulb. liof. și solv. pt. susp. inj. i.m. elib. prel. triptorelină 3,75 mg/fl. ***(S/P-RF)***

DIPHERELINE® 11,25 mg *BEAUFOUR IPSEN INT.;* Pulb. liof. și solv. pt. susp. inj. i.m. elib. prel. triptorelină 11,25 mg/fl. ***(S/P-RF)***

Ind: *La bărbat:* cancer de prostată avansat cu metastaze. *La copil:* trat. pubertății precoce la fetițe sub 8 ani și băieți sub 10 ani. *La femeie:* trat. endometriozei cu localizare genitală sau extragenitală, fibrom uterin, cancer de sân; trat. infertilității feminine ca trat. complementar în fertilizarea in vitro urmată de transfer embrionar.
Dz: *Cancer de prostată:* inj. s.c. 0,1 mg zilnic timp de 7 zile, apoi inj. i.m. 3,75 mg la 28 zile. *Pubertate precoce:* inj. i.m. 50 g/kg la fiecare 4 săpt. *Endometrioză:* inj. i.m. de 3,75 mg în primele 5 zile ale ciclului, repetat lunar. *Infertilitate feminină:* inj. i.m. 3,75 mg în ziua a 2-a a ciclului, apoi din ziua a 15-a începe injectarea de gonadotrofine.
Cind: Sarcină și alăptare.
A!: Monitorizate clinică, biologică și radiologică; prudență în metroragii, ovare polichistice.
RA: *La bărbat:* tulburări urinare, dureri osoase, valuri de căldură, durere la locul de injectare, scăderea libidoului, impotență. *La copil:* la fetițe mici hemoragii vaginale. *La femeie:* bufeuri de căldură, mucoasă vaginală uscată, cefalee, astenie, pierdere osoasă, dureri pelviene și/sau abdominale.

TROMETAMOLUM (THAM)

COD ATC: B05BB03

TROMETAMOL N *BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP;* Sol. perf. (fl. × 500 ml) *(S)*

Ind: Cazuri selecționate de acidoză metabolică în cadrul chirurgiei cardiace, intervenții chirurgicale cu circulație extracorporală, posttransfuzional, arsuri grave, comă diabetică, edem cerebral, edem pulmonar sever și IR funcțională, postoperatorie; acidoză respiratorie acută gravă; intoxicații acute cu barbiturice, salicilați și alcool metilic.
Dz: Se stabilește doza în funcție de gravitatea acidozei. *Tamponare standard la adulți:* 5-10 ml/kg/oră, în medie 500 ml/oră; doza zilnică este de 1000-2000 ml; *nou-născuți, sugari și copii:* 10-20 ml/kg corp/zi. Perfuzare strict i.v. timp de cel puțin o oră.
Cind: Alcaloză, IR severă, insuficiență respiratorie cronică, soc, hiperhidratare, hipokaliemie, hiponatremie, oligoanurie.
A!: Injectarea paravenoasă poate provoca necroză locală. Prudență în acidoza respiratorie acută (creșterea pH-ului deprimă centrul respirator, facând necesară asistarea respirației). Monitorizarea glicemiei (risc de hipoglicemie), a ionogramei serice, conc. de bicarbonat, presiunii parțiale a CO_2 și a echilibrului acido-bazic. Menținerea unei diureze corespunzătoare. IR impune reducerea dozelor.
RA: La perfuzare prea rapidă risc de iritare a peretelui venos și hemoliză, tromboflebită, deprimarea respirației, hipoglicemie, dezechilibre hidroelectrolitice.

TROPICAMIDUM

COD ATC: S01FA06

MYDRIACYL *ALCON SRL;* Sol. oft. tropicamidă 0,5% sau 1% (fl. × 15 ml) *(S/P-RF)*

MYDRUM *ANKERPHARM GROUP CHAUVIN;* Sol. oft. tropicamidă 0,5% (fl. × 10 ml) *(S/P-RF)*

TROPICAMIDĂ *PHARMAPLANT BIOGALENICA SRL;* Sol. oft. 0,5%, (fl. × 10 ml) *(S/P-RF)*

TROPIXAL *DEMO SA;* Sol. oft. 0,5% *(S/P-RF)*

Ind: Obținerea midriazei și cicloplegiei în scop diagnostic.
Dz: Pentru refracție se instilează 1-2 pic. sol. 1%; se repetă la 5 minute. Pentru examinarea fundului de ochi, se instilează 1-2 pic. din sol. 0,5%, cu 15-20 min. înaintea examinării.
Cind: Hipersensibilitate la tropicamidă, glaucom cu unghi îngust.
A!: Nu se injectează, prudență când presiunea intraoculară este crescută sau nu se cunoaște, când camera anterioară este puțin adâncă.
RA: Senzație de usturime (arsură, înțepătură).

TROXERUTINUM

COD ATC: C05CA04

MEDOXERUTIN *MEDIPHARMA SERV SRL;* Gel 2% (tub × 40 g) *(OTC)*

TROXERUTIN *CHIRMIS FARMIMPEX;* Gel 2% (tub × 50 g) *(OTC)*

TROXERUTON 300 *MEDIPHARMA SERV. S.R.L.;* Cpr. troxerutină 300 mg *(OTC)*

TROXEVASIN *BALKAN PHARMA TROYAN AD;* Cps. troxerutină 300 mg; Gel 2% (tub × 40 g) *(OTC)*

TROXSAL® GEL 2% *SLAVIA PHARM SRL;* Gel 2% (tub × 45 g) *(OTC)*

VEINAMITOLV 3500 mg *NEGMA LERADS;* Pulb. 3,5 g/plic (ct. × 10 plicuri) *(OTC)*

VENOTON *EUROPHARM SA;* Gel 2% troxerutină (tub × 40 g) *(OTC)*

VENORUTON *NOVARTIS CONSUMER HEALTH;* Cps. 300 mg; Gel 2% *(OTC)*

Ind: Medicație simptomatică în boala venoasă - varice, hemoroizi. Adjuvant în afecțiuni însoțite de fragilitate capilară: hemoragii retiniene, ateroscleroză, diabet etc.
Dz: *Int.:* Inițial 300 mg de 2-3 ori/zi. Întreținere 300 mg/zi timp de 2-4 săpt. *Ext.* se aplică de 2 ori/zi, timp de 2-3 săpt.
Cind: Hipersensibilitate la troxerutină.
A!: Trat. trebuie să fie scurt; prudență în sarcină și alăptare.
RA: Greață, cefalee, erupții cutanate.

U

UBIDECARENONUM *COD ATC: C01ED09*

COENZIMA Q10 *LAROPHARM SRL;* Cps. × 15 mg coenzima Q10, ct. × 2 blist. × 10 cps. *(OTC)*

COENZIMA Q 10 10, 15, 30 *WALMARK;* Gelule 10 mg, 15 mg, 30 mg *(OTC)*

EURO 10 *PHARCO PHARMACEUTICALS;* Cps. *(OTC)*

Ind: Supliment nutritiv (neexcluzând tratamentul medicamentos de bază) în diferite afecțiuni cardiovasculare, în paradontoză (deoarece stimulează procesul imun și ajută la refacerea țesuturilor gingivale), în afecțiuni ale ficatului și pancreasului, alergii (asigurând energia necesară funcționării normale a diferitelor organe și țesuturi ca urmare a proprietăților antioxidante). Întârzie procesele naturale ale îmbătrânirii. Menține un tonus general ridicat fiind indicat ca supliment nutritiv persoanelor care desfășoară o activitate fizică sau intelectuală intensă, ca și sportivilor de performanță, oferindu-le posibilitatea să se antreneze o perioadă mai mare de timp. Poate fi indicat și în curele de slăbire.
Cind: Sensibilitate la unul din componenții produsului.
Dz: 1-2 capsule/zi.

UROFOLLITROPINUM

COD ATC: G03GA04

FOLLEGON *N.V. ORGANON;* Pulb. pt. sol. inj. urofolitropină (FSH) 75 UI (f. × 1 ml) ***(P-RF)***

Ind: Inducerea ovulației la paciente cu sd. de ovare polichistice și amenoree sau anovulație și sd. de infertilitate datorate dezechilibrului hormonal prin creșterea raportului LH/FSH.
Dz: Inj. i.m. în funcție de concentrația estrogenilor plasmatici sau urinari, până la obținerea unui nivel estrogenic satisfăcător: 75-150 UI.
Cind: Hipersensibilitate la urofolitropină; situațiile în care nu este posibil un răspuns terapeutic eficient: sarcină, menopauză precoce, disgenezie ovariană sau uterină, insuficiență ovariană hipergonadotropică, sterilitate fără deficit al maturării foliculare normale, metroragii cu etiologie necunoscută, carcinoame ovariene, uterine sau mamare.
A!: Va fi efectuat în primul rând tratamentul specific al afecțiunilor primare, este necesară spermograma corespunzătoare; risc de hiperstimulare ovariană și de ovulație multiplă; monitorizarea secreției estrogenilor ovarieni, fie prin determinări directe, fie cu ajutorul parametrilor indirecți.
RA: Dureri hipogastrice, distensie abdominală, hipertrofie ovariană, sarcini multiple, avort.

V

VALACYCLOVIRUM

COD ATC: J05AB11

VALTREX *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. valaciclovir 500 mg ***(P-RF)***

Ind: Trat infecției cu herpes zoster.
Dz: 1000 mg de 3 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la valaciclovir și aciclovir.
A!: Prudență în IR, copii; interacțiuni medicamentoase cu cimetidină, probenecid; sarcină și alăptare.
RA: Cefalee, greață, IR, anemie hemolitică, trombocitopenie, rash.

VALDECOXIBUM

COD ATC: M01AH03

BEXTRA *PFIZER H.C.P.;* Cpr. film. × 10 mg valdecoxib; ct. × 1 blister × 5 cpr. film.; ct. × 1 blister × 10 cpr. film.; ct. × 2 blistere × 10 cpr. film.; ct. × 3 blistere × 10 cpr. film.; ct. × 5 blistere × 10 cpr. film.; ct. × 10 blistere × 10 cpr. film.; ct. × 1 fl. × 300 cpr. film.; ct. × 1 fl. × 500 cpr. film.

BEXTRA *PFIZER H.C.P.;* Cpr. film. × 20 mg valdecoxib; ct. × 1 blister × 5 cpr. film.; ct. × 1 blister × 10 cpr. film.; ct. × 2 blistere × 10 cpr. film.; ct. × 3 blistere × 10 cpr. film.; ct. × 5 blistere × 10 cpr. film.; ct. × 10 blistere × 10 cpr. film.; ct. × 1 fl. × 300 cpr. film.; ct. × 1 fl. × 500 cpr. film.

BEXTRA *PFIZER H.C.P.;* Cpr. film. × 40 mg valdecoxib; ct. × 1 blister × 2 cpr. film.; ct. × 1 blister × 5 cpr. film.; ct. × 1 fl. × 300 cpr. film.; ct. × 1 fl. × 500 cpr. film.

Ind: Ameliorarea simptomatică în tratamentul osteoartritei sau poliartritei reumatoide. Tratamentul dismenoreei primare.
Dz: Oral, cu sau fară alimente. Osteoartrita și poliartrita reumatoidă: 10 mg o dată pe zi. Doza maximă recomandată este 20 mg o dată pe zi. Tratamentul dismenoreei primare: 40 mg o dată pe zi, la nevoie. În prima zi de tratament, se poate lua înca o doză de 40 mg, la nevoie. După aceea, doza maximă recomandată este 40 mg o dată pe zi. La pacienții *vârstnici* (≥ 65 ani), în special cei cu greutate corporală sub 50 kg, se adm. 10 mg o dată pe zi. La pacienții cu insuficiență hepatică moderată (clasa B Child-Pugh), în osteoartrita și poliartrita reumatoidă se adm. 10 mg o dată pe zi, iar în dismenoree, 20 mg pe zi. Nu este recomandată administrarea la pacienți sub 18 ani.
CI: Hipersensibilitate la substanță activă sau excipienți. Hipersensibilitate la sulfonamide. Antecedente de bronhospasm, rinită acută, polipi nazali, edem angioneurotic, urticarie sau reacții de tip alergic după administrarea de acid acetilsalicilic, compuși AINS sau alți inhibitori selectivi ai ciclooxigenazei-2 (COX-2). Ultimul trimestru de sarcină și perioada de alăptare. Ulcer peptic activ sau hemoragie gastro-intestinală. Boala inflamatorie intestinală. Insuficiență cardiacă congestivă severă. Insuficiență hepatică severă (clasa C Child-Pugh).
A!: Prudență la administrare după bypass coronarian, antecedente de hipertensiune arterială, insuficiență cardiacă, alterări ale funcției renale, insuficiență hepatică moderată (clasa B Child-Pugh), antecedente de boli gastro-intestinale, ulcerații sau afecțiuni inflamatorii. Se întrerupe administrarea la apariția primelor manifestări alergice de tip erupții cutanate. Poate masca febra. Monitorizarea plăgii pentru depistarea eventualelor infecții la pacienți cu intervenții chirurgicale. Prudență la asocierea cu warfarina, diuretice, antihipertensive, IEC, ciclosporină, tacrolimus, ketoconazol, flecainidă, propafenonă, metoprolol, fenitoină, dextrometorfan, omeprazol, diazepam, imipramina, metotrexat, litiu, contraceptive orale. Nu este indicat la femei care încearcă să aibă copii și la femei care alăptează. Atenție la conducători auto și pacienți care utilizează utilaje.
RA: Reacțiile adverse frecvente (≥ 1/100, < 1/10): uscăciunea gurii, hipertensiune arterială, edeme periferice, meteorism abdominal, dureri abdominale, osteită alveolară, diaree, dispepsie, eructații, greață, insomnie, somnolență, anemie, tuse, faringită, sinuzită, prurit, erupții cutanate, infecții ale căilor urinare. Mai puțin obișnuite (≥ 1/1000, < 1/100): hipertensiune arterială agravată, sincopă, supurație seroasă anormală a inciziei sternale, agravarea alergiilor, edeme generalizate, edeme periorbitare, infecții ale plăgilor, insuficiența cardiacă, hipertonie, hipoestezie, parestezii, duodenită, gastroenterită, ulcerații gastroduodenale, reflux gastroesofagian, stomatită, palpitații, creșteri ale AST și ALT, creșterea fosfatazei alcaline, ureei, creatininei, creatin-fosfokinazei, creșterea în greutate, echimoze, anxietate, confuzie, nervozitate, moniliază, infecții virale, bronhospasm, pneumonie, urticarie, tulburări ale gustului, albuminurie, hematurie, oligurie, hematoame, vedere încețoșată, conjunctivită. Rare (≥ 1/10000, < 1/1000): disfonie, hematochezie, hematemeză, ocluzie intestinală, trombocitopenie, depresie, angioedem, fotosensibilizare, nefrită, afecțiuni cerebrovasculare, leucopenie. După intervenția chirurgicală de bypass coronarian, pacienții tratați cu valdecoxib 80 mg/zi pot prezenta un risc crescut de reacții adverse, precum accidente vasculare cerebrale, disfuncții renale sau complicații ale plăgii sternale. Reacții adverse rare și grave - au fost consemnate în asociere cu AINS, neputând fi excluse în cazul valdecoxibului:

insuficiență renală acută, hepatită. În cadrul experienței post-marketing au fost observate următoarele reacții: reacții anafilactice, angioedem, eritem polimorf, sindrom Stevens-Johnson, dermatită exfoliativă și necroliză toxică epidermică.

VALGANCICLOVIRUM

COD ATC: J05AB14

VALCYTE *HOFFMANN LA ROCHE;* Cpr. film. 450 mg valganciclovir ***(P-RF)***

Ind: Inducția și menținerea tratamentului pentru retinită cu citomegalovirus (CMV) la pacienții cu sindromul imunodeficienței umane dobândite (SIDA). Prevenția bolii CMV la pacienții cu transplant de organ solid care prezintă risc.
Dz: Dozajul standard la *adulți* în tratamentul de inducție al retinitei CMV: Pentru pacienții cu retinită CMV activă, doza recomandată este de 900 mg valganciclovir (două comprimate de Valcyte 450 mg) de două ori pe zi timp de 21 de zile și, când este posibil, administrate cu alimente.
Tratamentul de întreținere al retinitei CMV: după tratamentul de inducție, sau la pacienții cu retinită CMV inactivă, doza recomandată este de 900 mg valganciclovir (două comprimate Valcyte 450 mg) o dată pe zi, dacă este posibil, administrate cu alimente. Pacienții la care retinita s-a agravat pot repeta tratamentul de inducție; totuși trebuie acordată atenție posibilității dezvoltării de rezistență virală.
Prevenția bolii CMV la *pacienții cu transplant:* pentru pacienții care au primit transplant doza recomandată este de 900 mg (două comprimate a 450 mg) o dată pe zi, cu începere în decurs de 10 zile de la transplant până la 100 de zile post-transplant. Oricând este posibil, comprimatele trebuie administrate odată cu ingerarea de alimente. În insuficiența renală se administrează în funcție de clearance-ul creatininei: ≥ 60: doza de inducție este 900 mg (2 comprimate) de două ori pe zi, doza de menținere/prevenție 900 mg (2 comprimate) o dată pe zi; 40-59: doza de inducție este 450 mg (1 comprimat) de două ori pe zi, doza de menținere este 450 mg (1 comprimat) o dată pe zi; 25-39: doza de inducție este 450 mg (1 comprimat) o dată pe zi, doza de menținere este 450 mg (1 comprimat) la fiecare 2 zile; 10-24: doza de inducție este 450 mg (1 comprimat) la fiecare 2 zile, doza de menținere este 450 mg (1 comprimat) de două ori pe săptămână.
Comprimatele nu trebuie zdrobite sau sparte.
Cind: Hipersensibilitate la valganciclovir, ganciclovir, aciclovir și valaciclovir sau la oricare dintre excipienți. Este contraindicat în timpul alăptării.
A!: Înainte de inițierea terapiei cu valganciclovir, pacienții trebuie informați asupra potențialului risc teratogen și cancerigen. Utilizarea la copii și adolescenți nu este recomandată.
Interacțiuni cu: dapsonă, pentamidină, flucitozină, vincristin, vinblastin, adriamicin, amfotericină B, trimetoprim/combinații sulfa, analogi nucleozidici și hidroxiuree.
Nu trebuie utilizat în timpul sarcinii decât dacă beneficiul terapeutic pentru mamă este mai mare decât riscul potențial de afectare teratogenică a copilului. Femeile de vârstă fertilă trebuie sfătuite să utilizeze metode contraceptive eficiente în timpul tratamentului. Pacienții de sex masculin trebuie sfătuiți să utilizeze contracepție de barieră în timpul, și cel puțin 90 de zile după întreruperea tratamentului. Prudență la conducătorii auto.
RA: Cel mai frecvent (≥ 5%) raportate reacții adverse pentru terapia de inducție: neutropenie (9%), diaree (6%), anemie (6%) și dermatită (5%); sub

terapia de întreținere: neutropenie (18%), anemie (13%), diaree (11%) și greață (8%). Cel mai frecvent raportate (> 1%) reacții adverse în timpul inducției cu valganciclovir și în timpul terapiei de întreținere la pacienții cu SIDA cu retinită CMV, care au fost considerate a fi severe și amenințătoare pentru viață au fost: neutropenia (12,5%), anemia (7,5%), trombocitopenia (25), pancitopenia (1,5%), leucopenia (1,5%) și tulburări ale funcției hepatice (1%). Cel mai frecvent raportate efecte adverse (≥ 5%) care se bănuiesc a fi în relație cu valganciclovirum (cel puțin într-o mică măsură) în tratament profilactic, indiferent de severitate, la pacienții cu transplant de organ solid, conform investigatorului, au fost: leucopenia (9%), diareea (7%), greața (6%) și neutropenia.

VALSARTANUM

COD ATC: C09CA03

DIOVAN® 80; DIOVAN® 160 *NOVARTIS PHARMA SERVICES;* Cpr. film. valsartan 80 mg sau 160 mg ***(P-6L)***

Ind: Tratamentul HTA.
Dz: 80 mg pe zi, în priză unică. Efectul maxim apare după 4 săpt. Doza poate fi crescută la 160 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la valsartan, sarcină.
A!: Corectarea depleției sodice și/sau lichidiene înaintea trat; prudență în stenoza bilaterală de arteră renală sau unilaterală pe rinichi unic funcțional, IR, IH, copii; interacțiuni medicamentoase cu diuretice care economisesc potasiu; alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Cefalee, amețeli, infecții virale, infecții ale tractului respirator superior, tuse, diaree, oboseală, rinită, sinuzită, dureri de spate, dureri abdominale, greață, faringită, artralgii, scăderea hemoglobinei și hematocritului.

VANCOMYCINUM (HYDROCHLORIDUM)

COD ATC: J01XA01

EDICIN 500 mg; 1 g *LEK PHARMACEUTICALS;* Pulb. liof. pt. sol. inj. vancomicină 500 mg sau 1 g ***(S)***

VANCO-TEVA *TEVA;* Pulb. liof. pt. sol. inj. 500 mg ***(S)***

VANCOCIN *ELI LILLY;* Pulb. pt. sol. inj. vancomicină 500 mg sau 1 g ***(S)***

Ind: *Inj. iv:* infecții produse de germeni sensibili la vancomicină (cu excepția meningitei), în special infecții stafilococice severe.
Dz: *Inj. i.v: Adulți:* 2 g/zi (aproximativ 30 mg/kg și zi). *Copii și sugari:* 40 mg/kg și zi. În cazul afectării SNC, doza poate fi crescută la 15 mg/kg la fiecare 6 ore (60 mg/kg și zi). *Nou-născuți:* 0-7 zile: 30 mg/kg și zi ca doză de atac, apoi 10 mg/kg la fiecare 12 ore. 7-30 zile: 45 mg/kg și zi. *IR:* doza inițială este 1 g, urmată, la fiecare 7-10 zile, dependent de rezultatele obținute după controlarea concentrației serice, de 1 g sau de 500 mg.
Cind: Hipersensibilitate la vancomicină.
A!: Prudență în IR, tulburări de auz, vârstnici, anestezie generală; interacțiuni medicamentoase cu aminoglicozide, polimixină B, curarizante, cisplatină, anestezice; sarcină și alăptare.
RA: Reacție anafilactică, ototoxicitate, nefrotoxicitate, greață, vomă, febră, urticarie, erupții maculare cutanate, neutropenie.

VARDENAFILUM *COD ATC: G04BE09*

LEVITRA *BAYER AG;* Cpr. film. × 5 mg vardenafil; ct. × un blister × 2 cpr. film; ct. × un blister × 4 cpr. film; ct. × un blister × 8 cpr. film; ct. × un blister × 12 cpr. film. ***(P-RF)***

LEVITRA *BAYER AG;* Cpr. film. × 10 mg vardenafil; ct. × un blister × 2 cpr. film; ct. × un blister × 4 cpr. film; ct. × un blister × 8 cpr. film; ct. × un blister × 12 cpr. film. ***(P-RF)***

LEVITRA® 5 mg, 10 mg, 20 mg *GLAXO SMITHKLINE;* Cpr. film. 5 mg, 10 mg, 20 mg ***(P-RF)***

Ind: Tratamentul disfuncției erectile, care reprezintă incapacitatea de a obține sau de a menține o erecție a penisului suficientă pentru o performanță sexuală satisfăcătoare. Pentru a fi eficace, este necesară stimularea sexuală.
Dz: *Bărbați adulți:* 10 mg oral, adm. cu aproximativ 25-60 minute înainte de activitatea sexuală. În funcție de eficacitate și tolerabilitate doza poate fi crescută la 20 mg sau scăzută la 5 mg. Doza maximă recomandată este de 20 mg. Frecvența maximă de administrare recomandată este de o dată pe zi. Debutul acțiunii poate fi întârziat în cazul administrării cu un prânz bogat în lipide. *Vârstnici:* doza inițială este de 5 mg. În funcție de eficacitate și tolerabilitate, doza poate fi crescută la 10-20 mg. La pacienții cu afectare hepatică ușoară și moderată (scor Child-Pugh A-B) se adm. o doză inițială de 5 mg. În funcție de eficacitate și tolerabilitate, doza poate fi crescută la 10 mg și apoi la 20 mg. Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții cu afectare renală ușoară – moderată. La pacienții cu afectare renală severă (clearance-ul creatininei < 30 ml/min), se adm. o doză inițială de 5 mg. Pe baza tolerabilității și eficacității doza poate fi crescută la 10-20 mg. Nu este indicată pentru persoanele cu vârsta sub 18 ani. Atunci când se administrează în asociere cu eritromicina, doza de vardenafil nu trebuie să depășească 5 mg.
Cind: Co-administrarea cu nitrați sau donori de oxid nitric (cum este nitritul de amil), în orice formă farmaceutică. Nu trebuie administrată la bărbații la care activitatea sexuală nu este recomandată: pacienți cu afecțiuni cardiovasculare severe ca angină instabilă sau insuficiență cardiacă severă (NYHA III sau IV). Afectare hepatică severă (Child-Pugh C), afecțiuni renale în stadiul final care necesită dializă, hipotensiune arterială (presiunea arterială < 90/50 mmHg), antecedente recente de accident vascular cerebral sau infarct miocardic (în ultimele 6 luni), angina instabilă și afecțiuni retiniene ereditare degenerative cunoscute, cum este retinita pigmentară. Administrarea concomitentă a vardenafilului cu inhibitori potenți ai CYP 3A4 (ritonavir, indinavir, ketoconazol și itraconazol (forme cu administrare orală) este contraindicată la barbații cu vârsta peste 75 ani. Hipersensibilitate la vardenafil sau la oricare dintre excipienții produsului.
A!: Înaintea administrării se evaluează statusul cardiovascular al pacienților. Precauție la pacienții cu deformări anatomice ale penisului: angularea, fibroza cavernoasă sau boala Peyronie, la pacienții cu afecțiuni ce pot predispune la priapism: siclemia, mielomul multiplu, leucemia. Prudență la pacienți cu tulburări de coagulare sau cu ulcer peptic activ. Interacțiuni cu blocante alfa-adrenergice, ritonavir, indinavir, itraconazol și ketoconazol, eritromicină, suc de grapefruit. Nu este indicată administrarea la femei. Prudență la conducătorii auto și la cei care lucrează cu utilaje (s-au raportat amețeli și tulburări de vedere).
RA: Foarte frecvente (≥ 10%): înroșirea feței, cefalee. Frecvente (> 1%, < 10%): dispepsie, greață, amețeli, rinită. Mai puțin frecvente (> 0,1%,< 1%): hipertensiune arterială, reacții de fotosensibilizare, tulburări de vedere.

Rare (> 0,01%,< 0,1%): hipertonie, hipotensiune arterială, sincopă, disfuncții erectile. După punerea pe piață, s-au raportat evenimente cardiovasculare severe, incluzând hemoragie cerebro-vasculară, infarct miocardic, moarte subită cardiacă, atac ischemic tranzitor și aritmie ventriculară, în asociere temporală cu alte produse medicamentoase din această clasă.

VECURONIUM *COD ATC: M03AC03*

NORCURON *N.V. ORGANON;* Pulb. pt. sol. inj. 4 mg sau 10 mg ***(S)***

Ind: Curarizant antidepolarizant. Adjuvant în anestezia generală pentru facilitarea intubației traheale și asigurarea unei relaxări musculare bune care să permită actul chirurgical.
Dz: i.v.; doza se adaptează în funcție de pacient. *Adulți și copii peste un an:* doza de intubare 0,08-0,1 mg/kg; doza de întreținere 0,02-0,03 mg/kg; *nou-născuți:* 0,01-0,02 mg/kg. *Cezariană:* 0,1 mg/kg.
Cind: Antecedente cunoscute de reacție anafilactică.
A!: Reacții anafilactice.

VENLAFAXINUM *COD ATC: N06AX16*

EFECTIN *WIETH-LEDERLE PHARMA GmbH;* Cpr. venlafaxin 37,5 mg sau 75 mg ***(P-RF)***

EFECTIN ER *WIETH-LEDERLE PHARMA GmbH;* Cps. venlafaxin 75 mg sau 150 mg ***(P-RF)***

Ind: Simptome ale bolilor depresive, inclusiv boli depresive asociate cu anxietate.
Dz: 37,5 mg de 2 ori pe zi.
Cind: Hipersensibilitate la venlafaxină; copii sub 18 ani; trat. recent cu IMAO; sarcină și alăptare.
A!: Prudență în afecțiuni hepatice și renale, antecedente de epilepsie, boli cardiace; interacțiuni medicamentoase cu cimetidină; șoferi și activități de precizie.
RA: Rash, reacții alergice; cefalee, disconfort abdominal; frecvență cardiacă neregulată sau crescută; schimbări ale apetitului, indigestii, flatulență, greață, vomă; creștere în greutate; schimbări de dispoziție, anxietate, amețeală, insomnie, scăderea apetitului sexual, impotență, slăbiciune, tremor; transpirații, gură uscată; senzații de înțepături sau arsuri la nivelul pielii; tulburări ale vederii; tulburări de ejaculare/orgasm; hTA ortostatică.

VERAPAMILUM *COD ATC: C08DA01*

CORDAMIL 40, CORDAMIL 80 *HELCOR;* Cpr. film. clorhidrat de verapamil 40 mg sau 80 mg ***(P-6L)***

FALICARD *AWD PHARMA GmbH & Co. KG;* Sol. inj. 2,5 mg/ml (f. × 2 ml) ***(S)***

FALICARD 40; FALICARD 80; FALICARD 120 *AWD PHARMA GmbH & Co. KG;* Cpr. film. 40 mg; 80 mg sau 120 mg ***(P-6L)***

FALICARD LONG *AWD PHARMA GmbH & Co. KG;* Cps. ret. 180 mg ***(P-6L)***

ISOPTIN *ABBOTT GmbH & Co. KG;* Sol. inj. clorhidrat de verapamil 2,5 mg/ml (f. × 2 ml) ***(S)***

ISOPTIN 80 *ABBOTT GmbH & Co. KG;* Cpr. film. clorhidrat de verapamil 80 mg ***(P-6L)***

ISOPTIN MITE 40 *ABBOTT GmbH & Co. KG;* Cpr. film. clorhidrat de verapamil 40 mg ***(P-6L)***

ISOPTIN RR *ABBOTT GmbH & Co. KG;* Cpr. retard verapamil 240 mg ***(P-6L)***

RANIL *FARAN LABORATORIES S.A.;* Cpr. film. clorhidrat de verapamil 40 mg ***(P-6L)***

VERAPAMIL 40; VERAPAMIL 80 *CHINOIN, membru al SANOFI-SYNTHELABO GROUP;* Dj. clorhidrat de verapamil 40 mg sau 80 mg ***(P-6L)***

VERAPAMIL *ARENA GROUP SA;* Dj. clorhidrat de verapamil 80 mg ***(P-6L)***

VERAPAMIL AL 40; VERAPAMIL AL 80 *ALIUD® PHARMA GmbH & Co. KG;* Cpr. film. 40 mg sau 80 mg ***(P-6L)***

VEROGALID® ER 240 mg *IVAX PHARMACEUTICALS;* Cpr. film. elib. prel. 240 mg clorhidrat de verapamil retard (cutie 10 tb. × 1 blist.; cutie 10 tb. × 3 blist.; fl. × 30 tb.; fl × 100 tb.) ***(P-6L)***

Ind: *Int.:* Profilaxia și tratamentul stărilor de insuficiență coronariană cronică: angină cronică stabilă; angină de repaus, inclusiv angină vasospastică, angină instabilă; angină post IMA; HTA; tahiaritmii de tipul tahicardiei paroxistice supraventriculare; flutter și fibrilație atrială cu ritm ventricular rapid (în afară de sdr. WPW). *Inj.:* Tahiaritmii ca tahicardia paroxistică supraventriculară; fibrilație atrială/flutter atrial cu tahiaritmie (exceptând sindromul WPW,); crize hipertensive; insuficiența coronariană acută (spasme coronariene).
Dz: *Int.: adulți:* 40-80 mg de 3-4 ori/zi. *Copii sub 6 ani:* 80-120 mg/zi. *Copii peste 6 ani:* 40-120 mg de 2-3 ori/zi (maxim 360 mg/zi). Pacienți cu ciroză hepatică: la început se adm. 40 mg de 2-3 ori/zi. Forme retard: pt. HTA: 240 mg dimineața, suplimentat la nevoie cu 120-240 mg; pt. celelalte indicații: 120 mg de 2 ori/zi, maxim 480 mg/zi. *Inj.:* i.v. lent *adulți:* inițial 5 mg, repetat la nevoie după 5-10 min; perf. 5-10 mg/oră. *Copiii: nou-născuți:* 0,75-1 mg; *sugari:* 0,75-2 mg; *1-5 ani:* 2-3 mg; *6-14 ani:* 2,5-5 mg.
Cind: Colaps cardiocirculator, IMA recent însoțit de complicații (bradicardie, hTA accentuată, insuficiență ventriculară stângă); tulburări grave ale conducerii impulsului electric (BAV de gradul II sau III, bloc sinuatrial); sindromul nodului sinusal bolnav (sindromul bradicardie-tahicardie).
A!: Preparatele retard nu se administrează la copii; prudență în caz BAV de gradul I, bradicardie sub 50 bătăi/min, hTA, tahicardii ventriculare, fibrilație atrială/flutter atrial în prezența simultană a unui sindrom de preexcitare, IC, distrofie musculară progresivă, insuficiență coronariană acută; interacțiuni medicamentoase cu betablocante și alte antihipertensive, alte antiaritmice (chinidină), anestezice inhalatorii, digoxină, carbamazepină, ciclosporină, teofilină, cimetidină, miorelaxante; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Bradiaritmii ca bradicardie sinusală, oprire sinusală cu asistolie, BAV de gradul II sau III, bradiaritmie ventriculară, dezvoltarea sau accentuarea unei

IC, aritmii atriale, hTA, constipație, greață, amețeli, senzație de buimăceală, cefalee, înroșirea pielii feței, oboseală, nervozitate, edeme ale gleznelor, eritromegalie, parestezii, mialgii, artralgii, alergie cutanată, creșterea reversibilă a transaminazelor și/sau fosfatazei alcaline, ginecomastie, creșteri ale nivelului de prolactină, hiperplazie gingivală.

VERTEPORFINUM

COD ATC: L01XD02

VISUDYNE *NOVARTIS PHARMA SERVICES;* Pulb. pt. sol. perf. velteporfinum 15 mg/fl ***(S)***

Ind: Trat. degenerescenței maculare senile la pacienții la care predomină forma clasică de neovascularizație coroidiană subfoveală.
Dz: Inițial perf. i.v. timp de 10 minute a 6 mg/m^2, apoi activarea prin acțiunea luminii, la 15 minute după începerea perfuziei, cu lumină roșie non-termică (lungime de undă 689 nm ± 3 nm) produsă de un laser cu diode, dirijată cu ajutorul unui sistem optic de fibră de sticlă montat la lampa cu fantă și a unei lentile de contact adecvate. La intensitatea recomandată a luminii de 600 mW/cm^2, sunt necesare 83 de secunde pentru a elibera doza necesară de lumină de 50 J/cm^2.
Cind: Hipersensibilitate la verteporfină, porfirie, IH severă.
A!: Pacienții trebuie reevaluați la 3 luni; trat. poate fi repetat de maxim 4 ori pe an; pacienții trebuie să evite expunerea neprotejată a pielii, ochilor sau altor părți ale corpului la lumina solară directă sau la o lumină de interior puternică 48 ore după perf.; prudență în IH moderată, obstrucție biliară, extravazare, IC necontrolată, HTA necontrolată; interactiuni medicamentoase cu agenți fotosensibilizanți; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Vedere anormală, diminuarea acuității vizuale, defecte de câmp vizual, tulburări lacrimale, hemoragie subretiniană, hemoragie intravitroasă, durere, edem, extravazare, greață, reacții de fotosensibilizare, dureri lombare, astenie, prurit, hipercolesterolemie.

VIGABATRINUM

COD ATC: N03AG04

SABRIL *MARION MERRELL SA;* Cpr. 500 mg ***(P-6L)***

Ind: Epilepsie în tratament asociat. Monoterapie în sindromul West (spasm infantil).
Dz: *Adulți:* 2-3 g/zi. Doza inițială de 1 g/zi se crește săptămânal până la obținerea răspunsului clinic optim. *IR:* la un clearance mai mic de 60 ml/min. se ajustează dozele. *Copii:* doza inițială 40 mg/kg corp/zi. Tratament de întreținere: doza se stabilește în funcție de greutatea corporală (10-15 kg: 0,5-1 g/zi; 15-30 kg: 1-1,5 g/zi; 30-50 kg: 1,5-3 g/zi; peste 50 kg: 2-3 g/zi). *Nou-născuți cu sindromul West:* 50 mg/kg corp/zi; doza se poate crește săptămânal până la 150 mg/kg corp/zi.
Cind: Hipersensibilitate.

VINBLASTINUM

COD ATC: L01CA01

CYTOBLASTIN *CIPLA;* Sol. inj. 1 mg/ml (fl. × 10 ml) ***(S)***

VELBE *ELI LILLY;* Pulb. pt. sol. inj. 10 mg/fl. ***(S)***

Ind: Maladia Hodgkin și limfoame non- Hodgkin, cancer testicular, cancer de sân, cancer al rinichiului, cancer al vezicii urinare, unele cazuri de histiocitoză.
Dz: *Copii:* doza inițială 2,5 mg/m^2; se crește cu 1,25 mg/m^2 pe săptămână până la atingerea dozei maxime de 12,5 mg/m^2. *Adulți:* doza inițială 4-7 mg/m^2; max. 18,5 mg/m^2 pe săptămână. Perfuzie continuă: 1,5-2 mg/m^2 4-5 zile. Factorul care limitează doza este leucopenia.
Cind: Hipersensibilitate, sarcină, alăptare, neutropenii nelegate de maladia tratată, infecții.
A!: Adm. strict i.v. de către personal cu experiență. Se va evita contactul soluției cu ochii sau pielea. Controlul formulei sanguine înaintea inițierii terapiei. Interacțiuni medicamentoase cu ciclosporina, vaccinuri vii atenuate, medicamente care inhibă izoenzima citocrom P450 CYP 3A, fenitoina, mitomicina C. Prudență la șoferi și activități de precizie.
RA: Deprimare medulară, leucopenie, constipație, anorexie, grețuri, vărsături, dureri abdominale, scaune cu mucus, diaree, hemoragie digestivă (cu ulcer preexistent), enterocolită hemoragică, HTA, alopecie reversibilă, hiponatriemie la doze mari.

VINCAMINUM

COD ATC: C04AX07

OXYBRAL *GLAXO SMITHKLINE;* Sirop 20% (fl. × 120 ml) ***(P-6L)***

OXYBRAL SR *GLAXO SMITHKLINE;* Cps. ret. 30 mg ***(P-6L)***

VINCAMINĂ *BIOFARM SA;* Dj. 10 mg ***(P-6L)***

Ind: Normalizarea și adaptarea fluxului vascular cerebral la nevoile metabolice. Tulb. de memorie la vârstnici, tulb. de concentrare, atenție și conștiență. Boli trofice degenerative (diabet zaharat, ateroscleroză), accidente cerebrale acute (post-traumatic, post-apoplectic, encefalopatie hipertensivă). Amețeală, vertij, cefalee de origine vasculară și migrenă. Tulb. de auz de origine vasculară. Tulb. de vedere de origine vasculară. Tulb. psihiatrice: orientare temporo-spațial, tulb. emoționale, tulb. cerebro-vasculare în special ischiemice. Îmbunătățirea capacității intelectuale la copii și adolescenți.
Dz: *Copii:* 1/2 linguriță de 3 ori pe zi. *Adulți:* 1-2 lingurițe de 3 ori pe zi sau 1 cps. de 2 ori pe zi.
Cind: Tumori intracraniene, hipersensibilitate. Sarcină și alăptare.
A!: Precauție în IH și afecțiuni cardiace.
RA: Tulb. digestive foarte rare.

VINCRISTINUM

COD ATC: L01CA02

CITOMID *LEMERY SA;* Liof. pt. sol. inj. 1 mg ***(S)***

CITOMID *CSC PHARMACEUTICALS* ***(S)***

SINDOVIN *SINDAN SRL;* Liof. pt. sol. inj. 1 mg ***(S)***

Ind: Polichimioterapie: Leucemie acută limfoblastică, boala Hodgkin, limfoame non-Hodgkin, cancer pulmonar cu celule mici, cancer de sân, cancer de col uterin, mielom multiplu, rabdomiosarcom, neuroblastom, nefroblastom, tumori embrionare ale copilului, sarcom Ewing, osteosarcom. Monoterapie în purpura trombocitopenică idiopatică.
Dz: *Monoterapie, adulți:* 1,4 mg/m^2 o dată pe săptămână. *Copii cu greutate peste 10 kg:* 1-2 mg/m^2. *Copii cu greutate mai mică de 10 kg:* 0,05 mg/m^2 o dată pe săptămână.
Cind: Hipersensibilitate, forme demielinizante ale sd. Charcot-Marie-Tooth. Asociere cu itraconazol sau nifedipină.
A!: Adm. strict i.v. Administrarea intratecală poate fi fatală. Prudență la asocierea cu alte citostatice, vârstnici, în prezența leucopeniei și trombocitopeniei, IH și obstrucție biliară.
RA: De obicei reversibile și dependente de doză. Tulb. neurologice, vegetative (constipație, dureri abdominale, tulb. de micțiune), tulb. gastrointestinale (greață, vărsături, anorexie, diaree, perforații intestinale), reacții de hipersensibilitate, tulb. hematologice (leucopenie, trombocitopenie), tulb. endocrine care antrenează hiponatremia, tulb. cardiovasculare (hTA sau HTA, infarct acut de miocard), tulb. pulmonare (bronhospasm sever, dispnee), cefalee, febră, alopecie de obicei tranzitorie, azoospermie.

VINORELBINUM *COD ATC: L01CA04*

NAVELBINE *LAB. PIERRE FABRE;* Sol. inj. 10 mg/ml (f. × 1 ml) ***(S)***

Ind: Cancer pulmonar fără celule mici, cancer de sân cu metastaze.
Dz: Monoterapie, doza uzuală 25-30 mg/m^2 o dată pe săptămână. Polichimioterapie: doza se ajusteaza individual. IH; se reduc dozele.
Cind: IH severă, sarcină și alăptare.
A!: Adm. strict i.v. Atenție în IR.
RA: Anemie, oboseală, constipație, vărsături, dispnee, bronhospasm.

VINPOCETINUM *COD ATC: N06BX18*

CAVINTON *GEDEON RICHTER Ltd.;* Conc. pt. sol. perf. vinpocetină 5 mg/ml (f. x 2 ml) ***(S)***

CAVINTON *GEDEON RICHTER Ltd.;* Cpr. vinpocetină 5 mg ***(P-6L)***

CAVINTON FORTE *GEDEON RICHTER Ltd.;* Cpr. vinpocetină 10 mg ***(P-6L)***

VIMPOCETIN 5 mg *VIM SPECTRUM SRL;* Cps. 5 mg ***(P-6L)***

VINPOCETIN 5 mg *LAROPHARM SRL;* Cps. 5 mg ***(P-6L)***

VINPOCETINE *COVEX;* Cpr. vinpocetină 5 mg ***(P-6L)***

Ind: Tulburări circulatorii cerebrale: atacuri ischemice tranzitorii (AIT), ictus și stări postictus, demență vasculară, ateroscleroză cerebrală, tulburări ischemice posttraumatice, encefalopatie hipertensivă, insuficiență vertebrobazilară; atenuarea simptomelor neurologice și psihice ale afecțiunilor cerebrovasculare. Tulburări vasculare ale coroidei și retinei. Presbiacuzie acută, boala Ménière, nevrită cohleo-vestibulară, tinitus.

Dz: *Perf. i.v.* lent maxim 1 mg/kg și zi. *Int.* 15-30 mg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la vinpocetină, faza acută a hemoragiei cerebrale, ischemie coronariană severă, aritmii severe, sarcină și alăptare.
A!: Vinpocetina în soluție este incompatibilă cu heparina.
RA: HTA, tahicardie, extrasistole, insomnie, amețeală, cefalee, senzație de slăbiciune, erupții cutanate.

VITAMINA F

COD ATC: A11HA

VITAMINA F *BIOFARM SA;* Cps. 270 mg; Sol. (fl. × 10 ml) concentrat de esteri etilici ai acizilor grasi nesaturați esențiali

Ind: Eczeme, seboree, ulcerații atone ale pielii, ateroscleroză, hepatite cronice sau ciroze cu infiltrație sau degenerescență grasă (ca medicație adjuvantă).
Dz: *Adulți:* 540 mg de 2-3 ori pe zi sau 50-100 picături de 3 ori pe zi. *Copii:* 1-4 luni: 1 pic./zi; 4-7 luni: 2-3 pic./zi; 7-12 luni: 4-5 pic./zi; 1-5 ani: 5-6 pic./zi; 5-15 ani: 10-20 pic./zi sau 1-2 cps./zi.

VORICONAZOLUM

COD ATC: J02AC

VFEND® *PFIZER H.C.P. CORPORATION;* Pulb. pt. sol. inj. 200 mg ***(S)***

VFEND® *PFIZER H.C.P. CORPORATION;* Cpr. film. 50 mg sau 200 mg ***(P-RF)***

Ind: Aspergiloza invazivă, candidoze severe, invazive, rezistente la fluconazol. Infecții cu Scedosporium, Fusarium.
Dz: Cu cel puțin o oră înainte sau după masă. *Adulți, oral:* inițial: 400 mg la 12 ore în două prize (pacienți cu greutate sub 40 kg doza se reduce la jumătate). Intreținere: 200 mg de 2 ori pe zi (100 mg la cei cu mai puțin de 40 kg greutate corporală). *i.v.:* inițial 6 mg/kg la 12 ore, în două prize; întreținere: 4 mg/kg de 2 ori pe zi. Nu este necesară ajustarea dozelor la vârstnici, IR sau IH. *Copii:* 2-12 ani: inițial 6 mg/kg i.v. sau oral. La 12 ore, două doze; întreținere 4 mg/kg de 2 ori pe zi.
Cind: Nu se asociază cu terfenadina, astemizol, pimozid, chinidină, fenobarbital.
RA: Febră, cefalee, dureri abdominale, frison, astenie, dureri toracice, edem facial, sindrom pseudo-gripal, hTA, tromboflebită, aritmii, greață, vome, diaree, pozitivarea testelor hepatice, trombopenie, anemie, leucopenie.

X

XANTINOLI NICOTINAS

COD ATC: C04AD02

✗ **SADAMIN®** *PLIVA KRAKOW;* Sol. inj. 150 mg/ml (f. × 2 ml) ***(P-RF);*** Cpr. 150 mg ***(P-6L)***

Ind: Tulburări circulatorii periferice: endangeită obliterantă, claudicație intermitentă, boală Raynaud, angiopatie diabetică, tromboze, embolii, ulcer varicos, degerături; ateroscleroză cerebrală, sechele postictus; tulburări circulatorii ale retinei și urechii interne; cardiopatii ischemice, sechele post-IMA.
Dz: Int. 150-600 mg de 3 ori/zi, după mese. Inj. i.m. sau i.v. (lent), 300 mg de 1-3 ori/zi. Perf. i.v. 1500-4500 mg.
Cind: IC, IMA, accidente cerebro-vasculare acute, hemoragii acute, colaps, ulcer gastroduodenal în evoluție.
A!: Prudență la bolnavii cu TA labilă, diabetici, infarct cerebral; interacțiuni medicamentoase cu simpatolitice, vasodilatatoare, IMAO; sarcină și alăptare.
RA: Congestie a pielii, prurit, eritem, cefalee, hTA, dureri abdominale.

XYLOMETAZOLINUM

COD ATC: R01AA07

OLYNTH 0,05%; OLYNTH 0,1% *PFIZER H.C.P. CORPORATION;* Aerosol nazal 0,05% sau 0,1% ***(OTC)***

RHINXYL *PHARMAPLANT BIOGALENICA SRL;* Sol. ext. 0,05% sau 0,1% (fl. × 10 ml) ***(OTC)***

XYLO AL 0,05%; XYLO AL 0,1% *ALIUD® PHARMA GmbH & Co.KG;* Sol. nazală clorhidrat de xilometazolină 0,05% sau 0,1 % (fl. × 10 ml) ***(OTC)***

Ind: Coriză, rinită vasomotorie și rinită alergică, inflamații ale sinusurilor paranazale, inflamații catarale ale urechii medii asociate cu coriza.
Dz: 1-2 pic. în fiecare nară, de cel mult 3 ori/zi, maxim 5 zile.
Cind: Hipersensibilitate la xilometazolină; rinita sicca; copii sub 6 ani pt. sol. 1%, respectiv copii sub 2 ani pt. sol. 0,05%; glaucom, îndeosebi cu unghi îngust.
A!: Trat. cronic are risc de atrofie a mucoasei nazale; prudență la cardiaci, feocromocitom, hipertiroidie, diabet zaharat; fenomene de rebound; interacțiuni medicamentoase cu IMAO, antidepresive triciclice; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Iritație locală, moderată și tranzitorie, rebound al congestiei, congestie reactivă cu rinită indusă medicamentos, cefalee, insomnie, astenie, tulburări de vedere, palpitații, tahicardie, HTA.

Z

ZALCITABINUM

COD ATC: J05AF03

HIVID *HOFFMANN LA ROCHE;* Cpr. film. zalcitabină 0,375 mg sau 0,750 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Terapie asociată cu zidovudină pentru SIDA sau pentru ARC (Complex Asociat SIDA) avansat, cu număr de celule CD4 mai mic sau egal cu $200/mm^3$.

Dz: Monoterapie: 0,75 mg, la 8 ore. Dacă apare neuropatie periferică: 0,375 mg la 8 ore. Terapie asociată: 0,75 mg zalcitabină, concomitent cu 200 mg zidovudină la 8 ore.
Cind: Hipersensibilitate la zalcitabină.
A!: Monitorizarea pacienților: numărătoarea celulelor CD4, evaluări neurologice, hematologice și clinice; prudență în trat. lungi, persoane infectate cu virusul HIV și asimptomatice, copii sub 12 ani, neuropatie periferică, funcție renală afectată, afecțiuni hepatice preexistente, pancreatită în antecedente, ulcer esofagian, hiperglicemie preexistentă; interacțiuni medicamentoase cu cloramfenicol, iodochinol, etionamidă, aur, ribavirină, vincristină, cisplatină, glutetimidă, hidralazină, nitrofurantoină, dapsonă, fenitoină, isoniazidă, piridoxină, pentamidină, amfotericină; sarcină și alăptare.
RA: Neuropatie periferică, stomatită ulcerativă, cefalee, exantem, oboseală, greață, mialgie, prurit, amețeală, dureri abdominale, faringită, vomă, pierdere în greutate, dureri toracice, astenie, febră, dureri, dureri substernale, tahicardie, anorexie, disfagie, stomatită aftoasă, diaree, dureri abdominale, uscăciune a gurii, ulcer esofagian, vomă, constipație, dureri esofagiene, dispepsie, glosită, stomatită, hemoragie rectală, hemoroizi, ulcerații rectale, abdomen dilatat, afectări gingivale, afectări hepatocelulare, hepatită, artralgie, umăr dureros și crampe ale musculaturii picioarelor, hipertonie, tremor, tremur al mâinilor, confuzie, putere de concentrare diminuată, amnezie, insomnie, somnolență, depresie, faringită, dispnee, tuse, dermatită, exantem maculo-papular, alopecie, urticarie, afectarea simțului gustativ, tulburări de vedere, dureri oculare, xeroftalmie, micțiune frecventă, afecțiuni renale acute.

ZANAMIVIRUM

COD ATC: J05AH01

RELENZA® *GLAXO SMITHKLINE;* Pulb. liof. 5 mg/doză (fl. × 5 sau 7 blist. (Rotadisk®) × 4 doze pulb. + dispozitiv Diskhaler®) ***(P-RF)***

Ind: Trat. infecțiilor provocate de virusurile gripale A și B ale adulților și adolescenților (peste 12 ani).
Dz: Inhal. orale, 10 mg de 2 ori/zi, timp de 5 zile; trat. trebuie început cât de repede posibil.
Cind: Hipersensibilitate la zanamivir.
A!: Prudență în sarcină și alăptare.
RA: Zanamivir este bine tolerat.

ZIDOVUDINUM

COD ATC: J05AF01

RETROVIR *GLAXO SMITHKLINE;* Cps. zidovudină 100 mg; Sirop 1% (fl. × 200 ml) ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. pacienților cu infecție cu virusul HIV asimptomatici sau aflați în stadiile inițiale de progresie a bolii HIV; trat. pacienților cu boală HIV avansată, cum ar fi cei cu SIDA sau cu ARC (Complex Asociat SIDA).
Dz: *Adulți:* 500-600 mg/zi, divizat în 3-5 prize. Alternativ, este eficientă și doza de 1000 mg/zi, divizată în 2-4 prize. *Copii:* peste 3 luni, 180 mg/m^2, la fiecare 6 ore (720 mg/m^2 și zi).
Cind: Hipersensibilitate la zidovudină, neutropenie sub 0,75 × 10^9/l sau cu hemoglobină sub 7,5 g/dl.

A!: Nu previne transmiterea HIV; nu vindecă infecția HIV; monitorizare hematologică; prudență la femei obeze, hepatomegalie, hepatită sau alt factor de risc pentru boli hepatice, vârstnici, IR, IH; interacțiuni medicamentoase cu fenitoină, paracetamol, aspirină, codeină, morfină, indometacină, ketoprofen, naproxen, oxazepam, lorazepam, cimetidină, clofibrat, dapsonă, izoprinosină, produse potențial nefrotoxice sau mielosupresive, ribavirină; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Anemie, neutropenie, leucopenie, grețuri, vărsături, anorexie, dureri abdominale, cefalee, rash, febră, mialgii, parestezii, insomnie, stare de disconfort, astenie, dispepsie, somnolență, diaree, amețeli, dispnee, flatulență, modificarea gustului, dureri toracice, pierderea acuității mentale, anxietate, polakiurie, depresie, dureri generalizate, frisoane, tuse, urticarie, prurit și sindrom pseudo-gripal.

ZIPRASIDONUM

ZELDOX® 80 mg; ZELDOX® 60 mg; ZELDOX® 40 mg; ZELDOX® 20 mg *PFIZER H.C.P. CORPORATION;* Cps. 80 mg; 60 mg; 40 mg; 20 mg

ZELDOX® 20 mg/ml *PFIZER H.C.P. CORPORATION;* Liof. pt. sol. inj. + solvent 20 mg/ml

Ind: Tratamentul schizofreniei.
Dz: *Oral:* Doza de atac: 40 mg de 2 ori pe zi, în timpul meselor. Doza max. 80 mg de 2 ori pe zi. Doza maximă se poate atinge la nevoie în a 3-a zi de tratament. De regulă doza de întreținere este de 20 mg de 2 ori pe zi. La vârstnici peste 65 ani și în IH se reduc dozele. În IR nu este necesară reducerea dozelor. *i.m.:* 10-20 mg, maxim. 40 mg/zi. Dozele de 10 mg pot fi adm. la 2 ore. Se recomandă pentru trat. de întreținere înlocuirea căii i.m. cu calea orală. Vârstnici peste 65 ani: nu se recomandă calea i.m. Atenție în cazul IR și IH la adm. i.m.
Cind: Hipersensibilitate, sd. congenital de interval QT, IMA recent, IC decompensată, aritmii tratate cu antiaritmice din clasa IA și III. Asocierea cu medic. care prelungesc intervalul QT. Sarcină. Alăptare. Șoferi și activități de precizie. Alcool.
A!: Ziprasidona produce, în funcție de doză, o prelungire ușoară sau moderată a intervalului QT. Prudență la pacienții cu bradicardie semnificativă. Prudență în caz de hipokaliemie, hipomagneziemie (crește riscul aritmiilor maligne). Prudență la cei cu convulsii în antecedente. Prudență în IH.
RA: *După adm. orală:* somnolență, astenie, cefalee, constipație, uscăciunea gurii, dispepsie, hipersalivație, greață, vărsături, agitație, acatizie, amețeli, distonie, sd. extrapiramidal, hipertonie, tremor, tulb. de vedere, dischinezie tardivă (se recomandă reducerea dozei sau întreruperea trat.); *după adm. i.m.:* durere la locul injecției, astenie, cefalee, HTA, hTA ortostatică, diaree, greață, somnolență, amețeli, acatizie, tahicardie.

ZOLPIDEMUM

COD ATC: N05CF02

HYPNOGEN® 10 mg *LECIVA;* Cpr. film. 10 mg ***(P-RF)***

SANVAL 5 mg; SANVAL 10 mg *LEK PHARMACEUTICALS;* Cpr. film. 5 mg și 10 mg ***(P-RF)***

STILNOX® 10 mg *SANOFI~SYNTHELABO;* Cpr. film. 10 mg ***(P-RF)***

ZOLPIDEM 10 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. film. 10 mg ***(P-RF)***

Ind: Trat. de scurtă durată a insomniei, în situații în care insomnia este invalidantă sau determină un disconfort important pentru pacient.
Dz: *Adulți* 10 mg imediat înainte de culcare sau în pat. *Vârstnicii* 5 mg.
Cind: Hipersensibilitate la zolpidem, apnee obstructivă de somn, miastenia gravis, IH severă, insuficiență respiratorie acută și/sau severă, copii.
A!: Trat. nu trebuie să depășească 4 săpt.; trebuie identificată cauza insomniei; prudență la vârstnici, insuficiență respiratorie, tulburări psihotice, IH, risc de amnezie, reacții psihice și "paradoxale", toleranță, dependență, trat. nu se întrerupe brusc; interacțiuni medicamentoase cu alcool, deprimante ale SNC, inhibitori enzimatici, inductori enzimatici; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.
RA: Somnolență diurnă, reducerea atenției, stare de confuzie, oboseală, cefalee, amețeală, slăbiciune musculară, tulburări de vorbire, diplopie, tulburări gastrointestinale, modificări de libido, reacții cutanate, amnezie anterogradă, neliniște, agravarea insomniei, agitație, iritabilitate, agresivitate, delir, furie, coșmaruri, halucinații, comportament neadecvat, somnambulism, depresie preexistentă.

ZOPICLONUM

COD ATC: N05CF01

ALS-ZOPICLON *ALSIFCOM;* Cpr. film. 7,5 mg ***(P-RF)***

IMOVANE *LAB. AVENTIS PHARMA;* Cpr. film. zopiclonă 7,5 mg ***(P-RF)***

ZOLPIDEM 10 mg *LABORMED PHARMA SA;* Cpr. film. 10 mg ***(S/P-RF)***

ZOPICLON 7,5 SL *SLOVAKOFARMA;* Cpr. film. 7,5 mg ***(P-RF)***

Ind: Insomnii de diferite etiologii.
Dz: *Adulți:* 7,5 mg seara, la culcare. *Vârstnici:* se va iniția trat. cu 3,75 mg seara, la culcare. *IH:* 3,75 mg seara la culcare.
Cind: Hipersensibilitate la zopiclonă; insuficiență respiratorie decompensată; copii sub 15 ani; sarcină și alăptare.
A!: Durata trat. max. 4 săpt; risc de dependență; prudență în IH severă, miastenie, insuficiență respiratorie; interacțiuni medicamentoase cu miorelaxante nedepolarizante si alte deprimante ale SNC (mai ales neuroleptice); șoferi și activități de precizie.
RA: Somnolență reziduală diurnă, gust amar, uscăciunea gurii, hipotonie musculară, amnezie anterogradă, senzație pseudo-ebrioasă, iritabilitate, agresivitate, sindrom confuziv oniric, cefalee, astenie, sindrom de sevraj.

ZUCLOPENTHIXOLUM

COD ATC: N05AF05

CLOPIXOL *H. LUNDBECK;* Sol. orală zuclopentixol decanoat 2% (fl. × 20 ml); Cpr. film. 2 mg, 10 mg sau 25 mg ***(P-RF)***

CLOPIXOL ACUPHASE *H. LUNDBECK;* Sol. inj. 50 mg/ml (f. × 1 ml) ***(P-RF)***

CLOPIXOL DEPOT *H. LUNDBECK;* Sol. inj. zuclopentixol decanoat 200 mg/ml (f. × 1 ml) ***(P-RF)***

Ind: Schizofrenie, îndeosebi forme cu agitație și agresivitate, delir cronic, psihoze halucinatorii.
Dz: Inj. i.m. profund, 200-400 mg la 2-4 săpt. Doza medie zilnică 50-100 mg.
Cind: Intoxicație acută cu alcool, barbiturice, opioide; bolnavi psihotici care nu tolerează neuroleptice orale, psihoze cu apatie, psihoze cu parkinsonism, arterioscleroză avansată, stări confuzionale senile, boli renale, hepatice și cardiovasculare grave, glaucom.
A!: Prudență la copii; sarcină și alăptare.
RA: Reacții extrapiramidale, somnolență, reacții iritative locale, galactoree, amenoree, ginecomastie, diskinezii tardive, hTA ortostatică.

MONOGRAFII – COMBINAȚII

MONOGRAFII – COMBINAȚII

A

ACECLOFEN *COD ATC: M01AB55*

ANTIBIOTICE IAȘI; Supoz. cu paracetamol 500 mg, diclofenac sodic 50 mg; ct. × 2 folii Al-PE a câte 3 supoz. ***(P-6L)***

Ind: Boli reumatismale inflamatorii sau degenerative: artrită reumatoidă, artrită reumatoidă juvenilă, spondilită ankilopoietică, osteoartrită și spondilartrită, sindroame dureroase ale coloanei vertebrale, reumatism abarticular, reumatism psoriazic, atacuri acute de gută. Afecțiuni dureroase și/sau inflamatorii în ginecologie, de exemplu, dismenoree primară sau anexită.
Dz: *Adulți:* 1-2 supozitoare: în afecțiuni reumatismale acute, o doză inițială de 100-150 mg diclofenac sodic, în 2-3 prize; la pacienții cu afecțiuni gastrointestinale în antecedente se recomandă 1 supozitor de 2 ori pe zi (dimineața și seara), asociat cu 50 mg diclofenac sodic administrat oral; la pacienții cu sensibilitate a mucoasei rectale, în antecedente, pentru a se evita iritațiile locale, se recomandă un supozitor seara, asociat cu 50-100 mg diclofenac sodic administrat oral.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului; hipersensibilitate la alte AINS (inclusiv criză de astm, urticarie sau rinită acută). Ulcer gastroduodenal; insuficiență hepatică severă; insuficiență renală severă; insuficiență cardiacă severă sau necontrolată terapeutic; antecedente recente de rectită sau rectoragii; ultimul trimestru de sarcină (după luna a VI-a).
A!: Se monitorizează funcția hepatică. Prudență la pacienții cu deficit de glucozo-6-fosfat-dehidrogenază. Asocieri nerecomandate: alte antiinflamatoare nesteroidiene incluzând salicilați, anticoagulante orale, heparină și ticlopidină, dispozitive intrauterine: posibilitatea diminuării eficacității dispozitivelor intrauterine; litiu, metotrexat, diuretice, antihipertensive (și blocante, captopril, lizinopril, diuretice), interferon alfa. Prudență și sub supraveghere la pacienții cu afecțiuni gastrointestinale în antecedente (ulcer duodenal, colită ulcerohemoragică, boală Crohn) și la cei cu antecedente de tulburări hematologice sau tulburări de coagulare (se recomandă examene hematologice periodice și pe parcursul tratamentului). Se monitorizează funcția renală la pacienții cu insuficiență cardiacă, ciroză sau nefropatie cronică, la pacienții tratați cu diuretice, după o intervenție chirurgicală majoră care antrenează o hipovolemie. La pacienții vârstnici și subponderali se recomandă utilizarea celei mai mici doze eficace. Nu se recomandă conducerea autovehiculelor sau utilajelor.
RA: Greață, vărsături, dureri epigastrice, diaree, crampe abdominale, dispepsie, flatulență, anorexie; rare cazuri de ulcer gastroduodenal, hemoragie digestivă sau perforate, exacerbarea colitei ulcerohemoragice; iritații locale sau agravarea bolii hemoroidale, ocazional cefalee, amețeli și somnolență; pot să apară în cazuri izolate parestezii, tulburări de memorie, dezorientare, tulburări de vedere și auz, insomnie, iritabilitate, depresie, anxietate; ocazional erupții cutanate și urticarie; cazuri izolate de erupții buloase, eczeme, eritem polimorf, eritrodermie, purpură; rar, edeme periferice, insuficiență renală acută, hematurie, nefrite, proteinurie și necroză papilară; creșteri ale transaminazelor, hepatite cu sau fără icter; excepțional leucopenie, trombocitopenie, agranulocitoză, anemie hemolitică

sau aplastică; manifestări dermatologice (exantem, exemă), manifestări respiratorii (bronhospasm, excepțional reacții anafilactoide). Tulburări ce țin de calea de administrare: manifestări ușoare ce pot să apară la începutul tratamentului - diaree, colici, balonări și dureri rectale.

ACENOSIN *COD ATC: C02LA51*

HEMOFARM; Dj. cu 0,1 mg reserpină, 0,5 mg dihidroergocristină și 5 mg clopamid ***(P-6L)***

Ind: HTA.
Dz: *Inițial:* 1 dj./zi. În cazuri grave, 2 sau 3 dj./zi. *Trat. de întreținere:* 1 dj./zi sau la 2 zile.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenți și la sulfonamide, hipokaliemie, IH; IR grave, insuficiență coronariană gravă, IMA recent, ateroscleroză avansată, depresie psihică, terapie prin electroșocuri în antecedente, ulcer peptic activ. Sarcină și alăptare.
A!: Adaptarea dozei de agent antidiabetic. La pacienții cu gută poate provoca o creștere a uricemiei. Verificarea potasemiei. Șoferi și activități de precizie.
RA: Tulburări gastrointestinale (greață și vărsături), tulburări electrolitice (în special hipokaliemie), hTA, oboseală, slăbiciune musculară, congestie nazală; rar depresie psihică sau trombocitopenie.

ACTIFED *COD ATC: R01BA52*

GLAXO SMITHKLINE; Cpr. cu 2,50 mg triprolidină clorhidrat și 60 mg pseudoefedrină clorhidrat ***(OTC)***

Ind: Ameliorarea simpt. afecțiunilor tractului respirator superior (rinite alergice, rinite vasomotorii, răceală obișnuită și gripă).
Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* 1 cpr. 3-4 ori pe zi. *Copii sub 12 ani:* 6-12 ani – 1/2 cpr. sau de 3-4 ori pe zi. *2-5 ani* – 1/4 cpr. de 3-4 ori pe zi.
Cind: Intoleranță la pseudoefedrină sau triprolidină, HTA, afecțiuni coronare grave, trat. cu IMAO în cele 2 săpt. dinaintea începerii adm. de Actifed. Consumul concomitent de alcool sau alte sedative cu acțiune la nivel central.
A!: Determină somnolență și afectează performanțele în testele auditive. Șoferi și activități de precizie. Asocierea cu antiHTA, antidepresive triciclice, alte simpatomimetice. HTA, afecțiuni cardiace, diabet, hipertiroidism, HT intraoculară și adenom de prostată.
RA: Somnolență, tulburări ale somnului, halucinații, rash tegumentar, tahicardie, uscăciunea gurii, nasului și gâtului, retenție urinară.

ACTIVELLE *COD ATC: G03FA01*

NOVO NORDISK; Cpr. film. cu estradiol 1 mg și noretisteron acetat 0,5 mg ***(P-6L)***

Ind: Terapie de substituție hormonală pentru simptomele deficienței estrogenice la femeile la care menopauza s-a instalat de mai bine de un an.
Dz: Un cpr. zilnic, fără întrerupere.
Cind: Sarcină, alăptare, cancer de sân, tumori estrogeno-dependente, sângerări vaginale nediagnosticate, procese tromboembolice active sau recente, afec-

țiuni hepatice acute sau cronice și hipersensibilitate cunoscută la unul din ingredienți.
A!: Leiomiom, endometrioză, hiperplazia endometrului, afecțiuni fibrochistice ale sânului, perturbări tromboembolice, HTA, diabet zaharat cu implicații vasculare, afecțiuni hepatice, colelitiază, otoscleroză, migrenă, tromboză venoasă profundă sau embolism pulmonar.
RA: Tensiune mamară, cefalee, vertij, tumefacția sânilor, dureri abdominale, greață, flatulență, sângerări vaginale, creșterea în volum a fibroamelor uterine, prurit cutanat, insomnie, depresie, tromboembolism venos și edeme.
RA: Alergii, tulburări gastrice.

ADDAMEL N *COD ATC: A12CXN0*
FRESENIUS KABI AS GmbH; Conc. pt. sol. perf. conț. clorură de crom 5,33 µg, clorură de cupru 0,34 mg, clorură de fier 0,54 mg, clorură de mangan 0,99 µg, molibdat de sodiu 4,85 µg, selenit de sodiu 10,5 µg, clorură de zinc 1,36 mg, iodură de potasiu 16,6 µg, fluorură de sodiu 0,21 mg, sorbitol 300 mg, acid clorhidric (pH 2,2)/1 ml; f. × 10 ml ***(S)***

Ind: Ca supliment în nutriția i.v. la adulți (electroliți).
Dz: O fiolă de 10 ml/zi în sol. perf.
Cind: Intoleranță la fructoză.
A!: Afectarea funcției renale sau/și biliare când excreția electroliților poate fi semnificativ scăzută. Sarcină și alăptare.

ADVIL COLD® *COD ATC: R01BA52*
WYETH LEDERLE PHARMA GmbH; Dj. cu ibuprofen 200 mg și clorhidrat de pseudoefedrină 30 mg ***(OTC)***

Ind: Congestie nazală și/sau sinusală cu cefalee și febră, rinită acută, sinuzită, viroză respiratorie și gripă.
Dz: *Adulți, vârstnici și copii peste 15 ani:* inițial 1-2 dj., apoi se poate repeta la intervale de 4-6 ore, fără a depăși 4 dj./zi.
Cind: Hipersensibilitate la ibuprofen, acid acetilsalicilic, alte AINS, pseudoefedrină sau la oricare dintre componenții produsului. Tahiaritmii, HTA, feocromocitom, IH gravă, IR gravă, ulcer gastric sau duodenal activ, diabet zaharat, glaucom cu unghi închis, LES. Copii sub 15 ani. Asocierea cu IMAO.
A!: Produsul nu se recomandă în caz de rinită alergică sau vasomotorie. La pacienții cu ulcer gastric sau duodenal, hernie hiatală sau hemoragii digestive în antecedente este necesară o supraveghere atentă în timpul trat. La începutul trat. este necesară monitorizarea volumului diurezei și a funcției renale la pacienții cu IC, ciroză și nefropatii, la cei tratați cu diuretice, la cei cu IRC, îndeosebi la vârstnici. Prudență la pacienții cu angină pectorală, hipertiroidie, psihoză, tulburări de micțiune, îndeosebi vârstnici cu adenom de prostată. Sportivii trebuie avertizați că pseudoefedrina poate determina pozitivarea testelor antidoping. Asocierea cu diuretice, metotrexat în doze < 15 mg/săpt., pentoxifilină, antihipertensive, trombolitice. Șoferi și activități de precizie. Sarcină și alăptare.
RA: *Gastrointestinale:* greață, vărsături, epigastralgii, dispepsie, hemoragii oculte sau manifeste, tulburări de tranzit; *reacții de hipersensibilitate:* erupții cutanate, rash, prurit, edeme, crize de astm; *neurologice:* foarte rar vertij și cefalee;

oculare: cazuri rare de tulburări de vedere; foarte rar reacții adverse *hepatice* (creșterea tranzitorie a transaminazelor), *renale* (oligurie, IR), *hematologice* (agranulocitoză, anemie hemolitică); uscăciunea mucoasei bucale, insomnie, migrenă, anxietate.

AFACORT *COD ATC: S01CA01*
ANFARM HELLAS; Sol. oft. 1 ml colir conține: dexametazonă 0,83 mg, neomicină 3,50 mg, fl × 5 ml ***(P-RF)***

Ind: Antiinflamator, antimicrobian în infecții microbiene oculare: conjunctivite inflamatorii alergice și nealergice; keratite; inflamații ale uveei, sclerei și episclerei; inflamații cauzate de arsuri (chimice, solare), corpi străini; postoperator - după intervenții intrabulbare sau keratoplastii.
Dz: Instilare în sacul conjunctival a 1-2 pic. de 3-6 ori/zi. După 3-4 zile, se reduce frecvența adm. la 2-3 aplicații/zi.
Cind: Keratite herpetice; micoze oculare; în cursul și după perioada de vaccinare; inflamații oculare; purulente, fără trat. chimioterapic; ulcere și abcese ale țesutului kerato-conjunctival; Trachoma; hipersensibilitate la neomicină; sd. Cushing la copii.
RA: Creșterea presiunii intraoculare, mai ales la persoanele cu glaucom sau cu predispoziție la HT intraoculară; activarea sau predispunerea la forme inflamatorii ca: herpes, micoze sau infecții bacteriene (mai ales cu Pseudomonas).

AKNEMYCIN-PLUS *COD ATC: D01AF52*
HERMAL KURT HERMANN GmbH; Sol. cut. eritromicină 4 g și tretinoin 0,025 g/100g; fl. × 25 ml ***(P-6L)***

Ind: Trat. tuturor formelor de acnee: forme neinflamatorii comedogene și forme cu papule și pustule, în special cele asociate unui ten foarte gras.
Dz: În primele zile de trat., se va aplica pe zona afectată o dată/zi, seara, apoi, în funcție de toleranța individuală se va aplica o dată sau de două ori/zi, 9-12 săpt.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului. Antecedente personale și heredocolaterale de epiteliom. Eczeme acute, acnee rozacee și inflamații cutanate acute, localizate în special perioral. Arsuri solare. Sarcină și alăptare.
A!: În timpul trat. se va evita expunerea la soare sau lămpi cu UV, precum și la condiții meteo extreme și utilizarea produselor cosmetice, în special cele astringente.
RA: Iritație cutanată sub formă de eritem sau descuamare. Accentuarea simptomelor inflamatorii ale acneei la începutul trat., dar aceste fenomene sunt tranzitorii. Este posibilă o depigmentare la non-caucazieni.

ALFOGEL *COD ATC: A02AB10*
GALENICA a.d.; Gel 55 g ALPO 4 coloidal + pectine + agar + zahăr până la 100 g ***(OTC)***

Ind: Ulcer gastric și duodenal, gastrită hiperacidă, esofagită de reflux.
Dz: Int., câte 1-2 lingurițe la 1 și 3 ore după mese, apoi se reia ciclul masă-antiacid.

Cind: Abdomen acut, gastrită hipoacidă, hiperfosfatemie, asocierea cu tetracicline, digoxină.
A!: IR avansată.

ALGOMIN

LABORMED PHARMA SA; Cpr. 175 mg acid acetilsalicilic, 75 mg paracetamol, 15 mg cafeină anhidră, 3 mg maleat de clorfeniramin; ct. × 2 blis. × 10 cpr. și ct. × 200 blist. × 10 cpr. ***(S/OTC)***

Ind: Trat. simptomatic în dureri de intensitate medie cu diferite localizări (cefalee, migrene, mialgii, artralgii, dureri dentare sau din sfera ORL, dismenoree), în stări febrile, congestie nazală.
Dz: Se adm. un cpr. la nevoie; dacă este necesar doza poate fi repetată fără a depăși 4 cpr. Algomin pe zi. Dacă simptomatologia nu se ameliorează, se recomandă consult medical.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului; Copii sub 12 ani cu febră produsă de afecțiuni virale; Insuficiență hepatocelulară; Insuficiență renală severă; Ulcer gastro-duodenal activ, hemoragie digestivă, boli hemoragice și alte boli cu risc hemoragic; Deficit de glucozo-6-fosfatdehidrogenază; Adenom de prostată, glaucom cu unghi închis, stenoză pilorică, ileus paralitic, miastenie; Sarcină și alăptare.
A!: Astm bronșic și alte afecțiuni alergice respiratorii, hipersensibilitate la analgezice antiinflamatorii. În caz de antecedente de ulcer sau de hemoragii digestive, în insuficiență renală și hepatică ușoare-moderate. Sportivi. Insuficiență respiratorie. Produsul poate influența capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje din cauza existentei unui risc de reacții adverse neurologice.
RA: Tulburări digestive - epigastralgii, mici sângerări digestive, greață, vărsături, diaree, declanșarea sau agravarea unei suferințe gastrice preexistente. Relativ rar pot să apară reacții alergice - erupții cutanate, edem angioneurotic, crize de astm. În cazuri izolate poate să apară agranulocitoza (faringită, febră). Rareori sedare accentuată, somnolență și oboseală, reacții care apar la doze mari. În caz de supradozare pot să apară tahipnee cu alcaloză, afectare hepatică, deprimare la nivelul sistemului nervos central, tahicardie.

ALGOSTOP

COD ATC: N02BE51

OZONE LAB. Ltd.; Cpr. cu 500 mg paracetamol, 43 mg cofeină benzoat sodic și 20 mg fosfat de codeină ***(OTC)***

Ind: Cefalee, dureri dentare, nevralgii, mialgii, dismenoree, stări febrile, gripă.
Dz: *Adulți:* 1-2 cpr. de 3-4 ori/zi. *Copii peste 6 ani:* 1/2-1 cpr. de 3-4 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la paracetamol, cofeină și codeină, porfirie hepatică acută, deficit de G-6-PDH, IR și IH, copii sub 6 ani.
A!: Stări de deprimare respiratorie și hipoxie, ulcer gastroduodenal, anemie, tulburări renale și hepatice. Codeina figurează pe lista substanțelor dopante (interzise la sportivi). Sarcină și alăptare.
RA: Erupții cutanate alergice, trombocitopenie, anemie, agranulocitoză, leziuni renale și hepatice; constipație, rareori dependență, creșterea presiunii intrabiliare și durere (prin codeină); palpitații, anxietate, tremor.

ALKA SELTZER "ZITRONEN" *COD ATC: N02BA01*
BAYER AG; Cpr. eff. cu 324 mg acid acetilsalicilic ***(OTC)***

Ind: Trat. durerilor de intensitate slabă sau moderată, febrei, în boli cardiovasculare sau cerebrovasculare, ca agent antiplachetar în profilaxia IMA, al anginei pectorale instabile, ischemiei acute tranzitorii și accidentelor cerebrovasculare ischemice.
Dz: Ca analgezic, antipiretic și antiinflamator. *Adulți:* 250-1000 mg în priză unică, repetându-se la nevoie la intervale de 4-8 ore, maxim 4 g/zi. *Copii: 5-9 ani* - 250 mg o dată, repetându-se la intervale de 4-8 ore, maxim 750 mg/zi. Ca antiagregant plachetar: *Adulți:* 100 mg pe zi sau 500 mg la 2-3 zile.
Cind: Alergie cunoscută la acidul acetilsalicilic sau la alte componente ale produsului, intoleranță la alte AINS, diateză hemoragică, ulcer gastric sau duodenal, ultimul trimestru de sarcină.
A!, RA: vezi *ACIDUM ACETYLSALYCILICUM.*

ALMAGEL *COD ATC: A02AD01*
BALKAN PHARMA DUPNITZA AD; Susp. orală 5 ml conțin: 4,75 ml hidroxid de aluminiu gel și 100 mg hidroxid de magneziu gel; fl. × 200 ml ***(OTC)***

Ind: Ulcer gastric și duodenal, gastrită hiperacidă, esofagită de reflux.
Dz: Int., 1-2 lingurițe la 1 și 3 ore după mese, apoi se reia ciclul masă-antiacid.
Cind: Abdomen acut, gastrită hipoacidă, alergie la benzocaină, hiperfosfatemie, asocierea cu tetracicline, digoxină (le scade efectul).
A!: IR avansată.
RA: Carență fosfatică cu osteoporoză, hipercalciurie și nefrolitiază secundară.

ALMAGEL A *COD ATC: A02AD01*
BALKAN PHARMA DUPNITZA AD; Susp. orală 100 ml conțin: 4 g hidroxid de aluminiu, 1 g hidroxid de magneziu și 2 g benzocaină; fl. × 200 ml ***(OTC)***

Ind: Ulcer gastric și duodenal, gastrită hiperacidă, esofagită de reflux.
Dz: Int., câte 1-2 lingurițe la 1 și 3 ore după mese, apoi se reia ciclul masă-antiacid.
Cind: Abdomen acut, gastrită hipoacidă, alergie la benzocaină, hiperfosfatemie, asocierea cu tetracicline, digoxină (le scade efectul) sau sulfonamide - benzocaina îi antagonizează efectul.
A!: IR avansată.
RA: Reacții alergice cutanate (la benzocaină); carență fosfatică cu osteoporoză, hipercalciurie și nefrolitiază secundară.

ALPHACAINE-N *COD ATC: N01BB58*
LAB. SPAD; Sol. inj. 1,8 ml conțin 72 mg articaină clorhidrat și 10,8 µg clorhidrat de adrenalină (f. × 1,8 ml) ***(S)***

Ind: Anestezie plexală, tronculară, intraligamentară, în caz de: intervenții chirurgicale realizate la nivelul mucoaselor (în profunzime), osului sau pulpei dentare, de exemplu în cazul extracției sau pulpectomiei, unde este necesară o ischemie mai intensă; intervenții chirurgicale de lungă durată, intervenții muco-gingivale, osteosinteză percutană, cistectomie, precum și complicațiile pregătirii cavităților și bonturilor pentru acoperirea cu microproteze.

Dz: Dozele sunt individualizate în funcție de gradul de dificultate și durata intervenției.
Cind: Hipersensibilitate la articaină sau la alte anestezice locale, la adrenalină sau la oricare dintre componenții produsului; sarcină sau suspiciune de sarcină; copii sub 4 ani; deficit de colinesterază; Cardiopatie, arteriopatii grave, hipertensiune arterială, ischemie, cefalee, hipertiroidie, nefropatie, diabet zaharat, glaucom cu unghi închis, anestezie în teritoriile cu circulație terminală.
A!: Nu se adm. i.v. Înainte de utilizarea anestezicului, medicul trebuie să controleze parametrii circulatori ai pacientului. Trebuie evitat supradozajul de anestezic și două doze maxime se pot administra doar după un interval de cel puțin 24 ore. Pentru obținerea efectului dorit este recomandată folosirea celei mai mici doze de anestezic și a celei mai mici concentrații de vasoconstrictor. Pacientul trebuie supravegheat continuu, iar la primul semn de alarmă (de exemplu modificări senzoriale), administrarea anestezicului trebuie întreruptă imediat. Rareori după administrarea anestezicelor locale s-au raportat reacții adverse grave, uneori fatale, chiar în absența reacțiilor de hipersensibilitate în antecedente; de aceea, este necesar să fie disponibile echipament medical, produse medicamentoase și personal calificat, apt pentru tratamente de urgență. Sportivii trebuie avertizați că produsul conține un principiu activ care poate produce reacții pozitive la testele antidoping. Efectul de creștere a TA poate fi potențat de către antidepresivele triciclice sau IMAO.
RA: În cazul folosirii anestezicelor locale asociate cu vasoconstrictoare pot să apară reacții toxice sau alergice: fenomene de stimulare nervos centrală cu excitație, tremor, dezorientare, vertij, creșterea temperaturii corporale, iar în cazul dozelor foarte mari, trismus și convulsii. Dacă este afectată măduva spinării pot fi afectați centri cardiovasculari, respiratori și ai emezei și pot să apară transpirație, aritmii, HTA, tahipnee, bronhodilatație, greață și vărsături. Pot să apară efecte de tip periferic la nivelul aparatului cardiovascular cu bradicardie și vasodilatație. Reacțiile alergice pot să apară îndeosebi la pacienți cu hipersensibilitate. Manifestările locale includ rash cutanat de diferite tipuri, urticarie, prurit; manifestările generale includ bronhospasm, edem laringian, șoc anafilactic; anxietate, transpirație, aritmii, hipertensiune arterială (în special la pacienții hipertensivi sau hipertiroidieni), cefalee, fotofobie, dureri retrosternale sau faringiene, vărsături.

ALPHACAINE-SP *COD ATC: N01BB58*
LAB. SPAD; Sol. inj. 1,8 ml conțin 72 mg articaină clorhidrat și 21,6 µg clorhidrat de adrenalină (f. × 1,8 ml) ***(S)***

Ind, Dz, A!, RA: vezi *ALPHACAINE-N*

AMINOMIX 1 *COD ATC: B05BA01*
FRESENIUS KABI GmbH; Sol. perf. conținând la 1000 ml: L-izoleucină 2,50 g, L-leucină 3,70 g, L-lizină 4,125 g, L-metionină 2,15 g, L-fenilalanină 2,55 g, L-treonină 2,20 g, L-triptofan 1,0 g, L-valină 3,10 g, L-arginină 6,0 g, L-histidină clorhidrat 1,50 g, glicocol 7,0 g, L-alanină 7,50 g, L-prolină 7,50 g, L-acid malic 3,065g; electroliți în mmol (Mval/1): Na (50), K (30), Ca (2,5), Mg (2,5), Zn (0,04), Cl (100,11); maleat (22,8), glicerofosfat (15); aminoacizi totali (50 g/l) kcal/l = 1000. ***(S)***

Ind: Aport parenteral de aminoacizi, glucoză și electroliți, atunci când alimentația pe cale orală sau enterală este imposibilă sau insuficientă.

Dz: Doza medie este de 20-30 ml/kg/zi, ceea ce corespunde la: aminoacizi 1,0-1,5 g, glucoză 4,0-6,0 g. Doza maximă este de 30 ml/kg/zi, ceea ce corespunde la: aminoacizi 1,5 g, glucoză 6 g. Se administrează într-o venă centrală.
Cind: Tulburări în metabolismul aminoacizilor, dezechilibre acido-bazice (acidoză metabolică), IH, IR, hiperkaliemie, hiperglicemie, hiperhidratare; nou-născuți și copii sub 2 ani.
A!: Aminomix 1 trebuie folosit imediat după amestecarea soluțiilor din cele două compartimente. Nu se adm. într-o venă periferică. Se introduce în perfuzie lentă (0,9-1,5 ml/min), ținând seama de riscul producerii diurezei osmotice și pierderii renale de aminoacizi. În primele zile de terapie sunt necesare evaluări clinice și analize de laborator repetate, pentru a preveni complicațiile metabolice sau a micșora frecvența acestora. Este necesară monitorizarea glicemiei. La unii pacienți trebuie administrată insulină pentru controlul hiperglicemiei și pentru prevenirea glicozuriei. Se adm. cu prudență la pacienții cu diabet. Este necesară supravegherea periodică a balanței hidrice, precum și a osmolarității serului. Vitaminele, electroliții suplimentari și oligoelementele se administrează în funcție de necesități. În condițiile adăugării de electroliți și în prezența unei emulsii lipidice, stabilitatea amestecului se păstrează atunci când concentrația cationilor bivalenți (Mg^{2+}, Ca^{2+}) nu depășește 10,8 mmol/l pentru emulsia injectabilă de ulei de soia, fosfatide și glicerol și 5 mmol/l pentru alte emulsii lipidice.
RA: O perfuzie prea rapidă poate provoca: greață, vărsături, frisoane, hiperglicemie, glicozurie, diureză, pierdere renală de aminoacizi, coma hiperosmolară.

AMINOMIX 2 *COD ATC: B05BA01*
FRESENIUS KABI GmbH; Sol. perf. conținând la 1000 ml: L-izoleucină 2,50 g, L-leucină 3,70 g, L-lizină 4,125 g, L-metionină 2,15 g, L-fenilalanină 2,55 g, L-treonină 2,20 g, L-triptofan 1,0 g, L-valină 3,10 g, L-arginină 6,0 g, L-histidină 1,50 g, glicină 7,0 g, L-alanină 7,50 g, L-prolină 7,50 g, L-acid malic 3,81 g; glucoză 132 g; electroliți în mmol (Mval/1): Na (50), K (30), Ca (2,5), Mg (2,5), Zn (0,04), Cl (85,11); maleat (28,4), glicerofosfat (15); aminoacizi totali (50 g/l) kcal/l = 680 ***(S)***

Ind: Aport parenteral de aminoacizi, glucoză și electroliți, atunci când alimentația pe cale orală sau enterală este imposibilă sau insuficientă.
Dz: Doza medie este de 20-40 ml/kg/zi. Doza maximă este de 40 ml/kg/zi, ceea ce corespunde la: aminoacizi 2 g, glucoză 4,8 g. Se administrează într-o venă centrală.
Cind: Tulburări în metabolismul aminoacizilor, dezechilibre acido-bazice (acidoză metabolică), IH, IR, hiperkaliemie, hiperglicemie, hiperhidratare; nou-născuți și copii sub 2 ani.
A!: Aminomix 2 trebuie folosit imediat după amestecarea soluțiilor din cele două compartimente. Nu se adm. într-o venă periferică. Se introduce în perfuzie lentă (0,8-1,7 ml/min), ținând seama de riscul producerii diurezei osmotice și pierderii renale de aminoacizi. În primele zile sunt necesare evaluări clinice și analize de laborator repetate, pentru a preveni complicațiile metabolice sau a micșora frecvența acestora. Este necesară monitorizarea glicemiei. La unii pacienți trebuie administrată insulină pentru controlul hiperglicemiei și pentru prevenirea glicozuriei. Trebuie adm. cu prudență la pacienții cu diabet. Este necesară supravegherea periodică a balanței hidrice, precum și a osmolarității serului. Vitaminele, electroliții suplimentari și oligoelementele se administrează în funcție de necesități. În condițiile adăugării de electroliți și

în prezența unei emulsii lipidice, stabilitatea amestecului se păstrează atunci când concentrația cationilor bivalenți ($Mg2^{+}$, $Ca2^{+}$) nu depășește 10,8 mmol/l pentru emulsia injectabilă de ulei de soia, fosfatide și glicerol și 5 mmol/l pentru alte emulsii lipidice.
RA: O perfuzie prea rapidă poate provoca: greață, vărsături, frisoane, hiperglicemie, glicozurie, diureză, pierdere renală de aminoacizi, coma hiperosmolară.

AMINOMIX 3 *COD ATC: B05BA01*
FRESENIUS KABI GmbH; Sol. perf. conținând la 1000 ml: L-izoleucină 2,50 g, L-leucină 3,70 g, L-lizină 4,655 g, L-metionină 2,15 g, L-fenilalanină 2,55 g, L-treonină 2,20 g, L-triptofan 1,0 g, L-valină 3,10 g, L-arginină 6,0 g, L-histidină 1,50 g, L-alanină 7,50 g, L-prolină 7,50 g, L-acid malic 3,065 g; glucoză 132 g; aminoacizi totali (50 g/l) kcal/l = 680 ***(S)***

Ind: Pentru aport de aminoacizi și de glucoză, atunci când alimentația orală sau enterală este imposibilă sau insuficientă.
Dz: Doza medie la *adult* este de 20-30 ml/kg/zi, ceea ce corespunde la aminoacizi 1,0-1,5 g și 1500-2100 ml pe zi, adică 16-25 picături/min și 55-90 ml/oră. Doza maximă este de 40 ml/kg/zi, ceea ce corespunde la 2 g aminoacizi și 4,8 g glucoză.
Cind: Tulburări ale metabolismului aminoacizilor, dezechilibre acido-bazice, IR, IH, hiperkaliemie, hiperglicemie, hiperhidratare, nou-născuți și copii sub 2 ani.
A!: *Aminomix 3* trebuie folosit imediat după amestecarea soluțiilor din cele două compartimente. Produsul nu se adm. într-o venă periferică. Se adm. în perfuzie lentă (0,8-1,7 ml/min), ținând seama de riscul producerii diurezei osmotice și pierderii renale de aminoacizi. Îndeosebi în primele zile de terapie sunt necesare evaluări clinice și analize de laborator repetate, pentru a preveni complicațiile metabolice sau a micșora frecvența acestora. În timpul tratamentului se monitorizează glicemia. La unii pacienți trebuie adm. insulina pentru controlul hiperglicemiei și pentru prevenirea glucozuriei. Prudență la pacienții cu diabet manifest sau diabet subclinic cunoscut. Este necesară supravegherea periodică a balanței hidrice, precum și a osmolarității serului. Vitaminele, electroliții suplimentari și oligoelementele se administrează în funcție de necesități. În cazul adăugării de electroliți și în prezența unei emulsii lipidice, stabilitatea amestecului se păstrează atunci când concentrația cationilor bivalenți (Mg^{+}, Ca^{+}) nu depășește 10,8 mmol/l pentru emulsia injectabilă de ulei de soia, fosfatide și glicerol și 5 mmol/l pentru alte emulsii lipidice.
RA: O perfuzie prea rapidă poate provoca: greață, vărsături, frisoane, hiperglicemie, glicozurie, diureză, pierdere renală de aminoacizi, comă hiperosmolară.

AMINOPLASMAL -5%E, -10%E *COD ATC: B05BA01*
B. BRAUN MELSUNGEN; Sol. perf. conținând, la 1000 ml: aminoacizi 52 g/104 g, xilină 50 g/100 g, Na 48 mmol, K 25 mmol, Mg 5 mmol, acetat 53 mmol, Cl 90 mmol, riboflavină fosfat de sodiu 20 mg, nicotinamidă 20 mg, piridoxină clorhidrică 30 mg, acid ascorbic 40 mg ***(S)***

Ind: Nutriția parenterală – profilaxia și trat. deficitului proteic; pre- și postoperator sau posttraumatic și după rezecții de stomac și intestin; în sindroame de malabsorbție, boli inflamatorii ale tractului gastrointestinal, diaree și vomă persistente; IR.
Dz: În perf. i.v. lentă, 40-60 pic./min. (120-180 ml/oră) 30 ml/kg corp/zi.

Cind: Tulburări ale metabolismului aminoacizilor, IH, IC necompensată, IR cu azot rezidual crescut, hiperkaliemie, acidoză, hiperhidratare.

AMINOPLASMAL HEPA 10% *COD ATC: B05BA01*
B. BRAUN MELSUNGEN; Sol. perf. conținând la 1000 ml: L-izoleucină 8,8 g, L-leucină 13,60 g, L-lizină acetat 10,6 g, L-metionină 1,20 g, L-fenilalanină 1,6 g, L-treonină 4,60 g, L-triptofan 1,50 g, L-valină 10,6 g, L-arginină 8,8 g, L-histidină 4,7 g, glicocol 6,30 g, L-alanină 8,3 g, L-prolină 7,10 g, L-acid aspartic 2,50 g, L-aspargină 0,55 g, L-cistină 0,80 g, L-acid glutamic 5,7 g, L-ornitină 1,66 g, L-serină 3,70 g, L-tirozină 0,86 g, acetil tirozină 0,86 g, acetat de magneziu 0,56 g, hidroxid de sodiu 1,73 g, hidroxid de potasiu 1,4 g ***(S)***

Ind: Profilaxia și trat. stărilor de carență proteică: pre- și postoperator, posttraumatic, arsuri, osteomielită, malabsorbție, intoxicații, nefroze.
Dz: Perf i.v. 1-2 g aminoacizi/kg/zi, cu o viteză de 40-60 de pic./min. (120-180 ml/oră).
Cind: Leziuni hepatice grave, tulburări în metabolismul aminoacizilor, IC manifestă, IR, acidoză.

AMINOSOL KE *COD ATC: B05BA01*
HEMOFARM; Sol. perf. conținând, la 1000 ml: aminoacizi echilibrați 50 g, sorbitol 75 g, Na 30 mmol, K 20 mmol, Mg 5 mmol, Cl 60 mmol, maleat 17,5 mmol ***(S)***

Ind: Pentru nutriția parenterală în scopul profilaxiei și tratamentul deficitului proteic; pre- și postoperator sau posttraumatic și după rezecții de stomac și intestin; în sindroame de malabsorbție, boli inflamatorii ale tractului gastrointestinal, diaree și vomă persistente.

AMINOSOL L 600 *COD ATC: B05BA01*
HEMOFARM; Sol. perf. conținând, la 1000 ml: isoleucină 1,4 g, leucină 2,2 g, lizină 2 g, metionină 2,2 g, fenilalanină 2,2 g, treonină 1 g, triptofan 0,5 g, valină 1,6 g, arginină 5 g, histidină 1,2 g, ornitin aspartat 0,5 g, glicocol 10 g, alanină 17,1 g, prolină 3,5 g, sorbitol 100 g, ac. malic 3,5 g, clorură de potasiu 1,864 g, vit. B_2 2 mg, nicotinamidă 15 mg, dexpantenol 10 mg, vit. B_6 2 mg, rutin 0,24 g ***(S)***

Ind: Pentru nutriția parenterală în scopul profilaxiei și tratamentul deficitului proteic; pre- și postoperator sau posttraumatic și după rezecții de stomac și intestin; în sindroame de malabsorbție, boli inflamatorii ale tractului gastrointestinal, diaree și vomă persistente; insuficiență renală cu valori ușor crescute ale azotului rezidual după analiză.

AMINOSOL L 800 *COD ATC: B05BA01*
HEMOFARM; Sol. perf. conținând, la 1000 ml: isoleucină 2,8 g, leucină 4,4 g, lizină 4 g, metionină 4,4 g, fenilalanină 4,4 g, treonină 2 g, triptofan

1 g, valină 3,2 g, arginină 10 g, histidină 2,4 g, ornitin aspartat 1 g, glicocol 20 g, alanină 34,2 g, prolină 7 g, sorbitol 100 g, ac. malic 7 g, vit. B_2 2 mg, nicotinamidă 15 mg, dexpantenol 10 mg, vit. B_6 2 mg, rutin 0,24 g ***(S)***

Ind: Pentru nutriția parenterală în scopul profilaxiei și tratamentul deficitului proteic; pre- și postoperator sau posttraumatic și după rezecții de stomac și intestin; în sindroame de malabsorbție, boli inflamatorii ale tractului gastrointestinal, diaree și vomă persistente; insuficiență renală cu valori ușor crescute ale azotului rezidual după analiză.

AMINOSTERIL KE

COD ATC: B05BA01

FRESENIUS KABI GmbH; Sol. perf. conținând, la 1000 ml: isoleucină 2,5 g, leucină 3,7 g, lizină 4,12 g, metionină 2,15 g, fenilalanină 2,55 g, treonină 2,2 g, triptofan 1 g, valină 3,1 g, arginină 6 g, histidină 1,5 g, glicocol 7 g, alanină 7,5 g, prolină 7,5 g, sorbitol 150 g, ac. malic 4,7 g, clorură de sodiu 1,75 g, vit. B2 1 mg, nicotinamidă 15 mg, dexpantenol 10 mg, vit. B6 2 mg, rutin 0,2 g ***(S)***

Ind: Profilaxia și trat. stărilor de carență proteică: pre- și postoperator, posttraumatic, arsuri, osteomielită, malabsorbție, intoxicații, nefroze.
Dz: În perf i.v. lentă, cel mult 20-30 pic./min sau 1,3 ml/kg/oră; doza maximă este de 2 800 ml/zi pentru un adult de 70 kg, respectiv până la 3 g sorbitol/kg/zi.
Cind: Leziuni hepatice grave, tulburări în metabolismul aminoacizilor, IC manifestă, IR, acidoză, intoleranță la sorbită.

AMINOSTERIL KE NEPHRO

COD ATC: B05BA01

FRESENIUS KABI GmbH; Sol. perf. conținând la 1000 ml: L-izoleucină 7,52 g, L-leucină 11,38 g, L-lizină 10,82 g, L-metionină 6,59 g, L-fenilalanină 7,76 g, L-treonină 6,78 g, L-triptofan 2,91 g, L-valină 9,53 g, L-histidină 4,90 g, acid malic 6,53 g, conținut total în azot 8,8 g/l ***(S)***

Ind: Aport de aminoacizi esențiali și histidină în IR acută și cronică, precum și în timpul dializei peritoneale și hemodializei.
Dz: Perf i.v. lentă, 20 picături/min. Doza maximă zilnică 250 ml.
Cind: Leziuni hepatice grave, tulburări în metabolismul aminoacizilor, IC manifestă, anurie.

AMINOSTERIL N-HEPA 8%

COD ATC: B05BA01

FRESENIUS KABI GmbH; Sol. perf. 1 000 ml conțin: L-izoleucină 10,4 g, L-leucină 13,1 g, monoacetat de L-lizină 9,71 g, L-metionină 1,1 g, N-acetilcisteină 0,7 g, L-fenilalanină 0,88 g, L-treonină 4,4 g, L-triptofan 0,70 g, L-valină 10,1 g, L-arginină 6,7 g, L-histidină 2,8 g, Glicină 5,82 g, L-alanină 4,64 g, L-prolină 5,73 g, L-serină 2,24 g ***(S)***

Ind: Aport de aminoacizi în cadrul alimentației parenterale în forme severe de IH cu sau fără encefalopatie, atunci când nutriția orală sau enterală este imposibilă, insuficientă sau contraindicată.

Dz: În perfuzie i.v. pe cale centrală sau periferică. *Doza zilnică*: 1,0-1,25 ml/kg/oră, corespunzând la 0,08-0,1 g aminoacizi/kg/oră. *Viteza maximă de perfuzare:* 1,25 ml/kg și oră, corespunzând la 0,1 g aminoacizi/kg/oră. *Doza maximă zilnică* :1,5 g aminoacizi/kg, corespunzând la 18,75 ml/kg. În calitate de componentă a unui regim de alimentație parenterală total, trebuie asociat cu un substrat energetic adecvat (soluții de carbohidrați, emulsii lipidice), electroliți, vitamine și oligoelemente. Pentru o administrare optimă, soluțiile de carbohidrați și/sau emulsiile lipidice trebuie administrate simultan.
Cind: Tulburări ale metabolismului aminoacizilor, acidoză metabolică, hiperhidratare, hiponatremie, hipokaliemie, IR, IC decompensată, șoc, hipoxie.
A!: Se vor monitoriza echilibrul electrolitic și balanța acido-bazică. Electroliții și carbohidrații trebuie administrați în doze adecvate și, perfuzați, dacă este cazul, utilizând o piesă în Y sau amestecați într-o pungă "totul în unu". Datorită compoziției speciale a acestui produs, utilizarea sa în alte indicații decât cele recomandate poate determina dezechilibre ale aminoacizilor și tulburări metabolice severe. Alegerea unei vene periferice sau centrale depinde de osmolaritatea finală a amestecului. Valoarea acceptată a osmolarității, pentru perfuzarea pe venă periferică, este de 800 mosm/l, dar variază considerabil cu vârsta, starea generală a pacientului și starea venelor periferice.
RA: Nu apar, dacă se adm. conform recomandărilor.

AMINOSTERIL® KE 10% CU ELECTROLIȚI ȘI FĂRĂ CARBOHIDRAȚI *COD ATC: B05BA01*

FRESENIUS KABI GmbH; Sol. perf. conținând la 1000 ml: L-izoleucină 4,67 g, L-leucină 7,06 g, clorhidrat de L-lizină 7,46 g, L-metionină 4,1 g, L-fenilalanină 4,82 g, L-treonină 4,21 g, L-triptofan 1,82 g, L-valină 5,92 g, L-histidină 2,88 g, glicina 15,95 g, L-alanină 15 g, L-prolină 15 g, acid malic 8,08 g, clorură de magneziu 1,01 g, clorură de potasiu 0,68 g, hidroxid de sodiu 1,2 g ***(S)***

Ind: Profilaxia și trat. stărilor de carență proteică: pre- și postoperator, posttraumatic, arsuri, osteomielită, malabsorbție, intoxicații, nefroze.
Dz: În perf. i.v. lent 10-20 ml/kg și oră; doza maximă 2 g aminoacizi/kg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului. Dezechilibre ale metabolismului aminoacizilor, acidoză metabolică IH severă, IR netratată prin hemodializă sau hemofiltrare, IC decompensată.

AMINOSTERIL® KE 10% FĂRĂ ELECTROLIȚI ȘI FĂRĂ CARBOHIDRAȚI *COD ATC: B05BA01*

FRESENIUS KABI GmbH; Sol. perf. conținând la 1000 ml: L-izoleucină 5,000 g; L-leucină 7,400 g; L-lizină 6,600 g (sub formă de monoacetat de L-lizină 9,310 g); L-metionină 4,300 g; L-fenilalanină 5,100 g; L-treonină 4,400 g; L-triptofan 2,000 g; L-valină 6,200 g; L-arginină 12,000 g; L-histidină 3,000 g; Glicină 14,000 g; L-alanină 15,000 g; L-prolină 15,000 g; Acid acetic glacial 99% 5,297 g ; ct. x 10 flac. a 500 ml sol. perf. **(S)**

Ind: Nutriție parenterală parțială. Soluțiile de aminoacizi pot fi administrate într-un regim de nutriție parenterală totală, în asociere cu cantități adecvate de electroliți, carbohidrați sau emulsii lipidice, ca sursă suplimentară de energie.

Dz: Se adm. în perfuzie intravenoasă. Doza recomandată este de 1-1, 5 ml soluție/kg și oră sau 25 de picături/minut (pentru un pacient cu greutatea corporală de 70 kg). Doza zilnică maximă este de 1000 ml soluție/zi, corespunzător la 16 g azot/zi (pentru un pacient cu greutatea corporală de 70 kg). Soluția poate fi administrată atât timp cât este necesară nutriția parenterală.
CInd: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului. Dezechilibre ale metabolismului aminoacizilor, insuficiență renală, insuficiență cardiacă decompensată.
AI: Poate fi utilizat într-un regim de nutriție parenterală totală, în asociere cu un aport energetic adecvat (soluții de carbohidrați, emulsii lipidice), electroliți, vitamine și oligoelemente. Asocierea electroliților (care necesită monitorizarea ionogramei) și a carbohidraților (care se va face cu prudență dacă există acidoză lactică) se va realiza într-o balanță corectă sau printr-o conexiune în Y. Profilactic se adm. antihistaminice H_2.
RA: Dacă se administrează doze prea mari sau viteza de perfuzare este prea mare, pot să apară frisoane, greață, vărsături și pierderi renale crescute de aminoacizi. În aceste cazuri, perfuzarea va fi oprită imediat. Perfuzarea poate fi reluată apoi cu doze mai mici. O perfuzare prea rapidă printr-o venă periferică poate produce iritarea venei (este necesară menținerea osmolarității corecte).

AMINOVEN® 3,5% GLUCOZĂ/ELECTROLIȚI *COD ATC: B05BA01*
FRESENIUS KABI GmbH; Sol. perf. conținând la 1000 ml: L-tirozină 0,140 g; L-izoleucină 1,750 g; L-leucină 2,590 g; L-lizină 2,31g (sub formă de clorhidrat de L-lizină 2,885 g); L-metionină 1,505 g; L-fenilalanină 1,785 g; L-treonină 1,540 g; L-triptofan 0,700 g; L-valină 2,170 g; L-arginină 4,200 g; L-histidină 1,050 g; Glicină 3,850 g; L-alanină 4,900 g; L-prolină 3,920 g; L-serină 2,275 g; Taurină 0,350 g; Glucoză monohidrat 55,000 g (echivalent la glucoză anhidră 50 g); Clorură de sodiu 1,169 g; Clorură de calciu dihidrat 0,294 g (echivalent la clorură de calciu anhidră 0,222 g); Clorură de magneziu hexahidrat 0,610 g (echivalent la clorură de magneziu anhidră 0,286 g); Clorură de zinc 0,00545 g; Glicerofosfat de sodiu pentahidrat 4,592 g (echivalent la glicerofosfat de sodiu anhidru 3,241 g); Hidroxid de potasiu 1,980 g (echivalent la hidroxid de potasiu anhidru 1,68 g); Electroliți: Na^+ 50 mmol/l; K^+ 30 mmol/l; Ca^{++} 2 mmol/l; Mg^{++} 3 mmol/l; Zn^{++} 0,04 mmol/l; Cl^- 46,7 mmol/l; Glicerofosfat 15 mmol/l; ct. × 1 fl. a 500 ml sol. perf.; ct. × 10 fl. a 500 ml sol. perf.; ct. × 6 fl. a 1000 ml sol. perf. **(S)**

Ind: Indicat ca aport parenteral de aminoacizi, electroliți și glucoză pentru pacienții adulți atunci când alimentația orală sau enterală este imposibilă, insuficientă sau contraindicată.
Dz: Adm. în perf. i.v. continuă pe o cale venoasă periferică. Stabilirea dozei zilnice depinde de necesarul individual de lichide al pacientului. *Doza maximă zilnică* este de 40 ml/kg, echivalent la 1,4 g aminoacizi/kg și 2 g glucoză/kg. *Viteza maximă de perfuzare* este de 1,7 ml/kg și oră, echivalent la 0,06 g aminoacizi/kg și oră și 0,085 g glucoză/kg și oră. Poate fi administrat maximum o săptămână la pacienții cu status nutrițional satisfăcător până la bun și catabolism redus sau moderat.
CInd: Șoc; hipoxie; hiponatremie; hiperkaliemie; tulburări ale metabolismului aminoacizilor; insuficiență renală; insuficiență hepatică severă; hiperglicemie refractară la insulinoterapie, care impune administrarea a mai mult de 6 UI

insulină/oră; nou-născuți, sugari și copii mai mici de 12 ani sau cu greutatea corporală mai mică de 40 kg. Contraindicațiile generale ale tratamentului prin perfuzie intravenoasă: edem pulmonar acut; hiperhidratare; insuficiență cardiacă decompensată; deshidratare hipotonă; condiții clinice instabile (de exemplu, status posttraumatic sever, diabet zaharat decompensat, infarct miocardic acut, acidoză metabolică, septicemie și comă hiperosmolară).
A!: Monitorizarea regulată a ionogramei serice, balanței hidrice, funcției renale și glicemiei. Pentru reducerea riscului iritării venei, se recomandă examinarea zilnică a locului de abord venos. Alegerea unei căi de abord venos periferică sau centrală depinde de osmolaritatea finală a amestecului perfuzabil. În general, pentru un abord venos periferic limita superioară a osmolarității este de 800 mOsm/l. Se pot administra suplimentar lipide, vitamine, electroliți și oligoelemente. În caz de hipokaliemie și/sau hiponatriemie se vor administra simultan cantități adecvate de potasiu și/sau sodiu. Se adm. suplimentar acid folic. Prudență la administrarea în sarcină. Incompatibilități cu cationi polivalenți (calciu), ionul anorganic fosfat, alte produse medicamentoase.
RA: Iritarea peretelui venos și tromboflebită. Supradozarea sau viteza de perfuzare prea mare pot produce frisoane, greață, vărsături și creșterea pierderilor renale de aminoacizi. Pot apărea hiperhidratare, hiperglicemie și tulburări electrolitice. În acest caz, perfuzia trebuie oprită imediat și poate fi reluată utilizând o doză mai mică.

AMINOVEN 5% *COD ATC: B05BA01*
FRESENIUS KABI GmbH; Sol. perf. conținând, la 1000 ml: izoleucină 2,5 g, leucină 3,70 g, acetat de lizină 4,655 g, metionină 2,15 g, fenilalanină 2,55 g, treonină 2,20 g, triptofan 1,00 g, valină 3,10 g, arginină 6,00 g, histidină 1,50 g, alanină 7,00 g, glicină 5,50 g, prolină 5,60 g, serină 3,25 g, tirozină 0,20 g, taurină 0,50 g, aminoven 10%: Sol. perf. conținând, la 1000 ml: izoleucină 5 g, leucină 7,40 g, acetat de lizină 9,31 g, metionină 4,30 g, fenilalanină 5,10 g, treonină 4,40 g, triptofan 2,00 g, valină 6,20 g, arginină 12,00 g, histidină 3,00 g, alanină 14,00 g, glicină 11,00 g, prolină 11,20 g, serină 6,50 g, tirozină 0,40 g, taurină 1,00 g. Aminoven 15%: Sol. perf. conținând, la 1000 ml: izoleucină 5,2 g, leucină 8,90 g, acetat de lizină 15,66 g, metionină 3,80 g, fenilalanină 5,50 g, treonină 8,60 g, triptofan 1,60 g, valină 5,50 g, arginină 20,00 g, histidină 7,30 g, alanină 25,00 g, glicină 18,50 g, prolină 17,20 g, serină 9,60 g, tirozină 0,40 g, taurină 2,00 g ***(S)***

Ind: Aport de aminoacizi în cadrul alimentației parenterale. În calitate de componentă a unui regim de alimentație parenterală, aminoacizii trebuie administrați în asociere cu un substrat energetic adecvat.
Dz: Se adm. în perfuzie continuă pe venă periferică sau venă centrală. Doza depinde de deficitul de aminoacizi. În alimentația parenterală nu trebuie depășită doza maximă de 2 g aminoacizi/kg. *Doza zilnică*: 10-20 ml/kg (echivalent cu 1,0-2,0 g aminoacizi/kg). *Viteza maximă de perfuzare:* 1,0 ml/kg/oră (echivalent cu 0,1 g aminoacizi/kg/oră). *Doza maximă zilnică*: 20 ml/kg (echivalent cu 2,0 g aminoacizi/kg).
Cind: Tulburări ale metabolismului aminoacizilor, acidoză metabolică, IR netratată prin hemodializă sau hemofiltrare, IH severă, hiperhidratare, șoc, hipoxie. Pentru alimentația parenterală la nou-născuți, copii mici și copii trebuie folosite produse conținând aminoacizi cu o formulă adaptată necesarului metabolic al copilului.

AI: În timpul tratamentului trebuie monitorizate ionograma și balanța hidrică. În general, perfuzarea pe venă periferică poate provoca iritarea intimei venei și tromboflebită. Pentru a preveni riscul iritării venei, se recomandă controlul zilnic al zonei în care se realizează perfuzia. Este necesară asocierea cu soluții cu aport energetic crescut, electroliți, vitamine și oligoelemente. Alegerea unei vene periferice sau centrale depinde de osmolaritatea finală a amestecului. Valoarea acceptată a osmolarității, pentru perfuzarea pe venă periferică, este de 800 mosm/l, dar variază considerabil cu vârsta, starea generală a pacientului și starea venelor periferice. În cazul hipokaliemiei și/sau hiponatriemiei trebuie adm. simultan cantitățile necesare de potasiu și/sau sodiu.
RA: La doze mari apar: frisoane, greață, vărsături și creșterea pierderilor renale de aminoacizi.

AMINOVEN® 10% *COD ATC: B05BA01*
FRESENIUS KABI GmbH; Sol. perf. conținând la 1000 ml: Isoleucină 5,0 g; Leucină 7,4 g; Lizină 6,60 g (sub formă de acetat de lizină 9,31 g); Metionină 4,30 g; Fenilalanină 5,10 g; Treonină 4,40 g; Triptofan 2,00 g; Valină 6,30 g; Arginină 12,00 g; Histidină 3,00 g; Alanină 14,00 g; Glicină 11,00 g; Prolină 11,20 g; Serină 6,50 g; Tirozină 0,40 g; Taurină 1,00 g; ct. × 10 fl. a 500 ml sol. perf.; ct. × 10 fl. a 1000 ml sol. perf. *(S)*

AMINOVEN® 15% *COD ATC: B05BA01*
FRESENIUS KABi GmbH; Sol. perf. conținând la 1000 ml: Isoleucină 5,20 g; Leucină 8,90 g; Lizină 11,10g (sub formă de acetat de lizină 15,66 g); Metionină 3,80 g; Fenilalanină 5,50 g; Treonină 8,60 g; Triptofan 1,60 g; Valină 5,50 g; Arginină 20,00 g; Histidină 7,30 g; Alanină 25,00 g; Glicină 18,50 g; Prolină 17,20 g; Serină 9,60 g; Tirozină 0,40 g; Taurină 2,00 g; ct. × 10 fl. a 250 ml sol. perf.; ct. × 10 fl. a 500 ml sol. perf.; ct. × 10 fl. a 1000 ml sol. perf. *(S)*

Ind: Aport de aminoacizi în cadrul alimentației parenterale. În calitate de componentă a unui regim de alimentație parenterală, aminoacizii trebuie administrați în asociere cu un substrat energetic adecvat.
Dz: În perfuzie continuă pe venă periferică sau venă centrală. Doza depinde de deficitul de aminoacizi. În alimentația parenterală nu trebuie depășită doza maximă zilnică de 2 g aminoacizi/kg. *Doza zilnică* este de 10-20 ml/kg (echivalent cu 1,0-2,0 g aminoacizi/kg). *Viteza maximă de perfuzare* este de 1,0 ml/kg și oră (echivalent cu 0,1 g aminoacizi/kg și oră). Doza maximă zilnică este de 20 ml/kg (echivalent cu 2,0 g aminoacizi/kg).
Cind: Tulburări ale metabolismului aminoacizilor, acidoză metabolică, insuficiență renală netratată prin hemodializă sau hemofiltrare, insuficiență hepatică severă, hiperhidratare, șoc, hipoxie. Pentru alimentația parenterală la nou-născuți, copii mici și copii trebuie folosite produse conținând aminoacizi cu o formulă adaptată necesarului metabolic al copilului.
AI: În timpul tratamentului trebuie monitorizate ionograma și balanța hidrică. Controlul zilnic al zonei în care se efectuează perfuzia. Este necesară asocierea cu soluții cu aport energetic crescut (carbohidrați, lipide emulsionate), electroliți, vitamine și oligoelemente. Alegerea unei vene periferice sau centrale depinde de osmolaritatea finală a amestecului (valoarea acceptată a osmolarității, pentru perfuzarea pe venă periferică, este de 800 mOsm/l, dar variază considerabil cu

vârsta, starea generală a pacientului și starea venelor periferice). În cazul hipokaliemiei și/sau hiponatremiei trebuie administrate simultan cantitățile necesare de potasiu și/sau sodiu.
RA: La doze mari, apar: frisoane, greață, vărsături și creșterea pierderilor renale de aminoacizi. În supradozaj pot să apară: frisoane, greață, vărsături și creșterea pierderilor renale de aminoacizi. În acest caz, perfuzia trebuie oprită imediat. Perfuzarea poate fi reluată după o perioadă de pauză utilizând doze mai mici. O viteză prea mare a perfuzării poate produce hiperhidratare, modificări hidroelectrolitice și creșterea tensiunii arteriale.

AMINOVEN INFANT 10% *COD ATC: B05BA01*
FRESENIUS KABI GmbH; Sol. perf. conținând la 1000 ml: L-izoleucină 8,0 g, L-leucină 13,00 g, L-lizină 8,51 g, L-metionină 3,12 g, L-fenilalanină 3,75 g, L-treonină 4,40 g, L-triptofan 2,01 g, L-valină 9,00 g, L-arginină 7,50 g, L-histidină 4,76 g, glicină 4,15 g, L-alanină 9,3 g, L-prolină 9,71 g, L-serină 7,67 g, taurină 0,4 g, N-acetil tirozină 5,176 g, N-acetil-L-cisteină 0,7 g, L-acid malic 2,62 g ***(S)***

Ind: Profilaxia și trat. stărilor de carență proteică: pre- și postoperator, posttraumatic, arsuri, osteomielită, malabsorbție, intoxicații, nefroze.
Dz: În perf i.v. lent 10-20 ml/kg și oră; doza maximă 2 g aminoacizi/kg/zi.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului. Dezechilibre ale metabolismului aminoacizilor, acidoză metabolică IH severă, IR netratată prin hemodializă sau hemofiltrare, IC decompensată.

AMPICLOX *COD ATC: J01CA51*
EUROPHARM SA; Cps. a 250 mg ampicilină și 250 mg cloxacilină ***(P-RF)***

Ind: Infecții respiratorii, biliare, urinare și digestive; gonoree, meningită cu Haemophilus influenzae, pneumococ sau meningococ, sinuzită, otită medie; infecții cu stafilococi penicilinazo-secretori: infecții cutanate și ale țesuturilor moi (dermatite, furunculoze, antrax, flegmoane, limfadenite, mastite, plăgi și arsuri infectate); infecții mixte produse de streptococi și stafilococi penicilinazo-secretori; infecții ORL: abcese dentare, otite externe; alte infecții: osteomielite, artrite purulente. Spectru antimicrobian: stafilococi, stafilococi penicilinazo-secretori, streptococi (S. pneumoniae, viridans, mitis, sanguis), enterococi, Listeria monocytogenes, Clostridium, Peptococcus, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, Salmonella, Shigella, Bordetella pertussis, Brucella, Actinomycetes, gonococi, meningococi.
Dz: *Adulți:* 2-4 g/zi (4-8 cps.), în 4-6 prize; *copii până la 20 kg:* 50 mg/kgzi, cu o oră înainte de masă sau la 2 ore după masă.
Cind: Alergii la peniciline și cefalosporine. IH și IR. Alăptare (diaree la sugari). Adm. orală în caz de infecții severe sau tulburări gastrointestinale. Asocierea cu antibiotice bacteriostatice.
A!: Antecedente de astm sau diateză alergică. Supravegherea funcției renale, hepatice și hematopoietice. Asocierea cu alopurinol, beta-blocante. Sarcină.
RA: Reacții alergice imediate și întârziate. *Reacțiile imediate:* la 20 de minute de la adm.: urticarie și prurit, edem angioneurotic, laringospasm, bronhospasm, hipotensiune, colaps vascular și exitus – sau la 20 de minute – 48

de ore de la adm.: urticarie, prurit, febră, edem, spasm laringian și hipotensiune. *Reacții întârziate* după minim 48 de ore de la ingestie, cu manifestări caracteristice unui sindrom de tip boala serului, urticarie, mialgii, febră, artralgii, dureri abdominale, erupții cutanate. Tulburări gastrointestinale: greață, vărsături, diaree, stomatită, anorexie, dureri abdominale, colită pseudo-membranoasă. Suprainfecții intestinale cu Candida, Klebsiella sau Pseudomonas. Modificări ale funcției hepatice: creșterea tranzitorie a GOT. Modificări ale parametrilor hematologici: anemie, trombocitopenie, agranulocitoză de natură alergică, reversibile la întreruperea trat. Scade efectul contraceptivelor orale.

AMRASE
PHARCO PHARMACEUTICALS; Cpr. cu pancreatină 300 mg, papaină 50 mg și extract de bilă de bou 30 mg; ct. × 3 blist. a 10 cpr.

Ind: Insuficiență pancreatică exocrină (produsă de pancreatite cronice, fibroză chistică, post-pancreatectomie, afecțiuni hepatobiliare inclusiv colecistopatii cronice litiazice, alcoolism); indigestii cauzate de abuzuri alimentare (în special abuzul de lipide asociate sau nu cu consum crescut de alcool).
Dz: Un comprimat înainte sau în timpul meselor principale, de 3 ori pe zi.
Cind: Alergia sau intoleranța cunoscută la unul din componente. Pancreatita acută.
A!: În timpul sarcinii și lactației se utilizează numai la recomandarea medicului și sub supraveghere medicală.
RA: În cazul depășirii dozelor recomandate poate apărea constipație.

ANAXERYL *COD ATC: D05AC51*
LAB. A. BAILLY-SPEAB; 100 g ung. conțin ditranol 0,35 g, acid salicilic 0,3 g, rezorcinol 0,2 g, ihtiol 0,85 g și balsam de Peru 1 g (tub × 38,5 g) ***(P-6L)***

Ind: Trat. psoriazisului; adjuvant în trat. peladei.
Dz: Se aplică o dată/zi pe zona afectată.
Cind: Hipersensibilitate la una din componentele produsului; leziuni deschise.
A!: Nu se aplică pe mucoase. Trebuie evitată aplicarea pe față. Sarcină și alăptare.
RA: Reacții de sensibilizare. Poate colora în roșu-brun pielea și lenjeria.

ANTALGIC *COD ATC: N02AA59*
AESCULAP SRL; Cpr. paracetamol 300 mg + fosfat de codeină 40 mg + maleat de prometazină 3 mg ***(P-RF)***

Ind: Calmarea durerilor moderate și severe care nu cedează la aspirină/paracetamol utilizate singure.
Dz: *Adulți:* 2 cpr. de 4 ori/zi, dacă este necesar. *Copii peste 12 ani:* 1/2-1 cpr, max. de 4 ori/zi. IR severă: intervalul între 2 adm. succesive trebuie să fie de cel puțin 8 ore.
Cind: Copii sub 12 ani; alergie la paracetamol și/sau codeină; maladii grave ale ficatului; tulburări respiratorii. Sarcină și alăptare.

A!: Evitarea consumului de alcool în timpul trat. Poate accentua HT intracraniană preexistentă. Poate induce pozitivarea testelor în controalele antidoping. Șoferi și activități de precizie.

ANTALGIC-P *COD ATC: N02BA51*
FLORILEX PHARMAMIT SRL; Cpr. paracetamol 200 mg + acid acetilsalicilic 250 mg + cafeină 20 mg ***(OTC)***

Ind: Mialgii, cefalee, nevralgii, dureri postoperatorii, artralgii, febră.
Dz: 1 cpr. la nevoie, max. 3-4 cpr./zi.
Cind: Hipersensibilitate, ulcer gastro-duodenal activ, boli hemoragice, IH sau IR severă, deficit de G-6-PD, copii sub 7 ani. Sarcină și alăptare.
A!: Astm bronșic, hipersensibilitate, copii cu boli febrile acute. Asocierea cu anticoagulante, AINS, inductoare enzimatice. Poate pozitiva testul de control antidoping. Sarcină și alăptare.
RA: Epigastralgii, sângerări digestive, greață, vărsături, diaree, erupții cutanate, edem angioneurotic, crize de astm. Nefrită interstițială, necroză papilară la trat. lungi. Rar, reacție anafilactoidă cu asfixie sau colaps.

ANTIBIOPTAL
FARMILA FARMACEUTICI SpA; Colir 10 ml cu neomicină sulfat 340.000 u.i. și cloramfenicol 0,5 g

Ind: Infecții ale segmentului anterior al ochiului, cauzate de germeni Gram-pozitivi și Gram-negativi sensibili.
Dz: 1-2 picături instilate în sacul conjunctival de 3 - 6 ori pe zi, sau după sfatul medicului.
Cind: Hipersensibilitate la una din substanțele din compoziție.
A!: Administrarea la copii până în 3 ani se va face doar când este necesar și sub directul control al medicului. Nu se va administra la gravide și la persoanele care alăptează decât în caz de efectivă necesitate, caz în care se impune monitorizare strictă din partea medicului.
RA: Utilizarea îndelungată a cloramfenicolului poate da fanomene de sensibilizare (edeme angioneurotice, urticarie, dermatite veziculare sau maculopapulare); în aceste cazuri tratamentul trebuie întrerupt. Administrat timp îndelungat în doze mari, trebuie reconsiderat riscul inducerii oto-nefrotoxicității de către neomicină și al hipoplaziei medulare de către cloramfenicol. Produsul conține mertiolat ca și conservant și la persoanele cu sensibilitate deosebită poate de reacții alergice.

ANTIFLEBITIC MK *COD ATC: C05BA01*
MARK INT.; Cremă cu 1 g diclofenac sodic, 25000 UI heparină sodică, 0,25 g mentol la 100 g (tub × 35 g) ***(OTC)***

Ind: Varice, tromboflebite, tromboze superficiale, flebite, hematoame, edeme locale.
Dz: Uz cutanat, aplicații locale de mai multe ori/zi.

ANTIGAST *COD ATC: A02AD01*
AESCULAP SRL; Cpr. mast. cu carbonat de calciu 680 mg și carbonat bazic de magneziu 80 mg; fl. × 20 cpr. mast. ***(OTC)***

Ind: Hiperaciditate gastrică, ulcer gastroduodenal, esofagită de reflux.
Dz: Se mestecă 1-2 cpr./zi la 1-2 ore după mesele principale.
Cind: IR avansată; diabet zaharat – un cpr. conține 513,5 mg zahăr.
RA: Uneori provoacă hipersecreție gastrică reactivă; utilizarea cronică poate fi cauză de hipercalciurie (este necesară prudența și calcemia controlată periodic); administrarea îndelungată în asociere cu bicarbonat de sodiu și cu un regim lactat poate provoca, mai ales în caz de IR, alcaloză hipercalcemică și nefrocalcinoză cu azotemie; favorizează litiaza calcică.

ANTIGRIPAL *COD ATC: N02BA51*
LAB. REMEDIA SRL; Cpr. cu acid acetilsalicilic 200 mg, paracetamol 200 mg, cafeină 25 mg și fosfat de codeină 10 mg ***(OTC)***

Ind: Trat. simpt. al durerilor de intensitate medie sau severă cu diferite localizări: cefalee, migrene, nevralgii, mialgii, artralgii, algii dentare sau în sfera ORL, dismenoree; febră.
Dz: *Adulți și copii peste 15 ani:* 1 cpr.; doza se poate repeta la intervale de 4-6 ore, fără a depăși 4 cpr./zi. *Vârstnici:* inițial 1/2 din doza adulților, crescând în funcție de toleranță și necesități. IR: se recomandă adm. unor doze mai mici decât cele uzuale la adulți.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului; copii sub 15 ani; insuficiență hepatocelulară; IR severă; ulcer gastro-duodenal activ; hemoragie digestivă; boli hemoragice și alte boli cu risc hemoragic; deficit de G-6-PDH; astm bronșic și insuficiență respiratorie; sarcină și alăptare.
A!: La pacienții cu astm bronșic și alte afecțiuni alergice respiratorii, ca și la cei cu hipersensibilitate la AINS pot fi declanșate crize de astm bronșic și alte reacții alergice de tip anafilactic. Prudență în caz de antecedente de ulcer sau de hemoragii digestive, în IR și IH ușoare-moderate. Sportivii trebuie atenționați că acest medicament poate induce pozitivarea testelor antidoping. Șoferi și activități de precizie.
RA: *Gastrointestinale:* greață, vărsături, hemoragii digestive acute grave sau oculte și ulcerații gastrointestinale (în cazul adm. orale timp înlungat), constipație. *Hematologice:* epistaxis, gingivoragii, risc crescut de hemoragii intra- și post-operatorii. *Hepatice:* hepatotoxicitate; creșterea transaminazelor și a fosfatazei alcaline. *Reacții alergice:* de tip anafilactic, manifestate prin erupții, mai ales urticarie, edem angioneurotic, crize de astm bronșic. *Neuropsihice:* adm. în doze mari provoacă cefalee, amețeli, tinitus, somnolență sau excitație, insomnie, neliniște, palpitații, confuzie. *Renale:* trat. prelungit poate determina nefrită interstițială și necroză papilară.

ANTIGRIPAL PC *COD ATC: N02BE51*
FARMEX COMPANY; Cpr. cu paracetamol 500 mg, cafeină anhidră 50 mg ***(OTC)***

Ind: Trat. simptomatic al durerilor de intensitate ușoară - medie cu diferite localizări: mialgii, artralgii, alte dureri reumatice, nevralgii, dureri dentare, dureri postoperatorii, dureri intercostale, sciatică, cefalee, migrene, dismenoree, febră.

Dz: *Copii 3-7 ani:* 1/2 cpr. de 1-3 ori/zi. *7-11 ani:* 1 cpr. de 1-3 ori/zi. *12-15 ani:* 1 cpr. de 1-3 ori/zi. *Adulţi:* 1-2 cpr. de 1-3 ori/zi, max. 6 cpr./zi. În caz de IR severă intervalul dintre prize este de minimum 8 ore.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componenţii produsului, IH sau IR severă, deficit de G-6-PDH, copii cu vârsta sub 7 ani, hiperexcitabilitate nervoasă, insomnie, gastrită, aritmii cardiace.
A!: Antecedente de gastrită, leziuni cerebrale, epilepsie, HT intracraniană, abdomen acut chirurgical, angină pectorală, hipotiroidism, hipertrofie de prostată sau stricturi uretrale. Sarcină şi alăptare.
RA: *Digestive:* epigastralgii, mici sângerări digestive, greaţă, vărsături, diaree sau constipaţie, dureri abdominale. *Reacţii alergice:* erupţii cutanate, hematoame, edem angioneurotic, rar reacţii de tip anafilactic, mergând până la asfixie sau colaps. *Hematologice:* trombocitopenie, agranulocitoză, anemie. *Cardiovasculare:* palpitaţii, aritmii cardiace. *Renale:* nefrită interstiţială, necroză papilară, retenţie hidrosalină. *Neurologice:* somnolenţă, insomnie, vertij, excitaţie nervoasă, tremor fin al extremităţilor, dependenţă.

ANTINEVRALGIC P *COD ATC: N02BA51*
SICOMED SA; Cpr. cu acid acetilsalicilic 250 mg, cafeină 20 mg şi paracetamol 150 mg ***(OTC/S)***

Ind: Cefalee, nevralgii, mialgii, febră, gripă, dureri postoperatorii.
Dz: Câte 1 cpr. la nevoie, de 3-4 ori/zi.
Cind: Alergie sau intoleranţă la salicilaţi, AINS şi la paracetamol; ulcer gastroduodenal, boli hemoragice şi risc de hemoragii, primul trimestru şi ultima lună de sarcină; asocierea cu anticoagulante cumarinice, glucocorticoizi, metotrexat, sulfamide antidiabetice, probenecid, sulfapirazonă sau spironolactonă.
A!: Ulcer, astm bronşic, afecţiuni renale; sarcină.
RA: Epigastralgii, greaţă, vomă; alergie, erupţii cutanate, bronhospasm; reacţii anafilactice, cu asfixie sau colaps (intoleranţă încrucişată pentru toate AINS); tulburări de ritm şi creşterea TA.

ARDINEX *COD ATC: N02AA59*
KNOLL AG; Cpr. film. cu ibuprofen 200 mg şi codeină fosfat hemihidrat 30 mg ***(P-RF)***

Ind: Trat. simptomatic al durerii.
Dz: *Adulţi:* 1 cpr. la 4-6 ore, max 6 cpr./zi.
Cind: Alergie, afecţiune hepatică severă, astm grav, insuficienţă respiratorie, fenilcetonurie. Asociere cu buprenorfină, nalbufină, pentazocină, alcool. Sarcină şi alăptare. Şoferi şi activităţi de precizie.
A!: Dependenţă la utilizarea prelungită. Afecţiuni hepatice sau renale, astm, inflamaţie bronşică (tuse cu expectoraţie), pacienţi colecistectomizaţi. Poate determina rezultate pozitive la testele antidoping.
RA: Constipaţie, greaţă, vomă, somnolenţă, vertij, depresie respiratorie, reacţii alergice, rash cutanat.

ARGININĂ – SORBITOL *COD ATC: A05BA01*
SICOMED SA; Sol. perf. clorhidrat de arginină 5% şi sorbitol 10%; fl. × 250 ml şi 500 ml ***(S)***

Ind: Stări grave de hiperamoniemie asociate cu afectare hepatică. Come hepatice sau encefalopatii hepatice. Ca supliment în nutriția parenterală a copiilor cu deficit de creștere precum și în alte stări de denutriție.
Dz: 200-800 mg arginină/kg în cazuri de hiperamoniemie, ca doză de încărcare în aprox. 4 ore, după care se adm. 200-800 mg arginină/kg/zi.
Cind: IR cu anurie, acidoză metabolică, diselectrolitemii, în special hipercloremie, intoleranță la fructoză.
RA: Greață, vomă, eritem, cefalee, parestezii, iritație venoasă locală, creșterea concentrației plasmatice de potasiu, acidoză lactică, hiperuricemie.

ARLEVERT *COD ATC: N07CA52*
EWOPHARMA/HENNIG ARZENEIMITTEL; Cpr. cinarizină 20 mg și dimenhidrinat 40 mg ***(P-RF)***

Ind: Vertij de diferite etiologii.
Dz: Un cpr. de 3 ori/zi, nemestecat, cu puțin lichid, după mesele principale. La începutul tratamentului, precum și în cazuri deosebit de severe de vertij, doza poate fi mărită până la 5 cpr./zi.
Cind: În intoxicații acute, stări convulsive, suspiciune de procese intracraniene compresive (îngreunează diagnosticul), tensiune intraoculară crescută (glaucom cu unghi irido-cornean îngust), hipertrofie de prostată (adenom de prostată) cu retenție de urină, crize astmatice acute, abuz de alcool, tratament cu antibiotice de tip aminoglicozidic (posibilitatea mascării efectului ototoxic), în timpul sarcinii și alăptării, la prematuri și nou-născuți. La pacienți cu boala Parkinson, prescrierea se va face cu atenție sporită.
A!: Atenție sporită se recomandă și în cazul administrării simultane de medicamente cu acțiune hiper- sau hipotensivă. Se recomandă controlul permanent al TA și eventuala adaptare a posologiei. Nu se va adm. în același timp cu IMAO. Efectele secundare de tip anticolinergic pot fi intensificate prin asocierea cu antidepresive triciclice și/sau medicamente cu acțiune parasimpatolitică. Alcoolul și sedativele de tip central îi potențează efectul sedativ. Arlevert intensifică acțiunea procarbazinei. Acțiunea glucocorticoizilor și a heparinei poate fi diminuată. Arlevert diminuează sindrom extrapiramidal indus la adm. de fenotiazină. Șoferi și activități de precizie.
RA: Ocazional: sedare, uscăciunea gurii, tulburări neurologice de tip central, micțiuni dificile, reacții de hipersensibilizare (ex. de tip cutanat). Rar: tulburări gastrointestinale, cefalee, transpirații. Foarte rar: LES, lichen plan roșu. În cazuri izolate: agranulocitoză reversibilă și leucopenie reversibilă. Mai ales la persoane în vârstă care iau doze mari de cinarizină, adică mai mult de 150 mg/zi (doza maximă admisă fiind de 100 mg cinarizină), se pot semnala tulburări ale motilității involuntare (tremor, hipertonie musculară, astenie motorie). În aceste cazuri, adm. se va întrerupe imediat, iar după dispariția acestor simptome, medicul va decide asupra posibilității reluării trat. cu doze mai mici.

ARTHROTEC *COD ATC: M01BXN2*
SEARLE; Cpr. cu diclofenac 50 mg și misoprostol 200 µg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

Ind: Tratamentul fazelor acute și cronice ale artritei reumatoide și osteoartritelor.

Dz: *Adulți:* un cpr. de 2 ori/zi, în timpul meselor. Cpr. se vor înghiți întregi, fără a fi mestecate.
Cind: Sângerări gastrointestinale, hipersensibilitate la diclofenac sau la alte AINS, misoprostol sau alte prostaglandine. Pacienți la care administrarea de aspirină sau alte AINS precipită crize de astm, urticarie, rinită acută.
RA: *Gastrointestinale:* dureri abdominale, diaree, greață, vărsături, flatulență, eructații, tulburări de tranzit gastrointestinal. *Renale:* rar, necroză papilară renală, nefrite interstițiale, sindrom nefrotic. *Genitale:* menoragii, sângerări intermenstruale, sângerări vaginale la femei în postmenopauză.

ARTHROTEC 75 *COD ATC: M01BXN2*
SEARLE; Cpr. cu diclofenac 75 mg și misoprostol 200 µg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

Ind: Tratamentul fazelor acute și cronice ale artritei reumatoide și osteoartritelor.
Dz: *Adulți:* un cpr. de 2 ori/zi, în timpul meselor. Cpr. se vor înghiți întregi, fără a fi mestecate.
Cind: Sângerări gastrointestinale, hipersensibilitate la diclofenac sau la alte AINS, misoprostol sau alte prostaglandine. Pacienți la care administrarea de aspirină sau alte AINS precipită crize de astm, urticarie, rinită acută.
RA: *Gastrointestinale:* dureri abdominale, diaree, greață, vărsături, flatulență, eructații, tulburări de tranzit gastrointestinal. *Renale:* rar, necroză papilară renală, nefrite interstițiale, sindrom nefrotic. *Genitale:* menoragii, sângerări intermenstruale, sângerări vaginale la femei în postmenopauză.

ASCOFER *COD ATC: B03AA03*
GALENIC FARM SRL; Cpr. cu gluconat feros 378 mg și acid ascorbic 100 mg ***(P-6L)***

Ind: Trat. anemiei feriprive. Profilaxia anemiei feriprive din timpul sarcinii.
Dz: *Trat. anemiei feriprive: adulți și adolescenți:* 2-5 cpr./zi; *copii 6-15 ani:* 2 cpr./zi, până la corectarea valorilor Hb și refacerea rezervelor de fier. *Profilaxia anemiei feriprive:* 1-2 cpr./zi.
Cind: Anemie normo- sau hipersideremică, talasemie, anemie prin insuficiență medulară. Copii sub 6 ani.
A!: Hiposideremia asociată sindroamelor inflamatorii nu este sensibilă la trat. cu fier. Sărurile de fier scad absorbția tetraciclinelor, bifosfonaților (adm. oral), penicilaminei și tiroxinei. Sărurile, oxizii și hidroxizii de magneziu, aluminiu și calciu scad absorbția digestivă a sărurilor de fier.
RA: Tulburări gastrointestinale – greață, constipație, diaree, colorare în negru a scaunelor.

ASCOLECITIN®
BIOFARM SA; Cpr. cu lecitină din soia 0,250 g, vit. C 0,020 g; 4 folii blister × 5 tb. mast. ***(OTC)***

Ind: Pentru creșterea randamentului intelectual (elevi, studenți etc.). Întârzieri în dezvoltarea intelectului la copii. Scăderea capacității de memorare, concentrare

sau a atenției. Pentru creșterea randamentului fizic (sportivi de performanță, persoane suprasolicitate fizic). Convalescență.
Dz: 1-2 tablete de 3 ori/zi.
Cind: Produsul este contraindicat în diabetul zaharat (o tabletă conține 2,720 g zahăr).

ASKINE *COD ATC: N02BA51*

ALEXANDRIA CO.; Cpr. cu ac. acetilsalicilic 300 mg și cafeină 10 mg ***(OTC/S)***

Ind: Migrene, cefalee, nevralgii, mialgii, sinuzite, febră, dureri dentare și după extracții dentare, dismenoree, dureri musculare și entorse.
Dz: *Adulți:* 1-2 cpr. la 4-6 ore. *Copii 6-12 ani:* 1/2 cpr. la nevoie, max. 5 cpr./zi.
Cind: Alergie la salicilați și la AINS, IH, ulcer gastroduodenal evolutiv, gastrite, boli hemoragice și risc de hemoragii, gută. Copii sub 15 ani. Aritmii cardiace, cardiopatie ischemică, hiperexcitabilitate nervoasă, insomnie. Asocierea cu anticoagulante, metotrexat. Sarcină și alăptare.
A!: Antecedente de ulcer gastric sau duodenal, hemoragie digestivă, IR, astm, metroragie sau menoragie, în cazul utilizării de sterilet. Asocierea cu antidiabetice, glucocorticoizi. Reacție pozitivă la controalele antidopping.
RA: *Aparat digestiv:* iritația mucoasei gastrice cu pirozis, gastralgii, greață, vomă, hemoragii digestive, favorizarea apariției ulcerului. *Sânge:* hipocoagulare cu favorizarea hemoragiilor (epistaxis, gingivoragie, purpură). *Aparat circulator:* retenție hidrosalină și ușoară HTA. *Aparat respirator:* agravarea astmului bronșic mai ales la bolnavii cu polipi nazali sau sinuzită cronică. *Sistemul nervos central:* euforie, tulburări de echilibru, diminuarea acuității auditive, zgomote în urechi, reversibile la oprirea trat. *Manifestări alergice:* Erupții cutanate, cel mai frecvent urticarie, edem Quincke, crize de astm. *Alte reacții adverse:* Hepatită asimptomatică, mai ales la bolnavii cu lupus eritematos și poliartrită reumatoidă. Dureri abdominale. Acidul acetilsalicilic inhibă contracțiile uterine. Acest efect, util în dismenoree sau pentru evitarea nașterii premature, poate apărea ca nedorit pentru nașterea normală.

ASLAVITAL *COD ATC: A13AN01*

SICOMED SA; Dj. cu procaină clorhidrică 100 mg, acid benzoic 6 mg, clorhidrat de piridoxină 30 mg ***(P-6L).*** Sol. inj. cu procaină clorhidrică 100 mg, acid benzoic 6 mg, acid glutamic 64 mg (f. × 5 ml) ***(S/P-RF)***

Ind: Profilactic și curativ al formelor de îmbătrânire predominant cerebrală și cardiovasculară. Astenie psihică și fizică, surmenajul intelectual, tulburări de memorie și de concentrare, în stări depresive și de hiperemotivitate. ATS generalizată sau cu predominanță cerebrală, coronariană, periferică (arterite), în prevenirea și combaterea accidentelor tromboembolice și a sechelelor posthemoragice.
Dz: *Profilactic* serii de 12 injecții i.m. și 12 dj. în decurs de 4 săpt., 1 injecție la 2 zile (3/săpt.) și 1 dj./zi, după micul dejun, în zilele fără injecții (3 zile/săpt.) cu pauză de 2-3 săpt. între serii, de 4-5 ori/an. *Curativ:* În afecțiunile cerebrale și vasculare – 8 serii pe an a câte 12 injecții i.m. (3/săpt.) și 24

dj. (2/zi, câte unul după micul dejun și masa de prânz, în zilele fără injecții), cu pauze de 1-2 săpt. între serii.
Cind: Sensibilitate la procaină.
RA: Cefalee, tremor, bradicardie sau tahicardie, agitație motorie și psihică, reacții alergice.

ASMOFUG® *COD ATC: R03DA74*
BIOFARM SA; Sol. orală cu teofilină 500 mg, cafeină 930 mg, iodură de potasiu 1,80 g; fl. × 100 ml ***(P-6L)***

Ind: Astm bronșic și bronșită astmatiformă, bronșită cronică, astm cardiac (ca medicație adjuvantă).
Dz: *Adulți:* 3-4 lingurițe/zi; *copii (peste 4 ani):* 1-3 lingurițe/zi.
Cind: Intoleranță sau alergie la iod, hipertiroidism, tbc evolutivă, stări de excitație, insomnie, ulcer gastroduodenal, tahicardie, aritmii ectopice, alergie la salicilați.
RA: Agitație și insomnie, palpitații, iritația mucoasei gastrice cu hipersecreție, reacții de intoleranță la iod.

ASORIAN *COD ATC: D05AXN1*
BIOFARM SA; Sol. cut. cu fluocinolon acetonid 0,04 g, alantoină 0,25 g, dimetilsulfoxid 10 g; fl. × 100 ml ***(P-6L)***

Ind: Psoriazis, dermatită seboreică, dermatite alergice, eczeme hiperkeratozice.
Dz: Aplicații locale, inițial de 2-3 ori pe zi, reducându-se treptat la o aplicație pe zi sau o aplicație la 2 zile în funcție de răspunsul terapeutic. În general tratamentul durează 6-15 zile.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului. Infecții primitiv bacteriene, virale, micotice sau parazitare. Leziuni ulcerate. Aplicare pe pleoape (risc de glaucom).
A!: Produsul se va aplica strict pe leziuni, evitându-se aplicarea pe suprafețe mari de tegument. Nu trebuie utilizat pe față sau sub pansamente ocluzive. Utilizarea prelungită, la nivelul feței, a glucocorticoizilor cu activitate moderată poate duce la apariția unei dermatite cortizonice, sensibilă în mod paradoxal la glucocorticoizi. Este necesară întreruperea treptată a tratamentului. Se evită contactul cu ochii. Copii - la sugari, este preferabil să se evite glucocorticoizii cu activitate puternică.
RA: Uilizarea îndelungată poate produce atrofie cutanată, teleangiectazii, vergeturi, purpură secundară atrofiei, fragilitate capilară. Rar, poate apărea senzație de usturime moderată și tranzitorie. Este posibilă apariția efectelor sistemice. Au fost raportate erupții acneiforme sau pustuloase, hipertricoză, depigmentări. Pot să apară infecții secundare, în special dacă se folosesc pansamente ocluzive la nivelul pliurilor cutanate și dermatită de contact.

ASPACARDIN *COD ATC: A12BA30*
TERAPIA SA; Cpr. cu D,L-aspart monopotasic 180 mg și D,L- aspart de magneziu 180 mg ***(P-RF)***

Ind: Stări de hipomagneziemie ușoare. Adjuvant în trat. bolii coronariene și a aritmiilor. Profilaxia dezechilibrelor electrolitice în cazul folosirii de diuretice tiazidice sau furosemid.
Dz: *Adulți:* 1-2 cpr., de 2-3 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componenții produsului. IR severă. Stări de hipermagneziemie și hiperkaliemie.
A!: La pacienții cu IR se recomandă supravegherea potasemiei și magneziemiei. Produsul nu este adecvat folosirii la copii. Asocierea cu chinidină și alte antiaritmice de tip chinidinic impune prudență.
Sarcină și alăptare.
RA: Rareori tulburări digestive – greață, diaree, dureri abdominale.

ASPACO EEL *COD ATC: N02BA51*

BIO EEL SRL; Cpr. cu ac. acetilsalicilic 300 mg, paracetamol 250 mg și fosfat de codeină 12 mg ***(OTC)***

Ind: Tratamentul simptomatic al durerilor de intensitate ușoară - medie cu diferite localizări: mialgii, artralgii, alte dureri reumatice, nevralgii, dureri dentare, dureri postoperatorii, dureri intercostale, sciatică, cefalee, migrene, dismenoree. Stări febrile.
Dz: Oral, 1 cpr. la 4-6 ore. Adm. se face de preferință pe stomacul gol; în caz de iritație gastrică sau la bolnavii cu risc ulcerigen, se recomandă adm. în timpul mesei.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului; copii sub 15 ani; insuficiență hepatocelulară; IR severă; ulcer gastro-duodenal activ; hemoragie digestivă; boli hemoragice și alte boli cu risc hemoragic; deficit de G-6-PDH; astm bronșic și insuficiență respiratorie; sarcină și alăptare.
A!: La pacienții cu astm bronșic și alte afecțiuni alergice respiratorii, ca și la cei cu hipersensibilitate la AINS pot fi declanșate crize de astm bronșic și alte reacții alergice de tip anafilactic. Prudență în caz de antecedente de ulcer sau de hemoragii digestive, în IR și IH ușoare-moderate. Sportivii trebuie atenționați că acest medicament poate induce pozitivarea testelor antidoping. Șoferi și activități de precizie.
RA: *Gastrointestinale:* greață, vărsături, hemoragii digestive acute grave sau oculte și ulcerații gastrointestinale (în cazul adm. timp îndelungat) constipație. *Hematologice:* epistaxis, gingivoragii, risc crescut de hemoragii intra- și postoperatorii. *Hepatice:* hepatotoxicitate; creșterea valorilor transaminazelor și fosfatazei alcaline. *Reacții alergice:* de tip anafilactic, manifestate prin erupții cutanate, mai ales urticarie, edem angioneurotic, crize de astm bronșic. *Neuropsihice:* adm. în doze mari provoacă cefalee, amețeli, tinitus, somnolență sau excitație, insomnie, neliniște, palpitații, confuzie. *Renale:* trat. prelungit poate determina nefrită interstițială și necroză papilară.

ASPACORD

LAROPHARM; Cpr. cu aspartat de magneziu 140 mg (11,8 mg Mg^{2+}) și aspartat de potasiu 158 mg (36,2 mg K^{+}); ct. × 3 blistere × 10 cpr. ***(OTC)***

Ind: Supliment nutritiv, util contracției miocardice normale, în spasmofilie.
Dz: Profilactic: 3 cpr. pe zi. Curativ: 2 cpr. de 3 ori pe zi.

ASPACORD + COENZIMA Q10
LAROPHARM; Cpr. cu aspartat de magneziu 140 mg (11,8 mg Mg^{2+}) și aspartat de potasiu anhidru 158 mg (36,2 mg K^+); cps. cu 15 mg coenzima Q10; ct. × 4 blistere combinate × 7 cpr. Aspacord și 7 cps. coenzima Q10 ***(OTC)***

Ind: Supliment nutritiv.
Cind: Hipersensibilitate la componenții produsului.
Dz: Dimineața, la prânz și seara: se administrează înainte de fiecare masă câte o capsulă de coenzima Q10 iar după fiecare masă câte un comprimat de Aspacord.

ASPATOFORT *COD ATC: A05BAN3*
TERAPIA SA; Sol. inj. f. × 10 ml cu acid D,L-aspartic 250 mg și vit. B_6 125 mg ***(P-RF)***

Ind: Hepatită acută, hepatită cronică, precomă hepatică, hiperamoniemie din coma hepatică, encefalopatie portală, alcoolism, boala de iradiere, hepatoprotecția neoplazicilor supuși chimioterapiei.
Dz: I.v., 2 f. în 300 ml sol. de glucoză izotonă, introduse într-o oră (se poate repeta de 2-4 ori/zi).
Cind: Alergie la piridoxină (vit. B_6). Asocierea cu levodopa (îi anulează efectul).
A!: A nu se amesteca cu alte soluții, risc de embolie.
RA: Fenomene de nevrită senzorială, somnolență, micșorarea nivelului plasmatic al acidului folic.

ASPAVIM *COD ATC: A12BA30*
VIM SPECTRUM; Cps. cu aspartat de potasiu 167 mg și aspartat de magneziu 175 mg ***(OTC)***

Ind: Stări de hipomagneziemie ușoare. Ca medicație adjuvantă în boala coronariană și aritmii. Pentru profilaxia dezechilibrelor electrolitice în cazul folosirii de diuretice tiazidice sau furosemid.
Dz: *Adulți:* 1-2 cps. oral, de 2-3 ori pe zi.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componenții produsului. IR severă. Stări de hipermagneziemie și hiperkaliemie.
A!: La pacienții cu IR se recomandă supravegherea potasemiei și magneziemiei. Produsul nu este adecvat folosirii la copii. Asocierea cu chinidină și alte antiaritmice de tip chinidinic impune prudență. Sarcină și alăptare.
RA: Rareori tulburări digestive - greață, diaree, dureri abdominale.

ASPIRIN PLUS C® *COD ATC: N02BA51*
BAYER AG; Cpr. eff. cu ac. acetil salicilic 400 mg și vit. C 240 mg ***(OTC)***

Ind, Dz, Cind: vezi *ACIDUM ACETYLSALICYLICUM*

B

BANEOCIN *COD ATC: D06C*

SANDOZ GmbH; Pulbere cu bacitracină 250 UI/g, neomicină sulfat 3500 UI/g; fl. × 10 g; unguent cu bacitracină 250 UI/g, neomicină sulfat 5000 UI/g; tub × 20 g ***(P-RF)***

Ind: Infecții provocate de germeni patogeni sensibili la neomicină și/sau la bacitracină. *Baneocin pulbere:* - infecții bacteriene ale pielii de mică extindere, de ex: Herpes simplex, Herpes zoster/vezicule de varicelă, impetigo contagios supurant, ulcere infectate ale gambei, eczeme infectate, dermatite fesiere (la nou-născuți) infectate cu bacterii. Prevenirea infecțiilor ombilicale la nou-născuți. După intervenții chirurgicale (dermatologice) ca adjuvant în îngrijirea postoperatorie (excizii și cauterizări, tratarea ragadelor, ruptură perineală, episiotomie, răni și cicatrice supurante). *Baneocin ung.:* Infecții bacteriene focale ale pielii: Furuncule, antrax (după trat. chirurgical), foliculita bărbiei, foliculita profundă, hidrosadenite supurative, periporite. Infecții ale pielii de extindere limitată: Impetigo contagios, ulcere infectate ale gambei, eczeme secundare infectate, răni și tăieturi infectate secundar, arsuri, operații estetice și grefe cutanate. Infecții ale canalului auditiv extern, răni sau escare chirurgicale.
Dz: Se aplică un strat subțire de pulbere sau ung. pe rană, acoperit eventual cu un pansament, 2-4 aplicații cu pulb. sau 2-3 cu ung./zi. La pacienții cu arsuri care acoperă mai mult de 20% din suprafața corpului aplicații o singură dată/zi.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la bacitracină sau/și neomicină sau la alte antibiotice aminoglicozidice. Leziuni severe extinse ale pielii. Pacienți cu tulburări excretorii grave de origine cardiacă sau renală cât și cei cu leziuni vestibulare sau/și cohleare. Timpan perforat. Aplicații pe mucoasa oculară. Adm. simultană de cefalosporine sau alte aminoglicozide.
A!: Urmărirea semnelor de nefrotoxicitate sau/și ototoxicitate. Pacienți cu funcție hepatică sau/și renală redusă. Otită medie cronică veche. Timpan perforat. Acidoză, miastenia gravis sau alte boli neuromusculare - risc de bloc neuromuscular, antagonizat de calciu și neostigmină, potențat de anestezice, miorelaxante. Sarcină și alăptare.
RA: Rar, descuamări, uscăciunea pielii, congestia tegumentelor pielii și prurit, alergie încrucișată cu celelalte aminoglicozide. Aplicat în dermatoze cronice și otită medie cronică, favorizează sensibilizarea față neomicină. La aplicarea de doze mari - leziuni vestibulare și cohleare, nefrotoxicitate și blocaj neuromuscular.

BCG - MEDAC *COD ATC: L03AX03*

MEDAC GESELLSCHAFT FÜR KLINISCHE SPEZIALPRÄPARATE GmbH; Pulb. și solv. pt. uz intravezical ***(S/P-RF)***; ct. × 1 fl. cu pulb. și o pungă a 50 ml solv.; ct. × 3 flac. cu pulb. și 3 pungi a 50 ml solv.; ct. × 5 fl. cu pulb. și 5 pungi a 50 ml solv. ***(S/P-RF)***

Ind: Tratamentul carcinomului vezical urotelial non-invaziv: tratamentul curativ al carcinomului in situ; tratamentul profilactic al recidivei. Carcinom urotelial limitat la mucoasă: Ta G1-G2 în caz de tumoră multifocală și/sau recidivantă, Ta G3.

Carcinom urotelial în lamina propia, dar nu în musculatura vezicii urinare (T1). Carcinom in situ.

Dz: Carcinom in situ: Schema de tratament standard constă dintr-o instilație intravezicală pe săptămână, timp de șase săptămâni consecutiv. Această schemă poate fi repetată dacă nu s-a realizat remisiunea tumorii și dacă circumstanțele clinice justifică acest lucru. După un interval de pauză de 4 săptămâni, administrarea intravezicală va continua folosindu-se tratamentul de întreținere prezentat mai jos.

Tratamentul adjuvant (tratamentul profilactic al recidivei): Tratamentul trebuie inițiat la aproximativ 2-3 săptămâni după rezecția transuretrală (RTU) sau biopsia vezicală și fără cateterizare traumatică; se va repeta la intervale săptămânale timp de 6 săptămâni. Cel puțin în cazul tumorilor cu risc mare, această terapie trebuie urmată de tratamentul de întreținere.

Tratamentul de întreținere: O schemă terapeutică constă dintr-un tratament cu durata de 12 luni, administrat la intervale lunare. o altă schemă de întreținere constă dintr-o cură de inducție de șase săptămâni urmată de 3 instilații intravezicale săptămânale în lunile 3, 6, 12, 18, 24, 30 și 36. în această schemă se administrează un total de 27 instilații de-a lungul unei perioade de trei ani.

Cind: Hipersensibilitate (alergie) la oricare dintre componente. Imunosupresie sau deficiențe imunitare congenitale sau dobândite, datorate unei afecțiuni concomitente (de exemplu serologie HIV pozitivă, leucemie, limfom), tratamentului cancerului (de exemplu citostatice, radioterapie) sau terapiei imunosupresive (de exemplu corticosteroizi). Tuberculoză activă. Tratament anterior prin radioterapie. Alăptare.

A!: Nu poate fi utilizat prin administrare subcutanată, intradermică, intramusculară sau intravenoasă și nici pentru vaccinare. Nu trebuie instilat înainte de 15-21 de zile după o RTU, o biopsie a vezicii sau o cateterizare traumatică. Instilația traumatică poate provoca evenimente de septicemie cu posibil șoc septicemic și potențial letal. Infecțiile tractului urinar trebuie excluse înainte de fiecare instilație vezicală. Nu se utilizează în febră sau hematurie masivă. Pacienții cu HLA-B27 pozitiv pot avea risc crescut de apariție a artritei reacționale sau a sindromului lui Reiter. Pacienții cu imunodeficiențe cunoscute trebuie să evite contactul cu pacienții aflați sub tratament cu BCG. Reactivitatea la tuberculină poate fi efectuată înainte de administrare (deoarece tratamentul poate induce sensibilitate la tuberculină). Nu se recomandă în timpul sarcinii.

Bacteriile BCG sunt sensibile la medicamentele tuberculostatice (de exemplu etambutol, streptomicină, acid p-aminosalicilic (PAS), izoniazidă (INH) și rifampicină), antibiotice, antiseptice și lubrifianți. A fost descrisă o rezistență față de pirazinamidă și cicloserină.

În caz de tratament cu instilații intravezicale cu BCG, nu trebuie utilizate concomitent tuberculostatice și antibiotice cum sunt fluorochinolone, doxiciclină sau gentamicină. Bacteriile BCG sunt sensibile la toate tuberculostaticele folosite în mod curent, cu excepția pirazinamidei. Dacă este necesar un tratament tuberculostatic trivalent, combinația recomandată de obicei este izoniazidă (INH), rifampicină și etambutol.

RA: Foarte frecvente (>1/10): greață, cistită și reacții inflamatorii (granulomate) ale vezicii urinare, polakiurie cu disconfort și durere, prostatită granulomatoasă asimptomatică, febră < 38,5°C, simptome asemănătoare gripei (rău general, febră, frisoane), disconfort general.

Frecvente (>1/100, <1/10): febră > 38,5°C. Mai puțin frecvente (>1/1 000, <1/100): citopenie, anemie, sindrom Reiter (conjunctivită, oligoartrită asimetrică și cistită), pneumonie miliară, granulom pulmonar, hepatită, erupții cutanate, abces cutanat, artrită, artralgii, infecții ale tractului urinar, hematurie macroscopică, retracție vezicală, obstrucție vezicală, orhită, epididimită, hipotensiune arterială. Rare (>1/10 000, <1/1 000): septicemie cu BCG, infecții vasculare (de ex. anevrism infectat), abces renal, prostatită granulomatoasă simptomatică. Foarte rar (<1/10 000, inclusiv raportări izolate): infecție cu BCG a implanturilor și țesuturilor învecinate (de ex. infecția grefei aortice, defibrilatorului cardiac, artroplastiei șoldului sau genunchiului), limfadenită cervicală, infecție nodulară limfatică regională, reacții de hipersensibilitate (de exemplu edem al pleoapelor, tuse), osteomielită, infecții ale măduvei osoase, abces al mușchiului lombar, corioretinită, conjunctivită, uveită, fistule vasculare, vărsături, fistule intestinale, peritonită, orhită sau epididimită rezistentă la tratamentul antituberculos, infecție a penisului.

BEMAGNUM FORTE
LAROPHARM SRL; Cpr. film. cu lactat de magneziu dihidrat 470 mg și clorhidrat de piridoxină 5,5 mg; ct. x 3 blistere x 10 cpr. film. ***(OTC)***

Ind: Supliment nutritiv în: carențe de magneziu și/sau vitamina B_6, izolate sau datorate unei alimentații dezechilibrate, efort fizic intens, alcoolism, cure de slăbire, tratament îndelungat cu diuretice, diabet sau stres; în manifestările asociate carenței de magneziu: rezistență scăzută la stres, crampe musculare, fragilitatea părului și unghiilor, precum și în cazul altor manifestări datorate carențelor de magneziu și/sau vitamina B_6.
Dz: *Adulți:* 3 cpr. pe zi, în trei prize, în timpul meselor. La *copii peste 6 ani:* 2 cpr. în 2 prize în timpul meselor.
Cind: Hipersensibilitate la unul din componenții produsului.

BEN-GAY EXTRA STRENGTH SPORTS® *COD ATC: M02AX10*
PFIZER H.C.P. CORPORATION; Cremă cu salicilat de metil 28%, mentol 10%; tub × 35 g ***(OTC)***

Ind: Imediat după efort: pentru a reduce durerea musculară.
Dz: Aplicații pe zona cu musculatura suprasolicitată, de 3-4 ori/zi.
A!: Evitarea aplicării în jurul ochilor, pe mucoase, pe tegumente iritate sau cu leziuni.

BEN-GAY GREASESALESS® *COD ATC: M02AX10*
PFIZER H.C.P. CORPORATION; Cremă cu salicilat de metil 150 mg, mentol 100 mg; tub × 35 g ***(OTC)***

Ind: Ameliorarea artralgiilor și mialgiilor de origine inflamatorie, a artralgiilor asociate cu redoare articulară și a durerilor lombo-sacrate produse prin elongație.
Dz: Se aplică pe piele la nivelul zonei afectate prin masaj; se poate repeta după câteva ore (de 3-4 ori/zi).
Cind: Hipersensibilitate la salicilatul de metil, mentol sau la oricare dintre componenții produsului, plăgi deschise, iritații cutanate, copii sub 12 ani.
A!: Exclusiv pentru uz extern. Nu se folosește sub pansament ocluziv. Dacă apar iritații cutanate se întrerupe adm. Se evită contactul cu ochii și alte mucoase. Dacă durerea persistă mai mult de 10 zile fără ameliorare, consultați medicul. Sarcină și alăptare.

RA: Mentolul poate produce rar reacții alergice: urticarie, eritem și alte reacții cutanate. Datorită absorbției sistemice după aplicarea pe suprafețe cutanate întinse apar: greață, dureri abdominale, vărsături, eritem facial și simptome de deprimare la nivel SNC (amețeală, mers ebrios, somnolență, bradipnee și comă). Salicilatul de metil induce apariția iritațiilor locale severe.

BEROCCA CALCIUM ȘI MAGNESIUM *COD ATC: A12AXN1*

HOFFMANN LA ROCHE; Cpr. eferv. cu vit. B_1 15 mg, vit. B_2 15 mg, vit B_6 10 mg, vit. B_{12} 10 µg, vit. C 1000 mg, biotină 150 mg, nicotinamidă 50 mg, pantotenat 23 mg, calciu 125 mg, magneziu 100 ml ***(OTC)***

Ind: Carență de vit. ale complexului B și vit. C, (creștere, boli prelungite, anumite forme de trat. cu antibiotice sau agenți chimioterapeutici și ca adjuvant în trat. nevritei alcoolice).
Dz: 1-2 cpr. eferv./zi.
Cind: Alergie, hipercalcemie, calculi urinari sau IR severă.
A!: În cazul diabeticilor, vit. C poate influența punerea în evidență a glucozei în urină, fără a influența glicemia. Sarcină și alăptare.

BERODUAL *COD ATC: R03AK03*

BOEHRINGER INGELHEIM; Aerosol 0,02 mg bromură de ipratropium și 0,05 mg fenoterol bromhidrat/doză; fl. × 300 doze ***(P-6L)***

Ind: Profilaxia și trat. simptomelor datorate bronhospasmului din: BPOC, astm bronșic.
Dz: *Adulți* și *copii peste 6 ani:* trat. crizei de dispnee: 2-4 doze. Profilaxia bronhospasmului, 1-2 doze de 3-4 ori/zi (maximum 8 doze/zi).
Cind: Cardiomiopatia obstructivă hipertrofică, tahiaritmii. Hipersensibilitate la fenoterol, la derivații atropinici sau la propulsanții de aerosoli. Asocierea cu β-blocante. Sarcină și alăptare.
A!: Asocierea cu bronhodilatatoare simpatomimetice. Diabet zaharat, IMA, hipertiroidism. Asocierea cu β-adrenergice, anticolinergice și derivați xantinici pe cale sistemică poate duce la intensificarea efectelor secundare.
RA: Tremor al extremităților, nervozitate, mai rar tahicardie, amețeli, palpitații sau cefalee. Rar, uscăciunea gurii. Tulburări de acomodare reversibile care apar la contactul cu ochii.

BERODUAL N® *COD ATC: R03AK03*

BOEHRINGER INGELHEIM; Aerosol sol. inh. 21 µg bromură de ipratropium și 50 µg fenoterol bromhidrat; fl. × 200 puff-uri ***(P-6L)***

Ind: Profilaxia și trat. simptomelor datorate bronhospasmului din: BPOC, astm bronșic.
Dz: *Adulți* și *copii peste 6 ani:* trat. crizei de dispnee: 2-4 puff. Profilaxia bronhospasmului, 1-2 puff de 3-4 ori/zi (maximum 8 puff/zi).
Cind: Cardiomiopatia obstructivă hipertrofică, tahiaritmii. Hipersensibilitate la fenoterol, la derivații atropinici sau la propulsanții de aerosoli. Asocierea cu β-blocante. Sarcină și alăptare.

A!: Asocierea cu bronhodilatatoare simpatomimetice. Diabet zaharat, IMA, hipertiroidism. Asocierea cu β-adrenergice, anticolinergice și derivați xantinici pe cale sistemică poate duce la intensificarea efectelor secundare.
RA: Tremor al extremităților, nervozitate, mai rar tahicardie, amețeli, palpitații sau cefalee. Rar, uscăciunea gurii. Tulburări de acomodare la contactul cu ochii.

BETABIOPTAL *COD ATC: S01CA05*
FARMILA FARMACEUTICI; Susp. oft. cu betametazonă 0,2% și cloramfenicol 0,5%; fl. × 5 ml ***(P-RF)***

Ind: Infecții oftalmice nepurulente cu germeni sensibili la cloramfenicol atunci când este utilă asocierea acțiunii antiinflamatorii a betametazonei. Indicații particulare: inflamații ale segmentului anterior al ochiului, reacții post-operatorii; conjunctivite bacteriene și alergice; iridociclite acute.
Dz: 1-2 picături în sacul conjunctival de 3-6 ori/zi.
Cind: HT intraoculară. Infecție acută cu Herpex simplex și alte infecții virotice la nivelul corneei în faza acută ulcerativă, în afară de asocierile cu chimioterapice specifice virusului herpetic, conjunctivite cu cheratite ulcerative chiar în stadiul inițial. În cheratitele herpetice nu se recomandă folosirea, dar aceasta poate fi eventual admisă sub stricta supraveghere a oftalmologului. Tbc oculară. Micoză oculară. Infecții oftalmice acute, conjunctivite purulente și blefarite purulente și herpetice care pot fi mascate sau agravate de corticosteroizi. Orjelet. Hipersensibilitate la unul din componenți.

BIORINIL *COD ATC: R01AD06*
FARMILA FARMACEUTICI SA; Susp. orală pt. pulverizări nazale cu: betametazonă alcool 0,05 g; hidroclorură de tetrahidrozolină 0,1 g; fl. 10 ml ***(P-RF)***

Ind: Rinite acute si subacute, sinuzite, rinofaringite.
Dz: Inhalații nazale: 1-2 pufuri în fiecare nară de 3-4 ori pe zi.
Cind: Hipersensibilitate la una dintre componentele produsului, glaucom, hipertrofie prostatică, afecțiuni cardiace grave, hipertensiune, hipertiroidism, insuficiență renală gravă, tuberculoză, infecții micotice și virale ale mucoasei. Produsul nu se administrează în timpul sau după 2 săptămâni de la tratamentul cu antidepresive și la copii mai mici de 2 ani.
A!: Utilizarea topică, mai ales pe timp îndelungat, poate favoriza apariția fenomenelor de sensibilizare. În cazul pacienților cu boli cardiovasculare și mai ales al celor hipertensivi, utilizarea decongestionantelor nazale trebuie stabilită de fiecare dată de medic. Utilizarea îndelungată de preparate conținând substanțe vasoconstrictoare poate modifica funcționarea normală a mucoasei și a sinusurilor nazale și poate crea dependență. Nu se recomandă utilizarea pentru mai mult de 4 zile consecutiv. În cazul femeilor însărcinate și al copiilor, produsul se va administra numai în caz de strictă necesitate și sub supraveghere medicală.
RA: Reacții de sensibilizare și fenomenul de congestie. În cazul administrării de lungă durată, absorbția substanțelor simpatomimetice poate genera efecte sistemice, cum ar fi: dureri de cap, hipertensiune arterială, modificări ale ritmului cardiac, iritabilitate și insomnie. În mod similar absorbția de costicosteroizi poate cauza sindromul Cushing și inhibiția axei hipofizo-adrenale.

BI-PENICILLIN *COD ATC: J01CE09*
ANTIBIOTICE SA; Pulb. pt. sol. inj. benzil penicilină 400 000 UI și procain penicilină 600 000 UI ***(S/P-RF)***

Ind: Indicată în forme ușoare sau de gravitate medie ale infecțiilor sistemice sau localizate, generate de germeni sensibili la Penicilină G, în care sunt suficiente titrurile ce se obțin prin injectarea preparatului: unele infecții bronhopulmonare, scarlatină, angine, celulite, erizipel, infecții după intervenții ca amigdalectomia, extracția dentară ș.a.

Dz: Strict i.m., cât mai profund (se controlează, aspirând cu seringa, dacă acul nu a pătruns într-un vas sanguin). Posologia este în funcție de boală și de bolnav și de asemenea intervalele. Dozele uzuale sunt: *Adulți:* 400 000-800 000 UI la 12-14 ore. *Copii peste 2 1/2 ani:* 200 000-400 000 UI la 12-14 ore. În tratamentul sifilisului se recomandă administrarea unei doze totale de 6 000 000-12 000 000 UI în decurs de 10-15 zile.

Cind: Persoane sensibilizate la penicilină sau la procaină; în formele grave ale infecțiilor cu germeni sensibili (în care este necesară o penicilinemie de start ridicată, ce nu se poate obține cu procainbenzilpenicilină, ci numai cu o penicilină „acută"); în infecții cu germeni rezistenți la Penicilină G sau cu o sensibilitate moderată la aceasta. Nu se recomandă administrarea preparatului la copii sub 2 1/2 ani.

A!: Efectuarea antibiogramei înainte de instituirea tratamentului cu procainbenzilpenicilină, iar în infecțiile determinate de stafilococ, testarea repetată a sensibilității acestuia (rezistența se poate instala foarte rapid).

RA: Cele mai importante sunt de tip alergic (erupții cutanate, fenomene asemănătoare celor din boala serului, mai rar șoc anafilactic, modificări sanguine – anemie, leucopenie, eozinofilie peste 25%, trombocitopenie).

BILICHOL *COD ATC: A05AXN2*
PHARCO PHARM.; Cps. cu mentol 32 mg, mentonă 6 mg, pinen 17 mg, borneol 5 mg, cineol 2 mg, camfen 5 mg ***(OTC)***

Ind: Boli hepatice și litiază biliară; diskinezia de duct biliar; stază biliară; inflamații biliare; colecistite.

Dz: 1-2 cps. de 3 ori/zi înainte de masă.

Cind: Sarcină.

A!: Trat. cu anticoagulante orale. Creșterea metabolizării hepatice a medicamentelor.

BIO-BILOBA
PHARMA NORD; Cpr. ce conțin: 100 mg extract standardizat de Ginkgo Biloba (24 mg flavonozide și 6 mg terpeno-lactone) ***(OTC)***

Ind: Îmbunătățește fluxul sanguin dilatând vasele de sânge și reducând agregarea plachetară. Îmbunătățește micro-circulația cerebrală și în alte organe. Influențează factorul de activare plachetară și balanța tromboxan/prostaciclină reducând riscul de complicații trombotice. Folosit în prevenirea și tratarea durerilor de picioare (claudicație intermitentă), mâini și picioare reci și alte tulburări vasculare. Indicat în insuficiența cerebrală (tulburări de memorie, dificultate în concentrare, oboseală psihică, tinitus și amețeli). S-a dovedit a fi

eficient în tratamentul și prevenirea demenței și bolii Alzheimer. Este un antioxidant puternic cu efecte neuroprotectoare.
Dz: 1 cpr./zi, dimineața, de preferință în timpul mesei.
Cind: Complicații gastrointestinale, dureri de cap și reacții alergice au fost raportate rareori.
A!: Adm. de doze crescute de Ginkgo Biloba crește timpul de sângerare, de aceea administrarea se va opri cu 2 săptămâni înainte de orice intervenție chirurgicală.

BIO-C-ZINC
PHARMA NORD; Cpr. ce conțin Vit. C 15 mg și Zinc 2,5 mg *(OTC)*

Ind: Întărește mecanismele locale de apărare în tractul respirator superior, mărind rezistența la răceli și infecții. Reduce durata și severitatea răcelilor comune. Ajută în reducerea simptomelor asociate răcelii ca: tusea, durerile de cap, răgușeala și congestia nazală. Este util în prevenirea gripei.
Dz: 1 cpr./oră (max. 15 pe zi). Comprimatele trebuie lăsate să se dizolve în gură pentru ca substanțele active să se absoarbă la nivelul mucoasei bucale.

BIO-CALCIU + D_3 + MAGNEZIU + SILICIU
PHARMA NORD; Cpr. ce conțin: Calciu 165 mg, Vit. D_3 1,25 µg, Magneziu 100 mg, Siliciu 25 mg *(OTC)*

Ind: Întărește oasele și previne osteoporoza. Reduce incidența polipozei colonice și a cancerului de colon.
Dz: 1-4 cpr./zi, de preferință în timpul mesei.
Cind: La persoanele în vârstă, ca urmare a suplimentării cu calciu, poate apărea constipația. Acest risc poate fi redus prin ingestia odată cu alimentele.
A!: O ingestie crescută de calciu poate reduce absorbția zincului.

BIO-CAROTEN + E
PHARMA NORD; Cps. moi ce conțin: vit. A (din beta-Caroten, 6 mg) 1 000 g, vit. E 10 mg *(OTC)*

Ind: Puternic antioxidant cu efect protector asupra pielii. Reduce riscul de boli cardiovasculare și cancer de plămâni și prostată.
Dz: 1 cps./zi, de preferință în timpul mesei.
Cind: Vit. A (retinolul) poate fi toxică în cantități mari, dar cu precursorul beta-caroten nu sunt semne de toxicitate acută.

BIO-CHROM-FTG
PHARMA NORD; Cpr. ce conțin 30 mg crom *(OTC)*

Ind: Stabilizează glicemia și previne hipo- și hiperglicemia. Reduce nivelul colesterolului. Reduce riscul de boli cardiovasculare. Ideal pentru controlul greutății (crește metabolismul lipidic și termogeneza). Reduce pofta de mâncare și “foamea dureroasă”.

Dz: 1 comprimat pe zi, de preferință în timpul mesei.
A!: Persoanele cu o funcție renală redusă și cei alergici la drojdie ar trebui să evite folosirea preparatului.

BIOCRON MELATONIN COD ATC: H01C
PHARMEX INDUSTRIES Ltd.; Cpr. cu melatonină 3 mg, vitamină B_6 0,3 mg, vitamină B_{12} 3 μg; fl. x 30 cpr. ***(P-6L)***

Ind: În reglarea tulburărilor de somn apărute la schimbarea de fus orar, la persoanele care călătoresc cu avionul pe distanțe lungi, lucrează în ture, pe timp de noapte, în condiții de lumină artificială.
Cind: Sarcină și alăptare; copii sănătoși, pentru că epifiza acestora secretă deja melatonina necesară organismului.
Dz: *Adulți:* 1 comprimat pe zi, seara la culcare.

BIO-CLA 1000
PHARMA NORD; Capsule moi ce conțin: acizi grași liberi de origine vegetală 1 000 mg (din care acid linoleic conjugat 600 mg) ***(OTC)***

Ind: Ideal pentru controlul greutății. Ajută la reducerea depozitelor de grăsime și reface/dezvoltă masa musculară. Pentru rezultate mai bune, combinați Bio-CLA 1 000 cu exercițiu fizic regulat. Previne pierderea masei musculare asociate dietelor de slăbire.
Dz: 2-4 capsule de 2 ori pe zi, de preferință în timpul mesei.
Cind: În rare cazuri s-a observat un ușor disconfort gastric.
A!: O cantitate mare de acizi grași ingerați necesită o cantitate corespunzătoare de antioxidanți pentru a împiedica peroxidarea lipidică.

BIO-FIBER
PHARMA NORD; Cpr. cu fibre vegetale 640 mg (corespondentul în substanță uscată 520 mg, din care celuloză 120 mg, hemiceluloză 250 mg, pectină 130 mg, lignină 20 mg) ***(OTC)***

Ind: O dietă bogată în fibre s-a demonstrat a avea efect protector împotriva bolilor cardiovasculare, bolilor de inimă și diabetului. Fibrele scad nivelul colesterolului și influențează pozitiv funcția insulinei. Un supliment important pentru persoanele cu o dietă dezechilibrată. Reduce incidența cancerului de colon și bolilor de inimă.
Dz: 4-12 comprimate pe zi (doza se va crește treptat).
A!: O cantitate mare de fibre sub formă de tablete poate cauza disconfort digestiv sau costipație dacă nu se beau cantități suficiente de lichide.

BIO-GLADIN
PHARMA NORD; Cps. cu ulei de Borago off. 500 mg, cu un conținut de 118 mg acid gamalinolenic ***(OTC)***

Ind: Dermatită atopică, artrită reumatoidă, neuropatie, sindrom premenstrual și mastodinie. Tratarea copiilor hiperreactivi și în protecția funcției hepatice la alcoolici. Poate fi folosit de către femeile care alăptează.

Dz: 1-2 cps./zi, în timpul mesei.
A!: O cantitate mare de acid gamalinolenic ingerată necesită o cantitate corespunzătoare de antioxidanți pentru a împiedica peroxidarea lipidică. Epilepticii.
RA: Diaree, vărsături, balonări.

BIO-MAGNEZIU

PHARMA NORD; Cpr. 200 mg magneziu ***(OTC)***

Ind: Magneziul este implicat în peste 300 de reacții enzimatice din organism. Cantități reduse de magneziu în organism sunt asociate cu HTA, diabet, ateroscleroză, osteoporoză și formare de trombi. Previne apariția bolilor cardiovasculare. Scăderea cantității de magneziu poate determina crampe musculare și aritmie. Magneziul este implicat în activitatea musculară, în sistemul imunitar (celulele T) și sistemul nervos. Este antihipertensiv, folosit în prevenirea și tratamentul migrenelor.
Dz: 1 cpr./zi, de preferință în timpul mesei.
Cind: Nu sunt cunoscute la doze sub 2 000 mg/zi.
A!: Persoanele cu afecțiune renală ar trebui să evite suplimentarea cu magneziu. La persoanele cu o funcție renală normală excesul de magneziu este eliminat prin urină.

BIO-MARIN PLUS

PHARMA NORD; Cps. moi ce conțin: ulei de pește 500 mg (pur, sub formă de acizi grași liberi) din care: acizi grași Ω3 333 mg, acid folic 100 µg, vit. B_{12} 1 µg ***(OTC)***

Ind: Reduce disconfortul menstrual (dismenoreea). Eficient în reducerea homocisteinei plasmatice. Crește greutatea la naștere și reduce riscul bolilor congenitale. Supliment important pentru prevenirea aritmiilor și a morții subite. Poate îmbunătăți simptomele artritei reumatoide. Eficient în tratamentul bolii Crohn și colitei ulcerative.
Dz: 1 capsulă pe zi, de preferință în timpul mesei.
A!: Uleiul de pește în cantități mari trebuie administrat la pacienții cu tratament anticoagulant sub supraveghere medicală. O ingestie crescută de acizi grași necesită o asociere cu antioxidanți în doză mare pentru a evita peroxidarea lipidică.

BIO-MELATONINĂ

PHARMA NORD; Cpr. cu 3 µg melatonină ***(OTC)***

Ind: Melatonina este o substanță cheie care reglează ritmul sezonier și diurn. Melatonina guvernează ritmurile circadiene cum ar fi zi-noapte și termoreglarea. Melatonina este cel mai eficient antioxidant nocturn. Indicată celor care călătoresc cu avionul, care lucrează în ture, sau în insomnia moderată.
Dz: 1 cpr. pe zi seara înainte de culcare.
A!: Poate avea un potențial convulsivant la copiii cu pragul convulsivant scăzut.

BIO-MULTI
PHARMA NORD; Cpr. ce conțin: vit. A 600 μg, vit. D 7,5 μg, vit. E 4 mg, vit. C 60 mg, vit. B_1 0,6 mg, vit. B_2 1 mg, nicotinamidă 9 mg, vit. B_6 0,9 mg, acid folic 400 μg, vit. B_{12} 1,5 μg, calciu 100 mg, fer 10 mg, magneziu 100 mg, zinc 5 mg, iod 100 μg, seleniu 60 μg ***(OTC)***

Ind: Previne cancerul de colon, cataracta și bolile cardiovasculare. Reduce infecțiile, întărind sistemul imunitar. Luat în perioada prenatală previne apariția tumorilor cerebrale la copii.
Dz: 1 cpr./zi, de preferință în timpul mesei.

BIO-SELENIU + ZINC
PHARMA NORD; Cpr. ce conțin: vit. A 800 μg, vit. E 15 mg, vit. C 90 mg, vit. B_6 2 mg, Zinc 15 mg, Seleniu (L-selenometionină) 100 μg ***(OTC)***

Ind: Supliment alimentar ce intenționează să compenseze nivelul redus de micro-nutrienți în dieta modernă, în special acela al seleniului. Potrivit în special pentru persoanele care nu reușesc să își asigure o alimentație echilibrată (vârstnici, bolnavi cronic, adolescenții care au o dietă dezechilibrată, femeile însărcinate și care alăptează). Îmbunătățește motilitatea spermatozoizilor. Este un supliment alimentar important pentru cei cu boli cronice, precum bolile cardiovasculare, cancer și artrită.
Dz: 1 cpr./zi, de preferință în timpul mesei.
Cind: Seleniul poate fi toxic în doze peste 800-1 000 μg. Mirosul și gustul seleniului pot produce greață în unele cazuri. Această problemă poate fi însă rezolvată prin ingestia împreună cu alimente.

BIO-SILUET
PHARMA NORD; Cpr. cu 30 μg crom, ubiquinonă (coenzima Q10) 10 mg, carnitină 50 mg, fibre (Garcinia cambogia) 300 mg ***(OTC)***

Ind: Este util persoanelor supraponderale care vor să piardă în greutate urmând o dietă controlată caloric și persoanelor care vor să-și mențină greutatea.
Dz: 1 cpr. de 3 ori/zi, cu 30 minute înainte de masă, cu o cantitate mare de lichide, sau 3 cpr. dimineața la micul dejun.
A!: Persoanele cu funcție renală afectată ar trebui să evite folosirea preparatului. Diabeticii care folosesc crom pe o perioadă lungă, își pot modifica necesarul de insulină. Monitorizarea glicemiei în prima săptămână de suplimentare cu produse cu crom.

BIORINIL *COD ATC: R01AD06*
FARMILA FARMACEUTICI; Aerosol cu betametazonă 0,05% și tetrahidrozolină 0,1%; fl. × 10 ml ***(P-RF)***

Ind: Rinite acute și subacute, rinite, rinofaringite.
Dz: Pulverizări nazale 1-2 pufuri/zi în fiecare nară, de 3-4 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la unul din componente; glaucom; hipertrofie de prostată; boli cardiace grave; HTA; hipertiroidism; IR gravă; nu se adm. în timpul și/sau 2 săptămâni după tratamentul cu antidepresive; infecții virale, tuberculoase și micotice ale mucoaselor tratate.

BISEPTRIM *COD ATC: J01EE01*
EUROPHARM SA; Cpr. 400 mg/80 mg sulphamethoxazolum + trimethoprinum; ct. × 2 blist. × 10 cpr. ***(P-RF)***

Ind: Infecții produse de germeni sensibili. Pentru tratament curativ este indicat în: infecții produse de Pneumocystis carinii; toxoplasmoză fără atingere cerebrală la pacienți imunocompetenți; infecții uro-genitale la bărbați, în special în caz de prostatită; infecții urinare joase (cistită acută) necomplicate, la femei sub 65 ani, se poate administra o singură doză; infecții ORL (otită sau sinuzită), de preferat pe baza antibiogramei; infecții bronhopulmonare; infecții digestive, febră tifoidă. Pentru tratament profilactic este indicat: pentru profilaxia infecției cu Pneumocystis carinii la pacienții imunodeprimați (la pacienții infectați cu HIV, administrarea profilactică pe termen lung a sulfametoxazolului și trimetoprimului a redus riscul de pneumocistoză și toxoplasmoză cerebrală); la pacienții supuși transplantului de măduvă osoasă sau transplantului de organe.
Dz.: *Adulți:* doza uzuală este de 2 comprimate la intervale de 12 ore, timp de 10-14 zile. În caz de infecții severe, se pot administra 6 comprimate pe zi în 2 sau 3 prize. Pentru tratamentul cistitelor acute necomplicate la *femei sub 65 ani* se pot administra 6 comprimate în priză unică. Pentru tratamentul infecțiilor produse de Pneumocystis carinii, doza uzuală este de 80-100 mg sulfametoxazol/kg/zi, respectiv 16-20 mg trimetoprim/kg/zi. Pentru profilaxia infecțiilor cu Pneumocystis carinii, la *pacienții infectați cu HIV* doza recomandată este, în general, de 1 comprimat pe zi. Pentru tratamentul profilactic, *în cazul pacienților supuși transplantului de măduvă osoasă,* doza recomandată este de 2 comprimate de două ori pe zi, 2 zile consecutive pe săptămână, cel puțin 6 luni după transplant. În cazul transplantului de organe se pot administra 2 comprimate pe zi sau 2 comprimate de 3 ori pe săptămână. La *pacienții cu insuficiență renală* doza se ajustează în funcție de clearance-ul creatininei, astfel: clearance-ul creatininei >30 ml - doza uzuală; 15-30 ml/min - ½ din doza uzuală; <15 ml/min - nu se recomandă utilizarea decât la pacienții dializați; se recomandă administrarea dozei reduse după ședința de hemodializă; la acești pacienți se recomandă monitorizarea concentrației plasmatice a sulfametoxazolului și trimetoprimului.
Cind: Hipersensibilitate la sulfametoxazol, trimetoprim sau la oricare din excipienții produsului. Reacții alergice în antecedente la alte sulfamide. Insuficiență hepatică severă. Insuficiență renală severă la pacienții nedializați. Deficit de glucozo-6-fosfatdehidrogenază (risc de hemoliză). Nou-născuți sau prematuri. Alăptare la nou-născut. Tratament concomitent cu metotrexat.
A!: Pacienții alergici la furosemidă, diuretice tiazidice, sulfoniluree sau inhibitori ai anhidrazei carbonice pot fi alergici și la sulfamide antibacteriene. Reacții adverse cutanate sau hematologice impun întreruperea imediată și definitivă a tratamentului. Atenționări speciale: la nou-născuți, sarcină, alăptare. Monitorizare hematologică în caz de tratament prelungit sau iterativ, pacienți peste 65 ani, carență de folați. Nu se administrează copiilor sub 12 ani. Se ajustează doza în insuficiența renală în funcție de clearance-ul de creatinină, în insuf. hepatică se monitorizează nivelul transaminazelor și al bilirubinei. Supravegherea kaliemiei

la pacienții cu insuficiență renală, pacienții infectați cu HIV, la cei tratați cu doze mari de trimetoprim, la vârstnici sau la cei tratați concomitent cu medicamente hiperkaliemiante. În timpul tratamentului se recomandă un aport hidric suficient (minim 2 l pe zi) pentru a preveni cristaluria. Interacțiuni: metotrexat, anticoagulantele cumarinice, sulfamidele antidiabetice, fenitoină, medicamente hiperkaliemiante, zidovudină, pirimetamină, ciclosporină, acidul aminobenzoic, procaina, acidul folic, mandelamina, substanțe care acidifică urina.

RA: Sunt relativ frecvente. Alergia de multe ori încrucișată pentru diferite sulfamide. Manifestările alergice frecvente: febra și erupțiile cutanate. Mai rare sunt edemul angioneurotic, boala serului, fenomenele de fotosensibilizare și vasculitele alergice asemănătoare eritemului nodos. Foarte rar au fost semnalate cazuri de sindrom Stevens-Johnson și sindrom Lyell. Tulburări digestive: ocazional apar fenomene de intoleranță digestivă - anorexie, greață, vărsături, epigastralgii, diaree, colită pseudomembranoasă. Rareori au fost semnalate cazuri de hepatită colestatică, creșterea transaminazelor și bilirubinemiei. La pacienții imunocompromiși: pancreatită. Tulburări hematologice: trombocitopenie, leucopenie, agranulocitoză, aplazie medulară, anemie hemolitică. Tulburări renale: insuficiență renală prin nefropatie interstițială. Tulburări neurologice: neuropatie periferică, parestezie; rareori au fost raportate cazuri de meningită aseptică, ataxie, vertij, tremor și convulsii. Excepțional au fost semnalate cazuri de uveită. Tulburări osteo-musculare: rare cazuri de artralgii, mialgii, rabdomioliză. Tulburări metabolice: hiperkaliemie reversibilă la întreruperea tratamentului, rareori hiponatriemie și acidoză metabolică; hipoglicemia a fost semnalată uneori la pacienți nediabetici. La nou-născuți sulfamidele antibacteriene pot favoriza icterul nuclear. Reacții adverse mai frecvente la pacienții cu SIDA / infectați cu HIV: tulburări cutanate, hipertermie, leucopenie, creșterea transaminazelor și hiperkaliemie au fost semnalate în special după administrarea unor doze mari. Producerea pancreatitei și rabdomiolizei este mai frecventă în cazul asocierii cu alte medicamente care favorizează aceste reacții adverse.

BIVACYN

COD ATC: S01AA30
D06C

LEK; Pulb. aerosol cu 165 000 UI neomicină și 12 500 UI bacitracină; fl. × 150 g. Pulb. cu 3 500 UI neomicină și 250 UI bacitracină; fl. × 30 g sau 50 g. Ung cu 3 500 UI neomicină C și 500 UI bacitracină; tub × 30 g. Ung. oft. cu 3 500 UI neomicină și 250 UI bacitracină; tub × 3,5 g ***(P-RF)***

Ind: În *dermatologie:* piodermita epidermică (impetigo) și epidermocutanată (foliculite), dermatopatii suprainfectate de diferite etiologii (eczema vulgară, pruridermatite constituționale cronice alergice, dermatite seboreice cu infecție bacteriană secundară și stasis dermatitis), ulcerații suprainfectate de diverse etiologii (tumori ulcerate, ulcerații datorate insuficienței circulatorii), eritrasma, dermatopatii bacteriene (Ecthyma gangrenosum, anthrax), prevenirea infecțiilor piococice în unele dermatopatii frecvent asociate cu suprainfecții (Herpes simplex, Herpes zoster, înțepături de insecte). În *oftalmologie:* blefarite, dacriocistite, hordeolum, conjunctivite acute, ulcere corneene, kerato-conjunctivite, blefaro-conjunctivite.

Dz: *Pudra aerosol:* pulverizări pe zona afectată o dată sau de mai multe ori/zi, de la o distanță de 20-25 cm. *Pudră:* Aplicații pe zona afectată în strat subțire o dată sau de mai multe ori/zi. *Ung.:* Aplicații pe zona afectată de 2-4 ori/zi. *Ung. oft.:* Aplicații pe pleoape într-un strat subțire de 2-5 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la neomicină și alte aminoglicozide, bacitracină. Aplicații pe suprafețe extinse. Sarcină și alăptare.
A!: IR - poate crește riscul de nefrotoxicitate și ototoxicitate.
RA: Iritații ale pielii, edem, prurit, urticarie, dermatite de contact, suprainfecții. Rar, efecte secundare sistemice asociate utilizării excesive (ototoxicitate, nefrotoxicitate).

BIXTONIM *COD ATC: R01AD60*
BIOFARM SA; Sol. ext. cu efedrină clorhidrică 500 mg, nafazolină clorhidrică 100 mg, hidrocortizon 20 mg; fl. × 20 ml ***(OTC)***

Ind: Rinite seroase acute și subacute, rinite alergice. Edem postoperator al mucoasei nazale.
Dz: 2-3 picături, în fiecare nară la interval de 3-4 ore. Utilizare maximum 3 zile)
Cind: Copii sub 3 ani.
RA: Determină tahifilaxie (diminuarea efectului) în cazul administrării frecvente.

BRINERDIN *COD ATC: C02LA51*
NOVARTIS; Dj. cu 0,1 mg reserpină, 5 mg clopamidă, 0,5 mg dihidroergocristină ***(P-6L)***

Ind: HTA.
Dz: *Inițial:* 1 dj./zi. În cazuri grave, 2 sau 3 dj./zi. *Trat. de întreținere:* 1 dj./zi sau la 2 zile.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenți și la sulfonamide, hipokaliemie, IH; IR grave, insuficiență coronariană gravă, IMA recent, ateroscleroză avansată, depresie psihică, terapie prin electroșocuri în antecedente, ulcer peptic activ. Sarcină si alăptare.
A!: Adaptarea dozei de agent antidiabetic. La pacienții cu gută poate provoca o creștere a uricemiei. Verificarea potasemiei. Șoferi și activități de precizie.
RA: Tulburări gastrointestinale (greață și vărsături), tulburări electrolitice (în special hipokaliemie), hTA, oboseală, slăbiciune musculară, congestie nazală; rar, pot apărea depresie psihică sau trombocitopenie.

C

CAL-C-VITA *COD ATC: A12AXN1*
HOFFMANN LA ROCHE; Cpr. eff. cu 1000 mg acid ascorbic, 250 mg calciu, 300 UI vit. D_3, 15 mg vit. B_6 ***(OTC)***

Ind: Necesități nutriționale crescute, în timpul bolilor și convalescenței, la vârstnici, în perioadele de creștere, efort psihic și fizic, în perioadele cu probabilitate crescută de a răci. Creșterea rezistenței la infecții; în cazurile de oboseală

fizică rapidă. Favorizarea vindecării rănilor și fracturilor; prevenirea deficitului de vitamine și de calciu și a osteomalaciei.
Dz: Un cpr. eff./zi.
Cind: Alergie, hipervitaminoză D, hipercalcemie, litiază renală, litiază urinară sau IR.
RA: Vit. C poate influența metodele de dozare a glicozuriei.

CALCIU CU VITAMINA D *COD ATC: A12AXN1*
PHARMEX ROM IND.; Cpr. cu 500 mg calciu și 133 UI vit. D ***(OTC)***

Ind: Deficit de calciu în perioada de creștere, în timpul sarcinii și alăptării, în insuficiența paratiroidiană, în osteoporoză (senilă, de postmenopauză, de imobilizare sub corticoterapie) și alte osteopatii cu decalcifiere, în osteomalacie și rahitism, ca trat. de fond în spasmofilie calciprivă.
Dz: 1-2 cpr./zi în timpul meselor.
Cind: Hipercalcemie și hipercalciurie, hiperparatiroidism, hipervitaminoza D, metastaze osoase, IR și litiază calcică.

CALCIU-D_3 comprimate masticabile *COD ATC: A12AX*
NYCOMED PHARMA SA; Cpr. mast. cu carbonat de calciu corespunzător pentru 500 mg calciu, concentrat de colecalciferol (pudră) corespunzător pentru 5 micrograme = 200 UI colecalciferol (vitamina D_3); fl. × 20 sau 100 de tb. (OTC)

Ind: Femei cu nevoi crescute de calciu și vitamina D în timpul sarcinii, alăptării și după menopauză, și pentru vârstnici.
Dz: *Adulți:* una sau două tablete pe zi. Tableta poate fi mestecată, suptă, înghițită întreagă sau administrată dizolvată într-un pahar cu apă. *Copii:* doar la indicația medicului.
Cind: În cazul unor nivele mult mărite de calciu în sânge sau în urină, tendință de a forma pietre la rinichi, hipersensibilitate la vitamina D, disfuncție a rinichilor.
A!: În timpul tratamentului pe termen lung cu doze mari sau în cazul insuficienței renale, trebuie monitorizată apariția hipercalcemiei sau calciuriei. Produsul conține aspartam și nu trebuie administrat pacienților cu fenilcetonurie. Se recomandă administrarea tabletelor de calciu cu trei ore înainte sau după administrarea orală a tetraciclinelor, bifosfaților și a florurii de sodiu. Nivelul calciului poate să crească dacă se administrează concomitent diuretice. Absorbția de calciu poate fi diminuată de administrarea concomitentă de fenitoină sau barbiturice.
RA: Simptome ușoare pot apărea la nivel gastrointestinal. Tratamentul trebuie oprit dacă scade pofta de mâncare și crește setea, dacă apar greață și vomă, pentru că acestea pot indica un nivel prea ridicat al calciului în sânge.

CALCIU MAGNEZIU CU VITAMINA D
JAMIESON LABORATOIRES ambalat de BIOFARM SA; Cpr. cu Calciu 333 mg, Magneziu (Mg^{2+}) 167 mg, Vitamina D 133 UI; ct. × 3 blistere × 10 cpr. ***(OTC)***

Ind: Util în stări carențiale datorate unei alimentații necorespunzătoare, la copii în perioada de creștere, în sarcină, alăptare, în decalcifieri ale oaselor la bătrâni. Este eficient și în carențe cronice (după gastrectomii, in tulburări de digestie ale grăsimilor, tratament cu corticoizi, alcoolism cronic etc.), la femei în perioada post-menopauză, după imobilizări prelungite în aparat gipsat. Recomandat în stări de astenie fizică și psihică, în condiții de stres, iritabilitate, crampe musculare, parestezii, palpitații, hiperemotivitate, insomnii. În tratament prelungit cu diuretice.
Dz: *Adulți:* 1-2 comprimate pe zi. *Copii peste 3 ani:* 1 comprimat pe zi. Preferabilă administrarea după mese.

CALCIU ȘI MAGNEZIU

COD ATC: A12CCN1

SICOMED SA; Cpr. eff. cu gluconolactat de calciu și magneziu echivalent la 66,6 mg calciu și 40 mg magneziu ***(OTC)***

Ind: Stări de deficit de calciu și magneziu în perioada de creștere, sarcină și alăptare, stres, spasmofilie.
Dz: *Copii:* 1 cpr./zi. *Adulți:* 2 cpr./zi. Se dizolvă în 200 ml apă.
Cind: Hipercalcemie, ulcer gastro-duodenal, litiază urinară, IR.
RA: Iritație gastrică, manifestări de hipercalcemie (anorexie, greață, nefrocalcinoză, litiază urinară), manifestări de hipermagneziemie (senzație de oboseală, congestia tegumentelor, bufeuri, hTA).

CALCIU MAGNEZIU ZINC

LAROPHARM SRL; Cpr. cu carbonat de calciu 333 mg, oxid de magneziu 133 mg, oxid de zinc 5 mg; ct. × 2 blistere × 10 cpr. ***(OTC)***

Ind: Ca supliment nutritiv utilizat în deficiențele de calciu, magneziu și zinc în diferite boli nutriționale, în menținerea integrității tegumentelor, în creșterea imunității organismului, în efort fizic îndelungat și în activitate mentală susținută. Recomandat persoanelor ce au o alimentație dezechilibrată, săracă în elemente minerale.
Dz: *Adulți:* 1-3 comprimate/zi.
Cind: Hipersensibilitate la unul din componenții produsului.

CALCIUM EFF. INSTANT

COD ATC: A12AXN1

SEDICO; Pulb. eferv. conț.: calciu 500 mg, vit. D_3 400 UI și vit. C 180 mg ***(OTC)***

Ind: Copilărie, sarcină și alăptare, pentru a satisface necesarul crescut de calciu. Osteomalacie, rahitism carențial, osteoporoza postmenopauză și senilă. Pierderi masive sau absorbție redusă de calciu în timpul trat. prelungite cu corticosteroizi, în caz de gastrectomie și în hipoparatiroidism. Osteodistrofie renală. IRC. Adjuvant în terapia unor cazuri de alergie.
Dz: *Adulți:* 1-2 pliculețe/zi. *Copii:* 1/2-1 pliculeț/zi.
Cind: Hipercalcemie, hipercalciurie, litiază calcică urinară.
AI: Ingestie crescută de apă la pacienții predispuși la litiază urinară.
RA: Tulburări gastrointestinale minore.

CALCIUM FROM OYSTER SHELL *COD ATC: A11CC20*
STANLEY PHARMA Ltd.; Cpr. cu calciu 250 mg și vit. D 133 UI ***(OTC)***

Ind: Deficit de calciu în perioada de creștere, în timpul sarcinii și alăptării, în insuficiența paratiroidiană, în osteoporoză (senilă, de postmenopauză, de imobilizare sub corticoterapie) și alte osteopatii cu decalcifiere, în osteomalacie și rahitism, ca trat. de fond în spasmofilie calciprivă.
Dz: *Copii 2-7 ani:* 1 cpr./zi după mese. *7-15 ani:* 2 cpr./zi, după mese. *Adulți:* 3-4 cpr./zi după mese.
Cind: Hipercalcemie și hipercalciurie, hiperparatiroidism, hipervitaminoza D, metastaze osoase, IR și litiază calcică.
RA: Foarte rar iritație gastrică sau diaree.

CALCIUM SANDOZ *COD ATC: A12AXN1*
NOVARTIS PHARMA; Sirop 15 ml conțin 4,29 g gluconolactat de calciu și 0,91 g lactobionat de calciu; fl. × 210 ml ***(OTC)***

Ind: Carență calcică în perioada de creștere, sarcină și alăptare, în osteoporoză (senilă, de postmenopauză, de imobilizare sau sub corticoterapie), în osteopatii cu decalcifiere, în rahitism, ca trat. de fond în tetanie cronică (spasmofilie calciprivă).
Dz: *Copii peste 12 ani:* 2 lingurițe/zi. *Adulți:* 3-4 lingurițe/zi.
Cind: Hipercalcemie.

CALCIUM SANDOZ R FORTE *COD ATC: A12AXN1*
NOVARTIS PHARMA; Cpr. eff. cu 2,94 g calciu lacto-gluconat și 0,3 g carbonat de calciu ***(OTC)***

Ind: Necesar crescut de calciu la femeile gravide sau care alăptează, perioade de creștere rapidă (copilărie, adolescență), bătrâni, boli infecțioase, convalescență.
Dz: *Adulți și copii școlari:* 1 cpr. eff./zi. *Copii între 3-7 ani:* 1/2 cpr. eff./zi.
Cind: Hipersensibilitate la produs; hipercalcemie; hipercalciurie severă; IR severă.
A!: Hipercalciurie ușoară cu IR ușoară sau moderată, antecedente de concrețiuni urinare.
RA: Rar, tulburări gastrice ușoare. Favorizarea formării de calculi urinari.

CALCIUM SANDOZ + VIT. C 1000 *COD ATC: A12AXN1*
NOVARTIS PHARMA; Cpr. eferv. cu 1 g gluconolactat de calciu, 0,327 g carbonat de calciu și 1 g ac. ascorbic ***(OTC)***

Ind: Necesar crescut de calciu și vit. C, la femeile gravide sau care alăptează, perioade de creștere rapidă (copilărie, adolescență), bătrâni, boli infecțioase, convalescență.
Dz: *Adulți și copii școlari:* 1 cpr. eff./zi. *Copii între 3-7 ani:* 1/2 cpr. eff./zi.
Cind: Hipersensibilitate la produs; hipercalcemie; hipercalciurie severă; IR severă.
A!: Hipercalciurie ușoară cu IR ușoară sau moderată, antecedente de concrețiuni urinare. Diabetici. Regim desodat.

RA: Rar, tulburări gastrice ușoare (balonare, diaree). Favorizarea formării de calculi urinari.

CALGEL *COD ATC: A01AD11*
GLAXO SMITHKLINE; Gel cu clorhidrat de lignocaină 0,33% și clorură de cetilpiridină 0,1% ***(OTC)***

Ind: La copii în perioada când le cresc primii dinți.
Dz: Masaj ușor pe zona afectată a gingiei, maxim de 6 ori/zi.
Cind: Alergie la clorhidrat de lignocaină sau la clorură de cetilpiridină.

CALMA FORTE *COD ATC: N02BE51*
PHARMEX ROM IND.; Cpr. cu paracetamol 300 mg, cafeină 15 mg și fosfat de codeină 8 mg ***(OTC)***

Ind: Cefalee, nevralgii, migrene, febră, gripă.
Dz: *Adulți:* 1-2 cpr. de 3 ori/zi.
Cind: Alergie la unul din componenți, IR gravă, IH, copii. Sarcină și alăptare.
A!: Codeina figurează pe lista substanțelor dopante (interzise la sportivi).
RA: Palpitații, tremor (prin cafeină).

CALMANT FORTE *COD ATC: N02BE71*
LAB. REMEDIA SRL; Cpr. cu paracetamol 400 mg, fenobarbital 50 mg, cafeină 25 mg, fosfat de codeină 20 mg ***(OTC)***

Ind: Cefalee, nevralgii, febră, gripă.
Dz: Câte 1 cpr. la nevoie, de 3-5 ori/zi.
Cind: Alergie, copii mici. Sarcină și alăptare.
A!: Asocierea cu anticoagulante cumarinice (risc de hemoragii) și cu sulfamide hipoglicemiante (risc de hipoglicemie). Fosfatul de codeină figurează pe lista substanțelor dopante (interzise la sportivi).
RA: Erupții cutanate alergice, constipație, rareori dependență (prin codeină).

CALMOFLUID T *COD ATC: R05FB02*
TIS FARMACEUTIC SA; Sirop cu extr. Plantago 10 g + extr. Liquiritiae 10 g + clorură de amoniu 500 mg; fl. × 100 ml. ***(OTC)***

Ind: Tuse spastică, bronșite iritative.
Dz: *Adulți:* o linguriță de 6 ori/zi; *copii:* 1 linguriță de 2-3 ori/zi.

CALMOGEN *COD ATC: C07NAN1*
EUROPHARM SA; Cps. cu alc. totali din Belladonna 0,2 mg; dihidroergotoxină metan sulfonat 0,3 mg; propranolol 10 mg; clorhidrat de hidroxizină 10 mg ***(S/P-6L)***

Ind: *Tulburări cardiovasculare:* tahicardie, extrasistole, palpitații, puls labil, bufeuri, HTA incipientă. *Tulburări digestive:* dureri abdominale difuze sau localizate, meteorism, dureri epigastrice, grețuri, vărsături, tulburări de tranzit digestiv. Tulburări neuropsihice: amețeli, parestezii, extremități reci, tulburări emoționale, nevroză astenică și anxioasă. *Tulburări premenstruale și de menopauză. Geriatrie:* labilitate psihică, iritabilitate, agitație nocturnă, tulburări de ritm veghe-somn. *Pediatrie:* hiperkinezie, tulburări de comportament, dereglări ale tranzitului digestiv. *Alte indicații:* Hipertiroidism și pregătirea pacientului pentru explorări funcționale.

Dz: *Adulți,* 1 cps. de 2-4 ori/zi. Stări acute episodice de hiperactivitate vegetativă și psihoneurologică, 1-2 cps. dimineața. Tulburări nocturne, 1-2 cps. seara.

Cind: Glaucom, astm bronșic, bronșită astmatiformă, BAV. Copii sub 10 ani. Sarcină și alăptare.

RA: Pot fi cele ale substanțelor asociate (anticolinergice, adrenolitice, tranchilizante).

CANESTEN HC *COD ATC: D07XA01*

BAYER AG; Cremă, 1 g conține 0,01 g clotrimazol și 0,01 g hidrocortizon; tub × 15 g ***(OTC)***

Ind: Dermatomicoze provocate de dermatofiți, mucegaiuri, levuri și alte ciuperci. Onicomicoze.

Dz: Se aplică local, de 2-3 ori/zi, 4 săptămâni.

Cind: Hipersensibilitate la clotrimazol.

CAPTOSPES H *COD ATC: C03AX01*

SPECIFAR SA; Cpr. cu 50 mg captopril și 25 mg hidroclorotiazidă ***(P-6L)***

Ind: HTA.

Dz: În funcție de stadiul afecțiunii; max. 2 cpr./zi.

A!: AVC, hiperpotasemie, dietă hiposodată.

RA: Neutropenie, anemie, trombopenie, IR, hTA, tahicardie, palpitații, erupții.

CARDIOVIT

EMIL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES PVT. Ltd în colaborare cu PFIZER H.C.P.CORPORATION; Cpr. cu: vitamina A (sub formă de acetat) 2 500 U.I., acid ascorbic 50 mg, vitamina E (sub formă de acetat) 10 U.I., clorhidrat de piridoxină 1,5 mg, vitamina B_{12} (sub formă de triturat de manitol) 1 microgram, acid folic 300 micrograme, dioxid de seleniu monohidrat 163,3 micrograme (echivalent cu 100 micrograme seleniu elementar) ***(OTC)***

Ind: Antioxidant în situații cu factori de risc: hipertensiune arterială, diabet zaharat, fumat, creșterea nivelului de homocisteină în sânge, creșterea colesterolului în sânge, sedentarism, obezitate, ateroscleroză coronariană, cerebrală sau periferică etc.

Dz: Un comprimat pe zi.

A!: Nu se adm. în caz de hipersensibilitate la oricare dintre compușii produsului. Vitamina C poate da reacții fals pozitive ale glucozei urinare în cazul folosirii testului Benedict. Se recomandă ca doza zilnică să nu fie depășită.

CARMOL® *COD ATC: N02AX10*
BIOFARM SA; Loțiune pentru frecție cu: alcohol. denat., aqua, menthol, terpineol, cinnamal - aldehidă cinamică, savory (Satureia Hortensis) oil - ulei de cimbru; fl. × 100 ml ***(OTC)***

Ind: Loțiune pentru frecție, cu scopul revigorării și relaxării musculare precum și a diminuării pruritului.

CATHEJELL CU LIDOCAINĂ *COD ATC: N01BB52*
PHARMAZEUTISHCE FABRIK MANTAVIT; Gel cu 2 g clorhidrat de lidocaină și 0,05 g diclorhidrat de clorhexidină; seringă × 12,5 g ***(S-P/RF)***

Ind: Anestezia locală în proceduri de mică chirurgie.
Cind: Hipersensibilitate la anestezice locale de tip amidic sau la alt component al produsului. Methemoglobinemie congenitală sau idiopatică.

CAVIT *COD ATC: A11AA*
BIOFARM SA;

CAVIT JUNIOR *COD ATC: A11AA*
BIOFARM SA;

CAVIT 9 FORTE *COD ATC: A11AA*
BIOFARM SA; Cpr. cu vit. A 3600 u.i., vit. B$_1$ 2 mg, vit. B$_2$ 3 mg, vit. B$_6$ 2 mg, ac nicotinic 6 mg, pantotenat de calciu 20 mg, vit. C 69 mg, vit. D$_2$ 250 UI, vit. E 1 mg, gluconat de calciu 364 mg ***(OTC)***

Ind: Hipovitaminoze în perioada de creștere, la bătrâni, în sarcină, alăptare, boli infecțioase, convalescență, postoperator, după antibioticoterapie prelungită, după iradiere; dezechilibru alimentar, malnutriție; rahitism, dentiție întârziată, fracturi.
Dz: *Adulți:* 1-4 cpr./zi; *copii (peste 1 an):* 1-2 cpr./zi.
Cind: Parkinson tratat cu levodopa (piridoxina îi împiedică efectul).

CEBION® PLUS *COD ATC: N02BA51*
MERCK KGaA; Cpr. eff. cu 500 mg vit. C și 500 mg ac. acetilsalicilic ***(OTC)***

Ind: Răceli, dureri (de ex, cefalee), inflamații, febră.
Dz: *Adulți:* 1-2 cpr/zi.
Cind: Diateza hemoragică. Asociere cu anticoagulante, corticoizi, metotrexat, probenecid, sulfinpirazonă, furosemid, spironolactonă.
A!: Astm bronșic, febră de fân, adenite, infecții cronice ale tractului respirator, disconfort gastrointestinal cronic, afecțiuni renale în antecedente. Sarcină și alăptare.
RA: Tulburări gastrointestinale; hemoragii gastrointestinale oculte (anemie); reacții de hipersensibilitate; rar trombocitopenie.

CEBION® PLUS VITAMIN C CALCIUM *COD ATC: A11GB01*
MERCK KGaA; Cpr. eff. cu vit. C 150 mg, calciu 500 mg; fl. × 10 cpr. eff. ***(OTC)***

Ind: Hipocalcemie; trat. de susținere al osteoporozei, fracturi.
Dz: 1-2 cpr./zi în 150 ml apă.

CEBION® PLUS VITAMIN C MAGNEZIUM *COD ATC: A11GBN1*
MERCK KGaA; Cpr. eff. cu vit. C 150 mg, magneziu 170 mg; fl. × 10 cpr. eff. ***(OTC)***

Ind: Hipomagneziemie ca urmare a unei alimentații unilaterale sau în caz de necesități crescute, în suprasolicitări fizice, stres, sarcină sau cure de slăbire.
Dz: 1-2 cpr./zi în 150 ml.

CENTRUM SILVER *COD ATC: A11JB*
WYETH LEDERLE PHARMA GmbH; Cpr. film. cu: vit. A 3000 UI, betacaroten 3000 UI, vit. E 45 UI, vit. C 90 mg, acid folic 0,4 mg, vit. B_1 2,25 mg, vit. B_2 3,2 mg, biotină 45 µg, nicotinamidă 40 mg, vitamina B_6 3 mg, vit. B_{12} 25 µg, vit. D_3 400 UI, acid pantotenic 10 mg, calciu 200 mg, fosfor 125 mg, magneziu (oxid) 100 mg, fer (fumarat feros) 4 mg, cupru (oxid) 2 mg, zinc (oxid) 15 mg, siliciu 10 µg, seleniu 25 µg, potasiu (clorură) 80 mg, clor 72 mg, crom 100 µg, iod 0,150 mg, molibden 25 µg, nichel 5 µg, staniu 10 µg, vanadiu 10 µg, mangan (sulfat) 5 mg ***(OTC)***

Ind: Vitamine cu minerale destinate persoanelor cu vârsta peste 50 de ani.
Dz: 1 cpr./zi, înghițit întreg, cu puțin lichid, preferabil după micul dejun.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componenții produsului.
A!: Pacienții care primesc diferite tratamente medicamentoase vor folosi produsul la recomandarea medicului.
RA: Rar pot să apară reacții alergice la unii din componenții produsului.

CENTRUM DE LA A LA ZINC *COD ATC: A11JB*
WYETH LEDERLE PHARMA GmbH; Cpr. film. cu: vit. A 5000 UI, vit. E 30 UI, vit. C 60 mg, acid folic 0,4 mg, vit. B_1 1,5 mg, vit. B_2 1,7 mg, biotină 30 µg, nicotinamidă 20 mg, vit. B_6 2 mg, vit. B_{12} 6 µg, vitamina D_3 400 UI, acid pantotenic 10 mg, calciu 162 mg, fosfor 125 mg, magneziu (oxid) 100 mg, fer (fumarat feros) 18 mg, cupru (oxid) 2 mg, zinc (oxid) 15 mg, siliciu 10 µg, seleniu 25 µg, potasiu (clorură) 40 mg, clor 36,3 mg, crom 25 µg, iod 0,15 mg, molibden 25 µg, nichel 5 µg, staniu 10 µg, vanadiu 10 µg, mangan (sulfat) 2,5 mg ***(OTC)***

Ind: Supliment de vitamine și minerale.
Dz: 1 cpr./zi, înghițit întreg, cu puțin lichid, preferabil după micul dejun.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componenții produsului.
A!: Pacienții care primesc diferite tratamente medicamentoase vor folosi produsul la recomandarea medicului.
RA: Rar pot să apară reacții alergice la unii din componenții produsului.

CERVIRON *COD ATC: G01AXN1*
EUROPHARM SA; Ovule cu subgalat de bismut 100 mg, rezorcină 10 mg, hidrolizat de colagen 15 mg, tinctura Thymi 10 mg, tinctura Hydrastis 10 mg, balsam Peru 10 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Vulvovaginite acute și cronice; cervicite; eroziuni ale colului uterin simple sau infectate; leucoree; prurit vulvar; trat. pre- și postoperator în chirurgia ginecologică.
Dz: Intravaginal 1 ovul seara, începând cu prima zi după menstruație, 10-15 zile pe lună.
RA: Rareori iritații locale.

CERVUGID *COD ATC: G01BAN1*
IRCON SRL; Ovule cu cloramfenicol 200 mg, metronidazol 500 mg, nistatin 150 mg, acetat de hidrocortizonă 15 mg ***(P-RF)***

Ind: Trat. vaginitelor și cervicitelor produse de germeni aerobi sau anaerobi (inclusiv Clostridium), rickettsii și micoplasme; vaginite trichomoniazice; vaginite micotice produse de Candida; vaginite mixte produse de asocierea bacterii-Trichomonas-Candida. Profilaxia vaginitelor și cervicitelor la bolnave tratate cu imunosupresoare, citostatice și corticosteroizi, precum și înainte de intervenții chirurgicale sau exploratorii în sfera genitală: histero-salpingografie, hidrotubație, biopsie de endometru.
Dz: Cervico-vaginite: intravaginal un ovul seara, înainte de culcare, timp de 10 zile; trat. se va repeta de 1-2 ori în cervicite, până la cicatrizarea acestora, cu o pauză de 7 zile între perioadele de trat. Cervico-vaginite însoțite de procese inflamatorii profunde (congestii pelvine, metroanexite, pelviperitonite): se va asocia cu antibiotice adm. pe cale generală.
Cind: Hipersensibilitate; sarcină, alăptare; afecțiuni hematologice; IH sau IR severă.
A!: Trat. nu trebuie să depășească 10 zile; nu se vor adm. mai mult de 2-3 cure de trat. pe an. Se recomandă monitorizarea atentă a hemoleucogramei.
RA: Prurit și senzație de arsură locală.

CILEST *COD ATC: G03AA11*
CILAG AG; Cpr. cu 0,250 mg norgestimat și 0,035 mg etinilestradiol ***(P-6L)***

Ind: Contracepție orală.
Dz: 1 cpr./zi începând cu prima zi a ciclului.
Cind: Procese embolice sau trombotice arteriale sau venoase; cancer de sân, endometru sau alte neoplazii estrogen dependente; icter; adenom sau carcinom hepatic; sângerare genitală nediagnosticată; asocierea cu barbiturice, fenitoină, rifampicină; hipersensibilitate la oricare din componentele produsului. Sarcină și alăptare.
A!: Imobilizare prelungită sau intervenții chirurgicale majore; fumat, hiperlipidemie, HTA, obezitate; migrenă cu aură; diabet zaharat; depresii severe sau istoric de depresie. Sângerări vaginale anormale nediagnosticate.
RA: *Aparat cardiovascular:* HTA, IMA, AVC, tromboză venoasă profundă, tromboembolism arterial, embolism pulmonar. *Tumori:* tumori hepatice benigne,

foarte rar, tumori hepatice maligne, neoplasm cervical, neoplasm de sân, adenoame hipofizare posterioare. *Hepatobiliare:* colestază intrahepatică, colelitiază. *Variate:* cefalee severă, migrenă, leziuni neurovasculare. *Tract genital:* sângerări intermenstruale, amenoree, absența sau scurtarea sângerării menstruale, creșterea dimensiunii fibromioamelor uterine, candidoză vaginală. *Sân:* galactoree, durere, scăderea elasticității sânilor. *Tract gastrointestinal:* vomă, greață, crampe abdominale, balonări. *Piele:* eritem nodos, rash, cloasmă, eritem multiform, acnee, seboree, alopecie, hipertricoză, pemfigoid. *Ochi:* modificări ale curburii corneei. *SNC:* cefalee, depresie, iritabilitate, coree. *Metabolice:* retenție hidrosalină, modificări în greutatea corporală, scăderea toleranței la glucoză. *Altele:* modificări ale libidoului.

CIRRUS® *COD ATC: R01BA52*
U.C.B. GROUP; Cps. cu clorhidrat de cetirizină 5 mg și clorhidrat de pseudoefedrină 120 mg ***(P-RF)***

Ind: Trat. simpt. asociate rinitelor sezoniere și perene cum sunt: congestie nazală, strănut, rinoree, prurit nazal și oftalmic.
Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* o cps. de 2 ori/zi (dimineața și seara).
Cind: Hipersensibilitate la cetirizină, pseudoefedrină, efedrină sau la alți derivați piperazinici; HTA severă sau coronaropatii grave; HT intraoculară, retenție urinară. IR. Copii sub 12 ani. Sarcină și alăptare.
A!: Diabet zaharat, hipertiroidie, HTA, tahicardie, aritmii, IH, psihoze, la vârstnici, la pacienții cu tulburări de micțiune. Sportivii trebuie atenționați că produsul conține pseudoefedrină care este considerată o substanță dopantă. Șoferi și activități de precizie.
RA: Uscăciunea gurii, cefalee, insomnie, somnolență, astenie, tahicardie, amețeală, vertij, greață, anxietate, neliniște, tremor, slăbiciune, paloare, dificultăți în respirație, disurie, halucinații, convulsii, deprimarea SNC, aritmii și colaps. Reacții de hipersensibilizare cutanate și edem angioneurotic.

CITOCARTIN® 100 *COD ATC: N01BB58*
MOLTENI DENTAL; Sol. inj. 1 ml conține 40 mg clorhidrat de articaină și 10 µg L-adrenalină ***(S)***

Ind: Anestezie plexală, tronculară, intraligamentară, în caz de: intervenții chirurgicale realizate la nivelul mucoaselor (în profunzime), osului sau pulpei dentare, de exemplu în cazul extracției sau pulpectomiei, unde este necesară o ischemie mai intensă; intervenții chirurgicale de lungă durată, cum sunt operația Caldwell-Luc, intervenții muco-gingivale, osteosinteză percutană, cistectomie, precum și complicațiile pregătirii cavităților și bonturilor pentru acoperirea cu microproteze.
Dz: Pentru extracții necomplicate ale dinților de pe arcada superioară este suficientă inj. în fundul de sac vestibular a o fiolă pentru fiecare dinte. Foarte rar, pentru evitarea durerii produsă de inj. la nivelul palatului poate fi necesară o a doua inj. cu 1-1,7 ml soluție. Când trebuie efectuată incizia sau sutura palatului este suficientă inj. a 0,1 ml soluție de fiecare dată. În caz de extracții multiple ale unor dinți învecinați, de regulă, numărul inj. vestibulare poate fi micșorat. Pentru extracții necomplicate de premolari de pe arca-

da inferioară este suficientă anestezia plexală cu o fiolă pentru fiecare dinte. Dacă anestezia a fost incompletă, se recomandă inj. suplimentară a 1-1,7 ml soluție la nivel vestibular; numai în cazul în care nu s-a realizat analgezia completă este necesară inj. uzuală în foramenul mandibular. În intervențiile chirurgicale dozele sunt individualizate în funcție de gradul de dificultate și durata intervenției.

Cind: Hipersensibilitate la articaină sau la alte anestezice locale, la adrenalină sau la oricare dintre componenții produsului; sarcină sau suspiciune de sarcină; copii sub 4 ani; deficit de colinesterază; cardiopatie, arteriopatii grave, HTA, ischemie, cefalee, hipertiroidie, nefropatie, diabet zaharat, glaucom cu unghi închis, anestezie în teritoriile cu circulație terminală.

A!: Nu se administrează intravenos. Înainte de utilizarea anestezicului, medicul trebuie să controleze parametrii circulatori ai pacientului. Două doze maxime se pot administra după un interval de cel puțin 24 ore. Pentru obținerea efectului dorit este recomandată folosirea celei mai mici doze de anestezic. Soluția trebuie injectată cu precauție, în doze mici, după aprox. 10 secunde de la o aspirație prealabilă. În special atunci când trebuie anesteziate zone bogat vascularizate, este indicat să se aștepte 2 minute înainte de a se trece la anestezierea prin bloc nervos. Pacientul trebuie supravegheat continuu, iar la primul semn de alarmă (de exemplu modificări senzoriale), administrarea anestezicului trebuie întreruptă imediat. Pacientul poate mânca numai după revenirea sensibilității. Produsul conține metabisulfit de sodiu, care poate provoca, în special la astmatici, reacții alergice și crize grave de astm. Sportivii trebuie avertizați că produsul poate produce reacții pozitive la testele antidoping. Asocierea cu antidepresivele triciclice sau IMAO duce la creșterea TA.

RA: Reacții toxice: fenomene de stimulare SNC cu excitație, tremor, dezorientare, vertij, creșterea temperaturii corporale, iar în cazul dozelor foarte mari, trismus și convulsii. Dacă este afectată măduva spinării pot fi afectați centri cardiovasculari, respiratori și ai emezei și pot să apară transpirație, aritmii, HTA, tahipnee, bronhodilatație, greață și vărsături. Pot să apară efecte de tip periferic la nivelul aparatului cardiovascular cu bradicardie și vasodilatație. Manifestările locale includ rash cutanat, urticarie, prurit; manifestările generale includ bronhospasm, edem laringian, șoc anafilactic. Anxietate, transpirație, aritmii, HTA, cefalee, fotofobie, dureri retrosternale sau faringiene, vărsături.

CITOCARTIN® 200 *COD ATC: N01BB58*

MOLTENI DENTAL; Sol. inj. 1 ml conține 40 mg clorhidrat de articaină și 5 µg L-adrenalină ***(S)***

Ind: Anestezie plexală, tronculară, intraligamentară, în caz de: intervenții chirurgicale de rutină, cum sunt extracții dentare unice sau multiple, pregătirea cavităților și bonturilor pentru acoperirea cu microproteze, îndeosebi la pacienții debilitați fizic.

Dz: Pentru extracții necomplicate ale dinților de pe arcada superioară este suficientă injectarea în fundul de sac vestibular a o fiolă pentru fiecare dinte. Foarte rar, pentru evitarea durerii produsă de injectarea la nivelul palatului poate fi necesară o a doua injecție cu 1-1,7 ml soluție. Când trebuie efectuată incizia sau sutura palatului se inj. 0,1 ml sol. În caz de extracții multiple ale unor dinți învecinați, de regulă, numărul inj. vestibulare poate fi micșorat. Pentru extracții necomplicate de premolari de pe arcada inferioară este suficientă anestezia plexală (nu este necesară anestezia tronculară) cu o fiolă pentru fiecare dinte. Dacă anestezia a fost incompletă, se recomandă injectarea suplimentară a 1-1,7 ml soluție la nivel vestibular; numai în cazul în care nu s-a realizat analgezia completă este necesară injectarea uzuală în foramenul mandibular. Pentru pregătirea căvitaților și bonturilor pentru acoperirea cu microproteze, cu excepția tratamentelor molarilor de minte, se recomandă inj. la nivel vestibular a 0,5-1,7 ml pentru fiecare dinte, în funcție de dificultate și durata intervenției.

Cind: Hipersensibilitate la articaină sau la alte anestezice locale, la adrenalină sau la oricare dintre componenții produsului; sarcină sau suspiciune de sarcină; copii sub 4 ani; deficit de colinesterază; cardiopatie, arteriopatii grave, HTA, ischemie, cefalee, hipertiroidie, nefropatie, diabet zaharat, glaucom cu unghi închis, anestezie în teritoriile cu circulație terminală.

A!: Nu se administrează intravenos. Înainte de utilizare, medicul trebuie să controleze parametrii circulatori ai pacientului. Două doze maxime se pot administra doar după un interval de cel puțin 24 ore. Pentru obținerea efectului dorit este recomandată folosirea celei mai mici doze de anestezic. Soluția anestezică trebuie injectată cu precauție, în doze mici, după aprox. 10 secunde de la o aspirație prealabilă. În special atunci când trebuie anesteziate zone bogat vascularizate, este indicat să se aștepte 2 minute înainte de a se trece la anestezierea prin bloc nervos. Pacientul trebuie supravegheat continuu, iar la primul semn de alarmă (de exemplu modificări senzoriale), adm. trebuie întreruptă imediat. Pacientul poate mânca numai după revenirea sensibilității. Sportivii trebuie avertizați că poate produce reacții pozitive la testele antidoping. Asocierea cu antidepresivele triciclice sau IMAO duce la creșterea TA.

RA: Reacții toxice: fenomene de stimulare SNC cu excitație, tremor, dezorientare, vertij, hipertermie, iar în cazul dozelor foarte mari, trismus și convulsii. Dacă este afectată măduva spinării pot fi afectați centri cardiovasculari, respiratori și ai emezei și pot să apară transpirație, aritmii, HTA, tahipnee, bronhodilatație, greață și vărsături. Efecte de tip periferic la nivel cardiovascular cu bradicardie și vasodilatație. Manifestările locale includ rash cutanat, urticarie, prurit; manifestările generale includ bronhospasm, edem laringian, șoc anafilactic. Anxietate, transpirație, aritmii, HTA, cefalee, fotofobie, dureri retrosternale sau faringiene, vărsături.

CITROLIN *COD ATC: A01AB5H*

PHARCO PHARM.; Sol. ext. 100 ml conțin: cetrimid 25 mg și clorhidrat de lidocaină 3 mg ***(OTC)***

Ind: Infecții orofaringiene; amigdalite acute; inflamații postamigdalectomie; gingivite; stomatite; ușurarea durerii și inflamațiilor după extracții dentare, irigarea canalului dentar și a alveolei dentare.

Dz: Pentru clătire și gargară de 2-3 ori/zi.

CLARINASE *COD ATC: R06AX13*

SCHERING-PLOUGH EUROPE AG; Cpr. cu elib. modificată cu 5 mg loratadină și 120 mg pseudoefedrină ***(P-6L)***

Ind: Rinită alergică, guturai, congestie nazală, strănut, rinoree, prurit și secreție lacrimală crescută.

Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* 1 cpr. de 2 ori/zi.
Cind: Sensibilitate sau idiosincrazie la oricare dintre componente, trat. cu IMAO, glaucom cu unghi îngust, retenție urinară, HTA severă, boală coronariană severă și hipertiroidism. Copii sub 12 ani. Sarcină și alăptare.
A!: Glaucom, ulcer peptic stenozant, obstrucție piloro-duodenală, hipertrofie de prostată sau obstrucția colului vezicii urinare, afecțiuni cardiovasculare, creșterea presiunii intraoculare sau diabet zaharat, afectare renală. Trat. cu digitalice. Vârstnici.
RA: Insomnie, uscăciunea gurii, cefalee și somnolență. Rar: nervozitate, oboseală, greață, dureri abdominale, anorexie, sete, tahicardie, faringită, rinită, acnee, prurit, eritem, urticarie, artralgie, confuzie, disfonie, hiperkinezie, hipoestezie, scăderea libidoului, parestezie, tremor, vertij, hTA posturală, hipersudorație, afecțiuni oculare, dureri auriculare, tinitus, alterarea gustului, agitație, depresie, euforie, colon iritabil, dispepsie, eructație, hemoroizi, afecțiuni ale limbii, vărsături, disfuncții hepatice tranzitorii, deshidratare, creștere în greutate, HTA, palpitații, migrene, bronhospasm, epistaxis, congestie nazală, strănut, disurie, nicturie, poliurie, retenție urinară, dureri de spate, crampe musculare la nivelul membrului inferior, stare de rău și rigiditate.

CLIMEN® *COD ATC: G03HB01*
SCHERING-PLOUGH EUROPE AG; Dj. albe a 2 mg estradiol valerat; dj. roz a 2 mg estradiol valerat și 1 mg ciproteron acetat ***(P-6L)***

Ind: Tulburări de premenopauză. Prevenirea osteoporozei.
Dz: 1 dj./zi din a 5-a zi a ciclului, cu pauză de 7 zile.
Cind: Hipersensibilitate față de componentele produsului, tulburări funcționale hepatice, icter în cursul unei sarcini anterioare, sd. Dubin-Johnson și sd. Rotor, tromboză cerebrală, IMA, tumori hormono-dependente uterine, ovariene sau de sân, endometrioză, tulburări ale metabolismului lipidic, diabet grav cu modificări vasculare, otoscleroză, sângerări genitale. Sarcină, alăptare.
A!: Diabet, HTA, varice, otoscleroză, scleroză multiplă, epilepsie, porfirie, tetanie, chorea minor.
RA: Tensiune mamară, tulburări gastrice, modificări ale greutății și libidoului, apariția de sângerare în perioada de pauză la femei ce nu au mai avut menstră, neapariția sângerării în perioada de pauză la cele la care menstra mai era păstrată, edeme, cefalee, stări depresive.

CLORURĂ DE SODIU 0,9% ȘI GLUCOZĂ 5% *COD ATC: B05BB02*
HELVETICA PROFARM SA; 1000 ml sol. perf. conțin: clorură de sodiu 9 g și glucoză anhidră 50 g ***(S)***

Ind: Substituent hidroelectrolitic, în condiții de alcaloză hipocloremică; pierderi de clor; deshidratare hipotonă; deshidratare izotonă; substrat energetic; vehicul pentru concentratele de electroliți și medicamentele compatibile.
Dz: Doza maximă recomandată este de 40 ml sol. perf./kg și zi, corespunzător la 2 g glucoză/kg/zi.
Cind: Hiperhidratare; deshidratare hipertonă; hipokaliemie.
A!: Hipernatriemie; hipercloremie; afecțiuni în care este recomandată reducerea aportului de sodiu (IC, edeme generalizate, EPA, HTA, eclampsie, IR

gravă); hiperglicemie care nu răspunde la doze de insulină de până la 6 unități/oră. Este necesară monitorizarea ionogramei sanguine și a echilibrului hidric.
RA: Hipernatremie și hipercloremie.

CLOTRIMAZOL B *COD ATC: D07XC01*
EUROPHARM SA; 100 g cremă conțin clotrimazol 1 g și valerat de betametazonă 0,05 g ***(P-RF)***

Ind: Infecții fungice superficiale cutanate însoțite de fenomene inflamatorii, localizate mai ales la nivelul mâinii, spațiilor interdigitale ale piciorului, regiunilor inghinale și genitale, precum și la nivelul unghiilor.
Dz: Se aplică de 2-3 ori/zi la nivelul zonelor afectate, prin masare ușoară, max. 2 săpt.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului; leziuni tuberculoase sau sifilitice, localizate la nivelul regiunilor pe care se aplică crema; afecțiuni virale; dermatoze virale sau bacteriene.
A!: Trebuie evitată aplicarea pe suprafețe cutanate întinse sau timp îndelungat; în aceste situații există riscul apariției RA determinate de absorbția sistemică a glucocorticoidului, în special la sugar și la copilul mic. Nu se recomandă utilizarea produsului la copii sub 5 ani. Se va aplica cu atenție la nivelul feței, pentru a evita contactul cu ochii. În caz de dermatită periorală sau acnee rozacee, nu se va aplica la nivelul feței.
RA: Iritație, eritem, prurit, senzație de arsură. Rar, atrofie cutanată dermo-epidermică, telangiectazii, vergeturi, acnee, dermatită periorală, hipertricoză, precum și RA sistemice determinate de absorbția glucocorticoidului.

CO-DIOVAN® 80/12,5 *COD ATC: C09DA03*
NOVARTIS PHARMA; Cpr. film. 80 mg vasartan și 12,5 mg hidrocortiazidă ***(P-6L)***

Ind: Trat. HTA la pacienții a căror TA nu este controlată adecvat prin monoterapie. Asocierea în doze fixe trebuie folosită ca terapie alternativă.
Dz: 1 cpr. la pacienții care necesită o scădere mai accentuată a TA. Efectul antihipertensiv maxim apare în 2-4 săptămâni. În IR/IH ușoară-moderată de etiologie non-biliară și fără colestază nu se ajustează doza.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componenții produsului; IH severă, ciroză biliară și colestază; anurie, IR severă (clearance al creatininei < 30 ml/min); hipokaliemie refractară, hiponatriemie, hipercalcemie sau hiperuricemie simptomatică; sarcină.
A!: *Modificări ale electroliților serici.* Utilizarea concomitentă a suplimentelor de potasiu, a diureticelor ce economisesc potasiu sau a altor med. ce pot crește conc. plasmatică de potasiu (heparina etc.) trebuie făcută cu precauție. Este recomandată monitorizarea frecventă a potasemiei. Tratamentul cu diuretice tiazidice a fost asociat cu hiponatriemie și alcaloză hipocloremică. Tiazidele cresc excreția urinară de magneziu, putând determina hipomagneziemie. *Pacienții cu depleție sodică și/sau de volum.* La pacienții cu depleție severă de sodiu și/sau volum, cum ar fi cei care primesc doze mari de diuretice, hTA simptomatică poate apare în cazuri rare. Depleția sodică și/sau de volum tre-

buie să fie corectată înainte de a începe tratamentul cu Co-Diovan *80/12,5.* Dacă apare hTA, pacientul trebuie să stea în clinostatism și, dacă este necesar, trebuie adm. o perfuzie i.v. cu ser fiziologic. *LES,* Au fost raportate agravarea sau activarea lupusului eritematos după adm. de diuretice tiazidice. *Alte tulburări metabolice.* Diureticele tiazidice pot altera toleranța la glucoză și crește conc. plasmatice de trigliceride și acid uric. Efectul antiHTA poate fi crescut prin asocierea cu alte antiHTA. A fost raportată o creștere reversibilă a concentrațiilor plasmatice și a toxicității litiului în timpul administrării concomitente de IEC și de tiazide. Asocierea cu AINS îi poate scădea acțiunea. Hipokaliemia produsă de tiazide poate fi agravată de alte diuretice kaliuretice, glucocorticoizi, ACTH, amfotericină, carbenoxolonă, penicilină G, derivați ai acidului salicilic. Hipokaliemia sau hipomagneziemia induse de tiazide pot apare ca efect nedorit, favorizând instalarea aritmiilor produse de digitalice. Co-administrarea de diuretice tiazidice poate crește incidența hipersensibilizării la allopurinol, riscul reacțiilor adverse ale amantadinei și efectul hiperglicemiant al diazoxidului, poate reduce excreția renală a medicamentelor citotoxice (ciclofosfamidă, metotrexat), potențând efectul lor mielosupresiv. Absorbția intestinală a diureticelor tiazidice este scăzută de colestiramină. Adm. diureticelor tiazidice concomitent cu vitamina D sau cu săruri de calciu poate potența creșterea calcemiei. Tratamentul concomitent cu ciclosporină crește riscul de hiperuricemie și riscul complicațiilor de tip gutos.

RA: Cefalee, amețeli, nazofaringită, oboseală, dureri de spate, tuse, infecții ale tractului respirator superior, sinuzită, dureri precordiale, dureri ale extremităților, urticarie și alte forme de rash, pierderea apetitului alimentar, greață și vărsături ușoare, hTA posturală, care pot fi agravate de alcool etilic, anestezice generale sau sedative; impotență sexuală. Rare: fotosensibilizare, disconfort abdominal, constipație, diaree, colestază intrahepatică sau icter, aritmii, tulburări ale somnului, depresie, parestezii, tulburări de vedere, trombocitopenie, rareori purpură.

COBIDEC-N

COD ATC: A11AA03

PFIZER H.C.P.CORPORATION; Cpr. eff. cu vit. A 3 000 U.I.; vit. B_1 10 mg; vit. B_2 15 mg; vit. B_6 5 mg; vit. PP 100 mg; vit. E 15 U.I.; vit. B_{12} 5 µg; vit. C 200 mg; calciu 80 mg; mangan 0,65 mg; molibden 0,2 mg; magneziu 16,9 mg; fer 7,4 mg ***(OTC)***

Ind: Prevenirea și tratarea carențelor vitaminice și minerale de diverse etologii. Perioade de suprasolicitare fizică și intelectuală. Creșterea rezistenței organismului la infecții. Scurtarea perioadei de convalescență.

Dz: 1 cpr./zi dizolvat într-un pahar cu apă.

COD LIVER OIL

COD ATC: A11CB

PHARMEX ROM IND.; Cps. cu vit. A 330 UI (ulei de pește cu acetat de retinol 1100 UI/g și vit. D_2 1000 UI ***(OTC)***

Ind: Profilaxia și trat. rahitismului, tetaniei, distrofiei osoase. Carențe de vit. A și vit. D, în timpul creșterii și în sarcină. Ca adjuvant în trat. stărilor infecțioase prelungite, disfuncțiilor hepatice, hipertiroidismului, enteritelor regionale, afecțiunilor pancreatice și fibrozei chistice.

Dz: *Copii 2-7 ani:* 1 cps./zi. *Copii 7-15 ani:* 1-2 cps./zi. *Adulți:* 2 cps./zi.
Cind: Hipervitaminoză A și D, hipercalcemie, hipercalciurie, litiază calcică, hipersensibilitate la vit. D.
RA: Dozele excesive pot provoca fenomene de hipervitaminoză A și D.

CODAMIN P *COD ATC: N02BE51*
TERAPIA SA; Cpr. cu paracetamol 400 mg, cafeină 23 mg, fosfat de codeină 20 mg ***(OTC)***

Ind: Cefalee, dureri dentare, nevralgii, mialgii, dismenoree, stări febrile, gripă.
Dz: *Adulți:* 1-2 cpr. de 3-4 ori/zi. *Copii peste 6 ani:* 1/2-1 cpr. de 3-4 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la componentele produsului, porfirie hepatică acută, deficit de G-6-PDH, IR și IH, copii sub 6 ani.
A!: Deprimare respiratorie și hipoxie, ulcer gastroduodenal, anemie, tulburări renale și hepatice. Codeina figurează pe lista substanțelor dopante (interzise la sportivi). Sarcină și alăptare.
RA: Erupții cutanate alergice, trombocitopenie, anemie, agranulocitoză, leziuni renale și hepatice; constipație, rareori dependență, creșterea presiunii intrabiliare și durere (prin codeină); palpitații, anxietate, tremor.

COFEDOL *COD ATC: N02CA52*
SICOMED SA; Dj. cu tartrat de ergotamină 1 mg și cofeină 100 mg ***(P-6L)***

Ind: Migrenă.
Dz: 1-2 dj. la începutul accesului migrenos.
Cind: Nu se adm. ca trat. de fond. în sd. Raynaud, leziuni coronariene, tulburări circulatorii periferice, IH sau IR gravă, ulcere gastrointestinale, asocierea cu eritromicină sau alte macrolide. Copii sub 10 ani. Sarcină, alăptare.
A!: Produsul poate pozitiva teste de control antidoping.
RA: Tulburări circulatorii periferice și tulburări digestive.

COLBIOCIN *COD ATC: S01AA30*
S.I.F.I.; Sol. oft. cu cloramfenicol 0,400 g; colistin metansulfonat 18 000 000 U.I.; rolitetraciclină 0,500 g ***(P-RF)***

Ind: Conjunctivite acute, catarale, purulente și cele cu bacili Morax-Axenfeld, blefarite ulceroase, blefaro-conjunctivite, ulcere corneene septice, keratite ulceroase, kerato-hipopion, keratită disciformă, dacriocistită.
Dz: 1-2 pic. în sacul conjunctival inferior.
CInd: Hipersensibilitate la oricare dintre componente.
A!: Sarcină și alăptare.
RA: Iritații locale, arsuri, edem angioneurotic, urticarie, dermatite verzicolore și maculopapuloase.

COLDREX *COD ATC: N02BE51*
GLAXO SMITHKLINE; Cpr. cu paracetamol 500 mg, cofeină 25 mg, ac. ascorbic 30 mg, fenilefrină 5 mg și terpinhidrat 20 mg ***(OTC)***

Ind: Răceală comună, gripă, stări febrile, inclusiv cefalee, guturai, dureri în gât, sinuzită, mialgii.
Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* 2 cpr. adm. de maximum 4 ori/zi. *Copiii între 4-6 ani:* 1 cpr. adm. de maximum 4 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la paracetamol sau la oricare din componenții produsului. Copii sub 6 ani. IH/IR gravă, HTA, hipertiroidism, diabet, boli cardiace. Trat. cu antidepresive triciclice, beta-blocante, IMAO.
A!: Vârstnici și hipertensivi. Sarcină și alăptare.
RA: Erupții cutanate alergice, trombocitopenie, HTA cu cefalee, amețeli, palpitații, insomnie.

COLDREX LARYPLUS (AROMĂ DE LĂMÂIE) *COD ATC: R02AA12*

GLAXO SMITHKLINE; Cpr. de supt cu 2,5 mg hexilrezorcină și 1,2 mg clorură de benzalconiu ***(OTC)***

Ind: Ameliorarea durerilor și iritației faringiene. Se obține atenuarea simptomelor pe durată limitată, paliativ.
Dz: *Adulți (inclusiv vârstnici) și copii mai mari de 12 ani:* un cpr. se dizolvă încet în cavitatea bucală la un interval de 3 ore sau în funcție de necesități. Max. 8 cpr. în 24 ore. *Copii între 7 și 12 ani:* un cpr. se dizolvă încet în cavitatea bucală la intervale de 3 ore sau după necesități. Maxim 4 cpr./zi.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre ingrediente. Copii sub 7 ani.

COLDREX BRONCHO *COD ATC: R05CA03*

GLAXO SMITHKLINE; Sirop 100 ml conțin 2 g guaiafenazină, 26,92 g glucoză lichidă și 60 g melasă; fl. × 100 ml sau 160 ml ***(OTC)***

Ind: Ameliorarea simptomatică, ocazională și pe termen scurt a tusei (inclusiv tusea din bronșită) și a manifestărilor catarului bronșic, în special atunci când acestea urmează sau sunt asociate cu răceală și gripă.
Dz: *Adulți și copii de 12 ani și peste, vârstnici:* 200 mg guaiafenezină (10 ml Coldrex Broncho – 2 lingurițe) la 2-3 ore. *Copii cu 3-12 ani:* 100 mg guaiafenezină (5 ml Coldrex Broncho – o linguriță) la 2-3 ore.
Cind: Hipersensibilitate la guaiafenezină sau la oricare dintre componentele produsului.
A!: Nu va fi adm. copiilor mai mici de 3 ani, cu excepția cazurilor în care utilizarea este recomandată de către medic. În caz de afecțiune bronhopulmonară cronică se recomandă consult medical. În timpul tratamentului pacientul trebuie să depună eforturi voluntare pentru a expectora. Asocierea cu medicamente antitusive sau parasimpatolitice este irațională. În cazul în care simptomele persistă peste 5 zile și/sau în cazul în care apare febra, conduita terapeutică trebuie reevaluată de către medic. Pacienții cu diabet zaharat vor ține cont de aportul de glucide al produsului (conținut în carbohidrați – 3,6 g/5 ml). Poate determina reacții fals-pozitive pentru acidul 5-hidroxi- indolacetic și acidul vanilmandelic. Șoferi și activități de precizie.
RA: Ocazional, pot să apară greață, vărsături, tulburări gastrice și amețeli. S-a raportat că guaiafenezina influențează funcțiile plachetare, însă efectele nu sunt semnificative clinic.

COLDREX HOTREM BLACKCURRANT *COD ATC: N02BE51*
GLAXO SMITHKLINE; Pulb. pt. susp. orală; 5 g pulb (1 plic) conțin: paracetamol 750 mg, ac. ascorbic 60 mg și clorhidrat de fenilefrină 10 mg ***(OTC)***

Ind: Răceală comună, gripă, stări febrile, inclusiv cefalee, guturai, dureri în gât, sinuzită, mialgii.
Dz: 1 plic într-un pahar cu apă la 4-6 ore.
Cind: Hipersensibilitate la paracetamol sau la oricare din componenții produsului. Copii sub 12 ani. IH sau IR gravă, HTA, hipertiroidism, diabet, boli cardiace. Trat. cu antidepresive triciclice, beta-blocante, IMAO.
A!: Vârstnici și hipertensivi. Sarcină și alăptare.
RA: Erupții cutanate alergice, trombocitopenie, HTA cu cefalee, amețeli, palpitații, insomnie.

COLDREX HOTREM LEMON *COD ATC: N02BE51*
GLAXO SMITHKLINE; Pulb. pt. susp. int.; 5 g pulb (1 plic) conțin: paracetamol 750 mg, ac. ascorbic 60 mg și clorhidrat de fenilefrină 10 mg ***(OTC)***

Ind: Răceală comună, gripă, stări febrile, inclusiv cefalee, guturai, dureri în gât, sinuzită, mialgii.
Dz: *Adulți (inclusiv vârstnici)* și *copii peste 12 ani:* Conținutul unui plic se dizolvă într-o cană cu apă; se adm. oral, 1 plic la 4-6 ore, max. 4 plicuri/zi.
Cind: Hipersensibilitate la paracetamol sau la oricare din componenții produsului. Copii sub 12 ani. IH sau IR gravă, HTA, hipertiroidism, diabet, boli cardiace. Adm. la pacienți sub trat. cu antidepresive triciclice, beta-blocante, IMAO (inclusiv cei care au făcut tratament cu IMAO în ultimele 2 săpt.).
A!: Nu se asociază cu alte medicamente folosite pentru răceală sau ca decongestive și cu alte produse care conține paracetamol. Prudență la vârstnici și la hipertensivi - fenilefrina poate crește TA. Riscul hepatotoxicității paracetamolului este mai mare în caz de afectare hepatică pre-existentă sau când sunt asociate alte medicamente cu potențial hepatotoxic. Sarcină și alăptare.
RA: Erupții cutanate alergice, excepțional trombocitopenie, creșterea TA, cu cefalee, amețeli, palpitații, insomnie.

COLDREX MAXGRIP LEMON *COD ATC: N02BE51*
GLAXO SMITHKLINE; Pulb. orală. Un plic conține paracetamol 1000 mg, acid ascorbic 40 mg, clorhidrat de fenilefrină 10 mg ***(OTC)***

Ind.: Tratamentul pe termen scurt al simptomelor gripei, răcelii comune, stărilor febrile, frisoanelor, inclusiv al cefaleei, durerilor faringiene, disconfortului general, congestiei nazale, sinuzitei și durerii asociate acesteia și a catarului nazal acut.
Dz: Conținutul unui plic se toarnă într-un pahar, care se va umple apoi până la jumătate cu apă fierbinte. *Adulți (inclusiv vârstnici) și copii cu vârsta ≥ 12 ani:* un plic cu pulbere orală la fiecare 4-6 ore, în funcție de necesitate; nu trebuie depășită doza de 4 plicuri în 24 ore. Nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 12 ani. Nu trebuie utilizat mai mult de 7 zile fără recomandarea medicului.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la paracetamol, clorhidrat de fenilefrină, acid ascorbic sau la oricare din excipienții produsului. Copii cu vârsta sub 12 ani. Insuficiență hepatică sau renală severă, hipertensiune arterială, hipertiroidism, diabet zaharat, boli cardiace. Administrarea la pacienți sub tratament cu antide-

presive triciclice, beta-blocante, inhibitori de monoaminoxidază - IMAO (inclusiv cei care au făcut tratament cu IMAO în ultimele 2 săptămâni). Deficite congenitale de absorbție a zahărului, deoarece fiecare plic conține 4 g zahăr.
A!: Trebuie evitată utilizarea concomitentă a altor medicamente pentru gripă și răceală, alte decongestionante nazale sau alte medicamente care conțin paracetamol. Prudență în cazul utilizării warfarinei. Posibile interacțiuni cu metoclopramid, domperidon, colestiramină, fenilefrină. În timpul sarcinii se utilizează numai dacă beneficiul terapeutic matern depășește riscul potențial pentru făt.
RA: Ocazional, paracetamolul poate determina erupții cutanate și alte reacții alergice. Aminele simpatomimetice pot crește tensiunea arterială cu cefalee, amețeli, vărsături, diaree, insomnie și rareori, palpitații. Totuși, s-au raportat unele din aceste reacții la doze normale de fenilefrină.

COLDREX NITE *COD ATC: R05DA09*
GLAXO SMITHKLINE; Sirop; 20 ml conțin 1 g paracetamol, 20 mg clorhidrat de prometazină și 15 mg bromhidrat de dextrometorfan; fl. × 160 ml ***(OTC)***

Ind: Ameliorarea simptomatică, ocazională și pe termen scurt a tusei (inclusiv tusea din bronșită) și a manifestărilor catarului bronșic, în special atunci când acestea urmează sau sunt asociate cu răceală și gripă.
Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* 10-20 ml/zi.
Cind: Hipersensibilitate la la oricare dintre componentele produsului.
A!: În caz de afecțiune bronhopulmonar cronică se recomandă consult medical. În cazul în care simptomele persistă peste 5 zile și/sau în cazul în care apare febra, conduita terapeutică trebuie reevaluată. Pacienții cu diabet zaharat vor ține cont de aportul de glucide al produsului. Poate determina reacții fals-pozitive pentru acidul 5-hidroxi-indolacetic și acidul vanilmandelic. Șoferi și activități de precizie.
RA: Ocazional, pot să apară greață, vărsături, tulburări gastrice și amețeli, constipație.

COLEBIL *COD ATC: A05AAN1*
BIOFARM SA; Dj. cu bilă bovină uscată 100 mg, salicilat de sodiu 90 mg, metenamină 50 mg, ulei de mentă 5 mg ***(OTC)***

Ind: Tulburări dispeptice: meteorism, eructații, flatulență, greață; constipație.
Dz: 1-3 dj./zi.
Cind: Obstrucție biliară, boală ulceroasă, esofagită de reflux, IH gravă, IR gravă, alergie la componentele produsului.
RA: Greață, gust amar, diaree.

COLPOSEPTINE *COD ATC: G01AX12*
LAB. THERAMEX; Cpr. vaginale cu clorchinaldol 200 mg și promesterină 10 mg ***(P-RF)***

Ind: Leucoree de toate etiologiile, cu excepția celei de origine gonococică.
Dz: 1 cpr. vaginal dimineața și seara, timp de 9 zile.
Cind: Cancer estrogeno-dependent.

COLVITIOD *COD ATC: S01XAN1*
BIOFARM SA; Sol. oft. cu iodură de sodiu 0,5 g, iodură de potasiu 0,5 g, pantotenat de calciu 0,1 g, tiamină clorh. 0,1 g, ac. nicotinic 0,03 g, cisteină clorh. 0,03 g, clorură de magneziu 0,3 g, clorură de sodiu 0,47g ***(P-6L)***

Ind: Cataractă în evoluție.
Dz: 1-2 pic. în sacul conjunctival, dimineața și seara.
Cind: Intoleranță sau alergie la iod sau la alte componente ale produsului.
RA: Manifestări alergice.

COMBIVIR *COD ATC: J05AB20*
GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. cu 150 mg lamivudină și 300 mg zidovudină ***(P-RF)***

Ind: Adulți și copii peste 12 ani infectați cu HIV, cu imunodeficiență progresivă.
Dz: 1 cpr. de 2 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la lamivudină sau zidovudină. Neutropenie sau anemie severă. Sarcină și alăptare.
A!: Efectuarea testelor sanguine cel puțin o dată la 2 săpt. în primele 3 luni de trat. și apoi o dată pe lună. Ciroză hepatică avansată. Asocierea cu cotrimoxazol, fenitoină, paracetamol, aspirină, codeină, morfină, indometacin, ketoprofen, naproxen, oxazepam, lorazepam, cimetidină, clofibrat, dapsonă și izoprinozină. Șoferi și activități de precizie.
RA: Cefalee, fatigabilitate, greață, vărsături, anorexie, diaree, durere în abdomenul superior, febră și erupții. Rar, pancreatită și neuropatie periferică (sau parestezii). Neutropenie, leucopenie, anemie, trombocitopenie, creștere tranzitorie a enzimelor hepatice și a amilazei serice.

CONTACT 400 *COD ATC: R01BA51*
GLAXO SMITHKLINE; Cps. cu 50 mg fenilpropanolamină și 4 mg maleat de clorfenilamină ***(OTC)***

Ind: Rinite alergice, urticarie, boala serului, eczeme, manifestări pruriginoase, edem Quincke.
Dz: *Adulți:* 1 cps. de 2-3 ori/zi.
Cind: Glaucom, adenom de prostată, primul trimestru de sarcină, asocierea cu alte deprimante centrale (inclusiv alcool).
A!: Șoferi și activități de precizie.
RA: Sedare, somnolență, amețeli, retenție urinară, hiposalivație.

CORAL 21 (TRINORDIOL) *COD ATC: G03AA07*
WYETH-LEDERLE PHARMA GmbH; Dj. maron cu levonorgestrel 50 µg și etinilestradiol 30 µg. Dj. albe cu levonorgestrel 75 µg și etinilestradiol 40 µg. Dj. galben-ocru cu levonorgestrel 125 µg și etinilestradiol 30 µg ***(P-6L)***

Ind: Contracepție orală.
Dz: 1 dj. zilnic, timp de 21 de zile consecutive, în ordinea indicată pe ambalaj, apoi 7 zile de pauză.

Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului; tulburări tromboembolice sau tromboflebite; antecedente de tromboflebită profundă sau de tulburări tromboembolice; afecțiuni ale metabolismului lipidic; siclemie; boală cerebrovasculară sau coronariană; carcinom de sân diagnosticat sau suspectat; carcinom la nivelul endometrului sau alte neoplazii estrogen-dependente, diagnosticate sau suspectate; carcinom hepatic prezent sau în antecedente; tulburări funcționale acute și cronice ale ficatului (sd. Dubin-Johnson, sd. Rotor); sângerare vaginală de etiologie nediagnosticată; diabet zaharat sever cu modificări vasculare; icter colestatic de sarcină sau icter legat de folosirea anterioară a contraceptivelor orale combinate; antecedente de herpes gestațional. Sarcină și alăptare.

A!: Fumatul mărește riscul RA cardiovasculare grave datorate utilizării contraceptivelor orale combinate. La pacientele cu deficiențe ereditare la nivelul metabolismului lipoproteic, care primesc preparate cu estrogeni, au fost raportate cazuri de creștere semnificativă a trigliceridelor plasmatice, conducând la pancreatită. Disfuncțiile hepatice acute sau cronice necesită întreruperea adm., până când funcția hepatică revine la normal. Hormonii steroizi pot fi metabolizați în măsură mică la pacientele cu afectarea ficatului. Prudență la pacientele cu afecțiuni care pot fi agravate de retenția de fluide. Supraveghere medicală strictă pe durata adm. contraceptivelor orale în: diabet zaharat sau predispoziție, otoscleroză, scleroză multiplă, epilepsie, porfirie, tetanie, coree Sydenham, disfuncție renală, LES, noduli mamari.

RA: Severe: tulburări cerebrovasculare (atacuri trombotice și hemoragice), neoplazie hepatică, leziuni oculare, afecțiuni ale veziculei biliare, hiperglicemie, hiperlipemie, hipercolesterolemie, HTA. Alte RA posibile: cefalee, edeme, greață, vărsături, crampe abdominale, modificări ale apetitului, modificări ale greutății; porfirie, depresie, nervozitate, amețeli, modificări ale libidoului, rash, eritem nodos, acnee, melasmă, hirsutism, alopecie, intoleranță la lentile de contact, nevrită optică, sângerare întreruptă, pete de sânge, modificări ale fluxului menstrual; amenoree; modificări ale secreției și ectropionului cervical; vaginite; modificări la nivelul sânului: sensibilitate crescută, mărire în volum, secreție.

COSOPT *COD ATC: S01ED51*

MERCK SHARP & DOHME; Sol. oft. 1 ml conține 20 mg dorzolamidă și 5 mg timolol; fl. × 5 ml ***(P-6L)***

Ind: HT oculară, glaucom cu unghi deschis; glaucom pseudoexfoliativ (terapie asociată).

Dz: 1 picătură de 2 ori/zi în ochiul afectat.

A!: Dacă se asociază cu alt med. oftalmic, distanța între cele 2 adm. să fie de cel puțin 10 minute.

CURIOSIN *COD ATC: D03AXN0*

GEDEON RICHTER Ltd; Sol. ext. cu hialuronat de zinc 2,05 mg/ml ***(P-RF)***

Ind: Vindecare întârziată, răni infectate, ulcus cruris, ulcerații de decubit, în tratamentul local al fistulelor, ca parte a terapiei complexe și pentru accelerarea vindecării normale a rănilor.

Dz: După curățarea suprafeței rănii cu apă oxigenată 3% sau cu ser fiziologic, se aplică soluția de Curiosin direct pe zona afectată a corpului, în cantitate egal distribuită pentru umezirea suprafeței de tratat sau se poate pune pe rană un tifon impregnat în soluție. Se va înlocui tifonul o dată sau de 2 ori/zi.
Cind: Sensibilitate la oricare din componenele preparatului.
RA: Rareori, la începutul tratamentului, pot apărea senzații ușoare de înțepături, care dispar, treptat, în perioada de tratament.

CUTADEN *COD ATC: D03AXN0*
ARMEDICA SA; Ung. cu ihtiol 1,5 g, oxid de zinc 15 g, dioxid de titan 6 g, extr. fluid de Hamamelis exprimat în subst. uscată 0,1 g, tetraborat de sodiu 0,1 g ***(OTC)***

Ind: Eczeme uscate, eriteme fesiere, fisuri ale pielii, degerături, arsuri superficiale.
Dz: Aplicații locale pe piele, de 2-3 ori/zi (în condițiile de asepsie a leziunii).
CInd: Dermatoze zemuinde, leziuni suprainfectate, alergie la ihtiol.
RA: Rareori erupții cutanate alergice, eczemă de contact.

CYCLO 3 FORT *COD ATC: C05CXN1*
LAB. PIERRE FABRE; Cps. cu extr. de Ruscus Aculeatus 150 mg; Hesperidin metil chalconă 150 mg; ac. ascorbic 100 mg ***(P-6L)***

Ind: Afecțiuni circulatorii venoase, sângerări (altele decât sângerările menstruale) din timpul terapiei cu pilule contraceptive cu doze mici sau a sângerărilor asociate cu prezența unui dispozitiv intrauterin. Crize acute hemoroidale.
Dz: 2-3 cps./zi în timpul meselor.
A!: Sarcină și alăptare.
RA: Tulb. gastrointestinale minore (greață, dureri de stomac, arsuri, gust amar, diaree).

CYCLO-PROGYNOVA® 21 *COD ATC: G03FA10*
SCHERING-PLOUGH EUROPE AG; Dj. albe cu câte 2 mg valerat de estradiol și dj. maron cu câte 2 mg valerat de estradiol și 0,5 mg norgestrel ***(P-6L)***

Ind: Sd. de perimenopauză, simptomatologia de privare după ovariectomie sau castrare prin iradiere pentru afecțiuni necanceroase, amenoree primară și secundară (după excluderea posibilității unei sarcini; în amenoreea secundară cel mai devreme după 8 săpt. de la ultima menstră), alte tulburări menstruale.
Dz: 1 dj./zi din a 5-a până în a 25-a zi a ciclului cu 7 zile pauză. În amenoree se poate începe oricând.
Cind: Tulburări grave hepatice, tumori hepatice existente sau în antecedente. Icter de sarcină idiopatic sau prurit grav de sarcină, sindromul Dubin-Johnson și Rotor. Procese tromboembolice. Diabet zaharat grav cu modificări vasculare, anemie, tumori hormono-dependente de uter sau de sân. Endometrioză. Tulburări de metabolism lipidic, herpes de sarcină, anamneză. Otoscleroza cu perioade de înrăutățire în cursul sarcinilor anterioare. Sarcină și alăptare.

A!: Sub trat. nu este voie să se instaleze sarcina.
RA: Senzație de tensiune mamară, tulburări gastrice, grețuri, cefalee, modificarea greutății corporale și a libidoului; sângerări intermenstruale. Migrene; tulburări acute de vedere și alte deficiențe senzoriale.

CYSTENAL *COD ATC: G04BDN1*

IVAX PHARMACEUTICALS; Sol. orală cu Rubii tinctoriae radix 0,01 g, salicilat de magneziu 0,15 g, oleuri volatile 6,15 g; Sol. orală în picături 0,93 mg/14 mg ***(OTC)***

Ind: Calculoză renală (profilactic și curativ), inflamații secundare ale căilor urinare.
Dz: Int., 3-4 pic pe o bucată de zahăr, de 3 ori/zi.
A!: Nu este eficace în cazul calculozei cu indicație chirurgicală.

D

DAIVOBET *COD ATC: D05AX52*

LEO PHARMACEUTICALS PRODUCTS; Ung.; 1 g conține 0,05 mg calcipotriol și 0,05 mg betametazonă (dipropionat); tub × 3, 15, 30, 60, 100, 120 g ***(P-RF)***

Ind: Trat. psoriazisului vulgar.
Dz: *Adulți:* Ung. se aplică o dată/zi, pe zona afectată, timp de până la 4 săptămâni. Doza maximă: 100 mg pe săptămână.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componenții produsului. Infecții netratate ale pielii. Pacienții cu tulburări ale metabolismului calciului (datorită conținutului în calcipotriol).
A!: Nu se aplică pe față. Nu se utilizează pentru aplicații pe suprafețe intinse, și/sau sub pansamente ocluzive sau la nivelul pliurilor. Precauție la pacienții diabetici, la cei cu afecțiuni hepatice sau renale. Sarcină și alăptare.
RA: Poate produce mâncărimi ușoare și trecătoare, iritație locală tranzitorie, dermatite, eritem, uneori agravarea psoriazisului. Rar: foliculite, hipertricoză, dermatită periorală, dermatită alergică de contact sau depigmentări. Foarte rar apar RA sistemice: hipercalcemie datorată calcipotriclului sau inhibarea axului hipofizo-cortico-suprarenalian de către glucocorticoid.

DALERON C *COD ATC: N02BE51*

KRKA d.d.; Pulb. susp.; la 5 g conține 500 mg paracetamol și 20 mg acid ascorbic ***(OTC)***

Ind: Scăderea febrei care acompaniază variate infecții bacteriene și virale, ameliorarea durerilor musculare și articulare din răceală și gripă, ameliorarea durerilor ușoare și moderate de origine neinflamatorie (cefalee, dureri dentare), în special la pacienții cu afecțiuni gastrice, ameliorarea durerilor consecutive traumatismelor și procedurilor medicale.
Dz: *Adulții și copiii peste 12 ani:* 1 plic de granule, de 4-6 ori/zi. Intervalul dintre doze va fi de cel puțin 4 ore. Nu se recomandă adm. a mai mult de

8 plicuri în 24 ore. Goliți conținutul unui plic într-un pahar, turnați peste granule 150 ml apă caldă sau ceai, amestecați și beți conținutul cât timp este cald.
Cind: Hipersensibilitate la paracetamol, acid ascorbic, sau oricare dintre ingredienții medicamentului, sau disfuncții severe renale și hepatice.
A!: În IR sau IH ușoară-moderată, se adm. numai sub supraveghere medicală. Nu se recomandă adm. împreună cu alte medicamente ce conțin paracetamol. Se va evita consumul de alcool în timpul trat. Durata tratamentului nu va depăși 5 zile, decât la indicația medicului. Se recomandă prudență la adm. la pacienții debilitați, slăbiți, precum și la alcoolici. Nu se recomandă diabeticilor, deoarece conține zaharoză. Nu se va asocia cu antiepileptice, barbiturice, rifampicină și cloramfenicol.
RA: Ocazional pot apărea greață și reacții cutanate de hipersensibilizare (rash, urticarie, prurit).

DALERON C JUNOR *COD ATC: N02BE51*
KRKA d.d.; Pulb. susp.; la 5 g conține 120 mg paracetamol și 10 mg acid ascorbic ***(OTC)***

Ind: Scăderea febrei care acompaniază variate infecții bacteriene și virale (viroze), ameliorarea durerilor musculare și articulare din răceală și gripă, ameliorarea durerilor ușoare și moderate de origine neinflamatorie (cefalee, dureri dentare), în special la pacienții cu afecțiuni gastrice, ameliorarea durerilor consecutive traumatismelor și procedurilor medicale.
Dz: *Copiii cu vârsta între 2-12 ani:* 1 plic de granule, de 4-6 ori/zi. Intervalul dintre doze va fi de cel puțin 4 ore. Goliți conținutul unui plic într-un pahar, turnați peste granule 150 ml apă caldă sau ceai, amestecați și beți conținutul cât timp este cald.
Cind: Hipersensibilitate la paracetamol, acid ascorbic, sau oricare dintre ingredienții medicamentului, sau disfuncții severe renale și hepatice.
A!: În IR sau IH ușoară-moderată, se adm. numai sub supraveghere medicală. Nu se recomandă adm. împreună cu alte medicamente ce conțin paracetamol. Durata tratamentului nu va depăși 5 zile, decât la indicația medicului. Nu se va asocia cu antiepileptice, barbiturice, rifampicină și cloramfenicol.
RA: Ocazional pot apărea greață și reacții cutanate de hipersensibilizare (rash, urticarie, prurit).

DENTINOX TEETHING GEL *COD ATC: A01AD11*
DENTINOX; Gel 1 g conține 3,4 ng clorhidrat de lidocaină, 3,2 mg polidocanol și 150 mg T-ra Chamomille ***(OTC)***

Ind: Trat. simptomatic al durerii determinate de erupția dentiției la copii.
Dz: Se aplică de 2-3 ori/zi, pe gingia dureroasă o cant. de gel de mărimea unui bob de mazăre.

DERMESONE-N *COD ATC: D07CC01*
DAR AL DAWA; Cremă/Ung.; 1 g conț. 1 mg valerat de betametazonă și 5 mg sulfat de neomicină; tub × 15 g ***(P-RF)***

Ind: Dermatita de contact, atopică, seboreică, exfoliativă, solară, statis, neurodermatită, lichen plan, eczeme, intertrigo, dishidroză, prurit ano-genital și senil.
Dz: Aplicații locale de 2 ori/zi, dimineața și seara.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componente.
A!: Iritația locală sau sensibilizarea - trat. trebuie întrerupt. Copii, sugari. Sarcină și alăptare.
RA: Prurit, iritație locală, uscăciunea pielii, foliculită, hipertricoză, erupții acneiforme, hipopigmentare, dermatită periorală, alergică, de contact. Pansamente ocluzive: macerarea pielii, infecții secundare, atrofie cutanată, striații și miliaria.

DERMIX *COD ATC: D11AXN1*
EUROPHARM SA; Cremă; 100 g conțin 3 g ulei volatil de cuișoare, 1 g ulei volatil de cimbru, 1,5 g ulei volatil de levănțică, 1,5 g ulei volatil de mentă; tub × 15 g ***(OTC)***

Ind: Ca modalitate de tratament adjuvant local în: afecțiuni dermatologice minore, fisuri, escoriații, arsuri solare, arsuri superficiale cu suprafață limitată, înțepături de insecte; boală venoasă, sindrom varicos; dureri reumatice, spasme musculare; cefalee.
Dz: Aplicații locale pe piele sau în zona afectată, de 2-3 ori/zi. Se aplică în strat subțire; eventual se masează ușor.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului.
A!: Se evită contactul cu mucoasa conjunctivală. Nu se aplică pe plăgi întinse sau profunde. Se va evita folosirea la nou-născuți și sugari.
RA: Aplicarea pe zone sensibile sau plăgi poate produce iritație ușoară și trecătoare cu senzație de usturime.

DERMOCARE
PHARCO PHARMACEUTICALS; Cremă cu dimeticonă "350" 100 mg și cetrimide 5 mg; tub cu 20 g ***(OTC)***

Ind: Antiseptic local. Prevenirea eritemului fesier și a dermatitei de scutece. Incompatibil cu săpun și detergenți anionici. Tratamentul și prevenirea apariției rănilor de decubit (escare), protecția pielii împotriva iritațiilor, prevenirea iritațiilor de scutece, protecția pielii împotriva uscării sau iritațiilor datorate detergenților sau altor chimicale, prevenirea infecțiilor asociate tăieturilor minore sau zgârieturilor, curățirea preoperatorie a pielii.
Dz: O peliculă fină de cremă se aplică pe piele și se masează blând, de 2-3 ori pe zi. Nu se aplică în zona ochilor.

DESMANOL *COD ATC: D08AC52*
SCHULKE GmbH & MAYR; Sol. ext. cu 508 mg diclorhidrat de clorhexidină, 32,251 g 1-propanol și 20,985 g 2-propanol; fl. × 450 ml sau 1 l ***(OTC)***

Ind: Antisepsia tegumentelor preoperator, plăgi cutanate, cateterelor, instrumentarului.
Dz: Aplicații locale.

AI: Utilizare exclusiv externă.
RA: Manifestări alergice locale.

DESORELLE *COD ATC: G03AA09*
GEDEON RICHTER Ltd.; Cpr. cu etinilestradiol 0,03 mg și desogestrel 0,15 mg ***(P-6L)***

Ind: Contracepție orală.
Dz: 1 cpr./zi, 21 de zile, începând din prima zi a ciclului menstrual cu pauză de 7 zile.
CInd: Tulburări ale funcției hepatice, sindroamele Dubin-Johnson și Rotor. Sarcină și alăptare.
A!: Antecedente personale sau heredo-colaterale de leziuni cardiovasculare și cerebrovasculare, afecțiuni tromboembolice, tumori hepatice, carcinom mamar sau de endometru, hipertrofia endometrului, tulburări ale metabolismului lipidic, HTA severă, diabet zaharat sever, porfirie, sângerări vaginale nediagnosticate, otoscleroză (care s-a agravat în timpul sarcinilor anterioare), icter idiopatic de sarcină sau prurit sever de sarcină, herpes genital.
RA: Sângerări intermenstruale, modificarea secreției vaginale, infecții vaginale (de ex. candidoze), senzație de tensiune în sâni, greață, vărsături, litiază biliară, icter colestatic, tromboză, HTA, cloasmă, eritem nodos, exanteme, intoleranță la lentile de contact, cefalee, migrene, labilitate emoțională, retenție de lichide, scăderea toleranței la glucoză, modificări ponderale.

DETRALEX *COD ATC: C05CA03*
LAB. SERVIER IND.; Cpr. film. cu diosmină 450 mg și hesperidină 50 mg ***(P-6L)***

Ind: Insuficiența venoasă cronică. Hemoroizi.
Dz: Flebologie: 3 cpr./zi, în timpul meselor. Hemoroizi: 6 cpr./zi, în primele 4 zile, apoi 4 cpr./zi, în următoarele 3 zile.
CInd: Sarcină și alăptare.
RA: Tulburări digestive și neurovegetative.

DEXAMETHASONE CU NEOMICIN *COD ATC: S01CA01*
E.I.P.I.C.O.; 1 ml sol. oft. conț.: dexametazonă (sare de sodiu) 1 mg, neomicină (sulfat) 3,5 mg; fl. × 5 ml ***(P-RF)***

Ind: Afecțiuni ale polului anterior al ochiului complicate cu infecții cu germeni sensibili la neomicină: keratite superficiale; keratite profunde; herpes zoster oftalmic; conjunctivite și iridociclite nepurulente; irite; ulcerații marginale recidivate; leziuni corneene; alergii palpebrale; blefarite catarale, nepurulente și alergice; terapie antiinflamatorie postoperator.
Dz: Inițial, 1-2 pic. de colir în sacul conjunctival la fiecare oră în timpul zilei și la 2 ore în timpul nopții apoi o pic. la 4 ore.
CInd: Infecții oftalmice cu micobacterii, viroze ca: varicelă, herpes simplex incipient, afecțiuni virale corneene și conjunctivale; infecții acute purulente ale

conjunctivei și pleoapelor cu germeni rezistenți la neomicină; infecții fungice oftalmice; alergie; după extragerea unui corp străin corneean.
A!: Glaucom.
RA: Favorizarea apariției infecțiilor, creșterea presiunii intraoculare.

DEXTRAN 40 - CLORURĂ DE SODIU 0,9% *COD ATC: B05AA05*

SICOMED SA; Sol. perf. cu sol. 10% dextran 40 în clorură de sodiu 0,9%; fl. × 500 ml *(S)*

Ind: Șoc traumatic, hemoragic, cardiogen (toxic sau din arsuri), embolie grăsoasă, pancreatite, peritonite, ileus paralitic, tromboze, tromboflebite, gangrenă iminentă, ulcus cruris și boala Raynaud, chirurgia vasculară și plastică, intervenții pe cord deschis.
Dz: Șoc, arsuri, embolie grăsoasă, pancreatite, peritonite, ileus paralitic: perf. i.v. 500-1000 ml în 30-60 minute, apoi încă 500 ml în aceeași zi, continuându-se cu 500 ml/zi, 5 zile. Tromboze, tromboflebite, gangrena iminentă, ulcus cruris, boala Raynaud: perf i.v. 1000 ml în 4-6 ore în prima zi, iar în zilele următoare câte 500 ml în 4-6 ore, 2 săpt. Chirurgie vasculară și plastică: perf i.v. 500 ml în 30-60 minute înaintea intervenției, 500 ml intraoperator, apoi 500 ml/zi, 2 săpt. Intervenții pe cord deschis: 10-20 ml/kg, în lichidul de perfuzie.
Cind: Trombocitopenie, hipofibrinogenemie (pericol de hemoragie); IC congestivă gravă; IR cu anurie sau cu oligurie marcată, retenție hidrosalină, regim desodat.
A!: IC, HTA, IRC.
RA: Reacții de hipersensibilitate ca: înroșirea feței, erupție urticariană, frison. Excepțional, spasm bronșic și/sau hTA.

DEXTRAN 70 - CLORURĂ DE SODIU 0,9% *COD ATC: B05AA05*

SICOMED SA; Sol. perf. cu sol. 10% dextran 70 în clorură de sodiu 0,9%; fl. × 500 ml *(S)*

Ind: Hipovolemii (hemoragie), deshidratări (arsuri), insuficiență circulatorie prin șoc toxic sau septic. Trombembolii (trat. profilactic și curativ).
Dz: Perf. i.v. 500-1000 ml/zi, apoi câte 500 ml i.v. la 2 zile, max. 2 săpt.
Cind: Trombocitopenie marcată, IC congestivă gravă, IR, EP.
A!: IC congestivă, nefropatii cu scăderea filtratului glomerular.
RA: Rar reacții alergice (urticarie, spasm bronșic), prelungirea timpului de coagulare.

DEXTRAN 40 - GLUCOZĂ 5% *COD ATC: B05AA05*

SICOMED SA; Sol. perf. cu sol. 10% dextran 40 în glucoză 5%; fl. × 500 ml *(S)*

Ind: Șoc traumatic, hemoragic, cardiogen, embolie grăsoasă, pancreatite, peritonite, ileus paralitic, tromboze, tromboflebite, gangrenă iminentă, ulcus cruris și boala Raynaud, chirurgia vasculară și plastică, intervenții pe cord deschis, bolnavi cu excreție renală scăzută a clorurii de sodiu.

Dz: Șoc, arsuri, embolie grăsoasă, pancreatite, peritonite, ileus paralitic: perf. i.v. 500-1000 ml în 30-60 minute, apoi încă 500 ml în cursul aceleiași zile, continuându-se cu 500 ml/zi, 5 zile. Tromboze, tromboflebite, gangrena iminentă, ulcus cruris, boala Raynaud: perf i.v. 1000 ml în 4-6 ore în prima zi, apoi 500 ml în 4-6 ore, 2 săpt. Chirurgie vasculară și plastică: perf i.v. 500 ml în 30-60 minute înaintea intervenției, 500 ml intraoperator, apoi 500 ml/zi, 2 săpt. Intervenții pe cord deschis: 10-20 ml/kg, în lichidul de perfuzie.
Cind: Trombocitopenie, hipofibrinogenemie (pericol de hemoragie); IC congestivă gravă; IR cu anurie sau cu oligurie marcată. Nu se perfuzează în amestec cu sânge.
A!: IC, IR, policitemie.
RA: Rar, înroșirea feței, erupție urticariană, frison. Excepțional, spasm bronșic și/sau hTA.

DEXTRAN 70 - GLUCOZĂ 5%

COD ATC: B05AA05

SICOMED SA; Sol. perf. cu sol. 10% dextran 70 în glucoză 5%; fl. × 500 ml ***(S)***

Ind: Șoc hipovolemic, insuficiență circulatorie prin șoc toxic sau septic. Arsuri întinse cu deshidratare și hemoconcentrație. Profilaxia șocului chirurgical. Profilaxia trombozelor postoperatorii.
Dz: Perf. i.v. inițial 500-1500 ml/zi și apoi 500 ml/zi sau la 2 zile.
Cind: Trombocitopenie marcată, IC congestivă gravă, IR, EP.
A!: Nefropatii cu scăderea filtratului glomerular.
RA: Rar, înroșirea feței, erupție urticariană, frison. Excepțional, spasm bronșic sau hTA.

DIANE - 35

COD ATC:G03HB01

SCHERING PLOUGH EUROPE AG; Dj. cu 2 mg ciproteron acetat și 0,03 mg etinilestradiol ***(P-6L)***

Ind: Manifestări de androgenizare la femei: acnee papulo-pustuloasă și acnee nodulo-chistică, seboree, formele ușoare de hirsutism, alopecia androgenă. Contracepție orală.
Dz: 1 dj/zi începând din prima zi a ciclului, 21 de zile, apoi 7 zile de pauză.
Cind: Tulburări hepatice grave, tumori hepatice, antecedente de icter idiopatic de sarcină, de herpes sau prurit grav în timpul sarcinii. Sindromul Dubin-Johnson și Rotor. Trombembolii, carcinom mamar sau de endometru, diabet, HTA, migrenă, tulburări senzoriale și în special tulburări acute de vedere, tromboflebită, icter, hepatită anicterică, prurit generalizat, creșterea frecvenței acceselor epileptice. Sarcină și alăptare.
A!: Fumat, afecțiuni hepatice sau renale diabet, HTA, varice, flebită, otoscleroză, scleroză multiplă, epilepsie, coree, porfirie intermitentă sau tetanie latentă. Înainte de o operație planificată (cu 6 săpt. înainte), imobilizare prelungită.
RA: Tensiune mamară, greață, cefalee, modificarea libidoului, depresie psihică, cloasmă, sângerări intermenstruale; risc de trombembolie.

DIBEN
FRESENIUS KABI GmbH; Sol. pt. nutriție enterală; 100 ml conțin: Proteine 4,0 g; Glucide 8,3 g (din care amidon 6,3 g; zaharuri 1,6 g; lactoză < 0,02 g); Lipide 4,5 g (din care acizi grași saturați 0,5 g; acizi grași mononesaturați 3,2 g; acizi grași polinesaturați 0,8 g; DHA și EPA 0,15 g; colesterol < 4 mg); Fibre 2 g; Apă 87 ml; Unități pâine 0,7 BE; Unități carbohidrați 0,8 KE; Minerale și oligoelemente: Na 76,6 mg, K 130,3 mg, Cl 118,2 mg, Ca 80 mg, Mg 28 mg, P 47 mg, Fe 1,33 mg, Zn 1,2 mg, Cu 130 µg, Mn 0,27 mg, I 13,3 µg, Mo 10 µg, Cr 26,7 µg, F 0,13 mg, Se 6,67 µg; Vitamine și alte elemente nutritive: Vit. A 70 µg, β-caroten 670 µg, Vit D_1 1 µg, Vit. E 6,7 mg, Vit. K1 6,67 µg, Vit. B_1 0,13 mg, Vit. B_2 0,17 mg, Nicotinamidă 1,6 mg, Vit. B_6 0,16 mg, Vit. B_{12} 0,27 µg, Acid Pantotenic 0,47 mg, Biotină 5 µg, Acid folic 27 µg, Vit. C 16,7 mg, Colină 36,7 mg, flavone 20 mg, cafeină cca 3 mg; ct. × 12 fl. × 500 ml/fl. ***(S)***

Ind: Produs dietetic cu destinație medicală specială, conținând antioxidanți - vitamina C, vitamina E, β-caroten și flavone - crom (co-factor pentru toleranța la glucoză) și magneziu, bogat în acizi grași mononesaturați și acizi grași omega-3, carbohidrați modificați cu amidon și fructoză, bogat în fibre, fără gluten și purine, săracă în colesterol și sodiu, practic fără lactoză. alimentație enterală completă, pe sondă, recomandată pacienților cu diabet zaharat, precum și pacienților care prezintă intoleranță la glucoză.
Dz: Doza zilnică medie recomandată pentru nutriție enterală completă este de 3-4 flacoane/zi (1350-1800 kcal/zi). Doza zilnică pentru asigurarea necesarului de proteine, acizi grași esențiali, vitamine, minerale și oligoelemente este > 1500 ml/zi cantitatea administrată crește lent la începerea alimentației pe sondă.
Cind: Copii cu vârsta sub 1 an.
A!: Utilizat numai sub supraveghere medicală. Trebuie monitorizat echilibrul hidric. Pot să apară interacțiuni cu anumite medicamente. Conținut energetic 1900 kJ (450 kcal)/500 ml produs pentru nutriție enterală (echivalent la aprox. 3,5 BE/500 ml, respectiv 4,2 KE/500 ml).

DICARBOCALM *COD ATC: A02AXN1*
SICOMED SA; Cpr. cu 489 mg carbonat de calciu, 11 mg carbonat de magneziu și 6 mg trisilicat de magneziu ***(OTC)***

Ind: Simptomatic în hiperaciditate, pirozis.
Dz: 1-4 cpr./zi, în două prize (la 1 oră după masa de prânz și seara la culcare).
Cind: Debilitate fizică marcată, funcție renală alterată.

DIFRAREL® 100 *COD ATC: C05CXN1*
LAB. LEURQUIN MEDIOLANUM; Dj. cu extract de Vaccinium myrtillus 100 mg + beta caroten 5 mg; blist. × 10 dj. (OTC)

Ind: Tratamentul adjuvant al manifestărilor funcționale din insuficiența venolimfatică (picioare grele, dureri, ortostatism prelungit). Tratamentul simptomatic adjuvant al tulburărilor funcționale din fragilitatea capilară. Tratamentul adjuvant al scăderii acuității vizuale și al tulburărilor de câmp vizual având origine vasculară.

Dz: Oral, 3 până la 6 drajeuri pe zi. Drajeurile vor fi înghițite, fără a fi sfărâmate în gură. Se administrează cu un pahar cu apă. Tratamentul trebuie efectuat în cure de 20 de zile pe lună; la nevoie curele se pot repeta.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului. Este de preferat să nu se utilizeze medicamentul în timpul sarcinii.
A!: Un drajeu conține 200 mg zaharoză (100 mg glucoză).
RA: Rare tulburări digestive.

DIFRAREL® E *COD ATC: C05CXN1*
LAB. LEURQUIN MEDIOLANUM; Dj. cu extract antocianozidic de Vaccinium myrtillus (afine) 50 mg + acetat de alfa-tocoferol (vitamina E) 50 mg; ct. × 1 blist. × 12 dj. ***(OTC)***

Ind: Tratament adjuvant în tulburările vederii crepusculare (mezopice), tulburările scotopice (hemeralopie) și în miopie.
Dz: Doza uzuală este de 3-6 drajeuri pe zi. Drajeurile vor fi înghițite, fără a fi sfărâmate în gură. Se administrează cu un pahar cu apă. Tratamentul trebuie efectuat în cure de 20 zile pe lună; la nevoie curele se pot repeta.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componenții produsului.

DIGESTIN *COD ATC: A09AA02*
EUROPHARM SA; Cps. cu pancreatină 150 mg ***(S/OTC)***

Ind: Tulburări dispeptice, fibroză chistică, pancreatite cronice, meteorism, anorexie, colite și enterocolite, dispepsii din anemia pernicioasă, dispepsii de putrefacție și fermentație, pregătirea în vederea examenelor radiologice și a operațiilor pe abdomen, post-pancreatectomie.
Dz: *Adulți:* 2-4 cps./zi, în timpul meselor. *Copii peste 3-4 ani:* 1 cps./zi în timpul mesei. Pentru pregătirea tubului digestiv, trat durează 2 zile.
Cind: Hipersensibilitate la proteinele de porc; pancreatita acută sau cronică
A!: Sarcină și alăptare.
RA: Constipație sau diaree, alergii, hiperuricozurie și hiperuricemie.

DIPROGENTA *COD ATC: D07CC01*
SCHERING-PLOUGH EUROPE AG; Cremă și ung.; 1 g conț.: 0,05 mg betametazonă dipropionat și gentamicină sulfat 1 mg; tub × 15 g ***(P-RF)***

SCHERING-PLOUGH EUROPE AG; Cremă și ung. 0,64 mg/g + 1 mg/g combinație de betametazonă dipropionat + gentamicină sulfat ***(P-RF)***

Ind: Psoriazis, dermatită atopică, seboreică, exfoliativă, solară, statis, neurodermatită, lichen plan, eczeme, intertrigo, dishidroză, prurit ano-genital și senil.
Dz: Aplicații locale de 2 ori/zi, dimineața și seara.
Cind: Sensibilitate la oricare dintre componentele sale; uz oftalmic.
A!: Iritația locală sau sensibilizarea - trat. trebuie întrerupt. Copii, sugari. Sarcină și alăptare.
RA: Prurit, iritație locală, uscăciunea pielii, foliculită, hipertricoză, erupții acneiforme, hipopigmentare, dermatită periorală, alergică, de contact.

DIPROSALIC® *COD ATC: D07XC01*

SCHERING-PLOUGH EUROPE AG; Ung.; 1 g conț. 0,64 mg betametazonă dipropionat și 30 mg ac. salicilic (tub × 15 g); Sol. cut.; 1 g conț. 0,64 mg betametazonă dipropionat și 20 mg ac. salicilic; fl. × 30 ml ***(P-RF)***

SCHERING-PLOUGH EUROPE AG; Sol.cut. 0,05% și ung. 0,05% ***(P-RF)***

Ind: *Ung.:* dermatoze hiperkeratozice și uscate: psoriazis, dermatită atopică cronică, neurodermită, lichen plan, eczeme, dishidroză, dermatita seboreică a scalpului, ihtioza vulgară. *Sol. cutanată:* psoriazis, seboreea scalpului, dermatoze.
Dz: Aplicații locale, de 2 ori/zi, dimineața și seara.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componente.
A!: Copii, sugari, reacții de iritare sau sensibilizare. Sarcină și alăptare.
RA: Prurit, iritație, uscăciunea pielii, foliculită, hipertricoză, erupții acneiforme, hipopigmentația pielii, dermatită periorală, de contact, alergică. În pansamente ocluzive: macerația pielii, infecții secundare, atrofie cutanată, striuri, miliaria, senzația de durere, ragade.

DISTONOCALM *COD ATC: C07NAN1*

SICOMED SA; Cpr. film. cu 0,25 mg alcaloizi din rădăcină de beladonă, 0,30 mg alcaloizi din ergot, 15 mg propranolol și 25 mg amobarbital; fl. × 10 cpr. film. sau 30 cpr. film. ***(P-6L)***

Ind: Distonii neuro-vegetative cu manifestări digestive, cardiovasculare. Tulburări neurovegetative din nevroza astenică, climacteriu, hipertiroidism, HTA incipientă.
Dz: 1 cpr. de 2-4 ori/zi, 15-20 zile pe lună.
Cind: Glaucom, IC, ileus, astm bronșic, bradicardie sinusală. Sarcină și alăptare.

DIVINA *COD ATC: G03FB06*

ORION; 11 cpr. albe cu 2 mg estradiol valerat; 10 cpr. albastre cu 2 mg estradiol valerat și 10 mg medroxiprogesteron acetat ***(P-6L)***

Ind: Trat. simpt. în tulburările de climax, terapie hormonală de substituție, prevenirea osteoporozei în postmenopauză.
Dz: 1 cpr./zi timp de 21 zile; pauză de 7 zile.
Cind: Tulburări grave hepatice, tumori hepatice existente sau în antecedente. Icter de sarcină idiopatic sau prurit grav de sarcină, sindromul Dubin-Johnson și Rotor. Procese tromboembolice. Diabet zaharat grav cu modificări vasculare, anemie, tumori hormono-dependente de uter sau de sân. Endometrioză. Tulburări de metabolism lipidic, herpes de sarcină. Sarcină și alăptare.
RA: Senzație de tensiune mamară, tulburări gastrice, grețuri, cefalee, modificarea greutății corporale și a libidoului; sângerări intermenstruale. Tulburări acute de vedere și alte deficiențe senzoriale.

DOLOMIT *COD ATC: A12CCN2*

PHARMEX ROM IND.; Cpr. cu dolomit echivalent a 173 mg calciu și 100 mg magneziu ***(OTC)***

Ind: Supliment nutritiv ce asigură un aport de calciu și magneziu necesar pentru menținerea balanței acestor minerale în condițiile unui consum crescut în timpul perioadei de creștere a dinților și oaselor, ca și în cursul perioadei de graviditate și alăptare.
Dz: 2-3 cpr./zi în timpul meselor.
Cind: Hipercalcemie și/sau hipermagneziemie.
RA: Supradozarea determină apariția de anorexie, amețeli.

DOXIPROCT® *COD ATC: C05AD01*
OM PHARMA; Sup. cu dobesilat de calciu 250 mg și clorhidrat de lidocaină 40 mg; ung. cu dobesilat de calciu 4% și clorhidrat de lidocaină 2%; tub × 30 g *(P-RF)*

Ind: Hemoroizi interni și externi; prurit anal, eczemă; anită, perianită, papilită, tromboză hemoroidală acută, fisură anală; pre- și postoperator în caz de hemoroidectomie; hemoroizii sarcinii.
Dz: 1 sup. și/sau ung. dimineața și seara.
Cind: Hipersensibilitate.
RA: Ușoară senzație de arsură, creșterea motilității intestinale, hipersensibilizare.

DOXIPROCT PLUS® *COD ATC: C05AA09*
OM PHARMA; Sup. cu dobesilat de calciu 250 mg, clorhidrat de lidocaină 40 mg, dexametazonă acetat 0,025 mg; Ung. cu dobesilat de calciu 4%, clorhidrat de lidocaină 2%, dexametazonă acetat 0,025%; tub × 20 g *(P-RF)*

Ind: Hemoroizi interni și externi; prurit anal, eczemă; anită, perianită, criptită, papilită, tromboză hemoroidală acută, fisură anală; pre- și postoperator în caz de hemoroidectomie.
Dz: 1 sup. și/sau ung. dimineața și seara.
Cind: Hipersensibilitate.
RA: Ușoară senzație de arsură, creșterea motilității intestinale.

DOXIVENIL *COD ATC: C05BA51*
OM PHARMA; Gel și cremă cu dobesilat de calciu 2% și heparinoid (hidrodextransulfat de sodiu) 2%; tub × 40 g sau 100 g *(OTC)*

Ind: Insuficiență venoasă cronică, inflamații postoperatorii după intervenții pe varice sau infecții sclerozante, indurații ale traiectelor venoase după inj. i.v. sau perfuzie, inflamații posttraumatice: hematoame, entorse, luxații, contuzii.
Dz: Aplicații locale de 2-3 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate, tendință la hemoragii, trombocitopenie. Aplicarea pe mucoase, plăgi deschise sau pe focare infecțioase în timpul procesului purulent.
A!: Evitarea contactului cu conjunctiva. Sarcină și alăptare.
RA: Eritem.

DRILL® MIEL ROSAT, DRILL® PASTILE, DRILL® SANS SUCRE *COD ATC: R02AA05*

LAB. PIERRE FABRE; Pastile cu 3 mg digluconat de clorhexidină și 0,2 mg clorhidrat de tetracaină ***(OTC)***

Ind: Trat. adjuvant antiseptic și anestezic local al afecțiunilor mucoasei bucale și de la nivel orofaringian.

Dz: *Adulți:* 1 cpr. de 4 ori/zi, adm. perlingual. *Copii între 6 și 15 ani:* 1 cpr. de 2-3 ori/zi, adm. perlingual. Cpr. se adm. la distanță de mese; cpr. se sug lent, fără a se sfărâma. Intervalul dintre 2 adm. trebuie să fie de cel puțin 2 ore.

Cind: Hipersensibilitate la anestezice locale, la clorhexidină sau la oricare din componentele produsului; copii sub 6 ani.

A!: Există posibilitatea aspirării alimentelor în căile respiratorii din cauza acțiunii anestezice asupra mucoasei orofaringiene. Ca urmare nu se adm. înainte de ingerarea alimentelor și lichidelor. Adm. frecventă sau îndelungată, poate crește riscul RA sistemice ale anestezicului local (convulsii, deprimare cardiovasculară). Nu este justificat un tratament prelungit (mai mult de 5 zile), deoarece poate să apară un dezechilibru al florei microbiene saprofite de la nivelul cavității bucale, cu risc de suprainfecție bacteriană sau fungică. La pacienții cu diabet se recomandă adm. produsului Drill Sans Sucre (care nu conține glucide). Sportivii trebuie preveniți că acest produs poate determina o reacție fals pozitivă la testele antidoping.

RA: Reacții alergice; colorația brună a limbii și a dinților determinată de clorhexidină, reversibilă la întreruperea trat.; senzație pasageră de amorțeală a limbii; aspirare în căi respiratorii a alimentelor și lichidelor.

DUOFILM *COD ATC: D11AFN2*

STIEFEL LABORATORIES Ltd.; 100 ml sol. cutanată conțin acid salicilic 16,7 g și acid lactic 16,7 g ***(OTC)***

Ind: Trat. local al verucilor.

Dz: Se aplică la nivelul verucii o dată/zi.

Cind: Copii sub 2 ani.

A!: Nu se aplică pe pielea normală, pe față și în regiunea ano-genitală. Prudență la copii între 2-12 ani.

RA: Aplicarea pe pielea normală poate produce arsuri.

DUOVIT *COD ATC: A11AA04*

KRKA d.d.; Dj. roșu conține: vit. A 5000 I.U., vit. D_3 200 I.U., vit. C 60 mg, nicotinamidă 13 mg, vit. E 10 mg, pantotenat de calciu 5 mg, vit. B_6 2 mg, vit. B_2 1,2 mg, vit. B_1 1 mg, acid folic 0,4 mg, vit. B_{12} 3 µg. Dj. albastru conține: magneziu 20 mg, calciu 15 mg, fosfor 12 mg, fer 10 mg, zinc 3 mg, cupru 1 mg, mangan 1 mg, molibden 0,1 mg ***(OTC)***

Ind: În cazul creșterii necesarului de vitamine și minerale în: activitate fizică intensă; metabolizare insuficientă a hranei (vârstnici, fumători, alcoolici); alimentație neregulată și nediversificată; dietă restrânsă (cură de slăbire, diabet etc.); sarcină și alăptare; aport insuficient de alimente proaspete și legume; pierdere crescută de minerale (vărsături, diaree, hipermenoree, transpirații profuze).

Dz: *Adulți și copii peste 10 ani:* 1 dj. roșu (vitamine) și unul albastru (minerale) zilnic. Dj. vor fi înghițite întregi, cu lichid, după micul dejun.
Cind: Hipersensibilitate la oricare ingredient al produsului, afecțiuni renale sau hipervitaminoză A și D diagnosticată. Nu se recomandă la copii sub 10 ani.
A!: Fierul reduce absorbția tetraciclinelor și antiacidelor, astfel încât nu se recomandă asocierea. Dacă trat. concomitent este necesar, trebuie să existe un interval de cel puțin 3 ore între adm. dj. și tetracicline sau antiacide. Femeile însărcinate și cele care alăptează vor lua vitamine și minerale după sfatul medicului. Adm. îndelungată a unor doze foarte mari poate produce hipervitaminoză A și D. Diabeticii trebuie să ia în considerare faptul că fiecare dj. conține 0,8 g zahăr. Reacțiile alergice sunt mai frecvente la cei hipersensibili la acid acetilsalicilic.
RA: Sunt posibile reacții de hipersensibilitate la excipienți. Pot apărea tulburări digestive rare, în special dacă drajeurile sunt luate pe nemâncate.

E

ECOCAIN 2% CU ADRENALINĂ 1:100000 *COD ATC: N01BB52*
MOLTENI DENTAL; Sol. inj. de uz dentar; 1 cartuș conține 36 mg clorhidrat de lidocaină și 18 mg L-adrenalină (sub forma de bitartrat) ***(S)***

Ind: Anestezic local pentru orice tip de intervenție stomatologică, când se dorește o prelungire a duratei efectului anestezicului sau când e necesară obținerea unei ischemii locale.
Dz: 1-2 ml sol. inj. sau mai mult, în funcție de tipul intervenției, pentru infiltrații sau bloc nervos periferic. Doza maximă de lidocaină este de 300 mg/24 ore. La adulți sănătoși, netratați cu sedative, doza maximă pentru o singură adm. sau pentru adm. repetate într-un interval mai mic de 120 minute este de 300 mg lidocaină și de 0,2 mg adrenalină, echivalent cu 5,5 cartușe. Sol. se inj. în doze mici, cu o viteză de 1 ml/min, după aspirație. La copii, dozele se scad în funcție de greutate și vârstă.
Cind: Hipersensibilitate la lidocaină, adrenalină sau la oricare dintre excipienții produsului; tulburări de conducere atrioventriculare, insuficiență coronariană, aritmii ventriculare, HTA severă, cardiomiopatie obstructivă; migrenă; hipertiroidie; epilepsie necontrolată prin tratament; porfirii.
A!: Prudență la pacienții cu IH, IC, diabet zaharat, adenom de prostată, glaucom acut și nevroze. Înainte de utilizare, trebuie controlată TA și alura ventriculară. Este indicată folosirea dozei minime pentru obținerea efectului dorit. Pacientul trebuie monitorizat cu atenție; la primul semnal de alarmă, adm. trebuie întreruptă. Sunt necesare dotare corespunzătoare și personal calificat pentru a interveni în cazul apariției reacțiilor adverse grave. Nu se adm. în regiunile inflamate și infectate, precum și la pacienții tratați cu anticoagulante. Produsul poate produce o reacție pozitivă la testele de control antidoping. Prudență la asocierea cu guanetidină, anestezice generale inhalatorii halogenate, IMAO și antidepresive triciclice sau cu fenol.
RA: Nervozitate, agitație, tremor, dezorientare, nistagmus, logoree, cefalee, greață, convulsii; tahipnee, apoi apnee; tahicardie, bradicardie, hTA, tulburări de ritm; reacții alergice. Adrenalina poate determina, în special la pacienții cu afecțiuni cardiovasculare: anxietate, transpirație, insuficiență respiratorie, aritmii, HTA, cefalee, fotofobie, dureri retrosternale sau faringiene, vărsături.

ECOCAIN 2% CU ADRENALINĂ 1:50000

COD ATC: N01BB52

MOLTENI DENTAL; Sol. inj. de uz dentar, 1 cartuș conține 36 mg clorhidrat de lidocaină și 36 mg L-adrenalină (sub forma de bitartrat) ***(S)***

Ind, Dz: vezi *ECOCAIN 2% CU ADRENALINĂ 1:100000*

ECOZONE

COD ATC: D07CB04

MEDIPHAR LAB.; Cremă cu 1% nitrat de econazol și 0,1% dexametazonă; tub × 20 g ***(P-RF)***

Ind: Infecții fungice superficiale ale pielii însoțite de eczeme și de fenomene inflamatorii, localizate mai ales la nivelul mâinii, spațiilor interdigitale ale piciorului, regiunii inghinale și genitale. Terapia eritrasmei. Pitiriazis versicolor. Keratite micotice. Lichen plan.
Dz: Se aplică la nivelul zonelor cutanate afectate.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului. Leziuni tuberculoase sau sifilitice, localizate la nivelul regiunilor pe care se aplică crema; afecțiuni virale (vaccină, zona zoster, varicelă). Sarcină și alăptare.
A!: Trebuie evitată aplicarea pe zone cutanate întinse sau timp îndelungat; în aceste situații există riscul apariției RA, în special la sugar și la copilul mic. Aplicarea la nivelul feței trebuie efectuată cu grijă, pentru a evita contactul cu ochii.
RA: Rar, semne de iritație sau reacții alergice locale. După aplicarea pe zone întinse și timp îndelungat, pot să apară atrofie cutanată dermo-epidermică (atenție mai ales la sugari și pe perioadă de timp mai mare de 4 săpt.), telangiectazii, vergeturi, acnee steroidiană, dermatită periorală, hipertricoză (mai ales la nivelul feței), precum și efecte sistemice determinate de absorbția glucocorticoidului (la doze repetate și pe o perioadă mare de timp).

EFERALGAN CODEINE

COD ATC: N02AA59

LAB. UPSA; Cpr. eff. cu paracetamol 500 mg și 30 mg fosfat de codeină ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. simptomatic al durerii.
Dz: *Copii cu greutate mai mare de 15 kg:* 60 mg paracetamol/kg/zi și 3 mg/kg/zi codeină, în 4-6 prize. *Adulți:* 1 cpr. la 4-6 ore, max 6 cpr./zi.
Cind: Copii cu greutatea mai mică de 15 kg, alergie, IH severă, astm grav, insuficiență respiratorie, fenilcetonurie. Asociere cu buprenorfină, nalbufină, pentazocină, alcool. Sarcină și alăptare. Șoferi și activități de precizie.
A!: Dependență la utilizarea prelungită. Afecțiuni hepatice sau renale, astm, inflamație bronșică (tuse cu expectorație), pacienți colecistectomizați. Poate determina rezultate pozitive la testele antidoping.
RA: Constipație, greață, vomă, somnolență, vertij, depresie respiratorie, reacții alergice, rash cutanat.

EFFERALGAN VITAMINE C

COD ATC: N02BE51

LAB. UPSA; Cpr. eff. cu paracetamol 330 mg și 200 mg ac. ascorbic ***(OTC)***

Ind: Afecțiuni dureroase și febrile.
Dz: *Adulți și copii peste 15 ani:* 1-2 cpr. de 1-3 ori/zi; *copii între 7-13 ani:* 1/2-1 cpr. de 1-3 ori/zi; *copii între 13-15 ani:* 1-1 1/2 cpr. de 1-3 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate; insuficiență hepato-celulară; litiază renală.
A!: Regim desodat sau hiposodat.
RA: Erupții cutanate, tulburări digestive.

EFORTEX

COD ATC: A13AN

TERAPIA SA; Dj. cu glicocol 50 mg; ac. L-glutamic 75 mg; aspartat de potasiu 75 mg; aspartat de magneziu 75 mg; L-tirozină 30 mg; L-lizină clorhidrat 87,5 mg; cafeină 31 mg ***(OTC)***

Ind: Efort, convalescență; pregătirea biologică a sportivilor de performanță.
Dz: Câte 1-3 dj. de 3-4 ori/zi.
Cind: Excitație, insomnie, tahicardie, aritmii, boală coronariană, ulcer, IRA, IRC, leziuni parenchimatoase renale severe, comă hepatică, tulburări ale metabolismului aminoacizilor, astm bronșic, insuficiență suprarenală.
A!: Deprimare respiratorie și hipoxie, ulcer gastro-duodenal, anemie. Sarcină și alăptare.
RA: Nervozitate, insomnie, tremor, palpitații, greață, disconfort abdominal, diaree.

ELECTOVIT®

SICOMED SA; Cpr. eff. și cpr. film. conținând: vit. B_1 (tiamina) 4,8 mg; vit. B_2 (riboflavina) 5 mg; vit. B_6 (piridoxina) 6 mg; vit. B_{12} (cianocobalamina) 2 micrograme; vit. PP (nicotinamida) 10 mg; calciu pantotenat 10 mg; tub × 10 cpr. eff.; tub × 10 cpr. film. ***(OTC)***

Ind: Prevenirea și corectarea tulburărilor metabolice și clinice determinate de deficitul vitaminic.
Dz: Cpr. eff. sau film.: 1 comprimat pe zi. La indicația medicului se pot administra doze mai mari, de până la 1-2 comprimate de trei ori pe zi. Un comprimat efervescent se va dizolva într-un pahar cu apă (200 ml) și se va administra imediat după dizolvare. Comprimatele filmate se vor înghiți întregi, cu lichid suficient.
Cind: Nu se va administra produsul la persoanele cu alergii cunoscute la una dintre componente.

ELOSALIC

COD ATC: D07XC03

SCHERING-PLOUGH EUROPE AG; Ung. cu 1 mg furoat de mometazonă și 50 mg acid salicilic; tub × 1, 8, 15, 45 g ***(OTC)***

Ind: Tratamentul inițial al leziunilor psoriazice moderate-severe.
Dz: Se aplică un strat subțire pe zonele afectate, 1-2 ori/zi, maxim 3 săptămâni. Doza maximă zilnică este de 15 g unguent, aplicată pe cel mult 30% din suprafața corporală. Se recomandă ca întreruperea adm. să se facă treptat.
Cind: Hipersensibilitate la furoat de mometazonă, acid salicilic sau la oricare dintre excipienții produsului. La pacienții cu infecții bacteriene (piodermite, sifilis și tbc), virale sau fungice și parazitare, în cazul în care nu se adm. concomitent tratament etiologic. Reacții postvaccinale. Ultimul trimestru de sarcină.

La pacienții care prezintă dermatită periorală, acnee rozacee, acnee juvenilă vulgară și atrofie cutanată.
A!: Prudență în situațiile care impun aplicarea unguentului pe suprafețe cutanate mari. Nu este recomandat ca zonele pe care se aplică să fie acoperite cu pansamente ocluzive. Nu trebuie aplicat pe față, în regiunea inghinală sau la nivelul altor pliuri cutanate. Nu este destinat pentru uz oftalmic. Nu se va utiliza pentru ulcere, plăgi sau vergeturi. Dacă apare iritație, inclusiv uscăciune excesivă, nu se va mai folosi, urmând a se institui o terapie adecvată. Glucocorticoizii pot să mascheze, să activeze sau să agraveze infecțiile cutanate. În cazul în care se dezvoltă o infecție cutanată concomitentă, trebuie să se folosească un agent antifungic sau antibacterian corespunzător.
Pacienții care combină terapia topică cu Elosalic cu terapia UV trebuie să curețe zona tratată înainte de a începe terapia UV, pentru a reduce acțiunea de fotoprotecție, diminuând astfel riscul apariției arsurilor la nivelul zonelor învecinate netratate.
RA: Senzație de arsură la locul aplicării, prurit, atrofie cutanată locală; rar vergeturi, dermatită papuloasă asemănătoare acneei juvenile (pe pielea feței), echimoze, foliculită.

EMLA *COD ATC: N01BB52*
ASTRAZENECA; 1 g cremă conține lidocaină 25 mg, prilocaină 25 mg
(P-RF)

Ind: Anestezia topică a pielii pentru: inserția de catetere, trat. injectabile, puncții venoase, proceduri chirurgicale superficiale. Pe mucoasa genitală, anterior procedurilor chirurgicale superficiale sau anesteziei prin infiltrație.
Dz: Aplicații pe piele în zona interesată cu 1 oră înaintea intervenției. Aplicații pe mucoasa genitală cu 5-10 min înaintea intervenției.
Cind: Hipersensibilitate la anestezice locale amidice sau la alt component al produsului. Methemoglobinemia congenitală sau idiopatică. Aplicarea pe plăgi deschise, pe mucoasa genitală la copii, pe membrana timpanică lezată. Copii sub 3 luni.
A!: Dermatită atopică, aplicarea în vecinătatea ochilor. Sarcină și alăptare.
RA: Local: paloare, eritem și edem, ușoară arsură sau prurit. Rar, reacții alergice, methemoglobinemie.

EMLA *COD ATC: N01BB52*
ASTRAZENECA; Plasture ce conține lidocaină 25 mg și prilocaină 25 mg
(OTC)

Ind: Anestezia topică a pielii intacte, pentru procedurile de mică chirurgie: trat. injectabile, puncții venoase, trat. chirurgical al leziunilor localizate.
Dz: Se aplică plasturele pe suprafața dorită, o oră.
Cind: Hipersensibilitate. Methemoglobinemie congenitală sau idiopatică. Aplicarea pe plăgi deschise. Copii sub 3 luni. Asocierea cu medicamente care pot produce methemoglobinemie.
A!: Dermatită atopică. Aplicarea în vecinătatea ochilor. Sarcină și alăptare.
RA: Local: paloare, eritem și edem, ușoară arsură sau prurit. Rar, reacții alergice, methemoglobinemie.

ENAP® H, ENAP® HL *COD ATC: C09BA02*
KRKA d.d.; Cpr. cu 10 mg maleat de enalapril și 25 mg hidroclorotiazidă; Cpr. cu 10 mg maleat de enalapril și 12,5 mg hidroclorotiazidă ***(P-6L)***

Ind: Trat. HTA în cazurile în care monoterapia cu un diuretic sau un IEC nu este suficientă. De asemenea este avantajos pentru înlocuirea biterapiei cu hidroclorotiazidă și un IEC administrate separat.
Dz: 1-2 cpr. în priză unică, zilnic.
Cind: Hipersensibilitate la enalapril sau alți IEC, la hidroclorotiazidă și alte tiazide, la sulfonamide și la oricare din celelalte componente ale produsului. Edem angioneurotic provocat de un IEC în antecedente. Stenoză de arteră renală bilaterală sau pe rinichi unic funcțional. IR/IH severă. Sarcină și alăptare.
A!: Nu este recomandabil ca primă treaptă de tratament al HTA. Se recomandă inițierea trat. cu una din cele două componente separat, continuând eventual cu *Enap H* dacă monoterapia nu este suficientă. Înaintea începerii trat. se evaluează funcția renală și hepatică. Datorită riscului hTA marcate, se recomandă inițierea tratamentului sub strictă supraveghere medicală. După adm. primei doze, pacientul va rămâne culcat timp de 2 ore sub supravegherea medicului, pentru a evita eventualele fenomene hipotensive ortostatice. Prudență la bolnavii cu ateroscleroză avansată, cardiopatie ischemică și insuficiență circulatorie cerebrală, deoarece scăderea bruscă a TA poate precipita un accident vascular ischemic cerebral sau coronarian. La pacienții imunodeprimați sau cu boli autoimune (colagenoze) poate produce deprimarea funcției hematopoietice medulare. În aceste cazuri se recomandă monitorizarea hemogramei pe durata trat. Se recomandă prudență la bolnavii cu antecedente de astm bronșic sau alte boli alergice și autoimune, deoarece există riscul agravării/reactivării acestora. Adm. IEC la bolnavii cu HTA renovasculară impune prudență, deoarece există posibilitatea dezvoltării IRA. La bolnavii cu IC sau cu depleție hidrosalină există riscul hTA marcate cu IRA. Prudență la bolnavii dializați (risc de reacții anafilactoide). La vârstnici se inițiează trat. cu doze mici, pentru a evita scăderea bruscă a TA, acestea urmând a fi crescute treptat în funcție de răspunsul terapeutic. Înaintea unei intervenții chirurgicale se recomandă întreruperea trat. În IR (cu clearance-ul creatininei peste 30 ml/min) se recomandă verificarea potasemiei și nivelului plasmatic al creatininei. În IH se recomandă prudență, deoarece se poate precipita instalarea encefalopatiei portale. La bolnavii cu hiperparatiroidie se pot produce creșteri marcate ale calcemiei; în această situație se recomandă întreruperea trat. și evaluarea funcției paratiroidiene. La diabetici se recomandă controlul regulat al glicemiei și glicozuriei, eventual ajustarea dozelor de insulină sau de antidiabetice orale. La pacienții cu hiperuricemie se recomandă prudență, deoarece diureticele tiazidice pot crește nivelul plasmatic al acidului uric. Tratamentul de lungă durată cu diuretice tiazidice poate favoriza dislipemia. Pacienții alergici la diuretice tiazidice, furosemid, sulfonamide antibacteriene sau sulfoniluree antidiabetice pot prezenta reactivitate imunologică încrucișată. Se va evita asocierea enalaprilului cu diuretice antialdosteronice sau săruri de potasiu. Se impune prudență în asocierea cu antidepresive triciclice și neuroleptice, diuretice saluretice, med. imunosupresoare. AINS, glucocorticoizii pot reduce efectul antihipertensiv al enalaprilului. Asocierea cu sărurile de litiu nu este recomandată; dacă adm. celor două med. este absolut necesară, este obligatorie verificarea frecventă a litemiei și ajustarea dozelor. Hidroclorotiazida poate avea efect hiperglicemiant, de aceea folosirea la diabetici trebuie evitată sau obligă la controlul glicemiei și ajustarea dozelor de antidiabetice. În

caz de hipokaliemie (produsă de hidroclorotiazidă) se vor evita med. care prelungesc intervalul Q-T și prezintă risc de torsada vârfurilor (chinidină, disopiramidă, sotalol, amiodaronă, eritromicină, vincamină, terfenadină, astemizol etc.). Prudență în cazul asocierii cu: corticoizi sistemici, tetracosactid, purgative în doze mari, digitalice, metformină, produse iodate de contrast (hipokaliemia crește riscul de IRA).
RA: Relativ frecvent amețeli, cefalee, oboseală și tuse; crampe musculare, greață, hTA ortostatică, impotență, diaree; dureri toracice, palpitații, tahicardie, flatulență, uscăciunea gurii, insomnii sau somnolență, vertij, prurit, rash cutanat, parestezii, dispnee, gută, lombalgii, artralgii, tinitus, infecții urinare; edem angioneurotic, creșteri ușoare a ureei și creatininei serice.

EPHIMIGRIN *COD ATC: N02BA51*
EUROPHARM SA; Cpr. cu 350 mg ac. acetilsalicilic, 230 mg paracetamol, 20 mg cafeină ***(S/OTC)***

Ind: Mialgii, cefalee, nevralgii, dureri postoperatorii, artralgii, febră.
Dz: Int. 1 cpr. la nevoie, max 3-4 cpr./zi.
Cind: Hipersensibilitate, ulcer gastro-duodenal activ, boli hemoragice, IH sau IR severă, deficit de G-6-PDH, copii sub 7 ani. Sarcină și alăptare.
A!: Astm bronșic, hipersensibilitate, copii cu boli febrile acute. Asocierea cu anticoagulante, AINS, inductoare enzimatice. Poate pozitiva testul de control antidoping. Sarcină și alăptare.
RA: Epigastralgii, sângerări digestive, greață, vărsături, diaree, erupții cutanate, edem angioneuronic, crize de astm. Nefrita interstițială, necroza papilară la trat. lungi. Rar, reacție anafilactoidă cu asfixie sau colaps.

EPICOGEL *COD ATC: A02AF02*
E.I.P.I.C.O.; Susp. orală; 100 ml conțin hidroxid de aluminiu gel uscat 8,1 g, hidroxid de magneziu 2 g, dimeticonă 2,5 g; fl. × 125 ml ***(OTC)***

Ind: Ulcer gastric, duodenal, esofagită de reflux, gastrită, hernie hiatală, flatulență, dispepsie.
Dz: 1-2 lingurițe de 4 ori/zi după mesele principale și înainte de culcare.

EPIRAX *COD ATC: N05BAN1*
E.I.P.I.C.O.; Dj. cu clordiazepoxid 5 mg; bromură de clidinium 2,5 mg ***(P-RF)***

Ind: Ulcer gastric și duodenal, grastroduodenite, hipersecreție și hipermotilitate a tractului digestiv, dispepsie, diskinezie biliară, colon spastic sau iritabil, colite, diaree, spasm și diskinezie ureterală, vezică urinară iritabilă, enurezis, dismenoree.
Dz: 3-4 cpr./zi înaintea meselor și la culcare. Enurezis: *copii sub 11 ani* – 1 cpr. seara, 6 săpt.; *copii peste 11 ani* – 2 cpr. seara, 6 săpt.
Cind: Glaucom, adenom de prostată, stază gastrică, hipomotilitate digestivă.
RA: Uscăciunea gurii, constipație, tulburări de micțiune, creșterea presiunii oculare.

EQUITON *COD ATC: S01ED51*
BRUSCHETTINI; Sol. oft.; 100 ml conțin 0,5 g maleat de timolol și 1 g clorhidrat de pilocarpină; fl. × 5 ml ***(P-6L)***

Ind: Reducerea tensiunii intraoculare crescute la pacienții cu HT oculară, glaucom cronic cu unghi deschis, glaucom cu unghi închis și glaucom secundar, la care tensiunea intraoculară nu poate fi menținută în limite normale prin monoterapie cu un beta-blocant sau cu pilocarpină.
Dz: O picătură instilată în sacul conjunctival al ochiului afectat de 2 ori/zi (la intervale de 12 ore).
Cind: Hipersensibilitate la timolol, pilocarpină sau la oricare din componentele produsului. Astm bronșic sau antecedente de astm bronșic, BOC severă. Bradicardie sinusală, BAV de gradul II-III, IC inadecvat controlată prin tratament, șoc cardiogen. Iridociclite sau alte afecțiuni oftalmologice care pot fi agravate prin mioză. Cind asocierea cu floctafenina și sultoprida.
A!: În cazul absorbției sistemice, pot să apară RA specifice beta-blocantelor. La pacienții cu afecțiuni cardiace severe în antecedente sau IC, se recomandă supraveghere atentă. Pacienții tratați concomitent cu beta-blocante adm. sistemic trebuie atent supravegheați pentru a evidenția eventualele efecte aditive oculare sau sistemice. Produsul conține clorură de benzalconiu care se poate depune în lentilele de contact moi, de aceea nu se adm. în timpul folosirii acestora. La pacienții cu antecedente de reacții anafilactice severe, în special la substanțe de contrast iodate, precum și la cei aflați sub tratament de desensibilizare, adm. beta-blocantelor poate constitui un factor agravant; de asemenea, în tratamentul unor eventuale reacții anafilactice, efectul adrenalinei poate fi antagonizat de timolol. La pacienții cu psoriazis trebuie să se aibă în vedere că au fost semnalate cazuri de agravare a bolii în timpul adm. timololului. La pacienții cu feocromocitom, înaintea adm. beta-blocantului trebuie instituit tratament alfa-blocant, pentru a preveni riscul creșterii TA. La diabetici, se recomandă supravegherea glicemiei; anumite semne și simptome care pot anunța o reacție hipoglicemică (de ex. tahicardie, palpitații, transpirații) pot fi mascate de beta-blocant. Sportivii trebuie atenționați că beta-blocantele sunt cuprinse în lista substanțelor dopante. Se recomandă supraveghere oftalmologică în cazul asocierii cu topice oftalmice care conțin adrenalină, datorită riscului de midriază. Deși absorbția sistemică după instilarea în sacul conjunctival este slabă, nu poate fi exclusă apariția interacțiunilor descrise pentru beta-blocantele adm. sistemic. Prudență la pacienții care primesc concomitent amiodaronă, anestezice generale halogenate, blocante ale canalelor de calciu, antiaritmice din clasa I, baclofen, clonidină, insulină, sulfamide hipoglicemiante, lidocaină și substanțe de contrast iodate. Șoferi și activități de precizie.
RA: *Datorate timololului: Tulburări la nivelul organelor de simț:* iritație oculară, senzație de arsură sau de înțepături oculare, conjunctivite, blefarite, keratite, scăderea sensibilității corneene și uscăciune oculară; tulburări vizuale, incluzând modificări de refracție, diplopie, ptoză palpebrală, detașarea coroidei la pacienții operați anterior pentru glaucom; tinitus. *Tulburări cardiovasculare:* bradicardie, aritmii, hTA, sincopă, BAV, accident vascular cerebral, ischemie cerebrală, IC congestivă, sincopă, edeme, claudicații intermitente, fenomene Raynaud, extremități reci. *Tulburări respiratorii:* bronhospasm, insuficiență respiratorie, dispnee, tuse. *RA dermatologice:* alopecie, rash psoriaziform sau exacerbarea psoriazisului. *Reacții de hipersensibilitate:* edem angioneurotic, urticarie, rash localizat sau generalizat. *Tulburări neuropsihice:* cefalee, astenie, stare de oboseală, vertij, depresie, insomnie, amnezie, accentuarea semnelor și simptomelor la pacienții cu miastenia gravis, parestezii. *Tulburări digestive:* greață,

diaree, uscăciunea gurii. *Tulburări urogenitale:* scăderea libidoului, boală Peyronie. *Datorate pilocarpinei. Tulburări oculare*: spasm ciliar, hiperemie conjunctivală, lăcrimare, cefalee temporală sau supraorbitală, mioză, miopie secundară, dificultăți de acomodare la întuneric, dezlipire de retină. *RA sistemice*: rareori HTA, tahicardie, bronhospasm, EP, sialoree, transpirație, greață, vărsături, diaree.

ERYFLUID *COD ATC: D10AF52*
LAB. PIERRE FABRE; Sol. ext. 4% eritromicină bază; fl. × 30 ml sau 100 ml ***(P-6L)***

Ind: Trat. infecțiilor cutanate cu microorganisme sensibile: Streptoc, Staphylococcus aureus (numeroase tulpini sunt rezistente), Streptococcus pyogenes, Chlamydia trachomatis, Campylobacter fetus jejuni.
Dz: În aplicații locale, de 2 ori/zi (după spălarea și uscarea zonei de piele interesată).
Cind: Hipersensibilitate la antibioticele din clasa macrolidelor sau la oricare excipient al produsului.
A!: Prudență în astm bronșic; sarcină și alăptare.
RA: Suprainfecție cu microorganisme rezistente la eritromicină, reacții alergice.

ESOGAST *COD ATC: A02AD01*
FABIOL SA; Cpr. pt. supt × 15 cpr.; 1 cpr. conține hidroxid de aluminiu 0,4 g, carbonat de magneziu 0,15 g, anacardium D4 0,2 g, assa foetida D4 0,2 g, colagen 0,15 g, alginat de sodiu 0,1 g ***(OTC)***

Ind: Boală de reflux gastroesofagian în toate fazele, gastrită hiperacidă, gastroduodenită, tulburări dispeptice, aerofagie, agresiune gastroduodenală a antiinflamatoarelor nesteroidiene, colon iritabil.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componenții produsului. Abdomen acut chirurgical, gastrită hipoacidă, complicațiile ulcerului gastroduodenal (hemoragie, perforație).
Dz: Doza recomandată este de un comprimat pentru supt de 2-4 ori pe zi, la o oră și la 3 ore după masă sau la nevoie.
A!: Comprimatele nu se înghit, ele trebuie lăsate să se dizolve în cavitatea bucală. Hidroxidul de aluminiu și carbonatul de magneziu scad absorbția digestivă a antihistaminicelor H2, beta-blocantelor, tetraciclinelor, digoxinei, difosfonaților, sărurilor de fier, fluorochinolonelor, fluorurilor de sodiu, prednisonului, dexametazonei, indometacinului, ketoconazolului, lansoprazolului, neurolepticelor fenotiazinice, fosfaților, tiroxinei, etambutolului, izoniazidei, lincosamidelor. Va fi administrat la distanță de aceste medicamente (cel puțin 2 ore).
RA: Apar foarte rar și sunt ușoare, frecvent neglijabile. Hidroxidul de aluminiu poate produce greață, vărsături, constipație. Carbonatul de magneziu poate determina o acumulare de magneziu la bolnavii cu insuficiență renală gravă. Nu au fost semnalate reacții adverse la ceilalți componenți ai produsului.

ESSAVEN *COD ATC: C05BA53*
RHÔNE POULENC RORER/NATTERMANN; Gel; 100 g conțin heparină sodică 10000 UI, aescină 1 g și fosfolipide esențiale 1 g; tub × 40 g ***(P-6L)***

Ind: Tromboze, tromboflebite, flebite după injecții paravenoase, sindrom posttrombotic, varice, ulcer de gambă, hemoroizi, traumatisme cu hematoame, contuzii, bursite, tenosinovite.
Dz: Aplicații locale de mai multe ori pe zi.

ESSENTIALE-FORTE N *COD ATC: A05BAN2*
RHÔNE-POULENC RORER/ NATTERMANN; Cps. cu fosfolipide esențiale 300 mg; vit. B_1 6 mg; vit. B_2 6 mg; vit. B_6 6 mg; vit. B_{12} 6 mg; nicotinamidă 30 mg; vit. E 6 mg ***(OTC)***

Ind: Hepatite acute și cronice; ciroză hepatică; intoxicații; degenerescență grasă a ficatului; colestază; profilaxia recidivelor litiazei biliare; sd. de iradiere; terapia pre- și postoperatorie în chirurgia hepatobiliară.
Dz: 2 cps. de 3 ori/zi sau 3 cps. de 2 ori/zi.

ETA BIOCORTILEN V.C. *COD ATC: S01CA01*
S.I.F.I. SpA; Sol. oft. cu dexametazonă 0,15 g; neomicină 0,32 g; gramicidină 0,005 g; tetrazolină 0,1 g ***(P-RF)***

Ind: Conjunctivite acute, subacute, cronice, foliculare și catarale. Blefarite și blefaroconjunctivite. Dacriocistite. Keratite. Kerato-conjunctivite alergice, flictenulare. Kerato-endotelite. Sclerite și episclerite. Oftalmie simpatică. Inflamații oculare posttraumatice și postoperatorii. Leziuni corneene produse de agenți termici și chimici.
Dz: 1-2 pic. de 3-4 ori/zi în sacul conjunctival.
Cind: Hipersensibilitate. HT intraoculară. Herpex simplex acut și afecțiuni virale ale corneei, kerato-conjunctivite ulcerate. TBC oculară. Micoze oculare. Oftalmii acute purulente, blefarite purulente. Orjelet. Keratite herpetice. Copii sub 3 ani.
A!: Keratite disciforme herpetice, ulcere corneene. Sarcină și alăptare.
RA: Reacții alergice cutanate.

EUCARBON *COD ATC: A06AB56*
F.TRENKA CHEN-PHARM; Cpr. cu 25 mg extr. Rhei, 105 mg fol. Sennae, 180 mg carbo Lignii, 0,5 mg uleiuri volatile ***(OTC)***

Ind: Toate formele de constipație. Colon iritabil, ingestie cu meteorism, fermentație sau putrefacție. Hemoroizi, fisuri anale. Pregătirea preoperatorie și pentru examene radiologice.
Dz: *Adulți:* Diaree: 1 cpr. de 3 ori/zi, după mese. Constipație: 2 cpr. de 3 ori/zi, după mese, cu mult lichid; Examen radiologic de urgență: 6-8 cpr.; *Copii peste 2 ani:* 1/2 -1 cpr., după masă.
Cind: Ulcer, dureri sau obstrucții abdominale de etiologie necunoscută.

EUPADONT *COD ATC: A01AD11*
EUROPHARM SA; Gel dentar; 100 g conțin 1 g ulei volatil de cuișoare, 0,6 g ulei volatil de mentă și 5 g extract de gălbenele în propilenglicol; tub × 15 g ***(OTC)***

Ind: Parodontoză; gingivită; hiperemie pulpară; traumatisme ale mucoasei bucale.
Dz: Se adm. local, la nivelul gingiilor sau mucoasei bucale, de 3-4 ori/zi, în strat subțire, masând ușor regiunea pentru a favoriza absorbția gelului.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului.
AI: Nu se aplică pe afte și leziuni gingivale sângerânde.
RA: În timpul trat. poate să apară hemoragie la nivelul gingiei sau la baza dinților, care dispare relativ rapid.

EUROPIRIN T

COD ATC: N02BA01

EUROPHARM SA; Cpr. 500 mg ***(OTC)***

Ind: Ca analgezic și antipiretic în combaterea durerilor slabe moderate, cefalee, mialgii, dureri reumatice articulare și periarticulare, nevralgii, dureri dentare, dismenoree; combaterea febrei. Ca antiinflamator în: reumatismul articular acut; poliartrita reumatoidă; profilaxia arsurilor solare. Profilaxia în caz de atac ischemic tranzitor, profilaxia tromboembolismului cerebral; profilaxia infarctului miocardic și a tromboembolismului sistemic.
Cind: Hipersensibilitate la acid salicilic, afecțiuni cu risc hemoragic sau duodenal.
Dz: *Adulți:* analgezic și antipiretic – 1 cpr. repetat la nevoie după 4 ore. Antiinflamator – 6-12 cpr./zi, fracționat la 6 ore; antiagregant: $^{1}/_{2}$ cpr. pe zi. *Copii 5-9 ani:* analgezic, antipiretic: $^{1}/_{2}$ cpr. repetând la nevoie de 6 ori pe zi la intervale de 4-8 ore, *Copii 10-16 ani:* analgezic, antipiretic 1 cpr. repetând la nevoie de 6 ori pe zi la intervale de 4-8 ore, în reumatismul poliarticular acut: 85-100 mg/kg și zi (fără a depăși 5 g/zi), fracționat la 4-6 ore timp de 20-30 zile; în continuare se adm. $^{2}/_{3}$ din doza de atac timp de 10-20 zile, apoi $^{1}/_{2}$-$^{1}/_{3}$ timp de alte 30-40 zile.
Ra: Iritație gastrică; reacții alergice, complicații infecțioase; sângerări diverse.

EUROSEPT

COD ATC: R02AA20

EUROPHARM SA.; Cpr. de supt cu 100 mg acid ascorbic, 3 mg ulei volatil de eucalipt, 0,1 mg balsam Tolu, 1 mg beta-caroten ***(OTC)***

Ind: Infecții acute bucofaringiene: angine, trat. postoperator după amigdalectomie. În stomatologie: gingivite, stomatite, parodontoză, extracții dentare. Profilaxia răcelii comune și a gripei.
Dz: *Adulți:* 4-5 cpr./zi, 3-4 zile. *Copii peste 4 ani:* 1-2 cpr./zi.
Cind: Hipersensibilitate.
RA: Iritație locală sau gastrică după adm. excesivă.

EXIGAN®

COD ATC: N05CB02

ARMEDICA SA.; Cpr. cu 80 mg extr. moale de valeriană și 20 mg fenobarbital ***(OTC)***

Ind: Hiperexcitabilitate nervoasă; tulburări ușoare de somn; sindrom neurovegetativ.
Dz: *Sedativ*: 1 cpr. 2-3 ori/zi. Hipnotic: 2-3 cpr. adm. în priză unică, seara cu 1/2 oră înainte de culcare.

Cind: Hipersensibilitate la barbiturice, extract de valeriană și la oricare dintre excipienții produsului; insuficiență respiratorie; insuficiență hepatică; insuficiență renală severă; porfirii; copii. Sarcină și alăptare.
A!: Prudență la vârstnici, deoarece aceștia pot prezenta, ocazional, fenomene de excitație psihomotorie paradoxală, care pot fi însoțite de stare confuzivă. Adm. îndelungată trebuie evitată deoarece poate provoca tulburări de somn. Ca și alte barbiturice, fenobarbitalul adm. timp îndelungat prezintă risc de dependență. La bolnavii cu porfirie, barbituricele pot activa boala, pot declanșa crize severe în porfiria acută intermitentă și pot induce porfiria cutanată tardivă. În cazul apariției dependenței, toleranța este încrucișată pentru barbiturice, alte hipnotice, alcool etilic, anestezice generale și, în mai mică măsură, pentru anxiolitice. Se recomandă evitarea asocierii cu alcoolul sau cu alte deprimante centrale, deoarece efectele sunt aditive. Asocierea cu anticoagulantele cumarinice determină diminuarea eficacității dozelor utilizate; după oprirea administrării barbituricelor, concentrația plasmatică a anticoagulantelor crește, cu risc de accidente hemoragice (este necesar controlul activității protrombinice și ajustarea dozelor de anticoagulant). Barbituricele pot să scadă, de asemenea, eficacitatea contraceptivelor orale, antidepresivelor triciclice, unor glucocorticoizi, chinidinei, doxiciclinei, ciclosporinei, teofilinei, acidului folic, acidului valproic, digitoxinei, beta-blocantelor, carbamazepinei, fenitoinei. Șoferi și activități de precizie.
RA: Ocazional, se produc fenomene de excitație psihomotorie paradoxală, care pot fi însoțite de stare confuzivă; acestea sunt mai frecvente la bătrâni, la debilitați și în prezența durerii. Alte reacții adverse: stare ebrioasă, incoordonare motorie (mai ales la bătrâni), vertij, cefalee, polialgii. Reacțiile alergice (edeme și erupții cutanate) sunt favorizate de terenul atopic. Dependența fizică apare în cazul tratamentului îndelungat sau utilizării unor doze mari. Manifestările sindromului de abstinență constau în modificări electroencefalografice, nervozitate, agitație, insomnie, tremor și, în cazurile grave, delir și convulsii.

EXTRASEDYL *COD ATC: N05CB02*
LAROPHARM SRL.; Cpr. cu 80 mg extract moale de valeriană, 30 mg extract uscat de Crategus sp. și 20 mg fenobarbital ***(OTC)***

Ind: Hiperexcitabilitate nervoasă, insomnii, tulburări neuro-vegetative, HTA, hipertiroidie.
Dz: 2-3 cpr./zi.
Cind: IH și IR grave, copii.

EXTRAVERAL *COD ATC: N05CB02*
SICOMED SA; Cpr. cu extract moale de valeriană 80 mg și fenobarbital 20 mg ***(OTC)***

Ind: Hiperexcitabilitate nervoasă, insomnii, tulburări neuro-vegetative, HTA, hipertiroidie.
Dz: 2-3 cpr./zi.
Cind: IH și IR grave, copii.

F

FARAGEL FORTE *COD ATC: M02AX10*
FARAN LAB.; Gel ***(OTC)***

Ind: În forme acute de artralgii, mialgii, entorse și luxații, inflamații ale sistemului osos și muscular, osteite și miozite. Aplicat în strat subțire pe piept, gât, umeri, are o acțiune puternic decongestivă la nivelul sinusurilor și al căilor respiratorii superioare.
Dz: Aplicații locale în strat subțire de 3-4 ori pe zi, pe locul dureros.
Cind: Copii în primele luni de viață, aplicarea la nivelul mucoaselor și în zone ale pielii ce prezintă ulcerații.
A!: Se evită în cazul pacienților alergici la camfor.

FARCOVIT-B_{12} *COD ATC: A05BAN2*
PHARCO PHARM.; Cps. cu fosfolipide esențiale 10 mg, vit. B_1 2 mg, vit. B_2 1 mg, vit. B_6 2 mg, vit. B_{12} 10 µg, extract de cynara 50 mg, pantotenat de calciu 5 mg, nicotinamidă 10 mg, inositol 50 mg, ac. orotic 20 mg, ac folic 0,5 mg, biotină 0,1 mg ***(OTC)***

Ind: Tulburări hepatice din: intoxicații, hepatite infecțioase, parazitism intestinal, alcoolism cronic; tulburări metabolice: diabet, hipotiroidism, tireotoxicoză, sarcină, kwashiorkor; ca adjuvant în: HTA, ATS, obezitate, boli de piele.
Dz: 1-2 cps. de 3 ori/zi

FAREBIL *COD ATC: A05AXN2*
FARES SA ORĂȘTIE; Sol. orală cu cineol, borneol, ulei volatil de mentă; fl. × 10 ml ***(OTC)***

Ind: Colangită, colecistită, colelitiază, sindrom postcolecistectomie, pancreatită cronică, hiperbilirubinemie juvenilă, spasme și dischinezii ale căilor biliare. Profilaxia litiazei biliare.
Dz: 3-5 picături/zi, cu 15-20 minute înaintea mesei. Se pot adm. pe o bucată de zahăr. În colici sau dureri intense: 20-40 picături o dată. *Copii între 6-14 ani:* 1-2 picături de 3-4 ori/zi.

FASCONAL "M" *COD ATC: N02BA71*
SICOMED SA; Cpr. cu ac acetilsalicilic 200 mg, paracetamol 200 mg, cofeină 25 mg, codeină (fosfat) 10 mg, fenobarbital 25 mg ***(OTC)***

Ind: Cefalee, nevralgii, mialgii, febră, gripă.
Dz: 1 cpr. la nevoie, 3-5 cpr./zi. *Copii sub 3 ani.* Sarcină și alăptare.
Cind: Alergie sau intoleranță la una din componente, intoleranță gastrică, porfirii hepatice.
A!: Prudență la renali, hepatici, anemici, în stări hemoragice și în condiții de hipoxie. Prudență la asocierea cu anticoagulante cumarinice și cu sulfamide

hipoglicemiante. Codeina figurează pe lista substanțelor dopante (interzise la sportivi).
RA: Erupții cutanate alergice, fenomene de iritație a mucoasei gastrice și microhemoragii; rar, trombocitopenie, anemie, agranulocitoză, leziuni renale, necroză hepatică; constipație, rareori dependență.

FASCONAL P *COD ATC: N02BA51*

ARMEDICA; Cpr. cu ac acetilsalicilic 200 mg, paracetamol 200 mg, cafeină 25 mg, codeină fosfat 10 mg, fenobarbital 25 mg ***(S/OTC)***

Ind: Cefalee, nevralgii, mialgii, febră, gripă.
Dz: *Adulți:* 1 cpr. la nevoie; 3-5 cpr. pe zi. *Copii:* 1/4-1/2 cpr. de 1-3 ori/zi.
Cind: Alergie, intoleranță gastrică, porfirii hepatice. Copii sub 3 ani. Sarcină și alăptare.
A!: Afecțiuni renale, hepatice, anemie, hemogragii și în condiții de hipoxie. Asocierea cu anticoagulante cumarinice și cu sulfamide hipogliceminate. Codeina figurează pe lista substanțelor dopante.
RA: Iritația mucoasei digestive și microhemoragii, erupții cutanate alergice, rareori anemie și agranulocitoză. Dozele mari pot produce: palpitații, insomnie și tremor, prin cafeină; constipație, rareori dependență, prin codeină; ușoară somnolență prin fenobarbital.

FASCOREM *COD ATC: N02BA71*

LAB. REMEDIA SRL; Cpr. cu acid acetilsalicilic 200 mg, paracetamol 200 mg, cafeină anhidră 25 mg, fenobarbital 25 mg și fosfat de codeină hemihidrat 10 mg ***(OTC)***

Ind: Trat. durerilor de intensitate medie sau severă cu diferite localizări: cefalee, migrene, nevralgii, mialgii, artralgii, algii dentare sau în sfera ORL, dismenoree; stări febrile.
Dz: *Adulți și copii peste 15 ani:* 1 cpr. la nevoie; doza se poate repeta la 4-6 ore, max. 4 cpr./zi. *Vârstnici:* inițial se adm. 1 cpr., crescând, eventual, în funcție de toleranță și necesități. IR: se recomandă adm. unor doze mai mici decât cele uzuale la adulți.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului; copii sub 15 ani; IH; IR severă; ulcer gastro-duodenal activ; hemoragie digestivă; boli hemoragice și alte boli cu risc hemoragic; deficit de G-6-PD; astm bronșic și insuficiență respiratorie; porfirie; sarcină și alăptare.
A!: La pacienții cu astm bronșic și alte afecțiuni alergice respiratorii, ca și la cei cu hipersensibilitate la AINS pot fi declanșate crize de astm bronșic și alte reacții alergice de tip anafilactic. Prudență în caz de antecedente de ulcer sau de hemoragii digestive, în IR și IH ușoare-moderate. Prudență la pacienții supuși intervențiilor chirurgicale, chiar minore (extracții dentare), deoarece există riscul de accidente hemoragice. Reacție pozitivă la testele antidoping. Șoferi și activități de precizie.
RA: *Gastrointestinale:* greață, vărsături, hemoragii digestive acute grave sau oculte și ulcerații gastrointestinale, constipație. *Hematologice:* epistaxis, gingivoragii, trombocitopenie. *Hepatice:* hepatotoxicitate; creșterea transaminazelor și fosfatazei alcaline. *Reacții alergice:* erupții cutanate, urticarie, edem angioneurotic, crize de astm bronșic. *Neuropsihice:* în doze mari provoacă cefalee,

amețeli, tinitus, somnolență sau excitație, confuzie, insomnie, neliniște, palpitații. *Renale:* trat. prelungit poate determina nefrită interstițială și necroză papilară.

FAST *COD ATC: D06C*
MEDOCHEMIE Ltd.; Pulb. cu 250 UI bacitracină zinc și 5 mg sulfat de neomicină; fl. × 10 g ***(P-RF)***

Ind: Tratamentul infecțiilor pielii, cauzate de germeni sensibil la substanțele conținute în produs.
Dz: Este folosit numai pe suprafața pielii și nu trebuie utilizat în apropierea ochilor. Înainte de a aplica pulberea, se curăță cu grijă suprafața pielii. Se înlătură cu grijă puroiul sau crustele existente. Apoi, se aplică un strat foarte subțire de pulbere pe pielea afectată de 3 ori/zi.
Cind: Alergie la neomicină sau bacitracină. Afecțiuni renale. Surditate de orice grad. Sarcina și alăptarea.
A!: Trat. nu trebuie să depășească 4 săptămâni. Nu se va adm. la copiii foarte mici. Dacă se utilizează la copii, se va aplica un strat foarte subțire.
RA: Prurit, eritem cutanat cu scuame, edem al feței, buzelor, limbii, wheezing, greutate în respirație, surditate.

FEMODEN (FEMOVAR) *COD ATC: G03AA10*
SCHERING-PLOUGH EUROPE AG; Dj. cu gestoden 0,075 mg și etinilestradiol 0,03 mg ***(P-6L)***

Ind: Contracepția orală.
Dz: 1 dj./zi din prima zi a menstruației, 21 zile, pauză de 7 zile.
Cind: Tulburări hepatice, sindrom Dubin-Johnson și Rotor, tumori hepatice, procese tromboembolice, DZ cu modificări vasculare, carcinom mamar și uterin, tulburări ale metabolismului lipidic, forme grave de hipertonie, herpes de sarcină (în antecedente), otoscleroză. Sarcină și alăptare.
A!: Migrenă, modificări bruște de percepție vizuală sau auditivă, simptome incipiente de tromboflebită sau tromboembolie, senzație de durere sau greutate toracică, operații planificate (cu 6 săpt. înainte), imobilizare (după accidente), hepatită mecanică, prurit generalizat, creșterea frecvenței crizelor epileptice, creșterea marcată a tensiunii arteriale. Fumătoare. Asocierea cu barbiturice, hidantoină, fenilbutazonă, ampicilină, rifampicină, unele antiepileptice, care pot reduce efectul contraceptiv.
RA: Tensiune mamară, greață, cefalee.

FEMOSTON® CONTI 1/5 *COD ATC: G03FB08*
SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.; Cpr. film. cu 1 mg estradiol + 5 mg didrogesteron ***(P-6L)***

Ind: Terapie de substituție hormonală la femei cu tulb. datorate menopauzei naturale sau induse chirurgical. Profilaxia osteoporozei post-menopauză la femei cu uter intact care prezintă risc de fracturi.
Dz: 1 cpr./zi, med. se adm. fără întrerupere. Se adm. la pacientele care au avut ultima menstruație cu mai mult de 12 luni în urmă, iar în cazul menopauzei induse chirurgical, adm. se face imediat după intervenția chirurgicală.

Cind: Carcinom mamar cunoscut/suspectat, carcinom endometrial sau alte neoplazii hormono-dependente. Boală hepatică acută sau cronică. Antecedente de boală hepatică la care testele funcționale hepatice nu s-au normalizat. Sângerări vaginale nediagnosticate. Antecedente de TEV recurent sau boală trombofilică netratată cu anticoagulante. Hipersensibilitate la unul din componenții produsului.

A!: Înainte de inițierea tratamentului de substituție hormonală se vor efectua: examen fizic, cu palparea sânilor și a abdomenului, examen ginecologic. Este necesară cunoașterea antecedentelor personale patologice și a celor heredocolaterale, cu referire specială la HTA. Pacientele care au fost tratate anterior numai cu estrogeni trebuie investigate cu deosebită atenție pentru depistarea posibilei hiperstimulări endometriale înainte de începerea trat. Se recomandă efectuarea mamogramei la intervale regulate (1-2 ani). Sângerările inițiale după începerea trat. sau anomaliile depistate la examenul ginecologic sunt argumente pentru evaluarea stării endometrului. Se va lua în considerare întreruperea trat. în caz de traumatism, o boală sau urgență chirurgicală cu risc de tromboză. Precauție la pacientele cu istoric de tromboză venoasă profundă, afecțiuni tromboembolice sau accidente vasculare cerebrale. Pacientele cu epilepsie, migrenă, IC, HTA, porfirie, hemoglobinopatii sau otoscleroză trebuie monitorizate în timpul trat. O atenție deosebită se va acorda pacientelor cu leiomiom uterin sau cu endometrioză, deoarece estrogenii pot fi factori agravanți. Precauții la asocierea cu barbiturice, fenitoină, rifampicină, carbamazepină, felbamat, topiramat.

RA: Greață, cefalee, coree sau edeme, de obicei trecătoare. Sângerări de privație, pete, dismenoree, sindrom de tip premenstrual, accentuarea fibromatozei uterine, candidoza vaginală. Uneori reacții cutanate (cloasmă sau melasmă).

FEMOSTON conti 1/5 *COD ATC: G03FA14*
SOLVAY PHARMACEUTICALS Cpr. film. 1/5 estradiol + didrogesteron ***(P-6L)***

FEMOSTON 2/10 *COD ATC: G03FB08*
SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.; Cpr. film.; cele portocalii cu estradiol 2 mg și cele galbene cu 2 mg estradiol + 10 mg didrogesteron ***(P-6L)***

Ind: Terapie de substituție hormonală la femei cu tulb. datorate menopauzei naturale sau induse chirurgical.

Dz: Zilnic, 1 cpr. cu 2 mg estradiol în primele 14 zile ale ciclului și un cpr. cu 2 mg estradiol + 10 mg didrogesteron în ultimele 14 zile ale ciclului de 28 zile. Următorul ciclu de trat. se va începe imediat după un ciclu de 28 zile. Pacientele vor lua zilnic un cpr. în ordinea indicată pe blister. Medicamentul trebuie adm. fără întrerupere. Dacă pacienta mai prezintă menstruație, se recomandă începerea trat. în prima zi a ciclului (prima zi de sângerare). Dacă pacienta are rar menstruație, se recomandă începerea trat. după 10-14 zile de monoterapie cu un progestativ. La pacientele care au avut ultima menstruație cu mai mult de 12 luni în urmă, trat. poate fi început oricând.

Cind: Carcinom mamar cunoscut/suspectat, carcinom endometrial sau alte neoplazii hormono-dependente. Boală hepatică acută sau cronică. Antecedente de boală hepatică, dacă testele funcționale hepatice nu s-au normalizat. Sângerări genitale anormale de etiologie necunoscută. Sarcină existentă sau suspectată. Hipersensibilitate la unul din componenții produsului.

A!: Înainte de inițierea tratamentului de substituție hormonală se vor efectua:

examen fizic, cu palparea sânilor și a abdomenului, examen ginecologic. Este necesară cunoașterea antecedentelor personale patologice și a celor heredocolaterale, cu referire specială la HTA. Pacientele care au fost tratate anterior numai cu estrogeni trebuie investigate cu deosebită atenție pentru depistarea posibilei hiperstimulări endometriale înaintea de începerea trat. Ca o regulă generală, trat. de substituție hormonală nu trebuie prelungit peste un an. Se recomandă efectuarea mamogramei la intervale regulate (1-2 ani). Sângerările inițiale după începerea trat. sau anomaliile depistate la examenul ginecologic sunt argumente pentru evaluarea stării endometrului. Pacientele în perioada de instalare a menopauzei sunt sfătuite să utilizeze măsuri contraceptive non-hormonale. Se va lua în considerare întreruperea trat. în caz de traumatism, o boală sau urgență chirurgicală cu risc de tromboză. Precauție la pacientele cu istoric de tromboză venoasă profundă, afecțiuni tromboembolice sau accidente vasculare cerebrale. Pacientele cu epilepsie, migrenă, IC, HTA, porfirie, hemoglobinopatii sau otoscleroză trebuie monitorizate în timpul trat. O atenție deosebită se va acorda pacientelor cu leiomiom uterin sau cu endometrioză (chiar în antecedente). Precauții la asocierea cu barbiturice, fenitoină, rifampicină, carbamazepină.

RA: În primele luni de trat. poate apărea o sensibilitate crescută a sânilor; rar greață, cefalee sau edeme, de obicei trecătoare. La începutul trat. pot să apară sângerări. Uneori reacții cutanate.

FENIGIN B *COD ATC: G01AXN1*

PHARCO PHARMACEUTICALS; Pulb. cu laurilsulfat de sodiu 63 mg, simeticonă 15 mg, fosfat de sodiu 500 mg; plic × 2,4 g ***(OTC)***

Ind: Vaginite; igiena vaginului; reducerea hiperacidității secrețiilor vaginale.
Dz: 1-2 pliculețe într-un litru de apă caldă pentru spălături vaginale o dată/zi.
Cind: Hipersensibilitate.
RA: Iritație locală ușoară.

FENILBUTAZONĂ *COD ATC: M02AAN1*

HYPERION SA; Cremă cu 4% fenilbutazonă, 3% camfor, 1% mentol și 2% cloroform; tub × 40 g ***(OTC)***

Ind: Trat. simptomatic, de scurtă durată al puseelor acute de reumatism abarticular (periartrită scapulohumerală, tendinite, bursite), în traumatisme (contuzii, entorse, luxații, rupturi musculare).
Dz: Se aplică local numai pe tegumente integre, de 2-3 ori/zi, masând ușor zona afectată.
Cind: Alergie la fenilbutazonă și alți compuși derivați de pirazolonă (fenazonă, aminofenazonă, metamizol). Hipersensibilitate de tip idiosincrazic la acidul acetilsalicilic și la AINS.
AI: Crema nu se aplică pe mucoase sau pe plăgi. Acest produs conține un derivat de pirazolonă, care poate determina reacții hematologice grave, uneori mortale (agranulocitoza). Apariția febrei, anginei, hemoragiilor cutanate spontane, care semnalează posibilitatea agranulocitozei, impune oprirea imediată a trat. și verificarea formulei sanguine. Se recomandă numărarea leucocitelor, trombocitelor și eritrocitelor atât înaintea cât și în cursul tratamen-

tului cronic (la intervale de 2-4 săptămâni). În cazul scăderii numărului de leucocite, trombocite sau eritrocite se întrerupe trat. Apariția oricăror reacții alergice în timpul trat. obligă la întreruperea acestuia și interzice adm. ulterioară de fenilbutazonă și alți derivați pirazolonici.

RA: În cazul aplicării pe suprafețe întinse, tegumente lezate, pot să apară RA sistemice. *Cutanate:* erupții, prurit, senzație de arsură, urticarie, purpură, fotosensibilizare, eritem nodos, eritem polimorf. *Cardiovasculare:* rareori edeme, HTA, ICC. *Gastro-intestinale:* greață, vărsături, epigastralgii, fenomene de gastrită, dureri abdominale, diaree. *Reacții de hipersensibilitate:* rareori reacții anafilactice, edem Quincke, dispnee și agravarea astmului, vasculite. *Neuropsihice:* rareori cefalee, somnolență, vertij, tulburări vizuale, tinitus. *Hematologice:* rareori anemie, trombocitopenie, neutropenie. *Hepatice:* rareori creșterea transaminazelor, hepatită, uneori cu icter. *Renale:* frecvent retenție hidrică, uneori cu edeme; rareori hematurie, proteinurie, sindrom nefrotic, nefrită interstițială, IRA, anurie. *Endocrine:* rareori hipotiroidie și gușă.

FERRETAB *COD ATC: B03AD02*
LANNACHER; Cps. cu Fe(II)-fumarat 50 mg fer și 0,5 mg ac. folic ***(P-6L)***

Ind: Prevenirea carenței de fer și ac. folic în timpul sarcinii.

Dz: Întreținere: 1 cps./zi; anemii sau carențe de ac. folic: 2-3 cps./zi.

Cind: Intoleranță la ac. folic, anemie aplastică, hemolitică, hemosideroză, anemie sideroplastică, saturnină, talasemie, anemie pernicioasă.

A!: Tetraciclina, antiacidele și colestiramina blochează absorbția ferului. Anemie pernicioasă.

RA: Rar fenomene de intoleranță digestivă, vomă.

FERRO-FOLGAMMA® *COD ATC: B03AE10*
WORWAG PHARMA GmbH & Co.; Cps. moi cu sulfat feros 112,6 mg, acid folic 5 mg, vit. B_{12} 0,01 mg ***(P-6L)***

Ind: Anemii feriprive secundare unor hemoragii cronice (gastrice, intestinale, urinare, uterine, naștere, hemoroizi), unor sindroame de malabsorbie (boală celiacă, rezecții intestinale), hemodializei cronice; aport alimentar insuficient; anemii asociate alcoolismului (deficit predominant de acid folic); anemie megaloblastică asociată trat. cu anticonvulsivante și contraceptive orale; anemie megaloblastică prin deficit de folați; tratamentul anemiei feriprive și profilaxia anemiei megaloblastice din sarcină; suplimentarea aportului nutrițional în perioada de alăptare.

Dz: 1-2 cps. moi de 3 ori/zi. Durata terapiei depinde de evoluția bolii.

Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului. Valori crescute ale ferului (hemocromatoze, hemolize cronice, talasemii). Afecțiuni determinate de tulburări de utilizare ale fierului (anemii sideroacrestice, anemii datorate unor intoxicații cu plumb). Pacienți care primesc transfuzii repetate de sânge. Anemia pernicioasă Biermer. Trat. parenteral concomitent cu fer. Copii sub 5 ani.

A!: Este necesar un diagnostic clinic corect și complet înaintea adm. produsului, deoarece în cazul anemiei pernicioase Biermer se poate obține remisie hematologică, însă leziunile neurologice progresează ireversibil. Hiposideremia asociată sindroamelor inflamatorii cronice nu este influențată de tratamentul cu fer; tratamentul cu fer se poate asocia, dacă este posibil, tratamentului etiologic. Scăderea absorbției acidului folic poate fi determinată de adm. de primidonă, difenilhidantoină, fenobarbital, carbamazepină, valproat, sulfasalazină, contraceptive orale sau prin adm. de antagoniști ai acidului folic (metrotrexat, trimetoprim, pirimetamină și triamteren). Nu trebuie adm. cu antiacide, suplimente de calciu (calciu carbonat sau fosfat), ceai, cafea, ouă, alimente sau medicamente care conțin bicarbonați, carbonați, oxalați sau fosfați, lapte sau preparate de lapte, cereale, deoarece acestea scad absorbția fierului. Prep. cu fier se vor adm. cu o oră înainte sau la 2 ore după îngestia acestora.

RA: *Ferul:* produce tulburări gastro-intestinale: greață, diaree/constipație. În cazuri izolate pot apărea reacții alergice. Colorează materiile fecale în gri-negru. *Acid folic:* În cazul adm. unor doze foarte mari se pot produce, rar, tulburări gastro-intestinale, reacții alergice, tulburări de somn, iritabilitate și depresii. *Vitamina B_{12}:* Cazuri izolate de acnee, reacții de hipersensibilitate de tip urticarie sau eczeme.

FERROGRAD-C *COD ATC: B03AE10*

ABBOTT LAB. Ltd.; Cpr. film. cu sulfat feros 325 mg și vit. C 500 mg ***(P-6L)***

Ind: Prevenirea deficiențelor de fer și vit. C în perioada de creștere, la bătrâni, la gravide, în timpul lactației și în timpul menstruației, în boli febrile, arsuri, fracturi, traumatisme, intervenții chirurgicale, convalescență, stări toxice, sângerări, boli parazitare, în timpul creșterii ratei metabolismului, stresului fizic și mental.

Dz: 1-2 cpr. de 3 ori/zi.

FERROZINC C

PHARCO PHARMACEUTICALS; Cps. gelatinoase moi conținând sulfat feros 16,333 mg, sulfat de zinc 15 mg, vitamina C 24 mg; ct. × 24 cps. gelatinoase moi ***(OTC)***

Ind: Pentru prevenirea deficiențelor de fier, zinc și vitamina C la copii, pentru procesul de creștere normală și sănătoasă a copiilor și adolescenților, ca supliment alimentar la copii cu regim dietetic/restrictiv; pentru compensarea nevoilor crescute de fier, zinc, vitamina C în timpul bolilor febrile, arsurilor, fracturilor osoase, traumatismelor, intervențiilor chirurgicale, convalescenței, stărilor toxice, sângerărilor, bolilor parazitare, în timpul creșterii ratei metabolismului, stresului fizic și mental.

Dz: 1-2 capsule de 3 ori pe zi, după mese.

FERVEX, FERVEX „SANS SUCRE“ *COD ATC: N02BE51*

UPSA CONSEIL; Gran. susp.; un plic conține paracetamol 500 mg + maleat de feniramină 25 mg + vit. C 200 mg ***(OTC)***

Ind: Trat. simpt. afecțiunilor ORL: guturai, rinite alergice, rinofaringite, stări pseudogripale.

Dz: *Adulți (peste 15 ani)*: 1 plic de 2-3 ori/zi. Intervalul între 2 adm. trebuie să fie de minim 4 ore. În IR severă, intervalul între adm. trebuie să fie de minim 8 ore. Med. se va adm. cu o cantitate suficientă de apă rece.
Cind: Hipersensibilitate la unul dintre constituenți; insuficiență hepatocelulară; glaucom cu unghi închis; adenom de prostată; copii sub 15 ani.
A!: Consumul de alcool sau sedative (barbiturice) poate accentua efectul sedativ al produsului. Funcția renală trebuie monitorizată în caz de tratamente prelungite. Nu se recomandă utilizarea la pacienții cu intoleranță la glucoză, fructoză, galactoză sau cu sindroame de malabsorbție (la aceștia se adm. *FERVEX "sans sucre"*). Creșterea efectelor atropinice poate fi luată în considerare în cazul asocierii cu alte medicamente parasimpatolitice. Soferi și activități de precizie.
RA: Efecte atropinice: uscăciunea gurii, tulburări de acomodare, retenție de urină, excitație sau confuzie la vârstnici. Reacții adverse legate de paracetamol: rar, alergie cu rash tegumentar, eritem și urticarie; trombocitopenie.

FERVEX "ENFANT" *COD ATC: N02BE51*
UPSA CONSEIL; Gran. susp.; un plic conține paracetamol 280 mg + maleat de feniramină 10 mg + vit. C 100 mg ***(OTC)***

Ind: Trat. simptomatic al febrei și obstrucției nazale în rinofaringite acute la copii.
Dz: *Copii 6-10 ani*: 1 plic de 2 ori/zi. *Copii 10-12 ani*: 1 plic de 3 ori/zi. *Copii 12-15 ani*: 1 plic de 4 ori/zi. Intervalul între 2 adm. este de minim 4 ore. Medicamentul se va adm. cu o cantitate suficientă de apă rece.
Cind: Hipersensibilitate la unul dintre constituenți; IH; copii sub 6 ani; fenilcetonurie.
A!: Nu se recomandă utilizarea la pacienții cu intoleranță la glucoză, fructoză, galactoză sau cu sindroame de malabsorbție. Potențează efectele alcoolului, sedativelor și substanțelor deprimante SNC. Creșterea efectelor atropinice poate fi luată în considerare în cazul asocierii cu alte medicamente parasimpatolitice.
RA: Efecte atropinice: uscăciunea gurii, tulburări de acomodare, retenție de urină, excitație sau confuzie la vârstnici. Reacții adverse legate de paracetamol: rar, alergie cu rash tegumentar, eritem și urticarie; trombocitopenie.

FESTAL N® *COD ATC: A09AA02*
HOECHST MARION ROUSSEL· Dj. gastrorez. cu 192,00 mg pancreatină ***(OTC)***

Ind: Tulburări digestive prin deteriorarea funcției pancreatice.
Dz: 2-3 dj. la fiecare masă.
Cind: Hipersensibilitate. Afecțiuni hepatice grave, ocluzia canalului biliar, empiem al vezicii biliare, ileus.
A!: Pancreatită acută sau cronică. Sarcină și alăptare.
RA: Înroșirea pielii, lăcrimare. Diaree, greață și dureri abdominale. Uneori iritație perianală.

FINALGON® *COD ATC: M02AB01*
BOEHRINGER INGELHEIM; Ung. 100 g conțin 0,4 g nonivanil amidă și 2,5 g nicoboxil; tub × 20 g ***(OTC)***

Ind: Artrită, dureri reumatice; contuzii și luxații, dureri musculare cauzate de efort; lumbago, nevrită, sciatică, bursită și tenosinovită; revulsiv local în tulburările circulatorii periferice.
Dz: Aplicații locale pe zona afectată.
Cind: Hipersensibilitate. Aplicare pe răni, pe pielea iritată sau cu alte leziuni.
RA: Senzație de arsură la contactul cu mucoasele.

FLONIDA *COD ATC: B05BB*
B. BRAUN MELSUNGEN; Sol. perf.; 1000 ml conțin 9 g clorură de sodiu și 50 g glucoză; fl. × 500 ml ***(S)***

Ind: Substituent hidroelectrolitic, în condiții de alcaloză hipoclоremică; pierderi de clor; deshidratare hipotonă; deshidratare izotonă; substrat energetic; vehicul pentru concentratele de electroliți și medicamentele compatibile.
Dz: Doza maximă recomandată este de 40 ml sol. perf./kg/zi, corespunzător la 2 g glucoză/kg/zi.
Cind: Hiperhidratare; deshidratare hipertonă; hipokaliemie.
A!: Hipernatremie; hipercloremie; afecțiuni în care este recomandată reducerea aportului de sodiu (IC, edeme generalizate, EPA, HTA, eclampsie, IR gravă); hiperglicemie care nu răspunde la doze de insulină de până la 6 unități/oră. Este necesară monitorizarea ionogramei sanguine și a echilibrului hidric.
RA: Hipernatremie și hipercloremie.

FLUAMOX *COD ATC: J01CR50*
EUROPHARM SA; Cps. cu 250 mg amoxicilină și 250 mg flucloxacină sodică ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. infecțiilor produse de microorganisme sensibile la amoxicilină și flucloxacilină: bronșită acută, bronșită cronică acutizată, pneumopatii acute (pneumonie bacteriană), infecții ORL (otită medie acută, angină, sinuzită), infecții stomatologice, infecții digestive și biliare, infecții genito-urinare, inclusiv gonoree și boala Lyme. Profilaxia endocarditei bacteriene. Eradicarea infecției cu Helicobacter pylori în cadrul bolii ulceroase, în asociere cu metronidazol și antisecretor gastric.
Dz: *Adulți și copii > 12 ani*: 1-2 cps. de 4 ori/zi. În IR, dozele se vor reduce în funcție de clearance-ul creatininei. Cps. se adm. cu 30 minute înainte de masă sau la 2 ore după masă.
Cind: Hipersensibilitate la peniciline sau la oricare dintre componenții produsului. Mononucleoză infecțioasă. Copii sub 5 ani.
A!: Apariția oricăror manifestări alergice impune întreruperea adm. și instituirea tratamentului specific. Se recomandă prudență la pacienții cu teren atopic. Pacienții alergici la peniciline pot prezenta reactivitate imunologică încrucișată pentru cefalosporine. Infecțiile severe (meningite, septicemii, artrite, pericardite) necesită tratament parenteral. La bolnavii cu IR se recomandă supravegherea funcției renale pe durata tratamentului. La pacienții cu infecții biliare (colecistită, colangită), antibioterapia trebuie completată cu tratament specific, cu excepția formelor ușoare, fără colestază majoră; la acești pacienți trebuie supravegheată funcția hepatică, mai ales în condițiile tratamentului prelungit și/sau cu doze mari. În timpul trat. îndelungat există riscul suprainfecțiilor bac-

teriene sau fungice cu germeni rezistenți. Dacă în timpul trat. apare diaree severă și persistentă, trebuie suspectată colita pseudomembranoasă. În acest caz, adm. trebuie oprită și se instituie tratamentul specific. Nu este rațională asocierea cu antibiotice bacteriostatice. Nu se recomandă adm. concomitentă cu allopurinol (crește riscul erupțiilor cutanate). Amoxicilina poate reduce eficacitatea contraceptivelor orale care conțin estrogeni. Adm. concomitentă de probenecid determină creșterea concentrațiilor plasmatice ale antibioticelor și menținerea acestora timp mai lung.
RA: *Manifestări alergice:* urticarie, eozinofilie, edem Quincke, tulburări respiratori. *Manifestări cutanate:* erupții maculopapuloase, rar dermatită exfoliativă și eritem polimorf. *Tulburări digestive:* greață, vărsături, diaree, candidoză, glosită, stomatită. Foarte rar tulburări hematologice reversibile (anemie, leucopenie, trombocitopenie), nefrită interstițială acută, colită pseudomembranoasă. Adm. de doze mari, în special la pacienții cu IR, poate determina tulburări SNC (tulburări ale stării de conștiență, mișcări anormale, crize convulsive).

FLUOCINOLON D *COD ATC: D07BC02*
MARK INT.; Cremă 100 g conțin 25 mg fluocinolon acetonid și 400 mg clorură de deqalinium; tub x 20 g ***(P-RF)***

Ind: Tratamentul dermatitelor acute sau cronice (dermatită atopică, neurodermită, dermatită de contact, dermatită seboreică, dermatită exfoliativă, dermatite alergice, de contact, microbiene sau candidozice infectate sau cu risc de infecție.
Dz: Se aplică pe pielea intactă a zonei afectate, prin ușoară masare, de 2-3 ori/zi, la începutul tratamentului, apoi doar 2-3 aplicații pe săptămână. Nu se aplică pe suprafețe întinse și pe pielea feței. Durata trat. depinde de reacția pacientului.
Cind: La persoanele alergice la fluocinolon acetonid, la clorură de dequaliniu și la excipienți.
A!: Se contraindică adm. pe leziunile cutanate (inclusiv herpesul simplu, varicela). Gravidelor nu li se recomandă aplicarea cremei pe suprafețe cutanate întinse.
RA: Ocazional, se pot manifesta dermatite de contact. În cazul manifestărilor RA trat. va fi întrerupt, și, de îndată ce se poate, zona pe care a fost aplicată crema va fi spălată cu săpun și apă caldă.

FLUOCINOLON G *COD ATC: D07CC02*
MARK INT.; Cremă cu 25 mg fluocinolon și 154 mg sulfat de gentamicină; tub × 20 g ***(P-RF)***

Ind: Tratamentul eczemelor, dermatitelor acute sau cronice (dermatită atopică, neurodermită, dermatită de contact, dermatită seboreică, dermatită exfoliativă), infectate sau cu risc de infecție; intertrigo de natură microbiană, prurit anogenital, lichen simplu cronic și psoriazis.
Dz: Se aplică pe pielea intactă a zonei afectate prin ușoară masare de 2-3 ori pe zi, la începutul tratamentului, apoi doar 2-3 aplicații pe săptămână. Pentru a evita atrofia cutanată nu se aplică pe suprafețe întinse și pe pielea feței.
Cind: La persoanele alergice la fluocinolon acetonid, la sulfat de gentamicină și la excipienți.

AI: Este contraindicată adm. cremei pe leziunile cutanate. La gravide, nu se recomandă aplicarea cremei pe suprafețe cutanate întinse.
RA: Ocazional, se pot manifesta dermatite de contact. În cazul manifestărilor efectelor adverse tratamentul va fi întrerupt și zona pe care a fost aplicată crema va fi spălată cu săpun și apă caldă.

FLUOCINOLON N *COD ATC: D07CC02*
EUROPHARM SA; Ung. și cremă 100 g conțin 25 mg fluocinolon acetonid și 500 mg sulfat de neomicină ***(P-RF)***
ANTIBIOTICE IAȘI; Ung. și cremă 100 g conțin 25 mg fluocinolon acetonid și 500 mg sulfat de neomicină ***(P-RF)***

Ind: Eczeme întinse corticosensibile, dermatite atopice, neurodermite, dermatite de contact; dermatite seboreice, prurit ano-genital; lichen simplu cronic, dermatite de stază; intertrigo, dermatite exfoliative; psoriazis.
Dz: Aplicații în strat subțire pe zona afectată, de 2-3 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate. Leziuni cutanate tuberculoase, micozele pielii, viroze cutanate. Dermatita periorală, rozacee, acnee. Contactul cu conjunctiva.
AI: Se va evita aplicarea prelungită pe tegumentele feței. Aplicarea repetată pe suprafețe întinse, sub pansament oclusiv. Sarcină și alăptare.
RA: Iritație locală, prurit, uscăciunea pielii, erupții acneiforme, dermatită periorală, atrofie cutanată, eczemă alergică de contact, suprainfecții cu germeni rezistenți.

FLUOR VIGANTOLETTEN 500; 1000 *COD ATC: A11CC2N*
MERCK KGaA; Cpr. cu 500 UI/1000 UI colecalciferol și 550 µg florură de sodiu ***(P-6L)***

Ind: Profilaxia rahitismului, spasmofilie și osteomalacie; în trat. osteoporozei.
Dz: *Copii:* 500-5000 UI/zi sau la 2 zile. *Adulți:* 500-7500 UI/zi.
Cind: Hipercalcemie, hipercalciurie, sarcoidoză, litiază renală, hipersensibilitate la vitamina D. În sarcină și alăptare.
AI: Prudență în IR, la bătrâni, la bolnavii imobilizați, în hipercolesterolemie, în hipotiroidism. În trat. cu doze mari repetate, se supraveghează calcemia și calciuria și se va întrerupe adm. când calcemia depășește valoarea normală, iar calciuria depășește valoarea de 300-400 mg/24 ore. Atenție în cazul asocierii cu: barbiturice, fenitoină, diuretice tiazidice, digitalice, blocante ale canalelor de calciu.
RA: Hipercalcemie și/sau hipercalciurie cu hipersensibilitate la vitamina D. Persistența nivelului seric crescut al calciului se poate manifesta prin simptome acute (aritmii, greață, vomă, simptome psihice, tulburări ale stării de conștiență) și cronice (scădere ponderală, formare de calculi renali, nefrocalcinoză, calcifăcări ale țesuturilor moi, lipsa poftei de mâncare, sete intensă, poliurie).

FLUORORINIL *COD ATC: R01AD06*
FARMILA FARMACEUTICI; Susp. inhal. cu 0,1% maleat de clorfenilamină și 0,05% betametazonă; f. × 1 ml ***(P-RF)***

Ind: Rinite alergice, corize, rinite vasomotorii, dureri de gât, rinopatii.
Dz: Inhalator 1 f. de 1-2 ori/zi.

FORTRANS *COD ATC: A06AD13*
BEAUFOUR IPSEN; Pulb. susp. cu 64 g PEG 4000, 5,7 g sulfat de sodiu, 1,68 g carbonat acid de sodiu, 1,68 g clorură de sodiu și 0,7 g clorură de potasiu ***(P-RF)***

Ind: Pregătirea pacienților în prealabil: la explorări endoscopice și radiologice; la chirurgie colică.
Dz: *Adulți:* Se dizolvă conținutul unui plic în 1 l de apă. Posologia este de 1 litru de soluție pentru 15-20 kg greutate corporală, fie o posologie medie de 3-4 litri. Poate fi ingerat în priză unică (4 litri cu o seară înainte) sau fracționat (2 litri cu o seară înainte și 2 litri dimineața; se recomandă a se lua ultimul pahar cu 3-4 ore înainte de examinare).
Cind: Alterări grave ale stării generale, cum ar fi deshidratarea sau IC severă; Carcinom evoluat sau orice altă patologie ce antrenează o fragilitate prea mare a mucoasei; Pacienți susceptibili de ileus sau ocluzie intestinală; Copii sub 15 ani.
A!: La pacientul vârstnic cu stare generală precară se recomandă a se adm. produsul numai sub supraveghere medicală. Diareea consecutivă folosirii acestui med. poate perturba considerabil absorbția medicamentelor adm. simultan. Nu se recomandă prescrierea med. la pacienții cu sensibilitate la PEG.
RA: Grețuri și vărsături au fost semnalate la începutul adm., cedând în general după aceea. Au fost raportate senzații de balonare intestinală. Foarte rar manifestări alergice de tip eruptiv, urticarie și edem. În mod excepțional șoc anafilactic.

FORTZAAR® 100/25 *COD ATC: C09DA01*
MERCK SHARP & DOHME; Cpr. film. conținând losartan potasic 100 mg și hidroclorotiazidă 25 mg; ct. × 2 blist. a 14 cpr. ***(P-6L)***

Ind: Tratamentul hipertensiunii arteriale, la pacienții la care este recomandată terapia combinată, atunci când nu se poate realiza controlul presiunii sanguine prin administrare zilnică a combinației losartan potasic 50 mg/hidroclorotiazidă 12,5 mg.
Dz: Pentru pacienții care nu răspund adecvat la administrarea combinației losartan potasic 50 mg/hidroclorotiazidă 12,5 mg o dată pe zi, după o durată minimă de 3 săptămâni de tratament, doza poate fi crescută la un comprimat o dată pe zi. Doza maximă este de un comprimat, o dată pe zi. Nu este recomandată administrarea a mai mult de un comprimat pe zi. Inițierea tratamentului la pacienții vârstnici nu se va face cu acest produs.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele acestui produs. Anurie. Hipersensibilitate la alți derivați de sulfonamide. Insuficiență renală severă. Insuficiență hepatică (ciroză). Stenoză bilaterală a arterei renale sau stenoza arterei renale pe rinichi unic. Sarcină. Alăptare.
A!: Nu este recomandat la pacienți cu afecțiuni hepatice sau renale severe. La toți pacienții care primesc diuretice trebuie efectuate determinări periodice ale electroliților serici. Poate fi necesară ajustarea dozelor de medicamente antidiabetice, inclusiv insulină la pacienți diabetici. Interacțiuni cu rifampicină, fluconazol, spironolactonă, triamteren, amilorid, suplimente de potasiu sau substituenți de sare alimentară, indometacin, alcool, barbiturice sau narcotice, colestiramină și rășini de colestipol, corticosteroizi, ACTH, adrenalină, curarizante antidepolarizante, litiu.

RA: Au fost raportate după autorizarea medicamentului: reacții anafilactoide, angioedem inclusiv edem al laringelui și glotei cauzând obstrucția căilor aeriene și/sau tumefierea feței, buzelor, faringelui și/sau limbii; unii dintre acești pacienți au prezentat în antecedente angioedem cu alte medicamente inclusiv inhibitori ai enzimei de conversie. Vasculita, inclusiv purpură Henoch-Schönlein, a fost rareori semnalată. Diaree, tuse, urticarie.

FREBINI® ENERGY DRINK

FRESENIUS KABI GmbH. Sol. pt. nutriție enterală; 100 ml conțin Proteine 3,75 g; Glucide 18,8 g (din care zaharuri 3,75 g; lactoză < 0,03 g); Lipide 6,65 g (din care acizi grași saturați 1,87 g; acizi grași mononesaturați 3,14 g; acizi grași polinesaturați 1,64 g; MCT 1,2 g; colesterol ≤ 3 mg); Fibre 0 g; Apă 79 ml; Minerale și Oligoelemente: Na 75 mg, K 150 a,c/155b mg, Cl 150 mg, Ca 90a,c/93b mg, Mg 16 mg, P 75 mg, Fe 1,35 mg, Zn 1,35 mg, Cu 150 µg, Mn 0,18 mg, I 15 µg, F 0,12 mg, Cr 3a,c/6b µg, Mo 5,25 µg, Se 3,75 µg; Vitamine și alte elemente nutritive: Vit. A 68 µg, β-caroten 150 µg, Vit D_3 1,13 µg, Vit. E 1,5 mg, Vit. K_1 5,25 µg, Vit. B_1 0,3 mg, Vit. B_2 0,3 mg, Nicotinamidă 1,5 mg, Vit. B_6 0,14 mg, Vit. B_{12} 0,3 µg, Acid pantotenic 0,6 mg, Biotină 7,5 µg, Acid folic 33 µg, Vit. C 9 mg, Colină 22,5 mg, Taurină 10,5 mg, L-carnitină* 3 mg, Mio-inozitol 22,5 mg ***(S)***

Ind: Alimentație enterală completă, buvabilă. Dietă specială recomandată copiilor de 1-12 ani, expuși riscului de malnutriție.
Dz: Doza zilnică recomandată este în funcție de vârstă: *1-3 ani*/3-5 recipiente/zi; *4-5 ani*/5-6 recipiente/zi; *7-10 ani*/6-7 recipiente/zi; *11-12 ani*/7-8 recipiente/zi. Cantitatea zilnică se împarte în porții mici.
Cind: Copii sub 1 an.
A!: Doza zilnică nu trebuie să depășească 80 g proteine/zi.

FREBINI® ORIGINAL FIBER

FRESENIUS KABI GmbH; Sol. pt. nutriție enterală; 100 ml conțin: Proteine 2,5 g; Glucide 12,5 g (din care: zaharuri 0,7 g; lactoză < 0,08 g); Lipide 4,4 g (din care: acizi grași saturați 1,3 g; acizi grași mononesaturați 2,0 g; acizi grași polinesaturați 1,1 g; EPA și DHA 0,06 g; MCT 0,8 g; colesterol < 1,3 mg); Fibre 0,75 g; Apă 84 ml; Minerale și Oligoelemente: Na 50 mg, K 100 mg, Cl 100 mg, Ca 60 mg, Mg 10 mg, P 50 mg, Fe 0,9 mg, Zn 0,9 mg, Cu 100 µg, Mn 0,12 mg, I 10 µg, F 0,08 mg, Cr 2,0 µg, Mo 3,5 µg, Se 2,5 µg; Vitamine și alte elemente nutritive: Vit. A 45 µg, β-caroten 100 µg, Vit. D_3 0,75 µg, Vit. E 1,0 mg, Vit. K_1 3,5 µg, Vit. B_1 0,2 mg, Vit. B_2 0,2 mg, Nicotinamidă 1,0 mg, Vit. B_6 0,09 mg, Vit. B_{12} 0,2 µg, Acid pantotenic 0,4 mg, Biotină 5,0 µg, Acid folic 22 µg, Vit. C 6,0 mg, Colină 15,0 mg, Mio-inositol 15,0 mg, Taurină 7,0 mg, Carnitină 2,0 mg; ct. × 12 fl. a 500 ml ***(S)***

Ind: Alimentație enterală pe sondă, completă din punct de vedere nutrițional, cu fibre, taurină, carnitină și inozitol, cu o valoare energetică de 1 kcal/ml, fără gluten, practic fără lactoză. Dietă specială recomandată copiilor cu vârste cuprinse între 1 și 12 ani expuși riscului de malnutriție și care au indicație pentru nutriție enterală.

Dz: Pentru o nutriție enterală completă, se recomandă următoarele doze, în funcție de vârstă: *1-3 ani*/1-1,5 litri pe zi; *4-6 ani*/1,5-2 litri pe zi; *7-10 ani*/2 litri pe zi; *11-12 ani*/2-2,5 litri pe zi. Cantitatea administrată crește lent la începerea alimentației pe sondă.
Cind: Copii cu vârsta sub 1 an.
AI: Produsul este recomandat pentru nutriție enterală completă sau pentru suplimentarea alimentației. Se va monitoriza echilibrul hidric conținut energetic: 2100 kj (500 kcal)/500 ml produs pentru nutriție enterală.

FREKADERM *COD ATC: D08AXN2*
FRESENIUS KABI GmbH; Sol. ext. 100 ml conțin 0,8 g etanol, 1 mg clorură de benzalconiu, 25 mg 2-bifenolol și 25 mg 2-benzil 4-clorfenol; fl. x 250 ml ***(OTC)***

Ind: Antisepsia pielii înaintea intervențiilor chirurgicale (cateterizare, recoltare probe) și îngrijirea plăgilor și suturilor.
Dz: Aplicații locale.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului.
RA: Este posibil să apară eritem cutanat, prurit, erupții în zona aplicării, mai ales după folosirea excesivă.

FREKASEPT-80 *COD ATC: D08AXN2*
FRESENIUS KABI GmbH; Sol. ext. 100 ml conțin 80 g etanol, 0,1 g clorură de benzalconiu, 25 mg 2-bifenolol și 25 mg 2-benzil 4-clorfenol; fl. × 380 ml ***(OTC)***

Ind: Antisepsia pielii înaintea intervențiilor chirurgicale (cateterizare, recoltare probe) și îngrijirea plăgilor și suturilor.
Dz: Aplicații locale.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului.
RA: Este posibil să apară eritem cutanat, prurit, erupții în zona aplicării, mai ales după folosirea excesivă.

FRESUBIN® HEPA
FRESENIUS KABI GmbH; Sol. pt. nutriție enterală; 100 ml conțin: Proteine 4 g (din care aminoacizi ramificați 44% 1,93 g); Glucide 17,9 g (din care zaharuri 0,7 g; lactoză < 0,01 g); Lipide 4,8 g (din care: acizi grași saturați 2 g; acizi grași mononesaturați 1,4 g; acizi grași polinesaturați 1,3 g; MCT 1,7 mg; colesterol < 0,3 g); Fibre 1 g; Apă 78 ml; Minerale și Oligoelemente: Na 75 mg, K 120 mg, Ca 80 mg, Cl 71,5 mg, P 53 mg, Mg 27 mg, Fe 1,33 mg, Zn 1,2 mg, Cu 130 µg, Mn 0,27 mg, I 13,3 µg, F 0,13 mg, Cr 6,67 µg, Mo 10 µg, Se 6,67 µg; Vitamine și alte elemente nutritive: Vit. A 70 µg, β-caroten 130 µg, Vit. D_3 1 µg, Vit. E 1,33 mg, Vit. K_1 6,67 µg, Vit. B_1 0,13 mg, B_2 0,17 mg, Nicotinamidă 1,6 mg, Vit. B_6 0,16 mg, Vit. B_{12} 0,27 µg, Acid Pantotenic 0,47 mg, Biotină 5 µg, Acid Folic 27 µg, Vit. C 6,67 mg, Colină 28 mg; ct × 12 fl. a 500 ml ***(S)***

Ind: Alimentație enterală completă, pe sondă sau de băut, bogată în aminoacizi cu lanț ramificat, cu valoare energetică ridicată, cu fibre, săracă în lichide

și sodiu, fără gluten și practic fără lactoză. Dietă specială recomandată pentru nutriția enterală a pacienților cu afecțiuni hepatice acute sau cronice.
Dz: Doza zilnică recomandată pentru nutriție enterală completă: > 3 flacoane/zi. Doza zilnică recomandată pentru nutriție enterală de suplimentare: > 1 flacon/zi. Cantitatea administrată crește lent la începerea alimentației pe sondă. În cazul alimentației pe cale bucală, doza zilnică se împarte în porții mici, de-a lungul zilei.
Cind: Copii cu vârsta sub 1 an.
A!: Produsul este recomandat pentru nutriție enterală completă sau pentru suplimentarea alimentației. Se va monitoriza echilibrul hidro-electrolitic. Conține cofeină (4,0 mg/100 ml)[a]. Conținut energetic 2750 kj (650 kcal)/500 ml produs pentru nutriție enterală.

FRESUBIN® HP ENERGY

FRESENIUS KABI GmbH, Sol. pt. nutriție enterală; 100 ml conțin: Proteine 7,5 g; Glucide 17 g (din care zaharuri 1 g; lactoză < 0,06 g); Lipide 5,8 g (din care acizi grași saturați 3,7 g; acizi grași mononesaturați 0,5 g; acizi grași polinesaturați 1,5 g; DHA și EPA 0,05 g; MCT 3,3 g); Fibre 0 g; Apă 79 ml; Minerale și Oligoelemente: Na 120 mg, K 234 mg, Cl 184 mg, Ca 80 mg, Mg 27 mg, P 63 mg, Fe 1,33 mg, Zn 1,2 mg, Cu 130 µg, Mn 0,27 mg, I 13,3 µg, Mo 10 µg, Cr 6,7 µg, F 0,13 mg, Se 6,7 µg; Vitamine și alte elemente nutritive: Vit. A 70 µg, β-caroten 130 µg, Vit D 1 µg, Vit. K_1 6,67 µg, Vit. B_2 0,17 mg, Vit. E 1,33 mg, Vit. B_1 0,13 mg, Nicotinamidă 1,6 mg, Vit. B_6 0,16 mg, Vit. B_{12} 0,27 µg, Acid Pantotenic 0,47 mg, Biotină 5 µg, Acid folic 27 µg, Vit. C 6,7 mg, Colină 26,7 mg; ct. × 12 fl. a 500 ml ***(S)***

Ind: Alimentație enterală completă pe sondă bogată în proteine, cu valoare energetică ridicată, cu mct, fără fibre, practic fără lactoză, fără gluten. dietă specială recomandată pacienților cu necesități proteice și energetice crescute.
Dz: Doza zilnică recomandată pentru nutriția enterală completă a pacienților cu nevoi proteice și energetice crescute este > 1,5 litri/zi. Cantitatea administrată trebuie crescută lent la începerea alimentației pe sondă.
Cind: Copii cu vârsta sub 1 an.
A!: Produsul este recomandat pentru nutriție enterală completă sau pentru suplimentarea alimentației. Se va monitoriza echilibrul hidric. Pot să apară interacțiuni cu anumite medicamente. Conținut energetic 3150 kj (750 kcal)/500 ml produs pentru nutriție enterală.

FRESUBIN® ORIGINAL

FRESENIUS KABI GmbH; Sol. pt. nutriție enterală; 100 ml conțin: Proteine 3,8 g; Glucide 13,8 g (din care zaharuri 3,5 g; lactoză < 0,01 g); Lipide 3,4 g (din care: acizi grași saturați 0,4 g; acizi grași mononesaturați 1,9 g; acizi grași polinesaturați 1,1 g; colesterol < 0,8 mg); Fibre 0 g; Apă 84 ml; Minerale și Oligoelemente: Na 75 mg, K 125 mg, Cl 85 mg, Ca 60 mg, P 47 mg, Mg 20 mg, Fe 2 mg, Zn 1,5 mg, Cu 300 µg, Mn 0,4 mg, I 30 µg, F 0,2 mg; Cr 10 µg, Mo 15 µg, Se 10 µg; Vitamine și alte elemente nutritive: Vit. A 120 µg, β-caroten 300 µg, Vit. D_3 2 µg, Vit. E 3 mg, Vit. K_1 16,7 µg, Vit. B_1 0,23 mg, Vit. B_2 0,32 mg, Vit. B_6 0,33 mg, Vit. B_{12} 0,6 µg, Acid Pantotenic 1,2 mg, Biotină 7,5 µg, Acid Folic 50 µg, Vit. C 15 mg, Colină 20 mg; Niacină 3 mg; ct. × 12 fl. a 500 ml ***(S)***

Ind: Alimentație enterală completă pe sondă sau pentru băut, normocalorică, fără fibre, fără gluten și practic fără lactoză. Dietă specială recomandată pacienților expuși riscului de malnutriție.
Dz: Doza zilnică recomandată pentru nutriție enterală completă este ≥ 3 flacoane/zi. Pentru nutriție eneterală de suplimentare se recomandă ≥ 1 flacon/zi. Se crește lent cantitatea atunci când se începe alimentația pe sondă. În cazul alimentației pe cale bucală, cantitatea zilnică se împarte în porții mici, de-a lungul zilei.
Cind: Copii cu vârsta sub 1 an.
A!: Produsul este recomandat pentru nutriție enterală completă sau pentru suplimentarea alimentației. Se va monitoriza echilibrul hidric. Conținut energetic 2 100 kj (500 kcal)/500 ml produs pentru nutriție enterală.

FRESUBIN® ORIGINAL FIBER
FRESENIUS KABI GmbH; Sol. pt. nutriție enterală; 100 ml conțin: Proteine 3,8 g; Glucide 13,8 g (din care zaharuri 1 g; lactoză < 0,02 g); Lipide 3,4 g (din care: acizi grași saturați 0,9 g; acizi grași mononesaturați 1,6 g; acizi grași polinesaturați 0,9 g; DHA și EPA 0,04 g; MCT 0,56 mg; colesterol < 1,6 mg); Fibre 2 g; Apă 84 ml; Minerale și Oligoelemente: Na 133,3 mg, K 155 mg, Cl 153,3 mg, Ca 80 mg, P 63 mg, Mg 25 mg, Fe 1,33 mg, Zn 1,2 mg, Cu 130 µg, Mn 0,27 mg, I 13,3 µg, F 0,13 mg; Cr 6,7 µg, Mo 10 µg, Se 6,7 µg; Vitamine și alte elemente nutritive: Vit. A 70 µg, β-caroten 0,13 mg, Vit. D 1 µg, Vit. E 1,33 mg, Vit. K_1 6,67 µg, Vit. B_1 0,13 mg, Vit. B_2 0,17 mg, Vit. B_6 0,16 mg, Vit. B_{12} 0,27 µg, Acid Pantotenic 0,47 mg, Biotină 5 µg, Acid Folic 27 micrograme, Vit. C 6,67 mg, Colină 36,7 mg; ct. × 12 fl. a 500 ml ***(OTC)***

Ind: Alimentație enterală completă pe sondă, normocalorică, bogată în fibre, fără gluten și practic fără lactoză, colesterol și purine. Dietă specială recomandată pacienților expuși riscului de malnutriție.
Dz: Doza zilnică recomandată pentru nutriție enterală completă: > 1,5 litri/zi. Cantitatea administrată se crește lent la începerea alimentației pe sondă.
Cind: Copii cu vârsta sub 1 an.
A!: Produsul este recomandat pentru nutriție enterală completă sau pentru suplimentarea alimentației. Se va monitoriza echilibrul hidro-electrolitic. Conține 2100 kj (500 kcal)/500 ml produs pentru nutriție enterală.

FUCICORT® *COD ATC: D07CC01*
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS; 1 g cremă conține acid fusidic anhidru 20 mg și betametazonă (valerat) 1 mg; tub × 15 g ***(P-RF)***

Ind: Trat. dermatitelor suprainfectate cu bacterii sensibile la acidul fusidic, inclusiv al dermatitei atopice și de contact.
Dz: Se aplică de 2 ori/zi pe zona afectată, după spălarea și uscarea zonei afectate, 1-2 săpt.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului; infecții cutanate fungice sau virale (de exemplu herpes, varicelă), ulcerații cutanate, boli cutanate atrofice, dermatită periorală, acnee rozacee și manifestările cutanate din tbc și sifilis – datorită conținutului în betametazonă; infecții cutanate la nivelul zonei mamare la femeile care alăptează; sarcină.
A!: Nu se aplică pe mucoase sau pe plăgi. Trebuie evitat contactul cu ochii. Trat. îndelungat poate determina selecționarea tulpinilor bacteriene rezistente.

La copii se recomandă evitarea tratamentului îndelungat cu glucocorticoizi, datorită riscului deprimării axului hipotalamo-hipofizo-suprarenalian.
RA: Fenomene de iritație sau hipersensibilizare la locul aplicării, manifestate prin eritem, prurit, senzație de arsură. Trat. îndelungat provoacă atrofie dermo-epidermică, teleangiectazii, purpură și echimoze, uneori striuri și tulburări de pigmentare. Alte efecte nedorite locale constau în hipertricoză, foliculită, dermatită periorală și întârzierea vindecării plăgilor.

FUCIDIN® H

COD ATC: D07CA

LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS; 1 g cremă conține acid fusidic anhidru 20 mg și acetat de hidrocortizon 10 mg; tub × 15 g ***(P-RF)***

Ind: Trat. dermatitelor suprainfectate cu bacterii sensibile la acidul fusidic, inclusiv al dermatitei atopice și de contact.
Dz: Se aplică local de 2-3 ori/zi, după spălarea și uscarea zonei afectate, 1-2 săpt.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componentele produsului; infecții cutanate fungice sau virale (de exemplu herpes, varicelă), ulcerații cutanate, boli cutanate atrofice, dermatită periorală, acnee rozacee și manifestările cutanate din tuberculoză și sifilis – datorită conținutului în acetat de hidrocortizon; infecții cutanate la nivelul zonei mamare la femeile care alăptează.
A!: Nu se aplică pe mucoase sau pe plăgi. Trebuie evitat contactul cu ochii. Trat. îndelungat poate determina selecționarea tulpinilor bacteriene rezistente. La copii se recomandă evitarea tratamentului îndelungat cu glucocorticoizi, datorită riscului deprimării axului hipotalamo-hipofizo-suprarenalian. Sarcină.
RA: Fenomene de iritație sau hipersensibilizare la locul aplicării, manifestate prin eritem, prurit, senzație de arsură. Trat. îndelungat cu glucocorticoizi provoacă atrofie dermo-epidermică, teleangiectazii, purpură și echimoze, uneori striuri și tulburări de pigmentare. Alte efecte nedorite locale constau în hipertricoză, foliculită, dermatită periorală și întârzierea vindecării plăgilor.

FURAMEBE FORTE

COD ATC: P01AC01

SEDICO; Cpr. cu 200 mg metronidazol și 250 mg diloxanid furoat ***(P-RF)***

Ind: Trat. infecțiilor provocate de germeni sensibili la metronidazol: trichomoniază urogenitală, vaginite nespecifice.
Dz: 1 cpr. de 3 ori/zi, timp de 7 zile consecutiv.
Cind: Hipersensibilitate la metronidazol, la alți derivați de nitroimidazol; afecțiuni cerebrale organice; sarcină și alăptare.
RA: Senzație de gust metalic, anorexie, greață, dureri epigastrice, diaree, prurit, bufeuri vasomotorii; tulburări neuropsihice-cefalee, vertij, confuzie mintală, convulsii; pancreatită reversibilă; leucopenie, neuropatii senzitive periferice.

G

GARASONE

COD ATC: S01CA05

SCHERING-PLOUGH EUROPE AG; Sol. oft./otică cu 3 mg de gentamicină și 1 mg de betametazonă/ml; fl. × 5 ml ***(P-RF)***

Ind: Inflamații oculare; afecțiunile canalului auditiv ext., cum sunt otita ext. acută și cronică, dermatita eczematiformă, dermatita seboreică și dermatita de contact suprainfectată cu germeni sensibili la gentamicină.
Dz: *Oftalmic:* 1-2 pic. instilate de 3-4 ori/zi în sacul conjunctival al ochiului afectat. *Otic:* 3-4 pic de 2-4 ori/zi.
Cind: Keratite epiteliale cu herpes simplex, vaccinia, varicela, afecțiunile virale ale corneei și conjunctivei, infecțiile micobacteriene sau fungice ale ochiului sau urechii, corpi străini, trahom, perforația timpanului, hipersensibilitate. Copii sub 8 ani.
A!: Monitorizarea presiunii intraoculare. Glaucom cu unghi deschis, grad înalt de miopie, diabet. Sarcină și alăptare.
RA: Senzație de usturime la adm., creșterea presiunii intraoculare, glaucom, afectarea (rară) a nervului optic, tulburări ale acuității vizuale și ale câmpului vizual, apariția unor cataracte posterioare subcapsulare, întârzierea în vindecarea unor răni, apariția unor flictene cu lichid clar după intervențiile chirurgicale pentru cataractă, infecții oculare secundare produse de agenți patogeni inclusiv herpes simplex, uveite acute anterioare și perforații ale globului ocular, midriază, pierderi ale acomodării și ptoză. Alergie.

GARASONE *COD ATC: S01CA05*
SCHERING-PLOUGH EUROPE AG; Ung. oftalmic cu 3 mg de gentamicină și 1 mg de betametazonă/g; tub × 5 g ***(P-RF)***

Ind: Inflamații oculare: blefaroconjunctivita stafilococică, keratoconjunctivita flictenulară, keratoconjunctivita microbiană și alergică, conjunctivita alergică, bacteriană nepurulentă, catarală, vernală; cheratită; episclerită; dacriocistită; orjelet; meibomită; și traumatisme ale segmentului anterior ocular cauzate de corpi străini, radiații, factori termici, chimici sau postoperator.
Dz: Aplicații la nivelul sacului conjunctival al ochiului afectat, de 3-4 ori/zi.
Cind: Keratite epiteliale cu herpes simplex, vaccinia, varicela, afecțiuni virale ale corneei și conjunctivei, infecții microbiene sau fungice ale ochiului, trahom, hipersensibilitate la una din componentele preparatului, după îndepărtarea unui corp străin cornean.
A!: Monitorizarea presiunii intraoculare. Glaucom cu unghi deschis, grad înalt de miopie, diabet. Sarcină și alăptare.
RA: Ușoară senzație de usturime, reacții de hipersensibilitate manifestate prin creșterea hiperemiei oculare, edem și senzație de arsură, creșterea presiunii intraoculare; glaucom; afectarea nervului optic; tulburări ale acuității vizuale și ale câmpului vizual; apariția unor cataracte posterioare subcapsulare; întârzierea în vindecarea unor răni; uveită acută anterioară; perforarea globului ocular; midriază; pierderea acomodării; ptoză, sensibilizări alergice.

GASTAL *COD ATC: A02AD01*
PLIVA; Cpr. cu 450 mg gel de hidroxid de aluminiu-carbonat de magneziu și 300 mg hidroxid de magneziu ***(OTC)***

Ind: Trat. simpt. hiperacidității, cu sau fără pirozis, asociată cu ulcer peptic, gastrită, reflux gastroesofagian sau hernie hiatală.
Dz: *Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani:* 1-2 cpr. de 4-6 ori/zi, fără a depăși 8 cpr. în 24 ore; cpr. se adm. la o oră după mese și înainte de culcare.

Trat. nu va dura mai mult de 2 săptămâni. *Copii cu vârsta între 6-12 ani:* ½-1 cpr. de 4-6 ori/zi, fără a depăși 4 cpr. în 24 ore; cpr. se adm. la o oră după mese și înainte de culcare. Trat. nu va dura mai mult de 2 săptămâni. Cpr. se vor dizolva în cavitatea bucală.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului. IR severă. Copii sub 6 ani.
A!: Pentru copii și pacienți cu greutate corporală mică sunt indicate doze mai mici și durate mai scurte de tratament. Medicamentul nu trebuie utilizat mai mult de 2 săptămâni, deoarece există risc de rebound al secreției acide, prin hipergastrinemie. Gastal scade activitatea tetraciclinelor, ciprofloxacinei, ofloxacinei, acidului acetilsalicilic, izoniazidei, naproxenului, preparatelor de fer, digitalicelor; aceste med. trebuie adm. cu cel puțin 2 ore după sau cu o oră înainte de adm. Gastal.
RA: Dozele mari pot produce greață, diaree, constipație rebelă, hipermagneziemie. În cazul adm. prelungite sau de doze mari poate să apară carență de fosfați.

GASTRALGINE *COD ATC: A02AF02*
LAB. UPSA; Cpr. mast. cu 100 mg hidroxid de aluminiu, 100 mg glicinat de aluminiu, 100 mg dimeticonă, 350 mg trisilicat de magneziu ***(OTC)***

Ind: Tulburări dispeptice, meteorism abdominal, pirozis.
Dz: 3 cpr. pe zi, între mese.
Cind: Hipersensibilitate la componentele produsului.

GASTROBEN *COD ATC: A02AD*
ANTIBIOTICE IAȘI; Cpr. mast. conținând hidroxid de magneziu 250 mg, hidroxid de aluminiu exprimat ca oxid de aluminiu 125 mg; ct. × 4 blist. a 10 cpr., ct. × 150 blist. a 10 cpr. ***(OTC)***

Ind: Tratament simptomatic în afecțiuni gastroduodenale: ulcer gastric necomplicat, ulcer duodenal, gastrite, hiperaciditate gastrică, esofagita de reflux, hemie hiatală.
Dz: Doza recomandată este de 2-3 comprimate masticabile pe zi, administrate în timpul crizelor dureroase sau la 90 minute după mese; comprimatele se mestecă sau se lasă să se dizolve în cavitatea bucală. Durata tratamentului este în funcție de evoluția clinică; în ulcerul duodenal, 6-8 săptămâni sau mai mult, iar în ulcerul gastric, 4-6 săptămâni.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului. Insuficiență renală severă, datorită conținutului în magneziu. Hipofosfatemie. Abdomen acut, hemoragii sau perforații gastrice. Intoleranță la fructoză (datorită conținutului de sorbitol).
A!: Pacienții cu diabet zaharat trebuie să țină cont de conținutul în zahăr al produsului. Interacțiuni: chinidină, tuberculostatice (etambutol, izoniazidă), penicilamină, tetracicline, fluorochinolone, lincosamide, antihistaminice HI, atenolol, metoprolol, propranolol, clorochină, digoxină, diflunisal, bifosfonați, fluorură de sodiu, glucocorticoizi (prednisolon, dexametazonă), indometacină, ketoconazol, neuroleptice fenotiazinice, fosfați, săruri de fier, lansoprazol. Alte medicamente se vor administra la interval de 2 ore după administrare. Administrarea produsului

în timpul sarcinii sau alăptării se va face numai după evaluarea atentă a raportului beneficiu matern/risc potențial pentru făt sau sugar.
RA: Legate de hidroxidul de aluminiu: constipație, greață, vărsături; carență de fosfați (cu osteoporoză, hipercalciurie, nefrolitiază secundară) în caz de administrare prelungită sau la doze mari; tratamentul îndelungat poate provoca osteodistrofie, miopatie, encefalopatie (manifestată uneori prin fenomene de demență sau convulsii). Legate de hidroxidul de magneziu: diaree; la doze mari administrate timp îndelungat există risc de hipermagneziemie.

GASTROGRAFIN® *COD ATC: V08AA01*
SCHERING-PLOUGH EUROPE AG; Sol. gastroenterală; 100 ml sol. conțin amidotrizoat de sodiu (diatrizoat de sodiu) 10 g și amidotrizoat de meglumină (diatrizoat de meglumină) 66 g; ct. × 1 fl. a 100 ml ***(S)***

Ind: Indicat mai ales în cazurile în care sulfatul de bariu nu este util sau este cotraindicat: suspiciune de stenoză parțială sau completă, hemoragie digestivă acută; perforații care pun viața în pericol (în caz de ulcer peptic sau diverticul); abdomen acut chirurgical; după intervenții chirurgicale (de ex. rezecție de stomac sau de intestin); megacolon; fistulă gastrointestinală; vizualizarea unui corp străin sau a unei tumori înaintea endoscopiei. Alte indicații: tratamentul ileusului meconial; efectuarea tomografiei computerizate la nivelul regiunii abdominale.
Dz: Administrare orală sau rectală. *Administrare orală:* doza variază în funcție de tipul examinării și de vârsta pacientului: *Adulți și copii peste 10 ani:* pentru examinarea gastrică se administrează 60 ml; pentru examenul întregului tract gastrointestinal se administrează cel mult 100 ml. Pentru vârstnici și cașectici se recomandă diluarea soluției gastro-enterale cu un volum egal de apă. *Copii sub 10 ani:* se administrează 15-30 m, care se pot dilua cu un volum dublu de apă; pentru *copii sub 3 ani.* se recomandă diluarea cu un volum de 3 ori mai mare de apă. Pentru diagnosticarea precoce a perforațiilor sau a defectelor de anastomoză la nivelul esofagului și/sau tractului gastrointestinal: se administrează 100 ml. Dacă leziunea suspectată nu poate fi identificată clar pe filmul radiologic, se poate folosi o reacție chimică (după 30-60 min sau mai târziu, dacă se suspicionează că leziunea este în porțiunea distală a intestinului, se recoltează o probă de urină, din care 5 ml se vor amesteca cu 5 picături de acid clorhidric concentrat; dacă substanța de contrast este excretată renal, va precipita în decurs de 2 ore sub forma unei formațiuni cristalizate caracteristice).
Administrare rectală: se administrează 500 ml soluție obținută prin diluarea cu un volum de apă de 3-4 ori mai mare decât soluția gastro-enterală, la *adulți,* de 4-5 ori mai mare la *copii peste 5 ani* și de 5 ori mai mare la *copii sub 5 ani.*
Asocierea cu sulfat de bariu: adulți: 30 ml gastrografin împreună cu doza uzuală de sulfat de bariu. *Copii între 5-10 ani:* 10 ml împreună cu doza uzuală de sulfat de bariu. *Copii sub 5 ani:* 2-5 ml împreună cu 100 ml suspensie de sulfat de bariu. Dacă este necesar, în cazul spasmului piloric sau al stenozei pilorice, suspensia poate fi diluată în continuare, aceasta neafectând calitățile substanței de contrast.
Cind: Hipertiroidism manifest.
A!: Precauții: pacienți cu hipersensibilitate la substanțele de contrast iodate, hipertiroidie latentă, gușă, pacienții deshidratați, nou-născuți și copii mici. Nu se adm. i.v. La temperaturi sub 7°C, are tendința de a cristaliza. Atunci când se folosește împreună cu sulfatul de bariu, se vor lua în considerare contraindi-

cațiile, reacțiile adverse, precum și precauțiile și atenționările speciale, caracteristice acestui produs. Interacțiuni cu investigațiile radioizotopice, beta blocante adrenergice, interleukină, diuretice, metformină. Se evită utilizarea în timpul sarcinii.
RA: Ocazional, soluția hipertonă poate provoca diaree, dar aceasta se remite spontan, imediat ce intestinul a fost golit. O enterită sau colită preexistente pot fi exacerbate temporar. Modificările tranzitului intestinal pot fi însoțite de deshidratare. Foarte rar pot să apară greață și vărsături. Ocazional, s-au observat reacții cutanate urticariene; sunt posibile reacții anafilactice mergând până la șoc. În cazul aspirării substanței de contrast în căile respiratorii poate să apară un edem pulmonar.

GELOFUSINE *COD ATC: B05AA06*
B. BRAUN MEDICAL; Sol. perf. 40 mg succinil gelatină, 7,02 mg clorură de sodiu și 1,36 mg hidroxid de sodiu/ml; fl. × 500 ml ***(S)***

Ind: Hipovolemii (hemoragie), deshidratări (arsuri), insuficiență circulatorie prin șoc toxic sau septic. Tromboze și tromboflebite.
Dz: Perf. i.v. 500-1000 ml/zi.
Cind: Trombocitopenie marcată, IC congestivă gravă, IR cu anurie.
A!: IC congestivă, nefropatii cu scăderea filtratului glomerular.
RA: Rar reacții alergice (urticarie, spasm bronșic), febră.

GELONIDA *COD ATC: N02AA59*
GOEDECKE PARKE DAVIS; Cpr. cu 500 mg paracetamol și 30 mg codeină, ***(P-RF)***

Ind: Trat. simptomatic al durerii.
Dz: *Copii cu greutate mai mare de 15 kg:* 60 mg paracetamol/kg/zi și 3 mg/kg/zi codeină, în 4-6 prize. *Adulți:* 1 cpr. la 4-6 ore, max. 6 cpr./zi.
Cind: Copii cu greutatea mai mică de 15 kg, alergie, IH severă, astm grav, insuficiență respiratorie, fenilcetonurie. Asociere cu buprenorfina, nalbufina, pentazocina, alcool. Sarcină și alăptare. Șoferi și activități de precizie.
A!: Dependență la utilizarea prelungită. Afecțiuni hepatice sau renale, astm, inflamație bronșică (tuse cu expectorație), pacienți colecistectomizați. Poate determina rezultate pozitive la testele antidoping.
RA: Constipație, greață, vomă, somnolență, vertij, depresie respiratorie, reacții alergice, rash cutanat.

GERIATON® FORTE
DAR AL DAWA; Cps. gelatin. moi conținând: Extract de ginseng 80 mg; Vit. A USP 4000 UI; Vit. B_1 USP 2 mg; Vit. B_2 USP 2 mg; Vit. B_6 USP 1 mg; Vit. B_{12} 1 µg; Vit. C USP 60 mg; Vit. D_3 USP 10 mg; Vit. E 10 mg; Niacin USP 15 mg; Acid pantotenic 10 mg; Rutin NF 20 mg; Fier 10 mg; Calciu 90,5 mg; Fosfor 70 mg; Fluor 0,2 mg; Cupru 1 mg; Potasiu 8 mg; Mangan 1 mg; Magneziu 10 mg; Zinc 1 mg; Colină 33 mg; Inozitol 33 mg; fl. × 15 cps. gelatin. moi ***(OTC)***

Ind: *La populația matură și vârstnici:* Împotriva simptomelor generale ale înaintării în vârstă: scăderea eficienței fizice și mentale, stări de oboseală, epuizare,

depresie, paramnezie, incapacitate de concentrare, insomnie, rigiditate senilă, tremor, prurit și cașexie senilă. În procesele de involuție specifică: menopauză, andropauză, stări depresive paratimice, iritabilitate, distrofie a pielii, unghiilor și a părului, deficite de vitamine și minerale datorate înaintării în vârstă.
La *populația de vârstă medie și tânără:* În stări de stres fizic și psihic, diminuarea capacității de concentrare, fatigabilitate, scăderea performanțelor, deficite de vitamine și minerale.
În general: Ca adjuvant în tratamentul hiperlipidemiei, reducerii toleranței la carbohidrați, simptomelor artrozei și osteoporozei, consecințelor dietelor hipocalorice (urmare a nutriției insuficiente sau dezechilibrate, a diverselor diete, cure de slăbire etc.), convalescențelor după infecții, operații, radioterapie; îmbunătățește tonusul general.
Dz: Uzual se administrează 2 capsule pe zi primele 2-3 săptamâni – o capsulă în timpul micului dejun și una în timpul prânzului – apoi o capsulă pe zi, la micul dejun. Se recomandă administrarea în cure de câteva luni, ce se pot relua după anumite intervale de timp. Se poate administra continuu persoanelor vârstnice. Se recomandă administrarea capsulelor cu lichide.
A!: În unele cazuri de diabet senil s-a constatat o ameliorare a toleranței la carbohidrați. În astfel de cazuri se pot scădea dozele zilnice de antidiabetice, sub strictă supraveghere medicală.

GEROVITAL H$_3$ *COD ATC: A13AN01*
SICOMED SA; Dj./F. a 5 ml conținând: clorhidrat de procaină 100 mg; ac. benzoic 6 mg; clorură de potasiu 5 mg; fosfat de sodiu 0,5 mg (dj.) ***(P-6L)***/(inj.) ***(P-RF)***

Ind: Profilactic și curativ al fenomenelor de îmbătrânire. Tulburări trofice, nevrite, nevralgii, arterio-scleroza centrală și periferică, boala Parkinson, spondiloze, artroze, osteoporoză, neurodermite, eczeme, alopecie, psoriazis, sclerodermie, vitiligo, spasme vasculare, angină pectorală, sechele de infarct miocardic și posthemiplegice, arterite, astm bronșic.
Dz: Prevenirea fenomenelor de îmbătrânire: *Int.:* 2 dj./zi la 2-3 ore după mese, 12 zile cu pauză de o lună. *Inj.:* 1 f. i.m. de 3 ori/săpt., 4 săpt. cu pauză de 1-2 luni. În arterite adm. i.a. sau concomitent i.a. și periarterial. În artroze se poate adm. i.artic. și periartic. În boala astmatică și spasmele vasculare 1 f./zi i.v. foarte lent, 2-3 serii de câte 12 inj. cu o pauză de 7 zile între serii.
Cind: Sensibilitate la procaină.
RA: Cefalee, tremor, bradicardie, agitație motorie și psihică, reacții alergice.

GIARDINOCID *COD ATC: P01AXN1*
PLAFAR-CLUJ; Sol. orală cu Tra. Calendulae 49,75 g, Tra. Tanaceti 49,15 g și Aeth. Thymi 0,5 g ***(P-RF)***

Ind: Acțiune antiprotozoare și antiamoebiene.

GINKOR FORT *COD ATC: N06DX02*
BEAUFOUR IPSEN; Cps. cu extr. de Ginkgo Biloba 14 mg, heptaminol clorhidrat 300 mg, troxerutin 300 mg ***(P-6L)***

Ind: Insuficiență venolimfatică. Criză hemoroidală. Sd. premenstrual.
Dz: *Insuficiență venoasă:* 2 cps./zi. *Boală hemoroidală:* doză de atac: 4 cps./zi, 5 zile; doză de consolidare: 2 cps./zi, 5 zile. *Sd. premenstrual:* dismenoree: 2-4 cps./zi, între zilele 15-28 ale ciclului menstrual.
Cind: Hipertiroidie, asociere cu IMAO.
A!: Sportivi de performanță (pozitivarea testelor antidopping). HTA. Sarcină și alăptare.
RA: Cefalee, flush, tulburări digestive, tahicardie.

GINSAVIT *COD ATC: A13AN01*

PHARCO PHARMA.; Cps. cu extr. de Ginseng 40 mg, vit. A 4000 UI, vit. D_3 400 UI, vit. E 10 mg, vit. B_1 2 mg, vit. B_2 2 mg, vit. B_6 1 mg, vit. B_{12} 1 µg, ac. folic 400 µg, pantotenat de calciu 10 mg, nicotinamidă 15 mg, vit. C 60 mg, inositol 20 mg, cupru 1 mg, zinc 1 mg, mangan 1 mg, magneziu 10 mg, potasiu 5 mg, fer 10 mg, calciu 92 mg, fosfor 71 mg ***(OTC)***

Ind: Carențe vitaminice și minerale; dietă severă; bătrâni; polinevrite și scleroze multiple; convalescență; creșterea matabolismului celular; stimularea activității fizice și mentale.
Dz: 1-3 cps./zi.

GLIBOMET® *COD ATC: A10BD02*

LAB. GUIDOTTI SpA; Cpr. film. cu gibenclamidă 2,5 mg și 400 mg clorhidrat de metformină ***(P-6L)***

Ind: Diabet zaharat non insulino-dependent, fără cetoacidoză, care nu poate fi controlat prin dietă sau tratament cu sulfonamide.
Dz: Doza zilnică, modul și durata tratamentului trebuie stabilite de medic, în conformitate cu statusul metabolic al pacientului. De regulă, doza inițială este de 2 cpr. film./zi, în timpul meselor principale. Nu se recomandă depășirea a 2 g de metformină/zi. Ulterior, doza zilnică va fi scăzută treptat până la doza minimă suficientă pentru a controla glicemia.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului sau la alte sulfamide. Diabet zaharat latent; suspiciune de diabet zaharat. Diabet gestațional. Diabet insulino-dependent, cetoacidoză diabetică. Comă, precomă diabetică. Creatinina serică peste 12 mg/l. Acidoză lactică în antecedente la pacienții diabetici. Afectarea severă a funcției hepatice și renale. Pacienți în tratament cu diuretice sau antihipertensive care ar putea altera funcția renală. În timpul urografiei intravenoase. Decompensare cardiacă, șoc toxic sau cardiogen; tulburări de circulație arterială periferică. Boli respiratorii severe. Insuficiență corticosuprarenaliană. Alcoolism cronic. Regimuri hipocalorice severe sau repaus alimentar; boli distrofice severe. Hemoragii acute severe. Ș oc. Gangrenă. Sarcină.
A!: Consumul de băuturi alcoolice poate produce tulburări (stare de disconfort, dificultăți de respirație, palpitații, cefalee, greață și vomă) la pacienții sub tratament. În caz de traumatisme, intervenții chirurgicale, boli infecțioase și febră poate fi necesară instituirea temporară a terapiei cu insulină. Determinarea creatininei serice trebuie efectuată înainte de inițierea tratamentului,

apoi din 2 în 2 luni pentru primele șase luni, apoi la fiecare șase luni. Pacienții trebuie instruiți de către medic să recunoască primele semne de hipoglicemie (cefalee, transpirații, iritabilitate, tremor) și de acidoză lactică (lipsa poftei de mâncare, greață, vărsături, febră, creșterea frecvenței și amplitudinii respirației, disconfort, dureri abdominale, diaree și uneori stare confuzională și pierderea cunoștinței). Acțiunea hipoglicemiantă poate fi crescută de: dicumarol, IMAO, sulfonamide, unele AINS, cloramfenicol, ciclofosfamidă, danazol, salbutamol, terbutalină, β-blocante, IEC, fluorochinolone, clofibrat, fenofibrat, pentoxifilină, probenecid, feniramidol, salicilați miconazol, sulfinpirazone, parhexiline, ingestia unor mari cantități de alcool etilic. Acțiunea hipoglicemiantă poate fi scăzută de: adrenalină, glucocorticoizi, contraceptive orale, barbiturice, diuretice tiazidice, clorpromazină. Biguanidele pot crește acțiunea anticoagulantelor.
RA: Hipoglicemia poate să apară în special la persoane debilitate, vârstnici, în caz de efort fizic intens, dietă neregulată sau consum de alcool, afectarea funcției renale și/sau hepatice. Uneori pot să apară cefalee și tulburări gastrointestinale precum greață, anorexie, gastralgii, vărsături sau diaree – necesită întreruperea terapiei. Rar pot să apară reacții alergice cutanate. Uneori nivele serice crescute de acid lactic, de lactat/piruvat, acidoză și hiperazotemie, cu evoluție nefavorabilă. Acidoza lactică poate fi favorizată și de consumul de alcool. Tulburările hematologice (anemie hemolitică, leucopenie, eozinofilie, trombopenie) sunt rare și de regulă reversibile. Consumul de alcool poate determina reacții de tip disulfiram.

GLIFORMIN® *COD ATC: A10BD02*
LABORMED PHARMA SA; Cpr. film. cu 400 mg clorhidrat de metformină și 2,5 mg glibenclamidă; ct. × 6 blist. a 10 cpr.; ct × 100 blist. a 10 cpr. *(S/P-6L)*

Ind: Tratamentul diabetului zaharat non-insulino-dependent (de tip 2) la adulți: în cazul în care dieta, exercițiile fizice și tratamentul anterior cu metformină sau sulfoniluree nu au restabilit echilibrul glicemic; ca tratament de substituție pentru terapia anterioară combinată cu metformină și o sulfoniluree la pacienții la care s-a realizat echilibrul glicemic.
Dz: Tratamentul trebuie adaptat în funcție de regimul dietetic al pacientului și de rezultatele investigaților metabolice (glicemie, glicozurie). *La pacienții care nu au răspuns la monoterapia cu metformină sau sulfoniluree:* doza inițială este de un comprimat pe zi. *La pacienții la care s-a realizat echilibrul glicemic, ca tratament de substituție pentru terapia combinată cu metformină și sulfoniluree:* doza inițială este de 1-2 comprimate pe zi, în funcție de dozele anterioare de metformină și sulfoniluree. În cazul în care răspunsul glicemic nu este satisfăcător, doza zilnică se crește treptat, sub supraveghere medicală atentă, la intervale de 1-2 săptămâni, până la atingerea dozei eficace. Doza uzuală este de 1-5 comprimate pe zi, administrată fracționat în 1-3 prize. Doza maximă recomandată este de 5 comprimate filmate pe zi. Comprimatele filmate se înghit întregi, nesfărâmate, cu un pahar cu apă, la începutul meselor.
Cind: Hipersensibilitate la clorhidratul de metformină, glibenclamidă, alte sulfoniluree sau oricare dintre excipienții medicamentului; diabet zaharat insulino-dependent (de tip I), diabet gestațional, cetoacidoză, precomă, comă diabetică; acidoză metabolică decompensată; insuficiență renală și hepatică; afecțiuni acute în care este posibilă afectarea funcției renale, cum sunt deshidratare, infecții severe, șoc, precum și în caz de examinări radiologice cu administrare intravas-

culară de substanțe de contrast iodate; boli acute sau cronice care pot determina hipoxie tisulară, cum sunt anemie, insuficiență cardiacă sau respiratorie, infarct miocardic recent, colaps, șoc; boală arterială ocluzivă periferică; intoxicație acută cu alcool etilic, alcoolism; porfirie. Sarcină și alăptare.
AI: Se întrerupe tratamentul imediat dacă se suspectează acidoza lactică. Se va respecta cu strictețe orarul meselor și aportul de hidrocarbonate deoarece apare risc de hipoglicemie. Se monitorizează funcția renală: cel puțin anual la pacienții cu funcție renală normală; cel puțin de 2 sau 4 ori pe an la pacienții cu creatininemia la limita superioară a normalului și la vârstnici. Se întrerupe tratamentul cu 48 de ore înaintea administrării substanțelor de contrast iodate, intervențiilor chirurgicale (tratamentul se reia după 48 ore). Interacțiuni: insulină, alte antidiabetice orale (derivați de sulfoniluree, acarboză); antiinflamatoare nesteroidiene; IMAO (inhibitori de monoaminooxidază); oxitetraciclină; inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei; fibrați; ciclofosfamidă sau derivații săi, cimetidină, blocante beta-adrenergice, clonidină, rezerpină, guanetidină, glucocorticoizi; combinații estroprogestative, anticoncepționale orale, adrenalină și alte simpatomimetice; glucagon; hormoni tiroidieni; tiazide și diuretice de ansă; diazoxid, fenotiazine; acid nicotinic și derivați, consum acut sau cronic de alcool, substanțe de contrast iodate, miconazol, fenilbutazonă, fluconazol, sulfamide antibacteriene, fluorochinolone, anticoagulante orale, cloramfenicol, clofibrat, pentoxifilină, disopiramidă, danazol, desmopresină. Pacienții trebuie avertizați asupra riscului de apariție a hipoglicemiei, care poate influența negativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
RA: *Legate de metformină:* greață, vărsături, diaree, dureri abdominale și scăderea apetitului (>10%), în special la inițierea terapiei; în majoritatea cazurilor dispar spontan. Pentru prevenirea apariției reacțiilor adverse gastrointestinale se recomandă administrarea zilnică a metforminei în 2-3 prize, în timpul meselor sau postprandial. Creșterea lentă a dozelor poate ameliora toleranța gastrointestinală. Gust metalic (>3%). Ocazional, pot să apară cefalee, amețeli și oboseală. Foarte rar reacții de hipersensibilitate cutanată. Rareori, în timpul tratamentului cu metformină poate să apară acidoză lactică.
Legate de glibenclamidă: hipoglicemie, erupții cutaneo-mucoase, prurit, urticarie, erupții maculo-papulare, foarte rar, vasculite alergice, cazuri de fotosensibilizare, greață, diaree, jenă epigastrică, creșterea enzimelor hepatice, cu risc de hepatită citolitică sau colestatică, leucopenie, trombocitopenie, rareori, agranulocitoză, anemie hemolitică, aplazie medulară și pancitopenie, porfirie, hiponatremie (cazuri izolate), modificarea rezultatelor testelor de laborator – creșteri ocazionale, ușoare-moderate ale uricemiei și creatininemiei – reacții de tip disulfiram în cazul asocierii cu etanolul.

GLUCONOLACTAT Ca + Mg *COD ATC: A12CCN1*
GALENIC FARM SRL; Cpr. cu gluconolactat de calciu și magneziu; fl. × 20 cpr. ***(OTC)***
SICOMED SA; Sol. inj. 5% ***(P-RF)***

Ind: Spasmofilie, tetanie cronică, idiopatică, latentă; hiperexcitabilitate neurovegetativă, cu cefalee, dureri precordiale, parestezii, tremurături, crampe și contracții musculare fasciculare, diskinezii biliare; la gravide, astenici și hiperemotivi cu deficit de magneziu; compensarea pierderilor de magneziu din trat. cu cortizonice, digitalice, diuretice, extracte de tiroidă.
Dz: 2-3 cpr./zi.

GLUTAMAG® + B$_6$ *COD ATC: A12CCN2*
SICOMED SA; Cps. cu glutamolactat de magneziu 304 mg și clorhidrat de piridoxină 62,5 mg ***(OTC)***

Ind: Spasmofilie, tetanie cronică, idiopatică, latentă; hiperexcitabilitate neurovegetativă, cu cefalee, dureri precordiale, parestezii, tremurături, crampe și contracții musculare fasciculare, diskinezii biliare; la gravide, astenici și hiperemotivi cu deficit de magneziu; compensarea pierderilor de magneziu din trat. cu cortizonice, digitalice, diuretice, extracte de tiroidă; polinevritele etilice; crize comițiale.
Dz: 4-8 cps./zi.
Cind: IR, boala Parkinson.
RA: Greață.

GRAVIBINON *COD ATC: G03FA02*
SCHERING-PLOUGH EUROPE AG; Sol. inj. cu 250 mg hidroxiprogesteron caproat și 5 mg estradiol valerat; f. × 2 ml ***(OTC)***

Ind: Insuficiență de corp galben, avort habitual, iminență de avort.
Dz: Iminență de avort: inj. i.m. 2 f. × 2 ml/săpt. până la oprirea sângerării, iar în continuare, 2 ml/săpt.
Cind: Herpes gestațional în antecedente, procese tromboembolice.
A!: Procese tromboembolice, DZ cu modificări vasculare și anemie severă.

GRIPECALM *COA ATC: N02BA51*
AESCULAP SA; Cpr. cu 250 mg acid acetilsalicilic, 100 mg paracetamol, 25 mg cafeină și 10 mg fosfat de codeină ***(S/OTC)***

Ind: Trat. al durerilor de intensitate medie sau severă cu diferite localizări: cefalee, migrene, nevralgii, mialgii, artralgii, algii dentare sau în sfera ORL, dismenoree; febră.
Dz: *Adulți și copii peste 15 ani:* 1 cpr.; doza se poate repeta la intervale de 4-6 ore, fără a depăși 4 cpr./zi. *Vârstnici:* inițial 1/2 din doza adulților, crescând în funcție de toleranță și necesități. IR: se recomandă adm. unor doze mai mici decât cele uzuale la adulți.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului; copii sub 15 ani; insuficiență hepatocelulară; IR severă; ulcer gastro-duodenal activ; hemoragie digestivă; boli hemoragice și alte boli cu risc hemoragic; deficit de G-6-PDH; astm bronșic și insuficiență respiratorie; sarcină și alăptare.
A!: La pacienții cu astm bronșic și alte afecțiuni alergice respiratorii, ca și la cei cu hipersensibilitate la AINS pot fi declanșate crize de astm bronșic și alte reacții alergice de tip anafilactic. Prudență în caz de antecedente de ulcer sau de hemoragii digestive, în IR și IH ușoare-moderate. Sportivii trebuie atenționați că acest med. poate induce pozitivarea testelor antidoping. Șoferi și activități de precizie.
RA: *Gastrointestinale:* greață, vărsături, hemoragii digestive acute grave sau oculte și ulcerații gastrointestinale (în cazul adm. orale timp îndelungat), constipație. *Hematologice:* epistaxis, gingivoragii, risc crescut de hemoragii intra- și post-operatorii. *Hepatice:* hepatotoxicitate; creșterea transaminazelor și a

fosfatazei alcaline. *Reacții alergice:* de tip anafilactic, manifestate prin erupții, mai ales urticarie, edem angioneurotic, crize de astm bronșic. *Neuropsihice:* adm. în doze mari provoacă cefalee, amețeli, tinitus, somnolență sau excitație, insomnie, neliniște, palpitații, confuzie. *Renale:* trat. prelungit poate determina nefrită interstițială și necroză papilară.

GRIPPOSTAD® C *COD ATC: N02BE51*

STADA ARZNEIMITTEL AG; Cps. cu 208 mg paracetamol acoperit tip dC, 160 mg ac. ascorbic acoperit tip FC, 25 mg cafeină anhidră și 2,5 mg maleat de clorfenamină ***(OTC)***

Ind: Răceală comună, gripă, stări febrile, inclusiv cefalee, guturai, dureri în gât, sinuzită, mialgii.
Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* 2 cpr. de maximum 4 ori/zi. *Copiii între 4-6 ani:* 1 cpr. de maximum 4 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la paracetamol sau la oricare din componenții produsului. Copii sub 6 ani. IH/IR gravă, HTA, hipertiroidism, diabet, boli cardiace. Trat. cu antidepresive triciclice, β-blocante, IMAO.
A!: Vârstnici și hipertensivi. Sarcină și alăptare.
RA: Erupții cutanate alergice, trombocitopenie, HTA cu cefalee, amețeli, palpitații, insomnie.

H

HAES-STERIL® 6% ȘI 10% *COD ATC: B05AA07*

FRESENIUS KABI GmbH; Sol. perf. 1 l conține 60/100 g poli(O-2-hidroxietil) amidon și 9 g clorură de sodiu; fl. × 250 ml sau 500 ml ***(S)***

Ind: Tratamentul și profilaxia hipovolemiei și șocului, în caz de: intervenții chirurgicale (șoc hemoragic); traumatisme (șoc traumatic); infecții (șoc septic); arsuri (șoc termic). Pentru realizarea hemodiluției terapeutice isovolemice sau hipervolemice în tulburările microcirculației periferice, cerebrale, retiniene, otice și în tulburările circulației placentare. Pentru realizarea hemodiluției normovolemice acute (HNA) în scopul reducerii necesarului de sânge de la donatori în timpul intervenției chirurgicale.
Dz: Trat. și profilaxia hipovolemiei și a șocului (substituție de volum): perfuzie i.v. maxim 33 ml/kg/zi (aprox. 2 500 ml/75 kg/zi). Viteza maximă a perfuziei este de 20 ml/kg/oră (aprox. 1 500 ml/75 kg/oră). Hemodiluția limitează utilizarea terapeutică. Durata trat. este în funcție de durata și gradul hipovolemiei. *Hemodiluția terapeutică.* Aceasta se face pentru scăderea hematocritului, în condițiile de izovolemie sau hipervolemie. Dozele și vitezele maxime de perfuzare recomandate sunt de: 250 ml sol. 6% în 0,5-2 ore (doză mică), 500 ml sol. 6% în 4-6 ore (doză medie), 2 × 500 ml sol. 6% în 8-24 ore (doză mare). Durata tratamentului este de până la 10 zile. *Hemodiluția normovolemică acută (HNA).* În cazul în care nu există alte indicații, se recomandă ca înaintea intervenției chirurgicale să se înlocuiască o parte din sângele

pacientului cu Haes-steril 6% în raport de 1:1. Înlocuirea este limitată de valoarea hematocritului, care nu trebuie să fie mai mic de 30% (după HNA). Dacă nu s-a recomandat altfel, se scot de 2-3 ori câte 500 ml sânge; acest volum se înlocuiește cu Haes-steril 6% în doză de 500 ml soluție perfuzabilă, introduși de 2-3 ori/zi. Viteza perfuziei este de 1 000 ml în 15-30 min.
Cind: IC severă, IR, coagulopatii (cu excepția cazurilor care pun viața în pericol), supraîncărcare circulatorie, hiperhidratare, deshidratare, hemoragie intracraniană; hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului.
A!: Datorită riscului de reacții anafilactice, o doză inițială de 10-20 ml Haes-steril 6%, trebuie perfuzată încet, în acest timp pacientul fiind supravegheat atent. În cazul în care soluția se perfuzează prea rapid sau în doză prea mare, există risc de supraîncărcare circulatorie. Utilizarea substituenților polimerici de plasmă la pacienții fără riscuri cardiovasculare sau pulmonare, este permisă numai dacă hematocritul este mai mare de 30%. La începutul trat. se controlează valoarea creatininei serice. Dacă este la limita pragului fiziologic (1,2-2,0 mg/dl sau 106-177 mol/l, ceea ce indică IR compensată), echilibrul hidric și parametrii de retenție renală trebuie verificați zilnic. În cazul în care valorile creatininei serice sunt normale, dar sumarul de urină prezintă modificări, trebuie suspectată o IR compensată; în asemenea cazuri, creatinina serică trebuie determinată zilnic. În timpul trat. pacienții trebuie hidratați corespunzător (2-3 l lichide pe zi). Precauție la pacienții cu EP sau cu tulburări hepatice cronice grave. În timpul tratamentului este necesar un control regulat al balanței hidroelectrolitice. Reducerea dozei până la maxim 500 ml/zi poate să scadă riscul apariției pruritului sau a altor RA.
RA: În cazuri foarte rare poate provoca reacții anafilactice (reacții cutanate, tahicardie, hTA, vărsături, șoc, bronhospasm, mergând până la insuficiență respiratorie și cardiacă). Adm. zilnică pe termen lung a unor doze medii - mari, provocă frecvent prurit refractar la tratament. Acesta poate să apară în decurs de câteva săptămâni de la întreruperea trat. și poate dura până la câteva luni. În timpul perfuziei s-au raportat, foarte rar, dureri în lojile renale. În astfel de cazuri perfuzia trebuie întreruptă imediat, pacientul trebuie să primească un aport suficient de lichide, iar valorile creatininei serice trebuie monitorizate. Datorită hemodiluției, dozele mari pot micșora coagulabilitatea sângelui și pot prelungi timpul de sângerare. Trebuie supravegheate hematocritul și concentrația proteinelor plasmatice.

HARTMAN *COD ATC: B05BB01*
HEMOFARM; Sol. perf. 1000 ml conțin 294 mg clorură de calciu, 373 mg clorură de sodiu și 3,138 g lactat de sodiu; fl. × 500 ml ***(S)***

Ind: Reechilibrare hidroelectrolitică, în special intra- și postoperator.
Dz: Perf. i.v., în funcție de starea clinică și rezultatele testelor biologice.
Cind: Hiperhidratare extracel, alcaloză metabolică, hiperpotasemie, hipercalcemie, acidoză lactică, IC.
A!: Nu se adm. intramuscular.

HEPOMETIL *COD ATC: S01CA07*
HELP PHARMA. Ltd.; Sol. oft. cu 0,1% florometalon și 0,35% sulfat de neomicină; fl. × 5 ml ***(P-RF)***

Ind: Conjunctivite bacteriene cu germeni sensibili; inflamații ale segmentului anterior ocular cu risc crescut de infecție bacteriană (în special postoperator). **Dz:** În infecții bacteriene (conjunctivite bacteriene): 1 pic. de 5 ori/zi în sacul conjunctival al ochiului afectat. În cazuri severe, 1 pic./oră 1-2 zile. Tratam. postoperator: 1 pic. de 4 ori/zi, o săpt. în sacul conjunctival al ochiului operat. **Cind:** Hipersensibilitate. Leziuni sau ulcerații corneene; infecții virale (Herpes simplex, Vaccinia) sau micoze; tbc oftalmic, glaucom. **A!:** Controlul periodic al presiunii intraoculare. Evitarea utilizării lentilelor de contact. Sarcină și alăptare. **RA:** Senzație de arsură după instilare, reacții de hipersensibilitate însoțite de prurit, congestie și fotofobie. Cataractă subcapsulară posterioară.

HEMOGAL *COD ATC: D03AXN0*

HYPERION SA; Ung. cu 10 g extr. Calendulae flos, 1 g clorhidrat de procaină, 5 g galat bazic de bismut, 5 g oxid de zinc, 5 g hidroxid de aluminiu, 200 mg mentol; tub x 20 g ***(OTC)***

Ind: Arsuri și răni superficiale, eritem solar, iritații ale pielii. **Dz:** Aplicații locale, în strat subțire 1-2 ori/zi, după o prealabilă curățare a zonei afectate.

HEMOHES 6%, 10% *COD ATC: B05AA07*

B. BRAUN MELSUNGEN AG; Sol. perf. 1 l conține 60/100 g hidroxietilamidon M 200 000 și 9 g clorură de sodiu; pH 4-7; osmolaritate teoretică 310 mOsm/l fl. × 500 ml ***(S)***

Ind: Tratamentul și profilaxia deficitelor de volum sanguin (hipovolemie) și șocului, substituție a volumului coloidal după pierderi de sânge și plasmă. Diluarea terapeutică a sângelui (hemodiluție). **Dz:** Trat. și profilaxia hipovolemiei și a șocului (substituție de volum): perfuzie i.v. maxim 33 ml/kg/zi din sol. 6% (aprox. 2 500 ml/75 kg/zi) sau 20 ml/kg/zi din sol. 10% (aprox. 1500 ml/75 kg/zi). Viteza maximă a perfuziei este de 20 ml/kg/oră (aprox. 1 500 ml/75 kg/oră). Hemodiluția limitează utilizarea terapeutică. Durata trat. este în funcție de durata și gradul hipovolemiei. **Cind:** IC severă, IR cu oligo- sau anurie, coagulopatii (cu excepția cazurilor care pun viața în pericol), supraîncărcare circulatorie, hiperhidratare, deshidratare, hemoragie intracraniană; hipersensibilitate la amidon. Copii sub 12 ani. **A!:** Datorită riscului de reacții anafilactice, o doză inițială de 10-20 ml, trebuie perfuzată încet, în acest timp pacientul fiind supravegheat atent. În cazul în care soluția se perfuzează prea rapid sau în doză prea mare, există risc de supraîncărcare circulatorie. Utilizarea substituenților polimerici de plasmă la pacienții fără riscuri cardiovasculare sau pulmonare, este permisă numai dacă hematocritul este mai mare de 30%. La începutul trat. se controlează valoarea creatininei serice. În timpul trat. pacienții trebuie hidratați corespunzător (2-3 l lichide pe zi). Precauție la pacienții cu EP sau cu tulburări hepatice cronice grave. În timpul tratamentului este necesar un control regulat al balanței hidroelectrolitice. **RA:** În cazuri foarte rare poate provoca reacții anafilactice/anafilactoide (reacții cutanate, tahicardie, hTA, vărsături, șoc, bronhospasm, mergând până la insuficiență respiratorie și cardiacă). Adm. zilnică pe termen lung a unor doze medii - mari, provoacă frecvent prurit refractar la tratament. Datorită hemodiluției, dozele mari pot micșora coagulabilitatea sângelui și pot prelungi timpul de sângerare. Trebuie supravegheate hematocritul și concentrația proteinelor plasmatice.

HEMORZON *COD ATC: C05AA01*

ANTIBIOTICE IAȘI; Sup. cu hidrocortizon 8,9 mg, tetraciclină 20 mg, benzocaină 8,3 mg și clorhidrat de procaină 5 mg; ung. cu 0,448% hidrocortizon, 0,1% lidocaină, 1% tetraciclină ***(P-6L)***

Ind: Trat. adjuvant în: hemoroizi; tromboflebită hemoroidală; proctite; criptite; prurit anal.
Dz: 1 sup. rect, o dată/zi, după defecație. La nevoie, doza poate fi crescută până la 2-3 sup./zi. După dispariția completă a fenomenelor locale se continuă cu un sup. la 2 zile, timp de încă o săptămână. Ung. se aplică în regiunea anală și în zona hemoroizilor externi, după o prealabilă curățire a regiunii, după ce bolnavul a avut scaun sau seara, la culcare. În cazurile cu dureri intense, poate fi aplicat de 2-3 ori/zi. Trat. se continuă o săptămână după amendarea fenomenelor locale, aplicându-se în zona respectivă o dată la 2 zile.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului; infecții ano-rectale bacteriene, virale și fungice; leziuni ano-rectale suprainfectate; procese TBC fistulizate de vecinătate.
A!: Trat. prelungit cu glucocorticoizi topici, în special la copii mici, trebuie evitat. Adm. topică în doze mari a glucocorticoizilor poate determina absorbția sistemică. Sarcina și alăptarea.
RA: Atrofie a mucoasei rectale în caz de utilizare prelungită.

HEMORZON "O" *COD ATC: C05AA01*

ANTIBIOTICE IAȘI; Sup. cu hidrocortizon 9,4 mg, clorhidrat de oxitetraciclină 20 mg și lidocaină 2,2 mg ***(P-RF)***

Ind: Trat. simptomatic în afecțiuni dureroase sau pruriginoase anale, în special în crizele hemoroidale.
Dz: 1 sup./zi adm. rectal seara la culcare, după toaleta locală. În cazul unor dureri intense, doza poate fi crescută, fără a depăși 3 sup./zi.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului. Alăptare.
A!: Datorită conținutului în hidrocortizon, trat. nu este indicat în afecțiuni anale de origine micotică, virală sau parazitară, în absența trat. antiinfecțios specific. Reacție pozitivă la testele de control antidoping. Sarcina.
RA: Reacții locale iritative la nivelul rectului, reacții de hipersensibilizare, infecții secundare.

HEPA-MERZ *COD ATC: A05ABN1*

PHARMA MERZ; Gran. susp. 10 g conțin L-ortin-L-aspartat 3 g (plic × 10 g); Sol. inj. cu 500 mg/ml L-ornitin-L-aspartat; f. × 10 ml ***(OTC/P-RF)***

Ind: Hepatite acute și cronice, ciroză, ficat gras.
Dz: După masă, 1-2 pachete/zi, dizolvate în puțin lichid. Inj. lent, 0,5-1,5 g ornitină/zi.

HEPASOL A *COD ATC: B05BA01*
HEMOFARM; Sol. perf.; la 1000 ml: arginină 28,9 g, asparagină 1,33 g, sorbitol 50 g, acid malic 14,7 g, sodiu hidrogencarbonat 3,032 g, clorură de potasiu 2,98 g, vitamină B_2 1 mg, nicotinamidă 100 mg, dexpantenol 20 mg, vitamină B_6 80 mg; fl. × 500 ml ***(S)***

Ind: În stări de comă și precomă apărute din cauza nefuncționalității parțiale a parenchimului hepatic în hepatita acută sau cronică, ciroza hepatică, encefalopatia hepatică, în stări postoperatorii de anastomoză porto-cavală, sângerări produse de varicele esofagiene, creșterea nivelului de amoniac în sânge în urma leziunilor tisulare extinse (arsuri).
Dz: Terapia se stabilește în funcție de amoniacul din sânge și răspunsul individual al bolnavului. Uzual se adm. 500 ml sub formă de perfuzie i.v. lentă, aprox. 40 picături/min. Perfuzarea acestei cantități se continuă la fiecare 12 ore până la înlăturarea simptomelor neurologice.
Cind: La bolnavii la care funcția rinichilor a încetat pe deplin sau la cei cu anurie, precum nici la bolnavii cu IC. În cazurile în care coma hepatică este asociată cu afecțiuni grave ale rinichilor, trebuie întotdeauna apreciat care dintre cele doua stări patologice prezintă riscul vital maxim.
A!: Înainte și după adm. argininei trebuie monitorizat nivelul de potasiu, fosfat și clor din ser, îndeosebi la diabetici. Tiopentalul este incompatibil cu arginina. Asocierea argininei cu spironolactona provoacă hiperkaliemie gravă. Prezența nicotinamidei în soluția în care este aplicat cefaloridinul reduce acțiunea antibiotică a acestuia.

HEPATHROMBIN 30000 *COD ATC: C05BA53*
HEMOFARM; Gel/ung. cu 30000 UI heparină, 300 mg/25 mg alantoină și 400 mg/250 mg dexpantenol; tub × 40 g ***(OTC)***

HEPATHROMBIN 50000 *COD ATC: C05BA53*
HEMOFARM; Gel/ung. cu 50000 UI heparină, 300 mg/25 mg alantoină și 400 mg/250 mg dexpantenol; tub × 40 g ***(OTC)***

Ind: Tromboze, tromboflebite, varice. Hematoame, traumatisme, contuzii, întinderi de ligamente, tendoane, tasări, striviri, entorse.
Dz: Aplicațiii pe zonele afectate.
Cind: Nu se aplică pe mucoase și pe răni deschise.
RA: Reacții alergice.

HERMES® MULTIVIT JUNIOR *COD ATC: A11JB*
HERMES ARZNEIMITTEL GmbH; Cpr. eff. cu 0,7 mg vit. B_1, 0,8 mg vit. B_2, 9 mg vit. B_3, 3 mg vit. B_5, 1 mg vit. B_6, 0,5 µg vit. B_{12}, ac folic 0,1 mg, biotină 0,075 mg, 1333 UI vit. A, 100 UI vit. D_3, 30 mg vit. C, 5 mg vit. E, carbonat de calciu 625 mg ***(OTC)***

Ind: Profilaxia deficitului de vitamine și minerale, în cazul în care necesarul nu poate fi asigurat prin alimentație.
Dz: *Copii peste 4 ani:* 1-2 cpr./zi; după dizolvare într-un pahar cu apă (aproximativ 150 ml).
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului.
A!: În cazul în care se adm. concomitent alte produse conținând vitamine, trebuie avută în vedere doza maximă de vitamine A și D, pentru a evita supradozarea.

HERMES MULTIVIT® + MINERALS *COD ATC: A11JB*
HERMES ARZNEIMITTEL GmbH; Cpr. eff. cu 1,4 mg vit. B_1, 1,6 mg vit. B_2, 18 mg vit. B_3, 6 mg vit. B_5, 2 mg vit. B_6, 1 µg vit. B_{12}, ac folic 0,2 mg, biotină 0,15 mg, 2666 UI vit. A, 200 UI vit. D_3, 60 mg vit. C, 10 mg vit. E, oxid de magneziu 79,5 mg, carbonat de calciu 300 mg ***(OTC)***

Ind: Profilaxia deficitului de vitamine și minerale, în cazul în care necesarul nu poate fi asigurat prin alimentație.
Dz: 1 cpr. eferv./zi; ad mint, dizolvat într-un pahar cu apă (aproximativ 150 ml).
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului.
A!: În cazul în care se adm. concomitent alte produse conținând vitamine, trebuie avută în vedere doza maximă de vitamine A și D, pentru a evita supradozarea. Sarcina și alăptarea.

HERPESTOP® *COD ATC: D06BBN1*
ARMEDICA SA; Cremă cu clorhidrat de moroxidină 3 g și lidocaină 0,1 g ***(P-RF)***

Ind: Herpes simplex, Zoster, impetigo herpetiform.
Dz: Aplicații de 3-4 ori/zi pe zona lezată.
Cind: Alergie.
RA: Reacții alergice.

HEXORALETTEN N *COD ATC: R02AA05*
PFIZER H.C.P. CORPORATION; Cpr. de supt cu 5 mg clorhidrat de clohexidină și 1,5 mg benzocaină (fără zahăr) ***(OTC)***

Ind: Reducerea temporară a numărului de bacterii patogene din cavitatea oro-faringiană în cazul durerilor faringiene, stomatitelor și/sau gingivitelor.
Dz: *Adulți și adolescenți:* un cpr. de supt de mai multe ori pe zi. Dacă este necesar, se poate suge un cpr. la fiecare 1-2 ore, până la maximum 8 cpr./zi. *Copii (4-12 ani).* Până la 4 cpr. de supt pe zi. *Vârstnici.* Notă pentru diabetici. Conținutul în hidrocarbonați al unui cpr. de supt corespunde cu 0,1 unități de pâine.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre compușii produsului, în cazul plăgilor și ulcerațiilor din cavitatea oro-faringiană, în cazul diminuării nivelului plasmatic al colinesterazei, la copii cu vârsta sub 4 ani.
A!: Precauție sau sub supravegherea medicului în cazul eroziunilor și leziunilor descuamative ale mucoasei orale. Datorită metabolitului său 4-aminobenzoat, benzocaina reduce efectele sulfonamidelor și aminosalicilaților.

RA: După o administrare îndelungată poate apărea o afectare tranzitorie a senzației gustative și amorțeală la nivelul limbii. Adm. pe termen lung a preparatelor cu clorhexidină poate duce la colorarea danturii, care poate fi totuși înlăturată prin tratament stomatologic; de asemenea, se poate produce colorarea reversibilă a limbii. Benzocaina poate duce la reacții de hipersensibilitate și, în rare cazuri, chiar la șoc anafilactic. În asociere cu adm. de preparate cu benzocaină poate apărea methemoglobinemie la copiii mici.

HIDROMORFON CU ATROPINĂ *COD ATC: N02AG04*

SICOMED SA; Sol. inj. cu clorhidrat de hidromorfon 0,2%, sulfat de atropină 0,03%; f. × 1 ml ***(S/P-TS)***

Ind: Preanestezie, analgezie postoperatorie. IMA, infarct pulmonar, EPA, traumatisme cu dureri violente, arsuri de gradul II, colică biliară, saturnină și renală. Dureri tabetice, neoplazice.
Dz: Inj. i.m., s.c., i.v. *Adulți:* 1-2 f. în 24 de ore. *Copii: 10-15 ani,* 0,1 mg/5 kg corp.
Cind: Abdomen acut, insuficiență circulatorie, I Resp, IR, traumatisme craniocerebrale, glaucom.
A!: Copii sub 10 ani.

HIRODOID® *COD ATC: C05BA51*

SANKYO; Gel/cremă; 100 g conțin 300 mg mucopolizaharid polisulfat (organo-heparinoid "Luitpold" 25000 UI); tub × 40 g ***(OTC)***

Ind: Afecțiuni ale venelor superficiale: flebită, tromboflebită, varicoflebită, flebite datorate unor puncții venoase; varicozități postscleroterapie; hematoame, contuzii; fonoforeză, ionoforeză.
Dz: Se aplică pe tegumente o dată sau de mai multe ori pe zi. Se recomandă să se scoată din tub 3-5 cm cremă odată; doza poate fi crescută în funcție de gravitatea și întinderea leziunilor. Se aplică pe zona afectată și se masează ușor, până pătrunde în totalitate în piele; la nevoie tegumentele pot fi acoperite cu un bandaj. În cazul inflamațiilor însoțite de durere puternică, se aplică foarte ușor atât pe zona afectată, cât și în jurul acesteia; zona se acoperă cu tifon. Pentru realizarea ionoforezei preparatele se aplică sub catod.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produselor.
A!: Nu se va aplica decât pe tegumentele intacte. Trebuie evitat contactul cu mucoasele, ochii și plăgile deschise.
RA: În cazuri izolate au apărut iritații ale pielii și reacții alergice.

HUMEX RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ *COD ATC: R01BA52*

LAB. URGO; Cpr. cu paracetamol 500 mg, clorhidrat de pseudoefedrină 60 mg. Cps. cu paracetamol 500 mg, maleat de clorfeniramină 4 mg ***(OTC)***

Ind: Trat. simptomatic de scurtă durată al stărilor gripale însoțite de cefalee și/sau febră.
Dz: 1 cpr. alb de zi dimineața și 1 cps. bleu-alb de noapte, seara înainte de culcare; dacă este necesar se poate adm. încă 1 cpr. la prânz și unul

seara devreme, max. 3 cpr. și 1 cps./zi. Se va respecta un interval între prize de cel puțin 4 ore. Intervalul crește la 8 ore în IR severă.
Cind: Copii sub 15 ani. Hipersensibilitate la una dintre componentele produsului. Glaucom cu unghi închis. Retenție urinară în afecțiunile uretro-prostatice. HTA severă. Insuficiență coronariană severă. IH. Asocierea cu IMAO. Sarcina și alăptarea.
A!: În intervențiile chirurgicale programate se va întrerup trat. cu câteva zile înainte, datorită riscului apariției puseelor hipertensive și a aritmiilor cardiace intraoperator în cazul în care se face anestezia cu un compus volatil halogenat. Sportivii vor fi atenționați asupra faptului că pseudoefedrina poate induce o reacție pozitivă a testelor antidoping. Prudență în IH și/sau IR, vârstnici cu tendință crescută la hTA ortostatică, vertij, sedare, constipație cronică (risc de ileus paralitic), hipertrofie prostatică. Șoferi și activități de precizie.
RA: *Neurovegetative:* sedare sau somnolență, uscăciunea mucoaselor, cefalee, anxietate, constipație, tulburări ale acomodării, midriază, palpitații, retenție urinară, crize de glaucom prin închiderea unghiului la persoanele predispuse, afectarea secreției lactate, hipotensiune ortostatică, tulburări ale echilibrului, vertij, scăderea memoriei sau a concentrării mai frecvent la persoanele vârstnice, tulburări ale coordonării motorii, tremurături, confuzii, halucinații. *Reacții alergice:* eritem, eczemă, purpură, urticarie, edem, foarte rar edem Quincke și șoc anafilactic. *Hematologice:* leucopenie, neutropenie, trombocitopenie, anemie hemolitică.

HUMOXAL *COD ATC: R01AB01*
LAB. URGO; Sol. nazală; 100 ml conțin 0,04 g clorură de benzalconiu și 0,25 g clorhidrat de fenilefrină; fl. × 15 ml ***(OTC)***

Ind: Rinite alergice, vasomotorii, sinuzită asociată.
Dz: *Adult și copil peste 6 ani:* o pulverizare în fiecare nară de 1-2 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la componentele produsului. Rinite uscate.
RA: Hiperemie reactivă, senzație de arsură, posibile efecte sistemice.

HYZAAR *COD ATC: C03AX01*
MERCK SHARP & DOHME; Cpr. film. cu 50 mg hidroclortiazidă și 12,5 mg losartam (potasic) ***(P-6L)***

Ind: Trat. HTA, la pacienții la care este necesară terapia combinată. Terapie inițială la pacienții cu HTA severă.
Dz: Doza uzuală de atac și de întreținere este un cpr. o dată pe zi. Pentru pacienții care nu răspund adecvat, doza poate fi crescută la 2 cpr. o dată pe zi. Efectul antihipertensiv este atins în 3 săptămâni de la inițierea adm. Nu se va adm. la pacienții cu depleție a volumului intravascular (de ex., cei tratați cu doze mari de diuretice). Nu este recomandat la pacienții cu afecțiuni renale/hepatice severe. La pacienții vârstnici nu este necesară ajustarea dozei inițiale.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele acestui produs; pacienții cu anurie; pacienții cu hipersensibilitate la alți derivați de sulfonamide. Sarcină și alăptare
A!: *Losartan – hidroclorotiazidă. Afecțiuni hepatice și renale.* Nu este recomandat în afecțiuni hepatice sau afecțiuni renale severe (clearance de crea-

tinină 30 ml/min). *Losartan. Funcție renală alterată.* La pacienții cu stenoză bilaterală de arteră renală sau cu stenoza acestei artere pe rinichi unic, administrarea altor medicamente care afectează sistemul renină-angiotensină poate determina creșterea ureei plasmatice și a creatininei serice. *Hidroclorotiazidă. hTA și dezechilibru hidroelectrolitic.* La unii pacienți poate apărea hTA simptomatică. Pacienții trebuie observați pentru depistarea semnelor clinice ale dezechilibrului hidroelectrolitic, de ex. depleție de volum, hiponatremie, alcaloză hipocloremică, hipomagnezemie sau hipopotasemie care pot apărea în cursul diareei intercurente sau vomei. *Efecte metabolice și endocrine.* Terapia cu tiazide poate afecta toleranța la glucide. Poate fi necesară ajustarea dozelor de antidiabetice, inclusiv insulină. Tiazidele pot reduce excreția urinară de calciu și pot determina creșterea ușoară a calciului seric. O hipercalcemie marcată poate indica un hiperparatiroidism latent. Tiazidele trebuie întrerupte înaintea efectuării testelor pentru funcția paratiroidiană. Terapia cu diuretice tiazidice se poate însoți de creșteri ale nivelurilor de colesterol și trigliceride. La anumiți pacienți, hiperuricemia și/sau guta pot fi precipitate de tratamentul cu tiazide. Interacțiuni medicamentoase: Hidroclorotiazidă. În cazul adm. concomitente, med. următoare pot interacționa cu diureticele tiazidice: Alcool, barbiturice sau narcotice – pot potența hTA ortostatică. Antidiabetice orale și insulină – poate fi necesară ajustarea dozei medicamentului antidiabetic. Alte antihipertensive – efect aditiv. Colestiramină și rășini – absorbția hidroclorotiazidei este scăzută. Corticosteroizi, ACTH – depleție accentuată de electroliți, mai ales hipopotasemie. Amine presoare – posibilă scădere a răspunsului la aminele presoare, dar nu suficientă pentru a împiedica folosirea lor. Relaxante ale musculaturii scheletice, nedepolarizante (tubocurarină) – posibilă creștere a răspunsului la relaxantul muscular. Litiu – agenții diuretici cresc riscul de toxicitate prin litiu; nu se recomandă adm. concomitentă cu diuretice. AINS – pot reduce efectele diuretice, natriuretice și antihipertensive ale diureticelor. Interacțiuni cu testele de laborator – datorită efectelor lor asupra metabolismului calciului, tiazidele pot modifica rezultatele testelor pentru funcția paratiroidiană.

RA: Au fost limitate la acelea care au fost raportate anterior cu losartan potasic și/sau hidroclorotiazidă. Uneori vertij.

IDEOS *COD ATC: A11JB*
INNOTECH INTERNAT.; Cpr. mast cu carbonat de calciu 1250 mg și colecalciferol 400 UI ***(P-6L)***

Ind: Corecția deficitelor de vit. D și calciu la vârstnici. Terapie adjuvantă în osteoporoză.

Dz: 1 cpr. de 2 ori/zi; cpr. se vor mesteca.

Cind: Hipersensibilitate. Hipercalcemie, hipercalciurie, litiază calcică.

A!: În cazul trat. simultan cu un alt preparat de vit. D, trebuie calculată doza totală de vit. D primită. Se monitorizează calcemia și funcția renală la pacienții vârstnici. În caz de IR, dozajul va fi adaptat în funcție de clearance-ul creatininei. Imobilizarea prelungită este însoțită de hipercalcemie sau/și hipercalciurie; trat. cu vit. D și calciu trebuie inițiat doar în momentul în care pacienții

pot fi mobilizați. Prudență la asocierea cu: digitalice, diuretice tiazidice, tetraciclină, bifosfonați, fluorură de sodiu, fenitoină, barbiturice, glucocorticoizi. Sarcina și alăptarea.
RA: Constipație, flatulență, greață, epigastralgii, diaree; hipercalciurie și hipercalcemie.

IMACORT *COD ATC: D07XA02*

SPIRIG SA; 1 g cremă conține 10 mg clotrimazol, 2,5 mg hexamidin și 5 mg prednisolon acetat; tub × 20 g ***(P-RF)***

Ind: Dermatomicoze provocate de dermatofiți, mucegaiuri, levuri și alte ciuperci. Onicomicoze.
Dz: Se aplică local, de 2-3 ori/zi, 4 săptămâni.
Cind: Hipersensibilitate la clotrimazol.

INFECTOFLAM *COD ATC: S01CA07*

NOVARTIS OPHTALMICS AG; Sol. oft. cu fluorometolonă 1 mg, gentamicină 3 mg/ml; fl. × 5 ml; ung. cu fluorometolonă 1 mg, gentamicină 3 mg/g; tub × 4 g ***(P-RF)***

Ind: Conjunctivite bacteriene cu germeni sensibili; inflamații ale segmentului anterior ocular cu risc crescut de infecție bacteriană (în special postoperator).
Dz: *Sol.:* infecții bacteriene (conjunctivite bacteriene): 1 pic. de 5 ori/zi în sacul conjunctival al ochiului afectat. În cazuri severe, 1 pic./oră, 1-2 zile. Tratam. postoperator: 1 pic. de 4 ori/zi, o săpt. în sacul conjunctival al ochiului operat. *Ung:* se aplică 5 mm de ung. de 3-4 ori/zi în sacul conjunctival al ochiului afectat.
Cind: Hipersensibilitate. Leziuni sau ulcerații corneene; infecții virale (Herpes simplex, Vaccinia) sau micoze; tbc oftalmic, glaucom.
A!: Controlul periodic al presiunii intraoculare. Evitarea utilizării lentilelor de contact. Sarcină și alăptare.
RA: Senzație de arsură după instilare, reacții de hipersensibilitate însoțite de prurit, congestie și fotofobie. Cataractă subcapsulară posterioară.

INFESOL 40 X-E *COD ATC: B05BA01*

BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP; Sol. perfuzabilă ce conține: L-alanină 4,00 g; glicină 7,00 g; L-arginină 4,55 g; acid L-aspartic 2,00 g; acid L-glutamic 5,00 g; L-histidină 1,35 g; L-isoleucină 2,10 g; clorhidrat de L-lizină 2,50 g; L-metionină 1,75 g; L-leucină 2,75 g; L-fenilalanină 3,15 g; L-treonină 1,60 g; L-triptofan 0,50 g; L-valină 2,25 g; xilitol 50,00 g; acetat de sodiu 3,40 g; clorură de potasiu 1,86 g; clorură de magneziu 0,51 g; hidroxid de sodiu 0,60 g; K^+ 25,00 mmol; Na^+ 40,2 mmol; Mb^{2+} 2,5 mmol; Cl^- 43,6 mmol; acetat 25,00 mmol; fl. × 100 ml ***(S)***

Ind: Profilaxia și terapia deficiențelor proteice, refacerea patului vascular.
Dz: Perfuzie i.v. lent. *Adulți:* 0,6-1,0 g aminoacizi (până la 25 ml)/kg/zi; În stări catabolice: 1,3-2,0 g aminoacizi (până la 50 ml)/kg/zi; *Sugari și copii mici:* 1,5-2,5 g aminoacizi (până la 60 ml)/kg/zi.

Cind: Hipersensibilitate, astmatici, deficiențe hepatice grave, tulburări în metabolismul aminoacizilor, acidoză lactică, traumatisme craniene acute, hiperhidratare, intoxicație cu metanol.
A!: IC, acidoză. IR, hiperpotasemie, șoc (se va asigura o diureză satisfăcătoare).
RA: Greață, vomă, frisoane și inflamația pereților venoși. Reacții de hipersensibilitate.

INFUSAMIN 10% *COD ATC: B05BA01*
HUMAN SERUM PRODUCTION & MEDICINE MANUFACTURING Co. Ltd.; Sol. perf. cu: L-Izoleucină 5,60 g/l; L-Leucină 12,50 g/l; L-Lizină (acetat) 8,80/12,40 g/l; L-Metionină 3,50 g/l; L-Fenilalanină 9,35 g/l; L-Treonină 6,50 g/l; L-Triptofan 1,30 g/l; L- Valină 4,50 g/l; L-Tirozină 0,35 g/l; L-Cisteină bază 1,00 g/l; L-Histidină bază 6,00g/l; L-Arginină bază 7,90 g/l; L-Acid aspartic 3,80 g/l; L-Acid glutamic 6,50 g/l; L-Alanină 6,20 g/l; L- Serină 2,20 g/l; L-Prolină 3,30 g/l; Glicină 10,70 g/l; Sodiu bisulfit 0,457 g/l; fl. × 500 ml sau 1000 ml ***(S)***

Ind: Pierderi crescute de proteine sau malabsorbție proteică în: traumatisme, arsuri, hemoragii severe, complicații postoperatorii, vărsături și diaree severă sau cronică, tulburări cronice gastrointestinale (ulcer, stenoză), neoplazii cu cașexie, stări acute și cronice toxico-septice. Stări care nu permit alimentația orală.
Dz: Adm. i.v. lent. *Adulți:* 0,8-1,6 g aminoacizi/kg/zi, max. 2 g aminoacizi/kg/zi. *Copii sub 12 luni:* 1,5-2,5 g aminoacizi/kg/zi; *Copii peste 12 luni:* 1-2 g aminoacizi/kg/zi.
Cind: Tulburări ale metabolismului aminoacizilor. Tulburări severe ale microcirculației (șoc). IC decompensată. IR și IH în faza terminală. Acidoză metabolică. Hiperhidratare. Hipokaliemie.
A!: Monitorizarea aportului caloric, echilibrului hidroelectrolitic și acidobazic, ionogramei serice, și a parametrilor metabolici ai proteinelor, lipidelor și carbohidraților. Hiponatremie.
RA: *Reacții alergice:* erupții cutanate, prurit. *Tulburări gastrointestinale:* grețuri, vărsături, diaree, dureri epigastrice. *Tulburări cardio-vasculare:* palpitații, extrasistole, hTA. *Alte tulburări:* oboseală, cefalee, tremor, amețeli, arsuri. Transaminazele și azotul crescute.

INTRALIPID® 10% *COD ATC: B05BA02*
FRESENIUS KABI GmbH; Emulsie inj. cu ulei de soia 100 g/l; pH 8. Osmolalitate (mOsm/kg apă) 300; fl. × 100 ml sau 500 ml ***(S)***

Ind: Deficit de acizi grași esențiali.
Dz: *Adulți:* 3 g TG/kg/zi cu o rată a perfuziei de 500 ml în 5 ore. *Nou-născuți și sugari:* 0,54 g TG/kg/zi. Rata perfuziei nu trebuie să depășească 0,17 g TG/ kg/oră (4 g/kg/zi).
Cind: Stare de șoc, tulburări severe ale metabolismului lipidic. Hipersensibilitate.
A!: Metabolism lipidic alterat, IR, DZ decompensat, pancreatită, hipotiroidism (cu hipertrigliceridemie), septicemie. Monitorizarea numărului trombocitelor, testelor hepatice și concentrației plasmatice a TG. Sarcină și alăptare.
RA: Febră, frison, greață, vărsături, reacții de hipersensibilitate.

INTRALIPID® 20% *COD ATC: B05BA02*
FRESENIUS KABI GmbH; Emulsie inj. cu ulei de soia 200 g/l; pH 8. Osmolalitate (mOsm/kg apă) 350; fl. × 100 ml; 250 ml sau 500 ml ***(S)***

Ind: Deficit de acizi grași esențiali.
Dz: *Adulți:* 3 g TG/kg/zi cu o rată a perfuziei de 500 ml în 5 ore. *Nou-născuți* și *sugari:* 0,54 g TG/kg/zi. Rata perfuziei nu trebuie să depășească 0,17 g TG/kg/oră (4 g/kg în 24 de ore).
Cind: Stare de șoc, tulburări severe ale metabolismului lipidic. Hipersensibilitate.
A!: Metabolism lipidic alterat, IR, DZ decompensat, pancreatită, hipotiroidism (cu hipertrigliceridemie), septicemie. Monitorizarea numărului trombocitelor, testelor hepatice și concentrației plasmatice a TG. Sarcină și alăptare.
RA: Febră, frison, greață, vărsături, reacții de hipersensibilitate.

INTRALIPID® 30% *COD ATC: B05BA02*
FRESENIUS KABI GmbH; Emulsie inj. cu ulei de soia 300 g/l; pH 8. Osmolalitate (mOsm/kg apă) 310; fl. × 250 ml sau 500 ml ***(S)***

Ind: Deficit de acizi grași esențiali.
Dz: Perf. i.v. *Adulți:* max. 3 g/kg/zi în combinație cu soluții de aminoacizi și carbohidrați.
Cind: Tulburări severe ale metabolismului lipidic, IR severă, șoc.
A!: IR, diabet necompensat, tulburări metabolice, septicemie, nou-născuți și sugari.
RA: Febră, frison, creșterea nivelului transaminazelor, fosfatazei alcaline și bilirubinei.

ISCHEMOL-A *COD ATC: S01GA52*
FARMILA FARMACEUTICI; Sol. oft. cu 0,05% tetrahidrozolină și 0,1% clorfeniramină maleat; fl. × 10 ml ***(P-6L)***

Ind: Forme alergo-congestive ale conjunctivei și anexelor ochiului.
Dz: 1-2 picături în sacul conjunctival, de 2-5 ori/zi.
Cind: La bolnavii de glaucom cu unghi închis sau alte maladii grave ale ochiului și la copii sub 3 ani. Hipersensibilitate la una din componente.

ISOTREXIN® *COD ATC: D10AD54*
STIEFEL LAB. Ltd.; Gel 100 g conțin 0,05 g isotretinoin și 2 g eritromicină; tub × 30 g ***(P-6L)***

Ind: Acneea chistică și acneea conglobată.
Dz: Aplicații locale pe zona afectată o dată/zi, timp de 10-12 săptămâni.
Cind: Hipersensibilitate la componentele produsului. Sarcină și alăptare.
A!: Adm. simultană a altor keratolitice sau exfoliative nu este indicată, nici trat. concomitent cu UV; expunerea la soare trebuie evitată.
RA: Uscarea mucoaselor, iritație locală, descuamare, alergii, reacții de fotosensibilitate.

IZOCON A *COD ATC: D07XA01*

I & I EXIM VIVA FARM. SRL; 100 g cremă conțin nitrat de izoconazol 1 g, acetat de hidrocortizon 0,1 g ***(P-RF)***

Ind: Infecții fungice superficiale ale pielii însoțite de eczeme și de fenomene inflamatorii, localizate mai ales la nivelul mâinii, spațiilor interdigitale ale piciorului, regiunii inghinale și genitale. Terapia eritrasmei. Pitiriazis versicolor. Keratite micotice. Lichen plan.

Dz: Se aplică la nivelul zonelor cutanate afectate.

Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului. Leziuni tbc sau sifilitice la nivelul regiunilor pe care se aplică crema; afecțiuni virale (vaccină, zona zoster, varicelă). Sarcina și alăptarea.

A!: Se evită aplicarea pe arii cutanate întinse sau timp îndelungat; în aceste situații există riscul apariției RA determinate de absorbția sistemică a glucocorticoidului, în special la sugar și la copilul mic. Aplicarea la nivelul feței trebuie efectuată cu grijă, pentru a evita contactul cu ochii.

RA: Rar, semne de iritație sau reacții alergice locale. După aplicarea pe zone întinse și timp îndelungat, pot să apară atrofie cutanată dermo-epidermică (atenție mai ales la sugari și pe perioadă de timp mai mare de 4 săpt.), telangiectazii, vergeturi, acnee steroidiană, dermatită periorală, hipertricoză (mai ales la nivelul feței), precum și RA sistemice (la doze repetate și pe o perioadă lungă de timp).

IZORIFARM *COD ATC: J04AM02*

SICOMED SA; Cps. cu 300 mg pirazinamidă, 50 mg izoniazidă și 120 mg rifamicină ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. tbc pulmonare și extrapulmonare.

Dz: 1 cpr./15 kg corp, fără a depăși doza de 4 cpr./zi, în priză unică, cu 1-2 ore înainte de masă. Durata trat. se stabilește în funcție de răspunsul terapeutic, de sensibilitatea tulpinii izolate și de recomandările prevăzute de *Programul național antituberculos*. Nu este recomandată pentru tratamentul intermitent. Pacientul trebuie prevenit asupra riscului întreruperii intenționate/accidentale a trat. zilnic, deoarece au fost semnalate cazuri de reacții adverse renale grave la reluarea tratamentului.

Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului. IH, icter. Porfirie. Atac de gută. Nevrită optică. Intervenții care necesită anestezie generală. Alăptare.

A!: *Rifampicina.* Se recomandă prudență la pacienții cu IH preexistentă (monitorizare atentă a funcțiilor hepatice); în cazul apariției semnelor de afectare hepatocelulară în timpul tratamentului se întrerupe adm. În IR severă este necesară reducerea dozelor. Reluarea tratamentului după o pauză îndelungată se face cu doze mici, care se cresc treptat. În această situație este necesară supravegherea funcției hepatice și renale. *Isoniazida.* Datorită efectului hepatotoxic, se recomandă supravegherea atentă a funcțiilor hepatice, mai ales în cursul primelor 3 luni de tratament și în cazul asocierii cu rifampicina. Datorită riscului de apariție a neuropatiei periferice se recomandă efectuarea unui examen neurologic regulat și prudență la pacienții alcoolici. Asocierea de piridoxină previne, în mare parte, tulburările nevritice. În IR severă este necesară adaptarea dozei în funcție de concentrația plasmatică de isoniazidă. Isoniazida poate produce convulsii în caz de supradozaj (la acetilatori lenți). Interacțiuni medicamentoase: *Rifampicina.* Cind: asocierea cu

saquinavir și ritonavir. În cazul folosirii de asociații estro-progestative, se recomandă asocierea altor mijloace contraceptive. Asocierea cu următoarele medicamente obligă la prudență și la ajustarea dozelor acestora: anticoagulante, digitalice, antiaritmice clasa I, β-blocante, teofilină, fenobarbital, fenitoină, benzodiazepine, haloperidol, nortriptilină, tolbutamidă, glucocorticoizi, levotiroxină, ciclosporină și tacrolimus, cloramfenicol, claritromicină, zidovudină, indinavir, dapsonă. *Isoniazida.* Asocierea isoniazidei cu disulfiramul poate fi cauză de tulburări de comportament și incoordonare motorie. Antiacidele cu aluminiu scad absorbția digestivă a isoniazidei. Asocierea isoniazidei cu pirazinamida și rifampicina crește efectul hepatotoxic. Anestezicele volatile halogenate favorizează efectul hepatotoxic al isoniazidei. Glucocorticoizii scad concentrația plasmatică a isoniazidei. Isoniazida scade concentrația plasmatică a ketoconazolului și crește concentrația plasmatică a fenitoinei și carbamazepinei.
RA: *Rifampicina.* Adm. cronic provoacă frecvent creșterea enzimelor hepatice, mai rar hepatită cu icter, de regulă ușoară și reversibilă la oprirea trat. Alte RA: disconfort epigastric, greață, vărsături, dureri abdominale, diaree, prurit, erupții alergice, febră, rareori purpură, leucopenie, ocazional, tulburări nervos centrale. Sunt posibile reacții alergice, mai frecvente în condițiile folosirii intermitente: sindrom pseudogripal, rareori nefrită interstițială, trombocitopenie, anemie hemolitică, șoc. Poate colora urina (în roșu) și lentilele de contact. *Isoniazida.* Isoniazida provoacă relativ frecvent afectarea toxică a ficatului cu creșterea enzimelor hepatice și hepatită. Un accident toxic frecvent este nevrita periferică, ce este atribuită deficitului de piridoxină; alte fenomene nedorite datorate deficitului de piridoxină sunt: nevrita optică, dermatita, anemia. Au fost semnalate: amețeli, ataxie, convulsii, tulburări psihice, ca și unele efecte nedorite periferice: uscăciunea gurii, constipație, dificultate în micțiune. *Pirazinamida.* Poate provoca anorexie, tulburări ale hematopoezei, erupții, fotosensibilizare, hiperuricemie.

J

JEANINE® *COD ATC: G03FA15*
JENAPHARM GmbH & Co.KG; Dj. cu 2 mg dienogest și 0,03 mg etinilestradiol ***(P-6L)***

Ind: Terap. de substituție hormonală pentru trat. simptomelor deficienței de estrogeni la femeia la care menopauza a apărut de cel puțin un an și care are uter.
Dz: 1 dj./zi. Un ciclu de tratament se desfășoară pe o perioadă de 28 zile. Tratamentul este continuu, ceea ce înseamnă că următoarea folie se începe imediat, fără pauză. La pacientele care nu au mai făcut terapie de substituție hormonală sau la cele care au trecut de la un produs de terapie de substituție hormonală combinată continuă, trat. poate fi început în orice zi. La pacientele care trec de la o terapie de substituție hormonală secvențială, trat. se începe în ziua următoare terminării tratamentului anterior. Dacă se uită să se ia dj. la ora obișnuită, acesta trebuie luat cât mai curând posibil, dar fără să treacă peste 24 ore. Dacă trat. este întrerupt pentru mai multă vreme, poate apărea sângerare vaginală.
Cind: Sângerare vaginală de etiologie nediagnosticată. Cancer mamar, suspiciune de cancer mamar sau antecedente de cancer mamar. Stări premaligne sau maligne, cunoscute sau suspectate, dacă sunt dependente de hor-

monii sexuali steroidieni. Afecțiuni hepatice acute sau cronice sau antecedente de boli hepatice la care valorile testelor hepatice nu au revenit la normal. Tromboembolism venos activ (TEV) confirmat în ultimii 2 ani. Antecedente de tromboembolism venos recurent sau boli trombotice cunoscute la pacientele care nu mai iau anticoagulante. Eveniment tromboembolic arterial activ sau recent. Hipertrigliceridemie severă. Hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre componentele produsului.

A!: Înainte de a începe sau de a reîncepe terapia de substituție hormonală, se va face o examinare completă a antecedentelor personale și heredocolaterale, precum și examen general și ginecologic, având în vedere contraindicațiile și precauțiile de utilizare ale produsului. Înainte de începerea trat. trebuie exclusă posibilitatea unei sarcini. La pacientele tratate cu estro-progestative trebuie evaluată în permanență balanța risc/beneficiu. Trebuie avut în vedere faptul că aceste condiții pot, în cazuri rare, să reapară sau să se agraveze în timpul terapiei: tumori estrogen-dependente în antecedente; leiomiom, endometrioză, hiperplazie de endometru; antecedente sau factori de risc pentru afecțiuni tromboembolice; HTA; afecțiuni hepatice (porfirie, adenom hepatic); diabet zaharat cu implicare vasculară; litiază biliară; otoscleroză; migrenă sau cefalee severă; afecțiuni benigne ale sânului. Utilizarea terapiei de substituție hormonală la pacientele cu antecedente de TEV recidivant sau cu predispoziție pentru tromboze, aflate deja în tratament cu anticoagulante, necesită o evaluare atentă a raportului beneficiu/risc la utilizatorii terapiei de substituție hormonală. Antecedentele personale sau heredocolaterale de tromboembolism recidivant și avort spontan recidivant impun investigări pentru excluderea predispoziției la tromboze. Trebuie acordată o atenție deosebită măsurilor de prevenire a TEV după intervenția chirurgicală. Atunci când după intervenția chirurgicală electivă urmează o imobilizare prelungită, dacă este posibil, se oprește temporar terapia (cu 4-6 săptămâni preoperator). Pacientele cu disfuncții renale și cardiace necesită o supraveghere atentă (posibile edeme). Tratamentul trebuie revizuit în caz de astm bronșic, epilepsie sau diabet zaharat, care se pot agrava în timpul terapiei. În primele luni de tratament pot să apară hemoragii sau mici sângerări la întreruperea administrării. Dacă aceste simptome persistă după 2-3 luni de tratament și sunt inacceptabile, se întrerupe adm.

RA: *Sistemul nervos:* cefalee, amețeli, oboseală, anxietate, stări depresive; somnolență, nervozitate. *Sistemul cardiovascular:* agravarea HTA; tromboflebită, tromboză venoasă, dureri ale membrelor inferioare. *Aparat gastrointestinal:* greață, dureri abdominale, diaree, constipație, balonare, gastrită. *Tegumente și anexe:* transpirație excesivă, exantem, eczeme, dermatită acneiformă, căderea părului. *Sistemul de reproducere și glandele mamare:* creșterea grosimii endometrului, vulvo-vaginite; modificări ale secreției vaginale, boală fibrochistică a sânilor. *Organismul ca întreg:* bufeuri, reacții de hipersensibilitate. *Diverse:* modificări ale greutății corporale, afte, edeme ale membrelor inferioare, modificarea lipidogramei, creșterea glicemiei, modificări ale libidoului, crampe musculare, anemie.

JODTHYROX *COD ATC: H03AAN1*

MERCK KGaA; Cpr. cu 100 µg levotiroxină sodică, 130,8 µg iodură de potasiu ***(P-6L)***

Ind: Gușă endemică cu eutiroidie; profilaxia recidivelor după tiroidectomia unei gușe endemice.

Dz: La început 1/2 cpr./zi, apoi se crește doza după 2-4 săpt. până la o valoare de întreținere: *adulți și adolescenți:* 1 cpr./zi; sarcină: 1-11/2 cpr./zi.
Cind: Hipersensibilitate la iod; hipertiroidia manifestă; IMA; angină pectorală; miocardită și pancardită; IC cu tahicardie; aritmii; ICSR; sd. Duhring-Brocq; gușă nodulară, hipertiroidizată.
RA: Reacții de hipersensibilitate.

K

KABIVEN™ *COD ATC: B05BA10*
FRESENIUS KABI GmbH; Emulsie perf. cu glucoză 19%, aminoacizi și electroliți, emulsie lipidică (saci × 1026 ml, 1540 ml, 2053 ml, 2566 ml) *(S)*

Ind: Nutriție parenterală la adulți și copii cu vârstă peste 2 ani, atunci când alimentația orală sau enterală este imposibilă, insuficientă sau contraindicată.
Dz: Doza și viteza de perfuzare se stabilesc individual. La copii cu vârsta de peste 10 ani se recomandă aceleași doze ca la adulți.
Cind: Copii sub 2 ani. Hipersensibilitate cunoscută la ouă, proteine din soia. Hiperlipemie severă, IH severă, coagulopatii severe, tulb. congenitale ale metabolismului proteic, IR severă dacă hemofiltrarea sau dializa nu sunt posibile, șoc acut, hiperglicemie când sunt necesare mai mult de 6 UI insulină/oră, contraindicațiile generale ale perfuzării.
A!: Monitorizarea capacității de eliminare a lipidelor. Prudență în timpul sarcinii și alăptării.
RA: Componența lipidică poate provoca hipertermie, tremor, frisoane, greață, vărsături. Creșteri temporare ale enzimelor hepatice. La adm. în vene periferice există riscul de tromboflebite. Alte efecte extrem de rare: hipersensibilitate (reacții anafilactice, rash cutanat, urticarie), tahipnee, hTA sau HTA, hemoliză, reticuloză, dureri abdominale, cefalee, priapism, oboseală, sindromul supraîncărcării grase (hiperlipemie, febră, infiltrare grasă, hepatomegalie, splenomegalie, anemie, leucopenie, rombocitopenie, coagulopatii, comă). Toate simptomele sunt de obicei reversibile la întreruperea perfuziei.

KABIVEN™ PERIPHERAL *COD ATC: B05BA10*
FRESENIUS KABI GmbH; Emulsie perf. cu glucoză 11%, aminoacizi și electroliți, emulsie lipidică (saci × 1440 ml, 1920 ml, 2400 ml) *(S)*

Ind: Nutriție parenterală la adulți și copii cu vârstă peste 2 ani, atunci când alimentația orală sau enterală este imposibilă, insuficientă sau contraindicată.
Dz: Doza și viteza de perfuzare se stabilesc individual. La copii cu vârsta de peste 10 ani se recomandă aceleași doze ca la adulți.
Cind: Copii sub 2 ani. Hipersensibilitate cunoscută la ouă, proteine din soia. Hiperlipemie severă, IH severă, coagulopatii severe, tulb. congenitale ale metabolismului proteic, IR severă dacă hemofiltrarea sau dializa nu sunt posibile, șoc acut, hiperglicemie când sunt necesare mai mult de 6 UI insulină/oră, contraindicațiile generale ale perfuzării.

AI: Monitorizarea capacității de eliminare a lipidelor. Prudență în timpul sarcinii și alăptării.
RA: Componenta lipidică poate provoca hipertermie, tremor, frisoane, greață, vărsături. Creșteri temporare ale enzimelor hepatice. La adm. în vene periferice există riscul de tromboflebite. Alte efecte extrem de rare: hipersensibilitate (reacții anafilactice, rash cutanat, urticarie), tahipnee, hTA sau HTA, hemoliză, reticuloză, dureri abdominale, cefalee, priapism, oboseală, sindromul supraîncărcării grase (hiperlipemie, febră, infiltrare grasă, hepatomegalie, splenomegalie, anemie, leucopenie, trombocitopenie, coagulopatii, comă). Toate simptomele sunt de obicei reversibile la întreruperea perfuziei.

KALETRA

COD ATC: J05AE03

ABBOTT LABORATORIES Ltd.; Sol. orală 400 mg lopinavir + 100 mg ritonavir (fl. × 60 ml); Cps. cu lopinavir 133,3 mg și ritonavir 33,3 mg ***(S/P-RF)***

Ind: În asociație cu alte medicamente antiretrovirale pentru trat. infecției cu HIV-1.
Dz: *Adulți:* 5 ml soluție int. (400/100 mg) de 2 ori/zi, împreună cu alimente. *Copii peste 6 luni:* 300/75 mg/m^2 de 2 ori/zi, împreună cu alimente, până la o doză maximă de 400/100 mg de 2 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la lopinavir, ritonavir. Nu se asociază cu astemizol, terfenadină, midazolam, triazolam, cisapridă, pimozidă, ergotamină și dihidroergotamină.
AI: Asocierea cu sildenafil, lovastatin sau simvastatin, rifampicină. IH, hepatită B sau C, hepatită cronică, hemofilie de tip A sau B. Sarcină și alăptare.
RA: Diaree, dureri abdominale, astenie, cefalee. Rar, anemie, leucopenie, limfadenopatie, sd. Cushing și hipotiroidie, avitaminoză, deshidratare, edem, scăderea toleranței la glucoză, acidoză lactică, obezitate, edeme periferice, pierdere în greutate, vise anormale, agitație, amnezie, anxietate, ataxie, confuzie, depresie, amețeli, dischinezie, labilitate emoțională, encefalopatie, hipertonie musculară, scăderea libidoului, nervozitate, neuropatii, parestezii, nevrite periferice, somnolență, tulburări de gândire și tremor, tulburări de vedere, tulburări oculare, otită medie, tulburări ale gustului și tinnitus, HTA, palpitații, tromboflebită și vasculite, bronșită, dispnee, edem pulmonar, sinuzită, anorexie, colecistite, constipație, uscăciunea gurii, dispepsie, disfagie, enterocolită, eructații, esofagită, incontinență sfincteriană anală, gastrită, gastroenterită, colită hemoragică, creșterea apetitului, pancreatită, sialadenită, stomatită ulcerativă, alopecie, piele uscată, dermatită exfoliativă, furunculoză, erupție maculopapulară, afecțiuni ale unghiilor, prurit, tumori cutanate benigne, modificarea culorii pielii, hipersudorație, artralgii și artroze, ejaculare anormală, ginecomastie, hipogonadism masculin, calculi renali și modificări ale examenului de urină.

KALIUM 40

COD ATC: A12BA30

PHARMAVIT; Cpr. eff. citrat de potasiu 2170 mg, bicarbonat de potasiu 2000 mg (1 cpr. conține 40 mEq potasiu) ***(OTC)***

Ind: Hipopotasemie (sub 3,5 mmol/l). Tulb. cu bilanț potasic negativ (diaree, acidoză diabetică, trat. cu corticosteroizi, diuretice, aritmii cardiace). Adjuvant în angina pectorală.

Dz: 1-3 cpr. pe zi (în medie 50-100 mmol potasiu/zi). Doza maximă 100-150 mmol potasiu/zi. Doză unică maximă 40 mmol potasiu.

KALIUM-MAGNESIUM "APOGEPHA" *COD ATC: A12BA51*
APOGEPHA ARZNEIMITTEL GmbH DRESDA; Cpr. cu adipat de potasiu 111 mg ≅ 39,1 mg potasiu și adipat de magneziu 126 mg, anhidru ≅ 18,2 mg, magneziu ***(OTC)***

Ind: Hipopotasemie, hipomagneziemie după adm. de diuretice, laxative și ca urmare a unei eliminări crescute în afecțiuni gastrointestinale; trat. de întreținere al infarctului miocardic; aritmii cauzate de carențe de electroliți, în special în trat. cu glicozide cardiace; afecțiuni ale mușchiului cardiac datorate consumului de alcool, tetanie.
Dz: 2 cpr. de 3 ori/zi 2-4 săpt.
Cind: IR acută, IR cronică; hiperpotasemie și hipermagnezemie; bloc AV gr. III.
A!: Aport suficient de lichide. Sarcină și alăptare. Adm. concomitentă de diuretice care economisesc K pot conduce la apariția hiperpotasemiei și a hipermagneziemiei.
RA: Respectarea dozelor nu determină reacții adverse. La doze foarte mari pot apărea defecări mai frecvente.

KALIUM-MAGNESIUM-ASPARAGINAT *COD ATC: A12BA30*
BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP; Sol. perf. cu acid DL- aspartic 15,160 g; hidroxid de potasiu 3,900 g; oxid de magneziu 1,116 g; sorbitol 20,00 g (fl. × 500 ml) ***(S)***

Ind: IC, angina de efort, angina pectorală, intoxicații cu glicozide cardiotonice, îmbunătățirea toleranței la glicozide, aritmii cardiace. Trat. pre- și postoperator în chirurgia cardiacă, resuscitare după stop cardiac, degenerescența cardiacă senilă.
Dz: 1-2 perfuzii a 300 ml pe zi. Viteza de perfuzare 20-25 pic./min.
Cind: IR severă, hiperpotasemie, hipermagneziemie, hiperamoniemie, bloc AV, miastenia gravis, acidoză metabolică, intoxicații cu metanol.
A!: Sarcină și alăptare. Adm. concomitentă de diuretice care economisesc K pot conduce la apariția hiperpotasemiei și a hipermagneziemiei. Precauție în IH avansată și când există riscul formării edemelor.
RA: La mărirea vitezei de perfuzare pot apărea: hiperpotasemie, hipermagneziemie, senzație de căldură în regiunea extremității cefalice, local iritarea peretelui venos.

KARVOL *COD ATC: R01AX10*
BOOTS CO. PLC.; Sol. inhal. levometol 7,9%, timol 0,7%, clorobutol 0,5%, terpineol 14,8%, ulei de Pumilio pini 22,9%, ulei de Pini silvestris 2% (fl. × 10 ml, 12 ml sau 15 ml); Cps. gelatinoase levometol 35,55 mg, timol 3,15 mg, clorobutol 2,25 mg, terpineol 66,6 mg, ulei de Pumilio pini 103,5 mg, ulei de Pini silvestris 9 mg ***(OTC)***

Ind: Decongestionant nazal.
Dz: *Adulți și copii peste 3 luni.* Se toarnă conținutul unei capsule pe o batistă și se inspiră vaporii sau se toarnă într-un vas cu apă caldă.

A!: Nu se administrează intern. A se evita contactul cu ochii și pielea.
RA: Nu au fost raportate.

KETOSTERIL *COD ATC: B05ZN01*

FRESENIUS KABI GmbH; Cpr. film. cu calciu-3-metil-2-oxovalerat (DL) 67,00 mg; calciu-4-metil-2-oxovalerat (DL) 101,00 mg; calciu-2-oxo-3-fenil propionat 68,0 mg; calciu-3-metil-2-oxo-butirat 86,00 mg; calciu-2-hidroxi-4-(metiltio)-butirat 59,00 mg; monoacetat de L-lizină 75,00 mg; L-treonină 53,00 mg; L-triptofan 23,00 mg; L-histidină 38,00 mg; L-tirozină 30,00 mg; Conținut total de azot pe comprimat: 36,00 mg; conținut de calciu pe comprimat: 1,25 mmol = 50,00 mg ***(P-RF)***

Ind: Profilaxia și tratamentul tulburărilor provocate de disfuncții ale metabolismului proteic la pacienții adulți cu insuficiență renală cronică care au un aport proteic alimentar limitat la cel mult 40 g proteine pe zi; în general, este destinat pacienților cu rata filtrării glomerulare (RFG) cuprinsă între 5-15 ml/minut.
Dz: În absența altor recomandări, doza pentru un pacient adult în greutate de 70 kg este de 4-8 comprimate filmate de 3 ori pe zi, administrate în timpul meselor. Comprimatele trebuie înghițite întregi.
Cind: Hipercalcemie. Tulburări ale metabolismului aminoacizilor. În timpul sarcinii și la copii, deoarece nu există experiență clinică privind administrarea Ketosteril.
A!: Ketosteril trebuie administrat în timpul meselor pentru asigurarea absorbției și metabolizării optime a ceto-derivaților la aminoacizii corespunzători. În timpul tratamentului cu Ketosteril trebuie monitorizată regulat calcemia. De asemenea, trebuie asigurat un aport energetic adecvat.
RA: Hipercalcemie.

KLIMODIEN *COD ATC: G03FA15*

SCHERING-PLOUGH EUROPE AG; Dj. valerat de estradiol 2 mg și dienogest 2 mg ***(P-6L)***

Ind: Terapie de substituție hormonală pentru trat. simptomelor deficienței de estrogeni la femeia la care menopauza a apărut de cel puțin 1 an și care are uter.
Dz: Oral, 1 dj./zi. Un ciclu de trat. are 28 zile. Trat. este continuu, următoarea folie se începe imediat.
Cind: Sângerare vaginală nediagnosticată. Cancer mamar sau suspiciune de cancer mamar ori antecedente de cancer mamar. Stări premaligne sau maligne. Afecțiuni hepatice acute sau cronice. Tromboembolism venos. Hipersensibilitate. Hipertrigliceridemie. Sarcină sau alăptare.
A!: Experiența la femeile peste 65 ani este limitată.
RA: *SNC:* Cefalee, amețeli, migrenă, oboseală, anxietate, stări depresive. *Cardiovascular:* HTA, tromboflebită, tromboză venoasă, dureri venoase, dureri ale membrelor inferioare. *Digestiv:* greață, dureri abdominale, diaree, creșterea gamma GT, constipație, balonare, gastrită. *Altele:* căderea părului, eczeme, dermatită, creșterea grosimii endometrului, modificări ale secreției vaginale, bufeuri, reacții de hipersensibilitate.

KLIOGEST® *COD ATC: G03FA01*
NOVO NORDISK a/s; Cpr. film. cu estradiol 2 mg și norethisteron acetat 1 mg ***(P-6L)***

Ind: Deficiența estrogenică, prevenirea osteoporozei la femei în postmenopauză.
Dz: 1 cpr./zi; trat. începe după un an de la instalarea menopauzei, în oricare zi.
Cind: Hipersensibilitate, neoplasm de sân, neoplazie de natură estrogenică, porfirie.
A!: Folosirea îndelungată a estrogenilor – peste 10 ani – poate determina o creștere minoră a riscului de cancer mamar. Afecțiuni tromboembolice HTA, epilepsie, migrene, diabet zaharat, astm sau IC.
RA: Sângerări vaginale neregulate, tensiune la nivelul sânilor, cefalee, migrene.

KLION - D 100 *COD ATC: G01AF20*
GEDEON RICHTER Ltd.; Cpr. vag. cu 100 mg metronidazol și 100 mg azotat de miconazol ***(P-RF)***

Ind: Trat. local al infecțiilor vaginale tricomoniazice și micotice.
Dz: Infecție tricomoniazică: 1 cpr. vag./zi (seara, înainte de culcare), 10 zile, concomitent cu 1 cpr. int. de Klion-D 100, de 2 ori/zi (dimineața și seara).
Cind: Consumul de alcool. Primul trimestru de sarcină.
A!: Este interzisă activitatea sexuală. Partenerul trebuie să facă trat. cu Klion-D 100, cpr. cu adm. int.
RA: Cefalee, gust amar, greață, diaree.

KODAN TINKTUR FORTE COLORAT;
KODAN TINKTUR FORTE INCOLOR *COD ATC: D08AX53*
SCHULKE & MAYR GmbH; Aerosol cut. sol. 100 g sol. conțin: 2-propanol 45 g, 1-propanol 10 g, 2-bifenilol 0,2 g, peroxid de hidrogen 30 % 0,33 g (fl. 250 ml + pompa mecanică de pulverizare; fl. × 1000 ml + pompa dozatoare) ***(OTC)***

Ind: Antiseptic, dezinfectant pentru tegumente.
Dz: Uz extern.

KREON 10 000 *COD ATC: A09AA02*
SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.; Cps. 150 mg pancreatină în minimicrosfere cu înveliș enteric ***(OTC)***

Ind: Insuficiență pancreatică exocrină, cauzată de: fibroză chistică; pancreatită cronică; pancreatectomie; gastrectomie totală; rezecție gastrică parțială (Billroth I/II); obstrucție ductală neoplazică (de ex., în neoplasmul de pancreas sau de căi biliare comune).
Dz: 1-2 cps. la fiecare masă principală și 1 cps. la fiecare gustare, apoi se ajustează doza în funcție de răspuns.

Cind: Fazele precoce ale pancreatitei acute, hipersensibilitate.
A!: Sarcină și alăptare.
RA: Diaree, constipație, disconfort gastric, greață, reacții cutanate.

KREON 25 000 *COD ATC: A09AA02*
SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.; Cps. 300 mg pancreatină în mini-microsfere cu înveliș enteric ***(OTC)***

Ind: Insuficiență pancreatică exocrină, cauzată de: fibroză chistică; pancreatită cronică; pancreatectomie; gastrectomie totală; rezecție gastrică parțială (Billroth I/II); obstrucție ductală neoplazică (de ex., în neoplasmul de pancreas sau de căi biliare comune).
Dz: 1-2 cps. la fiecare masă principală și 1 cps. la fiecare gustare.
Cind: Faze precoce ale pancreatitei acute, hipersensibilitate.
A!: Copiii cu fibroză chistică de pancreas. Sarcină și alăptare.
RA: Diaree, constipație, disconfort gastric, greață, reacții cutanate.

L

LACRISIFI *COD ATC: S01XA20*
S.I.F.I.; Sol. oft. hidroxipropil-metilceluloză 4000 cps. 0,50 g; fosfat de sodiu monobazic H_2O 0,80 g; fosfat de sodiu dibazic 12 H_2O: 1,80 g; clorură de benzalconiu 0,01 g; edetat de sodiu 0,10 g; clorură de sodiu 0,20 g; apă distilată până la 100,00 ml (fl. × 10 ml) ***(OTC)***

Ind: Adjuvant în sindroamele "sicca", de origine endogenă (excesul sau deficitul de mucopolizaharide) și exogenă (purtători de lentile de contact, factori de mediu). Iritații oculare produse de smog, praf, vânt, apă de mare; facilitează eliminarea corpilor străini și a substanțelor toxice.
Dz: Se instilează 1-2 pic. de 4-8 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate.

LACRYVISC™ *COD ATC: S01XA20*
ALCON SRL; Gel. oft. cu 3 mg carbomer, manitol, 0,04 mg thiomersal (conservant antimicrobian), hidroxid de sodiu și apă purificată (tub × 10 g) ***(OTC)***

Ind: Substituent de lacrimi.
Dz: Se instilează în sacul conjunctival câte o pic. de 4 ori/zi sau la nevoie.
Cind: Hipersensibilitate.
A!: Purtătorii de lentile de contact. Șoferi și activități de precizie. Sarcină și alăptare.
RA: Tulburări de vedere ocazionale și temporare, alergie de contact.

LACTATED RINGER'S *COD ATC: B05BB01*
BAXTER HEALTH CARE; Sol. perf.; 1 litru sol. conține: clorură de sodiu 6 g, clorură de potasiu 0,3 g, lactat de sodiu 3,1 g (sac PVC × 1000 ml) ***(S)***

Ind: Trat. de substituție electrolitică în dezechilibre acido-bazice, în acidoza metabolică ușoară, în deshidratări izotone sau hipotone în șoc, colaps, arsuri, degerături, vărsături repetate, diaree (trat. pe termen scurt), precum și ca vehicul și solvent pentru medicamente compatibile cu electroliți.
Dz: Perfuzie i.v.; doza și viteza de perfuzare se stabilește în funcție de starea clinică, vârstă, greutate. Viteza max. de perfuzare 3 ml/kg și oră. Doza max. 40 ml/kg și zi (de ex. 2800 ml la un pacient de 70 kg).
Cind: Hiperhidratare, mai ales extracelulară, hipercloremie, hiperkaliemie, hipernatremie, hipercalcemie, IC congestivă, edeme, HTA, eclampsie, IR gravă, IH, acidoza metabolică. Nu se adm. i.m.
A!: Supravegherea echilibrului hidro-electrolitic și acido-bazic. În caz de transfuzii concomitente sângele și soluția Ringer nu se vor adm. în același dispozitiv.
RA: Hipercloremie.

LADY 4
PHARCO PHARMACEUTICALS; Cps. conținând lăptișor de matcă 200 mg, evening primrose oil 250 mg, extract de damiană 100 mg și extract de ginseng 50 mg; ct. × 12 cps. gelatinoase moi ***(OTC)***

Ind: Benefic pentru ameliorarea tulburărilor ce apar înainte de ciclul menstrual și a celor din menopauză, pentru menținerea elasticității tenului și prevenirea apariției ridurilor; pentru normalizarea apetitului sexual.
Dz: O capsulă pe zi, dimineața.

LASONIL N *COD ATC: C05BA01*
C05BA51

BAYER AG; 100 g ung. conțin: 5000 HDB-E (Heparinoid Bayer Unit = 0,5 g) și 15000 U.I. hialuronidază (tub × 40 g) ***(OTC)***

Ind: Entorse, contuzii, hematoame, acumulări sau tumefieri la nivelul articulațiilor, cicatrice, hemoroizi, flebite sau/și tromboflebite, tromboze superficiale, varice sau ulcer varicos.
Dz: Aplicații locale de 2-3 ori/zi. În tromboze și tromboflebite se aplică sub compresă. În ulcere varicoase se aplică în jurul ulcerațiilor prin masarea ușoară a locului, de la extremitate spre centru.
Cind: Hipersensibilitate la heparină, heparinoizi; sângerări; aplicare pe plăgi deschise și procese purulente.
RA: Rar, eritem.

LAURINA *COD ATC: G03AB05*
N.V. ORGANON; 7 Cpr. film. galbene: 0,050 mg desogestrel și 0,035 mg etinilestradiol; 7 Cpr. film. roșii: 0,100 mg desogestrel și 0,030 mg etinilestradiol; 7 Cpr. film. albe: 0,150 mg desogestrel și 0,030 mg etinilestradiol ***(P-6L)***

Ind: Contraceptiv oral.
Dz: Cpr. se iau zilnic, la aceeiași oră, în ordinea numerotării lor.

Cind: Tulb. circulatorii, angină pectorală, atac ischemic tranzitor, infarct reversibil ușor, diabet zaharat cu afectarea vaselor sanguine, hepatită, tumori maligne sau benigne ale ficatului, sângerări vaginale. Sarcină și alăptare.
RA: Tensiune a sânilor, durere, secreție, migrene, modificarea libidoului, stări depresive, intoleranță la lentile de contact, grețuri, vărsături, modificări ale secreției vaginale, retenția fluidelor, modificarea greutății corporale, reacții hipersenzitive.

LAURONIL *COD ATC: N05CB02*

SICOMED SA; Cpr. cu bromhidrat de scopolamină 0,6 mg, fenobarbital 100 mg ***(OTC)***

Ind: Excitație psihomotorie, convulsii, eclampsie.
Dz: 1-3 cpr./zi.
Cind: Glaucom, comă, idiosincrazie, IH gravă, diabet, tulburări cardiovasculare, prostatici și copii.

LECITINĂ CU VIT D_2 *COD ATC: A11CC20*

PHARMEX ROM IND.; Cps. cu 280 mg lecitină și 150 U.I. vit. D ***(OTC)***

Ind: Activarea metabolismului cerebral, proceselor de învățare și memorare, hepatopatii cronice, hipovitaminoză D.
Dz: *Copii 5-12 ani:* 1 cps./zi în timpul mesei. *Adulți:* 2-3 cps./zi în timpul meselor.
Cind: Hipervitaminoză D, hipercalcemie, litiază renală.

LEGALON *COD ATC: A05BA*

LAB. MADAUS; Dj.; 1 drajeu conține extract purificat de Sylibum Marianum Gaertn 100,00 mg echivalent la silimarină 70 mg exprimată în silibină. Aceasta conține trei izomeri: silibină, silidianină și silicristină, iar dintre aceștia silibina are concentrația cea mai mare – 80% ***(P-6L)***

Ind: Tratamentul hepatitelor acute și cronice (virale, toxice, alcoolice); steatoze hepatice; ciroze compensate funcțional; insuficiență hepatică; diabet zaharat; tratamentul intoxicațiilor cu faloidină, alfa-amanitină, tioacetamidă, D-galactozamină, paracetamol, solvenți organici-tetraclorură de carbon, profilactic în timpul administrării pe termen lung a unor substanțe cu potențial hepatotoxic (medicamente psihotrope, hormonale, tuberculostatice).
Dz: *Adulți și copii:* 2 drajeuri de 2-3 ori pe zi. Profilaxie: 1-2 dj./zi.
A: Prudență în sarcină și alăptare.
RA: Cazuri foarte rare de epigastralgii sau de diaree. Excepțional reacții alergice.

LEVOVIST *COD ATC: V08DA02*

SCHERING-PLOUGH EUROPE AG; Pub. gran. pt. susp. inj.; 1 g pulb. gran. conține 999 mg galactoză și 1 mg acid palmitic (fl. × 2,5 g sau 4 g pulb. + 1 f. × 20 ml apă distilată + disp. injectare + seringă × 20 ml) ***(S)***

Ind: Ecografie Doppler uni- sau bidimensională pentru urmărirea fluxului sanguin la pacienții la care intensitatea semnalului Doppler este insuficientă. Ecografie modul B cu contrast.
Dz: *Ecografie Doppler vasculară. Adulți:* semnal Doppler detectabil, dar insuficient pentru diagnostic – 10-16 ml din susp. 200 mg/ml; semnal Doppler slab, de ex. la vasele mici, la un flux sanguin redus sau în condiții nefavorabile de scanare 5-10 ml din susp. 300 mg/ml. Semnal Doppler foarte slab sau nedetectabil 5-8 ml din susp. 400 mg/ml. *Copii:* între 0,5 și 10 ml susp. 200 mg/ml în funcție de vârstă. *Examinarea cavităților inimii drepte și stângi. Adulți:* 10-16 ml din susp. 200 mg/ml. La pacienții cu semnale Doppler slabe sau nedetectabile și pentru clarificarea unei insuficiențe mitrale se adm. 5-10 ml din susp. 300 mg/ml. Examinarea cavităților inimii drepte: 4-10 ml susp. 200 mg/ml. *Copii:* dozele variază între 0,5 și 4 ml susp. 200 mg/ml, în funcție de vârstă. *Ecografie modul B cu contrast. Adulți:* 10 ml din susp. 300 mg/ml. Dacă conducerea semnalului sonor este nefavorabilă sau în ecografia de stres se adm. 5-8 ml din susp. 400 mg/ml. Examinarea cavităților inimii drepte: 4-10 ml din susp 300 mg/ml.
Cind: Galactozemie.
A!: La pacienții cu IC (NYHA IV), se va lua în considerare încărcătura osmotică totală produsă de injectarea de Levovist.
RA: Iritații nespecifice ale endoteliului vascular. Rar, pot să apară local senzație trecătoare de durere, de căldură sau de rece în timpul sau imediat după injectare. În cazul injectării paravasculare poate să apară iritație locală.

LEXPEC *COD ATC: B03ADN1*
ROSEMONT PHARMACEUTICALS; Sol. orală cu citrat feriamoniacal 400 mg (80 mg fier), ac. folic 2,5 mg/5 ml (fl. × 125 ml) ***(P-6L)***

Ind: Anemie latentă, profilaxia anemiei feriprive.

LIPOFUNDIN MCT/LCT 10% *COD ATC: B05BA02*
B. BRAUN MELSUNGEN AG; Emulsie perf. 10%; 1000 ml emulsie conțin: ulei de soia 50 g, trigliceride cu lanț mediu 50 g (fl. × 500 ml) ***(S)***

LIPOFUNDIN MCT/LCT 20% *COD ATC: B05BA02*
B. BRAUN MELSUNGEN AG; Emulsie perf. 20%; 1000 ml conțin: ulei de soia 100 g, trigliceride cu lanț mediu (MCT) 100 g, conținut energetic 7990 Kj/l (1908 kcal/l) (fl. × 500 ml) ***(S)***

Ind: Aport caloric, incluzând o componentă lipidică gata de a fi utilizată (MCT); aport de acizi grași esențiali și fluide în cadrul nutriției parenterale totale.
Dz: *Adulți și copii peste 7 ani:* 1-2 g lipide/kg și zi corespunzând la 10-20 ml/kg și zi. *Nou-născuți:* 2-3 g (max. 4 g) lipide/kg și zi corespunzând la 20-30 ml (max. 40 ml)/kg și zi. *Sugari și copii sub 7 ani:* 1-3 g lipide/kg și zi corespunzând la 10-30 ml/kg și zi.
Cind: Hipersensibilitate la unul dintre componentele produsului. Tulburări grave de coagulare, șoc și colaps, sarcină, tromboembolie acută, septicemie gravă,

atunci când este însoțită de acidoză și hipoxie, embolie lipidică, IMA și AVC acut, comă cetoacidozică, comă de etiologie necunoscută, tulburări metabolice decompensate și instabile, tulburări ale metabolismului lipidic, boli hepatice, afecțiuni ale sistemului reticuloendotelial, pancreatita necrotico-hemoragică. CI generale pentru nutriția parenterală: acidoze de etiologii diverse, tulburări netratate ale echilibrului hidroelectrolitic (deshidratare hipotonă, hipopotasemie, hiperhidratare), colestază intrahepatică.
A!: Când lipidele sunt adm. zilnic în doze mari, ar trebui să se efectueze controale ale concentrației plasmatice a trigliceridelor și, în cazul în care este necesar, ale glicemiei, echilibrului acidobazic și electroliților, la intervale adecvate. Balanța hidrică și/sau greutatea corporală trebuie controlate zilnic. Aportul caloric numai prin emulsii lipidice poate duce la acidoză metabolică. Acest fapt poate fi prevenit prin adm. simultană de carbohidrați. De aceea, se recomandă să se adm. simultan cu lipidele și soluții de carbohidrați sau soluții de carbohidrați care conțin aminoacizi. Sarcină și alăptare.
RA: În cazuri foarte rare pot să apară reacții acute, cum ar fi dispnee, cianoză, reacții alergice, hiperlipemie, hipercoagulabilitate, greață, vărsături, cefalee, înroșirea feței, hipertermie, transpirații, tremor, somnolență, dureri toracice și dorso-lombare în timpul perfuziei intravenoase de lipide.

LIPOVENOES 10% PLR *COD ATC: B05BA02*
FRESENIUS KABI GmbH; Emulsie perf. 1000 ml conțin: ulei de soia 100,00 g, glicerol 25,00 g, fosfolipide din ou fracționate (lecitină) 6,00 g (conținut energetic 4522 kJ/l = 1080 Kcal/l) ***(S)***

Ind: Nutriție parenterală ca aport energetic și de acizi grași esențiali.
Dz: *Nou-născuți și copii:* 1-2 g/kg corp și zi (10-20 ml emulsie/kg corp și zi). *Adulți:* 1-2 g/kg corp și zi (10-20 ml emulsie/kg corp și zi).
Cind: Hipersensibilitate, tulb. ale metab. lipidic, diateză hemoragică severă, diabet zaharat dezechilibrat, primul trimestru de sarcină, colaps și șoc, infarct de miocard recent, accident vascular cerebral, embolie, status comatos nedefinit, hipokaliemie, hiperhidratare, deshidratare hipotonă.
RA: Hipertermie, senzație de rece sau cald, înroșirea feței sau cianoză, scăderea apetitului alimentar, greață, vărsături, dispnee, cefalee, dureri toracice sau lombare, dureri osoase, priapism (foarte rar).

LIPOVITAN *COD ATC: A05BAN3*
LECIVA; Dj. cu colină bitartrat 170 mg, d,1-metionină 25 mg, inozitol 50 mg, tiamină diclorhidr. 1,5 mg, riboflavină 1,5 mg, piridoxină 1,5 mg, pantenol 3 mg, nicotinamidă 5 mg, cianocobalamină 3 mg ***(OTC)***

Ind: Afecțiuni hepatice acute și cronice, profilaxia și trat. încărcării grase a ficatului la cei supuși noxelor hepatotoxice și la alcoolici; adjuvant în hiperlipidemie, boli degenerative ale sistemului nervos.
Dz: 1-3 dj. de 3 ori/zi.
Cind: Boli hepatice grave, encefalopatie hepato-portală, precomă și comă hepatică, IR avansată; asociere cu levodopa (piridoxina și metionina acționează antagonist).

LITHOFALK *COD ATC: A05AA0N*
Dr. FALK GmbH; Cpr. cu 250 mg ac. chenodeoxicolic, 250 mg ac. ursodeoxicolic ***(P-6L)***

Ind: Calculi biliari colesterolici: pentru dizolvarea în special după litotripsia cu ultrasunete (ESWL).
Dz: 7 mg/kgc ac. chenodeoxicolic și ac. ursodeoxicolic, seara. Trat. continuă încă 3 luni după dizolvarea calculilor.
Cind: Hepatită acută și cronică, ciroză hepatică, inflamații acute ale vezicii biliare, ale canalelor biliare, staza biliară (colestază intra- și extrahepatică), ulcer gastric sau duodenal. Când vezica biliară nu poate fi vizualizată radiologic, la pacienții cu calculi calcificați, contractilitate perturbată a vezicii biliare sau frecvente colici biliare. Asocierea cu preparate ce conțin colestiramin și colestipol sau antiacide cu aluminiu și/sau smectită. Sarcină și alăptare.
RA: Diaree, creșteri ale GOT, GPT, gama-GTP.

LIV-52 *COD ATC: A05CN01*
HYMALAYA; Cpr. cu capparis spinosa 65 mg, cichorium intybus 65 mg, solanum nigrum 32 mg, cassia millefolium 16 mg, tamarix galica 16 mg mandur bhasma 33 mg ***(OTC)***

Ind: Hepatoprotector, coleretic, colecistochinetic, carminativ, laxativ, diuretic. Util în hepatite cronice, dischinezii biliare.
Dz: *Adulți:* 2-3 cpr. de 3-4 ori pe zi; *copii:* 1-2 cpr. de 2-3 ori pe zi.

LIVERCYN
LAB. CYNARA; Cps. gelatinoase; uleiul virgin de Cynara cardunculus conține: acizi grași nesaturați, aminoacizi esențiali, cinarina (flavonoide antioxidante) 0,14 mg, vitamina E 1,35 mg, beta-caroten 0,02 mg, minerale: Mg, Na, Ca, P, Cu, Zn, Fe, Mn ***(OTC)***

Ind: Infertilitate feminină și masculină; dismenoree și amenoree; mastite; degenerescențe hepatice cauzate de: hepatite virale, ciroze, abuzul de alcool, tutun sau după tratamente medicamentoase agresive; hipercolesterolemie; ca adjuvant în cure de slăbire; stări de stres; oboseală și convalescență; dermatite, eczeme și uscăciune a pielii; probleme ale părului și unghiilor.
Dz: 1-3 cps./zi, în cure de 2-3 luni.

LIZADON® P *COD ATC: A03EDN2*
SICOMED SA; Cps. papaverină clorh. 60 mg, fenobarbital 30 mg, propifenazonă 150 mg, atropină sulfat 0,4 mg ***(S/P-6L)***

Ind: Cefalee, mialgii, nevralgii, artralgii, dismenoree, colici intestinale, colită spastică, spasme biliare și ureterale, dureri ulceroase.
Dz: *Adulți:* 1 cps. de 3-4 ori/zi; *copii peste 7 ani:* 1 cps. de 2-3 ori/zi.
Cind: Antecedente alergice, astm bronșic, tahiaritmii supraventriculare, glaucom, ileus paralitic, hernie hiatală cu reflux esofagian, stenoză pilorică organi-

că, adenom de prostată, IH și IR, porfirii hepatice, agranulocitoză în antecedente. Sarcină și alăptare.
A!: IC, boli pulmonare cronice, colită ulceroasă, hipertiroidism. Asocierea cu chinidină, antidepresive triciclice și amantadină care potențează efectul atropinei.
RA: Uscăciunea gurii, tulburări gastrointestinale (epigastralgii, grețuri, vărsături, pirozis, constipație), alterarea testelor hepatice, alergii (erupții cutanate, edem angioneurotic), tulburări de vedere, tulburări de micțiune, somnolență, hiperexcitabilitate, palpitații, depresie medulară și excepțional agranulocitoză (în terapia de durată) și anemie megaloblastică.

LOGEST *COD ATC: G03AA10*
SCHERING-PLOUGH EUROPE AG; Dj. 0,075 mg gestoden si 0,02 mg etinilestradiol ***(P-6L)***

Ind: Contracepție hormonală.
Dz: 1 dj./zi din prima zi a ciclului, 21 zile consecutiv. Urmează un interval de pauză 7 zile în care apare menstruația.
Cind: Sarcină, boli hepatice severe, icter în antecedente, prurit persistent în timpul unei sarcini anterioare, sindrom Dubin-Johnson, sindrom Rotor, tumori hepatice, procese tromboembolice, tulb. de coagulare, afecțiuni valvulare cardiace, fibrilație atrială, cancer de sân sau de endometru, diabet sever cu modificări vasculare, tulb. ale metab. lipidic, herpes gestațional în antecedente, sângerări vaginale, alergie la produs. Sarcină și alăptare.
A!: Cefaleea, tulb. senzoriale, edemele picioarelor, tusea persistentă sau senzația de constricție toracică impun oprirea tratamentului. Evitarea expunerii prelungite la soare.
RA: Cefalee, tulb. digestive, senzație de tensiune a sânilor, modificarea greutății corporale, modif. libidoului, stări depresive, scăderea toleranței la lentile de contact.

LOGIMAX *COD ATC: C07EBN1*
ASTRAZENECA; Cpr. elib. prel. Ep 5 + 50 mg: felodipină 5 mg + metoprolol succinat 47,5 mg (coresp. la 50 mg metoprolol tartrat); EP 10 + 100 mg: felodipină 10 mg + metoprolol succinat 95 mg (coresp. la 100 mg metoprolol tartrat) ***(P-6L)***

Ind: HTA.
Dz: Inițial 1 cpr. EP 5 + 50 mg zilnic; dacă este necesar doza poate fi crescută la 1 cpr. EP 10 + 100 mg pe zi. Cpr. se adm. dimineața fără a fi sfărâmate.
Cind: Hipersensibilitate, sarcină, bloc A-V gr. II sau III, boală de nod sinusal, IC. decompensată, șoc cardiogen, sarcină, alăptare.
A!: La pacienții hipertensivi cu astm bronșic se va adm. concomitent un beta-2-stimulant. Întreruperea trat. nu se face brusc. Asocierea cu cimetidină, fenitoină, carbamazepină, barbiturice, rifampicină. Șoferi și activități de precizie.
RA: hTA, cefalee, edeme declive, obnubilare, flush, grețuri, oboseală.

LUISAR *COD ATC: S01XAN1*
VIANEX SA; Sol. oft. cu dihidroazopentacen polisulfonat (fl. × 15 ml) ***(P-6L)***

Ind: Cataractă.
Dz: 2 pic. de 3-5 ori pe zi, în sacul conjunctival.
Cind: Sensibilitate la componente.

M

MAALOX *COD ATC: A02AD01*
RHÔNE-POULENC RORER; Cpr. mast. cu hidroxid de aluminiu 400 mg; hidroxid de magneziu 400 mg. Susp. orală hidroxid de aluminiu 3,49 g; hidroxid de magneziu 3,99 g; parahidroxibenzoat de metil 0,1 g; parahidroxibenzoat de propil 0,05 g (fl. × 250 ml) ***(OTC)***

Ind: Tulburări datorate hiperacidității gastrice. Gastrită, hernie hiatală, dispepsie, ulcer gastroduodenal, esofagită de reflux.
Dz: *Cpr:* 1-2 cpr. la nevoie sau la 90 de minute după masă. *Flacon, susp. int.:* 1-2 linguri la nevoie sau la 90 de minute după masă.
Cind: IR severă.
A!: Pacienți cu dializă renală cronică. Alte medicamente pot fi adm. după aproximativ 2 ore de la adm. antiacidului.
RA: Constipație, diaree.

MACMIROR COMPLEX *COD ATC: G01AX05*
POLI IND. CHIMICA; Ung. vag.; 100 g ung. conțin: 10 g nifuratel și 4.000.000 U.I. nistatin (tub × 30 g + aplicator) ***(P-RF)***

Ind: Afecțiuni vulvo-vaginale cu microorganisme patogene: Candida, Trichomonas, bacterii.
Dz: 2,5 g ung. de 1-2 ori/zi, seara și/sau dimineața.
Cind: Hipersensibilitate.
A!: Se va evita contactul sexual în timpul trat.

MACMIROR COMPLEX-500 *COD ATC: G01AX05*
POLI IND. CHIMICA; Ovule 500 mg nifuratel, 200.000 U.I. nistatin ***(P-RF)***

Ind: Afecțiuni vulvo-vaginale cu microorganisme patogene: Candida, Trichomonas, bacterii.
Dz: 1 ovul/zi profund, în partea superioară a vaginului.
Cind: Hipersensibilitate.
A!: Se va evita contactul sexual în timpul trat.

MADOPAR *COD ATC: N04BA02*
TERAPIA SA; Cpr. levodopa 200 mg + benzerazidă clorhidrat 50 mg ***(P-6L)***

Ind: Antiparkinsonian.
Cind: Psihonevroze, leucopenie, ulcer gastroduodenal, sarcină, IR, IH, IC, infarct recent de miocard.

RA: Anorexie, grețuri, vome, hTA, tahicardie, aritmii, agitație, dezorientare, depresie, diskinezie, trombopenie, leucopenie.

MAGNE-B_6

COD ATC: A12CC06
A12CC30

SANOFI ~ SYNTHELABO; Dj. cu lactat de magneziu 470 mg, vit. B_6 5 mg (1 dj. conține 48 mg Mg^{2+}); Sol. orală cu lactat de magneziu 186 mg, magneziu pidolat 936 mg, vit. B_6 10 mg (f. × 10 ml; 1 f. conține 100 mg Mg^{+2}) ***(OTC)***

Ind: Carențe de magneziu izolate sau asociate. În cazul carenței asociate de calciu se recomandă tratarea deficitului de magneziu înaintea celui de calciu.
Dz: *Dj. Adulți:* 6-8 dj./zi. *Copii peste 6 ani:* 10-30 mg/kg/zi (0,4-1,2 mmol/kg/zi) sau 4-6 dj./zi în 2-3 prize, până la normalizarea magneziemiei. *Sol. orală: Adulți:* 3 f./zi. *Copii și sugari peste 10 kg* (aproximativ 1 an): 10-30 mg/ kg/zi (0,4-1,2 mmol/kg/zi), sau 1-3 f./zi, în 2-3 prize până la normalizarea magneziemiei.
Cind: Absolute: IR gravă (clearance-ul creatininei mai mic de 30 ml/min). Asociere cu levodopa, chinidina.
A!: Asociere cu chinidina. Sarcină și alăptare.
RA: Diaree, dureri abdominale. La doze masive sindrom anuric.

MAGNESIUM TYGGETABLETTER

COD ATC: A12CC06

NYCOMED; Cpr. mast. 120 mg lactat de magneziu 1078,52 mg + citrat de magneziu 125,00 mg (echivalentul a 120 mg magneziu) ***(OTC)***

Ind: Prevenirea și tratarea deficiențelor de magneziu.
Dz: Oral, *adulți:* 3 cpr./zi; *Copii:* 1-2 cpr./zi. Doza zilnică se divide în 3 prize.
Cind: IR severă.
A!: Produsul conține aspartam, nu se adm. pacienților cu fenilcetonurie. Nu se asociază cu fosfați. În cazul terapiei cu tetracicline magneziu se adm. la un interval de minim 3 ore.
RA: Tulb. digestive rare (accelerarea tranzitului intestinal).

MAGNEZIU FORTE CU VITAMINA B_6

BIOFARM SA; Dj. lactat de magneziu dihidrat 470 mg, vit. B_6 5 mg ***(P-RF)***

Ind: Anxietate, rezistență scăzută la stres, astenie, insomnie, crampe musculare, palpitații.

MAGNEZIU MARIN B_6

COD ATC: A12CC

LAB. ZENYL; Cps. cu extract vegetal de alge marine (magneziu de origine organică) + vitamina B_6 ***(OTC)***

Ind: Stres, oboseală, somnolență, efort fizic și intelectual, carențe de magneziu și/sau vitamina B_6, dureri și crampe musculare.

Dz: 2 cps. dimineața, în cure de 20 zile.
Cind: Sarcină și alăptare, copii sub 8 ani, IR.

MALTOFER® FOL *COD ATC: B03AB05*
VIFOR SA; Cpr. mast. cu complex de hidroxid de fier (III)-polimaltozat 100 mg și acid folic 0,35 mg ***(P-RF)***

Ind: Trat. și profilaxia carenței latente de fier (în sarcină și alăptare) și a anemiei feriprive.
Dz: Anemie feriprivă: 1 cpr. de 2-3 ori/zi până la normalizarea valorilor Hb, apoi 1 cpr./zi pe durata sarcinii, pt. a reface depozitele de fier. Trat. carenței latente de fier și prevenirea carenței de fier și ac. folic: 1 cpr./zi.
Cind: Cazuri de supraîncărcare cu fier (ex. hemocromatoză, hemosideroză), tulburări în metabolismul fierului (anemia saturnină, sidero-acrestică, talasemia) și anemiile care nu sunt cauzate de carențe de fier.
A!: Informație pt. diabetici: 0,04 unități de pâine/cpr. Sarcină și alăptare.
RA: Iritație gastrointestinală, senzație de plenitudine gastrică, presiune în regiunea epigastrică, greață, constipație sau diaree, colorație în negru a fecalelor.

MALUCOL *COD ATC: A02AD01*
LABORMED PHARMA SA; Cpr. mast. cu 200 mg hidroxid de aluminiu, 200 mg hidroxid de magneziu ***(OTC)***

Ind: Trat. simptomatic al hiperacidității gastrice din: ulcer gastric, duodenal, gastrite, esofagită de reflux, hernie hiatală.
Dz: 1-4 cpr. de 3-4 ori/zi, la o oră după mese și înainte de culcare.
Cind: IR severă.
A!: Scade efectele tetraciclinelor, anticoagulantelor, clorpromazinei, fierului, izoniazidei, acidului nalidixic, fenilbutazonei, digoxinei, vit. A și C.

MALUGEL *COD ATC: A02AD01*
PHARMASOL; Susp. orală 10 g hidroxid de aluminiu gel uscat; 3,5 g hidroxid de magneziu; 15 g sorbitol (fl. × 250 ml) ***(OTC)***

Ind: Trat. simptomatic al hiperacidității gastrice din: ulcer gastric, duodenal, gastrite, esofagită de reflux, hernie hiatală.
Dz: 1-2 linguri.
Cind: IR severă.
A!: Scade efectele tetraciclinelor, anticoagulantelor, clorpromazinei, fierului, izoniazidei, acidului nalidixic, fenilbutazonei, digoxinei, vit. A și C.

MALUGEL B *COD ATC: A02AD01*
PHARMASOL; Susp. orală 10 g hidroxid de aluminiu gel uscat; 3,5 g hidroxid de magneziu; 15 g sorbitol; 2,5 g benzocaină (fl. × 250 ml) ***(OTC)***

Ind: Trat. simptomatic al hiperacidității gastrice din: ulcer gastric, duodenal, gastrite, esofagită de reflux, hernie hiatală.
Dz: 1-2 linguri.

Cind: IR severă.
A!: Scade efectele tetraciclinelor, anticoagulantelor, clorpromazinei, fierului, izoniazidei, acidului nalidixic, fenilbutazonei, digoxinei, vit. A și C.

MARVELON 21 *COD ATC: G03AA09*

N.V. ORGANON; Cpr. cu desogestrel 0,15 mg; etinilestradiol 0,03 mg *(P-6L)*

Ind: Contracepția orală.
Dz: 1 cpr./zi începând cu prima zi a ciclului, 21 zile, apoi 7 zile pauză.
Cind: Tromboflebită, procese tromboembolice, HTA; IH; icter colestatic; antecedente de icter pe sarcină; sd. Rotor și sd. Dubin-Johnson; tumori estrogen-dependente; hiperplazie endometrică; sângerări vag. nediagnosticate; porfirie; hiperlipoproteinemie; antecedente de prurit sau herpes de gestație. Sarcină și alăptare.
A!: Fumatul crește riscul apariției de boli cardiovasculare. Femei peste 35 ani. Boli hepatice, IC latentă sau manifestă, tulburări renale, HTA, epilepsie sau migrenă; hemoglobinopatie cu celule în formă de seceră; fibrom uterin, endometrioză.
RA: *Aparat genito-urinar:* sângerare intermenstruală, amenoree post-medicație, modificări ale secreției cervicale, creșterea dimensiunii fibromului uterin, agravarea endometriozei, candidoză vagă. *Sâni:* sensibilitate, durere, mărire, secreție. *Aparat digestiv:* greață, vomă, colelitiază, icter colestatic. *Aparat cardio-vascular:* tromboză, HTA. Piele: cloasmă, eritem, urticarie. *Ochi:* disconfort al corneei în cazul în care se folosesc lentile de contact. *SNC:* cefalee, migrenă, depresie psihică. *Diverse:* retenție hidro-salină, toleranță redusă la glucoză, modificări ponderale.

MATERNA® CU SELENIU *COD ATC: A11AA03*

WYETH LEDERLE PHARMA GmbH; Cpr. film. beta-caroten 1500 UI, Vit. A acetat 1500 UI, Vit. E acetat 30 UI, Vit. C 100 mg, acid folic 1 mg, Vit. B_1 3 mg, Vit. B_2 3,4 mg, niacinamidă 20 mg, Vit. B_6 10 mg, Vit. B_{12} 12 g, Vit. D 250 UI, biotină 30 g, pantotenat de calciu 10 mg, carbonat de calciu 250 mg, oxid de magneziu 50 mg, iodură de potasiu 150 mg, fumarat feros 60 mg, oxid cupric 2 mg, oxid de zinc 25 mg, clorură de crom 25 g, sulfat de mangan 5 mg, molibdat de sodiu 25 g, selenat de sodiu 25 g ***(OTC)***

Ind: Suplimentarea aportului de vitamine, minerale și oligoelemente în timpul sarcinii și după naștere, pentru mamele care alăptează sau nu. Completarea aportului nutrițional de vitamine, minerale și oligoelemente înainte de concepție.
Dz: *Adulți:* 1 cpr./zi după micul dejun.
Cind: Hipersensibilitate la componentele produsului, hipervitaminoza A și D, hipercalcemie, tulb. ale funcției renale, afecțiuni cu acumulare crescută de fier.
A!: În anemia pernicioasă, acidul folic poate corecta parțial modificările hematologice determinate de deficitul de vit. B_{12}, în timp ce modificările neurologice progresează. Depășirea aportului zilnic recomandat (mai mult de două

Dj./zi sau peste 6.000 UI vit. A/zi) în timpul sarcinii, poate produce reacții adverse la fat. vit. B_2 poate colora materiile fecale în gri-negru.
RA: Rar hipersensibilitate, ocazional greață, vărsături, diaree, prurit, disconfort gastric, rash, constipație.

MAXIMUM STRENGTH SINUS *COD ATC: R01BA52*
LEINER HEALTH PRODUCT; Cpr. film. cu paracetamol 500 mg, pseudoefedrină 30 mg ***(OTC)***

Ind: Decongestionant nazal cu acțiune sistemică.
Dz: *Adulți:* Oral 60 mg pseudoefedrină de 3-4 ori pe zi; *copii 2-5 ani:* 15 mg pseudoefedrină de 3 ori pe zi; *copii 6-12 ani*: 30 mg pseudoefedrină de 3 ori pe zi.
A!: Pozitivează testele antidoping.

MAXITROL® *COD ATC: S01CA01*
ALCON SRL; Sol. oft. dexametazonă 0,1%, neomicină 3,5 mg/g, polimixină B sulfat 6000 u/g. (fl. × 5 ml); Ung. oft. dexametazonă 0,1%, neomicină 3,5 mg/g, polimixină B sulfat 6000 u/g (tub × 3,5 g) ***(P-RF)***

Ind: Inflamații oculare.
Dz: *Sol. oft.:* Se instilează 1-2 pic. local, în sacul conjunctival, de 4-6 ori/zi. *Ung:* Se aplică o cantitate mică în sacul conjunctival de 3-4 ori/zi.
Cind: Keratita epitelială produsă de Herpes simplex (keratita dendritică), vaccină, varicelă. Infecțiile mycobacteriene ale ochiului. Afecțiuni fungice ale structurilor oculare. Hipersensibilitate. După înlăturarea fără complicații a unui corp străin cornean.
A!: Monitorizarea presiunii intraoculare.
RA: Sensibilizări alergice. Creșterea presiunii intraoculare cu posibila dezvoltare a unui glaucom, afectarea nervului optic; cataractă posterioară subcapsulară, întârzierea vindecării leziunilor. Infecții fungice ale corneei.

MDP-KIT IN VIVO TC99M *COD ATC: V09BA*
INST. IZOTOPI BUDAPESTA; Kit (ct. × 6 fl.) ***(S)***

Ind: Substanță de contrast pentru investigarea sistemului osos.

MECLON; MECLON 1000 *COD ATC: G01AF20*
FARMIGEA S.P.A.; Cremă (tub × 30 g + 6 aplicatoare), sup. vag. (ct. × 10 sup.), sol. ext. (5 fl. × 130 ml + 5 f. × 10 ml + 5 canule vag.) cu metronidazol și clotrimazol într-un raport fix (5:1): Meclon sup. vag: 1 sup. (2,4 g) conține 500 mg metronidazol și 100 mg clotrimazol. Meclon 1000, cremă pt. aplicații vag.: 100 g cremă cu 20 g metronidazol și 4 g clotrimazol. Meclon 1000, sol. ext.: fl. de 130 ml cu 1000 mg metronidazol și f. de 10 ml cu 200 mg clotrimazol ***(P-RF)***

Ind: Cervico-vaginite și vulvo-vaginite cauzate de Trichomonas vaginalis.
Dz: Meclon, pt. aplicații ext.: bărbați: aplicare a 2 cm de cremă pe gland o dată/zi, seara; femei: aplicații de 2 ori/zi, câte 2 cm de cremă în zona vulvară și perivulvară. Meclon 1000, cremă pt. aplicații intravag: o aplicație/zi. Meclon sup. vag.: 1 sup. intravag., o dată/zi. Meclon 1000 sol. pt. spălături vag.: un duș vag./zi, dimineața.

MECLOZOL *COD ATC: G01AXN1*
SICOMED SA; Cpr. vag. cu metronidazol 0,5 g, clotrimazol 0,150 g, neomicină 0,200 g, hexestrol acetat 0,001 g ***(P-RF)***

Ind: Curativ: vaginite microbiene cu germeni piogeni aerobi și/sau anaerobi, trichomoniază vaginală (în asociere cu metronidazol per os), vaginite fungice cauzate de specii din genul Candida sau Torulopsis, vaginite parazitare, bacteriene, fungice sau mixte la femei cu mucoasă atrofică. Profilactic: în trim. II și III de sarcină la gravide cu micoză vaginală în antecedente; femei tratate cu antibiotice, imunosupresive, corticosteroizi, citostatice; înainte de intervenții endouterine (biopsie de endometru, histerosalpingografie, histeroscopie, histerotubație etc.); înainte și după intervenții chirurgicale în regiunea cervicală și vaginală.
Dz: Vaginite acute (trichomoniazice, bacteriene, fungice): 1 cpr. dimineața și seara 1-2 zile, apoi 1 cpr. seara 6-8 zile. Vaginite subacute și cronice: 1 cpr. seara 8-10 zile. Profilactic: 1 cpr. la 7-10 zile.
Cind: Vaginite la femei cu tumori benigne și maligne estrogenodependente.

MECOPAR FORTE *COD ATC: A05BAN3*
SICOMED SA; Cpr. film. cu bitartrat de colină 100 mg, metionină 100 mg, acetat de alfa-tocoferol 3 mg, clorhidrat de tiamină 2 mg, riboflavină 2 mg, clorhidrat de piridoxină 2 mg, ciancobalamină 0,00067 mg, nicotinamidă 6 mg, pantotenat de calciu 7 mg ***(OTC)***

Ind: Hepatite cronice și ciroze hepatice cu infiltrație și degenerescență grasă. Profilactic, în condiții de expunere la substanțe hepatotoxice; sarcină toxică, boală de iradiere, ATS, boli degenerative ale sistemului nervos (ca medicație adjuvantă).
Dz: 1-3 cpr. la mese.
Cind: Encefalopatie portală, precomă și comă hepatică, hepatită gravă, IR gravă, hiperamoniemie. Asociere cu levodopa.

MEMO
PHARCO PHARMACEUTICALS; Cps. gelatin. moi conținând: lăptișor de matcă 750 mg, extract standardizat de ginkgo biloba 120 mg, extract de damiană 100 mg și extract de ginseng 150 mg; ct. × 12 cps. gelat. moi ***(OTC)***

Ind: Benefic pentru îmbunătățirea circulației cerebrale și periferice, pentru întârzierea simptomelor de senilitate și pentru creșterea rezistenței organismului la stresul fizic și psihic.
Dz: O capsulă pe zi.

MERCILON *COD ATC: G03AA09*
N.V. ORGANON; Cpr. cu desogestrel 0,15 mg; etinilestradiol 0,02 mg ***(P-6L)***

Ind: Contracepția orală.
Dz: 1 cpr./zi începând cu prima zi a ciclului, apoi 7 zile pauză.
Cind: Tromboflebită acută, procese tromboembolice; HTA severă; IH; icter colecistic; antecedente de icter pe sarcină; sd. Rotor și sd. Dubin-Johnson; tumori estrogen-dependente; hiperplazie endometrială; sângerări vaginale nediagnosticate; porfirie; hiperlipoproteinemie; antecedente de prurit sau herpes de gestație. Sarcină și alăptare.
A!: Fumatul crește riscul apariției de boli cardiovasculare. Femei peste 35 ani trebuie. IC latentă sau manifestă, tulburări renale, HTA, epilepsie sau migrenă; hemoglobinopatie cu celule în formă de seceră; fibrom uterin, endometrioză.
RA: *Aparat genito-urinar:* sângerare intermenstruală, amenoree, modificări ale secreției cervicale, creșterea dimensiunii fibromului uterin, agravarea endometriozei, candidoză. *Sâni:* sensibilitate, durere, mărire, secreție. Aparatul gastrointestinal: - greață, vomă, colelitiază, icter colestatic. *Sistemul cardio-vascular:* tromboză, creșterea tensiunii. *Piele:* - chloasma, eritem, urticarie. *Ochi:* - disconfort al corneei în cazul în care se folosesc lentile de contact. *SNC:* cefalee, migrenă, depresie. *Diverse:* retenție hidrosalină, toleranță redusă la glucoză, modificări ponderale.

METASPAR *COD ATC: A05BAN3*
SICOMED SA; Cps. cu metionină 62,5 mg, ac. aspartic 62,5 mg, tiamină 1,95 mg, riboflavină 1,5 mg, piridoxină 15 mg, ac. nicotinic 3 mg ***(OTC)***

Ind: Hepatită cronică, steatoză hepatică.
Dz: Oral 3-5 cps. de 3 ori/zi, înainte de mese.
Cind: Encefalopatie hepatică, precomă și comă hepatică, IR gravă. Asociere cu levodopa.
RA: Deprimare SNC, erupții cutanate, leucopenie, agranulocitoză (rar). În IH gravă poate accentua toxemia.

METRONIDAZOL A 0,5% *COD ATC: J01XD01*
SICOMED SA; Sol. perf. 0,5%; 1000 ml conțin: metronidazol 5 g și glucoză monohidrat 55 g (fl. × 200 ml) ***(S)***

Ind: Tratamentul curativ al infecțiilor medico-chirurgicale cu germeni anaerobi sensibili.
Profilaxia infecțiilor postoperatorii cu germeni anaerobi sensibili, după intervenții chirurgicale digestive ori genitale, în asociere cu un antibiotic activ pe germenii aerobi. Amibiaza severă cu localizare hepatică și intestinală.
Dz: *Tratamentul infecțiilor cu germeni anaerobi: Adulți:* 1-1,5 g metronidazol/zi (1 – 1 1/2 flacoane Metronidazol A 5 g/l) în 2-3 perfuzii i.v. *Copii:* 20-30 mg metronidazol/kg și zi în 2-3 perfuzii i.v. Calea i.v. poate fi inlocuită imediat ce este posibilă administrarea orală a medicamentului. *Profilaxia infecțiilor postoperatorii:* antibioprofilaxia trebuie să fie de scurtă durată, adesea limitată la perioada preoperatorie, uneori 24 ore, dar niciodată mai mult de 48 ore. *Adulți:* cu 30 minute înaintea intervenției chirurgicale se injectează i.v. o doză

unică de 1 g metronidazol (1 flacon Metronidazol A 5 g/l). *Copii:* cu 30 minute înaintea intervenției chirurgicale se injectează i.v. o doză unică de 20-40 mg metronidazol/kg.
Amibiaza: Adulți: 1,5 g metronidazol/zi (1 1/2 flacoane Metronidazol A 5 g/l) în 3 perfuzii i.v. a 500 mg metronidazol. *Copii:* 30-40 mg metronidazol/kg și zi perfuzie i.v. În amibiaza hepatică în stadiul abcedat, evacuarea abcesului este dublată de tratamentul cu metronidazol.
Cind: Hipersensibilitate la metronidazol, la alți derivați imidazolici sau la oricare dintre excipienții produsului. Alăptare.
A!: Șoferi și activități de precizie.
RA: Rare tulburări digestive benigne: greață, gust metalic, anorexie, crampe epigastrice, vărsături, diaree.
Excepțional semne cutaneo-mucoase (prurit, urticarie, tulburări vasomotorii), semne neuropsihice (cefalee, vertij, confuzie mintală, convulsii) sau pancreatite reversibile după încetarea tratamentului.
În cazul utilizării dozelor mari și/sau tratamentului îndelungat pot să apară leucopenie, neuropatii periferice senzitive reversibile în câteva zile de la întreruperea tratamentului.
Se mai poate observa colorarea brun-roșcat a urinii determinată de prezența pigmenților hidrosolubili rezultați din metabolizarea produsului.

MEZYM FORTE *COD ATC: A09AA02*
BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP; Cpr. film. pancreatină (amilază 4200 u, triacetilglicerolipază 3500 u, proteaze 250 u) ***(S/OTC)***

Ind: Tulburări funcționale ale pancreasului exocrin, maldigestie, meteorism, dispepsie, pancreatită cronică.
Dz: Oral, 1-3 cpr. la mese.

MICARDIPLUS® *COD ATC: C09DA*
BOEHRINGER INGELHEIM; Cpr. 40/12,5 mg și 80/12,5 mg telmisartan/hidroclotiazidă ***(P-RF)***

Ind: Hipertensiune arterială esențială, la pacienții a căror TA nu este controlată adecvat numai cu telmisartan.

MICROGYNON® 21; MICROGYNON® 28 *COD ATC: G03AA07*
SCHERING-PLOUGH EUROPE AG; Dj. cu 0,15 mg levonorgestrel și 0,03 mg etinilestradiol ***(P-6L)***

Ind: Contracepție orală.
Dz: 1 dj./zi începând cu prima zi a ciclului, apoi 7 zile pauză. În cazul ambalajelor cu 28 dj., în zilele de pauză se vor adm. cpr. fără subst. activă.
Cind: Tromboflebită acută, procese tromboembolice; HTA severă; IH; icter colecistic; antecedente de icter pe sarcină; sd. Rotor și sd. Dubin-Johnson; tumori estrogen-dependente; hiperplazie endometrială; sângerări vaginale ne-

diagnosticate; porfirie; hiperlipoproteinemie; antecedente de prurit sau herpes de gestație. Sarcină și alăptare.
AI: Femeile după 30 de ani. Fumatul.
RA: Uneori, tensiune mamară, tulburări gastrice și altele.

MICROLAX® *COD ATC: A06AG11*
PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER; Gel rectal cu citrat de sodiu 90 mg, D-sorbitol 625 mg, laurilsulfoacetat de sodiu 9 mg (tub × 5 ml + canulă și sigiliu) ***(P-RF)***

Ind: Laxativ.

MILGAMMA® *COD ATC: B03BA51*
WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.; Dj. cu 50 mg benfotiamină, 250 µg ciancobalamină ***(P-6L)***

Ind: Neuropatii și polineuropatii (diabetică, alcoolică ș.a.) nevralgii, nevrite, herpes zoster, pareză facială, leziuni miocardice prin deficit de vitamină B_1, afecțiuni reumatice, mialgii, fenomene de suprasolicitare și în reconvalescență.
Dz: 1 dj. de 4 ori/zi sau 1-2 dj./zi în convalescență.
Cind: Hipersensibilitate la tiamină.
RA: Reacții de hipersensibilitate (eritem, urticarie).

MILGAMMA® N *COD ATC: A11DBN1*
WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.; Cps. cu 40 mg benfotiamină, 90 mg piridoxină clorhidrat, 250 µg ciancobalamină ***(P-6L)***

Ind: Polineuropatia diabetică și alcoolică, migrenă, contracții musculare dureroase (sindroame radiculare, sindrom de coastă cervicală, sindrom umăr-mână) herpes zoster, pareză facială, în convalescență și geriatrie.
Dz: 3-4 cps./zi. În cazuri ușoare 1-2 cps./zi după mese.
Cind: Hipersensibilitate la tiamină. Asocierea cu L-dopa. Sarcină și alăptare.
RA: Reacții de hipersensibilitate (eritem, urticarie).

MILGAMMA® N *COD ATC: A11DBN1*
WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.; 2 ml de sol. inj. conțin: tiamină clorhidrat 100 mg, piridoxină clorhidrat 100 mg, ciancobalamină 1000 µg, lidocaină clorhidrat 20 mg, alcool benzilic 40 mg ***(P-RF)***

Ind: Nevrite, nevralgii, polineuropatii (diabetică, alcoolică), mialgii, sd. radiculare, anumite forme de neurită retrobulbară, herpes zoster, pareză facială și ca roborant.
Dz: 1 f. de 2 ml inj. i.m. profund. După trecerea fazei acute 1 f. de 2-3 ori/ săpt.
Cind: Tulburări grave de conductibilitate, IC acută decompensată. Asocierea cu levodopa. Nou-născuți, în special la prematuri. Sarcină și alăptare.

RA: Transpirații, tahicardie, acnee, prurit și urticarie, reacții de hipersensibilitate: exantem, dispnee, stare de șoc, angioedem. Amețeli, vărsături, bradicardie, tulburări de ritm, crampe, la doze mari.

MOBILAT *COD ATC: M02AX10*

SANKYO PHARMA GmbH; Cremă și gel (100 g conțin: ester al ac. polisulfuric cu mucopolizaharide 0,2 g, ac. salicilic 2 g, extr. de suprarenală 1 g); (tub × 50 g) ***(OTC)***

Ind: Afecțiuni reumatismale incluzând și suferința musculară asociată iradierii musculare, umăr rigid, bolile inflamatorii ale articulațiilor. Entorse, contuzii, luxații, echimoze. În fizioterapie (gelul se aplică pe catod).
Dz: Aplicări cu 5-15 cm de cremă sau gel o dată sau de mai multe ori pe zi.
Cind: Hipersensibilitate la ac. salicilic, varicelă, reacții vaccinale, infecții cutanate cu fungi și bacterii, boli specifice ale pielii (TBC, lues).
A!: Sarcină și alăptare, copii mici, afecțiuni renale.
RA: Iritații locale ale pielii, foarte rar alergii de contact.

MODAFEN® *COD ATC: R01BA52*

LECIVA; Cpr. film. cu 200 mg ibuprofen și 30 mg clorhidrat de pseudoefedrină; ct. × un blist. a 10 cpr. film; ct. × 3 blist. 10 cpr. film. ***(OTC)***

Ind: Tratament simptomatic cu durată scurtă în caz de infecții acute ale tractului respirator superior: congestie nazală și/sau sinusală cu cefalee și febră, rinită acută, sinuzită, viroză respiratorie și gripă, inflamația acută a trompei lui Eustachio, când sunt necesare atât acțiunea decongestionantă a clorhidratului de pseudoefedrină, cât și cea analgezică și antiinflamatorie a ibuprofenului. Administrare la adulți și copii în vârstă de peste 12 ani.
Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* inițial 1-2 comprimate filmate, apoi, dacă este necesar, doza se poate repeta la intervale de 4-6 ore, fără a depăși 6 comprimate filmate pe zi. Comprimatele filmate se înghit întregi, cu puțină apă, preferabil în timpul meselor. Se recomandă ca durata tratamentului să nu depășească 7 zile.
Cind: Hipersensibilitate la ibuprofen, acid acetilsalicilic, alte antiinflamatorii nesteroidiene, pseudoefedrină sau la oricare dintre excipienții produsului. Antecedente de astm bronșic asociat cu acid acetilsalicilic sau la alte antiinflamatorii nesteroidiene. Tahicardie, hipertensiune arterială, feocromocitom, insuficiență coronariană severă; insuficiență hepatică gravă; insuficiență renală gravă; ulcer gastroduodenal activ; diabet zaharat; hipertiroidism; glaucom cu unghi închis; risc de retenție urinară cu tulburări uretroprostatice; lupus eritematos diseminat. Produsul nu se va administra copiilor sub 12 ani, la care sunt necesare alte forme farmaceutice cu concentrații mai mici.
A!: Nu se recomandă în caz de rinită alergică sau vasomotorie. În caz de tahicardie, extrasistole, hemoragie gastro-intestinală sau greață se întrerupe tratamentul. Nu se recomandă consumul de băuturi alcoolice în timpul tratamentului. Prudență la pacienții cu antecedente digestive (ulcer gastroduodenal, hernie hiatală sau hemoragii digestive). La începutul tratamentului este necesară supravegherea atentă a volumului diurezei și a funcției renale la pacienții cu insuficiență cardiacă, hepatică și renală cronică, la cei tratați cu

diuretice, îndeosebi la vârstnici. În caz de apariție a tulburărilor de vedere trebuie efectuat un examen oftalmologic complet. În caz de tratament prelungit se recomandă controlul hemoleucogramei, a funcției hepatice și renale. Precauții de utilizare legate de pseudoefedrină: se întrerupe tratamentul înaintea unei intervenții chirurgicale (risc de aritmii în cazul utilizării anestezicelor halogenate inhalatorii); sportivii trebuie avertizați că pseudoefedrina poate determina pozitivarea testelor antidoping. Asocieri medicamentoase neindicate datorită interacțiunii cu ibuprofen: cu alte antiinflamatorii nesteroidiene (inclusiv salicilați în doze mari), anticoagulante orale și heparine, litiu, metotrexat în doze >15 mg pe săptămână, ticlopidină. Prudență la asocierea cu diuretice, metotrexat în doze < 15 mg pe săptămână, pentoxifilină, antihipertensive (blocante beta-adrenergice, inhibitori ai enzimei de conversie). Asocieri contraindicate datorită interacțiunii cu pseudoefedrina: antidepresive inhibitoare ale monoaminooxidazei (IMAO) neselective; asocieri neindicate: guanetidina, anestezice generale volatile halogenate. Se evită utilizarea în timpul sarcinii și alăptării. Produsul poate, de asemenea, afecta negativ activitățile ce necesită atenție sporită, coordonare motorie și decizii rapide (de exemplu conducerea vehiculelor, folosirea utilajelor, lucrul la înălțime etc.).

RA: Cele mai frecvente sunt tulburările gastro-intestinale, cum ar fi greață, vărsături, dureri epigastrice, pirozis, diaree, constipație, flatulență etc.; rar au fost observate ulcer gastric sau duodenal, hemoragii digestive, gastrită, afectarea funcțiilor hepatice (care poate fi reversibilă), pancreatită. Pe SNC, pot apărea următoarele reacțiii adverse: amețeli, cefalee, foarte rar insomnie, depresie, instabilitate emoțională. Sporadic pot să apară tulburări ale hematopoiezei (neutropenie, agranulocitoză, anemie aplastică sau hemolitică, trombocitopenie), tulburări cardiovasculare, ca retenție hidrosalină însoțită de edeme, hipotensiune arterială, palpitații; rare sunt reacțiile de hipersensibilitate: febră, rash, hepatotoxicitate, meningită aseptică (mai ales la pacienții cu lupus eritematos sistemic și în unele colagenoze), la pacienții astmatici poate să apară bronhospasm; în cazuri excepționale au fost observate cistită, hematurie, tulburări ale funcției renale. Rar pot să apară tulburări ale vederii, tulburări ale percepției cromatice și ambliopie toxică. Supradozarea apare la doze mai mari de 400 mg/kg și poate produce intoxicații severe: pot apărea tulburări ale SNC – cefalee, amețeli, nistagmus, convulsii până la pierderea cunoștinței. În plus, pot apărea dureri abdominale, greață și vărsături. În cazuri severe au fost observate hipotensiune arterială, acidoză, deprimarea respirației și cianoză. Există riscul apariției crizelor hipertensive în caz de supradozare a pseudoefedrinei.

MORFINĂ-ATROPINĂ *COD ATC: N02AG01*

SICOMED SA; Sol. inj. (f. × 1 ml) cu morfină clorhidrat 0,02 g; atropină sulfat 0,001 g ***(S/P-TS)***

Ind: Adulți: dureri neoplazice, postoperatorii, tabetice, eclampsie, EPA, colici biliare și renale. Copii: se folosește la urgență în caz de extremă necesitate la copii 3-15 ani, mai ales la prima adm.

Dz: *Copii:* 1/2 mg morfină/an de vârstă și pe doză, de obicei o dată în 24 ore. *Copii 3-6 ani:* 1-2 mg morfină de 1-2 ori/zi inj. s.c.; 7-15 ani, 3-7 mg morfină de 1-2 ori/zi inj. s.c. *Adulți:* 1-3 f./zi inj. s.c.

Cind: Stază bronșică; glaucom; abdomen acut; cardiopatie decompensată; IR; traumatisme cranio-cerebrale (pericol de paralizie respiratorie). Nou născuți și sugari. Sarcină și alăptare.

MULTI SYMPTOM F. TYLENOL COLD *COD ATC: R05DA09*
MC NEIL CONSUMER HEALTHCARE; Cpr. cu paracetamol 325 mg, pseudoefedrină 30 mg, dextrometorfan 15 mg, clorfeniramină 2 mg ***(OTC)***

Ind: Catar respirator, bronșite.
Cind: Sugari și copii mici, astm bronșic.

MULTIBIONTA® JUNIOR *COD ATC: B03AE04*
MERCK KGaA; Cpr. eferv. cu 12 mg vit. E; 75 mg vit. C; 1,4 mg vit. B_1; 1,5 mg vit. B_2; 1,8 mg vit. B_6; ac. folic 0,15 mg; calciu 150 mg; fier 3 mg; magneziu 50 mg ***(OTC)***

Ind: Carențe vitaminice și minerale la copii.
Dz: 1 cpr. eferv./zi, într-un pahar cu apă (150 ml).

MULTIBIONTA® PLUS CALCIU ȘI MAGNEZIU *COD ATC: A12CCN2*
MERCK KGaA; Cpr. eferv. cu vit. E 12 mg; vit. C 75 mg; vit. B_1 1,3 mg; vit. B_2 1,7 mg; vit. B_6 1,8 mg; vit. B_{12} 0,003 mg, pantotenat 8 mg; ac. folic 0,15 mg; nicotinamidă 18 mg; biotină 0,03 mg; calciu 100 mg, magneziu 50 mg ***(OTC)***

Ind: Carențe vitaminice și minerale.
Dz: 1 cpr. eferv./zi într-un pahar cu apă (150 ml).

MULTIBIONTA® PLUS MINERAL *COD ATC: A11AA03*
MERCK KGaA; Dj. cu vit. A 5000 U.I.; vit. D_3 400 U.I.; vit. E 10 mg; vit. B_1 2 mg; vit. B_2 2 mg; vit. B_6 2 mg; vit. B_{12} 3,0 μg; ac. folic 0,1 mg; nicotinamidă 20 mg; pantotenat de calciu 8,7 mg; vit. C 75 mg; fumarat de fier (II) 21,0 mg; pulbere de fier 8,5 mg; oxid de cupru (II) 0,6 mg; sulfat-monohidrat de mangan (II) 1,6 mg; oxid de zinc 1,8 mg și butil hidroxitoluol ***(OTC)***

Ind: Prevenirea stărilor carențiale de vitamine și minerale.
Dz: 1 dj./zi.
Cind: Hipervitaminoză A, sideroze, tulburări în legarea și transportul fierului, hipercalcemie, hipercalciurie și calculi renali.
A!: În sarcină nu se vor adm. mai mult de 10 000 U.I. vit. A/zi.
RA: Urina se poate colora în galben.

MULTIGLUTIN *COD ATC: A05BAN4*
TERAPIA SA; Sol. inj.; 1 ml sol. apoasă conține: ac. glutamic 196,5 mg; carbonat de calciu sicc. 61,45 mg; hidroxid de potasiu 1,21 mg; carbonat de calciu 2,82 mg; uree 1 mg (f. × 10 ml) ***(P-RF)***

Ind: Hepatite toxice sau infecțioase grave, precomă sau comă hepatică, encefalopatie portală.
Dz: Perf. i.v., 5-10 f./zi, în 2-3 prize, asociat cu ser glucozat.
Cind: Oligurie și IR.
A!: Insuficiența suprarenală acută și cronică, în ciroza hepatică sau boli hepatice neasociate cu hiperamoniemie; pt. dozele mari atenție la echilibrul electrolitic. Carbonatul de calciu crește toxicitatea digitalicelor și interferă cu absorbția digestivă a tetraciclinelor. Sarcină și alăptare.
RA: Inj. i.v. rapidă poate fi cauză de salivație, congestie, vomă.

MULTIROVITAL *COD ATC: A11JCN1*
OMEGA PRODINVEST; Cpr. eferv. cu vit. B_1 1,4 mg; vit. B_2 1,7 mg; vit. B_6 1,8 mg; vit. B_{12} 0,005 mg; ac. folic 0,16 mg; niacinamidă 18 mg; pantotenat de calciu 8 mg; biotină 0,15 mg; vit. C 75 mg; vit. E 12 mg; provit. A 1 mg; bicarbonat de sodiu 800 mg; ac. citric 1200 mg; zaharină sodică, dextroză, arome naturale din lămâi și portocale ***(OTC)***

Ind: Carențe nutritive datorită unui aport alimentar deficitar, insuficienței secrețiilor digestive, tulburărilor de absorbție intestinală, parazitozelor intestinale; nevoi crescute de vitamine în cursul eforturilor fizice intense, prelungite, perioada de creștere, sarcină, alăptare, trat. cu antibiotice și chimioterapice; regimuri alimentare dezechilibrate sau restrictive.
Dz: *Adulți:* 1 cpr. eferv./zi. *Copii între 4-12 ani:* 1/2 cpr. eferv./zi, într-un pahar cu apă.

MULTISIS V *COD ATC: A11JAN1*
NILE CO.; Dj. cu vit. A 5000 u.i., vit. D 400 u.i., vit. C 75 mg, vit. B_1 2 mg, vit. B_2 3 mg, vit. B_6 2 mg, vit. B_{12} 2 µg, ac. folic 0,25 mg, nicotinamidă 20 mg, pantotenat de calciu 5 mg ***(OTC)***

Ind: Revitaminizare în caz de febră, infecții acute, convalescență, înaintea unor intervenții chirurgicale, diabet, cașecxie, obezitate, ulcer peptic, malnutriție, adjuvant în terapia antibiotică.
Dz: 1 dj. de 3 ori pe zi sau doză prescrisă de medic.

MULTIVITAMINE *COD ATC: A11JAN1*
PHARMEX ROM IND.; Cpr. mast. cu vit. A 5000 ui, vit. D 400 ui, vit. C 50 mg, vit. B_1 1 mg, vit. B_2 1,5 mg, vit. B_6 1 mg, vit. B_{12} 4 µg, ac. pantotenic 5,5 mg ***(OTC)***

Ind: Carențe nutritive datorită unui aport alimentar deficitar, insuficienței secrețiilor digestive, tulburărilor de absorbție intestinală, parazitozelor intestinale; nevoi crescute de vitamine în cursul eforturilor fizice intense, prelungite, perioada de creștere, sarcină, alăptare, trat. cu antibiotice și chimioterapice; regimuri alimentare dezechilibrate sau restrictive.

MULTIVITAMINE PLUS FIER *COD ATC: B03AE03*
PHARMEX ROM IND.; Cpr. mast. cu fumarat de fier 4 mg, vit. A 5000 ui, vit. D 400 ui, vit. C 50 mg, vit. B_1 1 mg, vit. B_2 1,5 mg, vit. B_6 1 mg, vit. B_{12} 4 μg, ac. pantotenic 5,5 mg ***(OTC)***

Ind: Carență de fier și acid folic.

MYCOSPOR® ONYCHOSET *COD ATC: D01AC60*
BAYER AG; Ung. cu bifonazol 1 g, uree 40 g (fl. × 10 g + 15 plasturi + 1 aplicator) ***(P-RF)***

Ind: Micoze cutanate ale pielii mâinilor și picioarelor.
Dz: Se aplică o dată pe zi pe suprafața afectată.
Cind: Hipersensibilitate.
RA: Rar iritație, macerarea tegumentului, descuamare,

N

NAPHCON-A
ALCON SRL; Sol. oft. cu nafazolină clorhidrat 0,025%, maleat de feniramin 0,3% (fl. × 15 ml) ***(OTC)***

Ind: Ameliorarea iritației și/sau congestiei oculare. Afecțiuni oculare alergice sau inflamatorii.
Dz: *Adulți:* 1-2 pic. de 3-4 ori pe zi în fiecare sac conjunctival.
Cind: Glaucom.

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM GLUCOSO 5% *COD ATC: B05BB02*
HEMOFARM; Sol. perf. clorură de sodiu 9 g, glucoză 50 g, apă distilată (fl. × 500 ml) ***(S)***

Ind: Substituent hidroelectrolitic în condiții de alcaloză hipocloremică; pierderi de clor; deshidratare hipotonă; deshidratare izotonă; substrat energetic; vehicul pentru concentratele de electroliți și medicamente compatibile; corectarea hiponatremiei asociate cu scăderea volumului fluidelor extracelulare (afecțiuni renale cronice, insuficiență adrenală corticală etc.); menținerea la un nivel satisfăcător al nivelului fluidului extracelular și a circulației pre- și postoperator, la pacienții cu funcție cardiovasculară și renală normală.
Dz: Perf. i.v. 500-1000 ml la 24 ore. *Adulți:* rata de adm. este de 80 pic./min. (cca 250 ml/oră); *copii:* rată adm. este de 5 ml/kgc/oră.
Cind: Deshidratare hipertonă, hipervolemie, hipokaliemie, IR acută, coma diabetică, delirium tremens. Nu se folosește pentru hemodiluție deoarece induce aglutinarea eritrocitelor și hemoliza, accidente cerebrale vasculare ischiemice.
A!: Prudență la cei cu IC congestivă, edeme periferice, edem pulmonar, IR, ciroza hepatică, hipoproteinemie, gravide cu preeclampsie, în asociere cu corticosteroizi sau corticotropin, diabetici.

RA: Durere la locul adm., iritație locală, iritație venoasă, tromboflebită, hipokaliemie, hipomagneziemie, hipofosfatemie.

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM CUM LACTATO (SOL. HARTMANN) *COD ATC: B05BB01*
HEMOFARM; Sol. perf. 1000 ml conțin: clorură de sodiu 5,98 g, clorură de calciu 0,2 g, clorură de potasiu 0,3 g, soluție lactat de sodiu 6,48 g (fl. × 500 ml) ***(S)***

Ind: Deshidratare hipovolemică și predominant extracelulară balanțată acido-bazic sau ușoară acidoză. Tratament inițial în șoc, hemoragie sau traumatisme.
Dz: Perf. i.v. până la 2500 ml/zi; rată de adm. 60 pic./min.
Cind: Afecțiuni hepatice severe, IR acută, edem pulmonar, alcaloză, acidoză lactică, deshidratare hipertonă. Nu se folosește pentru corectarea deficiențelor majore de calciu și potasiu.
A!: Prudență la cei cu IC congestivă, insuficiență circulatorie, alterări renale sau hepatice, hipoproteinemie, trat. cu corticosteroizi sau corticotropin.

NEO-PANPUR *COD ATC: A09AA02*
EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Cpr. film. cu pancreatină 125 mg (lipază 10000 u, amilază 9000 u, protează 500 u) ***(OTC)***

Ind: Tulb. funcționale ale pancreasului, tulb. biliare.
Dz: De 3 ori pe zi câte 1-3 cpr., înghițite întregi cu puțin lichid, la mese sau la scurt timp după mese.

NEOBACIN *COD ATC: D06C*
DAR AL DAWA; Ung. 1 g conține: neomicină sulfat 5000 UI și bacitracină zinc 250 UI (tub × 15 g) ***(P-RF)***

Ind: Infecțiile bacteriene ale mucoaselor și pielii, infecții bacteriene secundare în eczeme și dermatoze; colpite, cervicite, rupturi perineale operate, post-epiziotomie; infecții secundare în rinite acute și cronice, otite externe, post-operator în intervenții ale mastoidelor și sinusurilor; profilaxia infecțiilor plăgii ombilicale, infecțiilor bacteriene cutanate și dermatitelor; ca antibiotic local în profilaxia suprainfecțiilor arsurilor, plăgilor de suprafață postoperatorii și post-traumatice.
Dz: Se aplică o peliculă subțire pe zona infectată a pielii de 2-3 ori/zi atât la adulți cât și la copii.
Cind: Hipersensibilitate la una din componente.
RA: Rar, erupții cutanate, prurit, hipersensibilitate.

NEOCOPIRIN *COD ATC: N02ABA51*
LABORMED PHARMA SA; Cpr. 400 mg acid acetilsalicilic și 32 mg cafeină anhidră; ct. × 2 blist. × 10 cpr.; ct. × 200 blist. × 10 cpr. ***(S/OTC)***

Ind: Tratamentul simptomatic al durerilor de intensitate ușoară-medie cu diferite localizări: cefalee, migrene, mialgii, artalgii, alte dureri reumatice, nevralgii, dureri dentare, dureri postoperatorii, dureri intercostale, sciatică, dismenoree.

Dz: Un comprimat la 4-6 ore. Administrarea se face de preferință pe stomacul gol; în caz de iritație gastrică sau la bolnavii cu risc ulcerogen, se recomandă administrarea în timpul mesei.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componentele produsului, ulcer gastroduodenal activ, gastrite, boli cu risc hemoragic mare, insomnie, copii cu vârsta sub 7 ani. Este contraindicat în primul trimestru de sarcină și înainte de travaliu.
A!: La pacienții cu astm bronșic și alte alergii, ca și la cei cu hipersensibilitate la antiinflamatoare nesteroidiene, pot fi declanșate crize de dispnee și alte reacții alergice de tip anafilactic. Prin conținutul său în cafeină, poate pozitiva testele de control antidoping. Copii: la copiii cu gripă, viroze respiratorii sau varicelă există risc de complicații infecțioase și sindrom Reye. Se impun precauții în cazul existenței următoarelor situații: antecedente de ulcer și gastrită (risc de hemoragii digestive), insuficiență renală cronică, insuficiență hepatică, astm bronșic, gută, epilepsie, angină pectorală și aritmii. interacțiuni: corticosteroizi, antiinflamatoare nesteroidiene, anticoagulante, băuturi alcoolice, antidiabetice orale. în trimestrele II și III de sarcină și în perioada alăptării, produsul se poate administra cu prudență și numai la recomandarea medicului.
RA: Tulburări digestive: epigastralgii, mici sângerari digestive, greață, vărsaturi, diaree sau constipație, dureri abdominale. Reactii alergice: erupții cutante, edem angioneurotic, crize de astm bronșic, mai rar reacții de tip anafilactoid mergând până la asfixie sau colaps (la pacienții cu hipersensibilitate la acidul acetilsalicilic și alte antiinflamatoare nesteroidiene). Afectare renală: nefrită interstițială, necroză papilară, retenție hidrosalină. Tulburări neurologice: insomnie, tremor fin al extremitaților. La supradozare apar: tulburări gastrointestinale (hemoragii, greață, vărsături), fenomene de salicism (amețeli, cefalee, tinitus și surditate parțială, tulburări de vedere, greață, vomă, somnolență sau excitație cu stare confuzivă, creșterea temperaturii, erupții acneiforme). Simptome datorate cafeinei: tahicardie, extrasistole, insomnie, tulburări respiratorii, tremor.

NEOCRYSTEPIN *COD ATC: C02LA51*
LECIVA; Dj. cu reserpină 0,1 mg, dihidroergocristină mesilat 0,58 mg și clortalidonă 25 mg ***(P-6L)***

Ind: HTA esențială și renală, moderată sau severă, care nu răspunde la monoterapie cu un diuretic sau cu un blocant beta-adrenergic.
Dz: Int., trat. se începe cu 1 dj./zi (în cazurile grave de 2 ori/zi); întreținere 1 dj. la 2-3 zile.
Cind: Depresii, ulcer în evoluție, alergie la unul din componente, alergie la sulfamide.
A!: Ulcer în antecedente, hepatici și renali, în prezența tulburărilor hematopoiezei; diabetici.
RA: Hipokaliemie, congestie nazală, uscăciunea gurii, amețeli, hTA ortostatică, anorexie, pirozis, greață, vomă, diaree, colici, disfuncție sexuală, somnolență, stare depresivă.

NEODEX *COD ATC: S01CA01*
AMMAN PHARM. IND.; Sol. oft. cu neomicină 5 mg/ml, dexametazonă 1 mg/ml (fl. × 10 ml) ***(P-RF)***

Ind: Tratament local în infecții cu germeni sensibili (uveite, sclerite, episclerite, cheratite, conjunctivite alergice, tarsite, orjelet, blefarite).

Dz: O pic. de 4-6 ori pe zi în sacul conjunctival. Durata trat. cca 7 zile.
Cind: Keratită herpetică, keratită micotică, keratoconjunctivită virală.

NEODOLPASSE *COD ATC: M01AB55*
FRESENIUS KABI GmbH; Sol. perf. 1000 ml conțin: diclofenac sodic 0,3 g, citrat de orfenadrina 0,12 g osmolaritate 294-303 mOsm/l (fl. × 250 ml) ***(S)***

Ind: Durere postoperatorie în intervenții neurochirurgicale, durere în afecțiuni reumatice, durere de origine vertebrală.
Dz: *Adulți și copii peste 14 ani:* 250 ml pe zi, în cazuri excepționale 2 × 250 ml/zi. Durata perfuziei 1,5-2 ore. În IR dozele se ajustează. Durata trat. 5-10 zile. Trat. poate fi reluat după minim 2 săptămâni.
Cind: Hipersensibilitate, miastenia gravis, paralizie bulbară, glaucom cu unghi îngust, retenție urinară (asociată cu adenom de prostată, hipertrofia prostatei, obstrucție vezicală), tahiaritmii, ulcerații gastro-intestinale, megacolon, tulb. hematopoietice, porfirie, istoric de astm bronșic, urticarie sau rinită acută după adm. ac. acetilsalicilic. Copii sub 18 luni. Sarcină și alăptare.
RA: Epigastralgii, inapetență, greață, varsături, diaree, crampe abdominale, dispepsie, anorexie, meteorism, cefalee, amețeli, vertij, rash, exantem.

NEOPREOL *COD ATC: D07CA03*
ANTIBIOTICE IAȘI; Ung. cu prednisolon alcool 0,25 g, neomicină sulfat 0,5, untură de pește 40 g, vaselină farmaceutică 38,25 g, ceară galbenă 4 g, lanolină 17 g (tub × 40 g) ***(OTC)***

Ind: Arsuri localizate de gradul I și II; radiodermite cronice tardive ulcerate, fără sfacele; ulcere cronice de natură variabilă (ulcere varicoase, escare după diatermocoagulare, ulcere postinfecțioase).
Dz: Se aplică pe zona lezată un strat subțire de ung., de 3-4 ori/zi.
A!: În ulcerele cu țesuturi necrozate, aplicarea se va face numai după eliminarea acestora.

NEUROMULTIVIT *COD ATC: A11DB*
LANNACHER HEILMITTEL GmbH.; Cpr. film. cu vit. B_1 100 mg, vit. B_6 200 mg, vit. B_{12} 0,24 mg și excipienți ***(OTC)***

Ind: Trat. adjuvant in polineuropatii de diverse etiologii, nevrită și nevralgie, nevrită radiculară apărută ca urmare a bolii degenerative a maduvei spinării, durere și hipomotilitate cervicală datorate iritării plexului nervos cervical, nevralgie intercostală, nevralgie de trigemen, ischialgie, sd. umăr-mână, sd. lombar, sd. cervical, pareză pe nerv facial.
Dz: 1 cpr. de 3 ori pe zi.
Cind: Hipersensibilitate la tiamină, piridoxină, ciancobalamină sau oricare dintre excipienții produsului. Sarcină și alăptare.
RA: Greață, cefalee, amețeli. Rar hipersensibilitate la nivel cutanat.

NICOLEN *COD ATC: A02AXN1*
SICOMED SA; Gran. cu alginat de sodiu 5 g, fosfat de aluminiu gel 10 g, trisilicat de magneziu 10 g, nipagin 0,01 g, galben de tartrazină 0,05 g, aromă orange 0,3 g, PVP K3 3 g, glucoză monohidrat ad. 100 g (fl. × 100 g) ***(OTC)***

Ind: Gastrite hiperacide, ulcer gastric sau duodenal, esofagite de reflux, enterocolite, colopatii, sigmoidite, rectite, intoxicații prin ingerări de substanțe toxice, contaminări accidentale cu radionuclizi.
Dz: Doza uzuală este de 5 g granule (1 pachet sau 2 lingurițe) de 2-3 ori/zi între mese. În faza acută a ulcerelor se adm. 1 pachet (2 lingurițe) la 2-3 ore. O cură durează 15-30 zile. În intoxicațiile prin ingestie de substanțe toxice sau caustice se pot adm. 6-10 lingurițe (3-5 pachete) dizolvate în apă.
Cind: Diabet zaharat.

NIDOFLOR *COD ATC: D07CB01*
ANTIBIOTICE IAȘI; Cremă cu nistatină 10 000 000 UI, neomicină sulfat 0,382 g, triamcinolon acetonid 0,1 g, lanette N 16 g, eutanol G 4 g, glicerină 12 g, nipagin 0,15 g, nipasol 0,05 g, apă demineralizată 63,988 g/100 g (tub × 15 g) ***(P-RF)***

Ind: Intertrigo de natură microbiană, candidozică sau mixtă, perionichii și dermite alergice de contact, microbiene sau candidiene.
Dz: Se aplică de 2-3 ori/zi un strat subțire de cremă pe zona cutanată lezată masând ușor.
Cind: tbc, viroze cutanate (inclusiv herpesul simplu, vaccina și varicela); hipersensibilitate.
A!: Sarcină și alăptare.

NOSTAMINE *COD ATC: S01GA51*
E.I.P.I.C.O.; Sol. oft. cu nafazolină clorh. 0,5 mg; clorfeniramin maleat 0,5 mg (fl. × 10 ml) ***(OTC)***

Ind: Decongestiv în iritații oculare, inflamații conjunctivale, sd. cataral de primăvară și alte manifestări alergice oculare.
Dz: 1-2 pic în sacul conjunctival la 3-6 ore.
Cind: Glaucom cu unghi închis.
RA: În aplicațiile frecvente poate apărea o senzație de înțepătură ușoară, trecătoare.

NOVALOX *COD ATC: A02AD01*
P.N. GEROLYMATOS SA; Cpr. mast., Susp. orală (fl. × 300 ml); 1 cpr. sau o lingură conțin: aluminiu glicinat 0,3 g, oxid de magneziu 0,1 g ***(OTC)***

Ind: Ulcer peptic, ulcer duodenal, gastrită hipertrofică, tulburări gastrointestinale asociate cu hiperaciditate și hipermotilitate, gastrite cronice, esofagite, sindrom de colon iritabil, meteorism.
Dz: 1/2 h după masă, 2 linguri de supă sau 2 cpr. care se mestecă. Doza se poate dubla fără pericol. În cazuri de crize gastrointestinale, se recomandă mestecarea a 1-2 cpr. între mese.
A!: IR. Trat. cu tetracicline.
RA: Dozele mari pot provoca constipație sau diaree. Rar, osteomalacie și miopatie centrală.

NOVOTHYRAL *COD ATC: H03AA03*

MERCK KGaA; Cpr. cu 100 µg levotiroxină sodică, 20 µg liotironină sodică ***(P-6L)***

Ind: Gușa eutiroidiană; hipotiroidie; profilaxia recidivelor după tiroidectomie; adenocarcinomul tiroidian (după tiroidectomie).
Dz: *Adulți:* 1/2-1 cpr./zi.
Cind: Hipertiroidie. Sarcină și alăptare.
A!: Pacienții în vârstă, cu afecțiuni coronariene, IC, tahiaritmii. Asocierea cu fenitoină, salicilați, furosemid (în doze mari), clofibrat.
RA: Simptome de hipertiroidie (de ex. flapping tremor, tahicardie, hiperhidroză, diaree, scădere ponderală, senzație subiectivă de neliniște).

NOVYNETTE *COD ATC: G03AA09*

GEDEON RICHTER Ltd.; Cpr. filmate cu etinilestradiol 0,02 mg, desogestrel 0,15 mg ***(P-6L)***

Ind: Contracepție orală.
Dz: 1 cpr./zi 21 de zile, cu începere din prima zi a ciclului menstrual, apoi pauză de 7 zile.
Cind: Tulburări ale funcției hepatice, sd. Dubin-Johnson și Rotor. Afecțiuni cardiovasculare și cerebrovasculare, afecțiuni tromboembolice, tumori hepatice, carcinom mamar sau de endometru, hipertrofia endometrului, tulburări ale metabolismului lipidic, HT arterială severă, diabet zaharat sever, porfirie, sângerări vaginale nediagnosticate, otoscleroză (care s-a agravat în timpul sarcinilor anterioare), icter idiopatic de sarcină sau prurit sever de sarcină, herpes genital. Sarcină și alăptare.
A!: IC, afecțiune renală, HTA, epilepsie și migrenă, diabet zaharat, varice, flebite, otoscleroză, scleroze multiple, coreea minor, tetanie latentă, tumoră uterină benignă, endometrioză, mastopatie, la femeile în ale căror familii au apărut cazuri de afecțiuni tromboembolice juvenile sau tulburări de coagulare a sângelui.
RA: Sângerări intermenstruale, modificarea secreției vaginale, infecții vaginale (candidoze), senzație de tensiune în sâni, greață, vărsături, litiază biliară, icter colestatic, tromboză, HTA, cloasmă, eritem nodos, exanteme, intoleranță la lentile de contact, cefalee, migrene, labilitate emoțională, retenție hidrosalină, scăderea toleranței la glucoză, modificarea greutății corporale.

NUROFEN RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ *COD ATC: R01BA52*

BOOTS CO. PLC.; Cpr. film. cu ibuprofen 200 mg și clorhidrat de pseudoefedrină 30 mg ***(OTC)***

Ind: Diminuează secreția nazală, decongestionează căile respiratorii și sinusurile, scade febra, ameliorează durerile, cefaleea și disconfortul faringian fără a determina somnolență.
Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* doza inițială 2 cpr. apoi 1-2 cpr. la 4 ore.
Cind: Alergie la componetele produsului, ulcer, boli cardiovasculare, HTA, diabet, glaucom, afecțiuni ale prostatei sau tiroidei.
RA: Iritații gastrice, greață, constipații, insomnie, transpirații, amețeli, palpitații, dificultăți de micțiune, erupții cutanate.

Concor® COR
Bisoprolol
2,5 mg

Primul Sosit

în tratamentul Insuficienţei Cardiace Cronice

Concor® Cor 2,5; 5;10 mg

Substanța activă: Bisoprolol fumarat 2:1. **Indicații:** Tratamentul insuficienței cardiace cronice, stabile, de gravitate medie până la severă, în condițiile diminuării funcției sistolice a ventriculului stâng (fracție de ejecție ≥ 35%, confirmată echocardiografic) - în completarea tratamentului cu inhibitori de enzima de conversie și diuretice, precum și (în cazul de față) cu glicozide cardiace. **Contraindicații:** Administrarea **Concor® Cor** 2,5 mg nu este permisă în formele acute de insuficiență cardiacă, insuficiență cardiacă decompensată; • în șocul cardiogen; • tulburările de conducere atrioventriculară de grad înalt (blocuri AV de grad II și III), în absența unui pacemaker cardiac; • sindromul nodului sinusal bolnav (Sick-Sinus-Syndrome); • bloc sinoatrial bradicardie (<60 bătăi/minut) înaintea începerii tratamentului; • hipotensiune arterială (TA sistolică sub 100 mm Hg); • astmul bronșic sever sau bronhopneumopatia cronică obstructivă severă; • arteriopatiei periferice ocluzivă severă, sindrom Raynaud; • feocromocitom netratat; • acidoză metabolică; • hipersensibilitatea cunoscută la bisoprolol sau alt ingredient din compoziția tabletei. **Efecte secundare:** astenie, stare de epuizare, tulburări de somn, depresie, coșmaruri, halucinații, reducerea secreției lacrimale, conjunctivită, tulburări auditive, rar bradicardie, agravarea insuficienței cardiace, bronhospasm (la cei cu astm bronsic), rinigtă alergică, grețuri, vărsături, diaree, constipație, slăbiciune musculară, crampe musculare, tulburări de potență, reacții alergice, rar creșterea enzimelor hepatice etc. **Mod de administrare:** Se ve începe tratamentul insuficienței cardiace cronice la pacientul stabil sub tratament cu diuretic și inhibitor de enzima de conversie cu 1,25 mg (½ tableta **Concor® Cor** 2,5 mg) **Concor® Cor** și se va menține timp de 1 săptămână după care dacă este tolerat se va creste doza la 2,5 mg. Doza se va menține 1 săptămână și se va crește cu 1,25 mg/săptămână în continuare până la atingerea dozei de 5 mg. Doza de 5 mg de **Concor® Cor** se va menține timp de 4 săptămâni și se va crește cu 2,5 mg în funcție de tolerabilitate după care se va menține alte 4 săptămână. Doza ținta fiind de 10 mg **Concor® Cor.** **Mod de prezentare**: Cutii a 30 de tablete de bisoprolol fumarat de 2,5, 5, 10 mg.

Merck CardioMetabolic Care

CHIMIMPORTEXPORT – PLURIMEX S.R.L.
Agent Merck KGaA, Germania
Reprezentanța MERCK HSEE pentru produse farmaceutice
Str. Tunari nr. 26, Sector 2, București
Tel.: 021 211 85 68; Fax: 021 210 74 21
e-mail: office@chimimport.ro; www.chimimport.ro

MERCK

VREM SA FIM SIGURI ?

+ 99,9%
Dr. SIGUR®
TEST DE SARCINĂ
UTILIZARE SIMPLĂ LA DOMICILIU
CERTITUDINE LA ORICE ORĂ
CONCLUDENT ÎN 3 MINUTE
Dr. SIGUR®
TEST DE SARCINĂ

Dr. SIGUR®

TEST DE SARCINĂ

ÎMPREUNA OFERIM CERTITUDINEA

mai ușor fără durere
Reuprofen®
ibuprofen
HELCOR
GMP

Eficient în toate tipurile de dureri și inflamații.

Acțiune rapidă și țintită în:

- dureri de cap, dentare
- dureri menstruale
- dureri reumatice, traumatice, musculare

Disponibil în farmacii.
Acest produs se eliberează fără prescripție medicală.
Se recomandă citirea cu atenție a prospectului.
Dacă apar manifestări neobișnuite adresați-vă medicului sau farmacistului.

Compania Farmaceutică AC HELCOR
BAIA MARE, str. V. Babeș 50,
E-mail: [illegible].ro
Http: www.[illegible].ro

www.sicomed.ro

Respectul

se câştigă

într-o viață de om

Oamenii sunt principala noastră preocupare. Pentru că la Sicomed lucrăm cu oameni şi pentru oameni, iar asta presupune grijă, devotament şi implicare constantă. Şi, pentru că vă suntem alături de aproape o jumătate de secol, am ajuns să ne cunoaştem până în cele mai mici detalii. Ştim exact ce vă trebuie şi vă oferim exact ce aveţi nevoie.
Pentru că, în cele din urmă, Sicomed oferă sănătate nu doar medicamente.

sicomed®

Respect pentru viaţă

NUTRIFLEX LIPID PERI® *COD ATC: B05BA*
B. BRAUN MELSUNGEN AG; Emulsie perf. aminoacizi 32 g, glucide 64 g, lipide totale 40 g ***(S)***

NUTRIFLEX LIPID PLUS® *COD ATC: B05BA*
B. BRAUN MELSUNGEN AG; Emulsie perf. aminoacizi 38,4 g, glucide 120 g, lipide totale 40 g ***(S)***

Ind: Furnizarea necesarului zilnic de energie, acizi grași esențiali, aminoacizi, electroliți și lichide, pentru pacienți cu catabolism mediu-sever care necesită nutriție parenterală, atunci cand nutriția orală sau enterală nu este posibilă, este insuficientă sau contraindicată.
Dz: Perf. i.v. în vene periferice. Dozele se adaptează în funcție de starea clinică. Aport energetic max. 40 kcal/kg corp și zi. Doza max. zilnică 40 ml emulsie perfuzabilă/kg corp (corespunzând la 1,28 g aminoacizi/kg corp și zi, 2,56 g glucoză/kg corp și zi, 1,60 g lipide/kg corp și zi). rata max. de perfuzie 2,5 ml/kg corp și oră. Durata trat. nu trebuie să depășească 7 zile.
Cind: Anomalii ale metabolismului aminoacizilor, lipidelor, hiperkaliemie, hiponatriemie, metabolism instabil (sd. posttraumatic sever, diabet zaharat instabil, coma de etiologie necunoscută), hiperglicemie care nu răspunde la insulină în doze de până la 6 unități/oră, acidoză, colestază intrahepatică, IH severă, IR severă, IC, diateză hemoragică severă, fază acută a infarctului de miocard și accidentului cerebral vascular, evenimente acute tromboembolice, embolie cu lipide, hipersensibilitate cunoscută la proteine din ou, proteine din soia sau la celelalte componente, nou-născuți, sugari și copii sub 2 ani.
A!: Un ritm prea rapid de perfuzare poate determina o supraîncarcare volemică, hiperhidratare și edem pulmonar.
RA: Hipertermie, înroșirea bruscă a feței, senzație de frig, frison, pierderea apetitului alimentar, greață, vărsături, deprimare respiratorie, cefalee, dureri ale coloanei vertebrale, oaselor, toracelui și în regiunea lombară, scăderea sau creșterea tensiunii arteriale, reacții de hipersensibilizare (erupții cutanate, șoc anafilactic). Mai pot apărea: bufeuri, cianoză.

NUTRINEAL PD4 CU 1,1% AMINOACIZI *COD ATC: B05DB*
BAXTER HEALTH CARE Ltd.; Sol. dial. perit. (pungă × 1 l; 1,5 l; 2 l; 2,5 l; 3 l) ***(S/P-RF)***

Ind: Dializă peritoneală.

O

OBOLIZ *COD ATC: J04AM02*
RAFARM SA; Cpr. cu 300 mg rifampicină și 150 mg isoniazidă ***(S/P-RF)***

Ind: Tuberculoză activă, boala Hansen (lepra), chemoprotecția pentru meningococcus meningitidis.
Dz: 2 cpr. pe zi în doză unică, înaintea mesei.

Cind: Hipersensibilitate sau intoleranță la medicament, hepatopatie. Sarcină (teratogen).
A!: În cazul asocierii cu PAS se va modifica doza și intervalul între prize. Interacțiuni medicamentoase cu probenecid, anticoagulante orale, glucocorticoizi, estrogeni, contraceptive, barbiturice, anestezice.

OCTENISEPT *COD ATC: G01AX66*
SCHULKE GmbH & MAYR; Sol. ext. cu octenidin 0,1% și fenoxietanol 2% (fl. × 250 ml sau 1000 ml) ***(OTC)***

Ind: Antiseptic în infecții vulvo-vaginale, cateterism al vezicii urinare, cavitatea bucală.
Dz: Aplicații locale.

OCUVITE LUTEIN *COD ATC: A11AA03*
BAUSCH & LOMB; Cpr. film. cu luteină 3 mg, zeaxantină 0,25 mg, vit. C 30 mg, vit. E 4,4 mg, zinc 2,5 mg, seleniu 10 µg ***(OTC)***

Ind: Pentru buna funcționare a sistemului de apărare al organismului împotriva radicalilor liberi care rezultă în procesele de oxidare. Asigură troficitatea ochiului.
Dz: 1 cpr. de 2 ori pe zi, în timpul meselor, cu puțină apă.
Cind: Hipersensibilitate.
RA: Rar senzație ușoară de arsură tranzitorie, înțepături ale pleoapelor și/sau vedere încețoșată. Foarte rar reacții de iritare sau hipersensibilizare.

OMACOR
SOLVAY PHARMACEUTICALS/PRONOVA BIOCARE SA; Cps. moi. conținând esteri etilici 90 ai acidului omega-3 1000 mg, incluzând 840 mg ester etilic 46% al acidului eicosapentenoic (EPA) și ester etilic 38% al acidului ocosahexenoic (DHA). fl.: × 28 cps./fl.; × 100 cps./fl.; 10 × 28 cps.

Ind: Post-infarct miocardic: în tratamentul adjuvant pentru prevenirea secundară după infarct de miocard, în asociere cu terapia standard (de ex. statine, antiagregante plachetare, beta-blocante, inhibitori ai ECA). În hipertrigliceridemie endogenă ca și supliment nutritiv atunci când măsurile dietetice singure sunt insuficiente pentru a produce un răspuns adecvat: tip IV în monoterapie, tip II b / III în asociere cu statine, când controlul trigliceridelor este insuficient.
Dz: Post-infarct miocardic: o capsulă zilnic. Hipertrigliceridemie: în tratamentul inițial, 2 capsule pe zi. Dacă nu se obține răspunsul adecvat, doza poate fi crescută la 4 capsule pe zi. Capsulele pot fi administrate în prezența alimentelor, pentru a se evita tulburările gastro-intestinale.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre ingredientele produsului.
A!: Se monitorizează pacienții care fac terapie anticoagulantă. Poate crește timpul de sângerare la pacienții cu risc crescut de hemoragii. Nu este recomandată utilizarea la copii, în sarcină, alăptare. Nu este indicat în hipertrigliceridemia exogenă (hiperchylomicronemie de tip I). Experiența clinică în hipertrigliceridemia

endogenă secundară (în special diabet necontrolat), este limitată. Monitorizarea regulată a funcției hepatice (AST și ALT) este necesară la pacienții cu insuficiență hepatică (în special la doze mari, de ex. 4 capsule).
RA: Cel mai frecvent raportate sunt tulburările gastro-intestinale de tip reflux esofagian sau eructație cu miros sau gust de pește, greață, vomă, distensie, diaree sau constipație. Rar, au fost raportate cazuri de eczemă sau acnee. Creșterea moderată a valorilor transaminazelor hepatice (AST și ALT) a fost raportată la pacienții cu hipertrigliceridemie.

OMEGAVEN *COD ATC: B05BA02*
FRESENIUS KABI GmbH; Emulsie perf. 100 ml conțin: ulei de pește înalt purificat 10,0 g, fosfatide purificate din ou 1,2 g, glicerol 2,5 g (fl. × 50 ml sau 100 ml) ***(P-RF)***

Ind: Nutriție parenterală ca aport exogen de acizi grași cu lanț lung omega-3 (mai ales ac. eicosapentanoic și docosahexanoic), când alimentația orală sau enterală este imposibilă, insuficientă sau contraindicată.
Dz: Doza zilnică 1-2 ml omegaven/kg și zi. Viteza max. de perfuzare 0,5 ml/kg și oră.
Cind: Hipersensibilitate, tulb. ale metab. lipidic, boli hemoragice severe, diabet zaharat dezechilibrat, colaps cardiovascular, șoc, infarct miocardic recent, accident vascular cerebral, embolism, stare comatoasă nedefinită. IH și IR severe. Hipokaliemie, hiperhidratare, deshidratare hipotonă, stare metabolică instabilă, acidoze.
A!: Monitorizarea zilnică a nivelului trigliceridelor.
RA: Prelungirea timpului de sângerare, inhibarea agregării plachetare, hipertermie, frisoane, hiperemie, cianoză, scăderea apetitului, greață, vărsături, dispnee, cefalee, dureri toracice, dureri lombare, dureri osoase, priapism (foarte rar), HTA sau hTA, reacții anafilactice (eritem).

OPHTAMESONE-N *COD ATC: S01CA05*
DAR AL DAWA Ltd; Sol. oft. fosfat sodic de betametazonă B.P. 0,1% W/V și neomicină sulfat 0,5% W/V (fl. × 10 ml) ***(P-RF)***

Ind: Alergii și afecțiuni neinfecțioase sau infecțioase ale ochilor.
Dz: 1-2 pic. la 2 ore.
Cind: Glaucom, infecții virale sau fungice, hipersensibilitate la neomicină.
RA: Poate crește tensiunea intraoculară în cazul unei folosiri prelungite.

OPHTAZOLIN *COD ATC: S01GA51*
DAR AL DAWA Ltd; Sol. oft. cu antazolin sulfat 5 mg, nafazolin nitrat 0,25 mg, clorură de benzetoniu 0,1 mg/ml (fl. × 10 ml) ***(OTC)***

Ind: Conjunctivite iritative și alergice.
Dz: 1-2 pic de 3-4 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la una din componente.
RA: Ușoare înțepături trecătoare.

OPTICAL *COD ATC: A11EXN1*
E.I.P.I.C.O. sub licența LEO PHARMACEUTICAL; Cpr. eferv. cu vit. A 5000 U.I., vit. D_2 400 U.I., vit. B_1 5 mg, pantotenat de calciu 10 mg, vit. B_2 5 mg, nicotinamidă 20 mg, vit. B_6 2 mg, acid ascorbic 200 mg, vit. E 10 mg, carbonat de calciu 500 mg ***(OTC)***

Ind: Optical este indicat în timpul sarcinii, lactației și pubertății; diabet; ulcer gastric și duodenal; sub alimentație; anemii carențiale de orice tip; tulburări gastrointestinale; senilitate, oboseală, efort prelungit; ATS; alte condiții de avitaminoză.
Dz: 1-2 cpr. în 1/2 pahar cu apă de 3 ori/zi.

OPTICAL COMPOUND *COD ATC: B03AE03*
E.I.P.I.C.O. sub licența LEO PHARMACEUTICAL; Cpr. eferv. cu vit. A 5000 U.I., vit. D_2 400 U.I., vit. B_1 5 mg, pantotenat de calciu 10 mg, vit. B_2 5 mg, nicotinamidă 20 mg, vit. B_6 2 mg, acid ascorbic 200 mg, vit. E 10 mg, gluconat de fier 20 mg, carbonat de calciu 500 mg ***(OTC)***

Ind: Carențele vitaminice asociate: sarcinii, lactației și pubertății; diabetului zaharat; ulcer gastric și duodenal; malnutriție; anemii carențiale de orice tip; senilitate; ATS; alte condiții de avitaminoză.
Dz: 1 cpr. de 3 ori/zi.

OPTIMA FORTE *COD ATC: A11AA03*
PHARMEX ROM IND.; Cpr. filmate cu 1000 U.I. betacaroten, 4000 U.I. vit. A, 30 U.I. vit. E, 90 mg vit. C, 0,4 mg ac. folic, 2,25 mg vit. B_1, 2,6 mg vit. B_2, 20 mg niacinamidă, 3 mg vit. B_6, 9 μg vit. B_{12}, 400 U.I. vit. D, 45 μg biotină, 40 mg acid pantotenic, 162 mg calciu, 125 mg fosfor, 0,15 mg iod, 10 mg fier, 100 mg magneziu, 2 mg cupru, 5 mg mangan, 30 mg potasiu, 27,2 mg clor, 25 μg crom, 25 μg molibden, 25 μg seleniu, 15 mg zinc, 5 μg nichel, 10 μg staniu, 10 μg vanadiu, 10 mg metasilicat de sodiu ***(OTC)***

Ind: Hipovitaminoză, demineralizare, stres, oboseală, convalescență, anorexie, imunodeficiență.
Dz: *Adulți:* 1 cpr./zi în timpul mesei sau după masă.
Cind: Hipervitaminoze, IR gravă.
RA: Iritații gastrice (minore și trecătoare).

OPTOCAIN® 2% *COD ATC: N01BB53*
MOLTENI DENTAL; Sol. inj. 2% mepivacaină clorhidrat 20 mg și adrenalină bitartrat 10 μg (cartuș × 1,8 ml) ***(S)***

Ind: Anestezic local (anestezie locală de infiltrație, anestezie regională).
Dz: Adm. numai de către anestezist sau alt specialist. Doza max. 200 mg.
Cind: Copii sub o lună. Alergie la enestezice amidice, porfirie, antecedente de hipertermie malignă, tulb. de conducere atrioventriculară, epilepsie.
RA: Mai ales prin supradozare.

OROFAR *COD ATC: R02AA16*
NOVARTIS CONSUMER HEALTH; Cpr. de supt. cu clorură de benzoxon 1 mg, lidocaină clorh. 1 mg ***(OTC)***

Ind: Infecții orofaringiene (dezinfectant și analgezic local): faringite, laringite, stomatite, ulcerații, gingivite. Adjuvant în tonsilite.
Dz: *Adulți:* Infecții ușoare: 1 cpr. la 2-3 h. Infecții acute: 1 cpr. la 1-2 h. Se lasă tableta să se dizolve lent în gură. Se recomandă a nu se depăși 10 cpr. pe zi. *Copii peste 4 ani:* 1 cpr. la 4 h, max. 6 cpr./zi.
Cind: Hipersensibilitate la compuși cuaternari de amoniu sau lidocaină. Sarcină și alăptare.
AI: Nu se recomandă copiilor sub 4 ani.
RA: Uneori iritații locale ușoare, tranzitorii. Reacții alergice cutanate. Colorarea brună tranzitorie a limbii și/sau dinților.

OROPIVALONE – BACITRACINE *COD ATC: A01AC5N*
LAB. JOUVEINAL; Cpr. de supt cu pivalat de tixocortol 1,5 mg și bacitracină-zinc 200 U.I ***(P-RF)***
GOEDEKE PARKE - DAVIS; Cpr. de supt ***(P-RF)***

Ind: Afecțiuni inflamatorii și infecțioase buco-faringo-laringiene: laringite, faringite, traheite; amigdalită, angine; post-operator: amigdalectomii, abcese incizate.
Dz: Lăsați să se topească, fără să mestecați, 4-10 cpr./zi, 8-15 zile.
Cind: Hipersensibilitate la unul din componenți. Copii sub 30 de luni.
RA: Reacții de intoleranță locală. Reacții de tip alergic.

OSMOFUNDIN 10%;
OSMOFUNDIN 10% N; OSMOFUNDIN 15% N *COD ATC: B05BC01*
HELVETICA PRODFARM SA sub licență B. BRAUN MELSUNGEN; Sol. perf. manitol 100 g, clorură de sodiu 2,63 g și acetat de sodiu 3,4 g (fl. × 100 ml; 250 ml sau 500 ml) ***(S)***

Ind: Profilaxia IRA; scăderea presiunii intracraniene; forțarea diurezei; trat. sistemic în glaucomul acut.
Dz: 25-100 g manitol pe zi, echivalentul a 250-1000 ml Osmofundin 10%, max. 200 g manitol/zi, echivalentul a 2000 ml Osmofundin 10%. Profilaxia IRA: 1-1,5 g manitol/kg (aproximativ 70-100 g pentru un pacient cântărind 70 kg) echivalentul a 10-15 ml Osmofundin 10%/kg (aproximativ 700-1500 ml pentru un pacient cântărind 70 kg), în timp de 1,5-4 ore. Forțarea diurezei: Inițială 25 g manitol, echivalentul a 250 ml Osmofundin 10%, urmată de o doză care să producă o diureză mai mare de 100-150 ml/oră, preferabil de aproximativ 500 ml/oră, menținând o balanță hidrică pozitivă de 1-2 l. Scăderea presiunii intracraniene: 1,5-2 g manitol/kg (aproximativ 100-140 g pentru un pacient cântărind 70 kg), echivalentul a 15-20 ml Osmofundin 10%/kg (aproximativ 1000-1400 ml pentru un pacient cântărind 70 kg), adm. în timp de 30-60 minute. Trat. sistemic în glaucomul acut: 1,5 g manitol/kg (aproximativ 100 g pentru un pacient de 70 kg), echivalentul a 15 ml Osmofundin 10%/kg (aproximativ 1000 ml pentru un pacient de 70 kg), în timp de 30-60 minute.

Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului; oligurie sau anurie persistente; IC decompensată; EPA; deshidratare; hiperosmolaritate plasmatică; hemoragie intracraniană; obstrucții ale tractului urinar.
A!: Această soluție este indicată numai pentru osmoterapie. Continuarea osmoterapiei și după ce au fost eliminate cantitățile prevăzute de lichide, poate determina pierderi importante de lichide și electroliți, determinând reacții consecutive ale sistemului cardiovascular. Prudență în caz de: hipervolemie, IC compensată, oligo- sau anurie. Manitolul crește eliminarea renală a litiului. De aceea, se va monitoriza litemia la pacienții care primesc medicamente conținând litiu. Sarcină și alăptare.
RA: Perfuzia cu un ritm prea rapid sau adm. unei doze prea mari poate provoca o supraîncărcare de volum a sistemului cardiovascular, în special în cazul unei producții insuficiente de urină. Rar, greață, vărsături, dureri în etajul abdominal superior sau cefalee. În astfel de cazuri se va reduce debitul perfuziei. Dezechilibre hidrice sau electrolitice: hiper- sau hiponatriemie, hiper- sau hipopotasemie și hiperhidratare sau deshidratare. Foarte rar perfuzarea soluțiilor de manitol poate provoca reacții anafilactice: rinită, urticarie, edeme, detresă respiratorie, hTA sau șoc anafilactic.

OSTEOVIT COD ATC: A11H
SICOMED SA; Cpr. eferv. cu calciu 200 mg (sub formă de gluconolactat de calciu), vit. C 180 mg, vit. B_6 5 mg, vit. D_3 200 u.i., vit. K_1 0,2 mg ***(OTC)***

Ind: Prevenirea și corectarea tulburărilor metabolice care conduc la apariția osteoporozei (pierdere progresivă de masă osoasă, cu afectarea structurii osului și creșterea riscului de fracturi).
Dz: 1-3 cpr. eferv. pe zi.

OTALGIN COD ATC: S02DA30
PHARMAPLANT BIOGALENICA SRL; Sol. auriculară cu fenazonă 5 g, clorhidrat de lidocaină 1 g (fl. × 20 ml) ***(OTC)***

Ind: Trat. simptomatic al durerii la nivelul urechii medii la pacienți cu timpanul intact. Otite acute medii congestive, otite gripale flictenulare, otite barotraumatice.
Dz: Se aduce flaconul la temperatura corpului. Se instilează în ureche 4 pic. de 2-3 ori pe zi.
Cind: Hipersensibilitate la lidocaină, fenazonă sau glicerină. Perforație timpanică de origine infecțioasă sau traumatică.
A!: Durata trat. nu trebuie să depășească 10 zile. Produsul poate pozitiva testele antidoping la sportivi.
RA: Reacții alergice locale, iritații sau hiperemie la nivelul conductului auditiv.

OTIS-T COD ATC: S02DAN
TIS FARMACEUTIC; Sol. auriculară; 10 g sol. conțin: chloramphenicolum 0,05 g; fluocinoloni acetonidum 0,005 g; lidocaini hydrochloridum 0,100 g; fl. × 10 g ***(OTC)***

Ind: În otite acute dureroase, otite medii supurate, otite cronice.
Dz: *Adulți:* 6-8 picături de 2-3 ori/zi. *Copii:* 2-4 picături de 2-3 ori/zi
Cind: La persoanele cu sensibilitate crescută la unul din componenții produsului.

OTOCALM *COD ATC: S02DAN*
PHARCO PHARM.; Sol. ext. cu fenazonă 5%, clorobutol 1% (fl. × 10 ml) ***(OTC)***

Ind: Pentru prompta înlăturare a durerii și disconfortului de la nivelul urechii din otita externă și otita medie acută. Ca adjuvant terapeutic în timpul trat. sistemic cu antibiotice a infecțiilor urechii.
Dz: Instilați 2-4 pic. în ureche permițând sol. să se scurgă de-a lungul canalului otic, de 2-3 ori/zi.
Cind: Perforația membranei timpanice sau pierderi de lichid prin canalul otic.

OXIMED *COD ATC: D07CA01*
MEBRA SRL; Spray ext. cu oxitetraciclină clorhidrat 0,255 g, hidrocortizon 0,085 g (fl. × 59,5 g) ***(OTC)***

Ind: Dermatoze: eczemă alergică, neurodermită diseminată sau circumscrisă, prurit cu lichenificare, dermatită eczematoidă, eczeme alimentare necomplicate sau suprainfectate. Dermite de contact determinate de plante, substanțe medicamentoase, detergenți, diferite substanțe chimice. Prurit anal, vulvar și scrotal nespecific. Ulcus cruris de etiologie varicoasă, ischemică sau traumatică. Arsuri chimice sau termice. Leziuni de decubit.
Dz: După prealabila curățire a pielii se pulverizează de la o distanță de 15-20 cm suprafață de tratat, timp de 1-3 secunde.
Cind: Alergie la oxitetraciclină. Leziuni tuberculoase sau fungice ale pielii, leziuni acute de herpes simplex, vaccină sau varicelă, hipersensibilitate la componentele produsului.
RA: Rar fenomene de sensibilitate care dispar la întreruperea tratamentului.

OXYTEX®
WÖRWAG PHARMA GmbH & CO. KG; Cps. cu vit. C 300 mg, vit. E 36 mg (de origine naturală), provit. A 2 mg (7 mg betatene 30%, amestec de carotenoizi naturali), drojdie de seleniu 50 mg echiv. A 50 μg seleniu natural), excipienți: lecitină de soia, ulei de soia, gelatină ***(OTC)***

Ind: Complex antioxidant și seleniu. *Vitamina C:* îmbunătățește starea generală a organismului, contribuie la menținerea funcțiilor esențiale, reprezintă un factor de protecție a nucleului celular împotriva acțiunii nocive a radicalilor liberi. *Vitamina E:* are funcție de “captator de radicali liberi”, protejând vitaminele esențiale de atacul radicalilor liberi. Exercită o protecție a structurilor învelișului celular. *Provitamina A:* apără celulele organismului, acționând ca înveliș protector natural împotriva radicalilor liberi. *Seleniul:* component al unor enzime, inhibă formarea intracelulară a radicalilor liberi. Oxytex® conține sele-

niu în formă naturală. Prin compoziția sa, Oxytex® protejează fiecare celulă, iar starea generală și randamentul funcțional al organismului sunt îmbunătățite.
Dz: 1 cps. pe zi.

P

PACSIN *COD ATC: N02BE51*
SINTOFARM SA; Cpr. cu ac. acetilsalicilc 250 mg, paracetamol 150 mg și cafeină 50 mg ***(OTC)***

Ind: Trat. simptomatic al durerilor de intensitate ușoară și medie, cu diferite localizări: mialgii, nevralgii, cefalee, migrenă, dureri postoperatorii, artralgii și alte dureri reumatice. Stări febrile.
Dz: 1 cpr. la nevoie sau 3-4 cpr. pe zi, de preferință pe stomacul gol, cu puțină apă.
Cind: Hipersensibilitate la componentele produsului, ulcer gastro-duodenal activ, boli cu risc hemoragic mare, IH, IR severă, deficit G-6-PDH, copii sub 7 ani. Ultimul trimestru de sarcină.
A!: Astm bronșic, alergii respiratorii. La copii cu gripă sau varicelă există riscul de complicații infecțioase sau sd. Reye. Cofeina poate pozitiva testul anti-doping la sportivi. Prudență în sarcină și alăptare.
RA: Tulb. digestive (epigastralgii, mici sângerări digestive, vărsături, diaree), reacții alergice de tip anafilactic (erupții cutanate, edem angioneurotic, crize de astm). Trat. îndelungi pot determina afectarea renală (nefrită interstițială, necroză papilară). Rar reacții anafilactice până la asfixie și colaps (la cei cu intoleranță la ac. acetilsalicilic sau alte AINS).

PANADOL EXTRA *COD ATC: N02BE51*
STERLING; Cpr. cu paracetamol 500 mg, cofeină 65 mg ***(OTC)***

Ind: Analgezic mediu, antipiretic.
Dz: *Adulți inclusiv vârstnici:* 2 cpr. la 4 ore; max. 8 cpr. în 24 ore. Nu se recomandă copiilor sub 12 ani.
Cind: Copii sub 12 ani. Hipersensibilitate la paracetamol, cofeină sau excipienți.
A!: IR sau IH severă, hepatopatii alcoolice. Asocierea cu cafea sau ceai poate determina stări de excitabilitate nervoasă. Pozitivarea testelor antidoping.
RA: Hipersensibilitate, erupții cutanate, greață, insomnie, neliniște.

PANANGIN *COD ATC: A12BA30*
GEDEON RICHTER Ltd.; Cpr. film. aspartat de magneziu anhidru 175 mg și aspartat de potasiu anhidru 166 mg ***(OTC)***

Ind: Medicație ajutătoare în trat. anginei pectorale. Controlul aritmiilor, în caz de infarct miocardic și în trat. stărilor post-infarct. Aritmii cauzate de intoleranță la digitalice, intoxicația cu digitalice. Aritmii: tahiaritmii, extrasistole ventriculare.

Dz: *Tulb. de circulație coronariană:* 2 cpr. film. de 3 ori pe zi. *Profilactic:* 3 cpr. film. pe zi.
Cind: IR acută și cronică.

PANCARDIN®

LABORMED PHARMA SA; Cpr. cu 180 mg aspartat de magneziu (12 mg Mg^{+2}) și 180 mg aspartat de potasiu (39 mg K^{+}); ct. × 5 blist. a 10 cpr. ***(OTC)***

Ind: Creșterea toleranței la efort, înlăturarea stărilor de oboseală fizică și psihică, accelerarea refacerii în convalescență; supliment nutritiv pentru persoanele care fac sport sau desfășoară activități fizice intense. Adjuvant în tratamentul ischemiei miocardice, aritmiilor, prevenirea aritmiilor digitalice. Preparatul este eficient în tratarea sindromului de oboseală cronică atunci când acesta este asociat cu o carență de magneziu și potasiu.
Dz: Profilactic, un comprimat de trei ori pe zi. În scop terapeutic, două comprimate de câte trei ori pe zi.
A!: Precauție la persoanele în vârstă cu afecțiuni renale sau hepatice grave și persoanele care urmează tratament concomitent cu diuretice care economisesc potasiul.
RA: Consumul unor doze mari poate produce greață, disconfort abdominal, efecte laxative, diaree.

PANSORAL

COD ATC: A01AD11

PIERRE FABRE SANTE; Gel bucal cu salicilat de colină 8,7 g; clorură de cetalconium 0,01 g (tub × 3 g, 5 g, 12 g, 15 g) ***(OTC)***

Ind: Dureri în stări inflamatorii și ulceroase ale mucoasei bucale.
Dz: 1-4 aplicații pe zi, local, buco-dentar.
Cind: Antecedente de alergie la aspirină; copii în vârstă de până la 6 ani.
A!: Sarcină și alăptare.
RA: Rar, ușoară somnolență.

PANZCEBIL

COD ATC: A09AA02

BIOFARM SA; Dj. cu complex de enzime pancreatice 0,2 g, bilă de bou uscată 0,025 g, lichenază și hemicelulază 0,005 g ***(OTC)***

Ind: Insuficiență secretorie digestivă pancreatică, în pancreatita cronică și în fibroza chistică pancreatică (la copii); dispepsii cu steatoree, tulburări digestive prin exces alimentar la persoane (profilactic și curativ), sprue, intoleranță la grăsimi, tulburări digestive în cursul trat. cu sulfamide sau antibiotice.
Dz: Oral, câte 1-2 dj. de 3 ori/zi, după mese.
Cind: Alergie la una din componente, boli hepatice grave cu hiperbilirubinemie, icter mecanic.
A!: Bolnavii cu gută sau calculoză renală uratică.
RA: Dozele mari pot provoca iritație bucală și iritație perineală, hiperuricozurie și hiperuricemie; rareori reacții alergice.

PANZYTRAT® *COD ATC: A09AA02*
NORDMARK; Cps. cu lipază 10 000 UI, amilază 9 000 UI, proteaze 500 UI *(OTC)*

Ind: Maldigestia datorată insuficienței pancreatice exocrine (pancreatită cronică), fibroză chistică, postpancreatectomie, după by-pass chirurgical gastrointestinal (de exemplu Billroth II - Gastroenterostomie), obstrucție pancreatică sau de căi biliare (de exemplu prin neoplazie).
Dz: 2-4 cps. la o masă (corespunzând 20000-40000 UI lipază).
Cind: Pancreatită acută și puseu acut de pancreatită cronică, alergie la carnea de porc.
A!: Obstrucțiile intestinale sunt complicații cunoscute la pacienții cu mucoviscidoză. În cazul unor simptome de tip ileus trebuie ținut cont de posibilitatea existenței unor stenoze intestinale. La intoleranță la lactoză și alergie la carne de porc, există riscul unei intoleranțe gastrointestinale ca și reacții alergice.
RA: În cazuri singulare au fost semnalate reacții alergice de tip imediat, precum și reacții alergice ale tractului digestiv după adm. de pancreatină. La pacienții cu mucoviscidoză, în cazuri singulare, după adm. unor doze mari de pancreatină a fost semnalată constituirea unor stricturi în regiunea ileocecală și a colonului ascendent.

PARACETAMOL PLUS *COD ATC: N02BE51*
EUROPHARM SA; Cpr. cu maleat de clorfeniramină 3 mg și paracetamol 500 mg ***(S/OTC)***

Ind: Trat. simptomatic al rinitei alergice acompaniate de febră și/sau cefalee, stări febrile, gripă.
Dz: *Adulți:* 3-6 cpr./zi, divizate în 3 prize (dimineața, la prânz și seara), max. 6 cpr./zi și 2 cpr./priză. *Copii între 5-10 ani:* 1-2 cpr./zi (în funcție de vârstă), max. 2 cpr./zi; *între 10-15 ani:* 2-3 cpr./zi (în funcție de vârstă), max. 3 cpr./zi. La copii nu se va adm. mai mult de 1 cpr./priză.
Cind: Hipersensibilitate la una din componente. Copii sub 5 ani. IH gravă, glaucom, retenție urinară.
A!: IR, IH, se supraveghează funcția renală în caz de adm. prelungită. Nu se consumă băuturi alcoolice și nu se adm. deprimante ale SNC (în special barbiturice).
RA: Rareori trombocitopenie, anemie, agranulocitoză. Dozele mari pot provoca necroză hepatică. Somnolență, sedare, intoleranță digestivă, efecte atropinice. La persoanele în vârstă pot apărea fenomene de excitație centrală și confuzie mentală. Fenomene de hipersensibilitate.

PARACETAMOL SINUS *COD ATC: R01BA52*
EUROPHARM SA; Cpr. cu maleat de clorfeniramină 3 mg; clorhidrat de pseudoefedrină 30 mg; paracetamol 500 mg ***(S/OTC)***

Ind: Trat. simptomatic al rinitei alergice și vasomotorii, acompaniată de febră și/sau cefalee, gripă.
Dz: *Adulți:* 3-6 cpr./zi, divizate în 3 prize (dimineața, la prânz și seara), max. 6 cpr./zi și 2 cpr./priză. *Copii între 5-10 ani:* câte 1-2 cpr./zi (în funcție de vârstă), max. 2 cpr./zi; *între 10-15 ani:* 2-3 cpr./zi (în funcție de vârstă), max. 3 cpr./zi. La copii nu se va adm. mai mult de 1 cpr. o dată.

Cind: Hipersensibilitate; copii sub 5 ani; IH gravă; glaucom; retenție urinară; pacienți tratați cu IMAO în decursul ultimelor 15 zile.
AI: IR, IH; se supraveghează funcția renală în caz de adm. prelungită. Nu se consumă băuturi alcoolice și nu se adm. deprimante ale SNC (în special barbiturice). Prudență la pacienții prezentând hipertrofie de prostată, HTA, afecțiuni cardiace, diabet, hipertiroidie, la bolnavii tratați cu simpatomimetice. Pozitivează testele antidoping.
RA: Datorate paracetamolului: rareori trombocitopenie, anemie, agranulocitoză. Dozele mari pot provoca necroza hepatică. Datorate clorfeniraminului: somnolență, sedare, intoleranță digestivă, efecte atropinice (uscăciunea gurii, tulburări de acomodare, constipație, retenție urinară). La persoanele în vârstă pot apărea fenomene de excitație centrală și confuzie mentală. Datorate pseudoefedrinei: rareori insomnie, halucinații, retenție urinară la bărbați, erupții cutanate.

PARACOF® *COD ATC: N02BE51*
SINTOFARM SA; Cpr. cu paracetamol 300 mg și cafeină 30 mg ***(OTC)***

Ind: Cefalee, nevralgii dentare, lombosciatică, artralgii nereumatismale, entorse, luxații, dismenoree, stări febrile.
Dz: *Adulți:* 1 cpr. de 1-2 ori/zi. *Copii între 7-12 ani:* 1/2 cpr. de 1-2 ori/zi, dimineața și la prânz (nu se adm. în ultima parte a zilei).
Cind: Copii sub 7 ani. Se va evita asocierea cu anticoagulante. Sarcină și alăptare.
RA: Rareori erupții cutanate alergice, insomnie.

PARODONTAX C *COD ATC: V07AS*
BLOCK DRUG COMPANY INC.; Tub × 50 ml ***(OTC)***

PARODONTAX F *COD ATC: V07AS*
BLOCK DRUG COMPANY INC.; Tub × 75 ml ***(OTC)***

Ind: Pastă de dinți.

PECTOLYN ANTITUSSIVE *COD ATC: R05DA09*
DAR AL DAWA; Sirop cu difenhidramină clorhidrat 14 mg; dextrometorfan 6,5 mg; citrat de sodiu 57 mg; mentol 1,1 mg la 5 ml (fl. × 100 ml) ***(OTC)***

Ind: Tratamentul gripei/guturaiului. Calmarea tusei iritative (uscată); adjuvant în infecții de tract respirator superior.
Dz: *Adulți:* o lingură (15 ml) de 3 ori/zi. *Copii 6-12 ani:* o linguriță (5 ml) de 3 ori/zi. *Copii 1-5 ani:* 1/2 linguriță (2,5 ml) de 3 ori/zi.
Cind: Nou-născuți; hipersensibilitate la una din componente; glaucom cu unghi închis. Se interzice consumul de alcool în timpul trat. (se potențează efectul sedativ). Șoferi și activități de precizie. Sarcină și alăptare.
AI: Prudență la pacienții cu astm bronșic; HTA și alte boli cardiovasculare; hipertiroidie.
RA: Rar, somnolență, uscăciunea mucoaselor bucală și nazală, cefalee, palpitații.

PEDILIN *COD ATC: P03BA04*

KRKA d.d.; Emulsie cu tetrametrină 0,4 g, piperonil butoxid 2,0 g (fl. × 100 ml) ***(OTC)***

Ind: Pediculoza capului.
Dz: În cazuri severe de pediculoză se utilizează împreună cu șamponul Pedilin care conține malation. Se aplică 10 ml emulsie cu puțină vată pe toată suprafața scalpului și se acoperă capul cu o basma. După 30 min. se clătește cu apă. Apoi se aplică de 2 ori timp de 3 minute 10 ml șampon Pedilin și se clătește din nou. Cât timp părul este ud se piaptănă cu un pieptene des pentru a înlătura păduchii și ouăle rămase. În cazuri ușoare de pediculoză este suficient doar șamponul Pedilin. Se recomandă repetarea procedurii după o săptămână.
Cind: Hipersensibilitate.
A!: Se va evita contactul emulsiei cu ochii, nasul și gura. Se protejează fața cu un prosop.

PERCUTALGINE *COD ATC: M02AN01*

LAB. BESINS INTERNATIONAL; Gel cu acetat de dexametazonă 0,05 g, salicilamidă 2,0 g, hidroxietilsalicilat 10,0 g la 100 g (tub × 30 g) ***(P-RF)***

Ind: Trat. local în tendinite, artrozele micilor articulații, entorse benigne.
Dz: Se aplică local, la nivelul regiunii dureroase, în strat subțire de 2-3 ori pe zi.
Cind: Hipersensibilitate la salicilați, infecții primare bacteriene, virale, fungice, parazitare. Nu se aplică pe ochi, mucoase, plăgi și nici sub pansament ocluziv.
A!: Adm. pe suprafețe mari poate antrena efecte sistemice (sd. Cushing).
RA: Reacție alergică locală, senzație de căldură la locul aplicării. După aplicări repetate pot apărea atrofii cutanate, telangiectazii, vergeturi, purpură echimotică secundară atrofiei, fragilitate cutanată, efecte sistemice (sd. Cushing), erupții acneiforme, erupții pustuloase, hipertricoză, depigmentări, infecții secundare, dermatoze alergice de contact.

PHARMATON® capsule *COD ATC: A11AB*

PHARMATON SA; Cps. cu extract standardizat de Panax ginseng 40,00 mg, palmitat de retinol (vit. A) 1,4665 mg (2667 UI), colecalciferol (vit. D_3) 0,005 mg (200 UI), D,L-α-acetat de tocoferol (vit. E) 10,00 mg, monohidrat de tiamină (vit. B_1) 1,40 mg, riboflavină (vit. B_2) 1,60 mg, clorhidrat de piridoxină (vit. B_6) 2,00 mg, ciancobalamină (vit. B_{12}) 0,001 mg, biotină 0,150 mg, nicotinamidă (vit. PP) 18,00 mg, acid ascorbic (vit. C) 60,00 mg, acid folic 0,10 mg, cupru 2,00 mg sub formă de sulfat de cupru (II) 5,60 mg, mangan 2,50 mg sub formă de sulfat de mangan monohidrat 7,75 mg, magneziu 10,00 mg sub formă de sulfat de magneziu 71,00 mg, fer 10,00 mg sub formă de sulfat feros (II) 33,00 mg, zinc 1,00 mg sub formă de sulfat de zinc monohidrat 2,75 mg, calciu 100,00 mg sub formă de fosfat de calciu dibazic anhidru 340,00 mg, seleniu 0,050 mg sub formă de selenit de sodiu 0,111 mg și lecitină 100,00 mg; ct. × un fl. × 30 cps.; ct. × un fl. × 60 cps.; ct. × un fl. × 100 cps.; ct. × un blister × 4 cps.; ct. × un blister × 10 cps., ct. × 3 blistere × 10 cps., ct. × 6 blistere × 10 cps. ***(OTC)***

Ind: Stările de epuizare (de exemplu provocate de stres), oboseală, slăbiciune, scăderea capacității de concentrare, precum și pentru creșterea tonusului psihic; profilaxia și tratamentul simptomelor determinate de nutriția neechilibrată calitativ și cantitativ; convalescență.
Dz: *Adulți:* o capsulă pe zi, administrată cu alimente, preferabil la micul dejun. Nu se utilizează la copii mai mici de 12 ani.
Cind: Hipersensibilitate (alergie) la oricare dintre componenții produsului; tulburări ale metabolismului calciului, cum sunt: nivel crescut al calciului în sânge (hipercalcemie) sau excreție crescută a calciului prin urină (hipercalciurie); insuficiență renală; aport prea mare de vitamine A și D (hipervitaminoză preexistentă a vitaminelor A sau D); administrare concomitentă a altor medicamente care conțin vitamina D; tratament cu retinoizi (de exemplu, anumite medicamente pentru acnee).
A!: Ingestia zilnică a unor doze mari de vitamina A în timpul sarcinii crește riscul anumitor malformații la nou-născuți. Se evită utilizarea produsului atunci când se consumă cantități mari de vitamină A din alimente. Nu se utilizează atunci când se mănâncă ficat.
RA: Rareori, s-au observat reacții adverse gastrointestinale.

PHENIDEX *COD ATC: S02CA06*
AMMAN PHARM. IND.; Sol. otică cu dexametazonă 1 mg, cloramfenicol 5 mg/ml (fl. × 10 ml) ***(P-RF)***

Ind: Afecțiuni ale urechii externe.
Dz: 1-2 pic. de 2-5 ori pe zi în urechea afectată.

PHLOGENZYM® *COD ATC: M09AX*
MUCOS PHARMA GmbH & Co.; Cpr. film. gastrorez. cu rutozid trihidrat 100 mg, bromelină 90 mg și tripsină 48 mg ***(S/P-6L)***

Ind: Trat. adjuvant în: edeme și inflamații posttraumatice; boli reumatice: reumatism abarticular, boală artrozică activată; boli inflamatorii vasculare: tromboflebită.
Dz: 6 cpr./zi (2 cpr. de 3 ori/zi). La nevoie doza poate fi crescută până la 12 cpr./zi.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului.
A!: Prudență în caz de deficit de coagulare congenital (de ex. hemofilie) sau dobândit, IH avansată, IR gravă care necesită dializă. Înainte de interv. chirurgicale planificate trebuie avut în vedere efectul fibrinolitic. Atenționare pentru diabetici: conținutul în carbohidrați pentru un comprimat corespunde la 0,015 unități de pâine. Sarcină și alăptare.
RA: Dozele mari pot provoca senzație de plenitudine, flatulență; ocazional, greață; consistența, culoarea și mirosul scaunelor pot fi modificate. Rareori se produc reacții alergice.

PHOSPHON – KIT IN VIVO TC99M *COD ATC: V09BA*
INST. IZOTOPI BUDAPESTA; Kit ***(S)***

Ind: Substanță de contrast.

PIAFEN *COD ATC: A03DA02*

SICOMED SA; Cpr. cu metamizol sodic 500 mg, clorh. de pitofenonă 5 mg, bromometilat de fenpipramidă 0,1 mg ***(P-6L);*** Sol. inj. cu metamizol sodic 2,5 g, clorh. de pitofenonă 10 mg, bromometilat de fenpipramidă 0,1 mg (f. × 5 ml) ***(S/P-RF)***

Ind: Forma injectabilă este indicată, în special, în sd. algice severe (colică nefrotică, colică biliară, pancreatită cronică, algii neoplazice), de asemenea, în interv. chir. pe abdomen și micul bazin (determină analgezie fără tulburări de tranzit) și în unele manevre de explorare instrumentală. Cpr. sunt destinate pentru trat. unor algii mai puțin acute (cefalee, migrene, odontalgii, diskinezii hepatobiliare, colite, cistalgii, dismenoree, dureri postoperatorii și posttraumatice).
Dz: Inj. i.m. profund sau i.v. lent (1-1,5 ml/min), 1-3 f/; oral, câte 2 cpr. de 1-3 ori/zi.
Cind: Alergie la metamizol și alți pirazoli, antecedente de agranulocitoză toxică, deficit de G-6-PDH, porfirie hepatică acută, glaucom cu unghi închis, adenom de prostată cu tendință la retenție urinară, colaps, IC gravă, angină pectorală, IMA, tahicardie, obstrucție mecanică a tubului digestiv, megacolon.
A!: Prudență la asocierea cu amantadină, chinidină, antidepresive triciclice (cresc efectele atropinice). Sarcină și alăptare.
RA: Reacții alergice, erupții cutanate, foarte rar reacții grave (șoc anafilactic, anemie, agranulocitoză). Dozele mari pot provoca fenomene atropinice: uscăciunea gurii, tulburări de vedere, tahicardie, micțiune dificilă. *Injectarea intravenoasă* rapidă poate fi cauză de hipotensiune arterială și șoc.

PIAFEN *COD ATC: A03DA02*

ANTIBIOTICE IAȘI; Cpr. cu metamizol sodic 500 mg, clorh. de pitofenonă 5 mg, bromometilat de fenpipramidă 0,1 mg ***(S/P-6L);*** Sup. cu metamizol sodic 1 g, clorh. de pitofenonă 10 mg, bromometilat de fenpipramidă 0,1 mg ***(P-6L)***

Ind: Cpr. și sup. sunt destinate pentru trat. unor algii mai puțin acute (cefalee, migrene, odontalgii, diskinezii hepatobiliare, colite, cistalgii, dismenoree, dureri postoperatorii și posttraumatice), supozitoarele fiind deosebit de indicate în algiile cu localizare pelviană.
Dz: *Int.:* 2 cpr./zi; *Rectal:* 1 sup. de 1-3 ori/zi.
Cind: Glaucom, adenom de prostată, IC gravă, intoleranță la derivați de amidopirină, insuficiență coronariană, tahiaritmie, stenoză pilorică, megacolon, leucopenie.
A!: Prudență la asocierea cu amantadină, chinidină, antidepresive triciclice (cresc efectele atropinice). Sarcină și alăptare.
RA: Erupții cutanate alergice, trombopenie, anemie hemolitică, agranulocitoză.

PIASCLEDINE® 300 *COD ATC: M09AXN1*

LAB. PHARMASCIENCE; Cps. 300 mg fracțiune insaponificabilă de ulei de avocado 100 mg, fracțiune insaponificabilă de ulei de soia 200 mg ***(OTC)***

CSC PHARMACEUTICALS; Cps. 300 mg conținând extract uscat insaponificabil din ulei de avocado 100 mg, extract uscat insaponificabil din ulei de soia 200 mg.

Ind: Reumatologie: dureri artrozice. Stomatologie: parodontopatii.
Dz: 1 cps. pe zi la masă.
Cind: Sarcină.
RA: Regurgitații cu gust lipidic.

PIKOVIT®; PIKOVIT® D; PIKOVIT® FORTE

COD ATC: A11BA A11CC20

KRKA d.d.; Dj. *Pikovit* și *Pikovit D:* vit. A 600 u.i., vit. D_3 80 u.i., ac. ascorbic 10 mg, vit. B_1 0,25 mg, vit. B_2 0,30 mg, vit. B_6 0,30 mg, vit. B_{12} 0,20 µg, nicotinamidă 3 mg, ac. folic 0,04 mg, pantotenat de calciu 1,20 mg, calciu (sub formă de hidrogenofosfat de calciu) 12,50 mg, fosfor (sub formă de hidrogenofosfat de calciu) 10 mg și excipienți. *Pikovit forte:* vit. A 5000 u.i., vit. D_3 400 u.i., ac. ascorbic 60 mg, vit. B_1 1,5 mg, vit. B_2 1,7 mg, vit. B_6 2 mg, vit. B_{12} 6 µg, nicotinamidă 20 mg, ac. folic 0,4 mg, pantotenat de calciu 10 mg, vit. E 15 mg și excipienți ***(OTC)***

Ind: Lipsa poftei de mâncare, stare de oboseală excesivă la școlari, în timpul trat. cu antibiotice ca supliment, pentru suplimentarea cu vitamine și minerale a alimentației.
Dz: *Copii 4-6 ani:* 1 dj. de 4-5 ori pe zi. *Copii 7-14 ani:* 1 dj. de 5-7 ori pe zi.
Cind: Hipersensibilitate, hipervitaminoza A și D.
A!: În sarcină și alăptare numai la recomandarea medicului.
RA: Reacții alergice (se întrerupe adm.).

PIMAFUCORT®

COD ATC: D07CA01

YAMANOUCHI EUROPE B.V.; Loțiune cu 5 mg hidrocortizon, 10 mg natamicină, neomicină sulfat corespunzând la 1,75 mg neomicină per 1 g (fl. × 20 ml), unguent cu 10 mg hidrocortizon, 10 mg natamicină, neomicină sulfat corespunzând la 3,5 mg neomicină per 1 g (tub × 15 g), cremă cu 10 mg hidrocortizon, 10 mg natamicină, neomicină sulfat corespunzând la 3,5 mg neomicină per 1 g (tub × 15 g) ***(P-RF)***

Ind: Dermatoze răspunzând tratamentului cu steroizi, prezentând simptome de infecție secundară bacteriană sau fungică cauzate de microorganisme sensibile la neomicină respectiv la natamicină.
Dz: Se aplică de 2-4 ori pe zi pe suprafața afectată.
Cind: Sifilis, tbc cutanat, infecții virale (varicelă, zona zoster). Hipersensibilitate la neomicină. Nu se aplică la nivelul ochilor sau pe timpanul perforat. Sarcină (risc de ototoxicitate fetală).
A!: A se evita aplicarea prelungită (risc de ototoxicitate și nefrotoxicitate).
RA: Exacerbarea leziunilor, iritație, intoleranță mai ales la adm. prelungite.

PINOSOL

COD ATC: R01AX10

SLOVAKOFARMA; Sol. nazală (fl. × 10 ml) cu oleum pini silvestris 0,3752 g, oleum menthae piperitae 0,1 g, oleum eucalipty 0,05 g, thymolum 0,0032 g, azulenum 0,002 g, tocoferolum aceticum 0,17 g în 10 g soluție (1 ml = 25 pic.) ***(OTC)***

Ind: Trat. răcelii și afecțiunilor inflamatorii ale mucoasei nazale și nazo-faringiene, căilor respiratorii, precum și la pacienții ce au fost supuși unei intervenții chirurgicale la nivelul cavității nazale.
Dz: *Adulți* câte 2-3 pic. în fiecare nară, la început la interval de o oră, apoi la intervale mai mari. Pt. inhalare 2 ml din preparat adăugat la 1 litru de apă ce fierbe, de 2 ori/zi. *Copii peste 2 ani:* 1-2 pic. de 3-4 ori/ zi. *Copii între 1-2 ani:* dispersarea preparatului pe mucoasa nazală a unui tampon de vată (bastonaș cu capătul învelit în vată).
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la preparat, pacienți cu rinite alergice, copii sub 1 an.
A!: La copii sub 2 ani: există posibilitatea (cel puțin teoretic) introducerii preparatului în căile respiratorii (laringe, trahee, bronhii) datorită inspirației profunde.
RA: Rar, senzație de prurit și de arsuri la nivelul mucoasei nazale.

PIRIVIN-C *COD ATC: N06BXN5*
INCDCF BUCURESTI; Dj. cu piritinol 100 mg, cafeină 10 mg, piridoxină 25 mg, tiamină 10 mg ***(P-6L)***

Dz: *Adulți:* 1-2 dj. de 3 ori pe zi. *Copii:* 1 dj. de 2-3 ori pe zi.

PIVALONE NEOMYCINE *COD ATC: R01AD07*
LAB. JOUVEINAL; Susp. nazală cu pivalat de tixocortol 1,0 g, sulfat de neomicină 340.000 ui, clorură de N-cetilpiridină 0,02 g, alcool benzilic 0,5 g, clorură de sodiu 0,75 g, dihidrogenofosfat de sodiu 0,075 g, hidroxid de sodiu q.s. pH 6,8 la 100 g (fl. × 10 ml) ***(P-RF)***

GOEDEKE PARKE-DAVIS – Membru al Grupului PFIZER; Susp. nazală ***(P-FR)***

Ind: Manifestări inflamatorii și alergice rino-faringiene.
Dz: *Adulți:* 1-2 pulverizări în fiecare nară de 4 ori pe zi. *Copii și nou-născuți:* o pulverizare în fiecare nară de 2-4 ori pe zi.
Cind: Hipersensibilitate la componentele produsului. În cazul localizării nazale a unor infecții precum: zona, varicelă, herpes. Sarcină și alăptare.
A!: Nu se recomandă utilizarea îndelungată.
RA: Reacții de intoleranță locală (furnicături), reacții alergice (edem al feței, pielii, mucoasei), rar edem Quinke.

PLANTAGINOL *COD ATC: R05CA10*
TIS FARMACEUTIC; Sirop; 100 g conțin: extract fluid de pătlagină 20 g, benzoat de sodiu 2 g; fl. × 120 g ***(OTC)***

Ind: În afecțiuni inflamatorii acute, subacute și cronice ale aparatului respirator (bronșită, laringită) însoțite de tuse productivă.
Dz: *Adulți:* doza uzuală este de 3-4 linguri dozatoare pe zi. *Copii peste 1 an:* doza uzuală este de 4-5 lingurițe dozatoare pe zi.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului, afecțiuni gastro-intestinale acute.

A!: După prima deschidere a flaconului produsul trebuie utilizat în cel mult 10 zile. În caz de diabet zaharat trebuie ținut cont de conținutul în zahăr al produsului.

POLIVITAMINIZANT S *COD ATC: A11EB*

TERAPIA SA; Dj. cu vit. A 1,55 mg (500 u.i.), vit. B_1 1,5 mg, vit. B_2 1,5 mg, vit. B_6 5 mg, vit. B_{12} 0,005 mg, vit. C 60 mg, vit. D_2 0,04 mg, vit. E 30 mg, vit. PP 18 mg ***(OTC)***

Dz: Oral 2-4 dj./zi.

POLYGYNAX *COD ATC: G01AAXN*

INNOTECH INTERNATIONAL; Cps. vag. cu neomicină sulfat 35.000 UI, polimixină B sulfat 35.000 UI, nistatin 100.000 UI, tefose® 63 0,125 g, ulei saturat de soia 0,03 g, dimeticon qs ad. 2,5 g ***(P-RF)***

BEAUFOUR IPSEN; Cps. vag. cu neomicină sulfat 35.000 UI, polimixină B sulfat 35.000 UI, nistatin 100.000 UI, tefose® 63 0,125 g, ulei saturat de soia 0,03 g, dimeticon qs ad. 2,5 g ***(P-RF)***

Ind: Trat. local în infecții bacteriene și micotice (candida albicans) ale vaginului și colului uterin.
Dz: 1 cps. vag. seara, timp de 12 zile.
Cind: Copii, hipersensibilitate, folosirea prezervativelor sau diafragmelor din latex, asocierea cu produse spermicide. În timpul sarcinii și alăptării.
A!: Numai pentru adulți. Trat. se întrerupe în caz de intoleranță locală sau reacții alergice. Evitarea dușurilor vaginale, evitarea tamponului intern în timpul terapiei.
RA: La adm. pe termen lung posibilă dermatită de contact.

PREGVIT ZINC

PHARCO PHARMACEUTICALS; Cps. conținând: Fier (din fumarat feros) 70 mg, Zinc (din sulfat de zinc) 25 mg, Cupru (din sulfat de cupru) 0,60 mg, Vitamina C (acid ascorbic) 75 mg, Acid folic 0,75 mg, Vitamina B_{12} (ciancobalamină) 6 mg, Vitamina A (palmitat) 1300 UI, Vitamina D_3 (colecalciferol) 400 UI, Vitamina E (DL-α-tocoferol acetat) 5 mg, Vitamina B_1 (tiamină) 4 mg, Vitamina B_2 (riboflavină) 4 mg, Vitamina B_6 (piridoxină clorhidrat) 4 mg, Pantotenat de calciu 10 mg, Nicotinamidă 25 mg, Magneziu (din oxid de magneziu) 42 mg, Iod (din iodură de potasiu) 0,15 mg; ct. × 24 cps. gelatinoase moi ***(OTC)***

Ind: Prevenirea anemiei în perioada sarcinii și lactației; deficiențe de vitamine și minerale; senilitate și menopauză; stres, epuizare si oboseală fizică; afecțiuni ale ficatului, alcoolism.
Dz: 1-2 capsule zilnic, după mese.
A!: Produsul nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar variat.

PREMELLA 2,5; PREMELA 5 *COD ATC: G03FA12*
WYETH - LEDERLE PHARMA GmbH; Dj. cu estrogeni conjugați 0,625 mg și acetat de medroxiprogesteronă 2,5 mg; Dj. cu estrogeni conjugați 0,625 mg și acetat de medroxiprogesteronă 5 mg ***(P-6L)***

Ind: Trat. următoarelor afecțiuni, la femei cu uter intact: simptome vasomotorii moderate-severe, asociate cu deficiența de estrogeni; profilaxia și trat. osteoporozei asociate cu deficiență estrogenică; vaginite și uretrite atrofice.
Dz: 1 dj./zi, timp de 28 zile consecutiv, începând cu dj. 1 (din apropierea săgeții "START"). Se recomandă inițierea trat. cu Premella 5, care este adecvat pentru pacientele la care se urmărește obținerea de cicluri fără sângerări. Se va lua în considerarea micșorarea dozei, prin trecere la Premella 2,5 după obținerea amenoreei sau în decurs de 12 luni de la inițierea trat. Dacă apare sângerare după reducerea dozei la Premella 2,5, se va relua trat. cu Premella 5.
Cind: Hipersensibilitate la estrogeni; cancer de sân diagnosticat, suspectat sau în antecedente; neoplazii estrogeno-dependente diagnosticate sau suspectate; hemoragii genitale de etiologie neprecizată; tromboflebită activă sau tulburări tromboembolice; afecțiuni hepatice severe; sarcină și alăptare.
A!: Unele studii au sugerat posibilitatea creșterii incidenței cancerului mamar la femeile tratate cu estrogeni în doze mari, pe o perioadă lungă de timp. S-a constatat creșterea riscului apariției bolilor veziculei biliare la femeile care primesc estrogeni în perioada postmenopauză. Terapia cu estrogeni poate fi asociată cu creșterea importantă a concentrațiilor plasmatice de trigliceride, ducând la pancreatite și alte complicații la pacienții cu dislipidemii familiale. Șoferi și activități de precizie.
RA: *Sistem genitourinar:* sângerări vaginale; *sistem cardiovascular:* tromboembolism venos, embolism pulmonar; *glandă mamară:* sensibilitate, mărirea dimensiunilor, galactoree; *tub digestiv:* greață, crampe abdominale, vărsături, flatulență, litiază biliară/icter colestatic, pancreatită; *tegumente:* alopecie, rash, hirsutism, prurit; *glob ocular:* tulburări de vedere; *SNC:* cefalee, nervozitate; *altele:* scădere sau creștere în greutate, edeme, modificări ale libidoului, agravarea porfiriei.

PRIMASEPT MED *COD ATC: D08AX53*
SCHÜLKE & MAYR GmbH; 100 g sol. cutanată conțin: 1-propanol 10 g, 2-propanol 8 g, 2-bifenilol 2 g (fl. × 450 ml sau 1000 ml) ***(OTC)***

Ind: Curățarea tegumentelor mâinilor, în cazul contaminării cu diferiți agenți infecțioși.
Dz: Se aplică 3 ml soluție cutanată pe tegumentele mâinilor și se repartizează uniform, prin mișcările specifice spălării, timp de un minut. Se adaugă apoi, o cantitate mică de apă și se spală timp de un minut.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului.
A!: Nu se utilizează la nou-născuți prematuri. Se evită contactul cu ochii. Nu se recomandă contactul produsului cu sânii în timpul alăptării.
RA: La locul de aplicare pot să apară uscăciune, iritații tegumentare sau eczeme.

PRINZIDE *COD ATC: C09BA03*
MERCK SHARP & DOHME; Cpr. lisinopril 20 mg, hidroclorotiazidă 12,5 mg ***(P-6L)***

Ind: Inhibitor de enzimă de conversie (ACE) și diuretic.

PRITORPLUS® *COD ATC: C09DA*
GLAXO SMITHKLINE; Cpr. 40/12,5 mg sau 80/12,5 mg telmisartan/hidroclorotiazidă *(P-RF)*

Ind: Trat. HTA esențiale, la pacienții la care TA nu este controlată adecvat numai cu telmisartan.

PROCTO-GLYVENOL *COD ATC: C05AX05*
NOVARTIS CONSUMER HEALTH; Sup. cu 400 mg tribenosid, 40 mg lidocaină; 100 g cremă conține 5 g tribenosid și 2 g lidocaină (tub × 30 g) *(OTC)*

Ind: Hemoroizi, fisuri anale.
Dz: Până la dispariția semnelor acute, crema sau 1 supozitor trebuie aplicate dimineața și seara. Ulterior, se poate continua trat. printr-o singură adm. zilnică.
Cind: Hipersensibilitate la unul din componenți.
A!: Sarcină și alăptare.
RA: Senzație de arsură ușoară, durere, creșterea motilității intestinale.

PROCTOLOG *COD ATC: C05AX05*
LAB. JOUVEINAL; Cremă cu ruscogenină 0,5 g, trimebutină 5,8 g; Sup. cu ruscogenină 10 mg, trimebutină 120 mg *(OTC)*

GOEDEKE PARKE-DAVIS; Cremă rectală; Sup. *(OTC)*

Ind: Trat. simptomatic al manifestărilor dureroase și pruriginoase anale, în special în criza hemoroidală și în fisuri anale.
Dz: *Sup:* 1-2 sup./zi. *Cremă:* 1-2 aplicații/zi.

PROPOLIS C
MARK INTERNATIONAL SRL; Cpr. de supt cu 100 mg acid ascorbic, 1 mg riboflavină, 11,5 mg tinctură propolis – reziduu uscat *(OTC)*

Dz: *Adulți:* 2-3 cpr. de 3 ori pe zi.

PROPOLIS PLUS-DIGESTIV
MARK INTERNATIONAL SRL; Cpr. mast. cu 2 mg ulei de mentă, 2 mg mentol, 1 mg ulei de cimbru, 1 mg ulei coriandru, 0,0138 mg tinctură propolis *(OTC)*

Dz: *Adulți:* 1 cpr. de 3 ori pe zi.
A!: Sarcină și alăptare.

PROPOLIS PLUS-ECHINACEA
MARK INTERNATIONAL SRL; Cpr. mast. 50 mg acid ascorbic (vit. C), 11,5 mg tinctură propolis – reziduu uscat, 10 mg extract uscat de Ginkgo biloba, 30 mg extract uscat de Echinacea purpurea *(OTC)*

Dz: *Adulți:* 1 cpr. de 3 ori pe zi.
Cind: Afecțiuni autoimune (tuberculoză, scleroză multiplă, leicoze, colagenoze, lupus).
A!: Sarcină și alăptare.

PROPOLIS PLUS-MARKOSEPT
MARK INTERNATIONAL SRL; Cpr. de supt cu 2 mg ulei de mentă, 2 mg mentol, 2 mg ulei de pin, 2 mg ulei de eucalipt, 13,8 mg tinctură de propolis-reziduu uscat ***(OTC)***

Dz: *Adulți:* 1 cpr. de 3 ori pe zi.
Cind: Convulsii antecedente, epilepsie, hipersensibilitate la unul din excipienți. Nu se administrează la copii cu vârste mai mici de 6 ani.
A!: Sarcină și alăptare.

PROPOLIS PLUS-SPIRULINĂ *COD ATC: A13*
MARK INTERNATIONAL SRL; Cpr. mast. cu 70 mg acid ascorbic (vit. C), 18,3 mg tinctură de propolis, 200 mg spirulină ***(OTC)***

Dz: *Adulți:* 1 cpr. de 3 ori pe zi.
A!: Sarcină și alăptare.

PROSPAN *COD ATC: R05DB*
ENGELHARD ARZNEIMITTEL GmbH & CO KG; Sol. orală extract din frunze de iederă 7 mg/ml sol. (fl. × 100 ml) ***(OTC)***

Ind: Antitusiv în tusea uscată și cea umedă, bronșite acute și cronice, adjuvant în tratamentul astmului bronșic la copii.
Dz: *Sugari și copii sub 5 ani:* o jumătate de linguriță dozatoare de 3 ori pe zi timp de 7 zile. *Copii între 5 și 15 ani:* 1 linguriță dozatoare de 3 ori pe zi timp de 7 zile. *Adulți:* 1 măsură și 1/2 de 3 ori pe zi, până la dispariția simptomelor. 1 linguriță-măsură de 5 ml conțin 1,9 g sorbitol și 0,04 g sorbat de potasiu.
Cind: Intoleranță la fructoză.
RA: Diaree.

PULMEX-BABY *COD ATC: R05XN01*
NOVARTIS CONSUMER HEALTH; Ung. cu balsam de Peru artificial 60 mg, eter de eucalipt 50 mg, eter de rosmarin 50 mg, vanilină (tub × 20 g) ***(OTC)***

Ind: Adjuvant în trat. bolilor tractului respirator: bronșite, guturai, răceli, tuse.
Dz: Se aplică o cantitate mică de pomadă la nivelul părții superioare a toracelui (piept și spate), de-a lungul liniei mediane. Se masează ușor până la penetrarea completă a pielii, apoi se acoperă cu o flanelă uscată și caldă. *Copii peste 6 luni:* 2 aplicații/zi.
Cind: Hipersensibilitate la unul din componenți. Istoric de convulsii. Nu se aplică pe mucoase (nas sau gură, în special) și pe leziuni cutanate. Sarcină și alăptare.
A!: Nu trebuie utilizat la copii sub 6 luni.
RA: Sensibilizare cutanată secundară folosirii balsamului de Peru.

Q

QUARELIN *COD ATC: N02BB52*
CHINOIN - Membru al SANOFI~SYNTHELABO GROUP; Cpr. cu metamizol 400 mg, cafeină 60 mg, drotaverină 40 mg (blister × 10 cpr.) ***(OTC)***

Ind: Migrene (faza inițială a atacului migrenos) de intensitate ușoară și moderată, dureri de cap de origine hipertensivă forme episodice sau cronice), dureri de cap simptomatice (după traumatisme craniene, maladii intracraniene de origine vasculară și non-vasculară), manevre de introducere sau extragere a unor sonde din organism, infecții, tulburări metabolice, dureri în afecțiuni ale capului, gâtului, gurii, ochilor, nasului, urechilor, sinusurilor, dinților, altor părți ale capului și feței.
Dz: *Adulți,* doza medie: 1/2-1 cpr. de 2-3 ori pe zi.
Cind: Hipersensibilitate la pirazolone, porfirie hepatică, deficiență G-6-PDH, granulocitopenii, IH severă, IR severe, IC. Copii. Sarcină și alăptare.
A!: După adm. prelungite controlul hemogramei.
RA: Mai importante sunt cele induse de metamizol (agranulocitoză, leucocitopenie, trombocitopenie, anemie hemolitică, șoc anafilactic, erupții pe piele și mucoase).

R

REBETRON® *COD ATC: J05AB54*
SCHERING-PLOUGH EUROPE AG; Trusa: 1.) 2 ct. × 7 blist. × 10 cps. sau 12 cps. × 200 mg ribavirină; 2.) 2 pen-uri multidoză × 18 M u.i. interferon alfa-2b recombinat × 1,2 ml (6 doze × 3 M u.i./0,2 ml) ***(P-RF)***

Ind: Asociere eficace împotriva virusului hepatitei C cronică la adulți, care au răspuns la interferon alfa, dar prezintă recădere și la bolnavi netratați anterior (cu ALT crescută, ARN-VHC pozitiv și activitatea inflamatorie crescută).
Dz: Tratament sub supraveghere medicală. Oral 1-1,2 g/zi ribavirină, în două prize, la mese, dimineața și seara + interferon alfa-2b injectabil.
RA: Astenie, febră, cefalee, scădere ponderală, amețeli, parestezii, anorexie, dureri abdominale, diaree, vome, artralgii, mialgii, agitație, anxietate, depresie, insomnie.

REFORTAN® *COD ATC: B05AA07*
BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP; Sol. perf. 6% și 10% cu poli (0-2-hidroxietil) amidon 60 g respectiv 100 g la 1000 ml, clorură de sodiu 9,0 g la 1000 ml (fl. de sticlă de 250 ml sau 500 ml; pungi PP de 250 ml sau 500 ml) ***(S)***

Ind: Tratamentul și profilaxia hipovolemiei și șocului în intervenții chirurgicale, traumatisme, infecții, arsuri. Hemodiluție terapeutică.

Dz: Perfuzie i.v. continuă lentă. Doza și viteza de perfuzare depind de volumul de sânge pierdut și de valoarea hematocritului.
Cind: Hiperhidratare, hipervolemie, IC gravă, IR cu oligurie sau anurie, pacienți tratați prin dializă, hipersensibilitate la amidon, edem pulmonar, hemoragie intracraniană, coagulopatii severe, nou-născuți, sugari, copii.
A!: Administrarea se face numai sub supraveghere medicală de specialitate.
RA: Foarte rar reacții anafilactice (reacții cutanate, tahicardie, hTA, greață, vărsături, șoc, bronhospasm, stop cardiorespirator).

REMNEVRAL *COD ATC: N02BA51*
LAB. REMEDIA SRL; Cpr. cu ac. acetilsalicilic 200 mg, paracetamol 200 mg și cafeină anhidră 25 mg ***(S/OTC)***

Ind: Trat. simptomatic în: dureri de intensitate ușoară-medie, cu diferite localizări: mialgii, nevralgii, dureri dentare, cefalee, migrenă, dureri postoperatorii, artralgii și alte dureri reumatice; stări febrile.
Dz: *Adulți și copii peste 15 ani:* 1 cpr. oral, la nevoie; doza se poate repeta de 3-4 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului; ulcer gastroduodenal activ; hemoragie digestivă; boli hemoragice și alte boli cu risc hemoragic; insuficiență hepatocelulară; IR severă; deficit de G-6-PDH; copii sub 15 ani. Sarcină și alăptare.
A!: La pacienții cu astm bronșic și alte afecțiuni alergice respiratorii, ca și la cei cu hipersensibilitate la AINS pot fi declanșate crize de astm bronșic și alte reacții alergice de tip anafilactic. Prudență în caz de antecedente de ulcer sau de hemoragii digestive, în IR și IH ușoare-moderate. Nu se recomandă adm. în gută, deoarece dozele terapeutice mari scad eliminarea acidului uric. Prudență la pacienții supuși intervențiilor chirurgicale, chiar minore (de exemplu extracții dentare), deoarece acidul acetilsalicilic are efect antiagregant plachetar, care persistă câteva zile, existând risc de accidente hemoragice. Atenționare pentru sportivi: cafeina poate pozitiva testele de control antidoping. Datorită riscului de insomnie, nu se recomandă adm. la sfârșitul zilei.
RA: *Gastrointestinale:* greață, vărsături, hemoragii digestive acute grave sau oculte și ulcerații gastrointestinale. *Hematologice:* epistaxis, gingivoragii, risc crescut de hemoragii intra- și post-operatorii, trombocitopenie. *Hepatice:* hepatotoxicitate; creșterea valorilor transaminazelor și fosfatazei alcaline. *Reacții alergice:* de tip anafilactic, manifestate prin erupții cutanate, mai ales urticarie, edem angioneurotic, crize de astm bronșic. *Neuropsihice:* adm. în doze mari provoacă cefalee, amețeli, tinitus, somnolență sau excitație, confuzie, insomnie, neliniște, palpitații. *Renale:* trat. prelungit poate determina nefrită interstițială și necroză papilară.

RENALEX *COD ATC: G04BDN1*
FARES SA ORĂȘTIE; Sol. orală cu alfa și beta–pinen, borneol, 1,8-cineol, anetol, fenconă, ulei de floarea soarelui (fl. × 10 ml) ***(OTC)***

Ind: Antispastic, antiinflamator urinar, litiază renală.
Dz: 3-5 pic. pe o bucată de zahăr de 4-5 ori pe zi, înaintea meselor principale. În crize 20-30 pic. într-o priză; se poate repeta după 20 minute.

RENNIE *COD ATC: A02AC10*
HOFFMANN LA ROCHE; Cpr. mast. cu carbonat de calciu 0,68 g carbonat de magneziu 0,08 g ***(OTC)***

Ind: Hiperaciditate gastrică, pirozis, dispepsie.
Dz: *Adulți:* 1-2 cpr. mast. de 2-3 ori/zi, (maximum 12 cpr./zi) după mese sau în momentul durerii. *Copii de peste 6 ani:* 1 cpr. mast. de 2-3 ori/zi.
Cind: Tulburări renale grave.
A!: Poate reduce efectul altor medicamente adm. concomitent.
RA: Hipercalcemie la doze mari.

REPARIL *COD ATC: C05CXN1*
LAB. MADAUS; Gel cu escină amorfă 1 g, escină polisulfat de sodiu 1,0 g, salicilat de dietilamină 5,0 g, carboxipolimetilen 2,0 g, trietanolamină 2,5 g, isopropanol 27,0 g, esență de lavandă 0,35 g, esență de Neroli 0,35 g, apă purificată 60,80 g (tub × 40 g) ***(OTC)***

Ind: Manifestări funcționale ale insuficienței venoase cronice, a complicațiilor inflamatorii ale acesteia (hipodermita inflamatorie), manifestări inflamatorii venoase acute (flebite superficiale). Trat. adjuvant în traumatisme benigne (echimoze, contuzii).
Dz: 2-4 aplicații pe zi.
Cind: Hipersensibilitate.
A!: Se va evita contactul cu ochii, mucoasele, pe plagi, leziuni infectate, dermatoze supurate.
RA: Reacții cutanate alergice.

REVALID *COD ATC: D11AXN3*
EUROPHARM SA; Cps. cu metionină 100 mg, fier 2 mg, acid para-aminobenzoic 20 mg, cisteină 50 mg, zinc 2 mg, extract de mei 50 mg, vit. B_1 1,5 mg, cupru 0,5 mg, extract din germeni de grâu 50 mg, vit. B_6 10 mg, pantotenat de calciu 50 mg, drojdie de bere uscată 50 mg ***(OTC)***

VIFOR SA; Cps. cu metionină 100 mg, fier 2 mg, acid para-aminobenzoic 20 mg, cisteină 50 mg, zinc 2 mg, extract de mei 50 mg, vit. B_1 1,5 mg, cupru 0,5 mg, extract din germeni de grâu 50 mg, vit. B_6 10 mg, pantotenat de calciu 50 mg, drojdie de bere uscată 50 mg ***(OTC)***

Ind: Alopecie diseminată, androgenică, seboreică, de cauză medicamentoasă, hormonală sau de sarcină. Deteriorarea structurii părului: păr despicat, fragil, tern. Tulburări de creștere a unghiilor: unghii friabile, fragile sau cu aspect neatrăgător.
Dz: 1 cps. de 3 ori/zi, 3 luni.
A!: Sarcină și alăptare. Se vor evita trat. agresive: decolorări, vopsiri și ondulări permanente frecvente; abuzul de șampoane, uscarea la cald, întinderile mecanice excesive, expunerea prelungită la soare.

Cind: Hipersensibilitate. Trat. concomitent cu sulfamide.
RA: Tulburări digestive, cefalee, amețeli, insomnie.

REVULSIN *COD ATC: M02AX10*
BIOFARM SA; 100 g sol. cutanată conțin nicotinat de metil 3,13 g și alcool etilic 33,70 (fl. × 50 ml) ***(OTC)***

Ind: Trat. local al durerilor de tip reumatic: articulare, periarticulare, musculare; de asemenea, ca trat. adjuvant în nevralgii (inclusiv cea sciatică).
Dz: Produsul se aplică prin fricțiuni cutanate ușoare de 2-3 ori/zi. Soluția se aplică pe zona dureroasă, favorizând pătrunderea în piele prin masare ușoară cu vârful degetelor sau printr-un masaj mai energic al zonei afectate.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului. Diateze hemoragice. Tulburări hepatice, renale. Copii sub 10 ani
A!: Se va evita aplicarea produsului periocular sau pe zone cu piele mai sensibilă (plici de flexie). La persoanele predispuse la eczeme, se recomandă diluarea soluției cutanate Revulsin în raport de 1/2-1/3 cu apă. Nu se recomandă aplicarea produsului pe zonele cutanate cu iritații sau care prezintă soluții de continuitate.
RA: Dozele excesive sau aplicarea pe regiuni sensibile pot determina iritații cutanate locale.

RHINOIL *COD ATC: R01AB05*
TIS FARMACEUTIC; Sol. ext. cu efedrină 45 mg, camfor 72 mg, ulei de anason 72 mg, ulei de mentă 54 mg, ulei de eucalipt 63 mg (fl. × 10 ml) ***(OTC)***

Ind: Rinite acute și cronice.
Dz: Instilații nazale, 1-4 pic. în fiecare nară de 2-4 ori pe zi.

RIFAMPICINĂ CU IZONIAZIDĂ *COD ATC: J04AM02*
SICOMED SA; Cps. rifampicină 300 mg și izoniazidă 150 mg ***(S/P-RF)***

ANTIBIOTICE IAȘI; Cps. rifampicină 300 mg și izoniazidă 150 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Tuberculoză activă.
Dz: Zilnic 2 cps. într-o singură priză, înaintea mesei.
Cind: Hipersensibilitate, hepatopatii.
A!: Se va evita adm. intermitentă. În cazul asocierii cu PAS se va modifica dozajul.
RA: Erupții cutanate, tulb. gastrice (greață, vomă, diaree, dureri abdominale, febră), rar hepatită (mai ales pe fondul alcoolismului, la vârstnici, pe fondul unor hepatopatii cronice), sd. gripal (la doze mari), trombopenie, sd. hepatorenal, creșterea ușoară a transaminazelor, proteinurie asimptomatică.

RIFATER *COD ATC: J04AM02*
HOECHST MARION ROUSSEL; Dj. cu rifampicină 120 mg, izoniazidă 50 mg, pirazinamidă 300 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Tuberculoză.
Dz: Sub 40 kg: 3 dj./zi; 40-49 kg: 4 dj./zi; 50-65 kg: 5 dj./zi; peste 65 kg: 6 dj./zi.

RIFINAH 150; RIFINAH 300 *COD ATC: J04AM02*
HOECHST MARION ROUSSEL; Dj. rifampicină 300 mg, izoniazidă 150 mg (fl. × 56 dj.); rifampicină 150 mg, izoniazidă 75 mg (fl. × 100 dj.) ***(S/P-RF)***

Ind: Tuberculoză.
Dz: *Adulți:* 2 dj./zi.

RIGEVIDON; RIGEVIDON® 21+7 *COD ATC: G03AA07*
GEDEON RICHTER; Dj. cu 0,15 mg levonorgestrel și 0,03 mg etinilestradiol ***(P-6L)***

Ind: Contracepția orală. Dismenoree. Sindrom premenstrual.
Dz: 1 dj./zi începând cu prima zi a ciclului menstrual, timp de 21 zile, apoi pauză de 7 zile.
Cind: Tromboflebită, trombembolism. Afecțiuni cerebrovasculare. Boli ischemice cardiace. Carcinom de sân sau de endometru. Tumori estrogen-dependente. Funcție hepatică anormală. Tumori hepatice benigne sau maligne. Icter gestațional, prurit sau herpes în perioada sarcinilor anterioare. Sângerări vaginale de origini necunoscute. Cefalee severe, migrene. Siclemie. Otoscleroză (deteriorată în cursul sarcinilor anterioare). Hiperbilirubinemie congenitală (sd. Gilbert și Rotor-Dubin-Johnson). Dereglări de metabolism lipidic (hipercolesterolemie). Diabet zaharat sever. HTA severă. Sarcină și alăptare.
A!: Antecedente heredocolaterale de diabet zaharat; creștere ponderală excesivă în perioada de adm. a medicamentului, afecțiuni cardiace nonischemice, afecțiuni renale, retardare mintală, alcoolism, dependență medicamentoasă. Diabet zaharat, HTA, varice, flebite, otoscleroză, scleroză multiplă, epilepsie, chorea minor, porfirie intermitentă, tetanie latentă, tumori uterine benigne, endometrioze sau mastopatii, trombembolism juvenil, tulburări de coagulare în antecedentele personale patologice. Mononucleoză infecțioasă. Femei fumătoare peste 35 ani. Depresie. Se va adm. cu precauție împreună cu: ampicilină, rifampicină, tetracicline, cloramfenicol, neomicină, sulfonamide, barbiturice, fenilbutazonă (aceste medicamente pot reduce efectul contraceptiv; de aceea, se recomandă folosirea altor metode de contracepție, nonhormonale, pe perioada trat.). Antidiabetice orale, anticoagulante, derivați de cumarină sau de indandionă (contraceptivul reduce eficacitatea acestor medicamente) - la nevoie, se recomandă determinarea timpului de protrombină și ajustarea dozei de anticoagulant. Antidepresive triciclice, beta-blocanți (contraceptivele sporesc efectul acestor medicamente; risc de toxicitate). Medicamentele hepatotoxice pot crește riscul de hepatotoxicitate.
RA: Hipomenoree. Sângerări intermenstruale. Greață, vomă, cefalee, tensiune în sâni, modificarea greutății corporale, retenție hidro-salină, depresie, libidou scăzut sau crescut. Pigmentarea pielii, intoleranță la lentile de contact. Reducerea toleranței la glucoză, creșterea glicemiei și HTA. Modificarea secreției vaginale și micoze vaginale. Complicații periculoase: tromboze și tromboflebite

profunde, embolie pulmonară, infarct miocardic. Embolie cerebrală, hemoragii cerebrale. Tromboze retiniene, mezenterice și ale venei pelviene mici.

RINGER'S *COD ATC: B05BB01*

INFOSINT; Sol. perf. 1000 ml sol. conțin: clorură de sodiu 8,6 g, clorură de calciu 0,33 g, clorură de potasiu 0,3 g (saci PVC × 500 ml) ***(S)***

BAXTER HEALTH CARE; Sol. perf. 1000 ml sol. conțin: clorură de sodiu 8,6 g, clorură de calciu 0,33 g, clorură de potasiu 0,3 g (saci PVC × 1000 ml) ***(S)***

Ind: Trat. de substituție electrolitică în dezechilibre acido-bazice, în acidoza metabolică ușoară, în deshidratări izotone sau hipotone în șoc, colaps, arsuri, degerături, vărsături repetate, diaree (trat. pe termen scurt). precum și ca vehicul si solvent pentru medicamente compatibile cu electroliți.
Dz: Perfuzie i.v.; doza și viteza de perfuzare se stabilește în funcție de starea clinică, vârstă, greutate. Viteza max. de perfuzare 3 ml/kg și oră. Doza max. 40 ml/kg și zi (de ex. 2800 ml la un pacient de 70 kg).
Cind: Hiperhidratare, mai ales extracelulară, hipercloremie, hiperkaliemie, hipernatriemie, hipercalcemie, IC congestivă, edeme, HTA, eclampsie, IR gravă, IH, acidoză metabolică. Nu se adm. i.m.
A!: Supravegherea echilibrului hidro-electrolitic și acido-bazic. În caz de transfuzii concomitente sângele și soluția Ringer nu se vor adm. în același dispozitiv.
RA: Hipercloremie.

RINOALERSIN *COD ATC: R01BA52*

PHARMEX ROM INDUSTRY; Cpr. cu 500 mg paracetamol, 30 mg pseudoefedrină clorh., 2 mg clorfeniramină maleat ***(OTC)***

Ind: Ameliorarea rapidă a simptomelor de răceală și gripă însoțite de febră, tuse și hipersecreții nazale și conjunctivale. Trat. sinuzitelor și rinitelor vasomotorii sau alergice care includ congestie nazală, strănut și secreții nazale și lacrimare crescute.
Dz: *Adulți:* 1 2 cpr. la 6 ore max. 8 cpr./zi. *Copii:* 12 14 ani: 1 cpr. la 6 ore.
Cind: Hipersensibilitate, HTA, IR gravă, insuficiență hepatobiliară.
RA: Palpitații, tahicardie, insomnie, efect sedativ, retenție urinară la prostatici.

RINOALERSIN FORTE *COD ATC: R01BA52*

PHARMEX ROM INDUSTRY; Cpr. cu 500 mg paracetamol, 30 mg pseudoefedrină clorh., 15 mg dextrometorfan bromhidr., 2 mg clorfeniramină maleat ***(OTC)***

Ind: Ameliorarea simptomelor de răceală și gripă însoțite de febră, tuse și hipersecreții nazale și conjunctivale. Trat. sinuzitelor și rinitelor vasomotorii sau alergice care includ congestie nazală, strănut și secreții nazale și lăcrimare crescute.

Dz: *Adulți:* 2-4 cpr./zi, din care 1-2 cpr. seara, la culcare. *Copii: 12-14 ani:* 1 cpr. seara, la culcare.
Cind: Hipersensibilitate, HTA, IR gravă, insuficiență hepatobiliară.
A!: Șoferi și activități de precizie.
RA: Palpitații, tahicardie, insomnie, efect sedativ, retenție urinară la prostatici.

RINONEF-T

COD ATC: R01AB05

TIS FARMACEUTIC; Sol. ext. efedrină 50 mg, neomicină 50 mg (fl. × 10 g) *(OTC)*

Ind: Rinite acute și cronice.
Dz: Instilații nazale, 1-4 pic. în fiecare nară de 2-4 ori pe zi.

RINOSIN

COD ATC: R01AB02

PHARCO PHARM.; Gel nazal cu nafazolină clorh. 0,125 g, clorfeniramină maleat 0,5 g (tub × 5 g) ***(OTC)***

Ind: Trat. simptomatic al congestiei rino-faringiene în infecțiile acute ale căilor resp sup., rinite alergice.
Dz: Se introduce în fiecare nară o cantitate mică de gel, de 2-3 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate, HTA, glaucom, copii sub 7 ani.
A!: La copii nafazolina poate provoca fenomene de deprimare centrală. Pacienți cu ATS, cardiopatie ischemică, hipertiroidie. Sarcină și alăptare.
RA: Fenomene de iritație locală, senzație de arsură, furnicături. Rinită atrofică la utilizarea excesivă.

ROCKLE'S

COD ATC: V07AS

SPECIALITES SEPTODONT; Sol. dent. (fl. × 13 ml sol. dent. + 1 capac cu aplicator) ***(STO)***

Ind: Soluție de uz stomatologic.

RODILEMID

COD ATC: J05CNN1

SICOMED SA; Sol. inj., f. × 10 ml cu sol. de edetat disodic monocalcic 1 g, clorh. de L-cisteină 0,01 g și gluconat de calciu 0,05 g ***(S/P-RF)***

Ind: Herpes simplex, keratita herpetică, herpes zoster, varicelă, paralizii periferice faciale, scleroză multiplă.
Dz: *Adulți:* Herpes simplex cu caracter de primoinfecție sau reinfecție: 1 f./zi i.m. sau oral (în puțină apă) în funcție de gravitatea cazului, 4-6 zile. Herpes recidivant vechi: 1 f./zi 6 zile/lună, sau corespunzând ritmului recidivelor. Trat. injectabil se poate asocia cu badijonaj local (2-3 ori/zi). Herpes genital recidivant: se aplică în plus și tampoane locale îmbibate în Rodilemid. Herpes ocular (keratita herpetică cu virus herpetic tip I sau II): 1 f./zi i.m., 6-10 zile. Herpes Zoster: 1 f./zi i.m., 6-12 zile în orice moment al erupției (de preferat cât mai aproape de debut); în cazurile grave, cu tensiune normală, 2 f./zi,

una dimineața și una seara. În sechelele dureroase post-zosteriene, medicamentul este activ numai până la 1-2 luni de la stingerea erupției; se adm. 1-2 serii de câte 10 f., cu pauză de 5 zile între serii. *Copii:* Pentru aceleași afecțiuni mai sus enumerate, se adm. câte 1/2 f. (5 ml)/zi i.m. (cca 10-15 mg/kg corp) sau 1 f./zi oral, 5-6 zile. În varicelă se adm. 1 f./zi oral, 4-6 zile. Tratamentul paraliziilor periferice faciale se începe imediat după instalare: 1 f./zi i.m. 12 zile; în caz că vindecarea nu este completă se repetă seria de 12 f. după o pauză de 5-6 zile. Scleroza multiplă: trat. va fi individualizat în funcție de starea bolnavului. În cazuri moderate, 1 f./zi i.m. 6 zile/lună. În cazurile grave, prima serie poate fi de 8 f., câte 1 f./zi i.m., injectarea făcându-se lent și profund.

Cind: Hepatita acută, hepatita cronică, IH, nefropatii avansate. Adm. de preparate de calciu, corticoizi, barbiturice, sulfamide; consumul de produse lactate.

A!: HTA, vârstnici, forme avansate de ATS.

RA: Rareori cefalee, insomnie sau somnolență.

ROMPIRIN PLUS *COD ATC: N02BA51*

ANTIBIOTICE IAȘI; Cpr. ac. acetilsalicilic 250 mg, paracetamol 200 mg, cofeină 50 mg ***(P-RF)***

Ind: Dureri de intensitate medie-ușoară, cu diferite localizări: mialgii, nevralgii, dureri dentare, cefalee, migrenă, dureri postoperatorii, artralgii, dureri reumatice. Stări febrile.

Dz: *Adulți și copii peste 15 ani:* 1 cpr. de 3-4 ori pe zi.

Cind: Hipersensibilitate, ulcer gastroduodenal activ, hemoragie digestivă, boli hemoragice și alte maladii cu risc hemoragic, insuficiență hepatocelulară, IR gravă, deficit G-6-PDH, copii sub 15 ani. Gripă, viroze respiratorii, varicelă la copii (risc de complicații infecțioase sau sd. Reye). Sarcină trim. II și III. Alăptare.

A!: Antecedente de ulcer sau hemoragii digestive, IR și IH ușoare-moderate, gută, extracții dentare (risc de accidente hemoragice), astm bronșic, afecțiuni alergice. Cafeina pozitivează testele antidoping. Datorită riscului de insomnie nu se recomandă adm. seara.

RA: *Legate de acidul acetilsalicilic:* Gastrointestinale: greață, varsături, dureri epigastrice, hemoragii digestive acute grave sau oculte, ulcerații gastrointestinale. Hematologice: epistaxis, gingivoragii, risc crescut de hemoragii intra- și postoperatorii. Hepatice: hepatotoxicitate, creșterea valorilor transaminazelor și fosfatazei alcaline. Reacții alergice: de tip anafilactic manifestate prin erupții cutanate, urticarie, edem angioneurotic, crize de astm bronșic. Neuropsihice: cefalee, amețeli, tinitus, somnolență, excitație, confuzie. Renale: nefrită interstițială, necroză papilară. *Legate de paracetamol:* reacții alergice, rash cutanat cu eritem sau urticarie, excepțional trombocitopenie, nefrită interstițială, necroză papilară. *Legate de cafeină:* insomnie, neliniște, palpitații, disconfort epigastric.

ROVITAL C *COD ATC: A11GA01*

OMEGA PRODINVEST; Cpr. eferv. cu vit. C 75 mg; vit. E 12 mg; provit. A 2 mg; bicarbonat de sodiu 800 mg; acid citric 1200 mg (tub × 10 cpr.) ***(OTC)***

Ind: Eforturi fizice intense și prelungite; perioada de creștere a copiilor; infecții, mai ales virale și convalescența lor, astenii funcționale; profilaxia gingivitelor,

stomatitelor, erupțiilor purpurice; fragilitate vasculară; corectarea unor anemii; consum excesiv de alcool.
Dz: *Adulți:* 1 cpr. eferv./zi dizolvat într-un pahar cu apă sau ceai (150-200 ml). *Copii între 4-12 ani:* 1/2 cpr. eferv./zi, dizolvat într-un pahar cu apă sau ceai (150-200 ml).

ROWACHOL *COD ATC: A05AXN2*
ROWA WAGNER; Sol. orală 100 g conțin: mentol 32 g, menton 6 g, alfa-pinen 13,6 g, beta-pinen 3,4 g, borneol 5 g, camfen 5 g, cineol 2 g (fl. × 10 ml); Cps. ***(OTC)***

Ind: Colangită, colecistită, colelitiază, sindrom postcolecistectomie (ca medicație adjuvantă).
Dz: Oral, 3-5 pic. de 3-4 ori/zi; în colici 20-40 pic. o dată.
Cind: IH avansată, obstrucție biliară, empiem vezicular, ileus.

ROWATINEX *COD ATC: G04BDN1*
ROWA WAGNER; Sol. orală 100 g conțin: alfa-pinen 24,8 g, beta-pinen 6,2 g, camfen 15 g, borneol 10 g, anetol 4 g, fencon 4 g, cineol 3 g (fl. × 10 ml); Cps. ***(OTC)***

Ind: Litiază urinară (curativ și profilactic), infecții urinare (adjuvant).
Dz: Oral, 3-5 pic. de 3-4 ori/zi; în colici 20-40 pic. o dată.

ROYAL JELLY *COD ATC: A13AN01*
STANLEY PHARMA Ltd.; Cps. 150 mg lăptișor de matcă ***(OTC)***

PHARMEX ROM IND.; Cps. 150 mg lăptișor de matcă ***(OTC)***

PHARCO PHARMACEUTICALS; Cps. ***(OTC)***

Ind: Stres fizic și psihic, astenie, convalescență, boli cronice.
Dz: *Adulți:* 2-3 cps./zi, după mese. *Copii:* 1 cps./zi.
A!: Astmatici.

RUBJOVIT *COD ATC: S01XAN1*
S.I.F.I.; Sol. oft. cu iodură de rubidiu 0,8 g; iodură de sodiu 1,2 g; formiat de calciu 0,5 g; ascorbat de sodiu 0,225 g; clorhidrat de tiamină 0,250 g (fl. × 10 ml) ***(P-6L)***

Ind: Cataractă incipientă; miodesopsii; irite; episclerite; coroidite; miopii cu modificări corio-retiniene.
Dz: Se instilează 1-2 pic. în fiecare sac conjunctival.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componente. Hipertiroidism, tireotoxicoză, tbc. Asocierea cu medicamente ce conțin mercur. Copii sub 3 ani.
A!: Dacă soluția este ingerată accidental sau este folosită în doze mari un timp îndelungat pot apărea fenomene toxice. Sarcină și alăptare.
RA: Sialoree, lăcrimare, coriză și erupții cutanate.

RUBRIMENT *COD ATC: M02AX10*
NORDMARK; Ung. nicotinat de benzil 2,5 g/100 g, nonivamid 0,3 g (tub × 100 g) ***(OTC)***

RUBRIMENT - N *COD ATC: M02AX10*
NORDMARK; Emulsie nicotinat de benzil 2,5 g/100 g, nonivamid 0,3 g (fl. × 100 g) ***(OTC)***

Ind: Antireumatic, antiinflamator în dureri articulare sau musculare.
Dz: Masaj local de 3-4 ori pe zi.
Cind: Hipersensibilitate.

RUTINOSCORBIN® *COD ATC: C05CA51*
GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. rutin 25 mg, ac. ascorbic 100 mg ***(OTC)***

Ind: Medicația capilarelor.

S

SAFORELLE *COD ATC: D11AX*
LAB. IPRAD; Săpun lichid 100 ml sau 250 ml; Cremă 50 ml; cremă copii 125 ml; conține extract hidroalcoolic de brusture 1,2% agenți de hidratare și emulsificare; pH = 8 ***(OTC)***

Ind: *Pediatrie:* vulvo-vaginitele la fetițele prepubere; iritații cutanate (eritem fesier); prurit: anal, eritematos, parazitar (cauzat de înțepăturile insectelor); toaleta cotidiană. *Ginecologie:* Infecții bacteriene; micoze; adjuvant în tratamentul vulvo-vaginitelor specifice și nespecifice; igiena vulvo-perineală cotidiană. *Dermatologie:* Piele atrofică, iritată, eczeme uscate, eczeme lichenificate; adjuvant în tratamentul micozelor cutanate și altor dermatoze; arsuri și eritem solar. *Proctologie:* Prurit anal asociat sau nu cu senzații de arsură, leziuni de grataj, eritem, eczeme, ragade. *Diabetologie:* prurit diabetic. *Geriatrie:* prurit senil. *Chirurgie și stomatologie:* igiena mâinilor pre- și postoperator; proprietățile emoliente și pH=8 păstrează pielea catifelată și sănătoasă chiar și după întrebuințări frecvente.

SALMET - T *COD ATC: M02ACN1*
TIS FARMACEUTIC; Sol. ext. mentol 500 mg, salicilat de metil 500 mg, ulei de pin 150 mg, alcool 53 g, apă 45,85 g (fl. × 90 g) ***(OTC)***

Ind: Antireumatic, antiinflamator în dureri articulare sau musculare.
Dz: Masaj local de 3-4 ori pe zi.
Cind: Hipersensibilitate.

SANA-SOL *COD ATC: A11JAN1*

NYCOMED PHARMA; Sirop cu vit. A 1000 UI, nicotinamidă 16,0 mg, vit. D_3 400 UI, vit. B_6 1,2 mg, vit. E 10,0 mg, vit. B_{12} 2,5 g, vit. B_1 1,1 mg, ac. pantotenic 4,0 mg, vit. B_2 1,2 mg, vit. C 60,0 mg per 10 ml (fl. × 250 ml) ***(OTC)***

NYCOMED PHARMA; Tb. pt. copii ***(OTC)***; Tb. pt. gravide

Ind: Carențe vitaminice.
Dz: 10 ml (2 lingurițe) pe zi, după vârsta de 6 săpt.

SANADOR EXTRA *COD ATC: N02BE51*

LAROPHARM SRL; Cpr. paracetamol 250 mg, propifenazonă 150 mg, cafeină 50 mg ***(OTC)***

Ind: Cefalee și alte stări algice.
Dz: *Adulți:* 1-2 cpr. în doză unică; *Copii de vârstă școlară:* 1/2-1 cpr. o dată. Doza unică poate fi repetată de 3 ori în 24 ore.

SANTADERM *COD ATC: D06C*

"SANTA" N. BALANOS; Pulb. 1 g conține neomicină sulfat 5 mg, zinc bacitracină 250 UI, lactoză q.s. ad. 1 g (fl. × 10 g); Ung. 1 g conține neomicină sulfat 5 mg, zinc bacitracină 500 UI, parafină lichidă 0,2 g, vaselină q.s. ad. 1 g (tub × 10 g) ***(P-RF)***

Ind: Profilactic local postoperator, cât și în leziuni după chiuretarea pielii, în transplant de piele, arsuri de gradul 1 și 2 cu suprafață redusă. Terapie locală în ulcer aton, dermatită de poziție, ulcere de decubit, suprainfecția dermopatiilor cronice ca: eczeme, dermatomicoze, otită cronică externă. Lavaj vezical în microbiurie cu cateter definitiv.
Dz: *Pulb.:* Pudrarea zonei. *Ung.:* Se aplică de 1-2 ori/zi, prin masaj ușor.
Cind: Hipersensibilitate.
A!: Folosirea pe timp îndelungat poate avea ca rezultat dezvoltarea anumitor bacterii rezistente sau ciuperci. În cazuri mai grave ca leziuni cu suprafață mare, ulcere, arsuri sau în lavaje, probabilitatea absorbției sistemice crește rezultând apariția fenomenelor nefrotoxice sau/și ototoxice.
RA: Reacție alergică cu eritem local, edem, prurit și leziune cronică. Mai rar, fenomene ototoxice, nefrotoxice (proteinurie, cilindrurie, azotemie), exantem dermic, astenie prin blocaj neuromuscular.

SARE FĂRĂ SODIU *COD ATC: A12BA51*

MEDUMAN SA; Pulb. cu clorură de potasiu 55,5 g, clorură de amoniu 20,5 g, clorură de calciu 0,27 g, citrat de magneziu 2 g, acid citric 1 g, amidon la 100 g (pungă × 200 g) ***(OTC)***

Ind: Afecțiuni însoțite de retenție hidrosalină, edeme; hipokaliemie provocată prin diuretice.
Dz: Se adaugă alimentelor, în locul sării de bucătărie.
Cind: Boală Addison. Asociere cu diuretice antialdosteronice (spironolactonă, triamteren, amilorid).
A!: IR, IC.

SARIDON
COD ATC: N02BE51

HOFFMANN LA ROCHE; Cpr. cu 250 mg paracetamol, 150 mg propifenazonă, 50 mg cafeină ***(OTC)***

Ind: Cefalee, dureri dentare, dureri menstruale, migrenă, nevralgie, nevrite, dureri postoperatorii și dureri de origine reumatică; stări febrile (stări gripale etc.).
Dz: *Adulți:* 1-2 cpr. la nevoie, de max. 3 ori/zi. *Copii de vârstă școlară:* 1/2-1 cpr. la nevoie, de max. 3 ori/zi.
Cind: Afectări severe ale funcției hepatice sau renale, deficit congenital de G-6-PDH (anemie hemolitică), porfirie hepatică acută, alergie. Sugari și copii de vârstă preșcolară. Consum de alcool.
A!: Sarcină si alăptare.
RA: Reacții cutanate (rash, urticarie).

SCANDONEST 2% SPECIAL
COD ATC: N01BB03

SPECIALITES SEPTODONT; Sol. inj. mepivacaină clorhidrat 20 mg, adrenalină 1 mg (ct. × 50 blist. × 10 cartușe × 1,8 ml) ***(S)***

Ind: Anestezie locală.

SCOBUTIL-COMPUS
COD ATC: A03DB04

SICOMED SA; Sol. inj. cu bromură de N-butilscopolamină 0,02 g, metamizol sodic 2,5 g (f. × 5 ml) ***(S/P-RF)***

Ind: Colică biliară și nefretică, fenomenele spastice dureroase ale organelor cavitare. Dismenoree, stări algospastice în sfera genitală feminină. Tulburări spastice secundare ale tubului digestiv, legat de tubaje sau sondaje, de asemenea spasmele apărute în timpul cateterismelor, după intervenții chirurgicale pe vezica urinară, prostată și colecist.
Dz: În colica biliară sau nefretică gravă: 1 f. inj. i.v. lent. În cazurile în care adm. i.v. nu este posibilă preparatul poate fi inj. i.m. profund. După înlăturarea fenomenelor spastice acute prin adm. parenterală, trat. se poate continua cu supozitoare.
Cind: Sensibilizare la derivați pirazolonici, discrazii sanguine, glaucom.

SENSODYNE F
COD ATC: V07AS

BLOCK DRUG COMPANY INC.; Pastă de dinți (tub × 75 ml) ***(OTC)***

SENSODYNE F GEL
COD ATC: V07AS

BLOCK DRUG COMPANY INC.; Gel (tub × 75 ml) ***(OTC)***

Ind: Igienă orală.

SEPTANEST CU ADRENALINĂ 1/100.000; 1/200.000
COD ATC: N01BB58

SPECIALITES SEPTODONT; Sol. inj. articaină clorhidrat 40 mg, adrenalină bitartrat 0,5 mg/1 mg sol. inj. (ct. × 5 blist. × 10 cartușe × 1,7 ml) ***(S)***

Ind: Anestezie locală.

SEPTOGAL *COD ATC: R02AA02*
AESCULAP TG. MUREȘ; Cpr. mentol 5 mg, eucalipt 4 mg, ulei de mentă 2 mg, ulei din pini montane 2 mg, dequalinium HCl 0,2 mg ***(OTC)***

Ind: Stomatite, afte bucale.

SEPTOLETE; SEPTOLETE D *COD ATC: R02AA16*
KRKA d.d.; Pastile cu clorură de benzalconiu 1,0 mg, mentol 1,2 mg, ulei de mentă 1,0 mg, ulei de eucalipt 0,6 mg și timol 0,6 mg ***(OTC)***

Ind: Infecții ușoare ale cavității bucale și faringelui. Inflamații gingivale și ale mucoasei bucale. Profilactic în timpul gripei și corizei. Disfonie și halenă neplăcută.
Dz: Pastilele se țin în cavitatea bucală până la dizolvarea completă. *Adulți:* 1 pastilă la 2-3 ore; max. 6-8 pastile/zi. *Copii peste 4 ani:* 4 pastile/zi. *Copii peste 10 ani:* 6 pastile/zi.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului.
A!: Este necesară supravegherea copiilor până la dizolvarea completă a produsului. Medicamentul nu este recomandat la copii sub 4 ani. Atenționare pentru diabetici: fiecare pastilă Septolete conține 0,64 g zahăr. Pastilele Septolete D conțin 0,4 g maltitol și 0,6 g maltitol sirop. Insulina este necesară pt. metabolizarea maltitolului, dar datorită hidrolizei și absorbției lente din tractul gastro-intestinal, creșterea glicemiei la pacienții diabetici este mică după adm. maltitolului. Valoarea energetică de 2,4 Kcal/g a maltitolului este mai mică decât cea a zahărului. Sarcină și alăptare.
RA: Tulburări gastrointestinale (greață și vărsături). Dozele mari de maltitol pot provoca diaree.

SERETIDE DISKUS 50/100; 50/250; 50/500 *COD ATC: R03AK06*
GLAXO SMITHKLINE; Pulb. inhal.; Dispozitiv din plastic cu o bandă din folie cu 28 sau 60 blistere, fiecare conține 50 µg de salmeterol xinafoat și 100 µg de fluticasonă propionat. Dispozitiv din plastic cu o bandă din folie cu 28 sau 60 blistere, fiecare conținând 50 µg de salmeterol xinafoat și 250 µg de fluticasonă propionat. Dispozitiv din plastic cu o bandă din folie cu 28 sau 60 blistere, fiecare conținând 50 µg de salmeterol xinafoat și 500 µg de fluticasonă propionat ***(P-RF)***

SERETIDE INHALER CFC FREE® 25/250 µg; 25/125 µg; 25/50 µg *COD ATC: R03AK06*
GLAXO SMITHKLINE; Aerosol susp. inhal. ***(P-RF)***

Ind: Trat. afecțiunilor obstructive reversibile ale căilor respiratorii (ROAD), incluzând astmul la copii și adulți, unde este necesară combinația dintre un bronhodilatator și corticosteroid inhalator.
Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* o inhalație (50 µg salmeterol și 100 µg fluticasonă propionat) de două ori/zi, sau o inhalație (50 µg salmeterol și 250 µg fluticasonă propionat) de două ori/zi, sau o inhalație (50 µg salmeterol și 500 µg fluticasonă propionat) de două ori/zi. *Copii peste 4 ani:* o inhalație (50 µg salmeterol și 100 µg fluticasonă propionat) de două ori/zi. Nu este necesară adaptarea dozei la pacienții în vârstă sau la cei cu afecțiuni renale sau hepatice.

Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenți.
A!: Controlul afecțiunilor obstructive reversibile ale căilor respiratorii trebuie să urmeze un program etapizat, iar răspunsul pacientului trebuie monitorizat clinic prin teste de funcționare pulmonară. Trat. nu trebuie întrerupt brusc. Precauție în TBC pulmonară activă sau latentă, tireotoxicoză. Efectele sistemice pot apărea la doze mari prescrise pentru perioade lungi de timp; aceste efecte apar mai rar decât în cazul utilizării corticosteroizilor adm. oral. Beta-blocantele selective și neselective trebuie evitate în cazul pacienților cu afecțiuni obstructive reversibile ale căilor respiratorii, cu excepția cazurilor în care este absolut necesară introducerea lor. Atenție la adm. concomitentă de inhibitori puternici CYP3A4 (ketoconazol, ritonavir). Sarcină și alăptare.
RA: Salmeterol: tremor, palpitații, cefalee, aritmii cardiace (incluzând fibrilație atrială, tahicardie supraventriculară și extrasistole), artralgii și reacții de hipersensibilitate, incluzând rash, edem, angioedem. Rar s-au observat crampe musculare. Fluticasona propionat: răgușeală și candidoza (afte) gurii și gâtului, reacții de hipersensibilitate cutanată, bronhospasm paradoxal, cu creșterea imediată a wheezing-ului după adm.

SICALGIN *COD ATC: N02BA51*
SICOMED SA; Cpr. cu 400 mg ac. acetilsalicilic și 40 mg cafeină anhidră *(OTC)*

Ind: Cefalee, nevralgii, stări febrile, dureri postoperatorii.
Dz: 1 cpr. la nevoie, de 3-4 ori/zi.
Cind: Intoleranță la salicilați și AINS; ulcer gastro-duodenal, boli hemoragice, risc de hemoragii.
A!: Boala ulceroasă neevolutivă, astm bronșic, renali (în adm. prelungită). Asocierea cu anticoagulante cumarinice (risc crescut de hemoragii), glucocorticoizi (risc de ulcer și hemoragii), metotrexat (crește toxicitatea acestuia), sulfamide antidiabetice (risc de hipoglicemie), probenecid și sulfinpirazonă (efect uricozuric scăzut), spironolactonă (efect diuretic scăzut). Sarcină și alăptare.
RA: Epigastralgii, greață, vărsături; reacții alergice diverse, erupții cutanate, bronhospasm; rar reacții anafilactoide diverse, cu asfixie sau colaps (intoleranță încrucișată pentru toate inhibitoarele sintezei prostaglandinelor); tulburări de ritm și creșteri ale valorilor tensiunii arteriale.

SICOVIT A + D_2 *COD ATC: A11CB*
SICOMED SA; Dj. cu vit. A 3000 u.i. și vit. D_2 600 u.i. *(OTC)*

Ind: Corectarea fenomenelor de carență la copii, în perioadele de creștere, la batrâni, în perioade de convalescență.
Dz: *Adulți:* 1 dj./zi.

SIROFER *COD ATC: B03AE10*
ARMEDICA SA; Sirop cu gluconat feros 4,6 g (fl. × 120 ml) *(OTC)*

Ind: Anemia feriprivă după hemoragii acute sau cronice, profilactic și curativ în caz de necesități crescute de fier, de aport scăzut de fier, precum și în tulburări ale circulației acestuia în organism.

Dz: 1 linguriță a 5 ml = 35 mg Fe^{2+}. Poate fi adm. ca atare sau după diluare cu apă sau cu apă minerală. *Copii până la 5 kg:* 25 mg = 3,5 ml; *Copii 5-10 kg:* 50 mg = 7 ml; *Adulți:* 100 mg = 15 ml.
Cind: Hemocromatoză, anemie sideroacrestică, anemia din intoxicația cu plumb, thalasemie, gastrite severe, ulcerații, varice esofagiene, diaree, colită, ulcer, sindrom de malabsorbție intestinală.
RA: Rar greață, vărsături, colici, diaree sau constipație în special la pacienții cu intoleranță la fructoză.

SIROGAL ✓ *COD ATC: R05CA10*
BIOFARM SA; Sirop cu kaliu sulfogaiacolic 2,30 g, benzoat de sodiu 2,30 g, tinctură de aconit 0,80 g/100 g (fl. × 100 ml + linguriță dozatoare) ***(OTC)***

Ind: Bronșite acute și cronice.
Dz: *Adulți:* 3-4 linguri/zi; *copii (peste 2 ani):* 1-3 lingurițe/zi.
Cind: Diabetici (conține zahăr).

SIROP DE PĂTLAGINĂ X *COD ATC: R05CA10*
BIOFARM SA; Sirop cu extr. fluid de pătlagină 10 g și benzoat de sodiu 2,5 g/100 g (fl. × 100 ml sau 200 ml) ***(OTC)***

Ind: Bronșite acute și cronice cu expectorație vâscoasă.
Dz: *Adulți:* 3-4 linguri/zi. *Copii:* 3-4 lingurițe sirop/zi.
Cind: Diabetici (conține zahăr).

SIROP EXPECTORANT / *COD ATC: R05CA10*
BIOFARM SA; Sirop cu extr. pectoral fluid 20 g și clorură de amoniu 0,50 g/100 g (fl. × 100 ml) ***(OTC)***

Ind: Bronșită acută și cronică cu expectorație vâscoasă.
Dz: *Adulți și copii peste 7 ani:* 3-5 linguri/zi; *copii sub 7 ani:* 1-2 lingurițe de 3-5 ori/zi.
Cind: IH sau IR grave, acidoză, gastrită, ulcer gastroduodenal; diabetici (conține zahăr).

SOLPADEINE *COD ATC: N02BE51*
STERLING; Cpr. eferv. paracetamol 500 mg, codeină fosfat 8,0 mg, cofeină 30,0 mg ***(OTC)***

GLAXO SMITHKLINE; Cpr. paracetamol 500 mg, codeină fosfat 8,0 mg, cofeină 30,0 mg ***(OTC)***

Ind: Dureri reumatice, sciatică, lumbago, migrene, luxații, dureri menstruale, dureri dentare, nevralgii, sinuzite, dureri de gat, trat. simptomatic al răcelii și gripei.
Dz: *Adulți inclusiv vârstnici:* 2 cpr. de 3-4 ori pe zi. Nu se repetă doza la intervale mai mici de 4 ore. Nu se adm. mai mult de 4 doze pe zi.

Cind: Nu se adm. la copii sub 12 ani. Hipersensibilitate la paracetamol, codeină sau cofeină. Astm bronşic acut, depresie respiratorie, traumatism cranian, hipertensiune intracraniană, post-chirurgia tractului biliar. Exces de cafea sau ceai. Sarcină.
A!: Leziuni severe renale sau hepatice (hepatopatie alcoolică non-cirotică). Şoferi şi activităţi de precizie.
RA: Hipersensibilitate, reacţii cutanate date de paracetamol. Reacţii date de codeină: greaţă, vărsături, agitaţie, ameţeli, constipaţie. Reacţii date de cofeină: greaţă, insomnie, agitaţie.

SOLPADEINE SOLUBLE

COD ATC: N02BE51

GLAXO SMITHKLINE; Cpr. eferv. paracetamol Ph. Eur. 500 mg, codeină fosfat hemihidrat Ph. Eur. 8,0 mg, cofeină Ph. Eur. 30,0 mg ***(OTC)***

Ind: Dureri reumatice, sciatică, lumbago, migrene, luxaţii, dureri menstruale, dureri dentare, nevralgii, sinuzite, dureri de gât, trat. simptomatic al răcelii şi gripei.
Dz: *Adulţi inclusiv vârstnici:* 2 cpr. dizolvate în apă, de 3-4 ori pe zi. Nu se repetă doza la intervale mai mici de 4 ore. Nu se adm. mai mult de 4 doze pe zi.
Cind: Nu se adm. la copii sub 12 ani. Hipersensibilitate la paracetamol, codeină sau cofeină, astm bronşic acut, depresie respiratorie, traumatism cranian, hipertensiune intracraniană, post-chirurgia tractului biliar. Exces de cafea sau ceai. Sarcină.
A!: Leziuni severe renale sau hepatice (hepatopatie alcoolică non-cirotică). Şoferi şi activităţi de precizie.
RA: Hipersensibilitate, reacţii cutanate date de paracetamol. Reacţii date de codeină: greaţă, vărsături, agitaţie, ameţelii, constipaţie. Reacţii date de cofeină: greaţă, insomnie, agitaţie.

SOLTRAN

COD ATC: V07AB

BAXTER HEALT CARE; Sol. 1000 ml conţin: citrat de potasiu 8,6 g, citrat de sodiu 8,2 g, manitol 33,8 g, sulfat de magneziu 10 g; pH = 7,1 (pungă × 1000 ml) ***(S)***

Ind: Sol. pentru păstrarea organelor pregătite pentru transplant.

SOLUŢIE AURICULARĂ CU CLORAMFENICOL ŞI FLUOCINOLON

COD ATC: S02CA05

BIOFARM SA; Sol. auriculară cu cloramfenicol 0,5 g şi fluocinolon acetonid 0,05 g la 100 g (fl. × 10 ml) ***(P-RF)***

Ind: Infecţii bacteriene ale urechii externe.
Dz: *Adulţi:* 6-8 picături, instilate în conductul auditiv extern, de 2-3 ori/zi. *Copii:* 2-4 picături pe zi, instilate în conductul auditiv extern.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenţii produsului.
A!: Nu se recomandă administrarea produsului la pacienţii cu perforaţii ale timpanului. Sarcină şi alăptare, prudenţă.
RA: Rar, poate apărea iritare locală.

SOLUȚIE HARTMAN *COD ATC: B05BB01*
HEMOFARM; Sol. perf. 1000 ml conțin: clorură de sodiu 5,89 g, clorură de calciu 0,2 g, clorură de potasiu 0,3 g, lactat de sodiu 6,48 g, apă distilată q.s. (fl. × 500 ml) ***(S)***

Ind: Mărirea volumului de lichid extracelular în cazurile de hemoragii, șoc, traumatism. Pre- și postoperator pentru menținerea volumului de lichid în organism. În pierderea electroliților și a apei, în cazuri de vomă, diaree, arsuri, peritonită, infecții grave. Menținerea echilibrului acido-bazic.
Dz: 2000-3000 ml/24 ore. Viteza medie de perfuzare 60 pic./min, adică 2,5 ml/h/kg.
Cind: Leziuni hepatice grave, IR acută, edem pulmonar, alcaloză, deshidratare hipertonică.

SOLUȚIE PERFUZABILĂ RINGER *COD ATC: B05BB01*
HELVETICA PROFARM SA; Sol. perf. clorură de sodiu 8,6 g, clorură de potasiu 0,3 g, clorură de calciu dihidrat 0,33 g și excipienți per 1000 ml (fl. monobloc PLASCO × 500 ml) ***(S)***

B. BRAUN MELSUNGEN; Sol. perf. clorură de sodiu 8,6 g, clorură de potasiu 0,3 g, clorură de calciu dihidrat 0,33 g și excipienți per 1000 ml (fl. × 250 ml sau 500 ml) ***(S)***

SOLUȚIE RINGER *COD ATC: B05BB01*
HEMOFARM; Sol. perf. 500 ml ***(S)***

SICOMED SA; Sol. perf. clorură de sodiu 8,6 g, clorură de calciu 0,5 g, clorură de potasiu 0,3 g, apă dist. ad. 1000 ml (pungi × 250 ml) ***(S)***

VIOSER SA; 1000 ml sol. perf. conțin: clorură de sodiu 8,6 g, clorură de potasiu 0,3 g, clorură de calciu dihidrat 0,33 g; Osmolaritate: 309 mOsm/l. pH: 5-7 (fl. × 1000 ml) ***(S)***

SOLUȚIE RINGER FRESENIUS *COD ATC: B05BB01*
FRESENIUS KABI GmbH; Sol. perf. (fl. de sticlă sau polietilenă × 500 ml sau 1000 ml) ***(S)***

Ind: Trat. de substituție electrolitică în dezechilibre acido-bazice, în acidoză metabolică ușoară, în deshidratări izotone sau hipotone în șoc, colaps, arsuri, degerături, vărsături repetate, diaree (trat. pe termen scurt), precum și ca vehicul și solvent pentru medicamente compatibile cu electroliți.
Dz: Perfuzie i.v.; doza și viteza de perfuzare se stabilesc în funcție de starea clinică, vârstă, greutate. Viteza max. de perfuzare 3 ml/kg și oră. Doza max. 40 ml/kg și zi (de ex. 2800 ml la un pacient de 70 kg).
Cind: Hiperhidratare, mai ales extracelulară, hipercloremie, hiperkaliemie, hipernatremie, hipercalcemie, IC congestivă, edeme, HTA, eclampsie, IR gravă, IH, acidoză metabolică. Nu se adm. i.m.
A!: Supravegherea echilibrului hidro-electrolitic și acido-bazic. În caz de transfuzii concomitente sângele și soluția Ringer nu se vor adm. în același dispozitiv.
RA: Hipercloremie.

SOLUȚIE RINGER LACTAT *COD ATC: B05BB01*

SICOMED SA; Sol. perf. 1000 ml conțin: clorură de sodiu 6,0 g, clorură de potasiu 0,3 g, clorură de calciu 0,5 g, lactat de calciu 0,5 g și apă distilată q.s. (pungi × 250 ml sau 500 ml) ***(S)***

VIOSER SA; Sol. perf. 100 ml conțin: clorură de sodiu 0,6 g, clorură de potasiu 0,03 g, clorură de calciu 0,02 g, lactat de sodiu 0,62 g și apă distilată q.s. (fl. × 1000 ml) ***(S)***

FRESENIUS KABI GmbH; Sol. perf. 1000 ml conțin: clorură de sodiu 6,0 g, clorură de potasiu 0,4 g, clorură de calciu dihidrat 0,27 g, lactat de sodiu 50% 6,34 g și excipienți (fl. de sticlă sau polietilenă × 500 ml sau 1000 ml) ***(S)***

B. BRAUN MELSUNGEN; Sol. perf. 1000 ml conțin: clorură de sodiu 6,0 g, clorură de potasiu 0,4 g, clorură de calciu dihidrat 0,27 g, lactat de sodiu 3,12 g și excipienți (fl. × 500 ml sau 1000 ml) ***(S)***

HELVETICA PROFARM SA; Sol. perf. 1000 ml conțin: clorură de sodiu 6,0 g, clorură de potasiu 0,4 g, clorură de calciu dihidrat 0,27 g, lactat de sodiu 3,12 g și excipienți (fl. monobloc PLASCO × 500 ml) ***(S)***

Ind: Reechilibrare hidroelectrolitică, în special intra- și postoperator.
Dz: Perf. i.v., în funcție de starea clinică și rezultatele testelor biologice.
Cind: Hiperhidratare extracel., alcaloză metabolică, hiperpotasemie, hipercalcemie, acidoză lactică, IC.
A!: Nu se adm. intramuscular.

SOLUTIO RINGER *COD ATC: B05BB01*

HEMOFARM; Sol. perf. 1000 ml conțin: clorură de sodiu 8,6 g, clorură de calciu 0,335 g, clorură de potasiu 0,3 g, apă distilată q.s. (fl. × 500 ml) ***(S)***

Ind: Trat. de substituție electrolitică în dezechilibre acido-bazice, în acidoză metabolică ușoară, în deshidratări izotone sau hipotone în șoc, colaps, arsuri, degerături, vărsături repetate, diaree (trat. pe termen scurt), precum și ca vehicul și solvent pentru medicamente compatibile cu electroliți.
Dz: Perfuzie i.v.; doza și viteza de perfuzare se stabilește în funcție de starea clinică, vârstă, greutate. Viteza max. de perfuzare 3 ml/kg și oră. Doza max. 40 ml/kg și zi (de ex. 2800 ml la un pacient de 70 kg).
Cind: Hiperhidratare, mai ales extracelulară, hipercloremie, hiperkaliemie, hipernatremie, hipercalcemie, IC congestivă, edeme, HTA, eclampsie, IR gravă, IH, acidoză metabolică Nu se adm. i.m.
A!: Supravegherea echilibrului hidro-electrolitic și acido-bazic. În caz de transfuzii concomitente sângele și soluția Ringer nu se vor adm. în același dispozitiv.
RA: Hipercloremie.

SORBIFER DURULES *COD ATC: B03AA07*

EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Cpr. film cu 320 mg sulfat feros anhidru și 60 mg acid ascorbic ***(P-6L)***

Ind: Profilactic și curativ al deficitelor latente și manifeste de fier (anemii prin carență de fier).
Dz: *Adulți și adolescenți peste vârsta de 12 ani:* 1 cpr. de 2 ori/zi, cu 30 min înainte de masă. Primele 6 luni de sarcină: 1 cpr./zi; în ultimul trimestru ca și în perioada de alăptare: 1 cpr. de 2 ori/zi.
Cind: Hemocromatoză, hemoliză cronică, anemie sideroacrestică, anemia din intoxicația cu plumb, talasemie, boli hepatice grave, alergie sau intoleranță la fier, gastrite severe, ulcerații gastrice, varice esofagiene, diaree, colită ulceroasă, sindrom de malabsorbție intestinală (se recomandă fier injectabil). Copii sub 12 ani.
RA: Foarte rar greață, constipație sau diaree, dureri epigastrice.

SPERSADEX COMP® *COD ATC: S01CA01*
NOVARTIS PHARMA SERVICES; Sol. oft. 1 ml conține: fosfat disodic de dexametazonă 1 mg, cloramfenicol 5 mg (fl. × 5 ml + picurător) ***(P-RF)***

Ind: Cheratite acute și cronice de natură infecțioasă, alergică și non-virală. Inflamații ale uveei anterioare (irite, iridociclite). Sclerite, episclerite și miozite. Oftalmia simpatică. Trat. postoperator al cataractei, glaucomului, strabismului.
Dz: 1 pic. de 3-5 ori pe zi, în sacul conjunctival. În cazurile acute până la 1 pic./oră. Durata max. a trat. 10 zile.
Cind: Hipersensibilitate. Leziuni și procese ulceroase ale corneei, inclusiv cele produse de herpes simplex, alte stări virale sau micotice. Glaucom. Nou-născuți. Cazuri cu antecedente familiale de depresie a funcției medulare osoase. Nu se asociază cu bactericide (penicilină, cefalosporine, gentamicină, tetraciclină, polimixina B, vancomicină, sulfatiazină) sau cu medicamente sistemice care afectează funcția medulară. Sarcină și alăptare.
A!: Copii sub 2 ani.
RA: Ușoară senzație de arsură și gust amar. Rar au fost semnalate cazuri de anemie aplastică, pancitopenie, leucopenie, trombocitopenie, agranulocitoză. Trat. îndelungat poate determina, în special la copii creșterea presiunii intraoculare și rareori suferință corneeană sau cataractă.

SPERSALLERG *COD ATC: S01GA52*
NOVARTIS PHARMA SERVICES; Sol. oft. cu clorh. de antazolină 0,5 mg, clorh. de tetrizolină 0,4 mg, hidroxipropilmetilceluloză, conservant clorură de benzalconiu 0,15 g (fl. × 10 ml + picurător) ***(OTC)***

Ind: Conjunctivite alergice și inflamatorii, în special conjunctivita de primăvară și cea din febra fânului.
Dz: *Adulți.* În faza acută se adm. 1 pic. la fiecare 3 ore, iar apoi pentru întreținere sunt suficiente 2-3 pic./zi. În formele severe, 1 pic./oră. *Copii:* 1-2 pic./zi.
Cind: Hipersensibilitate. Glaucom cu unghi îngust.
A!: Purtători de lentile de contact (li se poate instila Spersallerg doar atunci când aceștia nu le poartă). Sarcină și alăptare.
RA: Ușoară senzație de arsură locală. La copiii mici, cefalee, somnolență, tahicardie. Hipersensibilitate.

STOPTUSSIN *COD ATC: R05FB02*

IVAX PHARMACEUTICALS; Sol. orală butamirat citrat 40 mg, guaiacol glicerineter 1000 mg/10 ml sol.; 1 ml = 30 pic. (fl. × 10 ml) ***(OTC)***

Ind: Antitusiv.
Dz: *Copii 7 kg:* 8 pic. × 3-4 ori pe zi. *Copii 8-12 kg:* 9 pic. × 3-4 ori pe zi; *Copii 13-20 kg:* 14 pic. × 3-4 ori pe zi; *Copii peste 40 kg:* 25-40 pic. × 3 ori pe zi. Se administrează în ceai, apă sau sirop (100 ml lichid la fiecare doză).
Cind: Miastenia gravis.

STREPSILS + VITAMINA C; STREPSILS PLUS;
STREPSILS CLASIC®;
STREPSILS MENTOL ȘI EUCALIPTOL®;
STREPSILS MIERE ȘI LĂMÂIE® *COD ATC: R02AA03*

BOOTS HEALTHCARE; Pastile Strepsils Plus: amilmetacrezol 0,6 mg, alcool 2,4-diclorobenzilic 1,2 mg, lidocaină 10 mg. Strepsils cu mentol și eucaliptol: amilmetacrezol 0,6 mg, alcool 2,4-diclorobenzilic 1,2 mg, excipienți: mentol și eucaliptol. Strepsils Miere și lămâie: amilmetacrezol 0,6 mg, alcool 2,4-diclorobenzilic 1,2 mg, excipienți: miere și lămâie. Strepsils cu vitamina C: amilmetacrezol 0,6 mg, alcool 2,4-diclorobenzilic 1,2 mg, ac. ascorbic 100 mg ***(OTC)***

Ind: Tratamentul infecțiilor bacteriene limitate la mucoasa orofaringiană.
Dz: Cpr. pentru supt. *Adulți și copii peste 5 ani:* 3-6 cpr. pe zi.
Cind: Nu se adm. copiilor sub 5 ani din cauza dimensiunilor cpr.
A!: Trat. mai lungi de 10 zile favorizează dezechilibre ale florei microbiene orale.

STRUCTOLIPID® 20% *COD ATC: B05BA02*

FRESENIUS KABI GmbH; Emulsie perf. 1000 ml conțin trigliceride purificate structurate (pungi × 250 ml sau 500 ml) ***(S)***

Ind: Supliment energetic și de acizi grași esențiali la pacienți adulți, ca parte a regimului de nutriție parenterală.
Dz: *Adulți:* 1-1,5 g trigliceride/kg corp și zi. Viteza de perfuzare max. 0,75 ml/kg și oră.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la proteinele din ou sau soia sau la excipienți. Hiperlipidemie severă. IH severă, sd. hemofagocitic, tulb. severe de coagulare, șoc în fază acută, edem pulmonar acut, hiperhidratare, IC decompensată.
RA: Greață, cefalee, hipertermie.

SULPERAZON 2 g *COD ATC: J01CR50*

PFIZER H.C.P. CORPORATION; Pulb. pt. sol. inj. i.m./i.v.; un flacon conține cefoperazonă 1000 mg sub formă de cefoperazonă sare de sodiu și sulbactam 1000 mg sub formă de sulbactam sare de sodiu. 1000 mg sulbactam sare de sodiu conțin 92 mg sodiu (4 mEq) ***(P-RF)***

Ind: *Monoterapie:* asocierea sulbactam cu cefoperazonă este indicată pentru tratamentul următoarelor infecții, atunci când acestea sunt provocate de microorganisme sensibile: infecții ale aparatului respirator superior și inferior; infecții ale tractului urinar superior și inferior; peritonită, colecistită, colangită și alte infecții abdominale; septicemie; meningită; infecții ale pielii și țesuturilor moi; infecții osteo-articulare; boli inflamatorii pelvine, endometrită, gonoree și alte infecții ale tractului genital. *Tratament asociat:* Datorită spectrului larg de acțiune al asocierii sulbactam cu cefoperazonă, majoritatea infecțiilor pot fi tratate adecvat numai cu această asociere. Totuși, asocierea sulbactam cu cefoperazonă poate fi folosită concomitent cu alte antibiotice, dacă aceste asocieri sunt indicate.
Dz: *Adulți:* 2-4 g pe zi, fracționat la 12 ore. În infecții severe se poate ajunge la 8 g pe zi. Doza maximă pe zi de sulbactam 4 g. Dozele se ajustează în IR. *Copii:* 40-80 mg/kg corp și zi, fracționat în doze egale la 6-12 ore. *Nou-născuți:* doza zilnică de sulbactam max. 80 mg/kg corp.
Cind: Alergie la peniciline, sulbactam, cefoperazonă, alte cefalosporine. Alăptare.
RA: Diaree, greață, vărsături, cefalee, febră, durere la locul injectării, frisoane. Au mai fost raportate: șoc anafilactic, hTA, colită pseudomembranoasă, leucopenie, prurit, sd. Stevens-Johnson, hematurie, vasculită.

SUPER BIO-QUINONA Q 10

PHARMA NORD; Cps. moi cu ubiquinonă 30 mg, ulei de soia ***(OTC)***

Ind: Previne angina pectorală și aritmia; trat. bolilor cardiace congestive (cardiopatii). Compensează sinteza redusă de Q 10 în ficat. Previne și tratează parodontoza, îmbunătățește motilitatea spermatozoizilor.
Dz: 1 cps. pe zi de preferință în timpul mesei.

SUPPORTAN®

FRESENIUS KABI GmbH; Sol. pt. nutriție enterală; 100 ml sol. conțin: Proteine 5,85 g; Glucide 10,4 g (din care: zaharuri 0,5 g; lactoză < 0,1 g); Lipide 7,2 g (din care: acizi grași saturați 2,8 g; acizi grași mononesaturați 3,3 g; acizi grași polinesaturați 1,1 g; EPA + DHA 0,17 g; MCT 2,3 g); Fibre 1,33 g; Apă 80 ml; Minerale și Oligoelemente: Na 160 mg, Cu 130 µg, K 240 mg, Mn 0,27 mg, Cl 160 mg, I 13,3 µg, Ca 67 mg, Fl 0,13 mg, P 63 mg, Cr 6,7 µg, Mg 27 mg, Mo 10 µg, Fe 1,3 mg, Se 6,7 µg, Zn 1,2 mg; Vitamine și alte elemente nutritive: Vit. A 200 µg, Vit. B_6 0,16 mg, β-caroten 130 µg, Vit. B_{12} 0,27 µg, Vit D_3 1 µg, Acid pantotenic 0,47 mg, Vit E 2,7 mg, biotină 5 µg, Vit. K_1 6,67 µg, Acid folic 26,7 µg, Vit. B_1 0,13 mg, Vit. C 8 mg, Vit. B_2 0,17 mg, Colină 26,7 mg, Nicotinamidă 1,6 mg; ct × 12 fl. × 500 ml (S)

Ind: Alimentație enterală pe sondă, cu valoare energetică ridicată, bogată în grăsimi, acizi grași omega-3 din ulei de pește, proteine și fibre, completată cu vitamine antioxidante A, C și E, fără gluten și practic fără lactoză. Dietă specială recomandată pacienților cu cașexie sau boli cronice catabolizante.
Dz: Doza recomandată: > 1,5 litri/zi. Cantitatea administrată se crește lent la începerea alimentației pe sondă.
Cind: Copii cu vârsta sub 1 an.
A!: Se va folosi numai sub supraveghere medicală. Produsul este recomandat pentru nutriție enterală completă sau pentru suplimentarea alimentației. Trebuie monitorizat echilibrul hidric.

SUPPORTAN DRINK

FRESENIUS KABI GmbH; Sol. pt. nutriție enterală; 100 ml sol. conțin: Proteine 5,85 g; Glucide 10,4 g (din care zaharuri: 3,6g; lactoză < 0,1 g); Lipide 7,2 g (din care acizi grași saturați 2,9 g; acizi grași mononesaturați 3,2 g; acizi grași polinesaturați 1,1 g; EPA + DHA 0,17 g; MCT 2,3 g); Fibre, 33 g; Apă 80 ml; Minerale și Oligoelemente*: Na 80 mg, K 172 mg, Cl 124 mg, Ca 50 mg, Mg 22 mg, P 50 mg, Fe 2 mg, Zn 1,5 mg, Cu 300 µg, Mn 0,4 mg, I 30 µg, F 0,2 mg, Cr 10 µg, Mo 15 µg, Se 10 µg; Vitamine și alte elemente nutritive: Vit. A 0,183 µg, β-caroten 300 µg, Vit D_3 2 µg, Vit E 3 mg, Vit. K_1 16,67 µg, Vit. B_1 0,23 mg, Vit. B_2 0,32 mg, Nicotinamidă 3 mg, Vit. B_6 0,33 mg, Vit. B_{12} 0,6 µg, Acid pantotenic 1,2 mg, Biotină 7,5 µg, Acid Folic 50 micrograme, Vit. C 15 mg, Colină 26,7 mg; ct. × 20 fl. × 200 ml; ct. × 30 recipiente tip TetraPack® × 200 ml ***(S)***

Ind: Produs dietetic cu destinație medicală specială. Alimentație enterală cu valoare energetică ridicată, bogată în grăsimi, acizi grași omega-3 din ulei de pește, proteine și fibre, completată cu vitamine antioxidante A, C și E, fără gluten și practic fără lactoză. Dietă specială recomandată pacienților cu cașexie sau boli cronice catabolizante.

Dz: Doza zilnică recomandată pentru nutriție enterală completă este > 2-3 × 200 ml, până la maximum 7-8 flacoane/zi. Cantitatea zilnică se împarte în porții mici.

Cind: Copii cu vârsta sub 1 an.

A!: Se va folosi numai sub supraveghere medicală. Produsul este recomandat pentru nutriție enterală completă sau pentru suplimentarea alimentației. Conținut energetic 1092 kj (260 kcal)/200 ml produs pentru nutriție enterală.

SUPRADYN; SUPRADYN FORTE *COD ATC: A11AA03*

HOFFMANN LA ROCHE; Dj. și cpr. eferv. cu vit. A 5.000 UI, vit. B_1 20 mg, vit. B_2 5 mg, vit. B_6 10 mg, vit. B_{12} 5 µg, vit. C 150 mg, vit. D_2 500 UI, vit. E 10 mg, biotină 0,25 mg, D-pantotenat de calciu 11,6 mg, dexpantenol 10 mg, ac. folic 1 mg, nicotinamidă 50 mg, calciu (fosfat, pantotenat) 51,3 mg, magneziu (fosfat, stearat, oxid) 21,2 mg, fier (carbonat, sulfat, elementar) 10 mg, mangan (sulfat) 0,5 mg, fosfor (fosfat) 23,8 mg, cupru (sulfat) 1 mg, zinc (sulfat) 0,5 mg, molibden (molibdat) 0,1 mg ***(OTC)***

Ind: Aport insuficient de vitamine, datorat dificultăților de alimentare la vârstnici, curelor de slăbire, formelor speciale de regim alimentar, lipsei poftei de mâncare, alcoolismului cronic. Necesități crescute datorate unor afecțiuni acute sau cronice, convalescenței, după intervenții chirurgicale, ca și în timpul, sau după trat. cu antibiotice sau chimioterapice.

Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* 1 cpr. eferv., 1 dj./zi. *Copii:* 1/2-1 cpr. eferv. sau dj./zi.

Cind: Alergie la una sau mai multe dintre componente; hipervitaminoza A sau D preexistentă; hipercalcemie, IR; în timpul trat. cu retinoizi.

SURVIMED OPD

FRESENIUS KABI GmbH; Sol. pt. nutriție enterală; 100 ml sol. conțin: Proteine 4,5 g (din care: aminoacizi liberi 15%; oligopeptide 80%); Glucide

15 g (din care: lactoză < 0,05 g; zaharuri 0,3 g); Lipide 2,4 g (din care: acizi grași saturați 1,5 g; acizi grași mononesaturați 0,2 g; acizi grași polinesaturați 0,7 g; MCT 1,3 g; DHA și EPA 0,03 g); Fibre 0 g; Apă 84 ml; Minerale și Oligoelemente: Na 133 mg, K 155 mg, Cl 117 mg, Ca 60 mg, Mg 20 mg, P 47 mg, Fe 1 mg, Zn 0,9 mg, Cu 100 µg, Mn 0,2 mg, I 10 µg, F 0,1 mg, Cr 5 µg, Mo 7,5 µg, Se 5 µg; Vitamine și alte elemente nutritive: Vit. A 53 µg, β-caroten 100 µg, Vit D_3 0,75 µg, Vit. K_1 5 µg, Vit. B_2 0,13 mg, Vit E 1 mg, Vit. B_1 0,1 mg, Nicotinamidă 1,2 mg, Vit. B_6 0,12 mg, Vit. B_{12} 0,2 µg, Acid pantotenic 0,35 mg, Biotină 3,75 µg, Acid folic 20 µg, Vit. C 5 mg, Colină 20 mg; ct. × 12 fl. × 500 ml *(S)*

Ind: Produs dietetic cu destinație medicală specială. Alimentație enterală pe sondă, completă, oligopeptidică, cu greutate moleculară mică, fără reziduuri, ușor absorbabilă, bogată în MCT, fără gluten și practic fără lactoză. Dietă specială recomandată pacienților cu malabsorbție.
Dz: Doza zilnică recomandată pentru nutriție enterală completă este > 2 litri/zi. Cantitatea administrată se crește lent la începerea alimentației pe sondă.
Cind: Copii cu vârsta sub 1 an.
A!: Se va folosi numai sub supraveghere medicală. Produsul este recomandat pentru nutriție enterală completă sau pentru suplimentarea alimentației. Trebuie monitorizat echilibrul hidric. Conținut energetic 2100 kj (500 kcal)/500 ml produs pentru nutriție enterală.

SURVIMED RENAL

FRESENIUS KABI GmbH; Sol. pt. nutriție enterală; Plicuri a 80 g ce conțin: Proteine 5,2 g; Glucide 69,0 g (din care: lactoză < 0,2 g; zaharuri 12,4 g); Lipide 3,8 g (din care: acizi grași saturați 0,9 g; acizi grași nesaturați 0,9 g; acizi grași polinesaturați 2,1 g; MCT 0,19 g; colesterol = 0,1 mg); Fibre 0 g; Minerale și Oligoelemente: Na 52 mg, K 60 mg, Cl 9 mg, Ca 133 mg, Mg 25 mg, P 42 mg, Fe 3 mg, Zn 2,5 mg, Cu 336 µg, Mn 0,5 mg, I 33,3 µg, F 0,04 mg, Cr 4,2 µg, Mo 11,7 µg, Se 8,3 µg; Vitamine și alte elemente nutritive: Vit. A 80,0 µg, Vit D_3 1,68 µg, Vit. K_1 16,64 µg, Vit. B_2 0,43 mg, Vit E 3,36 mg, Vit. B_1 0,37 mg, Nicotinamidă 3,0 mg, Vit. B_6 0,4 mg, Vit. B_{12} 1,0 µg, Acid pantotenic 2,0 mg, Biotină 23,3 µg, Acid folic 67,0 µg, Vit. C 16,64 mg, Mio-inozitol 40,0 mg; ct. × 6 plicuri × 80 g *(S)*

Ind: Produs dietetic cu destinație medicală specială. Alimentație enterală specială, pe sondă și de băut, cu conținut redus de proteine și electroliți, cu valoare energetică ridicată, săracă în sodiu, fără fibre, fără gluten și practic fără lactoză. Dietă specială recomandată pacienților cu insuficiență renală acută sau cronică, aflați în stadiul de predializă.
Dz: Doza recomandată pentru nutriție enterală completă > 6 plicuri/zi. Pentru alimentație de suplimentare > 2-3 plicuri/zi. Se crește lent cantitatea atunci când se începe alimentația pe sondă. În cazul alimentației pe cale bucală, doza zilnică se împarte în porții mici, de-a lungul zilei.
Cind: Copii cu vârsta sub 1 an.
A!: Se va folosi numai sub supraveghere medicală. Produsul este recomandat pentru nutriție enterală completă sau pentru suplimentarea alimentației. Trebuie monitorizat echilibrul hidro-electrolitic.

SYSTANE®
ALCON SRL; Sol. oft. lubrif. ce conține: polietilenglicol 400, propilenglicol, hidroxipropil guar, acid boric, clorură de calciu, clorură de magneziu, clorură de potasiu, clorură de sodiu, clorură de zinc și polyquad® (clorură de polidroniu) 0,001%; fl. × 5 ml, 15 ml

Ind: Soluție calmantă care umectează suprafața ochilor pentru ameliorarea rapidă, de lungă durată, a senzațiilor de uscăciune, iritație, arsură, înțepătură, a senzației de nisip în ochi sau de corp străin, cauzate de factori de mediu, cum ar fi praful, fumul, ozonul, razele UV, căldura uscată (radiator/saună), aerul condiționat, vântul, curenții de aer, cosmeticele sau frecvența scăzută a clipitului ce intervine din cauza vizionării prelungite la televizor sau expunerii la monitorul computerului.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componenții produsului.

T

TACHOCOMB *COD ATC: B02BC01*
NYCOMED; Burete de colagen învelit în fibrinogen uman, trombină, aprotinină (pansament × 9,5 × 4,8 × 0,5 sau 2,5 × 3,0 × 0,5) ***(S)***

Ind: Hemostatic local pe plăgi sângerânde, hemoragii gastroduodenale, amigdalectomii, epistaxis.

TARDYFERON *COD ATC: B03AD03*
PIERRE FABRE MEDICAMENT; Dj. ret. Sulfat feros 80 mg, mucoprotează 80 mg, acid ascorbic 30 mg ***(P-6L)***

TARDYFERON FOL *COD ATC: B03AD03*
ROBAPHARM (subsidiar al PIERRE FABRE GROUP); Dj. ret. ***(P-6L)***

Ind: Anemie prin carență gravă la femei însărcinate sau a nou-născutului prematur.

TARKA *COD ATC: C09BB01*
KNOLL AG; Cps. cu granule cu eliberare lentă: trandolapril 2 mg, verapamil 180 mg ***(P-6L)***

Ind: Inhibitor de enzimă de conversie (ACE) și blocant al canalelor de calciu.
Dz: 1 cps./zi dimineața, la/sau după micul dejun.

TAROSIN *COD ATC: C05CA01*
SICOMED SA; Cpr. cu rutozidă 20 mg; acid ascorbic 50 mg ***(OTC)***

Ind: Afecțiuni însoțite de fragilitate capilară sau de o permeabilitate anormală a pereților acestora: purpură vasculară endogenă sau toxică (intoxicație cu

săruri de aur, barbiturice, salicilați), hemoragii retiniene, digestive, renale etc. Stări alergice, hemoptizii, boli infecțioase cu afectare capilară (scarlatină, tifos exantematic etc.), varice, hemoroizi.
Dz: *Adulți:* 5-10 cpr./zi, în 5 prize. *Sugari:* 1-2 cpr./zi. *Copii 3-7 ani:* 2-4 cpr./zi. *Copii 7-15 ani:* 3-5 cpr./zi.

TAZOCIN *COD ATC: J01CR05*
WYETH LEDERLE PHARMA; Pulb. liof. pt. sol. inj. i.v. 1 fl. de 2,25 g conține 2,085 g piperacilină sodică și 0,2683 g tazobactam sodic; 4,69 mEq (108,0 mg) de sodiu/fl.; 1 fl de 4,5 g conține 4,17 g piperacilină sodică și 0,5366 g tazobactam sodic; 9,39 mEq (216,0 mg) de sodiu/fl. ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. infecțiilor bacteriene locale sau sistemice cu microorganisme sensibile. Infecții ale tractului respirator inferior, infecții ale tractului urinar (complicate și necomplicate), infecții intraabdominale, infecții ale pielii, septicemii bacteriene, infecții ginecologice, infecții bacteriene la pacienți neutropenici, infecții osteo-articulare, infecții polimicrobiene cu bacterii aerobe și anaerobe. Culturile și testele de sensibilitate trebuie făcute înainte de trat. pentru a identifica bacteriile care determină infecția și pentru a determina sensibilitatea acestora la piperacilină/tazobactam.
Dz: Se adm. inj. i.v. lent sau în perfuzie (timp de 20-30 de min). *Adulți și copii peste 12 ani* cu funcție renală normală: 4,5 g Tazocin la 8 ore. Doza totală zilnică depinde de localizarea și severitatea infecției și poate varia de la 2,25 g până la 4,5 g Tazocin la 6, 8 sau 12 ore. La pacienții cu IR, doza adm. i.v. trebuie ajustată în funcție de gradul actual de afectare a funcției renale (clearance la creatinină). Durata trat.: în infecțiile acute - minim 5 zile și încă 48 de ore după rezoluția simptomelor sau a febrei.
Cind: Hipersensibilitate la peniciline sau/și cefalosporine sau inhibitori de betalactamază. Copii sub 12 ani.
A!: La pacienții cu rezerve scăzute de potasiu trebuie avută în vedere posibilitatea hipokaliemiei și de aceea trebuie făcute determinări electrolitice periodice. În caz de diaree persistentă, severă, trebuie luată în considerare și posibilitatea unei colite pseudomembranoase potențial fatale indusă de antibiotice. De aceea, în aceste cazuri trat. trebuie întrerupt imediat și inițiată o terapie adecvată (de ex. teicoplanin sau vancomicin p.o.). Preparatele care inhibă peristaltismul intestinal sunt contraindicate. Teste de laborator: Determinări periodice ale funcției hematopoetice, evaluarea periodică a funcțiilor sistemice, incluzând funcțiile renală, hepatică și hematopoietică. Ca și în cazul altor peniciline, dacă se adm. intravenos doze mai mari decât cele recomandate, pacienții pot prezenta excitabilitate neuromusculară sau convulsii. Antimicrobienele folosite în doze mari pe perioade scurte de timp pentru trat. gonoreei pot masca sau întârzia apariția simptomelor sifilisului latent. Asocierea cu probenecid determină creșterea T1/2 și scăderea clearance-ului renal pentru piperacilină și tazobactam. Când se adm. împreună cu tobramicină, aria de sub curbă, clearance-ul renal și reabsorbția urinară a tobramicinei scad. Prelungește efectul vecuronium (bloc neuromuscular). Dacă se adm. în același timp doze mari de heparină, anticoagulante orale și alte medicamente care pot afecta sistemul de coagulare sau/și funcția plachetară, parametrii coagulării trebuie determinați mai frecvent și monitorizați regulat. Sarcină și alăptare.
RA: *Cutanate:* prurit, rash; aparat digestiv: diaree, greață și vomă; reacții alergice. *RA locale:* flebită, reacții la locul injecției, durere, inflamație, tromboflebită

și edem. Rar, RA sistemice. *Sistemul nervos vegetativ:* hipotensiune, ileus, sincope. Manifestări generale: dureri de spate, indispoziție, contractură. *Aparat cardiovascular:* tahicardie ventriculară și supraventriculară; bradicardie; aritmii, inclusiv fibrilație atrială, fibrilație ventriculară, stop cardiac, IC, insuficiență circulatorie, IMA. *Hematologic:* scăderea hemoglobinei și hematocritului, trombocitopenie, eozinofilie, leucopenie, neutropenie. *Coagulare:* test Coombs direct pozitiv, prelungirea timpului de protrombină, prelungirea timpului parțial de tromboplastină. *Hepatic:* creșteri temporare ale GOT, GPT, fosfatazei alcaline, bilirubinei. *Renal:* creșterea creatininei și ureei serice, proteinurie, hematurie, piurie.

TEARS NATURALE FREE *COD ATC: S01XA20*
ALCON SRL; Sol. oft. – Duasorb, sistem polimeric solubil în apă ce conține 0,1% dextran 70 și 0,3% hidroxipropilmetilceluloză 2910 și adjuvanți: borat de sodiu, clorură de potasiu, clorură de sodiu, apă purificată, ac. clorhidric și/sau hidroxid de sodiu pentru ajustarea pH-ului (32 f. multidoză × 0,8 ml) ***(OTC)***

Ind: Ameliorarea disconfortului produs de iritații minore ale ochiului sau de expunerea la vânt sau soare. Simptomele ochiului uscat.
Dz: Se instilează 1-2 pic. în ochiul afectat, la nevoie, evitând atingerea capătului picurătorului.

TEARS NATURALE® II *COD ATC: S01XA20*
ALCON SRL; Sol. oft. 1 ml conține dextran 70 1 mg și hidroxipropilmetilceluloză 3 mg, excipienți: polyquaternium-1, tetraborat de sodiu, clorură de potasiu, clorură de sodiu, apă purificată, ac. clorhidric și/sau hidroxid de sodiu pentru ajustarea pH-ului ***(OTC)***

Ind: Ameliorarea disconfortului produs de iritații ale ochiului sau de expunerea la vânt sau soare. Senzație de ochi uscat în keratoconjunctivita sicca și sd. Sjögren.
Dz: Se instilează 1-2 pic. în ochiul afectat, la nevoie, evitând atingerea capătului picurătorului.
Cind: Hipersensibilitate.
A!: Dacă apar dureri sau alte simptome oculare (afectarea vederii) tratamentul se va întrerupe. Sarcină și alăptare.
RA: Rar pot apărea dureri sau alte simptome oculare și afectarea vederii, foarte rar iritație locală sau hipersensibilitate.

TENSAPRIL *COD ATC: C09BA02*
SICOMED SA; Cpr. enalapril 20 mg + hidroclorotiazidă 12,5 mg ***(P-6L)***

TENSAPRIL® H *COD ATC: C09BA02*
SICOMED SA; Cpr. enalapril 20 mg + hidroclorotiazidă 12,5 mg ***(P-6L)***

Ind: Inhibitor al enzimei de conversie + diuretic, în trat. HTA.
Dz: 1 cpr./zi.

Cind: Hipersensibilitate la enalapril, la hidroclorotiazidă, la alte sulfonamide sau la oricare dintre excipienții produsului.
Datorită prezenței enalaprilului: antecedente de angioedem (edem Quincke) determinat de inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (IECA); stenoza de arteră renală bilaterală, stenoză de arteră renală pe rinichi unic funcțional; Sarcină și alăptare. *Datorită prezenței hidroclorotiazidei:* insuficiență renală severă (clearance al creatininei < 30 ml/min sau valori ale creatininei serice de peste 250 μmol/l (3 mg/100 ml); encefalopatie hepatică.

TERGYNAN *COD ATC: G01BDN1*
LAB. BOUCHARA; Cpr. vag. metronidazol 500 mg, neomicină 65 000 u.i., nistatin 100 000 u.i. ***(P-RF)***

Ind: Infecții în sfera vaginală.
Dz: 1-2 cpr. vag./zi, timp de 10 zile, eventual și tratament oral asociat.

TESOPALMED F. CUM YOHIMBIN *COD ATC: G04BE30*
TRIMA; Dj. yohimbină 5 mg, stricnină 1 mg, glicerofosfat de calciu 100 mg, fosfat bibazic de calciu 60 mg ***(P-RF)***

Ind: Impotență de etiologie psihică, insuficiență sexuală.
Dz: În general 1 dj. × 3 ori pe zi.
Cind: IH, IR, HTA, cardiopatie ischemică, convulsii în antecedente.

THEINOL *COD ATC: N02BE51*
LAB. A. BAILLY-SPEAB; Sol. orală 100 ml conține paracetamol 2,7 g și cafeină monohidrat 0,2666 g (fl. × 125 ml) ***(OTC)***

Ind: Trat. simptomatic al durerilor de intensitate ușoară sau moderată și al stărilor febrile.
Dz: Doza uzuală este de o lingură Theinol (aproximativ 15 ml soluție orală), adm. oral, la nevoie; dacă este necesar, doza se poate repeta la intervale de minimum 4 ore, fără a depăși 7 linguri Theinol/zi. Doza maximă recomandată este de 3 g paracetamol și 300 mg cafeină.
Cind: Hipersensibilitate la paracetamol, cafeină sau la oricare dintre componentele produsului; insuficiență hepatocelulară; IR gravă; deficit de G-6-PDH.
A!: Datorită prezenței cafeinei, se recomandă evitarea adm. medicamentului seara. În caz de diabet zaharat sau regim hipoglucidic trebuie avut în vedere conținutul în zahăr. Pacienții trebuie atenționați privind conținutul în alcool etilic. Sportivii trebuie avertizați că acest medicament conține un principiu activ (cafeina) care poate induce pozitivarea testelor antidoping. Sarcina și alăptarea. Șoferi și activități de precizie.
RA!: Reacții alergice, manifestate prin rash cutanat cu eritem sau urticarie. Trat. prelungit cu doze mari poate determina nefrită interstițială și necroză papilară, trombocitopenie. La doze mari pot să apară insomnie, neliniște, palpitații și disconfort epigastric.

THERMO - RHEUMON *COD ATC: M02AA06*

BAYER AG; Cremă etofenamat 10%, benzilnicotinat 1% (tub × 100 g) ***(OTC)***

Ind: Contracturi musculare.
Dz: Aplicații locale 1-2 ori/zi.

THYREOTOM *COD ATC: H03AA03*

BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP; Cpr. cu 40 μg levotiroxină și 10 μg liotironină ***(P-6L)***

Ind: Suplimentarea aportului de hormoni tiroidieni la pacienți cu hipotiroidie de orice etiologie, după tiroidectomie; terapia gușei benigne cu o stare funcțională eutiroidiană, terapie supresivă și substitutivă în cazul unui nodul tiroidian malign.
Dz: *Adulți cu hipotiroidism:* inițial 1 cpr./zi; se crește doza la interval de 2-4 săpt. cu câte 1/2 cpr. până la o doză de întreținere de 2-5 cpr./zi. *Copii:* 2-2 1/2 cpr. pe zi. Gușă benignă: inițial 1-2 cpr., iar în trat. de lungă durată 3-6 cpr./zi. Profilaxia recidivei: 2-3 cpr./zi. După strumectomia datorată unei tumori maligne: inițial 3 cpr./zi; în trat. de lungă durată 6 cpr./zi. Întreaga doză zilnică se va înghiți cu mult lichid, dimineața pe nemâncate, cu aprox. 30 min înainte de micul dejun.
Cind: Hipertiroidism, afecțiuni cardiace severe, tulburări funcționale ale corticosuprarenalei, hipersensibilitate la unul din componenți, tulburări ale tiroidei care pot conduce la hipertiroidism.
A!: Sarcină și alăptare.
RA: În cazul unei supradozări pot apărea simptome de hipertiroidism cu palpitații, tremurături ale degetelor, senzație de oboseală, transpirație excesivă, pierdere în greutate, în special dacă doza este crescută prea repede la începutul trat.

TOBRADEX *COD ATC: S01CA01*

ALCON SRL; Susp. oft. 1 ml conține: tobramicină 0,3% (3 mg) și dexametazonă 0,1% (1 mg) (fl. × 3 ml sau 5 ml); ung. oft.: 1 g conține: tobramicină 0,3% (3 mg) și dexametazonă 0,1% (1 mg) (tub × 3,5 g) ***(P-RF)***

Ind: Inflamații oculare care răspund la trat. cu corticosteroizi, asociate cu infecțiile oculare bacteriene superficiale. Inflamațiile conjunctivei palpebrale și ale conjunctivei bulbare, ale corneei și ale segmentului anterior al globului ocular. Uveite cronice anterioare și în leziunile corneei prin produși chimici, radiații, arsuri termice sau corpi străini.
Dz: *Susp:* Se instilează 1-2 pic. în sacul conjunctival, la 4-6 ore. Pe parcursul primelor 24-48 ore de trat., doza va crește la 1-2 pic. la 2 ore. *Ung.:* Se aplică o cantitate mică de unguent în sacul conjunctival de 3-4 ori/zi.
Cind: Keratita epitelială produsă de Herpes simplex (keratita dendritică), vaccina, varicela, afecțiuni ale corneei și conjunctivei. Infecțiile mycobacteriene ale ochiului. Afecțiuni fungice ale structurilor oculare. Hipersensibilitate față de oricare component. După înlăturarea fără complicații a unui corp străin cornean. Copii.

AI: Generale: după adm. îndelungată a steroizilor există posibilitatea apariției unor infecții fungice persistente ale corneei. Se impune monitorizarea de rutină a presiunii intraoculare. Sarcină și alăptare.
RA: Toxicitate oculară localizată, și hipersensibilitate, cu prurit și edem palpebral, eritem conjunctival. RA datorate componentei steroidice sunt: creșterea presiunii intraoculare cu posibila dezvoltare a unui glaucom și, uneori, afectarea nervului optic; cataractă posterioară subcapsulară; întârzierea vindecării leziunilor. Utilizarea de lungă durată poate deprima răspunsul imun al gazdei, crescând astfel riscul infecțiilor oculare secundare. În acele afecțiuni care produc subțierea corneei și a sclerei, pot apărea perforații după folosirea topică a steroizilor. În afecțiunile acute purulente ale ochiului, steroizii pot masca infecția sau o pot exacerba.

TONOTIL - N *COD ATC: A13AN01*
VIANEX SA; Pulb. (în capac): L-fosfotreonină 20 mg, L-glutamină 75 mg, hidroxicobalamină 500 µg + sol. (în fiolă): L-fosfoserină 60 mg, L-arginină clorhidrat 150 mg, sorbitol 4,5 g (f. × 10 ml) ***(OTC)***

Ind: Tonifică organismul, stimulează apetitul, înlătură oboseala fizică și psihică, combate surmenajul, elimină stresul, ajută la recuperarea după intervenții chirurgicale și în convalescență. *Pediatrie:* retardare psihosomatică, convalescență, anorexie, ameliorarea capacității de adaptare, oboseală după un efort intelectual prelungit. *Geriatrie:* depresiune senilă sau demență senilă, dereglări psihosomatice ale vârstei a III-a, pierderea memoriei, scăderea performanțelor intelectuale, dereglări metabolice, adjuvant în trat. cu medicamente angiovasculare. *Medicina sportivă:* recuperarea psihosomatică a atleților.
Dz: *Adulți:* 1-2 fiole dimineața, înainte de dejun. *Copii:* 1 fiolă dimineața, înainte de dejun.

TOPICORTEN - TAR *COD ATC: D07XB01*
TRIMA; Ung. pivalat de flumetazonă 0,02%, coal tar 1,5%, ac. salicilic 1% (tub × 30 g) ***(P-RF)***

Ind: Psoriazis, eczeme cronice lichenificate, neurodermite, prurit cu lichenificare (vulvar, anal, perianal).
Cind: Dermite și eczeme acute și subacute.

TOT'HEMA *COD ATC: B03AE10*
LAB. INNOTHERA; Sol. orală gluconat de fier 50 mg, gluconat de mangan 1,33 mg, gluconat de cupru 0,7 mg și excipienți (f. × 10 ml) ***(OTC)***

Ind: Anemia cu carență de fier. Trat. profilactic al carenței de fier la femeia însărcinată și la prematuri, gemeni, copii nou-născuți de mame cu carențe de fier.
Dz: Sol. se adm. diluată în apă sau alt lichid fară alcool. *Adulți:* 100-200 mg fier/zi (2-4 fiole/zi). *Copii (începând de la o lună):* 5-10 mg fier/kg/zi. *Trat. profilactic: sarcină:* 50 mg fier/zi, din luna a 4-a, de preferință înainte de mese. *Durata trat.:* pentru corectarea anemiei și refacerea stocurilor de fier la adulți:

600 mg pentru barbați și 1200 mg pentru femei (în anemia cu carență de fier 3-6 luni de trat.).
Cind: Supraîncărcare cu fier (normoanemie sau hipersidero-anemie): talasemia, anemia refractară, alte anemii care nu au drept cauză deficiența de fier.
A!: Evitarea consumului excesiv de ceai. Produsul conține 3 g zahăr per doză.
RA: Tul. gastro-intestinale: greață, disconfort, constipație, diaree. Scaune colorate în negru.

TRACHISAN *COD ATC: A01AD11*
ENGELHARD; Sol. ext. 100 ml conțin: clorhexidin gluconat 200 mg (0,2%), lidocaină 100 mg (0,1%), glicerol, etanol, arome, coloranți (fl. × 150 ml) ***(OTC)***

Dz: Gargară cu 10-15 ml sol., max. 3 ori/zi.

TRACHISAN - LOZENGES *COD ATC: R02AA05*
ENGELHARD; Cpr. de supt: tirotricin 0,5 mg, clorhexidin gluconat 1 mg, lidocaină 1 mg ***(OTC)***

Ind: Inflamații și infecții oro-faringiene. Antisepsia și anestezia cavității orale înaintea intervențiilor chirurgicale (tonsilectomie, extracții dentare).
Dz: *Adulți:* până la 8 cpr./zi; *copii:* max. 6 cpr./zi.
RA: În tratamentele ce depășesc 6 săptămâni se produce colorarea în galben-brun a limbii și a dinților, reversibile la întreruperea tratamentului.

TRACUTIL® *COD ATC: B05BA01*
B. BRAUN MELSUNGEN; Conc. pt. sol. perf. 1 f. × 10 ml conține: clorură de fier tetrahidrat II 6,958 mg, clorură de zinc 6,815 mg, clorură de mangan II tetrahidrat 1,979 mg, clorură de cupru II dihidrat 2,064 mg, clorură de crom III hexahidrat 0,053 mg, slenit de sodiu pentahidrat 0,0789 mg, molibdat de sodiu dihidrat 0,0242 mg, iodură de potasiu 0,166 mg, fluorură de sodiu 1,260 mg și excipienți ***(S)***

Ind: Aport de microelemente în timpul alimentației parenterale pe termen lung, la pacienții adulti.
Dz: Tracutil se adm. sub formă diluată. 10 ml la 6-8 ore
Cind: Concentrații plasmatice crescute ale microelementelor conținute în Tracutil. Nou-născuți, sugari și copii.
A!: Boala Wilson, tulb. de depozitare a fierului (hemosideroză, hemocromatoză). Hipertiroidism latent sau manifest. IH, IR.
RA: Rar reacții anafilactice.

TRANSULOSE *COD ATC: A06AD61*
LAB. SCHWARZ PHARMA; Gel oral 1 linguriță conține: lactuloză 1,75 g, ulei de parafină solidificat 3,2 g, excipienți: aspartam, colesterol, ac. lactic, ulei esențial de mandarină, lămâie, portocală (fl. × 150 g) ***(OTC)***

Ind: Laxativ osmotic.
Dz: *Adulți:* 1-3 lingurițe pe zi.

TRAVOCORT® *COD ATC: D07XC04*
SCHERING-PLOUGH EUROPE AG; Cremă 1 g conține 10 mg isoconazol nitrat și 1 mg difluocortolon-21-valerat (tub × 5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 30 g) ***(P-RF)***

Ind: Trat. inițial al dermatomicozelor cu modificări cutanate inflamatorii sau eczematoase.
Dz: Aplicații de 2 ori/zi, cât persistă manifestările inflamatorii, nu mai mult de 2 săpt.
Cind: Procese patologice cutanate specifice (lues, TBC), varicelă, reacții vaccinale, dermatită periorală, rozacee. Hipersensibilitate la alcool cetilstearilic. Sarcină și alăptare.
RA: În cazuri rare, fenomene de iritație sau reacții alergice tegumentare. După aplicații întinse pe suprafețe mari și/sau prelungite sunt posibile: atrofia pielii, teleangiectazie, striuri, apariții acneiforme, dermatită periorală și hipertricoză, precum și modificări sistematice prin reabsorbția corticoidului.

TRI - REGOL *COD ATC: G03AA07*
GEDEON RICHTER Ltd.; Dj.; un drajeu roz conține 0,03 mg etinilestradiol și 0,15 mg levonorgestrel (6 dj.); un drajeu alb conține 0,04 mg etinilestradiol și 0,075 mg levonorgestrel (5 dj.); un drajeu galben-ocru conține 0,03 mg etinilestradiol și 0,125 mg levonorgestrel (10 dj.) ***(P-6L)***

Ind: Contracepție orală, tulburări funcționale menstruale, dismenoree, sd. premenstrual.
Dz: Începând din prima zi a ciclului menstrual, se administrează câte un drajeu, zilnic, timp de 21 de zile (dacă este posibil la aceeași oră a zilei). Urmează o perioadă de pauză de 7 zile, în timpul căreia apare o sângerare asemănătoare cu sângerarea menstruală. Administrarea următoarelor 21 de drajeuri trebuie să înceapă din a 8-a zi, după trecerea celor 7 zile de pauză (adică exact la 4 săptămâni de la administrarea primului drajeu, în aceeași zi a săptămânii). Începutul tratamentului și ordinea corectă a administrării drajeurilor (inițial, cele 6 drajeuri roz, apoi cele 5 albe, apoi cele 10 de culoare ocru) sunt imprimate pe ambalaj, prin cifre și săgeți. *Dacă s-a omis administrarea unui drajeu la timpul potrivit,* acest drajeu trebuie administrat în decursul următoarelor 12 ore.
Cind: Tulburări severe ale funcției hepatice, hiperbilirubinemie congenitală (sd. Gilbert, Dubin-Johnson și Rotor), colelitiază, colecistită, colită cronică, tulburări cardiovasculare și cerebrovasculare severe, boli trombembolice existente sau în antecedentele patologice personale, predispoziție față de boli trombembolice, neoplasm hepatic, neoplasm mamar sau genital, tulburări ale metabolismului lipidic, HTA severă, diabet zaharat sever, siclemie, anemie hemolitică cronică, sângerări vaginale nediagnosticate, migrenă, otoscleroză (accentuată în cursul unei sarcini anterioare), icter de sarcină idiopatic în antecedentele patologice personale, prurit de sarcină sever, herpes gestationis. Sarcină și alăptare.
A!: Trombembolism juvenil, tulburări de coagulare în antecedentele heredocolaterale. Frecvența incidenței afecțiunilor trombembolice, infarctului cerebral și miocardic, precum și a apariției hemoragiei subarahnoidiene poate să crească. Riscul crește odată cu vârsta și, mai ales, la fumătoare. Se poate adm. cu prudență în asociere cu: ampicilină, rifampicină, cloramfenicol, neomi-

cină, penicilină-V, sulfonamide, tetracicline, dihidroergotamină, tranchilizante, fenilbutazonă (efectul contraceptiv poate fi redus; sunt necesare alte metode contraceptive non-hormonale adiționale); anticoagulante cumarinice sau derivați de indandionă (se recomandă determinarea timpului de protrombină și, dacă este necesar, ajustarea dozei de anticoagulant); antidepresive triciclice, maprotilină, beta-blocante; antidiabetice orale, insulină; bromocriptină (reducerea efectului); medicamente hepatotoxice, mai ales dantrolen (crește riscul de hepatotoxicitate, mai ales la femeile cu vârste de peste 35 de ani).
RA: Greață, vărsături, cefalee, tensiune în sâni, modificarea greutății corporale și a libidoului, depresie, cloasmă, sângerări vaginale importante, intoleranță la lentile de contact. Rar, creșterea nivelului seric al TG și glucozei, HTA, TEP, IMA, manifestări cerebrovasculare: embolism cerebral, AVC ischemic, tromboză venoasă mezenterică, a micului bazin, a membrelor inferioare, tromboză venoasă profundă, tromboflebită profundă, hepatită, boli ale colecistului, icter, rash cutanat, alopecie, modificări trofice vaginale, micoză vaginală, oboseală, diaree.

TRIAMCINOLON S *COD ATC: D07XB02*
ANTIBIOTICE IAȘI; Cremă; Ung. cu 3% saprosan și 0,10% triamcinolon acetonid (tub × 15 g) ***(P-RF)***

Ind: Infecții cutanate (impetigo, acnee, furunculoză, sicozis stafilococic), dermatomicoze (epidermofiție interdigitală și palmo-plantară, eritrasmă, sicozis tricofitic), eczeme infectate în stadiul acut sau subacut al bolii.
Dz: Ung. se aplică în strat subțire, de 2-4 ori/zi, timp de 2-7 zile. Pentru consolidarea rezultatelor terapeutice se recomandă aplicarea unguentului de 1-2 ori/zi, câteva zile după vindecarea clinică.
Cind: Tbc al pielii, dermatoze sifilitice, varicela, vaccina.
RA: După trat. prelungite - fenomene de hipocorticism reacțional datorită componentei steroidice: oboseală, adinamie, somnolență sau, dimpotrivă, agitație și insomnie. Eozinofilie sau ușoară anemie. Excreția sodiului crește uneori, concomitent cu scăderea eliminării potasiului. Mult mai rar se observă fenomene de hipercorticism, la bolnavii cu deficit funcțional hepatic sau renal.

TRICOMICON *COD ATC: G01AF20*
SICOMED SA; Cpr. vag. conținând 0,225 g metronidazol, 0,1 g cloramfenicol, 0,075 g (250.000 u.i.) nistatin ***(P-RF)***

Ind: *Curativ:* vaginite microbiene; vaginite tricomoniazice; vaginite micotice generate de Candida, Torulopsis etc.; vaginite mixte (bacterioparazitofungice). Profilactic: la femei tratate cu antibiotice, corticosteroizi, imunosupresoare, citostatice; la gravide cu antecedente micotice, în ultima lună de sarcină; înainte de intervenții endouterine (histero-salpingografie, hidrotubație, biopsie de endometru), înainte și după intervenții chirurgicale în regiunea cervicală, vaginală, vulvară.
Dz: În vaginopatiile acute (tricomoniazice, micotice, microbiene) 2 cpr./zi (dimineața și seara, profund intravaginal), 3-4 zile, apoi câte 1 cpr./zi. În infecții vaginale cronice, 1 cpr./zi. Profilactic: 1 cpr. la 3-7 zile.
Cind: Sarcină în primul trimestru.

TRIDERM *COD ATC: D07CC01*
SCHERING-PLOUGH EUROPE AG; Cremă, Ung. cu 0,64 mg betametazonă dipropionat (corespunzând la 0,5 mg betametazonă), 10 mg clotrimazol și gentamicină sulfat echivalent la 1 mg gentamicină bază per 1 g (tub × 15 g) ***(P-RF)***

Ind: Dermatozele care răspund la trat. corticosteroid topic complicate cu infecție secundară bacteriană și/sau fungică sau când o asemenea infecție este suspectată.
Dz: Un strat subțire trebuie aplicat astfel încât să acopere complet suprafața de piele afectată și regiunile alăturate, de două ori/zi, dimineața și seara.
Cind: Antecedente de sensibilitate la compușii produsului. Nu este indicat pentru uz oftalmic.
A!: Uneori, folosirea prelungită a antibioticelor locale poate duce la dezvoltarea unor microorganisme rezistente la acestea. Dacă apare iritația, sensibilitatea sau se dezvoltă o suprainfecție concomitent trat. cu Triderm, acesta trebuie oprit și trebuie instituită o terapie corespunzătoare. Absorbția sistemică a corticoizilor crește dacă se adm. pe suprafețe mari de corp sau se folosește tehnica ocluzivă. *Utilizarea în pediatrie:* Copiii pot prezenta o mai mare sensibilitate de supresie a axului hipotalamo-hipofizo-corticosuprarenalian (HPA) și de apariție a efectelor corticosteroide exogene decât adulții, din cauza absorbției crescute, datorată unei suprafețe mai mari de piele raportată la greutatea corporală. La copiii care au primit corticosteroizi topici au fost raportate supresia axului HT-HF-SR, sindrom Cushing, retardare liniară a creșterii, întârzierea creșterii în greutate și hipertensiune intracraniană. Manifestările supresiei suprarenale la copii, includ concentrații scăzute ale cortizolului plasmatic și absența răspunsului la stimulare cu ACTH. Manifestările hipertensiunii intracraniene includ bombarea fontanelelor, cefalee, edem papilar bilateral. Sarcină și alăptare.
RA: Rar, hipopigmentarea pielii, arsuri, eritem, exsudat și prurit. La utilizarea topică de corticosteroizi în special la folosirea pansamentelor ocluzive pot apărea: arsuri, prurit, iritație, uscăciune, foliculită, hipertricoză, erupții acneiforme, hipopigmentare, dermatită periorală, dermatită alergică de contact, macerarea pielii, infecții secundare, atrofia pielii, striae și miliaria.

TRIDiN *COD ATC: A12CDN2*
ROTTAPHARM; Cpr. mast. cu 5 mg de floruri și 150 mg de calciu ionic ***(P-6L)***

Ind: Osteoporoză primară.
Dz: 2 cpr. de 3 ori/zi. Remineralizarea fiziologică osoasă necesită o perioadă foarte îndelungată, de aceea se recomandă ca terapia să se facă cel puțin 1 an.
Cind: Perioada de creștere, pacienți cu osteomalacie. IR severă, hipercalcemie, hipercalciurie. Sarcină și alăptare.
A!: Sărurile de calciu pot reduce absorbția fierului și a tetraciclinelor.
RA: Dureri la nivelul articulațiilor, în special la membrele inferioare, dar foarte rar și numai după cure foarte îndelungate; intoleranță digestivă (gastrică sau intestinală).

TRIFERMENT *COD ATC: A09AA02*
BIOFARM SA; Dj. gastrorez. cu tripsină 18 u.W., lipază 6 u.W. și amilază 6,5 g ***(OTC)***

Ind: Pancreatită cronică, fibroză chistică pancreatică (la copii), dispepsii de putrefacție și fermentație, tulburări digestive prin exces alimentar la bolnavii cu insuficiență secretorie a pancreasului (profilactic și curativ), tulburări digestive în cursul trat. cu sulfamide sau antibiotice cu spectru larg.
Dz: Câte 1-4 dj. cu apă, după mesele principale.

TRIOVIT® *COD ATC: A11JBN1*
KRKA d.d.; Cps. beta-caroten 10 mg, tocoferol acetat 40 mg, ac. ascorbic 100 mg, seleniu 50 µg ***(OTC)***

Dz: 1-2 cps. pe zi, după masă. Serii de 2 luni, 2-3 serii pe an.

TRIQUILAR *COD ATC: G03AB03*
SCHERING-PLOUGH EUROPE AG; Dj. brun deschis cu levonorgestrel 0,05 mg, etinilestradiol 0,03 mg; Dj. alb cu levonorgestrel 0,075 mg, etinilestradiol 0,04 mg; Dj. ocru cu levonorgestrel 0,125 mg, etinilestradiol 0,03 mg ***(P-6L)***

Ind: Contraceptiv sistemic.
Dz: Câte 1 dj. pe zi începând din prima zi a ciclului (după calendar).

TRISEQUENS *COD ATC: G03FA01*
NOVO NORDISK A/S; Cpr. film.: cpr. albastre cu 2 mg estradiol, cpr. albe cu 2 mg estradiol și 1 mg norethisteron acetat și cpr. roșii cu 1 mg estradiol (disc calendaristic cu 28 cpr. colorate diferit în funcție de compoziție) ***(P-6L)***

Ind: Sd. de deficiență estrogenică, prevenirea osteoporozei la femeia în postmenopauză expusă riscului de fractură.
Dz: 1 cpr./zi, fără întrerupere pe cale orală; dacă pacienta mai are ciclu menstrual trat. va începe în a 5-a zi de sângerare; pentru celelalte paciente trat. poate începe în oricare zi.
Cind: Hipersensibilitate, neoplasm de sân suspectat, cunoscut, sau în antecedente, neoplazie de natură estrogenică suspectată sau cunoscută (ex. neoplasm de endometru), porfirie.
A!: Trat. cu estrogen necombinat poate crește riscul hiperplaziei de endometru și a neoplasmului de endometru, risc ce poate fi evitat dacă se adm. o doză minimă de progesteron cel puțin în 10 zile ale fiecărui ciclu menstrual. Studiile au arătat că la doze mici de estrogeni adm. în perioade scurte de timp mortalitatea prin cancer de sân nu este crescută, în timp ce o folosire îndelungată a estrogenilor - mai mult de 10 ani - poate determina o crestere minoră a incidenței cancerului de sân. Înaintea inițierii terapiei estrogenice este necesară o anamneză completă: antecedente medicale și familiale, precum și o examinare fizică și ginecologică. Se va exclude dacă este cazul - hiper-

plazia/malignitatea la paciente cu uter intact care au urmat terapie estrogenică necombinată sau cele cu uter intact ce prezintă sângerări pasagere de etiologie necunoscută. Se va efectua monitorizarea periodică a testelor hepatice la pacientele ce suferă de afecțiuni acute sau cronice sau au în antecedente afecțiuni hepatice cu permanentizarea unor modificări biochimice; a pacientelor cu afecțiuni tromboembolice în prezent sau în antecedente; a pacientelor aflate în trat. pentru HTA, epilepsie, migrene, diabet zaharat, astm sau IC. Prin adm. de estrogeni, un uter fibromatos pre-existent poate crește în volum, iar simptomatologia endometriozelor poate fi exacerbată. Dacă apar sângerări neregulate și anormale se va stabili diagnosticul prin aspirație sau chiuretaj biopsic pentru a exclude un posibil uter malign. Estrogenii nu vor fi adm. fără examene fizice și ginecologice periodice. Trat. profilactic pe termen lung al osteoporozei trebuie aplicat doar femeilor cu risc crescut de a dezvolta fracturi. Indicațiile pentru întreruperea imediată a adm. estrogenice sunt: afecțiuni tromboembolice venoase, apariția icterului, debutul unei cefalee de tip migrenos, tulburări de vedere apărute brusc, creșterea semnificativă a TA. Trisequens nu are efect contraceptiv. Asocierea cu barbiturice, rifampicina, carbamazepina, fenitoina poate diminua efectul direct al estrogenului.
RA: Tensiune în sâni și tulburări în regularitatea ciclului menstrual, inclusiv absența acestuia. Au mai fost raportate neoplasm de sân și endometru, tulburări tromboembolice și disfuncții hepatice, dar nu există dovezi clare că incidența acestor afecțiuni este crescută ca urmare a instituirii trat. de substituție hormonală.

TRISILICALM *COD ATC: A02AD01*
SICOMED SA; Cpr. conținând 0,500 g trisilicat de magneziu ***(OTC)***

Ind: Ulcerul gastric și duodenal (în special ulcerul peptic), gastrita hiperacidă.
Dz: Inițial câte 2 cpr. de 3-4 ori/zi, ultima priză seara cât mai târziu, timp de 7-10 zile. Apoi doza zilnică se poate reduce la 3 cpr./zi în 3 prize.
Cind: IR, diaree indiferent de etiologie.
RA: Relativ rar, ușoară tendință la diaree.

TRIZIVIR *COD ATC: J05AF30*
GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. cu 300 mg abacavir, 150 mg lamivudină și 300 mg zidovudină ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. infecției cu virusul imunodeficienței umane (HIV) la adult.
Dz: *Adulți (18 ani și peste):* 1 cpr. de 2 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la abacavir, lamivudină sau zidovudină. IR în stadiu terminal. IH severă. Sarcină și alăptare.
A!: Acidoză lactică cu hepatomegalie gravă și steatoză hepatică. Trat. cu analogi nucleozidici trebuie întrerupt în caz de creștere rapidă a nivelului de aminotransferaze, hepatomegalie progresivă sau acidoză metabolică/lactică de etiologie necunoscută. Pacienți cu hepatită cu virus B. Copii și adolescenți. Pacienți cu IH moderată. Șoferi și activități de precizie.
RA: Reacții de hipersensibilizare, greață, vărsături, diaree, dureri abdominale, ulcerații bucale, cefalee, insomnie, parestezii, limfopenie, valori crescute ale testelor funcționale hepatice, mialgii, mioliză, artralgii, creșterea CPK, dispnee, durere în gât, tuse, simptome pseudogripale, erupții cutanate, creșterea creatininei, IR, febră, letargie, stare de rău, edeme, limfadenopatie, hipotensiune, conjunctivită, anafilaxie.

TURFA *COD ATC: C03EA01*
PHARMACTIV ARZNEIMITTEL; Cpr. triamteren 50 mg, hidroclorotiazida 25 mg ***(P-6L)***

Ind: Diuretic moderat care economisește potasiul în trat. HTA.
Dz: Inițial 1-2 cpr. × 1/zi, după masă.

TUSIMUN *COD ATC: R05CA10*
TIS PHARMACEUTIC + HOFIGAL; Sol. orală extract de pătlagină 30 g, extract de liquiritiae 39 g, tinctură de valeriană 30 g, benzoat de sodiu 1 g (fl. × 90 g) ***(OTC)***

Ind: Expectorant.

TUSINOGAL - A *COD ATC: R05DA04*
LEK PHARMATECH; Sirop cu fosfat de codeină, guaiacol sulfonat de potasiu, benzoat de sodiu, tinctură de coji de portocale, zahăr, apă distilată (fl. × 250 g) ***(OTC)***

Ind: Afecțiuni ale aparatului respirator: traheobronșite în faza terminală, bronșiectazii, abces pulmonar, tuberculoză pulmonară cronică, bronșite cronice cu hipersecreție.
Dz: *Adulți:* 3-4 linguri pe zi. *Copii peste 2 ani:* 1-2 lingurițe pe zi.
Cind: Tulburări grave renale sau circulatorii. Dispepsii gastrointestinale cronice. Achilie gastrică.
A!: Diabetici (conține zahăr).

TUSINOGAL - C *COD ATC: R05CA10*
LEK PHARMATECH; Sirop cu guaiacol sulfonat de potasiu, maleat de prometazină, acid ascorbic, sirop de balsam de Tolu, *p*-hidroxibenzoat de metil, *p*-hidroxibenzoat de *n*-propil, zahăr, apă distilată (fl. × 125 g) ***(P-RF)***

Ind: Traheobronsite acute și cronice. Astm bronșic de natură alergică.
Dz: *Sugari până la 1 an:* ½ linguriță de 3-4 ori pe zi. *Copii de 1-2 ani:* 1 linguriță de 3-4 ori pe zi. *Copii peste 2 ani:* 2 lingurițe de 3-4 ori pe zi.
Cind: Tulburări grave renale sau circulatorii. Dispepsii gastrointestinale cronice.
A!: Diabetici (conține zahăr).

U

UBISTESIN *COD ATC: N01BB58*
ESPE DENTAL MEDIZIN GmbH; Sol. inj. articaină clorhidrat 40 mg, adrenalină 5 µg/ml (5 f.-cartuș × 1,7 ml) ***(S)***

UBISTESIN FORTE *COD ATC: N01BB58*
ESPE DENTAL MEDIZIN GmbH; Sol. inj. articaină clorhidrat 40 mg, adrenalină 10 µg/ml (5 f.-cartuș × 1,7 ml) ***(S)***

Ind: Anestezie locală sau locoregională dentară. Intervenții clasice: extracții simple fără complicații, extracții multiple, extracții de dinți inclusi, trepanații, rezecții apicale, chiste, alveolectomii, prepararea cavităților, biopulpectomii, intervenții în țesuturi infectate, chirurgie maxilo-facială. Intervenții muco-gingivale.

UFT *COD ATC: L01BC53*
BRISTOL-MYERS SQUIBB; Cps. cu 100 mg tegafur și 224 mg uracil ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. cancerului de colon/rect, sân, stomac, cancere ORL, ficat, veziculă biliară, căi biliare, pancreas, vezică urinară și col uterin.
Dz: Doza zilnică standard este echivalentă cu 300-600 mg tegafur/zi (3-6 cps.), oral, în 2-3 doze pe zi. Cancere ORL: 600 mg/zi (6 cps.), oral, în 2-3 prize. Aceste recomandări pentru dozare vor fi de asemenea urmate în cazul în care UFT se adm. în combinație cu alți agenți antineoplazici. Ca și în cazul altor citostatice, dozele UFT pot fi crescute (fără a se depăși 600 mg pe zi) sau scăzută, funcție de toleranța pacientului.
Cind: Antecedente de hipersensibilitate. În asociere cu sau la mai puțin de 4 săpt. după trat. cu un agent antiviral halogenat, ca sorivudina. Sarcină și alăptare.
A!: Pacienți cu: mielodepresie, tulburări hepatice, tulburări renale, boli infecțioase, varicelă, ulcer gastric și/sau duodenal simptomatic, toleranță scăzută la glucoză. Se vor efectua cu regularitate teste funcționale hepatice, hemograma. Utilizarea sa, ca și a altor pirimidine fluorurate ca: tegafur, fluorouracil, floxuridina, doxofluridina și flucitozina, în combinație cu agenți antivirali halogenați, ca sorivudina, inhibă metabolismul pirimidinei fluorurate, crescând concentrația plasmatică. Concentrațiile crescute de pirimidină fluorurată pot avea efect toxic asupra sistemului nervos și mielodepresia cu sfârșit letal. Se asociază cu precauție, cu următoarele medicamente: fenitoina (conc. crescute de fenitoină); alți agenți antineoplazici sau radioterapia (poate accentua mielodepresia). Siguranța adm. la copii nu este determinată. Adm. la pacienții cu potențial fertil presupune evaluarea riscului de efecte toxice asupra reproducerii.
RA: *Digestive:* deshidratare, enterită severă, hemoragică, ischemică sau necrotică, mielosupresie, tulburări hepatice severe (hepatita acută fulminantă), icter, creșteri ale transaminazelor și steatoză hepatică; anorexie, greață/vărsături, diaree, stomatită, dureri epigastrice, ulcer gastric/duodenal, pirozis, meteorism, anosmie și anomalii ale gustului. Stomatita angulară, glosita, eructațiile, setea, constipația, tulburările de deglutiție și hemoragiile gastrointestinale apar rareori. *SNC:* somnolență, tulburări ale stării de conștiență, disestezie, simptome extrapiramidale, incontinență urinară, paralizie în extremități, tulburări de vorbire, de mers, dezorientare, tulburări de memorie, leucoencefalopatie, vertij, cefalee, agitație, tinnitus. *Pulmonare:* pneumonie interstițială. *Cardiovasculare:* angină de efort și de repaus. *Renale:* creșteri ale ureei și creatininei, proteinurie și hematurie. *Dermatologice:* hiperpigmentare, hiperkeratoză, modificări ale unghiilor, erupții veziculare, eroziuni și dermatită, edeme și

alopecie. Rareori apar flush, sindrom tip lupus eritematos discoid și fotosensibilizare. *Pancreas:* pancreatita acută.

ULCEROTRAT *COD ATC: A02AHN1*
SICOMED SA; Cpr. cu nitrat de bismut 350 mg; carbonat bazic de magneziu 300 mg; bicarbonat de sodiu 200 mg, scoarță de crușin 20 mg, rizom de acorus calamus 25 mg ***(OTC)***

Ind: Ulcer gastroduodenal, ulcer peptic, gastrită cronică hiperacidă.
Dz: *Adulți:* 2 cpr. de 3-4 ori/zi, după mesele principale. Trat. poate dura de la 3-6 săptămâni până la 3 luni. *Copii 7-15 ani:* 1/2-1 cpr. de 3 ori/zi.
Cind: Abdomen acut, gastrită hipoacidă, complicațiile ulcerului (hemoragii, perforații), IR severă (risc de efecte toxice produse de magneziu). Copii sub 7 ani!
A!: Prudență în folosirea dozelor mari în caz de obstacol la nivelul intestinului și la copii (risc de efecte toxice ale magneziului și bismutului subnitric). Sarcină și alăptare. Interacțiuni medicamentoase cu tetraciclina (scade absorbția intestinală a acesteia), digoxina etc.

ULEI DE PEȘTE CU VITAMINELE A ȘI D_2 *COD ATC: A11CBN2*
BIOFARM SA; Cps. gelatinoase moi cu ulei de pește 0,3 g, vit. A 330 U.I., vit. D_2 1 000 U.I. ***(OTC)***

ULEI DE PEȘTE CU VITAMINA D
BIOFARM SA; Cps. moi cu 320 mg ulei de pește (minim 22 mg acid eicosapentaenoic și minim 25 mg acid docosahexaenoic), 200 UI (5 µg) Vitamina D_2; ct. × 3 blist. a 10 cps. moi ***(OTC)***

Ind: Supliment de vitamina D în perioada de creștere la copii, sarcină și alăptare, vârstnici, în cazul expunerii insuficiente la soare sau în prezența tulburărilor de absorbție intestinală.
Dz: Sarcină, alăptare: 3 capsule/zi; *Adulți:* 2-3 capsule/zi.

ULTRAPROCT *COD ATC: C05AA08*
SCHERING-PLOUGH EUROPE AG; Ung. 1 g conține: 0,92 mg fluocortolon pivalat, 0,95 mg fluocortolon hexanoat, 5 mg cincocaină (tub × 15 g) ***(P-RF)***

Ind: Hemoroizi, fisuri anale superficiale, inflamații rectale.
Dz: Se va aplica ung. de două ori/zi, iar în prima zi, pentru o mai rapidă calmare a simptomelor, până la 4 ori, după scaun și în urma unei atente toalete locale. Pentru a se evita recidivele, chiar și după dispariția simptomelor, trebuie continuat trat. cel puțin 1 săpt., dar numai 1 dată/zi, max. 4 săpt. Pentru a se evita recidivele, chiar și după dispariția simptomelor, trebuie continuat trat. cel puțin 1 săpt., 1 dată la 2 zile, max. 4 săpt.
Cind: Infecții ale pielii (sifilis, tbc), varicelă și reacții ale vaccinului antivaricelic. Sarcină și alăptare.

A!: În afecțiuni micotice este necesară o terapie antimicotică concomitentă.
RA: Reacții alergice locale. La o folosire îndelungată (peste 4 săpt.), atrofia tegumentului.

ULTRAPROCT *COD ATC: C05AA08*

SCHERING-PLOUGH EUROPE AG; Sup. cu 0,61 mg fluocortolon pivalat, 0,63 mg fluocortolon hexanoat și 1 mg cincocaină; Ung. rect. ***(P-RF)***

Ind: Hemoroizi, fisuri anale superficiale, inflamații rectale.
Dz: 1 sup. intrarectal de 2-3 ori în prima zi, apoi 1 sup./zi, după scaun și în urma unei atente toalete locale. Pentru a se evita recidivele, chiar și după dispariția simptomelor, trebuie continuat trat. cel puțin 1 săpt., 1 dată la 2 zile, max. 4 săpt.
Cind: Infecții ale pielii (sifilis, tbc), varicelă și reacții ale vaccinului antivaricelic. Sarcină și alăptare.
A!: În afecțiuni micotice este necesară o terapie antimicotică concomitentă.
RA: Reacții alergice locale. La o folosire îndelungată (peste 4 săpt.), atrofia tegumentului.

UNGUENT CU SULF 8% *COD ATC: P03AAN1*

ANTIBIOTICE IAȘI; 100 g ung. conțin 10 g sulf și 10 g carbonat de calciu farmaceutic (tub × 40 g) ***(P-RF)***

ARMEDICA SA; Ung. 8%; 100 g conțin sulf precipitat 8 g și carbonat de calciu 10 g (tub × 40 g) ***(P-RF)***

Ind: Infecții bacteriene, parazitare și fungice ale pielii (dermatite, scabie, intertrigo, impetigo, piodermite, candidoză). Stafilocociile regiunilor păroase.
Dz: În scabie se unge tot corpul 3 zile consecutiv, seara, după care se face baie și se schimbă lenjeria. În celelalte afecțiuni se ung zilnic suprafețele afectate, cu un strat subțire.
Cind: Sugari mai mici de 3 luni.
RA: Fenomene de dermatită iritativă.

UNGUENT OFTALMIC CU KANAMICINĂ ȘI HIDROCORTIZON *COD ATC: S01CA03*

ANTIBIOTICE IAȘI; Ung. oft. cu hidrocortizon 1 g și kanamicină sulfat 0,5 g/100 g (tub × 6 g) ***(P-RF)***

Ind: Afecțiuni inflamatorii ale ochiului: keratoconjunctivită flictenulară, conjunctivită alergică, keratită superficială nespecifică, keratită prin acnee rozacee, sclerokeratită, episclerită, keratită traumatică, atunci când sunt complicate de infecții cu germeni sensibili la kanamicină; plăgi și arsuri ale conjunctivei și corneei, unele infecții oculare pre- sau postchirurgicale și posttraumatice.
Dz: Aplicații locale în sacul conjunctival, la început la 1-2 ore, apoi 2-4 ore/zi (max. 2 săpt.).
Cind: Infecții oculare tuberculoase, micotice sau infecții purulente acute, infecții virale ale corneei și conjunctivei - keratită herpetică, vaccină, varicelă; plăgi

și ulcerații corneene; glaucom sau antecedente personale sau familiale de glaucom; alergie sau intoleranță la kanamicină.
RA: Alergie sau intoleranță locală; suprainfecții fungice (după 2-3 săpt. de trat.); aplicarea timp îndelungat a glucocorticoidului poate să provoace creșterea presiunii intraoculare, cataractă subcapsulară posterioară, perforație sclerală; în cazul herpesului sau zonei zoster oftalmice este posibilă perforarea corneei; dozele mari și tratamentul prelungit pot avea efecte cortizonice sistemice.

UPSARIN VITAMINE C *COD ATC: N02BA51*
LAB. UPSA; Cpr. eferv. cu ac. acetilsalicilic 0,330 g, ac. ascorbic 0,200 g ***(OTC)***

Ind: Trat. bolilor însoțite de durere și/sau febră, de exemplu: cefalee, afecțiuni virale acute ale căilor respiratorii, dureri dentare, dureri musculare.
Dz: Durere sau stări febrile: *Adulți:* 3 g/zi, 1-2 cpr. eferv. la 4 ore, max. 9 cpr. eferv./zi. *Vârstnici:* 2 g/zi, 1-2 cpr. eferv. la 4 ore, max. 6 cpr. eferv./zi. *Copii:* 30-50 kg (10-15 ani): 1 cpr. eferv., repetat dacă este necesar după 4 ore, max. 6 cpr. eferv./zi; peste 50 kg (15 ani) - doza de la adult.
Cind: Alergie la ac. acetilsalicilic sau la alte AINS, ulcer gastric sau duodenal, afecțiune hemoragică sau risc hemoragic, litiază renală, dacă sunt adm. doze mari de vit. C (peste 1 g). Nu va fi utilizat în combinație cu metotrexat, anticoagulante orale, heparină, uricozurice, ticlopidină. Sarcină din luna a 6-a și alăptare.
A!: Copii cu greutate mai mică de 30 kg. Gută, antecedente de hemoragie, ulcer gastric sau duodenal, afecțiune renală, astm, metroragie, utilizarea unui DIU, afecțiuni virale (varicela). În cazul dietelor hiposodate, trebuie luat în considerare conținutul în sodiu (485 mg/cpr. eferv.). Sarcină - primele 5 luni.
RA: Rash, urticarie, crize de astm; iritație gastrică, ulcer peptic; manifestări hemoragice (gingivoragii, melenă, rectoragii); tinitus, cefalee.

URALYT-U *COD ATC: G04BC*
HOYER MADAUS; Gran. orale cu hidrogenocitrat de potasiu și sodiu (6:6:3:5) 2,4277 g, apă de hidratare a substanței active 0,0673 g, ulei volatil de lămâie 0,0048 g, colorant Orange Yellow S (E110) 0,0002 g (fl. × 280 g + linguriță dozatoare + calendar de control + hârtie indicator + cârlig) ***(P-6L)***

Ind: Dizolvarea calculilor de acid uric și prevenirea refacerii lor; trat. adjuvant al calculozei urinare cistinice și al cistinuriei; alcalinizarea urinii în cursul tratamentului cu uricozurice și citostatice; tratamentul simptomelor în porfirie cutanată (alcalinizarea urinei în tratamentul porfiriei cutanate tarda).
Dz: Doza trebuie ajustată în funcție de răspunsul individual. pH-ul urinar trebuie determinat înaintea administrării fiecărei doze de medicament. Doza medie zilnică este de 4 măsuri rase Uralyt – U granule orale).
Cind: Hipersensibilitate, IR, HTA, retenție hidrosalină.
A!: Este de preferat ca tratamentul să se facă în mediu spitalicesc.
RA: Foarte rar intoleranță gastrică.

URICOL X *COD ATC: G04BDN2*
PHARCO PHARMACEUTICALS; Gran. susp., fiecare 100 mg conțin: hexamină 10 mg, citrat piperazină 3,8 mg, khelin 36,6 mg (ct. × 6 plicuri × 5 g) ***(OTC)***

Ind: Pentru litiază urinară, antiseptic urinar, antispastic. Infecții cronice ale tractului urinar (pielite, pielonefrite, cistite) și infecții asociate cu vezica neurogenă; profilaxia reinfectării unei urini sterile la pacienții cu urină reziduală însoțind unele tulburări neurologice și cu cateterizare prelungită a vezicii; spasme ale tractului urinar; pentru înlăturarea disconfortului datorat hipermotilității rezultând din inflamații ca în cistite, prostatite, uretrice și uretrocistite; adjuvant în trat. gutei.
Dz: 1-2 plicuri dizolvate în 1/2 pahar cu apă de 3 ori/zi.
Cind: IR, IH.

URINEX X cps. *COD ATC: G04BDN1*
PHARCO PHARMACEUTICALS; Cps gelatinoase cu Pinen (α și β) 31 mg, Campfen 15 mg, Borneol 10 mg, Fencona 4 mg, Anetol 4 mg, Cineol 3 mg ***(OTC)***

Ind: Boli renale și litiază urinară. Tulburări renale și urinare; spasme dureroase și inflamatorii ale tractului urinar asociate cu urolitiază; pentru dizolvarea și eliminarea calculilor de la nivelul tractului urinar.
Dz: 1 cps. de 3-4 ori/zi cu o jumătate de oră înainte de mese.

UROGRAFIN® 76% *COD ATC: V08AA01*
SCHERING-PLOUGH EUROPE AG; Sol. inj. ce conține amidotrizoat de sodiu 100 mg și amidotrizoat de meglumină 660 mg

Ind: Vizualizarea radiologică a venelor și a arterelor și detectarea anomaliilor aparatului urinar, rinichilor, inimii și cavităților din organism.
Dz: Se administrează de către medic, intravascular, utilizând un ac mic, imediat înainte de examinarea cu raze X. Doza recomandată va fi cea indicată de medic și va depinde de starea de sănătate, vârstă, greutate corporală, starea de sănătate a inimii precum și de tipul de raze X folosit. Viteza de injectare, intervalul dintre administrare și expunerea la raze X va depinde, de asemenea, de tipul de raze X folosit. Pentru cele mai multe tipuri de raze X se recomandă o singură doză. Deoarece este posibil să apară reacții adverse severe, pacientul va fi ținut sub observație cel puțin 30 min.
Cind: Nu se administrează pacienților cu insuficiență cardiacă sau cu hiperactivitate a glandei tiroide care nu sunt tratați corespunzător, în timpul sarcinii sau în cazul unei inflamații acute a organelor sexuale interne feminine, inflamații acute pancreatice. Nu se administrează intrarahidian deoarece sunt posibile reacții adverse severe.
A!: Va fi atenționat medicul în caz de: sarcină, alăptare, alergii, astm bronșic, tulburări hepatice sau renale severe; tulburări cardiace sau circulatorii; diabet; tratament cu biguanide, afecțiuni cerebrale asociate cu convulsii; hipertiroidism fără manifestări clinice; tumefacție a gâtului cauzată de mărirea glandei tiroide; cancer al celulelor sanguine (mielom multiplu), supraproducție de proteine anor-

male (paraproteinemie), afecțiuni autoimune sau o afecțiune în care mușchii devin slabi și obosesc rapid – miastenia gravis; hipertensiune arterială cauzată de feocromocitom.
RA: Reacțiile adverse legate de administrarea intravascular: cel mai frecvent sunt greață, vărsături, senzație de durere și o senzație de căldură. Tumefacția ușoară a feței, buzelor, feței, limbii sau a faringelui, conjunctivită, tuse, prurit, rinoree, strănut și urticarie apar frecvent. Aceste reacții, care pot apărea indiferent de cantitatea sau modul de administrare, pot fi primele semne ale unei reacții severe. Reacțiile severe ce necesită un tratament de urgență pot să apară sub forma unei reacții circulatorii însoțite de hipotensiune arterială, tahicardie, dispnee, agitație, confuzie și cianoză periorală ce poate evolua până la pierderea cunoștinței. În cazuri rare, este posibilă alterarea temperaturii corporale și tumefacția glandelor salivare. Greață, vărsături. Complicații neurologice tranzitorii cum ar fi: amețeală, cefalee, agitație sau confuzie, amnezie, tulburări de vorbire, viziuni, zgomote în urechi, convulsii, tremor, slăbiciune musculară conducând la pareze/paralizii, fotofobie, orbire temporară, comă și somnolență, mai puțin frecvente. Iritații locale la locul de injectare. Reacțiile adverse legate de administrarea în cavități: amețeală, leșin. Pancreatită, reacții alergice cutanate.

UVOFED *COD ATC: R01AX30*
BIOFARM SA; Sol. uleioasă nazală cu 100 g efedrină 0,5 g, camfor 0,15 g, ulei de eucalipt 0,65 g, ulei de mentă 0,6 g, ulei de fenicul 0,8 g, ulei de lămâie 0,7 g, clorbutanol 0,2 g (fl. × 10 ml) ***(OTC)***

Ind: Rinite acute și cronice, faringite.
Dz: Instilații în fiecare nară, la *adult* câte 4 pic., la *copii* câte 1-3 pic. (în funcție de vârstă), de 2-4 ori/zi.
Cind: Copii mai mici de 3 ani, glaucom cu unghi închis, alergie la una din componente.
AI: Prudență la hipertensivi, coronarieni și hipertiroidieni. Efedrina conținută figurează pe lista substanțelor dopante (este interzisă la sportivi).
RA: Rareori reacții alergice; adm. timp îndelungat poate provoca uscăciunea mucoasei nazale, rinită iatrogenă, cefalee, insomnie, palpitații; la copiii mici efedrina poate fi cauză de efecte toxice sistemice.

V

V2 PLUS *COD ATC: A05BAN4*
PHARCO PHARMACEUTICALS; Cps. gelatinoase cu extr. de Ginseng 50 mg, vit. A 10000 UI, vit. D$_3$ 400 UI, vit. E 30 mg, vit. B$_1$ 5 mg, vit. B$_2$ 5 mg, vit. B$_6$ 2 mg, vit. B$_{12}$ 3 µg, vit. C 75 mg, ac. folic 0,4 mg, pantotenat de calciu 5 mg, fosfolipide esențiale 10 mg, ulei vegetal 200 mg, nicotinamidă 25 mg, inositol 40 mg, D (+) Biotină 0,015 mg, molibden 0,2 mg, iod 0,15 mg, cupru 1 mg, mangan 1 mg, zinc 1,2 mg, magneziu 6 mg, potasiu 5 mg, fier 10 mg, calciu 88,2 mg, fosfor 68,1 mg ***(OTC)***

Ind: Deficiențe de vitamine și minerale, în malnutriție, anemii, anorexie și cașexie; pacienți cu diete restrictive; vârstnici; boli febrile; oboseală, slăbiciune

și epuizare datorită stresului intens fizic și psihic; convalescență după boală sau intervenții chirurgicale, pentru a întări mecanismele normale de apărare; polinevrite, tulburări hepatice, diabet zaharat și alcoolism.
Dz: 1-2 cps. zilnic.

VAGOSTABYL *COD ATC: N07XX*
LAB. LEURQUIN MEDIOLANUM; Dj. ce conțin extract hidroalcoolic uscat de păducel [extractum Crataegi (HA) siccum] 50 mg, extract hidroalcoolic uscat de melisă [extractum Melissae (HA) siccum] 45 mg, lactat de calciu pentahidrat 50 mg, tiosulfat de magneziu 10 mg; ct. × un tub × 40 dj. ***(OTC)***

Ind: Adulți: tratamentul hiperexcitabilității cardiace, în absența oricărei afecțiuni cardiace. Copii și adulți: tratamentul simptomatic al stărilor de agitație psihică, în special în cazurile de tulburări ușoare ale somnului.
Dz: *Adulți:* hiperexcitabilitate cardiacă: 2 dj. de 1-3 ori pe zi, înainte de masă; tulburări ușoare ale somnului: 2 dj. la masa de seară și 2 drajeuri înainte de culcare. *Copii mai mari de 6 ani:* tulburări ușoare ale somnului: 1 dj. la masa de seară, 1 dj. înainte de culcare.
Cind: Hipersensibilitate (alergie) la oricare dintre componenții produsului; copii cu vârsta sub 6 ani.
A!: În sarcină și alăptare se adm. numai după evaluarea raportului beneficiu matern/risc potențial pentru făt sau sugar. Datorită efectului slab sedativ, poate influența negativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

VENORUTON; VENORUTON GEL *COD ATC: C05CA04*
NOVARTIS CONSUMER HEALTH; Cps. 300 mg troxerutină și gel 2% troxerutină (tub × 40 g) ***(OTC)***

Ind: Medicație simptomatică în boala venoasă - varice, hemoroizi. Adjuvant în afecțiuni însoțite de fragilitate capilară: hemoragii retiniene, ateroscleroză, diabet etc.
Dz: *Int.:* Inițial 300 mg de 2-3 ori/zi. Întreținere 300 mg/zi timp de 2-4 săpt. *Ext.* se aplică de 2 ori/zi, timp de 2-3 săpt.
Cind: Hipersensibilitate la troxerutină.
A!: Trat. trebuie să fie scurt; prudență în sarcină și alăptare.
RA: Greață, cefalee, erupții cutanate.

VENOTON *COD ATC: C05CA54*
EUROPHARM SA; Cps. cu troxerutin 200 mg, ac. ascorbic 100 mg ***(OTC)***

Ind: Dureri și edeme ale membrelor inferioare cauzate de boli cronice ale venelor sau de origine traumatică. Ameliorarea durerilor cauzate de tratamentul varicelor cu injecții sclerozante. Hemoroizi, flebite, tromboflebite superficiale, stări postflebitice, tulburări trofice, dermite varicoase. Entorse, dureri și crampe musculare. Afecțiuni însoțite de fragilitate capilară: hemoragiile retiniene din ateroscleroză, HTA și diabet.
Dz: Oral, doza de atac: 1 cps. de 2-3 ori/zi în timpul meselor. Doza de întreținere este 1 cps./zi, 2-4 săpt.

Cind: Hipersensibilitate la una din componentele produsului.
A!: Dozele excesive pot favoriza formarea de calculi urinari. Bolnavi cu hemocromatoză, talasemie, anemie sideroblastică, bolnavi care primesc frecvent transfuzii de sânge, alcoolici cu deficit de folat. Sarcină și alăptare.

VIPLEX *COD ATC: A11BA*

SICOMED SA; Cpr. eferv. cu vit. B_1 (tiamina) 4,8 mg, vit. B_2 (riboflavina) 1,2 mg, vit. B_6 (piridoxina) 1,6 mg, vit. E (tocoferol acetat) 3 mg, vit. A (palmitat de retinol) 8,4 mg (2100 UI), vit. D_3 (colecalciferol) 6,2 µg, vit. PP (nicotinamida) 3 mg, vit. C (acid ascorbic) 55 mg; Cpr. film. cu vit. B_1 (tiamina) 4,8 mg; vit. B_2 (riboflavina) 1,2 mg; vit. B_6 (piridoxina) 1,6 mg; vit. E (tocoferol acetat) 3 mg; vit. A (retinol acetat) 4,2 mg; vit. D_3 (colecalciferol) 0,0625 mg; vit. PP (nicotinamida) 3 mg; vit. C (acid ascorbic) 55 mg ***(OTC)***

Dz: 1 cpr. eferv./zi sau 1 cpr. film./zi.

VI- SOL CALCIUM *COD ATC: A12AXN1*

NILE CO.; Sirop; 5 ml conțin: vit. A 1200 u.i., vit. D 100 u.i., vit. B_1 1 mg, vit. B_2 1 mg, vit. B_6 0,5 mg, vit. E 1 mg, vit. C 50 mg, niacinamida 5 mg, D-pantenol 2 mg, gluconat de calciu 25 mg, fosfolactat de calciu 25 mg (fl. × 120 ml) ***(OTC)***

Ind: Creșterea necesarului în caz de febră și boală îndelungată. Sd. de malabsorbție în special steatoreea. Stări de anorexie cu dietă restrictivă. În timpul creșterii dinților la copii. Rezistență scăzută la infecții.
Dz: *Sugari 4-6 săptămâni:* 5 ml/zi (o linguriță); *6 săptămâni-1 an:* 10 ml/zi (2 lingurițe); *1-10 ani:* 15 ml/zi (3 lingurițe).

VIBROCIL *COD ATC: R01AB01*

NOVARTIS CONSUMER HEALTH; Gel nazal (tub × 12 g + aplicator), aerosol (fl. pulverizator × 10 ml), sol. nazală (fl. picurător × 15 ml) cu dimetinden maleat 0,25 mg, fenilefrină 2,5 mg ***(OTC)***

Ind: Rinite acute și cronice, rinite alergice sezoniere (febra fânului) și nesezoniere, sinuzite acute și cronice, îngrijire pre- și postoperatorie. Adjuvant în otite medii acute. Gelul se recomandă în special în cazuri de mucoasă nazală uscată, cruste ori sechele ale traumatismelor nazale, precum și pentru a menține nasul curat în timpul nopții.
Dz: *Pic.:* după suflarea nasului, se aplică de 3-4 ori/zi în fiecare nară: *Copii sub 1 an:* o pic., înaintea meselor. *Copii între 1-6 ani:* 1-2 pic. *Copii peste 6 ani și adulți:* 3-4 pic. *Spray nazal: Copii peste 6 ani și adulți:* după suflarea nasului, se aplică 1-2 pulverizări în fiecare nară, de 3 ori/zi. *Gel nazal: Copii peste 6 ani și adulți:* după suflarea nasului, se aplică în fiecare nară, cât mai adânc posibil, de 3-4 ori/zi. O aplicație înainte de culcare păstrează nasul curat pe timpul nopții.
Cind: Hipersensibilitate la unul din constituenți. Rinite atrofice cu sau fără ozenă, la pacienții sub trat. cu IMAO sau care au întrerupt această terapie cu mai puțin de 2 săpt în urmă.

AI: Nu trebuie utilizat pe o perioadă mai mare de 2-3 săpt. Prelungirea duratei de trat. poate induce tahifilaxie, congestie reflexă sau rinită iatrogenă. Se indică evitarea trat. în caz de HTA, alte boli cardiovasculare, hipertiroidism și glaucom. La copii sub 6 ani se preferă folosirea Vibrocil pic. Sarcină și alăptare.
RA: Rar, reacție tranzitorie de uscare a mucoasei nazale, insomnie, amețeli.

VITA-DAY *COD ATC: A11AA*
BIOFARM SA; Cpr. vit. A 40 000 u.i., beta-caroten 10 000 u.i., vit. D_3 200 u.i., vit. C 60 mg, vit. E 10 u.i., vit. B_1 1,1 mg, vit. B_2 1,4 mg, vit. B_6 1 mg, vit. B_{12} 2 µg, nicotinamidă 19 mg, ac. folic 0,2 mg, fier 5 mg, zinc 20 mg ***(P-RF)***

Ind: Previne și corectează tulb. metabolice datorate lipsei de vitamine, pe fondul unor necesități crescute, a unui aport alimentar inadecvat sau a unor tulb. de absorbție. Crește rezistența organismului la infecții.

VITAM
PHARCO PHARMACEUTICALS; Sirop; o linguriță (5 ml) de sirop conține: Vitamina A 1250 UI, Vitamina B_{12} 1,5 micrograme, Vitamina D_3 200 UI, Nicotinamidă 4,5 mg, Vitamina E 5 mg, Pantotenat de Ca 2,5 mg, Vitamina C 20 mg, Acid folic 100 µg, Vitamina B_1 0,35 mg, Biotina 75 µg, Vitamina B_2 0,4 mg, Fier (din sulfatul feros) 5 mg, Vitamina B_6 0,35 mg, Zinc (din sulfatul de zinc) 4 mg; fl. x 120 ml ***(OTC)***

Ind: Prevenirea deficientelor de fier, zinc și vitamine, în deficiențe de creștere și dezvoltare la nou-născuți și copii, ca supliment nutrițional în cazurile de lipsă de apetit și în malnutriție, în boli febrile și convalescență, adjuvant terapeutic în cazurile de anemie la copii și în timpul tratamentului cu antibiotice sau sulfonamide.
Dz: *Nou-născuți:* 1 linguriță de 2 ori pe zi, dimineața și seara. *Copii:* 1 linguriță de 3 ori pe zi, după mese.

VITAMAX *COD ATC: A13AN01*
GLAXO SMITHKLINE; Cps. moi ce conțin: lăptișor de matcă 10 mg, ginseng 40 mg, polen 50 mg, ulei de grâu încolțit 50 mg, fosfatide din soia 90 mg, ulei de floarea-soarelui 30 mg, arginină 20 mg, L-lizină 20 mg, ac. orotic 10 mg, biotină 3 g, dimetilaminoetanol bitartrat 25 mg, vit. A 2000 i.u., colecalciferol 200 i.u., vit. E 10 mg, vit. B_1 15 mg, vit. B_2 3 mg, vit. B_6 2 mg, vit. B_{12} 5 µg, ac. folic 25 µg, pantotenat de calciu 3 mg, nicotinamidă 15 mg, ac. 4-aminobenzoic 50 mg, ac. ascorbic 50 mg, fier 10 mg, calciu 50 mg, fosfor 38,6 mg, potasiu 2 mg, cupru 1 mg, zinc 1 mg, mangan 1 mg, magneziu 1 mg, iod 50 µg, seleniu 50 µg, fluor 1 mg ***(OTC)***

Ind: Trat. oboselii, slăbiciunii, epuizării; ameliorarea eficienței mentale și intelectuale și combaterea tulburărilor de concentrare; ameliorarea rezistenței organismului la infecții; pentru scurtarea perioadei de convalescență după

diverse boli, intervenții chirurgicale, radioterapie; pentru creșterea performanței fizice, în special la atleți; în trat. menopauzei și al impotenței psihogene; pentru întârzierea proceselor degenerative ale îmbătrânirii; ca parte integrantă a trat.: neurasteniei și nevritelor, anemiilor prin deficite nutriționale, afecțiunilor hepatice, artritelor, ulcerului gastro-intestinal, hiperlipidemiei, diabetului, distrofiilor pielii și anexelor cutanate, părului și unghiilor; în timpul sarcinii și al lactației; pentru inducerea stării de confort și stabilitate.
Dz: 1 cps./zi sau la 2 zile, după masă.

VITAMIN B COMPLEX *COD ATC: A11EAN1*
E.I.P.I.C.O.; Sirop 5 ml conțin: vit. B_1 5 mg; vit. B_2 2 mg; nicotinamidă 20 mg; vit. B_6 2 mg; pantenol 3 mg (fl. × 125 ml) ***(OTC)***

Ind: Beriberi, sub-beriberi, pelagră; profilaxia și tratamentul deficitului de vitamine apărut după trat. cu antibiotice sau chimioterapice; necesar crescut de vitamine în perioada de convalescență a unor boli infecțioase (boli tropicale), parazitare, diaree sau în perioade de efort, creștere, sarcină; polinevrite și nevrite de diverse cauze; tulburări cardiovasculare asociate cu deficitul de vitamină B_1; disgravidie.
Dz: *Adulți:* 2-3 linguri sirop/zi. *Copii peste 3 ani:* 1-2 lingurițe sirop/zi. *Copii sub 3 ani:* 1/4-1/2 lingurițe sirop de 2-3 ori/zi.
A!: Colorația galbenă a urinei se datorează Vitaminei B_2.

VITAMINA A + D_2 *COD ATC: A11CBN1*
A11CB
BIOFARM SA; Cps. moi conținând vitamina A palmitat 2500 U.I. și vitamina D_2 550 U.I; ct. × 3 blist. × 10 cps. moi ***(P-6L)***

Ind: Carența de vitamina A și/sau vitamina D poate datorită aportului scăzut (prin alimentație dezechilibrată, diete vegetariene), consumului de alcool, tulburărilor digestive (diareei, sindroame de malabsorbție), în caz de expunere limitată la soare (în cazul vitaminei D), precum și în situațiile în care rinichiul este incapabil să transforme vitamina D în forma ei activă.
Dz: În scop profilactic, se recomandă 1 capsulă pe zi.
RA: Dozele excesive administrate timp îndelungat pot provoca fenomene de hipervitaminoză A și D, manifestate prin greață, diaree, scădere în greutate, poliurie cu nicturie, fragilitate osoasă, calcificări în țesuturile moi (inimă, rinichi, vase de sânge), căderea părului, carotenodermie (colorarea în galben a tegumentelor, cu intensitate mai mare la nivelul palmelor și plantelor).

VITAMINAT
PHARCO PHARMACEUTICALS; Sirop; 15 ml sirop conțin (după adăugarea fiolei cu vitamina B_{12}): vitamina B_1 5 mg, vitamina B_2 5 mg, vitamina B_{12} 6 µg, nicotinamidă 20 mg, pantotenat de calciu 6 mg; fl. × 120 ml sirop și o fiolă cu 50 µg vitamina B_{12}

Ind: Tratamentul deficiențelor de vitamine din complexul B cu manifestări ca: cheilite, stomatite angulare, glosite și dermatite seboreice. Pacienții cu diete

restrictive. Pacienții cu malnutriție, boli hepatice, diabet zaharat. În senilitate, boli febrile și în timpul convalescenței. La gravide și în perioada de alăptare. Ca adjuvant terapeutic în tratamentul anemiei, în timpul tratamentului cu antibiotice și sulfonamide.
Dz: *Copii:* 1 linguriță de 3 ori pe zi. *Adulți:* 1 lingură de 3 ori pe zi sau conform prescripției medicului.

VITREOLENT *COD ATC: S01XAN1*
NOVARTIS PHARMA SERVICES.; Sol. oft. cu iodură de potasiu 3 mg, iodură de sodiu 3 mg, metilhidroxipropilceluloză, conservant acetat de clorhexidină 0,1 mg (fl. × 10 ml) ***(P-6L)***

Ind: Opacifiere și sângerare în corpul vitros, de orice cauză (vârstă, miopie, hipertensiune, diabet, periflebite etc.), opacifiere a cristalinului, ca prim semn de cataractă senilă.
Dz: 1 pic. în sacul conjunctival de 1-3 ori pe zi.
Cind: Hipersensibilitate la iod sau ceilalți componenți. Tulb. funcționale ale tiroidei.
A!: După instilare se presează ușor sacul lacrimal cu indexul, timp de 1-2 minute, pentru reducerea absorbției sistemice.
RA: Efecte locale: ușoară senzație de arsură sau usturime pentru scurt timp după instilare. Ocazional creșterea fluxului lacrimal. Efecte sistemice: hipertiroidism și efecte de tip acneic la persoanele predispuse.

VOLUVEN® *COD ATC: B05AA07*
FRESENIUS KABI GmbH; Sol. perf. 6%; 1000 ml soluție perfuzabilă conțin: Poli(O-2-hidroxietil)amidon 60,00 g (substituție molară 0,38-0,45; masă moleculară medie 130000); Clorură de sodiu 9,00 g (Na^+ 154 mmol/l; Cl^- 154 mmol/l). Osmolaritate teoretică: 308 mOsm/l; pH: 4,0-5,5; aciditate titrabilă: <1,0 mmol NaOH/l (fl. sticlă × 250 ml sau 500 ml); pungi poliolefine (freeflex) + folie protectoare 250 ml sau 500 ml; pungi poliolefine (freeflex) fără folie protectoare 250 ml sau 500 ml; pungi PVC (250 ml sau 500 ml) ***(S)***

Ind: Terapia și profilaxia hipovolemiei.
Dz: Perfuzie intravenoasă continuă. Primii 10-20 ml trebuie perfuzați cu viteză mică, ținând pacientul sub observație atentă (datorită posibilelor reacții anafilactice). Doza zilnică și viteza de perfuzare trebuie adaptate în funcție de volumul de sânge pierdut, de menținerea sau refacerea hemodinamicii și de hemodiluție (efect de diluție). Doza maximă este de 50 ml/kg și zi.
Cind: Supraîncărcare volemică (hiperhidratare), incluzând edemul pulmonar; insuficiență renală cu oligurie sau anurie; pacienții dializați; hemoragii intracraniene; hipernatremie severă sau hipercloremie severă; hipersensibilitate cunoscută la hidroxietilamidon.
A!: În general, trebuie evitată hiperhidratarea prin supradozaj. Riscul hiperhidratării trebuie luat în considerare mai ales la pacienții cu insuficiență cardiacă sau disfuncții renale severe. La acești pacienți se impune individualizarea dozei.

Atenție în cazul bolilor hepatice severe sau tulburări grave de coagulare, de exemplu în cazurile severe de boală von Willebrand.

RA: În cazuri foarte rare, produsele medicamentoase care conțin hidroxietilamidon pot produce reacții anafilactoide (hipersensibilitate, simptome ușoare asemănătoare gripei, bradicardie, tahicardie, bronhospasm, edem pulmonar noncardiogen). În cazul apariției unei reacții de intoleranță în timpul administrării, perfuzia trebuie oprită imediat și se va iniția tratament medical de urgență. Concentrația plasmatică a amilazei poate crește în timpul administrării de hidroxietilamidon și poate interfera cu diagnosticul de pancreatită. Pruritul este o reacție adversă cunoscută la administrarea prelungită a unor doze mari de hidroxietilamidon.
La doze mari, efectul de diluție poate determina diluția corespunzătoare a componentelor sanguine, cum ar fi factorii de coagulare sau alte proteine plasmatice și scăderea hematocritului.
Administrarea hidroxietilamidonului poate produce, în funcție de doză, tulburări de coagulare a sângelui.

W

WARTNER ?
WARTNER MEDICAL PRODUCTS; Flacon cu aerosol conținând: dimetil eter și propan (10 aplicatoare din burete pentru 10 aplicații) ***(OTC)***

Ind: Îndepărtarea negilor și verucilor prin acționare asupra rădăcinii acestora.
Dz: Numai pentru uz extern. Aplicatorul se menține max. 20 secunde asupra zonei de tratat.
Cind: Nu se aplică pe alunițe colorate sau acoperite cu pilozitate sau în cazul altor afecțiuni dermatologice. Nu se folosește pe suprafețele cu piele subțire (față, axilă, bărbie, sâni, fese). Nu se folosește în cazul negilor genitali. Copii sub 4 ani.
A!: Dacă pe un deget sau mână există mai mulți negi, se vor trata separat, pe rând, cu o pauză de 2 săptămâni între tratamente.
RA: Senzație de durere, arsură, depigmentare.

WICK INHALER; WICK VAPORUB *COD ATC: R01AX10*
R05XN01
PROCTER & GAMBLE GmbH; Creion nazal (aplicator nazal); Ung. 100 g conțin: camfor 5,46 g, mentol 2,82 g, ulei de eucalipt 1,35 g, ulei de terpentine 4,71 g (tub × 12 g; 40 g 90 g) ***(OTC)***

Ind: Acțiune decongestivă în infecții respiratorii ale căilor superioare.
Dz: Se aplică un strat gros de unguent pe fața anterioară a toracelui și pe gât de 2-3 ori pe zi.

WOBENZYM® *COD ATC: M09AX*
MUCOS PHARMA GmbH & Co.; Dj. gastrorez. cu pancreatină 100 mg, tripsină 24 mg, chimotripsină 1 mg, bromelină 45 mg, papaină 60 mg, amilază 10 mg, lipază 10 mg, rutozid trihidrat 50 mg ***(SP-RF)***

Ind: Medicație adjuvantă în diferite afecțiuni cu componentă inflamatorie: tromboflebită și sindrom posttrombotic, inflamații ale tractului urogenital, boli reumatice; stări inflamatorii de natură traumatică sau consecutive intervențiilor chirurgicale stomatologice și altor intervenții minore; inflamații provocate de iradiere.
Dz: *Adulți:* 2-3 dj. de 3 ori/zi, cu 1-1½ oră înaintea meselor de dimineață, prânz și seară. Doza maximă este de 10 dj. de 3 ori/zi.
A!: Prudență în caz de deficit de coagulare congenital sau dobândit, IH avansată, afecțiuni renale, intervenții chirurgicale planificate sau tendință la reacții alergice. Sarcină și alăptare.
RA: Senzație de plenitudine, flatulență, ocazional, greață; consistența, culoarea și mirosul scaunelor pot fi modificate. Rar, reacții alergice.

X

XALCOM *COD ATC: S01ED51*
PHARMACIA - Membru al grupului PFIZER; Sol. oft. 1 ml conține latanoprost 50 µg și maleat de timolol 5 mg (fl. × 2,5 ml) ***(P-RF)***

Ind: Scăderea presiunii intraoculare crescute la pacienți cu hipertensiune oculară sau glaucom cu unghi deschis, care prezintă intoleranță sau răspund insuficient la alte medicamente ce scad presiunea intraoculară.
Dz: 1 pic. o dată pe zi, în ochiul afectat, de preferință dimineața.
Cind: Hipersensibilitate la latanoprost, timolol sau la oricare din componentele produsului. Astm bronșic sau antecedente de astm bronșic, bronhopneumopatie cronică obstructivă severă. Bradicardie sinusală, bloc atrio-ventricular de gradul II sau III, insuficiență cardiacă insuficient controlată prin tratament, șoc cardiogen.
A!: Xalcom conține clorură de benzalconiu care se poate depune în lentilele de contact moi, de aceea Xalcom nu trebuie administrat în timpul folosirii acestor lentile. Lentilele trebuie îndepărtate înaintea administrării picăturilor și nu trebuie reaplicate mai devreme de 15 minute. Xalcom poate modifica treptat culoarea ochilor prin creșterea numărului de melanozomi (granule de pigment) în melanocite. Șoferi și activități de precizie.
RA: Hiperpigmentarea irisului, iritație oculară cu senzație de înțepătură, arsură și prurit, hiperemie conjunctivală, keratită, conjunctivită, blefarită, durere oculară, cefalee și erupție cutanată.

XILINĂ CU ADRENALINĂ *COD ATC: N01BB52*
SICOMED SA; Sol. inj.; f. × 2 ml conținând 0,04 g de clorhidrat de lidocaină și 0,00001 g adrenalină ***(S/P-RF)***

Ind: Anestezie de infiltrație, spinală, de conducere în chirurgie generală, buco-maxilo-dentară.
Dz: Infiltrații locale, uzual 1-2 f. Eventual se poate crește doza, nu mai mult de 4 fiole.
Cind: Alergie la lidocaină, IC gravă și tireotoxicoză. Nu se utilizează în anestezia degetelor, a urechilor, a nasului, a penisului sau a scrotului, deoarece poate produce necroze ischemice.

A!: Prudență sau se evită la bolnavii cu HTA, ASC avansată, tulburări grave de conducere intracardiacă, cardiopatie ischemică. Prudență la copii sau bolnavi cu stare generală alterată. Șoferi și activități de precizie.
RA: Lidocaina provoacă relativ frecvent somnolență și amețeli, uneori reacții alergice. Supradozarea poate produce hipotensiune, paloare, sudorație, greață, vomă, fasciculații, convulsii, depresie respiratorie, tulburări de ritm și/sau de conducere. Adrenalina poate cauza anxietate, tremor, palpitații, tahicardie.

XOTIC *COD ATC: A11BA01*
HEXAL AG; Cpr. eferv. cu vit. B_1 1,5 mg, vit. B_2 1,8 mg, vit. B_6 2,1 mg, vit. B_{12} 5 µg, vit. C 100 mg, vit. E 10 mg, pantotenat de calciu 8,7 mg, nicotinamida 20 mg, ac. folic 160 mg, biotină 25 µg ***(OTC)***

Ind: Carențe alimentare, stări de convalescență.

XYLESTESIN A *COD ATC: N01BB02*
ESPE DENTAL MEDIZIN GmbH; Sol. inj. lidocaină 20 mg, adrenalină 12 µg/ml (f. × 1,7 ml) ***(S)***

Ind: Anestezie locală.

XYLOCAINE ADRENALINE *COD ATC: N01BB52*
ASTRAZENECA; Sol. inj. lidocaină + adrenalină (ct. × 100 cartușe × 1,8 ml) ***(S)***

XYLOCAINE ADRENALINE 0,5% *COD ATC: N01BB52*
ASTRAZENECA ; Sol. inj. lidocaină 5 mg + adrenalină 5 µg/ml (fl. × 20 ml) ***(S)***

XYLOCAINE ADRENALINE 1% *COD ATC: N01BB52*
ASTRAZENECA; Sol. inj. lidocaină 10 mg + adrenalină 5 µg/ml (fl. × 20 ml) ***(S)***

XYLOCAINE ADRENALINE 2% *COD ATC: N01BB52*
ASTRAZENECA; Sol. inj. lidocaină 20 mg + adrenalină 5 µg/ml (fl. × 20 ml sau 50 ml) ***(S)***

Ind: Anestezia prin infiltrație în proceduri stomatologice cu durată mai lungă. Anestezia prin bloc regional în stomatologie.
Dz: Inj. se va face lent, cu aspirare atentă înainte și în timpul injectării, pentru a evita injectarea intravasculară accidentală care poate avea efecte toxice. *Adulți:* 1-5 ml (20-100 mg lidocaină clorhidrat). *Copii sub 10 ani:* 1-2 ml (20-40 mg lidocaină clorhidrat).
Cind: Antecedente cunoscute de hipersensibilitate la anestezice locale de tip amidic.
A!: Pacienții vor fi instruiți să evite în timpul anesteziei traumatismele accidentale ale buzelor, limbii, mucoasei cavității bucale și palatine. Ingestia de alimente va fi astfel amânată până când funcția acestor structuri revine la normal. Injectarea intravasculară în regiunea capului și gâtului chiar și a unei

cantități reduse de anestezic local poate determina RA sistemice similare celor care apar după injectarea intravasculară accidentală a unei doze crescute în alte regiuni ale corpului. Prudență la pacienți cu BAV parțial sau complet, cu afecțiuni hepatice grave sau cu disfuncții renale severe; vârstnici și pacienți cu o stare generală precară, cu HTA severă sau netratată, boli cardiace severe, anemii severe sau insuficiență circulatorie. Sarcină și alăptare.
RA: Reacții alergice rare. Reacțiile neurologice după anestezie regională includ anestezia persistentă și tulburări de sensibilitate. Toxicitatea sistemică acută: lidocaina poate cauza efecte toxice acute în cazul în care apar niveluri sistemice crescute în urma unei injectări intravasculare accidentale, absorbții rapide sau a supradozării.

Y

YASMIN *COD ATC: G03AA12*
SCHERING AG; Cpr. film. cu drospirenonă 3 mg, etinilestradiol 0,03 mg; ct. × un blister tip calendar × 21 cpr. film.

Ind: Contraceptiv.
Dz: Blisterul conține 21 comprimate filmate. Pe blister, fiecare comprimat este marcat cu ziua din săptămână în care trebuie administrat. Un comprimat pe zi (la aceeași oră) timp de 21 de zile. 7 zile pauză și apoi se reia administrarea chiar dacă menstruația nu s-a terminat.
Cind: Nu se utilizează în tromboze sau antecedente trombotice, infarct miocardic inclusiv în antecedente, diabet zaharat cu modificări vasculare, icter sau boli hepatice severe, cancer la sân sau al organelor genitale, tumoră benignă sau malignă a ficatului, sângerări vaginale inexplicabile, alergie la componentele produsului. Sarcină. Alăptare.
RA: Reacții adverse severe: tromboză, cancer de sân, cervical, tumori hepatice benigne sau maligne. Alte reacții adverse posibile: tensiune la nivelul sânilor, durere și secreție; dureri de cap; modificări ale libidoului; stare depresivă; intoleranță la lentilele de contact; greață, vărsături și stare generală alterată; modificări ale secreției vaginale; reacții cutanate diverse; retenție hidrică; modificări ale greutății corporale; reacții de hipersensibilitate. Interacțiuni: primidona, fenitoina, barbituricele, rifampicina, ampicilina, tetraciclinele, griseofulvina, ketoconazolul, eritromicina, ciclosporina. Trebuie informat medicul sau farmacistul în cazul utilizării acestor produse.

Z

ZINCOMETIL *COD ATC: S01AX03*
FARMILA FARMACEUTICI; Sol. oft. cu sulfat de zinc 0,02 mg, clorură de benzalconiu 0,01 g, excipienți: clorură de sodiu, citrat de sodiu, ac. citric, monooleat de polioxietilensorbitan, blue patent V, apă distilată per 100 ml (fl. = dop picător × 15 ml) ***(OTC)***

Ind: Soluție dezinfectantă pentru uz oftalmic.
Dz: 1-2 pic. în sacul conjunctival, la ambii ochi, de 2-4 ori pe zi.
Cind: Hipersensibilitate.
AI: A se evita utilizarea lentilelor de contact. Pot fi aplicate la 15 minute după adm.

ZINERYT *COD ATC: D10AF02*
YAMANOUCHI EUROPE B.V.; Sol. cut. eritromicină 40 mg/ml, acetat de zinc 12 mg/ml (fl. pulb. + fl. solvent) ***(P-RF)***

Ind: Tratamentul acneei.
Dz: Aplicații locale, de 2 ori pe zi.
Cind: Alergie la eritromicină.

ZUCKLI *COD ATC: V06AAN1*
BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP; Sol. orală (fl. × 125 ml) și cpr. cu ciclamat de sodiu 40 mg, zaharină sodică 4 mg ***(OTC)***

Ind: Produs dietetic hipocaloric. Înlocuitor al zahărului la diabetici și obezi.

ZYMOGEN; ZYMOGEN FORTE *COD ATC: A09AA02*
NILE CO.; Dj. *Zymogen:* pepsină 50 mg; lipază 25 mg; amilază 30 mg; protează 35 mg; ac. dehidrocolic 50 mg; hemicelulază 50 mg. *Zymogen Forte:* pepsină 100 mg; lipază 800 u; amilază 5000 u; protează 5000 u; ac. dehidrocolic 50 mg; hemicelulază 40 mg; bilă de bou 20 mg; dimetilpolixiloxan 20 mg; vit. B_1 25 mg ***(OTC)***

Ind: Flatulență, dispepsie și insuficiență pancreatică. Distensie abdominală.
Dz: Zymogen: câte 2 cpr. în timpul mesei sau după masă. Zymogen forte: 1 cps. de 3 ori pe zi, în timpul mesei sau după masă.

MONOGRAFII – DIVERSE

MONOGRAFII – DIVERSE

A

ACTOVEGIN 5% cremă;
ACTOVEGIN 5% unguent *COD ATC: D03AXN1*
NYCOMED; Cremă; Unguent; 1 g conține hemoderivat deproteinizat din sânge de vițel (corespunzând unei mase uscate de 2 mg) ***(P-6L)***

Ind: *Cremă:* Ulcer varicos și alte ulcerații cu suprafață infectată. Pentru profilaxia și tratamentul escarelor de decubit. Pentru profilaxia și tratamentul reacțiilor provocate de iradiere. În general, în tratamentul proceselor supurative.
Ung.: Ulcer varicos și alte ulcerații cu suprafață infectată. Pentru profilaxia și tratamentul escarelor de decubit. Pentru profilaxia și tratamentul reacțiilor provocate de iradiere. În general, în tratamentul proceselor nesupurative.
Dz: *Cremă:* În ulcerații: după începerea tratamentului cu gel 20%, se aplică în strat subțire cremă 5%. Pentru prevenirea escarelor de decubit: crema se aplică și se masează pe zonele cutanate cu risc. Pentru prevenirea reacțiilor după iradieri: crema se aplică în strat subțire după radioterapie și în intervalul dintre iradieri.
Ung.: În ulcerații: unguent 5%, se aplică în strat subțire în finalul "tratamentului în trei etape", după gel 20% și cremă 5%. Pentru tratamentul și prevenirea escarelor de decubit: unguentul se masează pe zonele cutanate expuse riscului. Pentru prevenirea reacțiilor după iradieri: unguentul este aplicat în strat subțire după radioterapie și în intervalul dintre iradieri.
Cind: Alergie cunoscută la componentele lui.
RA: Reacții cutanate alergice.

ACTOVEGIN DRAJEE FORTE *COD ATC: A16AXN1*
NYCOMED; Dj. 200 mg hemoderivat deproteinizat din sânge de vițel **(P-6L)**

Ind: În tratamentul afecțiunilor metabolice și circulatorii cerebrale. Continuarea tratamentului injectabil și a perfuziilor din afecțiunile metabolice și circulatorii cerebrale.
Dz: 1-2 drajee se iau cu puțin lichid înainte de masă; de trei ori câte două drajee pe zi. Drajeele pot fi administrate pe o perioadă de 4-6 saptămâni.
Cind: Alergie cunoscută la componentele lui.
RA: Reacții cutanate alergice.

ACTOVEGIN FIOLE *COD ATC: A16AXN1*
NYCOMED; Sol. inj. 80 mg/2 ml; 200 mg/5 ml; 400 mg/10 ml; 1 ml conține hemoderivat deproteinizat din sânge de vițel corespunzând unei mase uscate de 40 mg; ct. × 5 f. ***(P-RF)***

Ind: Tratamentul tulburărilor circulației periferice, arteriopatiilor, ulcerului varicos. Tratamentul tulburărilor circulatorii si metabolice cerebrale, sindromului de defi-

cienţă cerebrală, ischemie şi traumatisme cranio-cerebrale. Tratamentul plăgilor post-arsuri termice şi de iradiere, leziunilor cutanate şi mucoase cauzate de radiaţii, leziuni ale ţesutului nervos şi ale sistemului limfatic, produse prin iradiere.
Dz: Posologia şi modul de administrare se stabilesc în funcţie de tipul şi severitatea tabloului clinic. Tratamentul injectabil se începe cu o doză de 5-10-20 ml/zi, administrat intravenos sau intraarterial, apoi tratamentul se continuă cu 2-5 ml i.v. sau i.m. zilnic, de câteva ori pe săptămână. Injectarea intramusculară se va efectua lent deoarece soluţia este hipertonă.
Cind: Alergie cunoscută la componentele lui.
RA: Reacţii cutanate alergice.

ACTOVEGIN 20% gel *COD ATC: D03AXN1*
NYCOMED; Gel; 1 g conţine hemoderivat deproteinizat din sânge de viţel corespunzând unei mase uscate de 8 mg ***(P-6L)***

Ind: Tratamentul plăgilor sau inflamaţiilor cutanate sau ale mucoaselor, cum ar fi arsurile solare, plăgi/leziuni cutanate minore (incizii), escoriaţii, arsuri. Facilitarea regenerării tisulare după arsuri sau leziuni provocate de contactul cu lichide fierbinţi. Profilaxia şi tratamentul reacţiilor de iradiere sau al altor leziuni cutanate sau mucoase determinate de factori termici sau chimici. Tratamentul iniţial al ulcerelor torpide de diverse etiologii. Tratamentul secundar al plăgilor infectate ale ţesuturilor moi, plăgilor cu lipsă de substanţă formate în urma prelevării de grefe
Dz: Se aplică în strat subţire pe plăgi deschise. Pentru tratamentul iniţial al ulceraţiilor, se aplică în strat gros. Stratul de gel poate fi acoperit cu comprese cu unguent sau cu pansament neadeziv, pentru a evita aderenţa la plagă. Pansamentul se schimbă zilnic, iar pentru plăgile cu supuraţie excesivă, şi de mai multe ori pe zi. Tratamentul se continuă cu cremă 5%, în fază de granulaţie şi cu unguent 5% în fază de epitelizare. Este recomandabil ca tratamentul plăgilor din ţesuturi cu capacitate de refacere diminuată să fie asociat cu fiole sau perfuzii.
Cind: Alergie cunoscută la componentele lui.
RA: Reacţii cutanate alergice.

ACTOVEGIN 20% GEL OCULAR *COD ATC: S01XAN2*
NYCOMED; Gel; 5 g conţin: 40 mg hemoderivat deproteinizat din sânge de viţel (masă uscată) ***(P-6L)***

Ind: În arsuri chimice corneene produse de soluţii acide sau alcaline. Ulcere corneene de etiologii variate. Inflamaţii corneene de etiologii variate (keratită buloasă şi neuroparalitică). Premedicatie şi postmedicaţie în transplantele corneene. Tratamentul profilactic şi al reacţiilor provocate prin radiaţii (raze ultraviolete, raze X şi alte raze cu lungime de undă scurtă). Arsuri termice. Defecte epiteliale corneene datorate lentilelor de contact şi în tratamentul profilactic pe perioada de testare a lentilelor de contact. Tulburări trofice (distrofii şi atrofii) ale ţesuturilor conjunctive, ca de exemplu atrofia ţesutului conjunctiv la vârstnici.
Dz: Câte o picătură în sacul conjunctival al ochiului afectat.
Cind: Alergie cunoscută la componentele lui.
RA: Reacţii cutanate alergice.

ALFLUTOP *COD ATC: M09AXN2*
BIOTEHNOS; Sol. inj. 10 mg/ml antihialuronidază, extrasă și purificată din organisme marine ***(P-RF)***

Ind: Boli reumatice degenerative: coxartroze, gonartroze, spondiloze, artroze interfalangiene. Convalescență (ca fortifiant).
Dz: Inj. i.m. profund 1 ml zilnic, timp de 3 săptămâni. Inj. i.a. în articulațiile afectate, câte 1-2 ml din 3 în 3 zile, 5 adm. Se repetă la 6 luni.
A!: Boli autoimune (PAR, spondilita anchilopoietică, LES, sclerodermie).
RA: Creșteri ale TA și dureri în articulațiile injectate.

APĂ DISTILATĂ *COD ATC: V07AB*
SICOMED SA; Solvent ***(S/OTC)***

Ind: Prepararea soluțiilor sterile. Pentru curățarea instrumentarului și curățarea tegumentelor.
Dz: Adaptat recomandărilor specifice.
Cind: Nu se va adm. parenteral.
A!: Produsul nu trebuie utilizat dacă este tulbure, dacă ambalajul este perforat sau nu este închis ermetic.

B

BENZOAT DE BENZIL MK CREMĂ *COD ATC: P03AX01*
MARK INT. SRL; Cremă cu 25% benzoat de benzil; tub × 35 g ***(P-RF)***

Ind: În tratamentul scabiei, formele fără leziuni de suprainfecții sau eczematizări și a pediculozelor.
Dz: În scabie crema se aplică pe întreaga suprafață a corpului pe pielea uscată după o prealabilă baie fierbinte. O a doua aplicație este făcută în următoarea zi în același fel. În pediculoză porțiunea de piele pe care se aplică trebuie bine spălată și uscată înainte de aplicarea cremei. Se menține timp de 24 ore. Tratamentul se repetă după 7 zile. *La copii sub 2 ani sau la femeile însărcinate sau care alăptează* se aplică o singură dată și se îndepărtează prin spălare după 12 ore.
Cind: La persoanele alergice la benzoat de benzil și la excipienți.
A!: Crema nu trebuie să fie aplicată pe pielea lezată sau inflamată, nu trebuie să vină în contact cu ochii, urechile și buzele. În caz de contact cu ochii, aceștia trebuie spălați cu multă apă.
RA: Poate determina efecte adverse locale, senzații trecătoare de arsură, înroșirea și iritarea pielii. În cazul apariției RA, trat. va fi întrerupt și, de îndată ce se poate, zona pe care a fost aplicată crema va fi spălată cu săpun și apă caldă.

BERES PLUS *COD ATC: V06DEN0*
BERES PHARMACEUTICALS; Sol. orală; fl. × 30 ml sau 100 ml ***(OTC)***

Ind: Supliment nutrițional.
Dz: 18 picături de 1-2 ori/zi, în timpul mesei.
A!: Tetraciclina, penicilina sau antiacidele scad absorbția produsului.

BRASAN *COD ATC: M01AXN4*
VIANEX SA; Cpr. film. 5 mg serrapeptidază (echivalent cu 10 000 u serrapeptidază) ***(P-RF)***

Ind: Medicație adjuvantă în tratamentul edemelor, în special al stărilor inflamatorii când acestea nu sunt de origine microbiană (edemele traumatice). **Dz:** 5-10 mg/zi. Comprimatele se înghit fără a fi mestecate. **Cind:** Hipersensibilitate la produs. **RA:** La persoanele cu antecedente gastrice pot apărea disconfort gastric, greață, vărsături. Prudență la pacienții cu tulburări de coagulare, cu boli renale și hepatice. Sub atentă supraveghere la pacienții tratați cu anticoagulante. Nu a fost stabilită siguranța acestui produs la gravide.

C

CEREBROLYSIN *COD ATC: N07XN01*
EBEWE PHARMA; Sol. inj./perf. 1 g/ml hidrolizat peptidic din creier de porcină ***(P-RF)***

Ind: Disfuncții organice, metabolice și neurodegenerative ale creierului, în special demența senilă de tip Alzheimer; complicații post-apoplectice; traume cranio-cerebrale; traume post-operatorii, contuzii cerebrale sau comoții. **Dz:** Este de preferat terapia zilnică în cure de 10-20 zile. *Disfuncții ale creierului:* organice, metabolice și neurodegenerative (demență) 5-30 ml; *Complicații post-apoplectice:* 10-50 ml; *Traume cranio-cerebrale:* 10-50 ml; *Copii 1-2 ml.* Eficacitatea terapiei poate fi crescută prin repetarea curelor, până nu se mai observă îmbunătățiri ale stării de sănătate. După cura inițială, frecvența dozelor poate fi redusă la de 2-3 ori/săptămână. Între cure trebuie lăsate pauze, durata acestora fiind egală cu cea a curei.
Se adm. doze de până la 5 ml i.m. și de până la 10 ml i.v.
Cind: Hipersensibilitate la unul din componentele medicamentului; Epilepsie; Afecțiuni renale severe.
A!: Se recomandă atenție specială: diateză alergică; epilepsie și convulsii.
RA: În cazuri rare efectele tratamentului au fost asociate cu: agitație, hiperventilație, hipertonie, oboseală, tremor, depresie, apatie, amețeală și simptome de gripă; atacuri tip "mare rău" și convulsii; dereglări gastro-intestinale (pierderea apetitului, dispepsia, diareea, constipația, voma și greața). În cazul inj. prea rapide poate apărea o senzație de căldură sau sudoare, amețeală și în cazuri izolate palpitații sau aritmie; reacții locale la locul inj. (iritare, prurit sau senzație de arsură); Hipersensibilitate sau reacții alergice, cum ar fi reacții ale pielii, reacții locale vasculare, dureri de cap, dureri de ceafă, febră, dureri lombare, dispnee, frisoane și stări de șoc.

CUROSURF *COD ATC: R07AA02*
CHIESI FARMACEUTICI; Susp. intratraheală 80 mg/ml poractant α, fracț. fosfolipidică obținută din plămâni de porc, coresp. la 74 mg fosfolipide totale ***(S)***

Ind: Tratamentul nou-născuților prematur, cu sindrom de detresă respiratorie (RDS).
Dz: Doză unică (2,5 ml/kg) direct în partea inferioară a traheei. Această operație va fi urmată de 1-2 minute de ventilație manuală. În alternativă, pentru ca produsul să ajungă gradual în fiecare plămân, este posibilă adm. în partea inf. a traheei a dozei înjumătățite (1,25 ml/kg), la interval de 1 minut fiecare, întorcând nou-născutul pe o parte și pe alta. Distribuirea fiecărei jumătăți de doză este urmată de un minut de ventilație manuală cu aceeași concentrație de oxigen folosită cu ventilatorul.
A!: Numai în spital de către personal medical instruit și cu experiență în terapia intensivă a nou-născuților prematur, având la dispoziție aparate adecvate pentru ventilație și terapie a nou-născuților cu RDS. La nou-născuții prematur în urma unei rupturi a membranelor (superioară a 3 săptămâni) rezultatele adm. pot să nu fie satisfăcătoare.

D

DIPEPTIVEN

COD ATC: B05BA01

FRESENIUS KABI GmbH; Conc. pt. sol. perf., conține 200 g‰ N(2)–L-alanil-L-glutamină; fl. × 50 ml sau 100 ml ***(S)***

Ind: Alimentație parenterală (aport exogen de aminoacizi) în stări hipercatabolice sau hipermetabolice, când necesarul de glutamină este crescut.
Dz: În absența altor recomandări, doza zilnică este, în funcție de severitatea condițiilor catabolice, de 1,5-2,5 ml conc./kg, corespunzător la 0,3-0,5 g N(2)-L-alanil-L-glutamină/kg. Doza maximă zilnică pentru pacienții cu necesități foarte mari de glutamină este de 2,5 ml conc./kg. Concentratul trebuie introdus într-o soluție de aminoacizi sau, în cadrul schemelor terapeutice cu soluții perfuzabile, într-o altă soluție perfuzabilă conținând aminoacizi, fără să fie depășită doza maximă de aminoacizi de 2,0 g/kg (doza maximă a unei soluții care include și N(2)-L-alanil-L-glutamină nu trebuie să depășească 1,8 g/kg). Viteza de perfuzie nu trebuie să depășească 0,1 g aminoacizi/kg/oră. Durata tratamentului nu trebuie să depășească 3 săptămâni.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la unul dintre constituenți; IR sau IH severă; acidoză metabolică severă; copii.
A!: La pacienții cu IH compensată trebuie monitorizate ionograma serică, osmolaritatea plasmatică, echilibrul hidric, balanța acido-bazică, parametrii funcției hepatice, amoniemia, bilirubinemia. Alegerea unei vene periferice sau centrale depinde de osmolaritatea amestecului final. Limita admisă pentru adm. într-o venă periferică este de 800 mOsm/l, dar aceasta variază considerabil cu vârsta, starea generală a pacientului și calitatea venelor periferice. Este necesară prudență la pacienții cu EP, IC decompensată și hiperhidratare.
RA: În condițiile adm. inadecvate (supradozare, viteză prea mare de perfuzare) pot să apară frisoane, greață, vărsături, hipersudorație, hipertermie și cefalee. Adm. de lungă durată poate duce la creșterea tranzitorie a enzimelor hepatice și a bilirubinemiei.

E

ENTEROL 250 *COD ATC: A07FA51*
BIOCODEX; Cps. și pulb. 250 mg liofilizat de celule vii de Saccharomyces boulardii ***(OTC)***

Ind: Profilaxia tulb. digestive secundare antibioterapiei. Enterite, enterocolite la adult și nou-născut.
Dz: 1-4 cps. sau plicuri/zi. Nu se adm. cu lichide foarte calde (inactivare) sau alcool.

EPIGEN *COD ATC: D02AXN1*
CHEMINOVA INT.; Cremă 100 mg acid glicirizinic; tub × 5 ml ***(OTC)***

Ind: Tratamentul și profilaxia erupțiilor herpetice ale buzelor și feței. Adjuvant topic în terapia zona-zoster.
Dz: Trat. se începe imediat după apariția primelor simptome prevestitoare (furnicături, durere, înțepături, usturimi). Astfel, făcându-se 3-4 aplicații/zi, se poate împiedica apariția veziculelor de herpes. În cazul în care erupția este deja constituită se fac 3-5 aplicații/zi, până la remiterea simptomatologiei și a leziunii, apoi încă 3-4 zile câte 2-3 aplicații/zi. Se adm. profilactic în 1-2 aplicații/zi, pe toată suprafața buzelor în perioadele care creează condițiile apariției erupției herpetice.
Cind: Hipersensibilitatea la acid glicirizinic.

G

GALIFIX *COD ATC: V07AY*
BIOFARM SA; Sol. adezivă pentru uz ext. cu colofoniu 44,5 g, alcool 37,5 g, benzen 17 g, Helianthi oleum 1000 g ***(TM)***

Ind: Se folosește la fixarea pansamentelor.

GELASPON *COD ATC: B02BC*
ANKERPHARM GROUP CHAUVIN; Burete de gelatină ***(OTC)***

Ind: Pentru oprirea sângerării și tamponare în marea și mica chirurgie, urologie, neurochirurgie, obstetrică și ginecologie, stomatologie și în intervențiile chirurgicale din celelalte discipline medicale.
Dz: Pentru utilizarea sterilă a buretelui se recomandă următoarele manevre: 1. Îndepărtarea celui de-al doilea ambalaj, prin tăierea învelișului de poliester și prinderea aseptică a ambalajului din blister. 2. Se apucă din partea stângă (colț volant) folia de acoperire a ambalajului în blister cu policele și indexul și se trage spre dreapta. Buretele steril se poate lua în acest mo-

ment în condiții de asepsie. 3. Se taie cu o foarfecă sterilă o bucată din buretele steril de mărimea zonei sângerânde și se aplică fie uscată, fie umedă pe zona respectivă, modelându-se cu materiale sterile (comprese, pensetă, spatulă).
Cind: Plăgi infectate sau inflamate. Hipersensibilitate cunoscută la componentele buretelui de fibrină.
A!: Buretele neîntrebuințat se va arunca. Resterilizarea alterează proprietățile de utilizare.
RA: Tulburări ale vindecării în cazul folosirii necorespunzătoare, în cazul implantului într-o plagă necurățată și în caz de traumatism termic în timpul trat. stomatologic.

H

HEPAROID LECIVA *COD ATC: C05BA01*
LECIVA; Cremă cu heparinoid 0,06 g (100 UI/mg); tub × 30 g ***(OTC)***

Ind: Afecțiuni ale venelor superficiale: flebită, tromboflebită, varicoflebită, flebite datorate unor puncții venoase; varicozități postscleroterapie; posttraumatic: hematoame, contuzii.
Dz: Se aplică un strat de 1 mm grosime pe zona afectată, de 2-3 ori pe zi, masând ușor până pătrunde în totalitate în piele; la nevoie tegumentele pot fi acoperite cu un bandaj. În cazul inflamațiilor însoțite de durere puternică, crema se aplică foarte ușor atât pe zona afectată cât și în jurul acesteia; zona se acoperă cu tifon. În ulcerul varicos, se recomandă aplicarea pe tegumentele din vecinătate, evitând aplicarea la nivelul leziunilor. Durata tratamentului este de 1-2 săptămâni.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului. Diateză hemoragică, purpură, trombocitopenie, hemofilii.
A!: Nu se va aplica decât pe tegumentele intacte. Trebuie evitat contactul cu mucoasele, ochii și plăgile deschise. Dacă apar reacții alergice, se va opri tratamentul. Crema nu se va aplica local concomitent cu produse topice ce conțin tetraciclină, hidrocortizon sau acid salicilic.
RA: Rar, pot să apară iritații locale cutanate: senzație de arsură, prurit, eritem și erupții cutanate. Există posibilitatea apariției reacțiilor alergice.

I

IMUDON *COD ATC: J07AX*
SOLVAY PHARMA; Cpr. pt supt. conținând: amestec de lizate bacteriene 0,53 ml, Lactobacillus acidophilus 3,50 mg, Lactobacillus helveticus 3,50 mg, Lactobacillus lactis 3,50 mg, Lactobacillus fermentum 3,50 mg, Streptococcus pyogenes de grup A 7,00 mg, Enterococcus faecium 3,50 mg, Enterococcus faecalis 3,50 mg, Streptococcus sanguis 3,50 mg, Staphylococcus aureus 2,50 mg, Klebsiella pneumoniae 2,50 mg, Corynebacterium pseudodiphtheriticum 5,00 mg, Fusobacterium nucleatum 5,00 mg, Candida albicans 3,50 mg; ct. × 40 cpr. pt. supt.

Ind: Tratamentul adjuvant al afecțiunilor mucoasei bucale, inclusiv ulcerațiile bucale. Comprimatele se dizolvă în cavitatea bucală.
Dz: Se administrează 6-8 comprimate pe zi, timp de 6-8 zile.
Cind: Hipersensibilitate la produs sau la oricare dintre ingrediente, în special la mercurotiolatul de sodiu. La copii cu vârsta sub 6 ani, datorită riscului de fals pasaj datorită tipului de comprimat. Pacienți cu maladii autoimune. Nu se recomandă utilizarea în perioada de sarcină și alăptare.
A!: Indicațiile terapeutice nu justifică o utilizare timp îndelungat. Dacă simptomele persistă mai mult de 8 zile și/sau sunt asociate cu stări febrile, tratamentul trebuie reconsiderat. Datorită prezenței lactozei, acest medicament este contraindicat în caz de galactosemie congenitală, sindrom de malabsorbție a glucozei și galactozei sau deficiență de lactază. Se recomandă informarea pacientului asupra posibilității apariției, în cazuri extrem de rare, a stărilor febrile (≥ 39°C) care necesită întreruperea imediată a tratamentului. Apariția atacurilor astmatiforme legate de utilizarea medicamentelor pe bază de extracte bacteriene cu scop imunostimulator a fost observata la pacientii astmatici. În acest caz, se recomanda întreruperea definitivă a tratamentului.
RA: Reacții la nivel cutanat: rar, reacții de hipersensibilitate (urticarie, edem angioneurotic) și reacții cutanate de tip eritem sau eczeme. Reacții la nivel gastro-intestinal: rar, greață, vomă, dureri abdominale, diaree. Altele: în timpul utilizării produselor cu extracte bacteriene în scop imunostimulator, următoarele efecte adverse au fost raportate: rar: temperatura crescută (≥ 39°C) în cazuri izolate, diaree, rinofaringite, sinuzite, laringite, bronșite, atacuri astmatice și tuse izolată; foarte rar: purpură vasculară și eritem nodos, trombocitopenie.

M

MARIMER
LAB. GILBERT; Spray nazal conținând apă de mare: 31,82 ml; apă purificată q.s.p. 100 ml; gaz propulsor inert (azot); fl. × 100 ml sub presiune

Ind: Indicat la sugari, copii și adulți: pentru curățarea ușoară a foselor nazale, pentru umidificarea mucoasei nazale uscate, adjuvant în tratamentele afecțiunilor ORL.
Dz: Se recomandă o pulverizare în fiecare nară de 1-4 ori pe zi, la nevoie.
A!: A nu se lăsa la îndemâna copiilor, a nu se păstra la temperaturi ridicate, a nu se găuri, a nu se arde, chiar după golire

MELAGENINA *COD ATC: D11AXN4*
MEDICUBA; Loțiune 50% extract de placentă umană ***(P-6L)***

Ind: Melanizant în trat. vitiligo.
Dz: Se aplică la nivelul zonelor depigmentate o dată/zi.
Cind: Expunerea la lumină a zonelor tratate.

O

OPRASKIN *COD ATC: D11AX57*
LOHMANN; Burete; 1 cm^2 conține: 7 mg colagen bovin și 0,42 mg apă oxigenată; ct. × 10 unități ***(OTC)***

Ind: Plăgi superficiale cu exsudat (arsuri, excoriații).
Dz: Se aplică la nivelul plăgii.

OPTI-FREE *COD ATC: S01XAN*
ALCON; Sol. ext cu Poliquaternium 1 (pt. întreținerea lentilelor de contact hidrofile); fl. × 250 sau 355 ml ***(OTC)***

Ind: Curățarea, clătirea, dezinfectarea și păstrarea lentilelor de contact moi (hidrofile), transparente sau colorate, zilnice sau pentru purtare îndelungată.
Dz: Curățare săptămânală.

OPTI-FREE ENZYMATIC CLEAN *COD ATC: S01XAN*
ALCON; Cpr. eff. conținând pancreatină porcină purificată; ct. × 2 seturi × 6 cpr. + 2 cuve ***(OTC)***

Ind: Curățarea lentilelor de contact moi (hidrofile), transparente sau colorate, zilnice sau pentru purtare îndelungată.
Dz: Curățare săptămânală. Se dizolvă 1 cpr. în cele 2 cuve și se introduce câte o lentilă de contact în fiecare cuvă.

OSTEOGENON *COD ATC: M09AXN1*
PIERRE FABRE; Cpr. film. cu 830 mg complex oseină-hidroxiapatită (COH), corespunzând la: 75 mg peptide necolagenoase și 216 mg colagen (corespunzând la 291 mg oseină); 178 mg de calciu și 82 mg fosfor (care corespunde la 444 mg de hidroxiapatită) ***(P-6L)***

Ind: Osteoporoză de diverse origini. Reglarea bilanțului fosfo-calcic în cursul sarcinii și al alăptării ca și trat. complementar al vindecării fracturilor.
Dz: *Osteoporoză:* 2 × /zi 1 600-3 200 mg. *Alte indicații:* 800-1 600 mg/zi. Cpr. pot fi înghițite cu puțin lichid.
Cind: Hipercalcemie și hipercalciurie severă.
A!: Precauție la pacienții care prezintă tendința de a forma calculi. A se evita utilizarea prelungită și cu doze ridicate la pacienții care prezintă tulburări renale. Resorbția fierului și tetraciclinelor este diminuată de adm. simultană cu hidroxiapatită. Este recomandat să se adm. preparatul conținând hidroxiapatită după 4 ore de la adm. primului preparat.

P

PARASIDOSE
LAB. GILBERT; Şampon × 200 ml, cu d-phenotrin 0,2% ***(OTC)***

Ind: Tratamentul pediculozei umane cu localizare capilară. Se aplică şamponul pe părul umed, se aşteaptă 3 minute, apoi se clăteşte.
Se repetă aplicarea şi după încă 3 minute se clăteşte bine părul. Un singur tratament este suficient.
Cind: A nu se folosi la copii sub 30 de luni (pentru că acest şampon conţine camfor).
A!: Deoarece produsul conţine acid acetic, este necesară clătirea părului după doar 3 minute de la aplicare, timp suficient pentru acţiune. A se evita contactul cu ochii, nasul şi gura. A nu se mirosi! Persoanele epileptice trebuie să ceară sfatul medicului înainte de a folosi produsul. Conţine derivaţi terpenici (ca excipienţi) care pot scădea pragul epileptogenic. Dozele excesive pot provoca tulburări neurologice sau convulsii la copiii mici.
Este preferabil să nu se folosească şamponul în timpul sarcinii sau alăptării datorită posibilităţii trecerii derivaţilor terpenici în lapte şi potenţialei lor toxicităţi neurologice.
RA: Deoarece acest produs conţine derivaţi terpenici (ca excipienţi), în cazul creşterii dozelor recomandate pot apărea: la copiii mici - riscul convulsiilor, la pacienţii în vârstă - agitaţie şi stări confuzionale.

S

SURVANTA® *COD ATC: R07AA02*
ABBOTT LAB.; Susp. conţine: fosfolipide 25 mg/ml (incluzând 11,0-15,5 mg/ml fosfatidilcoline disaturate), trigliceride 0,5-1,75 mg/ml, acizi graşi liberi 1,4-3,5 mg/ml, proteine mai puţin de 1,0 mg/ml ***(S)***

Ind: Prevenirea şi tratamentul Sindromului de Detresă Respiratorie (SDR) la nou-născuţii prematuri cu greutate sub 1 250 g sau peste, care sunt intubaţi şi beneficiază de ventilaţie mecanică.
Dz: 4 ml suspensie (100 mg/kg greutate de la naştere) pe cale intratraheală. Nu se folosesc doze mai mari. Terapia monodoză trebuie începută cât mai repede cu putinţă după apariţia SDR, preferabil la 8 ore după naştere. Dozele următoare sunt de 100 mg fosfolipide/kg şi depinde de greutatea la naştere a copilului. Necesarul de doze suplimentare este dată de persistenţa SDR. Nu se adm. doze ulterioare mai repede de 6 ore de la ultima doză administrată. Până la 3 doze ulterioare pot fi administrate în primele 48 de ore.
A!: Precauţii speciale de folosire: trebuie adm. cu facilităţi adecvate de ventilare şi monitorizarea copiilor cu SDR. Îmbunătăţiri marcate ale oxigenării apar în câteva minute de la adm. Este esenţială o monitorizare frecventă şi atentă a oxigenării sistemice pentru a evita hiperoxia. După adm. este necesară monitorizarea gazelor din sângele arterial, fracţiunii de sânge inspirat şi schimburile ventilatorii pentru a putea asigura ajustările necesare.

RA: Bradicardia tranzitorie, foarte rar reflux pe tubul endotraheal, HTA, apnee, vasoconstricții, hTA, paloare, hipocapnie, hipercapnie.

W

WOBE-MUGOS® E

COD ATC: L03AX

MUCOS PHARMA GmbH & Co.; Cpr. film. cu pancreatină 100 mg, tripsină 24 mg, chimotripsină 1 mg, bromelină 45 mg, papaină 60 mg, amilază 10 mg, lipază 10 mg, rutozid 50 mg ***(S/P-RF)***

Ind: Adj. în tromboflebită și sindrom posttrombotic, inflamații ale tractului urogenital, boli reumatice; stări inflamatorii de natură traumatică sau consecutive intervențiilor chirurgicale stomatologice și altor intervenții minore; inflamații provocate de iradiere.
Dz: *Adulți:* 2-3 cpr. de 3 ori/zi, cu o oră înaintea meselor de dimineață, prânz și seară. Doza maximă este de 10 cpr. de 3 ori/zi.
A!: Prudență în caz de deficit de coagulare congenital sau dobândit, IH avansată, afecțiuni renale, intervenții chirurgicale planificate sau tendință la reacții alergice. Sarcina și alăptarea.
RA: Senzație de plenitudine, flatulență, ocazional, greață; consistența, culoarea și mirosul scaunelor pot fi modificate. Rar, reacții alergice.

WATER FOR INJECTION

COD ATC: V07AB

VIOSER SA; Solvent ***(S)***
B. BRAUN MELSUNGEN; Solvent ***(S)***

Ind: Prepararea soluțiilor sterile. Pentru curățarea instrumentarului și a tegumentelor.
Dz: Adaptat recomandărilor specifice.
Cind: Nu se va adm. parenteral.
A!: Produsul nu trebuie utilizat dacă este tulbure, dacă ambalajul este perforat sau nu este închis ermetic.

MONOGRAFII – PRODUSE NATURALE/ PRODUSE HOMEOPATE

MONOGRAFII – PRODUSE NATURALE

A

ADENOSTOP *COD ATC: G04CXN1*
BIOFARM SA; Sol. orală. conț. extr. fluid de Xanthii herba și Xanthii spinosi herba; fl. × 100 ml ***(OTC)***

Ind: Adenom de prostată, infecții urinare cronice (ca medicație adjuvantă).
Dz: Int., câte 40-45 pic. de 2 ori/zi, cu 1/2 oră înainte de masă, 6 luni; se continuă eventual cu 40-45 pic. o dată/zi, încă 3-4 luni.
Cind: Insuficiență CSR (poate favoriza reținerea de potasiu).
A!: Prudență sub tratament digitalic (eventual se ajustează doza de tonicardiac).

AFTOLIZOL *COD ATC: A01AD11*
MEDUMAN SA; Sol. bucală; la 100 g sol. 15 g extr. fluid din petale de trandafir și 15 g miere de albine purificată; fl. × 50 ml ***(OTC)***

Ind: Stomatite aftoase, microbiene, micotice.
Dz: 1/2 linguriță se ține în gură 3-5 min apoi se înghite; se adm. de 3-5 ori/zi; minim 10-14 zile.

ANGHIROL® *COD ATC: A05AXN1*
BIOFARM SA; Dj. cu extract uscat din frunze de anghinare (Cynara scolymus) corespunzător la acizi cafeilchinici exprimați în acid clorogenic 3,25 mg; ct × 4 blist. a 10 dj. ***(OTC)***

Ind: Ca tratament adjuvant în tulburările dispeptice cu insuficiență secretorie biliară și pentru stimularea secreției și evacuării bilei la persoanele cu risc de calculoză. Scăderea apetitului alimentar. Preparatele de anghinare sunt folosite tradițional pentru favorizarea funcțiilor de eliminare digestivă și urinară.
Dz: *Adulți:* doza uzuală 2-3 drajeuri de 3 ori pe zi înaintea meselor. *Copii între 7 și 10 ani:* doza uzuală este de un drajeu de 3 ori pe zi înaintea meselor. *Copii între 10 și 15 ani:* doza uzuală este de 1-2 drajeuri de 3 ori pe zi înaintea meselor.
Cind: Alergie la anghinare sau la oricare dintre componenții produsului. Obstrucție biliară. Insuficiență hepatică severă, insuficiență renală acută.
A!: Nu se recomandă administrarea produsului la pacienții cu colici biliare litiazice sau hiperkinezie biliară.
RA: După doze mari pot să apară greață, amețeli, senzație de căldură.

ANTIDIAREICE *COD ATC: XNF*
C.C.P.P.M. PLANTAVOREL; Cpr. cu 0,1 g Myrtilli folium, 0,1 g Agrimonia herba, 0,05 g Chamomillae flos și 0,4 mg chelidonină ***(OTC)***

Ind: Enterocolită estivală acută, enterocolită cronică, dispepsii de fermentație și putrefacție, colici gastrointestinale, meteorism de origine spastică, colon iritabil.
Dz: *Adulți:* 2 cpr. de 3 ori/zi, 3-10 zile. Bolnavii cu colon iritabil pot prelungi cura până la 4-5 săptămâni. *Copii:* 1 cpr. de 2-3 ori/zi.

ARMON *COD ATC: D03AXN4*
BIOTEHNOS; Cremă cu rășină purificată de conifere, ulei din Hippophae fructus, extr. din: Calendulae flos, Hypericii herba, Bardanae radix, anestezină și apă structurată "I"; tub × 30 g sau 85 g ***(OTC)***

Ind: Trat. arsurilor de diferite grade (I-III) induse de agenți chimici, termici, electrici. Trat. plăgilor accidentale și chirurgicale reducând timpul de cicatrizare. Pregătirea suportului pentru grefare. Profilaxia și trat. arsurilor de iradiere.
Dz: Se spală plaga cu antiseptice uzuale. Se aplică un strat de cremă; bandajul nu se strânge excesiv și în primele 4-5 zile se schimbă la 24 ore, după o umezire prealabilă.
Cind: Alergie la unul din componentele produsului.

B

BABY DRINK
PHARCO PHARMACEUTICALS; Plicuri 5 g extracte naturale (mușețel, lemn dulce, mentă, cimbru, anason); ct. × 12 plicuri monodoză (OTC)

Ind: Anticolicativ instant natural.
Dz: Conținutul unui pliculeț se dizolvă în 50 ml apă fiartă și răcită. Nu necesită îndulcire sau fierbere. Valoare calorică: 372 kcal/100 g conținut.

BABYNOS *COD ATC: A03EDN1*
DENTINOX; Sol. orală cu 32 g extr. fluid de Foeniculi fructus, 20 g extr. fluid de Chamomillae flos și 20 g extr. fluid de Coriandri fructus fl. × 30 ml ***(OTC)***

Ind: Colici abdominale ale sugarului, crampe, balonări, sughiț.
Dz: *Nou născut:* 1/2 linguriță de ceai; 1-6 luni: 1 linguriță; peste 6 luni: 2 lingurițe; maxim de 4 ori/zi.

BARAKA

PHARCO PHARMACEUTICALS; Cps. 100 mg pt. copii (ct. × 24 cps.) și cps. 450 mg pt. adulți și copii peste 12 ani (ct. × 24 cps.) conținând ulei de semințe de Nigella sativa (chimen negru) ***(OTC)***

Ind: Imunostimulator. Bronhodilatator. Antitusiv.
Dz: 3-4 capsule pe zi, continuu timp de o lună sau în cure periodice de 10 zile pe lună, 3-6 luni consecutiv, pentru creșterea imunității organismului; 1 capsulă de 3 ori pe zi, 5-7 zile, ca antitusiv.
A!: Nu se administrează în timpul sarcinii.

BOICIL FORTE *COD ATC: M02AX10*
EXHELIOS; Sol. ext. 10% sau ung. cu extr. selectiv de Helleborus 5 g/100 g ***(OTC)***

Ind: Boli reumatismale articulare cu caracter degenerativ (artroze), inflamatorii (PAR, spondiloartrită anchilopoietică) și abarticulare (mialgii, nevralgii diverse), sechele dureroase după traumatisme accidentale sau chirurgicale.
Dz: Aplicații locale în strat subțire pe zona dureroasă prin masaj blând, de 3-4 ori/zi.

BOICIL FORTE *COD ATC: M01BXN3*
TERAPIA SA; Sol. inj. conține extr. purificat de Helleborus sp. (f. × 2 ml) ***(S/P-RF)***

Ind: Diverse algii, predominant din grupa afecțiunilor reumatice abarticulare și migrene esențiale rebele la tratamentele clasice, neuromialgii, miozite, fibrozite, tendinite, sindrom de disc intervertebral, diverse nevralgii și nevrite, periartrite, bursite; stadiile dureroase ale artropatiilor de tip degenerativ: artroze și spondiloze; poliartrita evolutivă și spondilartrita anchilopoietică pot beneficia, prin sedarea algiilor și uneori prin ușurarea mobilității articulare.
Dz: Punctele dureroase se mențin sub presiunea policelui stâng, aplicându-se apoi o microinfiltrație în fiecare punct dureros. În acest scop se folosește, obligatoriu, seringa de 1 ml, din al cărei conținut se pot face 3-4 microinfiltrații, strat cu strat (de la tegumente, uneori până la periost), lăsându-se în fiecare strat 1-2 diviziuni. Dată fiind eficacitatea aproape instantanee, medicul controlează aplicarea corectă a medicamentului, mobilizând segmentul dureros la câteva secunde după infiltrație (când nu apare durere, răspunsul terapeutic este pozitiv). Acest control se poate face după fiecare 2-3 microinfiltrații. Într-o ședință se pot infiltra 3-5 f., într-un număr de 15-20 puncte dureroase. Dacă durerile reapar, microinfiltrațiile pot fi repetate numai după 4-5 zile și numai în locurile rămase cu durere sau impotență funcțională. Suferințele recente afebrile și abarticulare pot fi trat. într-o ședință de microinfiltrații (durerile din regiunea cervicobrahială cu parestezii și crizele de migrenă).
Cind: Stări febrile, afecțiuni hepato-renale și cardiovasculare decompensate, AVC recente. Sarcină și alăptare.
A!: Nu se va administra soluția precipitată.
RA: Fenomene locale: ușoară hiperemie dureroasă post-infiltrativă, sau generale: senzație de căldură, mici frisoane, lipotimie la hipertensivi și emotivi.

BRONCHICUM ECHINACEA *COD ATC: R05XN01*
LAB. AVENTIS PHARMA.; Sol. orală tinct. Quebracho (1:5) 14 ml, tinct. Saponariae (1:5) 19 ml, tinct. Thymi (1:5) 22 ml ; fl. × 30 ml ***(OTC)***

Ind: Afecțiunile inflamatorii acute și cronice ale mucoasei bronșice.
Dz: *Adulți și tineri:* câte 20-30 pic. de 3-5 ori/zi;

BRONCHICUM ELIXIR
NATTERMANN; Sirop tinct. Tymi 1:5; fl. × 100 ml ***(OTC)***

Ind: Afecțiunile inflamatorii acute și cronice ale mucoasei bronșice.
Dz: *Adulți și tineri:* 20-30 pic. de 3-5 ori/zi; *copii între 6 și 14 ani:* 20 pic. de 3-5 ori/zi; *copii sub 6 ani:* până la 15 pic. de 3-5 ori/zi.

BRONCHICUM HUSTENSIRUP
RHÔNE POULENC RORER; Sirop cu tinct. H. Grindelia 0,2 ml + R. Pinpinelae 0,2 ml + R. Primulae 1 ml + Fl. Rosae 1 ml + H. Thymi 1,2 ml; fl. × 325 mg ***(OTC)***

Ind: Afecțiunile inflamatorii acute și cronice ale mucoasei bronșice.
Dz: *Adulți și tineri:* câte 20-30 pic. de 3-5 ori/zi; *copii între 6 și 14 ani:* 20 pic. de 3-5 ori/zi; *copii sub 6 ani:* după vârstă, până la 15 pic. de 3-5 ori/zi.
Cind: Șoferi și activități de precizie.
AI: Diabetici.
RA: Iritații ale mucoasei gastrice.

C

CARPICON *COD ATC: D11AXN1*
ROMDAN SRL; Ung. cu extract uleios de rășină brută de conifere 15 g, ceară galbenă 15 g, ulei de floarea soarelui; fl. × 20 g. ***(OTC)***

Ind: Protecția tegumentelor împotriva arsurilor acide.
Dz: Se aplică în strat subțire pe tegumentele expuse.

CASLAX *COD ATC: A06AB20*
PHARMEX ROM IND.; Cpr. conț. extr. uscat de Frangula 150 mg, extr. uscat de Rheum 150 mg; extr. uscat de Cichorium 100 mg, extr. uscat de Liquiritia 100 mg ***(OTC)***

Ind: Constipație funcțională; pregătirea pentru examenul radiologic, endoscopie, intervenții chirurgicale.
Dz: Câte 1-3 cpr. seara la culcare.
Cind: Boli inflamatorii ale colonului, apendicită acută, colopatii obstructive, ocluzie intestinală, dureri abdominale de cauză neprecizată; la copiii mai mici de 6 ani. Sarcină și alăptare.
RA: Uneori diaree, dureri abdominale, congestie pelviană; folosirea abuzivă poate provoca iritația cronică a colonului, mergând până la colită (eventual cu dezechilibre electrolitice, hipokaliemie).

CEDOVIX UNGUENT
SPECIFAR SA; Ung. 40 g ***(OTC)***

Ind: Descongestionarea căilor respiratorii superioare, ușurarea respirației, reducerea iritației gâtului și scăderea tusei.
Cind: Camforul poate provoca reacții alergice.
Dz: Frecții ușoare pe umeri, gât și piept. Pacientul va inspira vaporii. Se dizolvă 2 lingurițe de unguent în 1/2 apă fierbinte. Se fac inhalații.

COLOMINT
PHARCO PHARMACEUTICALS; Cps. 0,2 ml ulei de menta; ct. × 24 cps gelatinoase ***(OTC)***

Ind: Colon iritabil și enterocolite, colici intestinale, probleme digestive asociate acumulării excesive de gaze intestinale, crampelor și spasmelor.
Dz: 1-2 capsule, de 3 ori pe zi, înainte de mese.

COMMON COMFREY BALM *COD ATC: D11AXN1*
NATURLAND; Ung ext. Symphyty R. 10% + alantoină 0,1%; tub × 60 g ***(OTC)***

Ind: Trat. hematoamelor, al flebitei și al varicelor deschise.
Dz: Se aplică pe zona afectată, în strat subțire.

CRATEGUS *COD ATC:XNF*
NATURALIA IMPEX SRL; Cps. ***(OTC)***

Ind: Angină pectorală, stări postinfarct, tulburări cardiace funcționale.
Dz: 2-3 cps. de 3-4 ori/zi, 4-5 săpt.

D

DIFABIOL *COD ATC: C05CXN1*
FABIOL SA; Cpr. cu 100 mg extr. purificat de fructe de Vaccinum myrtillus ***(OTC)***

Ind: Ca medicație adjuvantă în ateroscleroză, HTA, angiopatii diabetice, afecțiuni vasculare retiniene, purpură, tulburări hemoragice la cirotici, varice, sechele de flebită, hemoroizi.
Dz: 1-2 cpr. de 3 ori/zi (la mese), 20 zile în fiecare lună.

E

EXPECTORANTE *COD ATC: XNF*
C.C.P.P.M. PLANTAVOREL; Cpr. 100 mg Primulae flos, 50 mg Primulae radix 50 mg, Inulae radix 50 mg, Chelidoni herba 100 ng, Aetheroleum thymi 0,5 mg, Aetheroleum pinii montanae 10 mg ***(OTC)***

Ind: Tusea din afecțiunile acute sau cronice ale aparatului respirator, în special în faza de cocțiune, răceli, stări post gripale.
Dz: *Adulți,* 3-4 cpr./zi, timp de 3-14 zile; *copii între 5-12 ani,* jumătate din doza adultului timp de 3-7 zile.

Cind: La persoanele cu afecțiuni cardiace aflate sub tratament cu medicație digitalică, când determină o scădere a nivelului digitalei în circulația sanguină. La copiii sensibili, în a 4-a/a 5-a zi de tratament, pot apărea scaune diareice.

F

FITODIAB *COD ATC: A10XN00*
HOFIGAL SA; Cpr. conținând 450 mg pulb compusă din Vaccinium myrtillus fructus, Phaseolus vulgaris fructus sine seminibus, Betulae verrucosa folium, Morus alba folium **(OTC)**

Ind: Trat. adjuvant al diabetului zaharat de tip II cu sau fără exces ponderal; poate fi asociat și în diabetul zaharat insulino-dependent inducând o mai bună echilibrare a bolii.
Dz: Doza se stabilește în funcție de nivelul glicemiei: între 120-150 mg/dl - 2 cpr./zi în timpul meselor principale; între 150-200 mg/dl - 4 cpr./zi; peste 200 mg/ dl - 6 cpr./zi.
Cind: Nu se folosește ca unic trat. în diabetul zaharat de tip II.
RA: Iritații gastroduodenale.

FITOLIP *COD ATC: XNF*
FABIOL; Cpr. conținând 0,6 g pulbere din: Crategus - 30%; Ribes nigrum - 30%; Melilotus off. - 20%; Betulae Verucosa - 10% și Silybum marianum - 10% ***(OTC)***

Ind: Hipercolesterolemia și/sau hipergliceridemia, cu/fără diabet/obezitate. Hepatopatie dismetabolică sau hepatită cronică.
Dz: La adulți, în primele 3 luni de trat. câte 2 cpr. de 3 ori/zi, urmate apoi de un tratament de întreținere cu 2-4 cpr./zi, după mese.
A!: Pacienți cu ulcer gastroduodenal sau IRC.

FLAVOSOL *COD ATC: R02AA20*
TIS FARMACEUTIC SA; Sol. orală 30% propolis; fl. × 35 g ***(OTC)***

Ind: Faringite, laringite, traheobronșite, tulburări dispeptice diverse.
Dz: Gargară cu sol. diluată (1:10) sau adm. intern.

G

GALACTOGIL
HYPERICUM; Gran. X 210 g conținând extract uscat din flori de Galega officinalis, extract din Hordeum distichon (malt) și fosfat neutru de calciu.

Ind: Stimularea și susținerea secreției lactate - corectarea stărilor de hipogalactie.

GINSENG *COD ATC: A13AN02*
LAROPHARM SRL; Cps. 40 mg ***(OTC)***
PHARCO PHARMACEUTICALS; Cps. gelatin. moi conținând extract standardizat de Panax Ginseng (ginseng corean) 100 mg; Sirop ***(OTC)***
PHARMEX ROM IND; Cps. cu extr. de Ginseng 250 mg ***(OTC)***
STANLEY PHARMA Ltd.; Cps. 250 mg ***(OTC)***

Ind: Îmbunătățește activitățile fizice și mentale; îndepărtează starea de oboseală și slăbiciune; crește rezistența organismului, metabolismul celular, viteza de metabolizare a alcoolului.
Dz: 1-2 cps/zi.

GRIPE BABY WATER
PHARCO PHARMACEUTICALS; Sirop; 5 ml conțin 2,3 mg ulei deterpenizat de semințe de mărar și 52,5 mg bicarbonat de sodiu (fl. × 120 ml) ***(OTC)***

Ind: Colici abdominale, flatulență, indigestii, stări de agitație ale sugarilor din perioada erupției dentare.
Dz: *Nou-născuți* ½ linguriță de 3 ori pe zi; *sugari 1-6 luni* 1 linguriță de 3 ori pe zi; 6-24 luni 2 lingurițe de 3 ori pe zi; *peste 2 ani* 2-3 lingurițe de 3 ori pe zi.

GRIPEC *COD ATC: XNF*
C.C.P.P.M. PLANTAVOREL; Cpr. cu 0,3 g Echinaceae sp. herba, 0,15 g Usnea barbata ***(OTC)***

Ind: Trat. infecțiilor cu virus gripal sau profilactic în caz de epidemii gripale.
Dz: *Adulți:* 4-6 cpr. în prima zi, apoi 3 cpr./zi, timp de 5-6 zile, înainte de mese.

H

HEPATOBIL
C.C.P.P.M. PLANTAVOREL; 1 cpr. conține: 150 mg Chelidonii herba, 110 mg Hyperici herba, 25 mg Cynarae folium, 90 mg Lupulis strobuli, 65 mg Valerianae rhizoma cum radicibus; fl. × 40 cpr. ***(OTC)***

Ind: Diskinezie biliară hipotonă, colecistită nelitiazică cronică, colită spastică, hepatită cronică.
Dz: *Adulți,* 1-2 cpr. de 3 ori/zi, cu 30 minute înaintea meselor, 5-30 zile; *copii peste 3 ani:* 1/2 din doza adulților.
Cind: Colecistita litiazică acută.

HEPATOFALK PLANTA *COD ATC: A05CN01*
DR. FALK GmbH; Cps. cu extr. uscat de armurariu (Silybum marianum) (43%-53% silimarină calculat în silibină) 132,1-162,8 mg, extr. uscat de rosto-

pască (Chelidonii herba); 2,0-2,2% alcaloizi totali, calculați în chelidonină 90,0-100,0 mg, extr. uscat de Javanese curcuma - turmeric (Curcuma xanth. Rhiz.) cu un extr. nativ de 54% (D-E-V 28,6:1) 25,0 mg ***(OTC)***
EWOPHARMA; Cps. 250 mg ***(OTC)***

Ind: Afecțiuni toxice hepatice; ca trat. adjuvant în afecțiunile hepatice cronice și ciroza hepatică. Colici biliare și gastrointestinale. Tulburări dispeptice.
Dz: 2 cps. de 3 ori/zi înainte de masă. Trat. de întreținere și cel al cazurilor medii - 1 cps. de 3 ori/zi.
Cind: Obstrucție biliară.
RA: Ușoară acțiune laxativă, tulburări gastrice.

I

INHALANT *COD ATC: R02AA20*
BIOFARM SA; Sol. ext. alcoolică conținând ulei de pin 10,4 g, ulei de mentă 2,4 g, ulei de eucalipt 16 g, ulei de lavandă 0,1 g, terpineol 0,2 g/100 ml ***(OTC)***

Ind: Traheobronșită, rinofaringită, sinuzite subacute sau cronice, otită medie catarală.
Dz: Se introduc 2,5 ml într-un litru de apă fierbinte și se inhalează seara la culcare.
Cind: Hemoptizie, tbc pulmonară, astm bronșic, ATS cerebrală avansată.
RA: Iritația locală poate favoriza dezvoltarea inflamațiilor acute sau a spasmului bronșic.

INSADOL *COD ATC: V07AS*
DELPHARM; Dj. 35 mg; Sol. orală 25 mg/ml extr. total de ulei de germeni de porumb (fl. × 30 ml) ***(P-RF)***

Ind: Parodontopatii.
Dz: Inițial 6 dj./zi sau o linguriță sol. înaintea meselor; trat. de întreținere: 3 dj. sau 1/2 linguriță/zi, în cure de minim 2 luni.

ISCADOR M *COD ATC: L03AXN1*
WELEDA AG.; Sol. inj. extr. apos fermentat de Viscum album Mali 20%: 150 mg, 100 mg, 50 mg, 5 mg, 0,5 mg, 0,05 mg, 0,005 mg, 0,0005 mg ***(P-RF)***

Ind: Vezi ISCADOR QU.

ISCADOR P
WELEDA AG.; Sol. inj. extr. apos fermentat de Viscum album Pinii 20%: 150 mg, 100 mg, 50 mg, 5 mg, 0,5 mg, 0,05 mg, 0,005 mg, 0,0005 mg ***(P-RF)***

Ind: Vezi ISCADOR QU.

ISCADOR QU
WELEDA AG.; Sol. inj. extr. apos fermentat de Viscum album Querci 20%: 150 mg, 100 mg, 50 mg, 5 mg, 0,5 mg, 0,05 mg, 0,005 mg, 0,0005 mg ***(P-RF)***

Ind: Imunomodulator în cursul unor procese neoplazice: tumori maligne și benigne; afecțiuni maligne ale sistemului hematopoietic și afecțiunile însoțitoare; stimularea hematopoiezei; profilaxia recidivelor tumorale; stări precanceroase.
Dz: *Faza inițială:* Se inj. de 3 ori pe săptămână 1 ml s.c., creșterea făcându-se în scopul atingerii dozei de reactivitate individuală. Doza de reactivitate individuală se recunoaște după apariția a cel puțin uneia din reacțiile următoare: ameliorarea stării generale și a stării psihice, ca și diminuarea durerilor cauzate de procesul tumoral. O stare generală ușor alterată, frisoane, cefalee și vertij pasager care apar pot indica fie o doză eficientă fie o doză prea mare. Dacă aceste manifestări nu dispar în ziua următoare, trebuie redusă doza. *Faza de întreținere:* este atinsă când apare cel puțin una din reacțiile descrise mai sus. Se recomandă continuarea terapiei cu acea serie, la care doza de reactivitate reprezintă concentrația cea mai înaltă atinsă. După fiecare cură de 14 injecții se face o pauză de o săptămână. La o evoluție favorabilă, pauzele pot fi prelungite în al doilea an de tratament până la 2 săptămâni, iar de la al treilea an până la 3-4 săptămâni. Dacă pauza durează 4 săptămâni sau mai mult, la reînceperea trat. pot să apară reacții inițiale exagerate. De aceea se reîncepe cu seria imediat inferioară. În cazul unui stadiu avansat de boală, sau atunci când apare o stare generală mai alterată între administrări, este posibilă adm. zilnică. La intervale de 3-6 luni ar trebui revăzut dozajul. *Tratamentul de desensibilizare:* Inj. 0,1 ml Iscador 0,001 mg din sortimentul de elecție și se crește zilnic cu 0,1 ml -1 ml. În cazul apariției unor reacții puternice la concentrație de 0,001 mg, se utilizează concentrația de 0,0001 mg. Injectarea trebuie făcută strict intradermic. Dacă 1 ml Iscador 0,001 mg este suportat fără reacții exagerate, se poate trece la treapta de concentrație superioară - 0,01 mg; se începe din nou cu 0,1 ml și se crește la modul descris anterior.
Cind: Alergie cunoscută la preparate de vâsc; după o desensibilizare este posibilă continuarea trat. prin creșterea progresivă a dozelor. Afecțiuni inflamatorii acute, stări febrile; tbc. Hipertiroidismul necompensat. Tumori primare cerebrale și spinale sau metastaze intracraniene cu risc de creștere a presiunii LCR. Va fi adm. în timpul sarcinii numai dacă este absolut necesar.

ISOREL-A *COD ATC: L03NX01*
NOVIPHARM GmbH; Sol. inj. 60 mg/ml (f. × 1 ml) ***(S)***

Ind: Terapie complementară la chimioterapia și radioterapia tumorilor maligne, pentru prevenirea recidivelor postoperatorii și post-radioterapie și pentru profilaxia stărilor canceroase. Imunomodulare peri-operatorie și deficiențe imune latente.
Dz: Zilnic 1-3 f., de 3 ori/săptămână (ex: luni, miercuri, vineri), respectiv 3-9 f./săptămână (tumori în stadiul I/II). Doza zilnică maximă 5 fiole. Pentru prevenirea recidivelor și metastazelor după intervenții chirurgicale și radioterapie: zilnic 3-5 fiole, de 3 ori/săptămână (ex: luni, miercuri, vineri), respectiv 9-15 fiole/săptămână (tumori în stadiul III/IV). Pentru stările precanceroase: 1 fiolă/zi, de 3 ori/săptămână (ex: luni, miercuri, vineri), respectiv 3 fiole/săptămână. Pentru imunomodularea peri-operatorie durata tratamentului este: 2 săptămâni inainte și 2 săptămâni după intervenția chirurgicală. Doza este de 6 fiole/săptămână,

divizată în 3 adm. pe săptămână. Pentru deficiența imună latentă, se adm. 0,5-1 ml de 2 ori/săptămână, 2 luni, în cure de 2 ori pe an.
Cind: Hipersensibilitate la preparatele cu vâsc. Pentru a evita o reacție de hipersensibilitate la produs, se recomandă efectuarea unei desensibilizări, prin adm. unor doze mici, adm. succesiv. Prudență în hipertiroidism, sarcină și alăptare.

L

LENICALM *COD ATC: XRNIT*
LAB. DOLISOS; Cpr. film. cu extr. de Asperula 75 mg, extr. de Crataegus 50 mg, extr. de Tilia 50 mg ***(P-RF)***

Ind: Trat. simptomatic al stărilor de neliniște la adulți și copii, în special în cazul unor tulburări minore de somn.
Dz: *Adulți:* 1-2 cpr. film de 1-3 ori/zi (fără a depăși 6 comprimate filmate pe zi). *Copii mai mari de 6 ani:* 1-2 cpr. film./zi.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului. Sarcina și alăptarea. Copii cu vârstă mai mică de 6 ani.

LIV. 52 *COD ATC: A05CN01*
HIMALAYA; Cpr. cu Capparis spinosa 65 mg, Cichorium intybus 65 mg, Solanum nigrum 32 mg, Cassia occidentalis 16 mg, Terminalia arjuna 32 mg, Achillea millefolium 16 mg, Tamarix gallica 16 mg, Mandur bhasma 33 mg ***(OTC)***

Ind: În prevenirea și ca adjuvant în trat. complex al afecțiunilor hepatice acute și cronice, ciroze hepatice, dischinezii biliare cauzate de infecții (virale, microbiene, parazitare), tulburări metabolice (alcoolism, abuz de medicamente, intoxicații cu metale grele, accidentale sau terapeutice), precum și în trat. simptomelor locale sau generale cauzate de afecțiunile de mai sus – inapetență, gust amar, balonări, constipație, malnutriție, slăbire, retenție hidrică, anemie, adinamie, astenie.
Dz: Int. *Adulți:* 2-3 cpr. de 3-4 ori/zi. *Copii:* 1-2 cpr. de 2-3 ori/zi.

M

MAG-ANGHINAR *COD ATC: A05AXN1*
HOFIGAL SA; Cpr. conț. 250 mg extr. uscat Cynara scoli-mus ***(OTC)***

Ind: Diskinezii biliare, atonii biliare, angiocolecistite; hepatite cronice; tulburări dispeptice.
Dz: *Adulți:* 2-3 cpr. de 3 ori/zi; *Copii între 3-7 ani:* 1/2 cpr. de 3 ori/zi; *copii între 7-10 ani:* 1 cpr. de 3 ori/zi; *copii peste 10 ani:* 1 1/2 cpr. de 3 ori/zi.
Cind: Obstrucție biliară, insuficiență hepatocelulară.

MENTHOLAX
PHARCO PHARMACEUTICALS; Cps. gelatin. moi cu 20 mg extract purificat de senna și 100 mg ulei de mentă ***(OTC)***
ct. × 24 cps. gelatinoase moi.

Ind: Tratamentul constipației habituale și ocazionale, în special cea asociată cu flatulență și spasme abdominale; adjuvant în tratamentul parazitozelor intestinale; evacuarea intestinului în scop diagnostic (înainte de ecografii, colonoscopii, rectosigmoidografii).
Dz: *Adulți:* Constipație habituală: se începe cu 1 capsulă de 3 ori pe zi sau conform indicației medicului. Ulterior doza poate fi redusă. Constipație ocazională: 2 capsule seara la culcare sau la indicația medicului. *Copii peste 6 ani:* 1 capsulă seara la culcare.

MIDRO TEA *COD ATC: A06AB56*
MIDRO VERTRIEB; Pulb. 100 g conțin: 75 g Senae f., 10 g Carvi fructus, 7 g Menthae f., 6 g Liquiritiae rad., 1 g Malvae f., 1 g Clacaptrippa f. ***(OTC)***

Ind: Constipație acută, constipație cronică.
Dz: Int: ca laxativ, 1/4-1/2 linguriță pulbere se mestecă sau se înghite cu apă, seara, la culcare, maxim 14 zile.
Cind: Hemoroizi, abdomen acut. Sarcină și alăptare. Copii sub 12 ani.

MIRTILENE *COD ATC: C05CXN1*
S.I.F.I.; Cps. moi cu extr. uscat de Vaccinium myrtillus 70 mg; beta-caroten 10 mg; alfa-tocoferol 40 mg ***(OTC)***

Ind: Fragilitate capilară. Afectarea permeabilității capilare. Dezordini vasculare retiniene. Miopie forte. Hemeralopie dobândită. Adaptare insuficientă la vederea scotopică și mezopică. Oboseală vizuală.
Dz: Int., 4-6 cps./zi.
Cind: Hipersensibilitate în antecedente la oricare dintre componente.

MORRIS *COD ATC: R02AA20*
DIOMSANA; Dj. cu 3,2 mg ulei de mentă și 1,1 mg mentol ***(OTC)***

Ind: Decongestionant al mucoasei nazale.
Dz: 1-2 dj. de 3 ori/zi se sug (nu se mestecă și nu se înghit).

MUCOFALK APPLE *COD ATC: A06AC51*
DR. FALK GmbH; Gran. 1 plic (5 g gran.) conține Ispaghula husk (sin. Plantago ovata) 3,25 g ***(OTC)***

Ind: Constipație habituală (constipația funcțională cronică), afecțiuni în care se dorește o activare a peristaltismului și o înmuiere a bolului fecal: fisuri anale, hemoroizi, după chirurgia rectală sau anală și în timpul sarcinii; trat. de întreți-

nere în diareea de diverse etiologii și în sindromul colonului iritabil. Trat. asociat în diverticuloza colonului și ca adjuvant (măsură ajutătoare) în maladia Crohn.
Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* un plic dispersat în 150 ml lichid de 2-6 ori/zi.
Cind: Obstrucție intestinală (ileus) posibilă sau existentă. Diabet necontrolat. Copii sub 12 ani.
A!: În cazul diabeticilor insulinodependenți poate fi necesară o reducere a dozei de insulină.
RA: Rar, reacții de hipersensibilitate.

MUCOFALK ORANGE *COD ATC: A06AC51*
DR. FALK GmbH; Gran. 1 plic (5 g gran.) conține Ispaghula husk (sin. Plantago ovata) 3,25 g ***(OTC)***

Ind: Constipație habituală (constipația funcțională cronică), afecțiuni în care se dorește o activare a peristaltismului și o înmuiere a bolului fecal: fisuri anale, hemoroizi, după chirurgia rectală sau anală și în timpul sarcinii; ca tratament de întreținere în diareea de diverse etiologii și în sd. colonului iritabil. Ca trat. asociat în diverticuloza colonului și ca adjuvant în maladia Crohn.
Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* un plic dispersat în 150 ml lichid de 2-6 ori/zi.
Cind: Obstrucție intestinală (ileus). Diabet necontrolat. Copii sub 12 ani.
A!: În cazul diabeticilor insulinodependenți poate fi necesară o reducere a dozei de insulină.
RA: Rar reacții de hipersensibilitate.

N

NATURLAND CALLEDDULA BALM
NATURLAND; Ung. Cu extract uleios de gălbenele și mușețel 6 g, betacaroten 50 mg; alfa-tocoferol 50 mg ***(OTC)***

Ind: Nutritivă, emolientă, hidratantă, reduce procesul de îmbătrânire a pielii.
Dz: Se aplică pe piele și se masează până la absorbția completă.

NATURLAND SPORTS KREM
NATURLAND; Cremă cu Aetheroleum Rosmarini 1 g + Aethe. Eucalipti 2 g + camphora 2 g + mentholum 1,5 g + Revitalin + 1 g acetat tartric de aluminiu ***(OTC)***

Ind: Adjuvant în trat. bronșitelor, rinitelor, guturaiului.
Dz: Se aplică pe piele (piept și spate) și se masează ușor.
CI: Copii sub 6 luni.

NATURLAND INNO-RHEUMA
NATURLAND; Sol. ext. cu Aetheroleum Rosmarini 1 g + Aethe. Lavandulae 2 g + menthol 0,5 g/100 g produs ***(OTC)***

Ind: Dz: vezi NATURLAND SPORTS KREM.

NORMODIAB *COD ATC: A10XN*

C.C.P.P.M. PLANTAVOREL; Cpr. cu pulberi vegetale din: Vaccinum myrtillus, Morus alba et nigra, Phaseolus vulgaris, Betula verrucosa, Juglans regia, extr. de Vaccinum myrtillus ***(OTC)***

Ind: În trat. diabetului zaharat insulino-independent (tip II) cu sau fără exces ponderal. Prin acțiunea sa preponderent periferică, produsul poate fi asociat insulinoterapiei în diabetul zaharat insulino-dependent (tip I) inducând o mai bună echilibrare a bolii.
Dz: Int: 2-6 cpr./zi astfel: *la diabeticii cu glicemia à jeun între 120-150 mg/dl* - 2 cpr./zi, în timpul meselor principale; *la diabeticii cu glicemia à jeun între 150-200 mg/dl* - 4 cpr./zi, câte 1 cpr. în timpul meselor principale și unul la gustarea de la ora 11; *la diabeticii cu glicemia peste 200 mg/dl* - 6 cpr./zi, câte 2 cpr. în timpul celor trei mese principale. *Pentru persoanele cu diabet zaharat insulino-dependent (tip I),* se asociază tratamentului cu insulină, în timp se poate constata reducerea necesarului de insulină utilizat.

NORMOPONDEROL *COD ATC: XNF*

C.C.P.P.M. PLANTAVOREL; Cpr. cu extr. de Rhamnus frangula, Capsella bursa-pastoris, Taraxacum off., Betula verrucosa, Cichorium intybus, Aeth. Foeniculi ***(OTC)***

Ind: Obezitate, constipație cronică.
Dz: Int: În obezitate, *pentru persoanele cu greutate sub 70 kg* – 3 cpr.; *pentru persoanele cu greutate peste 70 kg* – 4 cpr., în doză unică, seara după orele 19, timp de 14 zile. În timpul curei se va respecta cât mai strict un regim igieno-dietetic, hipocaloric. Se vor consuma trei mese pe zi, evitându-se consumul de alimente între mese. Cura va fi repetată după o pauză de 30 zile, perioadă în care se va respecta în continuare regimul igieno-dietetic. Se pot face 3-4 serii de trat. pe an. În caz de constipație cronică, se vor adm. 3-4 cpr. seara, la culcare, în doză unică, timp de 7 zile, după care încă 7 zile câte 3 cpr.
Cind: Vârstnici. Sarcină și alăptare.
RA: Congestie pelvină, meteorism, dureri abdominale.

O

ODOURLESS GARLIC *COD ATC: XNF*

STANLEY PHARMA Ltd.; Cps. gelatinoase cu 5 mg extr. de usturoi uscat ***(OTC)***
PHARMEX ROM IND.; Cps. gelatinoase cu 5 mg extr. de usturoi uscat ***(OTC)***

Ind: HTA, ATS, parazitoze intestinale. Profilaxia și tratamentul bolilor infecțioase.
Dz: 2-6 cps./zi, în timpul meselor sau după mese.
Cind: Sarcină și alăptare.
RA: Uneori greață sau dureri abdominale (minore și trecătoare).

OPTREX *COD ATC: S01GN01*
BOOTS; Sol. oft. 13% apă Hammamelis; fl. × 10 ml ***(OTC)***

Ind: Iritații oculare minore, datorate unor agenți externi (praf, fum).
Dz: *Adulți sau copii peste 3 ani,* instilații oculare de 6-8 ori/zi.

P

PERMINOX *COD ATC: G04CX02*
LAB. PIERRE FABRE; Cps. cu extr. lipidosterolic din Serenoa Repens ***(P-6L)***

Ind: Trat. hipertrofiei benigne de prostată.
Dz: 1 cps./zi administrată la aceeași oră, după masă.
RA: Foarte rar, tulburări gastrointestinale.

PLOPISAN *COD ATC: R05FB02*
MEDUMAN; Cpr. cu extr. fluid de muguri de plop ***(OTC)***

Ind: Afecțiuni ale căilor respiratorii: faringite, laringite, bronșite.
Dz: *Adulți:* 4-6 cpr./zi; *copii:* 2-3 cpr./zi; cpr. se sug.

PROPOSEPT *COD ATC: R02AA20*
XNA
ICPP APICULTURA; Cpr. cu propolis 0,10 g ***(OTC)***

Ind: Faringite, laringite, traheobronșite, tulburări dispeptice diverse.
Dz: Un cpr., supt sau înghițit, de 3-4 ori/zi, timp de 10-14 zile.

PROSTAMOL UNO® *COD ATC: G04CX02*
BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP; Cps. moi cu 320 mg extr. alcoolic purificat din fructe uscate de Serenoa repens 9-11:1 (raport plantă: extract) ***(OTC)***

Ind: Tulburări de micțiune în adenomul de prostată stadiile I și II.
Dz: 1 cps./zi administrată la aceeași oră, după masă.
A!: Adm. medicamentului pe stomacul gol poate provoca uneori greață.
RA: Foarte rar, tulburări gastrointestinale.

PYCNOGENOL
BIOFARM SA; Cpr. cu 0,020 g extract din scoarță de pin maritim, fl. × 30 cpr.; fl. × 60 cpr. ***(OTC)***

Ind: Prevenirea cancerului, a bolilor coronariene și cerebrovasculare îndeosebi la persoanele cu risc crescut (fumători, persoane expuse poluării și stresului) și prevenirea îmbătrânirii precoce. Toate afecțiunile în care sunt implicați radicalii

liberi: afecțiuni reumatismale, ateroscleroză, flebită, varice, hemoroizi, edeme, psoriazis, retinopatie diabetică, stări alergice (în special rinită și conjunctivită alergică). Datorită acțiunii de refacere a punților de colagen din tegument este considerat un cosmetic intern. Stimularea imunității.
Dz: În general între 0,5 - 3 mg/kg greutate corporală/zi și depinde de indicație. În general, pentru un adult de 70 kg se recomandă 4-5 comprimate/zi în primele 10 zile, iar apoi 1-3 comprimate zilnic.

R

REGULAX®
KREWEL MEUSELBACH GmbH.; Cub masticabil 100 g conțin pulb. frunze de Senna: 8,4 g + pulb. de fructe de Senna 3,6 g ***(OTC)***

Ind: Constipație cu defecații rare sau/și cu scaune de consistență crescută, motilitate intestinală scăzută.
Dz: *Adulți:* 1 cub seara, la culcare, *Copii peste 12 ani:* 1/4 -1/2 cub, mestecându-se bine. Maxim 14 zile.
Cind: Ocluzie intestinală, boli inflamatorii acute ale intestinului, dureri abd. de etiologie necunoscută, copii sub 12 ani.

REMOTIV *COD ATC: N06XN1*
EWOPHARMA; Cpr. film. 250 mg extract uscat de Hyperici herba; ct. × 2 blist. × 15 cpr. film. ***(OTC)***

Ind: Adjuvant în: tulburări neurovegetative; tulburări depresive de intensitate ușoară/medie; anxietate
Dz: *Adulți:* 1 comprimat filmat de două ori pe zi, dimineața și seara, administrarea făcându-se cu o cantitate de lichid (un pahar mare cu apă), de preferință în timpul mesei sau după aceasta; comprimatele nu trebuie sfărâmate. *Vârstnici:* dozele sunt identice ca pentru adulți. Trebuie administrat cel puțin 14 zile pentru a se instala efectul terapeutic. Se recomandă un tratament pe o durată de 4-6 săptămâni. Utilizarea în cazul tulburărilor depresive necesită avizul medicului de specialitate.
Cind: Hipersensibilități cunoscute la substanță activă sau oricare dintre excipienți. Tratament concomitent cu: anticoagulante orale, ciclosporină, antiretrovirale inhibitoare ale proteazei și inhibitori nonnucleozidici ai revers transcriptazei.
A!: Asocieri nerecomandate: cu digoxină, contraceptivele orale, teofilină, carbamazepină, fenitoină, antidepresivele inhibitoare ale recaptării serotoninei, antimigrenoase din familia triptanilor. Foarte rar și mai ales în cazul persoanelor cu tegumente deschise la culoare au fost semnalate reacții de tipul înroșirea pielii, aceasta apărând după administrare urmată de o expunere la soare. În astfel de cazuri tratamentul trebuie întrerupt. Prudență la pacienți cu insuficiență renală, hepatică, intoleranță la lactoză. Atenție la conducători auto (poate produce amețeli).
RA: Amețeli, astenie uscaciunea gurii, simptome gastrointestinale, cefalee și transpirații. Dacă apar reacții cutanate de fotosensibilitate, trebuie întrerupt tratamentul și investigate simptomele apărute.

RHAMNOLAX *COD ATC: XNF*
C.C.P.P.M. PLANTAVOREL; Cpr. cu extr. de Rhamnus frangula, Cichorium intybus, Aetheroleum Foeniculi (OTC)

Ind: Constipație acută, constipație cronică.
Dz: Int: ca laxativ, 2-3 cpr. seara, la culcare, în doză unică, sau 2 cpr. de 2 ori/zi, timp de 14 zile; ca purgativ, 4-5 cpr. seara, în doză unică, 2-3 zile, după care se continuă cu 3 cpr./zi, până la 14 zile.
Cind: Hemoroizi, abdomen acut. Sarcină și alăptare.

RIXATIVE *COD ATC: A06AB56*
P.N. GEROLYMATOS; Pastă mere 45,8% + pulb. Senna 8,4% + gem prune 45,8% *(OTC)*

Ind: Combaterea constipației cronice, care nu răspunde la alte purgative. Pregătirea preoperatorie și cea a intestinului pentru examen radiologic sau endoscopic.
Dz: 1-2 lingurițe (12-24 mg Sennoside A+B) seara, înainte de culcare. Se începe cu o linguriță și se crește progresiv, în concordanță cu rezultatele obținute. În cazul pregătirii intestinului: 150 mg în după-amiaza zilei care precedă examenul radiologic sau endoscopic.
Cind: Inflamații severe ale intestinului, în suspiciune de ocluzie intestinală, în ileus paralitic, cât și în cazul pacienților cu dureri abdominale, greață sau vomă.

ROMAZULAN *COD ATC: D08AXN0*
BIOFARM SA; Sol. ext. cu ext. de Chamomillae flos 95,881g (azulene 0,037g) ct. × 1 fl. × 100 ml, ct. × 1 fl. × 50 ml *(OTC)*

Ind: Uz intern: folosit tradițional ca adjuvant pentru tratamentul simptomatic al unor tulburări digestive funcționale - distensie epigastrică, flatulență, digestie lentă, tulburări dispeptice. Uz extern: folosit tradițional în aplicații pe piele ca antiinflamator, emolient, antipruriginos și cicatrizant în caz de fisuri, ragade și înțepături de insecte; în aplicații locale pe mucoasă bucală sau faringiană în scop antiinflamator, analgezic și antiseptic; în aplicații locale în afecțiuni vaginale inflamatorii și pruriginoase.
Dz: *Uz intern:* 1/2 linguriță de soluție la o ceașcă de apă caldă. *Uz extern:* sub formă de comprese, gargară și irigații vaginale - 1/2 lingură de soluție la 1 l de apă.

RUMEYN *COD ATC: M02AX10*
LAB. RUMEYN TIMIȘOARA; Ung. cu extr. Phytolacca American *(OTC)*

Ind: Boli reumatismale articulare – cu caracter degenerativ (artroze), cu caracter inflamator (poliartrită reumatoidă, reumatism articular acut, spondilartrită anchilopoietică) – și abarticulare (mialgii, miozite, tendinite, tenosinovite, bursite, condrite, periartrite), artralgii posttraumatice, algii la nivelul cicatricelor, crampe musculare, stări sechelare după pareze și paralizii ale extremităților.

Dz: Aplicații locale în strat subțire pe zonele dureroase cu masaj blând, de 3-4 ori pe zi, 10-20 de zile.
Cind: Intoleranță la produs.
RA: Uneori pot apărea erupții eritematoase (rar buloase) locale care impun întreruperea tratamentului și curățirea zonei prin spălare cu apă.

S

SEDOCALM *COD ATC: XNF*
C.C.P.P.M. PLANTAVOREL; Cpr. cu extr. de Chelidonium majus, Hyssopus off., Origanum vulgare, Leonurus cardiaca, Crataegus monogyna, Tilia sp., Arnica montana, Aetheroleum Foeniculi ***(OTC)***

Ind: Stări de hiperexicitabilitate nervoasă, anxietate, distonie neurovegetativă, tulburări de climax. La persoanele care lucrează în condiții de stres, cu predispoziție la sindromul de suprasolicitare.
Dz: Int: *Adulți:* profilactic: 1-2 cpr./zi timp de 7 zile; curativ: 1-4 cpr./zi, timp de 14 zile.
Cind: hTA, afecțiuni renale grave.

SINUPRET *COD ATC: R02AA20*
BIONORICA; Dj. sau sol. orală cu 0,2 g R. Gentianae + 0,6 g Fl. Primulae + 0,6 g H. Rumicis + 0,6 g Fl. Sambucci + 0,6 g H. Verdenae 18 mg ***(OTC)***

Ind: Inflamații acute și cronice ale tractului respirator și ale sinusurilor (mucolitic și antibacterian).
Dz: *Adulți:* 50 pic. de 3 ori/zi sau 1-3 dj.; *Copii:* 25 pic. de 3 ori/zi.

SOD NATURAL *COD ATC: L03NX02*
INST. CANTACUZINO; Sol. orală cu suc de orz verde ***(OTC)***

Ind: Antiinflamator, hepatoprotector, radioprotector, energizant și în profilaxia proceselor de îmbătrânire.
Dz: *Adulți:* ca antiinflamator și hepatoprotector: se vor administra, int., timp de 30 zile, câte 2 f. pe zi (dimineața și seara); ca radioprotector: se vor administra, int., câte 2 f./zi, pe tot intervalul iradierii; ca energizant și în profilaxia proceselor de îmbătrânire: se va administra, int., câte o f. zilnic, timp de 90 zile. *Copii:* ca energizant, în imunodepresii, în diverse procese inflamatorii, în dermatoze: se vor administra, int., câte 2 f./zi, timp de 30 zile.

STIMUVEN *COD ATC: C05CXN1*
EXHELIOS SRL; Emulgel, cremă sau gel conținând la 100 g extr. selectiv de Helleborus 4 g, extr. fluid de castan 2 g ***(OTC)***

Ind: Ca trat. adjuvant local în afecțiuni ale sistemului circulator venos: varice, tromboze, tromboflebite, insuficiență venolimfatică cronică, ulcer de gambă,

senzația de picioare grele; inflamații și tumefieri dureroase de natură traumatică, luxații, entorse, contuzii, bursite, tendinite; dureri și inflamații de natură reumatică.
Dz: Aplicații locale în strat subțire pe zona afectată, de 2-3 ori/zi.
Cind: Hipersensibilitate la unul din componenții produsului.
A!: În tromboze și tromboflebite nu se face masaj.

T

TISASEN *COD ATC: A06AB06*
ICH HUNGARY CO. Ltd; Dj. cu 10 mg senozide A+B ***(OTC)***

Ind: Constipație acută, constipație cronică.
Dz: Laxativ: 2-3 dj. seara, la culcare, în doză unică, sau 2 dj. de 2 ori/zi, timp de 14 zile; ca purgativ, 4-5 dj. seara, în doză unică, 2-3 zile, după care se continuă cu 3 dj./zi, până la 14 zile.
Cind: Hemoroizi, abdomen acut. Sarcină și alăptare.

TUSOGAL *COD ATC: R05FB02*
LAB. PARACELSUS TIMIȘOARA; Sirop, fl. × 100 ml ***(OTC)***

Ind: Tuse spastică de diverse etiologii; tuse convulsivă.
Dz: *Adulți și copii peste 10 ani:* câte o linguriță de 3-4 ori/zi; *copii între 3-10 ani:* 1/2 linguriță de 3 ori/zi; *copii 1-3 ani:* câte 15-20 pic. de 3 ori/zi.
A!: Se adm. cu prudență la bolnavii cu emfizem pulmonar; la diabetici deoarece conține zahăr.

V

VENEN GEL *COD ATC: C05CXN1*
NATURAWEREN; Ung. cu 3 g extr. fluidum Hyppocastani + 0,4 g extr. Spissum calendulae ***(OTC)***

Ind: Sd. prevaricoase, fragilitate capilară, varice, tulburări trofice din cadrul sindromului varicos, limfedeme, dermite și ulcere varicoase, tromboflebite superficiale, hemoroizi.
Dz: Ung. se aplică de 1-3 ori/zi în strat subțire, masând ușor regiunea afectată.

VORIHEP *COD ATC: XNF*
C.C.P.P.M PLANTAVOREL; Cpr. cu extr. din Epilobium sp. ***(OTC)***

Ind: Hepatită cronică, pancreatită cronică, diskinezie biliară cronică nelitiazică, sd. dispeptic datorat disfuncției veziculei biliare.

Dz: Int: *Adulți:* 1-2 cpr., de 3 ori/zi cu 30 minute înaintea meselor, 20 zile pe lună, în monoterapie sau asociat terapiei uzuale. *Copii peste 3 ani:* jumătate din doza adulților.
Cind: Litiază biliară.

VOSEPTOL *COD ATC: A01AD11*
C.C.P.P.M PLANTAVOREL; Cpr. 0,5 g conținând: tinctură de propolis 0,02 g (0,006 g S.U.); ulei volatil de levanțică 0,002 g; ulei volatil de eucalipt 0,003 g; ulei volatil de mentă 0,003 g; ulei volatil de jneapăn 0,002 g; ulei volatil de cimbru 0,002 g; menthol 0,0025 g (fl. × 30, 40 sau 50 cpr.)

Ind: Laringite, faringite, alte leziuni bucale, stomatite, traheobronșite, astm bronșic și emfizem pulmonar.
Dz: *Adulți:* se sug 1-2 cpr. de 4-5 ori/zi, timp de minimum 5 zile; *copii:* 1 cpr. de 4-5 ori/zi minim 5 zile.
RA: Se pot produce alergii specifice la propolis și uleiuri volatile.

MONOGRAFII – PRODUSE HOMEOPATE

C

CEPHYL *COD ATC: XRNIT*
LAB. BOIRON; Cpr. cu Belladonna 4 CH 4 mg, Iris versicolor 4 CH 4 mg, Nux vomica 4 CH 4 mg, Spigelia 4 CH 4 mg, Gelsemium 4 CH 4 mg, etenzamidă 0,2 g, guaranină 0,040 g, acid acetilsalicilic 0,10 g ***(OTC)***

Ind: Trat. simptomatic al durerilor și stărilor febrile: cefalee, migrene, nevralgii, dureri dentare, reumatismale, sciatică, dismenoree, stări febrile.
Dz: Fiecare cpr. trebuie luat cu puțină apă, la începutul sau în timpul mesei. *Adulți:* 1-2 cpr. de 2-3 ori/zi. *Copii de la 3 la 7 ani:* 1/2 cpr. de 2-3 ori/zi. *Copii de la 8 la 15 ani:* 1 cpr. de 2-3 ori/zi.
Cind: Boli ulceroase gastro-duodenale; hipersensibilitate la salicilați; orice boală hemoragică constituțională sau dobândită; riscuri hemoragice. Sarcină - ultimul trimestru.
A!: Acest medicament conține un principiu activ ce poate induce o reacție pozitivă la testele practicate din cadrul controalelor antidoping.
RA: Iritație gastrică.

CICADERMA *COD ATC: XRNIT*
LAB. BOIRON; 100 g unguent conțin: Calendula officinalis plantă proaspătă 20,0 g, Hypericum perforatum plantă proaspătă 10,0 g, Achillea millefolium plantă proaspătă 10,0 g, Ledum palustre TM 1,5 g, Anemone pulsatilla TM 1,5 g ***(OTC)***

Ind: Arsuri de mică intensitate, eritem solar. Răni superficiale cu întindere mică: tăieturi mici, fisuri și crăpături ale pielii. Înțepături de insecte. Iritații ale pielii.
Dz: Se aplică în strat subțire la nivelul tegumentului afectat, după curățarea leziunilor care urmează a fi tratate. Se aplică de 1-2 ori pe zi, cu sau fără pansament, în funcție de gravitatea leziunilor cutanate.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componentele produsului.
A!: Hypericum perforatum influențează metabolizarea hepatică a unor substanțe medicamentoase: ciclosporina, digoxina, contraceptivele orale, teofilina, warfarina, indinavir. Având în vedere absorbția redusă în circulația sistemică, se consideră că adm. cutanată nu constituie un risc pentru acest tip de interacțiuni. Se recomandă prudență în cazul unor astfel de asocieri, în special în aplicații pe leziuni întinse. Datorită riscului de fotosensibilizare se evită expunerea la soare a zonelor pe care s-a aplicat.

CORYZALIA *COD ATC: XRNIT*
LAB. BOIRON; Dj. conțin: Allium cepa 3 CH, Belladonna 3 CH, Sabadilla 3 CH, Kalium bichromicum 3 CH, Gelsemium sempervirens 3 CH, Pulsatilla 3 CH, $\overline{aa}$ 0,333 mg ***(P-6L)***

Ind: Afecțiuni rinofaringiene, guturai, febra fânului, răceli, rinite în diferite stadii, rinite acute, rinite cronice, rinite alergice (în aceste cazuri se recomandă asocierea unui tratament de fond cu polen, histamină, psorinum etc.).
Dz: Se administrază un drajeu la fiecare oră. După ameliorarea simptomatologiei se mărește intervalul dintre administrări. Drajeurile nu se înghit (se sug).
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componentele produsului.

D

DOLICOCCIL 1000 *COD ATC: XRNIT*
DOLISOS; Granule, o doză conține: Anas barbariae hepatis et cordis 9 CH 0,01 ml, Cuprum gluconicum 3 DH 0,01 ml, Echinacea angustifolia 3 CH 0,01 ml ***(P-6L)***

Ind: Împotriva gripei (profilactic).
Dz: O doză de 2-3 ori/zi. Se lasă să se dizolve lent în cavitatea bucală, pe limbă sau sub limbă.

DR. THEISS NOVA FIGURA *COD ATC: XRNIT*
NATURAWAREN; Sol. hidroalcoolică, 100 ml conțin: Fucus 1 D, Aurum 8 D, Acidum phosphoricum 3 D, Convallaria 2 D, Pancreas 8 D, Syzygium 6 D, $\overline{aa}$ 6 ml; Ephedrin 2 D 20 ml, Frangula 2 D, Betula 1 D, Scilla 4 D, Lycopodium 4 D, Apocynum 4 D, Chelidonium 2 D, Crategus 1 D, Cimicifuga 2 D, Sulphur 6 D, Euphorbia 4 D, $\overline{aa}$ 2 ml; fl. × 50 ml ***(P-6L)***

Ind: Adj. în trat. obezității (stimulează catabolismul și diureza).
Dz: 5 pic. pe limbă, înaintea fiecărei mese. Între mese: 15 pic. în puțină apă. Se alternează cure și pauze de o săptămână.

DROSETUX *COD ATC: XRNIT*
DOLISOS; Sirop, conține Drosera rotundifolia 3 CH, Arnica montana 3 CH, Atropa belladonna 3 CH, Artemisia cina 3 CH, Coccus cacti 3 CH, Corallium rubrum 3 CH, Cuprum metallicum 3 CH, Ferrosi phosphas 3 CH, Uragoga sp. 3 CH, Solidago virga aurea 1 CH; fl. × 150 ml ***(P-6L)***

Ind: Tuse seacă, neproductivă.
Dz: *Adulți:* 1 linguriță de 2-3 ori/zi. *Copii sub 5 ani:* ½ linguriță de 3-4 ori/zi; cei *peste 5 ani:* 1 linguriță de 3-5 ori/zi.

G

GASTROCYNÉSINE *COD ATC: XRNIT*
LAB. BOIRON; Cpr. cu Abies nigra 4 CH, Carbo vegetabilis 4 CH, Nux vomica 4 CH, Robinia pseudoacacia 4 CH ***(P-6L)***

Ind: Dureri, pirozis, somnolență după mese, reflux gastroesofagian.
Dz: 1-2 cpr. cu un sfert de oră înaintea meselor principale. În cazul în care este necesar, se repetă adm. și după mese.
A!: Sarcină și alăptare.

H

HÉPATO-DRAINOL *COD ATC: XRNIT*
LAB. BOIRON; Sol. hidroalcoolică cu extr. de Hydrastis canadensis 6 CH, Silybum marianum 3 CH, Juglans regia 3 CH, Chelidonium majus 3 CH, Leptandra virginica 3 CH, Rana bufo 3 CH, Solubilis 6 CH, Berberis vulgaris 3 CH ***(P-6L)***

Ind: Tulburări hepato-biliare.
Dz: Se iau câte 20 de pic de 3 ori/zi cu un sfert de oră înaintea meselor.

HOMEOGENE 9 *COD ATC: XRNIT*
LAB. BOIRON; Cpr. cu extr. de Mercurius solubilis 3 CH, Pulsatilla 3 CH, Spongia tosta 3 CH, Bryonia 3 CH, Bromum 3 CH, Belladonna 3 CH, Phytolacca decandra 3 CH, Arum triphyllum 3 CH, Arnica montana 3 CH, aa 0,667 mg ***(OTC)***

Ind: Dureri de gât, laringite, răgușeli.
Dz: Se suge lent 1 cpr. la fiecare oră, între mese.

HOMEOPLASMINE *COD ATC: XRNIT*
LAB. BOIRON; 100 g unguent conțin: Calendula officinalis^{TM} 0,1 g, Phytolacca decandra^{TM} 0,3 g, Brionya dioica^{TM} 0,1 g, Benzoe^{TM} 0,1 g, acid boric 4,0 g și vaselină. ***(OTC)***

Ind: Tratamentul adjuvant al dermatitelor iritative.
Dz: Ung. se aplică în strat subțire, de 1-3 ori pe zi, pe tegumentul spălat în prealabil.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componentele produsului. Copii mai mici de 2 ani 1/2. Nu se aplică pe leziuni infectate sau care supurează.
A!: Datorită conținutului în acid boric, aplicarea pe mucoasele sau pielea lezată crește absorbția sistemică a substanței medicamentoase, putând determina apariția efectelor sistemice toxice la copii. Aceste efecte sunt mai periculoase dacă produsul se utilizează timp îndelungat sau în mod repetat, pe arii cutanate mari, sub pansament ocluziv, pe tegumente cu leziuni (arsuri), pe mucoase sau la copiii mici.

HOMEOVOX *COD ATC: XRNIT*
LAB. BOIRON; Un dj. conține: Aconitum napellus 3 CH, Arum triphyllum 3 CH, Ferrum phosphoricum 6 CH, Calendula officinalis 6 CH, Spongia tosa 6 CH, Belladonna 6 CH, Mercurius solubilis 6 CH, Hepar sulfur 6 CH, Kalium bichromicum 6 CH, Populus candicans 6 CH, Bryonia dioica 3 CH, în părți egale a 0,091 mg ***(P-6L)***

Ind: Afectarea corzilor vocale manifestată în special prin răgușeală, oboseala corzilor vocale, afonie, laringită.
Dz: Profilaxie: 2 dj. de 5 ori/zi. Tratament: 2 dj. la fiecare oră, între mese. După ameliorarea simptomatologiei se crește intervalul dintre doze. Drajeurile se sug.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componentele produsului.

M

MASTODYNON *COD ATC: XRNIT*
BIONORICA; Sol. hihroalcoolică, 100 ml conțin: Agnus castus 1 D 200 mg, Caulophyllum thalictroides 4 D 100 ng, Cyclamen 4 D 100 mg, Ignatia 6 D 100 mg, Iris 2 D 200 mg, Lilium tigrium 3 D 100 mg, Lupulinum 8 D 100 mg, tinct. Condurago 100 mg ***(P-6L)***

Ind: Mastodinie, mastopatie fibrochistică, sindrom premenstrual, tulburări datorate insuf. luteinice temporale sau permanente, infertilitate prin insuficiență de corpus luteum.
Dz: 30 picături cu puțină apă, de 2 ori/zi, timp de 3 luni.

O

OSCILLOCOCCINUM *COD ATC: XRNIT*
LAB. BOIRON; Globule homeopatice cu autolizat filtrat de ficat și inimă de Anas Barbariae (rață sălbatică) dinamizat la a 200-a K ***(OTC)***

Ind: Gripă, stări gripale.
Dz: Este cu atât mai eficace cu cât este luat mai devreme, odată cu primele simptome ale stării gripale, având astfel o acțiune mai rapidă. Mod de adm: Se

ține sub limbă până la topire conținutul unui tub-doză. Pentru *sugari,* se lasă să se topească conținutul unui tub-doză în puțină apă și se adm. cu lingurița sau biberonul. Se adm. cu un sfert de oră înaintea mesei sau la o oră după. Trat. preventiv: 1 doză pe săptămână în perioada de expunere la gripă, în tot sezonul rece. Stare gripală la debut: 1 doză cât mai devreme posibil, repetând tratamentul eventual de 2-3 ori din 6 în 6 ore. Stare gripală declarată: 1 doză dimineața și seara 1-3 zile.

OSTÉOCYNÉSINE *COD ATC: XRNIT*

LAB. BOIRON; Cpr. cu Calcarea ostreica 3 DH, Calcarea fluorica 3 DH, Calcarea phosphorica 3 DH, Sulfur iodatum 4 DH ***(OTC)***

Ind: Decalcifieri, tulburări de creștere la copii, consolidarea fracturilor, convalescență. Asociere posibilă cu trat. hormonal clasic în perioadele de pre- sau postmenopauză.
Dz: 2 cpr. de 2-3 ori/zi.

P

PARAGRIPPE *COD ATC: XRNIT*

LAB. BOIRON; 1 cpr. conține: Arnica montana 4 CH, Belladonna 4 CH, Eupatorium perfoliarum 4CH, Gelsemium 4 CH, Sulfur 5 CH în părți egale a 0,6 mg ***(P-6L)***

Ind: Stări gripale, începând de la primele semne și simptome: frisoane, curbatură, febră, cefalee.
Dz: 2 cpr., adm. la 1-2 ore. După ameliorarea simptomatologiei se mărește intervalul dintre doze. Cpr. se sug sau pot fi adm. oral sfărâmate și dizolvate în puțină apă.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului.

S

SEDATIF PC *COD ATC: XRNIT*

LAB. BOIRON; 1 cpr. conține: Aconitum napellus 6 CH 0,5 mg, Belladonna 6 CH 0,5 mg, Calendula officinalis 6 CH 0,5 mg, Abrus precatorius 6 CH 0,5 mg, Chelidonium majus 6 CH 0,5 mg, Viburnum opulus 6 CH 0,5 mg **(OTC)**

Ind: Stări de anxietate, emotivitate accentuată, iritabilitate. Tulburări de somn, în special la pacienții surmenați, copii agitați și persoane vârstnice.
Dz: 2 cpr. de 3 ori/zi. Cpr. se sug. În cazul tulburărilor de somn se urmează trat., pe timpul zilei iar seara, înainte de culcare, se adm. alte 2 cpr.

STODAL *COD ATC: XRNIT*
LAB. BOIRON; Sirop, gran. cu extr. de Anemone pulsatilla 6 CH 0,95 g, Rumex crispus 6 CH 0,95 g, Bryonia dioica 3 CH 0,95 g, Ipecacuahna 3 CH 0,95 g, Spongia tosta 3 CH 0,95 g, Sticta pulmonaria 3 CH 0,95 g, Antimonium tartaricum 6 CH 0,95 g, Myocarde 6 CH 0,95 g, Coccus cacti 3 CH 0,95 g, Drosera TM 0,95 g, Sirop de Tolu 19 g, Sirop de Polygala 19 g (OTC)

Ind: Tuse de orice origine, laringite, traheite, bronșite.
Dz: *Adulți:* 1 lingură de 3 până la 5 ori/zi. *Copii:* 1 linguriță de 3 până la 5 ori/zi.

TINCTURI MAMA

ACONITUM NAPELLUS PLANTEXTRACT SRL
AGNUS CASTUS PLANTEXTRACT SRL
ALANTHUS GLANDULOSE PLANTEXTRACT SRL
ALLIUM SATIVUM PLANTEXTRACT SRL
AMYGDALAE AMARAE PLANTEXTRACT SRL
ANAMIRTA COCCULUS PLANTEXTRACT SRL
APIS MELLIFICA PLANTEXTRACT SRL
AQUILEGIA VULGARIS PLANTEXTRACT SRL
ARTEMISA ABSINTHIUM PLANTEXTRACT SRL
BETULA VERRUCOSA PLANTEXTRACT SRL
CETRARIA ISLANDICA PLANTEXTRACT SRL
CLEMATITIS ERECTA PLANTEXTRACT SRL
COLA PLANTEXTRACT SRL
DELPHINIUM CONSOLIDA PLANTEXTRACT SRL
DIGITALIS PURPUREA PLANTEXTRACT SRL
EUPHORBIA CYPARISSIAS PLANTEXTRACT SRL
GINSENG PLANTEXTRACT SRL
HYDRASTIS CANADENSIS PLANTEXTRACT SRL
IGNATIA AMARA PLANTEXTRACT SRL
JABORANDI PLANTEXTRACT SRL
JUNIPERUS SABINA PLANTEXTRACT SRL
MEDICAGO SATIVA PLANTEXTRACT SRL
TINCTURA MAMA 2 HAB (*4); 2 HAB (*5); 3 HAB (*3) PLANTEXTRACT SRL.
TUSSILAGO FARFARA PLANTEXTRACT SRL

MONOGRAFII – PREPARATE ȘI SUBSTITUENȚI DE SÂNGE

MONOGRAFII – PREPARATE ȘI SUBSTITUENȚI DE SÂNGE

A

ALBUMINĂ UMANĂ 20% *COD ATC: B05AA01*

KAMADA Ltd.; Sol. inj. i.v. de albumină umană 20%; fl. × 50 ml sau 100 ml ***(S)***

CENTEON PHARMA; Sol. inj. i.v. de albumină umană 20% ***(S)***

HUMAN SERUM PROD & MEDICINE MANUFACTURING CO; Sol. inj. i.v. de albumină umană 20% ***(S)***

OCTAPHARMA; Sol. inj. i.v. de albumină umană 20% ***(S)***

FARMA BIAGINI SPA; Sol. inj. i.v. de albumină umană 20% ***(S)***

LAB. FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DE BIOTECH.; Sol. inj. i.v. de albumină umană 20% ***(S)***

BIOMEDX GROUP; Sol. inj. i.v. de albumină umană 20% ***(S)***

Ind: Trat. de urgență al șocului și în alte situații care impun refacerea rapidă a volumului sanguin; stări de hipoproteinemie cu sau fără edeme; în arsurile grave pentru a preveni hemoconcentrația.
Dz: În perf. i.v., inițial 500 ml, se repetă la nevoie; se folosesc sol. încălzite la temperatura corpului.
Cind: Anemie gravă, IC, alergie specifică.
A!: Prudență la bolnavii cu rezervă cardiacă mică sau hipertensivi (viteza perfuziei să nu depășească 100 ml/oră) și în caz de traumatisme (atenție la sângerare).
RA: Rareori greață, vomă, salivație, febră; dacă dozele sunt excesive sau în caz de deficit de pompă cardiacă poate provoca supraîncărcare circulatorie, chiar EP.

ANTIHAEMOPHILI C FACTOR *COD ATC: B02BD02*

BAXTER HEALTHCARE CO.; Pulb. liofilizată reprezentând Factorul VIII de coagulare + solv. diluare ***(S)***

Ind: Profilaxia și trat. hemoragiilor în: hemofilia tip A (deficiență genetică de Factor VIII), deficiență de Factor VIII dobândită, trat. pacienților cu anticorpi la Factorul VIII.
Dz: Doza inițială: unități necesare = greutate (kg) × procentul (%) de creștere dorit × 0,5. Este posibil să fie necesare doze mai mari decât cele calculate. În terapia de substituție, în cazul intervențiilor chirurgicale majore se monitorizează activitatea Factorului VIII din plasmă. Profilaxia îndelungată a hemoragiilor la pacienții cu hemofilie tip A severă necesită adm. 10-50 UI de Factor VIII/kg la 2-3 zile. După adm. conc. de Factor VIII la hemofilici, este absolut necesară testarea anticorpilor pentru Factorul VIII. Pentru hemofilia inhibitorie este necesară aplicarea unei terapii specifice.
Cind: La pacienții cunoscuți cu reacții alergice la componentele preparatului.

A!: Dacă preparatul se folosește în terapia la domiciliu trebuie urmate cu strictețe instrucțiunile medicului. Sarcină și alăptare. Când frecvența inj. este mare sau se adm. doze foarte mari (în cazul prezenței inhibitorilor specifici ai Factorului VIII), primitorii având grupele sanguine A, B sau AB trebuie monitorizați pentru semne ale hemolizei.
RA: Rar, reacții alergico-anafilactice sau stare febrilă. Pot apărea în cazuri rare, inhibitori ai Factorului VIII. Adm. de produse din sânge uman poate duce la transmiterea de boli infecțioase datorită preluării unor factori infecțioși – unor agenți patogeni de natură necunoscută până în prezent, cum ar fi cei ai hepatitei non-A și non-B.

ANTITHROMBIN III IMMUNO *COD ATC: B01AB02*
BAXTER A.G.; Pulb. liofil. 1 ml de soluție reconstituită conține: antitrombină (AT) III 50 UI corespunzătoare la activitatea antitrombină III în 1 ml de plasmă umană normală, proaspătă. ***(S)***

Ind: Se adm. la pacienții care au o activitate plasmatică de antitrombină III sub 70% față de normal, pentru profilaxia și tratamentul tulburărilor trombolitice sau tromboembolice. În proceduri chirurgicale sau sarcină și travaliu la pacienți cu deficiență congenitală de antitrombină III; lipsa de răspuns sau răspuns inadecvat la heparină; existența sau riscul de coagulare intravasculară diseminată (ex. traume multiple); complicații septice, șoc, preeclampsie și alte tulburări asociate cu coagulopatie acută; existența sau riscul de tromboză la pacienți cu sindrom nefrotic sau boli inflamatorii intestinale; intervenții chirurgicale sau hemoragie la pacienții cu afecțiuni grave hepatice, mai ales atunci când pacienții sunt tratați cu concentrate de factori coagulanți.
Dz: Inițial, trebuie determinată act. AT III, în vederea calculării dozei. *Coagulare intravasculară diseminată:* Doza inițială trebuie să ridice nivelul plasmatic la limite normale (80=120%). Doze adiționale sunt necesare ori de câte ori activitatea AT III a scăzut sub 70%.1 UI AT III/kg = creștere nivelul plasmatic de antitrombină III cu 1%. *Alte deficiențe de antitrombină III:* doza inițială de 1 500 UI și doza de întreținere ½ din doza inițială, la 8-24 ore. Dozarea trebuie ajustată la nevoile individuale, care se estimează pe baza formulei: 1 UI AT III/kg = creștere nivelul plasmatic de AT III cu 2%
A!: În cazul adm. preparatelor din sânge uman, nu pot fi total excluse unele boli infecțioase datorate transmiterii de agenți infecțioși. Se recomandă monitorizarea regulată a timpului parțial de activare a tromboplastinei și ajustarea corespunzătoare a dozei de heparină, în orice terapie combinată cu heparină (efectul antitrombinei III este potențat de heparină; deficiența severă de AT III reduce semnificativ efectul heparinei. Vaccinarea trebuie abordată cu atenție.
RA: Uneori reacții anafilactoide sau anafilactice (febră, erupții pruriginoase, greață, amețeli, dispnee, șoc anafilactic) care necesită întreruperea terapiei de substituire.

B

BERIATE P *COD ATC: B02BD02*
CENTEON PHARMA; Pulb. liofilizată reprezentând Factorul VIII de coagulare, având o activitate specifică de coagulare (F VIII:C) de 250 UI, 500 UI sau 1 000 UI ***(S)***

Ind: Profilaxia și trat. hemoragiilor în: hemofilia tip A (deficiență genetică de Factor VIII), deficiență de Factor VIII dobândită, trat. pacienților cu anticorpi la Factorul VIII.
Dz: Doza inițială: unități necesare = greutate (kg) × procentul (%) de creștere dorit × 0,5. Este posibil să fie necesare doze mai mari decât cele calculate. În terapia de substituție, în cazul intervențiilor chirurgicale majore se monitorizează activitatea Factorului VIII din plasmă. Profilaxia îndelungată a hemoragiilor la pacienții cu hemofilie tip A severă necesită adm. 10-50 UI de Factor VIII/kg la 2-3 zile. După adm. conc. de Factor VIII la hemofilici, este absolut necesară testarea anticorpilor pentru Factorul VIII. Pentru hemofilia inhibitorie este necesară aplicarea unei terapii specifice.
Cind: La pacienții cunoscuți cu reacții alergice la componentele preparatului.
A!: Dacă preparatul se folosește în terapia la domiciliu trebuie urmate cu strictețe instrucțiunile medicului. Sarcină și alăptare. Când frecvența inj. este mare sau se adm. doze foarte mari (în cazul prezenței inhibitorilor specifici ai Factorului VIII), primitorii având grupele sanguine A, B sau AB trebuie monitorizați pentru semne ale hemolizei.
RA: Rar, reacții alergico-anafilactice sau stare febrilă. Pot apărea în cazuri rare, inhibitori ai Factorului VIII. Adm. de produse din sânge uman poate duce la transmiterea de boli infecțioase datorită preluării unor factori infecțioși – unor agenți patogeni de natură necunoscută până în prezent, cum ar fi cei ai hepatitei non-A și non-B.

BERIGLOBIN P *COD ATC: J06BA01*
CENTEON PHARMA; Sol. inj. 1 ml conține proteină umană 160 mg, imunoglobuline minim 95%, anticorpi pentru virusul Hepatitei A minim 100 UI; fl. × 2 ml sau 5 ml ***(S)***

Ind: Profilaxie pentru: hepatita A, înaintea expunerii la sursa de contaminare sau în 2 săptămâni de la expunere; pojar sau reducerea efectului infecției cu virusul pojarului, pentru persoanele care nu au depășit cu o săptămână perioada expunerii când nu poate fi adm. Ig specifică pojarului. Terapia mucozitei radiogenice. Substituție în: sindromul deficienței primare sau secundare a anticorpilor rezultată din sinteza incompletă a anticorpilor hipogammaglobulinemie tranzitorie prelungită în special în cazul sugarilor născuți prematur.
Dz: *Profilaxia Hepatitei A:* Călătorii în zone endemice: pentru o durată mai mică de 3 luni, 0,02 ml/kg, iar pentru o durată mai mare 0,06 ml/kg. Pentru persoanele în contact cu pacienți având Hepatită A: 0,02 ml/kg în cazul unei expuneri prelungite, inj. trebuie repetată după 6-8 săptămâni. *Profilaxia pojarului:* 0,25 ml/kg, în cazul în care expunerea s-a încheiat cu mai puțin de o săptămână înainte 0,05 ml/kg în cazul copiilor cu dereglări imune expuși la pojar. *Terapia mucozitei radiogenice:* La începutul terapiei 10 ml, după 2 zile 5 ml și după alte 2 zile 5 ml. *Substituția în sindromul deficienței anticorpilor* 0,66 ml/kg la fiecare 3-4 săptămâni, cu o doză dublă la începutul terapiei. *Hipogammaglobulinemie trecătoare prelungită:* în special în cazul sugarilor născuți prematur - 5 ml la interval de 4 săptămâni până când valorile de IgG ating nivelul normal pentru vârsta respectivă. Prod. se inj. încet, doar i.m. (mușchi fesier). În cazul în care sunt necesare doze mari este recomandabilă adm. lor în etape divizate. Aceasta este valabilă în cazul dozelor mai mari de 2 ml pentru persoane până la 20 kg și a dozelor mai mari de 5 ml pentru persoane ce depășesc greutatea de 20 kg.

Cind: La pacienții cu trombocitopenie severă sau orice formă de dereglare de coagulare în cazul căreia este contraindicată adm. i.m. Hipersensibilitate la produsele conținând Ig analogă, în special în cazul pacienților cu deficiență IgA și prezența simultană a anticorpilor pentru IgA.
AI: Pacienții trebuie ținuți sub observație cel puțin 20 de minute după adm. A nu se injecta intravascular! O injecție intravasculară poate cauza simptome asemănătoare stărilor de șoc în special în cazul sindromului deficienței anticorpilor. De aceea se recomandă ca pistonul seringii să fie retras înaintea injectării pentru a se verifica dacă vârful acului nu a străpuns un vas de sânge. În urma adm. Ig este necesar un interval de cel puțin 3 luni înaintea folosirii vaccinurilor parenterale cu viruși vii (ex.: oreion, pojar, rubeolă și vaccinurile combinate corespunzătoare, ca și vaccinul pentru varicelă). Nu este necesar un interval intermediar în cazul următoarelor vaccinuri: vaccinuri cu viruși vii pentru administrare pe cale bucală (ex: împotriva poliomielitei, a febrei tifoide); vaccinuri conținând agenți patogeni inactivați (ex.: gripa, TBE, rabie, tuse convulsivă, vaccinuri HIB) sau vaccinuri toxoide (ex.: difterie, tetanus și vaccinurile combinate corespunzătoare). Când se efectuează teste pentru anticorpi, trebuie să se ia în considerare cantitatea de Ig adm., durata de timp dintre adm. Ig și sensibilitatea metodelor de testare.
RA: Pot să apară dureri locale și sensibilitate pe suprafața injectată. Ocazional, creșterea temperaturii, reacții cutanate și frisoane. În cazuri foarte rare s-au observat amețeli, stări de vomă, indispoziție, dureri de cap și dificultăți respiratorii, ca și reacții cardiovasculare și reacții alergice/anafilactice. În cazuri izolate, simptome ajungând până la stări de șoc, pot să apară dacă produsul este adm. intravascular. În cazul adm. produselor medicale preparate din plasmă umană sau sânge nu pot fi excluse în totalitate bolile infecțioase datorate transmiterii agenților infecțioși.

BERININ P 600 UI *COD ATC: B02BD04*
CENTEON PHARMA; Pulb. liofilizată și îmbogățită cu 600 UI factor IX de coagulare *(S)*

Ind: Profilaxia și terapia hemoragiilor în hemofilia B și afecțiuni asociate cu deficit de factor IX.
Dz: Doza de administrare depinde de severitatea deficienței de factor IX, de mărimea și localizarea sângerării. Doza de factor IX de adm. se estimează astfel: 1 UI/kg conduce la o mărire a activității factorului IX de circa 0,8% din activitatea normală. Uneori este necesară adm. unei doze mai mari decât cele obișnuite. În special în cazul intervențiilor chirurgicale majore, este esențial ca terapia de substituție să fie monitorizată cu ajutorul testelor de coagulare. Efectul terapeutic nu poate fi obținut dacă în sânge există anticorpi antiFactor IX.
RA: Rar reacții alergice, hipervolemie și febră. În cazul pacienților cu sensibilitate de tip alergic cunoscută, este necesară adm. profilactică a antihistaminicelor și a corticosteroizilor. Nu este total exclusă ipoteza transmiterii maladiilor infecțioase, prin transmiterea agenților infecțioși. Aceasta se aplică și în privința celor de natură necunoscută până acum, cum ar fi hepatitele non-A și non-B.

BERIPLAST HS COMBI SET *COD ATC: B02BC*
CENTEON LLC; Conc. liof. de fibrinogen, sol. de aprotinină, conc. liof. de trombină (umană), sol. clorură de calciu *(S)*

Ind: Numai local, în orice disciplină chirurgicală, inclusiv cele endoscopice, ca: adeziv tisular, suport pentru suturi chirurgicale, hemostază, cicatrizarea plăgilor, reducerea cavităților nefiziologice (inclusiv în spațiul subarahnoidian). Realizarea hemostazei în trat. endoscopic al ulcerului gastroduodenal sângerând.
Dz: Volumul ce va fi adm. și frecvența aplicării vor fi adaptate necesităților clinice ale pacientului. Dozele depind de tipul intervenției chirurgicale, extensia suprafeței de acoperit sau de volumul cavității ce trebuie redusă. Dozele individuale variază: 0,5-4 ml. Pentru anumite situații clinice (traumatisme hepatice, arsuri extinse), sunt necesare doze mai mari (10 ml sau mai mult). Înainte de aplicare, suprafața respectivă trebuie să fie cât se poate de uscată.
Aplicarea separată a soluției de fibrinogen și a soluției de trombină: se aplică soluția de fibrinogen și imediat se acoperă cu soluția de trombină, țesuturile se fixează în poziția dorită pentru câteva minute, până la realizarea adeziunii tisulare. *Aplicarea concomitentă cu dispozitivul Panaject:* Pentru realizarea aplicării simultane a soluțiilor de fibrinogen și trombină, se poate folosi dispozitivul de aplicare existent în trusă. Pentru acoperirea suprafețelor mari, adezivul cu fibrină poate fi repartizat în strat subțire și omogen cu ajutorul vârfurilor spray existente în kit, sau utilizat în combinație cu un înveliș de colagen. Distanța optimă de adm. este de 10-20 cm.
Cind: Hemoragie importantă venoasă sau arterială; aceste cazuri necesită măsuri specifice. Hipersensibilitate cunoscută la proteine bovine.
A!: Se adm. exclusiv local. Nu va fi sub nici un motiv adm. intravascular! În cazul apariției reacțiilor de tip alergic/anafilactic, se întrerupe imediat adm. și se instituie trat. necesar. Se vor administra: în cazul unor reacții medii: corticosteroizi și antihistaminice; în cazul unor reacții severe: adrenalină (lent i.v.), corticoizi doze mari (lent i.v.), reechilibrare volemică și/sau oxigen. Atenție ca porțiunile de țesut din afara ariei de aplicare să fie suficient de bine protejate, pentru a preveni realizarea adeziunii în zone nedorite. La inj. locală în trat. endoscopic al sângerărilor gastrointestinale distrucțiile tisulare care pot apărea, pot duce la formarea hematoamelor intramurale. Sarcină și alăptare. Prod. poate fi afectat de expunerea la soluții conținând alcool, ioduri sau metale grele (ex. soluții antiseptice).
RA: Rar, reacții de hipersensibilitate sau de tip alergic (ex. dispnee, eritem, urticarie, hTA) mergând în extrem de rare cazuri până la șoc anafilactic.

BERIRAB P *COD ATC: J06BB05*
CENTEON PHARMA; Sol. inj. i.m.; 1 ml conține: Ig umană 100-170 mg, cu anticorpi antirabici min. 150 UI, glicină 22,5 mg ***(S)***

Ind: Profilaxia rabiei datorată tuturor rănilor provocate de animale sălbatice sau domestice, cunoscute sau suspecte de a avea rabie (inclusiv mușcături provocate de lilieci având virusul Duvenhage), precum și după contactul mucoaselor sau al pielii, îndeosebi al pielii având leziuni, cu saliva unor astfel de animale. Va fi adm. numai în corelație cu vaccinarea antirabică.
Dz: O doză unică de 20 UI/kg corp, exclusiv inj. i.m. Se adm. la temperatura corpului, de preferință intragluteal (mușchiul fesier), în poziția culcat a pacientului. Dacă sunt necesare doze totale relativ mari se recomandă adm. divizată, ca în cazul unor doze ce depășesc 2 ml la copiii până la 20 kg, sau peste 5 ml la persoane având peste 20 kg greutate corporală. A nu se inj. i.v.! Din doza calculată, jumătate se injectează în jurul rănii, i.m. și/sau de preferință în zona afectată. Restul dozei se introduce în partea anterioară a mușchiului fesier.

Protecția împotriva rabiei nu poate fi asigurată numai de Ig specifică. Este esențial ca aceasta să fie adm. în combinație cu vaccinul antirabic, dar în altă parte a corpului. La inocularea vaccinului este obligatorie respectarea indicațiilor din prospectul acestuia. Ig trebuie adm. de preferință în ziua rănirii contactului, în același timp cu prima doză de vaccin antirabic. Dacă profilaxia simultană nu este posibilă, în cazul că vaccinul a fost adm. la intervalele prescrise, Ig va fi adm. în cea de-a 8-a zi după prima inj. cu vaccinul antirabic.

Cind: Nici una, având în vedere prognosticul fatal al manifestărilor clinice ale rabiei unde este esențială legătura între imunizarea activă și adm. ulterioară de anticorpi. Dacă pacientul este hipersensibil la componentele produsului trebuie luate măsurile de precauție necesare.

A!: După adm. de Ig trebuie respectat un interval de minimum 3 luni înaintea adm. de vaccinuri cu viruși activi (ex. parotidită epidemică, rujeolă, rubeolă sau combinații ale acestora, precum și vaccinul varicelei). Nu este necesar acest interval în cazul adm. orale a vaccinurilor (în poliomielită, febră tifoidă), a vaccinurilor conținând agenți patogeni inactivi (gripă), sau a celor de tip toxoid (difterie, tetanus și combinații de vaccinuri).

RA: Ocazional pot apărea: edem la locul inj., reacții cutanate și stare febrilă. Foarte rar au fost observate reacții de: greață, vomă, tulburări cardiovasculare (tahicardie, bradicardie, hTA, transpirație, amețeli) și reacții alergice (eritem, urticarie), dispnee, iar în cazuri izolate chiar stare de șoc. În cazuri speciale, inj. i.v. neintenționată poate duce la apariția simptomelor de mai sus, ajungându-se la șoc. Măsuri terapeutice depind de natura și gravitatea efectelor secundare: antihistaminice, la nevoie adrenalină, doze mari de corticosteroizi, reechilibrare hidroelectrolitică, oxigen.

E

EMOCLOT 250 D.I., EMOCLOT 500 D.I. *COD ATC: B02BD02*
ISI SpA; Pulb. liof. cu Factorul VIII de coagulare, având o activitate specifică de coagulare (F VIII:C) de 250 UI, 500 UI ***(S)***

Ind: Profilaxia și trat. hemoragiilor în: hemofilia tip A (deficiență genetică de Factor VIII), deficiență de Factor VIII dobândită, trat. pacienților cu anticorpi la Factorul VIII.

Dz: Doza inițială: unități necesare = greutate (kg) × procentul (%) de creștere dorit × 0,5. Este posibil să fie necesare doze mai mari decât cele calculate. În terapia de substituție, în cazul intervențiilor chirurgicale majore se monitorizează activitatea Factorului VIII din plasmă. Profilaxia îndelungată a hemoragiilor la pacienții cu hemofilie tip A severă necesită adm. 10-50 UI de Factor VIII/kg la 2-3 zile. După adm. conc. de Factor VIII la hemofilici, este absolut necesară testarea anticorpilor pentru Factorul VIII. Pentru hemofilia inhibitorie este necesară aplicarea unei terapii specifice.

Cind: La pacienții cunoscuți cu reacții alergice la componentele preparatului.

A!: Dacă preparatul se folosește în terapia la domiciliu trebuie urmate cu strictețe instrucțiunile medicului. Sarcină și alăptare. Când frecvența inj. este mare sau se adm. doze foarte mari (în cazul prezenței inhibitorilor specifici ai Factorului VIII), primitorii având grupele sanguine A, B sau AB trebuie monitorizați pentru semne ale hemolizei.

RA: Rar, reacții alergico-anafilactice sau stare febrilă. Pot apărea în cazuri rare, inhibitori ai Factorului VIII. Adm. de produse din sânge uman poate duce la transmiterea de boli infecțioase datorită preluării unor factori infecțioși – unor agenți patogeni de natură necunoscută până în prezent, cum ar fi cei ai hepatitei non-A și non-B.

ENDOBULIN S/D *COD ATC: J06BA02*

BAXTER AG; Pulb. liof.: Imunoglobulină umană normală + solv. pt. adm. i.v.; 1 ml conține 51 mg proteină din care cel puțin 95% este IgG. Distribuția subclaselor de IgG: IgG1: 50-80%, IgG2: 20+50%, IgG3: 0,5%, IgG4: 1-3%. Conținut maxim de IgA: 0,05 mg/ml. ***(S)***

Ind: *Terapie de substituție în:* Sindrom de imunodeficiență primară (IDP): agamaglobulinemie sau hipogamaglobulinemie congenitale, imunodeficiență comună, variabilă, imunodeficiență severă combinată, sindrom Wiskott Aldrich. Mielom sau leucemie limfocitară cronică cu hipogamaglobulinemie secundară, severă și infecții recurente. Copii cu SIDA congenital și infecții recurente. *Imunomodulare:* Purpură trombocitopenică idiopatică la copii sau adulți cu risc crescut de sângerare sau înainte de intervenție chirurgicală pentru a se corecta numărul trombocitelor. Sindromul Guillain-Barré. Boala Kawasaki. Transplant de măduvă.

Dz: *Terapia de substituție în IDP:* doza inițială 0,8 g/kg urmată de 0,2 g/kg la fiecare 3 săptămâni. Doza necesară pentru a se atinge nivelul minim de 6,0 g/l este de ordinul 0,2-0,8 g/kg/lună. Intervalul între doze, atunci când s-a atins o stare stabilizată, variază între 2-4 săptămâni. *Terapia de substituție în mielom sau leucemie limfatică cronică cu hipogamaglobulimie severă și infecții recurente; terapie de substituție la copii cu SIDA și infecții recurente:* 0,2-0,4 g/kg la fiecare 3-4 săptămâni. *Purpură trombocitopenică idiopatică:* 0,8-1 g/kg în prima zi care poate fi repetat o dată în interval de 3 zile; sau 0,4 g/kg zilnic pe o perioadă de 2-5 zile. Se poate repeta tratamentul dacă se produce o recădere. *Sindromul Guillain-Barré:* 0,4 g/kg/zi timp de 5 zile consecutive. *Boala Kawasaki:* 1,6-2 g/kg în doze fragmentate pe o perioadă de 2-5 zile sau 2,0/kg ca doză mică. Pacienții trebuie tratați concomitent cu acid acetilsalicilic.*Transplant alogenic de măduvă:* Doza de pornire este 0,5 g/kg/săptămână, începând cu 7 zile înainte de transplant și până la 3 luni după transplant. În cazul menținerii lipsei de producție de anticorpi, se recomandă doza de 0,5 g/kg/lună până la normalizarea nivelului de anticorpi.

Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componente. Hipersensibilitate la imunoglobuline omologe, în special cazuri foarte rare de deficiență IgA, când pacientul are anticorpi anti IgA.

A!: Reacțiile de hipersensibilitate autentică sunt rare. Ele pot surveni în cazurile foarte rare de deficiență IgA cu anticorpi anti IgA. Rareori, Ig umană normală poate produce căderi în tensiunea arterială cu reacție anafilactică, chiar la pacienți care au tolerat bine un trat. anterior cu Ig. Complicațiile potențiale pot fi evitate deseori, asigurându-se inj. lentă (0,16 ml/kg/min), și monitorizarea pacientului, pe durata perfuziei. În mod special, pacienții fără antecedente de adm. de Ig umană, normală, pacienții care au primit un produs i.v. Ig alternativ sau la care a trecut un lung interval de la perfuzia precedentă, trebuie monitorizați în timpul primei perfuzii și în prima oră după prima perfuzie, în scopul de a se detecta semne potențiale de reacție adversă.

Se ia în considerare conținutul în glucoză (1 g/g din IgG) în cazul diabetului latent, la diabeticii, sau la pacienții cu dietă hipozaharată. Adm. de doze mari de la diabetici poate să se traducă în creșterea tranzitorie a glicemiei. La pacienții sub terapie Ig s-au înregistrat cazuri de tulburări renale acute. La majoritatea acestor cazuri s-au identificat factori de risc, ca IR preexistentă, diabet zaharat, hipovolemie, supraponderabilitate, administrare concomitentă de produse nefrotoxice sau vârsta peste 65 ani. După adm. de Ig, trebuie păstrat un interval de 3 luni înainte de vaccinarea cu vaccinuri virale vii, atenuate. În cazul rujeolei, acest interval trebuie să persiste până la 1 an. De aceea, pacienții care primesc vaccin rujeolic trebuie să aibă testați anticorpii antirujeolici. Sarcină și alăptare.

RA: Ocazional frisoane, dureri de cap, febră, vomismente, reacții alergice, grețuri, artralgii, TA scăzută, dureri lombare moderate. S-au înregistrat cazuri de meningită reversibilă, cazuri izolate de anemie hemolitică/hemoliză și cazuri rare de reacție cutanate tranzitorii. S-au înregistrat creșteri ale nivelului de creatinină și/sau afecțiuni renale acute. S-au observat incidente trombotice la persoane în vârstă, la pacienții cu semne de ischemie cerebrală sau cardiacă și la pacienții supraponderali și hipovolemici.

F

FEIBA™ TIM 4 IMMUNO *COD ATC: B02AB*

BAXTER AG; Substanță liofilizată cu cx. de anti-inhibitori ai coagulării cu 500 U sau 1000 U; o sol. cu 1 U scurtează aPTT la 50% din valoarea tampon. ***(S)***

Ind: Trat. și profilaxia hemoragiilor din hemofilia A la pacienții cu inhibitori de factor VIII. Trat. și profilaxia hemoragiilor din hemofilia B la pacienții cu inhibitori de factor IX. Trat. și profilaxia hemoragiilor la pacienții non-hemofilici, cu inhibitori dobândiți de factori VIII, IX, XII.

Dz: 50-100 U/kg, fără a depăși doza zilnică de 200 U/kg sau 100 U/kg doză unică. Testele de coagulare nu se corelează întotdeauna cu ameliorarea clinică. *Hemoragie spontană.* Hemoragie în articulații, mușchi, țesuturi moi. Pentru sângerări minore sau moderate: 50-75 U/kg la 12 ore. Pentru hemoragii majore musculare și în țesuturile moi: 100 U/kg la 12 ore interval. Hemoragie în membranele mucoase: 50 U/kg, la fiecare 6 ore, cu monitorizarea atentă a pacientului. Dacă hemoragia nu se oprește, doza poate fi crescută la 100 U/kg (fără a depăși doza maximă zilnică de 200 U/kg). *Chirurgie:* 50-100 U/kg, la intervale de până la 6 ore. *Profilaxia hemoragiilor la pacienții cu hemofilia A* cu inhibitori, în timpul terapiei de toleranță imună, sau dacă aceasta eșuează. La pacienții hiperreactivi, cu istoric de hemoragii frecvente, poate fi adm. concomitent cu concentratul de factor VIII în doze de 50-100 U/kg de 2 ori/zi, până la reducerea inhibitorului de factor VIII la 1 UB. Dacă terapia de toleranță imună cu doze mari de factor VIII nu poate fi indusă, este indicată monoterapia cu 50-100 U/kg timp de 3 săptămâni, pentru profilaxia hemoragiilor. *Adm.:* inj. sau se perfuzează lent i.v.; rata de inj./perfuzie max. 2 U/kg/minut.

Cind: Coagularea intravasculară diseminată. IC, tromboză acută și/sau embolism. La pacienții cu suspiciune sau diagnostic cert de boală coronariană cât și la pacienții cu tromboză acută și/sau embolie, prod. este indicat numai în cazurile de sângerări cu risc letal.

A!: Dacă survin reacții de hipersensibilitate în timpul adm., injecția/perfuzia trebuie oprite. Pacienții cu inhibitori împotriva factorilor de coagulare trebuie să aibă schemele de vaccinare standard la zi. Deoarece cantitatea de sodiu în doza zilnică maximă poate depăși 200 mg, se vor lua măsuri speciale în ceea ce-i privește pe pacienții cu o dietă hipersodată. Doze mari vor fi adm. numai atât timp cât este absolut necesar, pentru a stopa sângerarea. În cazul în care apar modificări semnificative ale TA, pulsului, greutate în respirație, dureri toracice și tuse, perfuzia va fi imediat oprită și se vor lua măsuri diagnostice și terapeutice. Pacienții nehemofilici cu inhibitori dobândiți față de factorii VIII, XI sau XII pot avea atât tendința la sângerare cât și risc crescut de tromboză. Testele pentru controlul eficienței, cum sunt: aPTT, timpul de coagulare și trombelastograma nu se corelează fidel cu ameliorarea clinică. Atunci când se adm. preparate din sânge uman sau plasmă, riscul transmiterii de agenți infecțioși nu poate fi total exclus. Aceasta este valabil și pentru agenți de natură necunoscută. Nu se recomandă asocierea cu antifibrinolitice (acidul ε-aminocaproic). Dacă este totuși necesar trat. cu ambele produse, acestea vor fi adm. la interval de cel puțin 6 ore.

RA: Inj. sau perfuzarea rapidă i.v. poate produce durere puternică și amorțeală la nivelul feței și extremităților, ca și scăderea bruscă a TA.

G

GAMAGLOBULINĂ 16% *COD ATC: J06BA01*
HUMAN SERUM PRODUCTION & MEDICINE MANUFACTURING CO.; Sol. inj. i.m. 16% ***(S)***

Ind: Terapeutic și profilactic împreună cu antibiotice corespunzătoare în: septicemii grave, în care s-a instalat starea de șoc septic; infecții bacteriene acute sau cronice; cazul unor intervenții chirurgicale complexe; trat. infecțiilor microbiene în SIDA.

Dz: Se ad. după gravitatea bolii și corespunzător greutății corporale, în doze care variază între 1-5 g gamaglobulină, în interval de 24 ore; doza se poate repeta la nevoie.

Cind: Produsul este bine tolerat; nu se utilizează dacă este tulbure.

GAMAGLOBULINĂ ISI *COD ATC: J06BA01*
ISI SpA; Sol. inj. i.m. gamaglobulină ***(S)***

Ind: Terapeutic și profilactic împreună cu antibiotice corespunzătoare în: septicemii grave, în care s-a instalat starea de șoc septic; infecții bacteriene acute sau cronice; cazul unor intervenții chirurgicale complexe; trat. infecțiilor microbiene în SIDA.

Dz: După gravitatea bolii și corespunzător greutății corporale, între 1-5 g gamaglobulină, în 24 ore; doza se poate repeta la nevoie.

Cind: Produsul este bine tolerat; nu se utilizează dacă este tulbure.

GAMMA-VENIN P *COD ATC: J06BA02*
CENTEON PHARMA; Pulb. liof. + solv. inj. i.v.; 1 ml sol. reconstituită conține 50 mg Ig umană, 25 mg glicină, 8,5 mg clorură de sodiu ***(S)***

Ind: Afecțiuni bacteriene severe cu complicații septice sau toxice, ca adjuvant la terapia cu antibiotice. Infecții la nou-născuți. Meningoencefalită, pneumonie. Infecții acute la pacienți cu sindrom de imunodeficiență de orice origine, inclusiv cea iatrogenă. Profilaxia rubeolei în timpul sarcinii, la maximum 5-7 zile după contactul infectant, pentru prevenirea embriopatiei rubeolice; se recomandă adm. împreună cu Ig specifice antirubeolice.
Dz: *Afecțiuni bacteriene și virale:* 1-3 ml/kg i.v. *Chirurgie abdominală:* pentru prevenirea complicațiilor se poate suplini adm. i.v. cu o instilație intraperitoneală de 200 ml. *Encefalite, meningite, meningoencefalite:* intrarahidian, 3 ml *(copii)* și 5-10 ml *(adulți)*; înainte de a inj. soluția, este necesară drenarea unei cantități echivalente de lichid cerebrospinal. *Profilax. embriopatiei rubeolice:* 50 ml (conținând cel puțin 500 U.I. de anticorpi antivirus rubeolic per ml) simultan cu cel puțin 15 ml Ig specific antirubeolice adm. i.m. (cu cel puțin 4500 U.I. anticorpi antirubeolici/ml). Preparatul va fi adus la temperatura corpului înainte de adm.
Cind: Pacienți cu deficiență absolută de IgA și prezentând anticorpi anti-IgA (tablou extrem de rar).
AI: După adm. de Ig se recomandă respectarea unui interval de minimum 3 luni până la efectuarea unei vaccinări parenterale cu virus viu atenuat. Nu este necesară respectarea unui interval de timp pentru adm. de vaccinuri cu adm. orală (ex. antipoliomielitic, antifebră tifoidă), vaccinurile conținând agenți patogeni inactivați (ex. antigripal), sau vaccinurile preparate pe bază de toxine (ex. antitetanic, antidifteric sau combinații ale acestora).
RA: În timpul adm., sau imediat după aceea, pot surveni ocazional reacții cutanate, febră sau frisoane, în special în cazul pacienților cu sindrom de imunodeficiență. În cazuri extrem de rare au fost observate senzație de greață, vomă, reacții circulatorii (ex. tahicardie, bradicardie, hTA, transpirații, amețeli) și reacții de tip alergic (ex. eritem cutanat, urticarie, dispnee, șoc).

H

HAEMATE P *COD ATC: B02BD06*
CENTEON PHARMA; Subst. liofil. care conține fracțiune de plasmă îmbogățită cu Factor VIII de coagulare, cu o activitate specifică de coagulare de factor VIII (F VIII:C) de 250 UI, 500 UI, 1 000 UI și factor VIII von Willebrand: activitate de cofactor ristocen (vWF:RCof) de 550 UI, 1 100 UI sau 2 200 UI ***(S)***

Ind: Profilaxia și trat. sângerărilor în: hemofilia A (deficiență congenitală de factor VIII); deficiență dobândită de factor VIII. Trat. pacienților care au anticorpi împotriva factorului VIII, profilaxia și trat. sângerărilor în boala von Willebrand.
Dz: *Hemofilia A:* Doza și durata terapiei depind de severitatea tulburării funcției hemostatice, de localizarea și profunzimea sângerării, precum și de condiția clinică. Calculul dozei inițiale se face cu următoarea formulă: Unitățile

necesare = greutate corp (kg) × creșterea dorită de factor VIII:C (%) × 0,5. În cazul intervențiilor chirurgicale majore este indispensabilă monitorizarea exactă a terapiei de substituire, prin intermediul analizei coagulării (activitatea factorului VIII din plasmă). Profilaxia pe termen lung împotriva sângerărilor în cazurile severe de hemofilie A: 10-50 U.I. de factor VIII:C/kg la 2-3 zile. În unele cazuri, mai ales la pacienții mai tineri, pot fi necesare intervale mai scurte sau doze mai mari. La hemofilici este foarte important ca după prima adm. să se facă un test pentru anticorpi anti-factor VIII. Pentru hemofilicii cu anticorpi anti-factor VIII este necesară o terapie specifică. Este posibil ca efectul terapeutic să nu fie obținut dacă sângele pacientului conține un procent ridicat de inhibitori ai factorului VIII. *Afecțiunile von Willebrand:* 20-40 U.I. de factor VIII:C/kg la fiecare 8-12 ore. Trebuie luat în considerare faptul că sângerarea poate apărea chiar după 10 până la 12 zile de la intervenția chirurgicală sau naștere; în anumite circumstanțe pot fi necesare cantități mai mari decât cele calculate, mai ales în cazul dozei inițiale. În cazul intervențiilor chirurgicale majore este indispensabilă monitorizarea exactă a terapiei de substituire, prin intermediul analizei coagulării.

Cind: În trat. pacienților despre care se știe că au reacții alergice la constituenții acestui preparat.

A!: Dacă preparatul se folosește acasă, trebuie urmate cu strictețe instrucțiunile medicului.

RA: În cazuri rare, reacții alergo-anafilactice și/sau creșterea temperaturii. Tratamentul depinde de natura și severitatea efectului secundar, în cazul reacției alergo-anafilactice se întrerupe imediat injectarea/perfuzarea și se constituie trat. de urgență. În cazul unei terapii masive, pacientul trebuie monitorizat pentru simptome de hipervolemie și reacții hemolitice provocate de *izoaglutininele grupei de sânge,* care apar în cazuri rare. În cazuri rare pot apărea *inhibitori de factor VIII.* Atunci când se adm. medicamente preparate din sânge uman nu este complet exclusă posibilitatea transmiterii de boli infecțioase datorate transmiterii de agenți infecțioși; acest fapt este valabil și în cazul agenților patogeni de natură încă necunoscută, cum este agentul care provoacă hepatita non-A/non-B.

HUMAGLOBIN *COD ATC: J06BA02*

HUMAN SERUM PRODUCTION MEDICINE CO.; Pulb. liof: Imunoglobulină normală + solv. pt. adm. i.v. *(S)*

Ind: *Terapie de substituție în:* Sindrom de imunodeficiență primară (IDP): agamaglobulinemie sau hipogamaglobulinemie congenitale, imunodeficiență comună, variabilă, imunodeficiență severă combinată, sindrom Wiskott Aldrich. Mielom sau leucemie limfocitară cronică cu hipogamaglobulinemie secundară, severă și infecții recurente. Copii cu SIDA congenital și infecții recurente. *Imunomodulare:* Purpură trombocitopenică idiopatică la copii sau adulți cu risc crescut de sângerare sau înainte de intervenție chirurgicală pentru a se corecta numărul trombocitelor. Sindromul Guillain-Barré. Boala Kawasaki. Transplant de măduvă.

Dz: *Terapia de substituție în IDP:* doza inițială 0,8 g/kg urmată de 0,2 g/kg la fiecare 3 săptămâni. Doza necesară pentru a se atinge nivelul minim de 6,0 g/l este de ordinul 0,2-0,8 g/kg/lună. Intervalul între doze, atunci când s-a atins o stare stabilizată, variază între 2-4 săptămâni. *Terapia de substituție în mielom sau leucemie limfatică cronică cu hipogamaglobulinemie* *severă și infecții recurente; terapie de substituție la copii cu SIDA și infecții recurente:* 0,2-0,4 g/kg la fiecare 3-4 săptămâni. *Purpură trombocitopenică idiopatică:* 0,8-1 g/kg în prima zi care poate fi repetat o dată în interval de 3 zile; sau 0,4 g/kg zilnic pe o perioadă de 2-5 zile. Se poate repeta tratamentul dacă se produce o recădere. *Sindromul Guillain-Barré:* 0,4 g/kg/zi timp de 5 zile consecutive. *Boala Kawasaki:* 1,6-2 g/kg în doze fragmentate pe o perioadă de 2-5 zile sau 2/kg ca doză mică. Pacienții trebuie tratați concomitent cu acid acetilsalicilic.*Transplant alogenic de măduvă:* Doza de pornire este 0,5 g/kg/săptămână, începând cu 7 zile înainte de transplant și până la 3 luni după transplant. În cazul menținerii lipsei de producție de anticorpi, se recomandă doza de 0,5 g/kg/lună până la normalizarea nivelului de anticorpi.

Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componente. Hipersensibilitate la imunoglobuline omologe, în special cazuri foarte rare de deficiență IgA, când pacientul are anticorpi anti IgA.

AI: Reacțiile de hipersensibilitate autentică sunt rare. Ele pot surveni în cazurile foarte rare de deficiență IgA cu anticorpi anti IgA. Rareori, Ig umană normală poate produce căderi în tensiunea arterială cu reacție anafilactică, chiar la pacienți care au tolerat bine un trat. anterior cu Ig. Complicațiile potențiale pot fi evitate deseori, asigurându-se inj. lentă (0,16 ml/kg/min), și monitorizarea pacientului, pe durata perfuziei. În mod special, pacienții fără antecedente de adm. de Ig umană, normală, pacienții care au primit un produs i.v. Ig alternativ sau la care a trecut un lung interval de la perfuzia precedentă, trebuie monitorizați în timpul primei perfuzii și în prima oră după prima perfuzie, în scopul de a se detecta semne potențiale de reacție adversă. Se ia în considerare conținutul în glucoză (1 g/g din IgG) în cazul diabetului latent, la diabeticii, sau la pacienții cu dietă hipozaharată. Adm. de doze mari de la diabetici poate să se traducă în creșterea tranzitorie a glicemiei. La pacienții sub terapie Ig s-au înregistrat cazuri de tulburări renale acute. La majoritatea acestor cazuri s-au identificat factori de risc, ca IR preexistentă, diabet zaharat, hipovolemie, supraponderabilitate, administrare concomitentă de produse nefrotoxice sau vârsta peste 65 ani. După adm. de Ig, trebuie păstrat un interval de 3 luni înainte de vaccinarea cu vaccinuri virale vii, atenuate. În cazul rujeolei, acest interval trebuie să persiste până la 1 an. De aceea, pacienții care primesc vaccin rujeolic trebuie să aibă testați anticorpii antirujeolici. Sarcină și alăptare.

RA: Ocazional frisoane, dureri de cap, febră, vomismente, reacții alergice, grețuri, artralgii, TA scăzută, dureri lombare moderate. S-au înregistrat cazuri de meningită reversibilă, cazuri izolate de anemie hemolitică/hemoliză și cazuri rare de reacții cutanate tranzitorii. S-au înregistrat creșteri ale nivelului de creatinină și/sau afecțiuni renale acute. S-au observat incidente trombotice la persoane în vârstă, la pacienții cu semne de ischemie cerebrală sau cardiacă și la pacienții supraponderali și hipovolemici.

HUMANALBIN 5% *COD ATC: B05AA01*
CENTEON PHARMA; Sol. inj. de albumină umană 5% *(S)*

Ind: Trat. de urgență al șocului și în alte situații care impun refacerea rapidă a volumului sanguin; stări de hipoproteinemie cu sau fără edeme; în arsurile grave pentru a preveni hemoconcentrația.

Dz: În perf. i.v., inițial 500 ml, se repetă la nevoie; se folosește sol. încălzită la temperatura corpului.

Cind: Anemie gravă, IC, alergie specifică.
A!: Prudență la bolnavii cu rezervă cardiacă mică sau hipertensivi (viteza perfuziei nu trebuie să depășească 100 ml/oră) și în caz de traumatisme (atenție la sângerare).
RA: Rareori greață, vomă, salivație, febră; dacă dozele sunt excesive sau în caz de deficit de pompă cardiacă poate provoca supraîncărcare circulatorie, chiar edem pulmonar.

I

IMMUNATE *COD ATC: B02BD02*
BAXTER AG; Subst. liofil. cu 250 UI, 500 UI sau 1000 UI factor VIII de coagulare și factor VIII von Willebrand (vWF:CBA) 125 UI, 250 UI sau 500 UI ***(S)***

Ind: Terapia și profilaxia episoadelor hemoragice cauzate de deficitul congenital sau dobândit de factor VIII (hemofilia A, hemofilie A cu inhibitor de factor VIII, deficit de factor VIII dobândit în urma dezvoltării spontane de inhibitor de factor VIII). Boala von Willebrand cu deficit de factor VIII.
Dz: Trat. trebuie inițiat sub supravegherea unui medic cu experiență în tratamentul hemofiliei. Dozarea și durata terapiei de substituție depind de severitatea deficienței de factor VIII, de localizarea și gravitatea hemoragiei și de starea generală a pacientului. Doza necesară este determinată prin formula: Doza = greutate corporală (kg) × creșterea dorită de factor VIII (%) × 0,5. În cazul intervențiilor chirurgicale majore, monitorizarea terapiei de substituție prin analize de coagulare (activitatea plasmatică factor VIII) este indispensabilă. *Profilaxia pe termen lung a hemofiliei A severe:* 20-60 UI FVIII/kg, la 2-3 zile. În unele cazuri, mai ales la pacienții tineri, este posibil să fie necesare doze mai mari și intervale mai scurte între adm. pentru a preveni hemoragiile. *Hemofilicii cu inhibitor de factor VIII:* Dacă nu se atinge nivelul prevăzut al activității plasmatice a factorului VIII, sau dacă hemoragia nu se poate controla după adm. unei doze adecvate, se va efectua un test pentru a detecta prezența inhibitorilor de factor VIII. Dacă aceștia sunt prezenți la nivele sub 10 Unități Bethesda (UB)/ml, se vor adm. doze suplimentare de factor VIII. La pacienții cu titruri peste 10 UB sau cu răspuns anamnestic puternic, se va adm. concentrat de complex protrombinic (activat) sau factor VIII recombinat activat (rVIIa). *Boala von Willebrand cu deficiență de factor VIII:* Terapia de substituție pentru controlul episoadelor hemoragice și prevenirea episoadelor hemoragice asociate cu intervenții chirurgicale urmează indicațiile pentru hemofilia A.
Cind: Hipersensibilitate la substanța activă sau oricare dintre excipienți.
A!: Dacă apar reacții de hipersensibilitate în timpul adm., injecția/perfuzia trebuie oprită. Deoarece cantitatea de sodiu din doza maximă zilnică poate depăși 200 mg, se recomandă precauție la persoanele care trebuie să mențină o dietă hiposodată. Persoanele cărora li se adm. concentrate de factor VIII derivat din plasmă trebuie să aibă la zi schemele recomandate de vaccinare. Formarea anticorpilor neutralizanți, inhibitori, împotriva factorului VIII este o complicație cunoscută în tratamentul pacienților cu hemofilie A. Riscul de dezvoltare a inhibitorilor este maxim în primele 20 de zile de expunere (rar după 100 zile). Monitorizare atentă pentru a sesiza apariția

anticorpilor inhibitori. Prudență la copii sub 6 ani. În adm. de produse derivate din plasmă umană, nu poate fi exclus total riscul unor boli infecțioase, produse prin transmiterea de agenți infecțioși. Sarcină și alăptare.
RA: Rareori reacții alergice sau de hipersensibilitate (incluzând angioedem, senzație de arsură sau înțepături la locul de inj./perfuzie, frisoane, înroșire, urticarie, cefalee, hTA, letargie, greață, agitație, tahicardie, senzație de presiune toracică, vomă, respirație grea. Pacienții cu hemofilie A pot dezvolta anticorpi anti factorului VIII. În acest caz este recomandată contactarea unui specialist în hemofilie. Adm. de doze mari poate duce la hemoliză la pacienții din grupele A, B sau AB.

IMMUNINE *COD ATC: B02BD04*

BAXTER AG; Subst. liofil. cu factor IX al coagulării cu potență 200 UI, 600 UI sau 1200 UI + solv. pt. reconstituire ***(S)***

Ind: Terapia și profilaxia episoadelor hemoragice datorate deficitului congenital sau dobândit de factor IX (hemofilia B, hemofilia B cu inhibitor de factor IX, deficit de factor IX dobândit în urma dezvoltării spontane de inhibitor de factor IX).
Dz: *Hemofilia B:* doza necesară este determinată prin următoarea formulă: Doza = greutate corporală (kg) × creșterea dorită de factor IX (%) × 1,2. Pentru a monitoriza terapia și pentru calcularea dozelor de menținere adecvate sunt necesare determinări regulate ale nivelelor de factor IX. În general, se adm. la 24 de ore. Pentru profilaxia chirurgicală, doza inițială va fi adm. cu o oră înainte de intervenție. În cazul intervențiilor majore, se vor menține intervale de adm. de 12 ore pentru primele zile post-operator. Profilaxia pe termen lung pentru hemofilia B severă: 20-30 UI/kg de 2 ori pe săptămână. Dozarea regimului profilactic va fi însă individualizată pentru fiecare pacient în parte. *Hemofilicii cu inhibitor de factor IX:* Terapia de înlocuire cu factor IX este de obicei eficientă numai la pacienții cu un titru de inhibitori sub 10 unități Bethesda. Deoarece răspunsul depinde de titrul de inhibitori al pacientului, nivelele plasmatice de factor IX vor fi monitorizate frecvent și doza va fi ajustată corespunzător.
Cind: Coagulare intravasculară diseminată (CID) și/sau hiperfibrinoliză. După rezolvarea acestor procese prin metodele adecvate, se va adm. numai pentru controlarea hemoragiilor cu risc letal.
A!: Dacă apar reacții de hipersensibilitate în timpul adm., injecția/perfuzia trebuie oprită. În cazul intervențiilor chirurgicale la un pacient cu hemofilie B, se recomandă profilaxia perioperativă a trombozelor cu doze mici de heparină, în situațiile în care această profilaxie ar fi indicată în mod normal, la un pacient fără tulburări de coagulare. La pacienții cu risc de tromboze (pacienții cu istoric de boală hepatică, trombofilie, angină pectorală sau IM), nivelul de factor IX nu va fi crescut peste 60% din normal. Acești pacienți - ca și pacienții cărora li se adm. doze mari de concentrat de factor IX pentru chirurgie majoră - vor fi monitorizați pentru apariția CID sau a trombozelor. Dacă se suspectează CID, terapia de substituție va fi imediat oprită. Se recomandă ca persoanele cărora li se adm. concentrate de factor IX să aibă la zi schemele recomandate de vaccinare. În adm. de produse fabricate din plasma umană, nu poate fi exclus total riscul unor boli infecțioase, produse prin transmiterea de agenți infecțioși. Sarcină și alăptare.
RA: Rareori pot apărea reacții de hipersensibilitate (febră, urticarie, greață, vomă, dispnee, hTA, șoc). În cazuri rare poate duce la formarea de anti-

corpi circulanți inhibitori ai factorului IX. Riscul complicațiilor tromboembolice la adm. este considerabil redus, comparativ cu adm. de preparate standard de complex protrombinic, dar nu poate fi complet exclus, mai ales în cazul pacienților cu risc de tromboză și/sau celor cărora li se adm. doze mari de concentrat.

ISIVEN V.I *COD ATC: J06BA02*
ISI SpA.; Pulb. liof: Imunoglobulină umană normală + solv. pt. adm. i.v.; 20 ml conțin 1000 mg Ig*(S)*

Ind: *Terapie de substituție în:* Sindrom de imunodeficiență primară (IDP): agamaglobulinemie sau hipogamaglobulinemie congenitale, imunodeficiență comună, variabilă, imunodeficiență severă combinată, sindrom Wiskott-Aldrich. Mielom sau leucemie limfocitară cronică cu hipogamaglobulinemie secundară, severă și infecții recurente. Copii cu SIDA congenital și infecții recurente. *Imunomodulare:* Purpură trombocitopenică idiopatică la copii sau adulți cu risc crescut de sângerare sau înainte de intervenție chirurgicală pentru a se corecta numărul trombocitelor. Sindromul Guillain-Barré. Boala Kawasaki. Transplant de măduvă.

Dz: *Terapia de substituție în IDP:* doza inițială 0,8 g/kg urmată de 0,2 g/kg la fiecare 3 săptămâni. Doza necesară pentru a se atinge nivelul minim de 6,0 g/l este de ordinul 0,2-0,8 g/kg/lună. Intervalul între doze, atunci când s-a atins o stare stabilizată, variază între 2-4 săptămâni. *Terapia de substituție în mielom sau leucemie limfatică cronică cu hipogamaglobulimie severă și infecții recurente; terapie de substituție la copii cu SIDA și infecții recurente:* 0,2-0,4 g/kg la fiecare 3-4 săptămâni. *Purpură trombocitopenică idiopatică:* 0,8-1 g/kg în prima zi care poate fi repetat o dată în interval de 3 zile; sau 0,4 g/kg zilnic pe o perioadă de 2-5 zile. Se poate repeta tratamentul dacă se produce o recădere. *Sindromul Guillain-Barré:* 0,4 g/kg/zi timp de 5 zile consecutive. *Boala Kawasaki:* 1,6-2 g/kg în doze fragmentate pe o perioadă de 2-5 zile sau 2/kg ca doză mică. Pacienții trebuie tratați concomitent cu acid acetilsalicilic.*Transplant alogenic de măduvă:* Doza de pornire este 0,5 g/kg/săptămână, începând cu 7 zile înainte de transplant și până la 3 luni după transplant. În cazul menținerii lipsei de producție de anticorpi, se recomandă doza de 0,5 g/kg/lună până la normalizarea nivelului de anticorpi.

Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componente. Hipersensibilitate la imunoglobuline omologe, în special cazuri foarte rare de deficiență IgA, când pacientul are anticorpi anti IgA.

A!: Reacțiile de hipersensibilitate autentică sunt rare. Ele pot surveni în cazurile foarte rare de deficiență IgA cu anticorpi anti IgA. Rareori, Ig umană normală poate produce căderi în tensiunea arterială cu reacție anafilactică, chiar la pacienți care au tolerat bine un trat. anterior cu Ig. Complicațiile potențiale pot fi evitate deseori, asigurându-se inj. lentă (0,16 ml/kg/min), și monitorizarea pacientului, pe durata perfuziei. În mod special, pacienții fără antecedente de adm. de Ig umană, normală, pacienții care au primit un produs i.v. Ig alternativ sau la care a trecut un lung interval de la perfuzia precedentă, trebuie monitorizați în timpul primei perfuzii și în prima oră după prima perfuzie, în scopul de a se detecta semne potențiale de reacție adversă. Se ia în considerare conținutul în glucoză (1 g/g din IgG) în cazul diabetului latent, la diabetici, sau la pacienții cu dietă hipozaharată. Adm. de doze mari de la diabetici poate să se traducă în creșterea tranzitorie a glicemiei. La pacienții sub terapie Ig s-au înregistrat cazuri de tulburări renale acute. La majoritatea acestor cazuri s-au identificat factori de risc, ca IR

preexistentă, diabet zaharat, hipovolemie, supraponderabilitate, administrare concomitentă de produse nefrotoxice sau vârsta peste 65 ani. După adm. de Ig trebuie păstrat un interval de 3 luni înainte de vaccinarea cu vaccinuri virale vii, atenuate. În cazul rujeolei, acest interval trebuie să persiste până la 1 an. De aceea, pacienții care primesc vaccin rujeolic trebuie să aibă testați anticorpii antirujeolici. Sarcină și alăptare.
RA: Ocazional frisoane, dureri de cap, febră, vomismente, reacții alergice, grețuri, artralgii, TA scăzută, dureri lombare moderate. S-au înregistrat cazuri de meningită reversibilă, cazuri izolate de anemie hemolitică/hemoliză și cazuri rare de reacție cutanate tranzitorii. S-au înregistrat creșteri ale nivelului de creatinină și/sau afecțiuni renale acute. S-au observat incidente trombotice la persoane în vârstă, la pacienții cu semne de ischemie cerebrală sau cardiacă și la pacienții supraponderali și hipovolemici.

K

KYBERNIN HS 500 *COD ATC: 01AB02*
CENTEON PHARMA; Subst. liofil. cu 309 mg fracțiune plasmatică umană, antitrombină (AT) III 500 UI; sol. reconstituită conține 50 U.I./ml antitrombină ***(S)***

Ind: Profilaxia și trat. complicațiilor tromboembolice în deficitul ereditar sau dobândit de antitrombină III.
Dz: *Nou-născuți și copii:* 40-60 UI AT III/kg/zi, depinzând de statusul coagulant. Dacă este impus de condiții clinice, dozarea poate fi crescută până la 250 UI AT III/kg/zi. *Durata tratamentului:* până când nivelul activității AT III se normalizează sau când simptomatologia se remite. Inj. sau perfuzia i.v. se face lent (max. 4 ml/min).
Cind: La bolnavii cu reacții alergice cunoscute la unul din constituenții preparatului. În sindromul de detresă respiratorie la prematuri.
A!: Efectul antitrombinei III este mult amplificat de heparină. Adm. concomitentă cu heparină trebuie făcută cu mare grijă la bolnavii cu risc crescut de sângerare. Dacă heparina este folosită, numai o doză scăzută de heparină standard poate fi utilizată (<500 UI heparină/oră). Efectul asupra parametrilor coagulării și activității AT III trebuie monitorizat cu atenție. Sarcină și alăptare.
RA: Reacții alergice: frisoane, dispnee, edem, HTA/hTA, rash, tahicardie și reacții generale (durere toracică, febră, cefalee, greață și/sau vărsături). Când se adm. preparate din sânge uman sau plasmă bolile infecțioase datorate transmiterii de agenți infecțioși nu pot fi excluse în totalitate.

M

MONOCLATE P *COD ATC: B02BD02*
CENTEON LLC; Pulb. liof. pt. adm. i.v. reprezentând Factorul VIII de coagulare, având o activitate specifică de coagulare (F VIII:C) de 250 UI, 500 UI sau 1 000 UI ***(S)***

Ind: Profilaxia și trat. hemoragiilor în: hemofilia tip A (deficiență genetică de Factor VIII), deficiență de Factor VIII dobândită, trat. pacienților cu anticorpi la Factorul VIII.

Dz: Doza inițială: unități necesare = greutate (kg) × procentul (%) de creștere dorit × 0,5. Este posibil să fie necesare doze mai mari decât cele calculate. În terapia de substituție, în cazul intervențiilor chirurgicale majore se monitorizează activitatea Factorului VIII din plasmă. Profilaxia îndelungată a hemoragiilor la pacienții cu hemofilie tip A severă necesită adm. 10-50 UI de Factor VIII/kg la 2-3 zile. După adm. conc. de Factor VIII la hemofilici, este absolut necesară testarea anticorpilor pentru Factorul VIII. Pentru hemofilia inhibitorie este necesară aplicarea unei terapii specifice.

Cind: La pacienții cunoscuți cu reacții alergice la componentele preparatului.

A!: Dacă preparatul se folosește în terapia la domiciliu trebuie urmate cu strictețe instrucțiunile medicului. Sarcină și alăptare. Când frecvența inj. este mare sau se adm. doze foarte mari (în cazul prezenței inhibitorilor specifici ai Factorului VIII), primitorii având grupele sanguine A, B sau AB trebuie monitorizați pentru semne ale hemolizei.

RA: Rar, reacții alergico-anafilactice sau stare febrilă. Pot apărea în cazuri rare, inhibitori ai Factorului VIII. Adm. de produse din sânge uman poate duce la transmiterea de boli infecțioase datorită preluării unor factori infecțioși – unor agenți patogeni de natură necunoscută până în prezent, cum ar fi cei ai hepatitei non-A și non-B.

O

OCTAGAM *COD ATC: J06BA02*
OCTAPHARMA A.G.; Sol. pt. adm. i.v. cu Ig normală ***(S)***

Ind: *Terapie de substituție în:* Sindrom de imunodeficiență primară (IDP): agamaglobulinemie sau hipogamaglobulinemie congenitale, imunodeficiență comună, variabilă, imunodeficiență severă combinată, sindrom Wiskott-Aldrich. Mielom sau leucemie limfocitară cronică cu hipogamaglobulinemie secundară, severă și infecții recurente. Copii cu SIDA congenital și infecții recurente. *Imunomodulare:* Purpură trombocitopenică idiopatică la copii sau adulți cu risc crescut de sângerare sau înainte de intervenție chirurgicală pentru a se corecta numărul trombocitelor. Sindromul Guillain-Barré. Boala Kawasaki. Transplant de măduvă.

Dz: *Terapia de substituție în IDP:* doza inițială 0,8 g/kg urmată de 0,2 g/kg la fiecare 3 săptămâni.Doza necesară pentru a se atinge nivelul minim de 6,0 g/l este de ordinul 0,2-0,8 g/kg/lună. Intervalul între doze, atunci când s-a atins o stare stabilizată, variază între 2-4 săptămâni. *Terapia de substituție în mielom sau leucemie limfatică cronică cu hipogamaglobulinemie severă și infecții recurente; terapie de substituție la copii cu SIDA și infecții recurente:* 0,2-0,4 g/kg la fiecare 3-4 săptămâni. *Purpură trombocitopenică idiopatică:* 0,8-1 g/kg în prima zi care poate fi repetat o dată în interval de 3 zile; sau 0,4 g/kg zilnic pe o perioadă de 2-5 zile. Se poate repeta tratamentul dacă se produce o recădere. *Sindromul Guillain-Barré:* 0,4 g/kg/zi timp de 5 zile consecutive. *Boala Kawasaki:* 1,6-2 g/kg în doze fragmentate pe o perioadă de 2-5 zile sau 2/kg ca doză mică. Pacienții trebuie tratați concomitent cu acid acetilsalicilic. *Transplant alogenic de măduvă:* Doza de pornire este 0,5 g/kg/săptămână, începând cu 7 zile înainte de transplant și până la 3 luni după transplant. În cazul menținerii lipsei de producție de anticorpi, se recomandă doza de 0,5 g/kg/lună până la normalizarea nivelului de anticorpi.

Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componente. Hipersensibilitate la imunoglobuline omologe, în special cazuri foarte rare de deficiență IgA, când pacientul are anticorpi anti IgA.

A!: Reacțiile de hipersensibilitate autentică sunt rare. Ele pot surveni în cazurile foarte rare de deficiență IgA cu anticorpi anti IgA. Rareori, Ig umană normală poate produce căderi în tensiunea arterială cu reacție anaflactică, chiar la pacienți care au tolerat bine un trat. anterior cu Ig. Complicațiile potențiale pot fi evitate deseori, asigurându-se inj. lentă (0,16 ml/kg/min), și monitorizarea pacientului, pe durata perfuziei. În mod special, pacienții fără antecedente de adm. de Ig umană, normală, pacienții care au primit un produs i.v. Ig alternativ sau la care a trecut un lung interval de la perfuzia precedentă, trebuie monitorizați în timpul primei perfuzii și în prima oră după prima perfuzie, în scopul de a se detecta semne potențiale de reacție adversă. Se ia în considerare conținutul în glucoză (1 g/g din IgG) în cazul diabetului latent, la diabeticii, sau la pacienții cu dietă hipozaharată. Adm. de doze mari de la diabetici poate să se traducă în creșterea tranzitorie a glicemiei. La pacienții sub terapie Ig s-au înregistrat cazuri de tulburări renale acute. La majoritatea acestor cazuri s-au identificat factori de risc, ca IR preexistentă, diabet zaharat, hipovolemie, supraponderabilitate, administrare concomitentă de produse nefrotoxice sau vârsta peste 65 ani. După adm. de Ig, trebuie păstrat un interval de 3 luni înainte de vaccinarea cu vaccinuri virale vii, atenuate. În cazul rujeolei, acest interval trebuie să persiste până la 1 an. De aceea, pacienții care primesc vaccin rujeolic trebuie să aibă testați anticorpii antirujeolici. Sarcină și alăptare.

RA: Ocazional frisoane, dureri de cap, febră, vomismente, reacții alergice, grețuri, artralgii, TA scăzută, dureri lombare moderate. S-au înregistrat cazuri de meningită reversibilă, cazuri izolate de anemie hemolitică/hemoliză și cazuri rare de reacție cutanate tranzitorii. S-au înregistrat creșteri ale nivelului de creatinină și/sau afecțiuni renale acute. S-au observat incidente trombotice la persoane în vârstă, la pacienții cu semne de ischemie cerebrală sau cardiacă și la pacienții supraponderali și hipovolemici.

OCTANATE *COD ATC: B02BD02*

OCTAPHARMA AG; Pulb. liof. reprezentând Factorul VIII de coagulare + solv. ***(S)***

Ind: Profilaxia și trat. hemoragiilor în: hemofilia tip A (deficiență genetică de Factor VIII), deficiență de Factor VIII dobândită, trat. pacienților cu anticorpi la Factorul VIII.

Dz: Doza inițială: unități necesare = greutate (kg) × procentul (%) de creștere dorit × 0,5. Este posibil să fie necesare doze mai mari decât cele calculate. În terapia de substituție, în cazul intervențiilor chirurgicale majore se monitorizează activitatea Factorului VIII din plasmă. Profilaxia îndelungată a hemoragiilor la pacienții cu hemofilie tip A severă necesită adm. 10-50 UI de Factor VIII/kg la 2-3 zile. După adm. conc. de Factor VIII la hemofilici, este absolut necesară testarea anticorpilor pentru Factorul VIII. Pentru hemofilia inhibitorie este necesară aplicarea unei terapii specifice.

Cind: La pacienții cunoscuți cu reacții alergice la componentele preparatului.

Al: Dacă preparatul se folosește în terapia la domiciliu trebuie urmate cu strictețe instrucțiunile medicului. Sarcină și alăptare. Când frecvența inj. este mare sau se adm. doze foarte mari (în cazul prezenței inhibitorilor specifici ai Factorului VIII), primitorii având grupele sanguine A, B sau AB trebuie monitorizați pentru semne ale hemolizei.

RA: Rar, reacții alergico-anafilactice sau stare febrilă. Pot apărea în cazuri rare, inhibitori ai Factorului VIII. Adm. de produse din sânge uman poate duce la transmiterea de boli infecțioase datorită preluării unor factori infecțioși – unor agenți patogeni de natură necunoscută până în prezent, cum ar fi cei ai hepatitei non-A și non-B.

R

RHESOGAM *COD ATC: J06BB01*

CENTEON PHARMA GmbH; Sol. inj. i.m.; 1 ml conține: Ig umană 100-170 mg, cu un conținut de IgG minimum 95% de anticorpi anti-Rho (D)eritrocitari minimum 200 µg echivalentul a minimum 900 U.I. ***(S)***

Ind: Înainte de naștere: între a 28-a și a 30-a săptămână de sarcină, la femeile cu Rh negativ (d) sau Du pozitiv. După naștere: Mama d (Rh-negativ), Copil D (Rh-pozitiv); Mama d (Rh-negativ), Copil Du (Du-pozitiv); Mama Du (Du pozitiv), Copil D (Rh-pozitiv). În următoarele cazuri speciale: La femeile cu Rh negativ (d) sau Du pozitive, după versiune extrauterină, traume abdominale, inclusiv intervenții chirurgicale, sângerări în timpul sarcinii, avort, sarcină ectopică, molă hidatidiformă (în săptămâna a 6-a de sarcină sau mai târziu) și după orice amniocenteză sau biopsie chorionică. La persoanele Rh negative, după transfuzii de sânge incompatibil în sistem Rh (sânge integral sau concentrat eritrocitar).

Dz: *Înainte de naștere:* 300 µg (= 1500 UI) între a 28-a și a 30-a săptămână de sarcină – în unele cazuri mai devreme – urmate de încă o doză de 300 µg la 2-72 ore de la naștere, dacă nou-născutul este Rh (D) pozitiv. *După naștere:* Doza standard este de 300 µg (= 1500 UI). Se poate adm. chiar și fără testarea prealabilă a hematiilor fetale (testul Kleihauer-Betke). Doza se adm. între 2 și 72 ore după naștere. Dacă nou-născutul este Du pozitiv, se recomandă o doză de 500 µg (= 2500 UI). În situațiile când în sistemul circulator al mamei au intrat cantități relativ mari de hematii fetale, sau în cazuri de infiltrare ulterioară a sângelui fetal (cezariană) pot fi adm. doze speciale.

Dozele deosebite adaptate următoarelor cazuri speciale: avort, sarcină ectopică, retroversie uterină externă, traumatisme abdominale, sângerări în timpul sarcinii, molă hidatidiformă: înaintea celei de-a 12-a săptămâni de sarcină: 120-150 µg (600-750 UI), în termen de 72 ore. După a 12-a săptămână de sarcină: 250-300 µg (1250-1500 UI), în termen de 72 ore. *După amniocenteză sau biopsie chorionică:* 250-300 µg (1250-1500 UI) în 72 ore. *În cazul transfuziilor incompatibile în sistem Rh*: se vor adm. primitorului 100-250 µg (= 500-1250 UI) pentru fiecare 10 ml de sânge transfuzat, în doze fracționate, în decurs de câteva zile. Dacă donatorul este Rh pozitiv și primitorul Rh negativ, sau dacă se detectează sensibilizare în sistem rhesus, pacientul respectiv va fi informat și cazul va fi luat în evidență având în vedere posibilele consecințe la următoarele transfuzii. Se adm. strict i.m. La pacienții cu deficiență plachetară severă sau cu alte tulburări de coagulare ce contraindică injecțiile intramusculare, ca o alternativă poate fi adm. subcutanat. Dozele totale, relativ mari, vor fi inj. în locuri diferite, aceeași regulă se aplică și în cazul dozelor mai mari de 2 ml la copii cu greutate până în 20 kg și mai mult de 5 ml la persoane cu greutatea mai mare.

CInd: În cazul pacienților cu deficiență plachetară severă sau cu alte tulburări de coagulare, la care inj. i.m. sunt contraindicate, poate fi adm. subcutanat, ca o alternativă. Hipersensibilitate la medicamente care conțin Ig omologe, în special la pacienții cu deficiență în IgA și prezența concomitentă de anticorpi anti IgA.

A!: După naștere, se adm. mamei, și nu nou-născutului. Se adm. la temperatura corpului, intragluteal (în mușchiul fesier), pacientul fiind în poziție culcat. Nu se utilizează soluții neclare sau care conțin particule nedizolvate. Nu trebuie inj. în amestec cu alte produse. După utilizarea Ig trebuie respectat un interval de cel puțin 3 luni înainte de adm. parenterală a unor vaccinuri cu virus viu atenuat (ex. virus urlian, rujeolic, rubeolic, combinații ale acestora și virusul varicella-zoster). Vaccinul contra rubeolei poate fi totuși adm. în timpul perioadei mai sus menționate, în asemenea cazuri eficiența vaccinării ar trebui verificată prin măsurarea nivelului seric de anticorpi la 8-10 săptămâni după vaccinare. Nu este necesară respectarea unui interval de timp pentru adm. vaccinurilor orale (anti-poliomielitic și anti-febră tifoidă), vaccinuri conținând agenți patogeni inactivați (gripă, TBC, rabie, tuse convulsivă, hepatită virală de tip B) sau vaccinuri conținând toxine bacteriene (ex. anti-difteric, tetanic și combinațiile acestora).

RA: La locul inj. poate surveni o inflamație sau edem. În unele cazuri apar febră, reacții cutanate și frisoane. Rareori au fost observate reacții de greață, vomă, dureri de cap și dificultăți respiratorii, precum și reacții cardiovasculare sau de tip alergic/anafilactic. În rare cazuri poate apărea colaps cardio-vascular în special dacă preparatul este adm. prin inj. i.v. La adm. preparatelor din sânge sau plasmă nu poate fi exclus complet riscul transmiterii agenților infecțioși.

T

TETAGAM *COD ATC: J06BB02*

CENTEON PHARMA GmbH; Sol. inj. i.m.; 1 ml conține: Ig umană 100-170 mg, cu un conținut de IgG minimum 95% și anticorpi antitoxină tetanică min. 250 UI *(S)*

Ind: Profilaxia tetanosului la persoane cu plăgi, a căror vaccinare este incompletă/necunoscută. Trat. tetanosului clinic manifest.
Dz: Profilaxia se realizează prin adm. simultană a 250 UI Tetagam P și 0,5 ml vaccin antitetanic adsorbit, pe părțile contralaterale ale corpului. În cazul plăgilor ce nu pot fi rezolvate satisfăcător chirurgical sau care au fost neglijate și în cazul arsurilor extinse, doza este de 500 UI. În cazul arsurilor este de preferat a 2 adm. de 250 UI, la sfârșitul fazei exsudative (aprox. la 36 ore de la producerea arsurii). Trat. se începe cu adm. 5000-10000 UI în prima zi și se continuă cu 3000 UI pe zi. *Copiii* primesc aceleași doze. Adm. se face exclusiv i.m. Dacă sunt necesare doze mari, este de preferat să fie adm. fracționat. Aceasta se referă la doze > 2 ml pentru copii cu greutate < 20 kg și la doze > 5 ml pentru persoane depășind 20 kg. În prezența unei trombocitopenii sau a unei alte tulburări de coagulare, ce contraindică inj. i.m., poate fi adm. subcutanat.
Cind: Riscul letal asociat infecției tetanice elimină orice contraindicații potențiale.
A!: Prudență la persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la Ig omologe, în special la pacienți cu deficit de IgA și anticorpi anti IgA. A nu se injecta intravascular! Injectarea intravasculară poate declanșa simptome de șoc, în special în cazul sindromului de imuno-deficiență. Se recomandă retragerea pistonului seringii, înaintea inj., pentru a controla dacă nu s-a pătruns în lumenul vascular. După adm. Ig, se recomandă păstrarea unui interval de cel puțin 3 luni până la vaccinarea cu virus viu atenuat (ex. oreion, rujeolă, rubeolă, combinații ale acestora și varicelă). Pentru următoarele tipuri de vaccinări nu este necesară respectarea vreunui interval de timp: vaccinuri cu administrare orală (antipoliomielitic, anti-tifoidic), vaccinuri conținând agenți patogeni inactivați (anti-difteric, anti-tetanic și combinații ale acestora). La efectuarea testelor de laborator, Ig pot conduce la rezultate fals pozitive, pentru o anumită perioadă de timp. Sarcină și alăptare.
RA: Uneori pot surveni: jenă și inflamare la locul injecției, febră, reacții cutanate generalizate, frisoane, în rare cazuri, au fost observate senzație de greață și vomă, cefalee, reacții circulatorii (tahicardie, bradicardie, hTA, transpirații, vertij) și reacții de tip alergic (eritem, urticarie, dispnee și șoc, extrem de rar). La adm. produselor preparate din plasmă umană, transmiterea agenților infecțioși nu poate fi total exclusă, aceasta fiind valabilă și în cazul agenților.

TISSUCHOL KIT *COD ATC: B02BC*

BAXTER AG; 1 fl. cu trombină pulb. 4 UI/ml, 1 fl. cu trombină pulb. 500 UI/ml, 1 fl. sol. de aprotinină, 1 fl. sol. clorură de calciu ***(S)***

Ind: Numai local, în orice disciplină chirurgicală, inclusiv cele endoscopice, ca: adeziv tisular, suport pentru suturi chirurgicale, hemostază, cicatrizarea plăgilor, reducerea cavităților nefiziologice (inclusiv în spațiul subarahnoidian). Realizarea hemostazei în trat. endoscopic al ulcerului gastroduodenal sângerând.
Dz: Volumul ce va fi adm. și frecvența aplicării vor fi adaptate necesităților clinice ale pacientului. Dozele depind de tipul intervenției chirurgicale, extensia suprafeței de acoperit sau de volumul cavității ce trebuie redusă. Dozele individuale variază: 0,5-4 ml. Pentru anumite situații clinice (ex. traumatisme hepatice, arsuri extinse), sunt necesare doze mai mari (10 ml sau mai mult). Înainte de aplicare, suprafața respectivă trebuie să fie cât se poate de uscată.

Cind: Hemoragie importantă venoasă sau arterială; aceste cazuri necesită măsuri specifice. Hipersensibilitate cunoscută la proteine bovine.
A!: Se adm. exclusiv local. Nu va fi sub nici un motiv adm. intravascular! În cazul apariției reacțiilor de tip alergic/anafilactic, se întrerupe imediat adm. și se instituie trat. necesar. Se vor administra: în cazul unor reacții medii: corticosteroizi și antihistaminice; în cazul unor reacții severe: adrenalină (lent i.v.), corticoizi doze mari (lent i.v.), reechilibrare volemică și/sau oxigen. Atenție ca porțiunile de țesut din afara ariei de aplicare să fie suficient de bine protejate, pentru a preveni realizarea adeziunii în zone nedorite. La inj. locală în trat. endoscopic al sângerărilor gastrointestinale distrucțiile tisulare care pot apărea, pot duce la formarea hematoamelor intramurale. Sarcină și alăptare. Prod. poate fi afectat de expunerea la soluții conținând alcool, ioduri sau metale grele (ex.: soluții antiseptice).
RA:. Rar, reacții de hipersensibilitate sau de tip alergic (ex. dispnee, eritem, urticarie, hTA) mergând în extrem de rare cazuri până la șoc anafilactic.

V

VENIMMUN N *COD ATC: J06BA02*
CENTEON PHARMA; Pulb. liof. 0,5 g/2,5 g/5 g/10 g + solv. pt. adm. i.v.; 1 ml sol. diluată conține 50 mg Ig (80% IgG; 12% IgA; 8% IgM) ***(S)***

Ind: Terapia deficitelor imune primare și secundare; prevenirea sau tratamentul infecțiilor asociate cu aceste cazuri. Modificarea sau controlul reacțiilor imune ale pacienților în boli diferite, de exemplu în purpura trombocitopenică idiopatică. Sindrom imunodeficitar primar precum: agamaglobulinemie congenitală și hipogamaglobulinemie, imunodeficiența, imunodeficiențe primare, sindromul Wiskott-Aldrich. Sindrom imunodeficitar secundar din leucemia limfocitară. Tratamentul infecțiilor asociate cu imunodeficiență. Purpura trombocitopenică idiopatică (ITP), în special forme acute în cazul copiilor.
Dz: *Terapia de substituție în sindromul deficienței primare sau secundare de anticorpi:* 100-400 mg/kg la fiecare 4 săptămâni pentru restabilirea nivelurilor de IgG la valoarea normală. Doza poate fi mărită până la 800 mg/kg sau adm. mai des în cazul în care nivelul de IgG din sânge nu este suficient de ridicat sau dacă acesta scade rapid. *Purpura trombocitopenică idiopatică:* 400 mg/kg/zi timp de 5 zile consecutiv sau 1000 mg/kg/zi timp de 2 zile consecutiv. Se pot adm. intermitent doze de întreținere în cazul în care creșterea trombocitelor este indicată clinic.
Cind: Hipersensibilitate la produse conținând Ig similară, în special în cazul pacienților cu deficiență IgA și prezența concomitentă a anticorpilor pentru IgA. În cazul terapiei în care se adm. doze mari, se recomandă atenție sporită pacienților cu risc pentru tromboze, cât și celor cu stenoză coronariană.
A!: Pacienții trebuie supravegheați în timpul și cel puțin 20 min. după adm. pentru a se preveni posibile incidente ce pot apărea. După adm. Ig, trebuie să treacă cel puțin 3 luni până la vaccinarea cu virus parenteral activ (ex.: oreion, pojar, rubeolă și vaccinurile mixte corespunzătoare, ca și vaccinul pentru varicelă). Nu este necesară o perioadă intermediară la adm. de vaccinuri active, adm. pe cale bucală (ex.: pentru poliomielită, febră tifoidă), vaccinuri conținând agenți patogeni inactivați (ex.: vaccinuri antigripale, TBC, rabie, DTP).

RA: Frecvent pot să apară frisoane, febră, stări de vomă, reacții alergice, artralgie, dureri lombare și foarte rar șoc anafilactic. În cazuri rare hTA, care, în cazuri izolate, poate duce la stări de șoc. Foarte rar, în urma adm. a unor doze mari, s-a înregistrat hemoliză. Au existat foarte puține cazuri de deteriorare a bolii de bază a pacienților cu afecțiuni autoimune în timpul aplicării terapiei cu doze mari de Ig, însoțită de creșterea valorii creatininei în cazul pacienților cu afecțiuni renale. În cazuri izolate, în special în timpul terapiei cu doze mari, au fost descoperite semne de meningită aseptică, precum cefalee, stări de greață, stări de vomă, febră, inflamarea gâtului, fotofobie și, rar, pierderea cunoștinței. Aceste semne sunt reversibile după încetarea terapiei.

MONOGRAFII – PRODUSE BIOLOGICE DE UZ UMAN (Vaccinuri, Seruri terapeutice, Imonomodulatori)

MONOGRAFII – PRODUSE BIOLOGICE DE UZ UMAN (Vaccinuri)

A

ACT - HIB

COD ATC: J07AG01

LAB. AVENTIS; Pastilă liof. de vaccin conjugat împotriva Haemophilus influenzae tip b (S)

Ind: Imunizarea activă a copiilor împotriva infecțiilor invazive produse de Haemophilus influenzae tip b, începând cu 2 luni.
Dz: Inj. i.m. și s.c. *2 luni - 2 ani:* fața anterolaterală a coapsei (în treimea medie); *2-5 ani:* regiunea deltoidiană. *2-6 luni:* 3 doze × 0,5 ml, la 1-2 luni, urmate de un rapel (0,5 ml) la 12 luni de la a 3-a doză; *6 luni - 1 an:* 2 doze × 0,5 ml, la 1-2 luni, urmate de un rapel (0,5 ml) la 12 luni de la a 2-a doză; *1-5 ani:* 1 doză × 0,5 ml, fără rapel.
Cind: Boli acute febrile, boli acute sau cronice în curs de evoluție, hipersensibilitate la constituenții vaccinului și la proteina tetanică.
A!: Dacă Act - HIB se adm. simultan cu alte vaccinuri (rujeolă, rubeolă, oreion), acestea se vor inj. în zone anatomice diferite.

ANATOXINĂ STAFILOCOCICĂ PURIFICATĂ ȘI CONCENTRATĂ

COD ATC: J07AX

INST. CANTACUZINO; Susp. inj. cu anatoxină stafilococică 1:5 diluată (tulpini de Staphylococcus aureus Wood 46); f. × 0,75 ml (S)

Ind: În tratamentul infecțiilor stafilococice (în asociere cu vaccinul stafilococic).
Dz: Inj. s.c. Se adm. doze crescânde de anatoxină diluată (0,1-0,2-0,3 ml), apoi anatoxină concentrată (de la 0,1 ml la 0,7 ml); intervalul între inj. este de 3-4 zile. Doza de 0,7 ml se poate repeta de 5-7 ori.
Cind: Febră, o boală acută sau cronică în evoluție, hipersensibilitate la unul din compuși. IH, IR, IC, tbc activă.
RA: Reacții locale - dureri însoțite de eritem. Foarte rar - noduli la locul injecției.

ANATOXINĂ STREPTOCOCICĂ

COD ATC: J07AX

INST. CANTACUZINO; Susp. inj. cu tulpini toxigene de streptococi hemolitici inactivați cu formol/termic; f. × 1 ml (S)

Ind: În tratamentul infecțiilor cutanate streptococice și în stări de sensibilizare a organismului față de streptococii hemolitici.
Dz: Inj. s.c. *În streptodermie:* 0,1-0,5 ml la interval de 2 zile. *Ptr. desensibilizare:* 0,1 ml anatoxina diluată 1:10, apoi 2 inj. a 0,1 ml anatoxină nediluată. La copil sub 7 ani: 1/2 - 1/4 din doza adultului.
Cind: Febră, o boală acută sau cronică în evoluție, hipersensibilitate la unul din compuși. IH, IR, IC decompensată, tbc activă, sindrom hemoragipar.
RA: Reacții locale - dureri însoțite de eritem. Foarte rar - noduli la locul injecției.

AVAXIM ADULT *COD ATC: J07BC02*

LAB. AVENTIS; Susp. inj. cu virus hepatitic A inactivat cu formaldehidă (160 U Ag HAV) ***(S)***

Ind: Imunizarea activă împotriva infecției cu virusul hepatitic A la adulți (peste 15 ani).
Dz: Inj. i.m., s.c. Se adm. o singură doză de vaccin de 0,5 ml urmată de un rapel la 6 luni.
Cind: Febră, o boală acută sau cronică în evoluție, hipersensibilitate la unul din compuși sau ca urmare a unei vaccinări anterioare. Sarcină și alăptare.
A!: Nu se adm. i.v., în mușchii fesieri datorită stratului variabil de țesut adipos și nici intradermic întrucât pe aceste căi de adm. se induce un slab răspuns imunologic. Acest vaccin nu asigură protecție împotriva infecțiilor cauzate de virusurile hepatitei B, C și E sau a altor agenți patogeni hepatici.
RA: Reacții locale - dureri însoțite de eritem. Foarte rar - noduli la locul injecției. Reacții sistemice - stări subfebrile, astenie, dureri de cap, mialgie, dureri articulare, tulburări gastrointestinale.

B

BRONCHO-VAXOM ADULȚI/CHILDREN *COD ATC: J07AX*

OM PHARMA; Cps. cu 7 mg/3,5 mg lizat bacterian liofilizat din: Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae și ozanae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes și viridans, Neisseria catarrhalis. ***(P-RF)***

Ind: Terapie adjuvantă în toate infecțiile sistemului respirator și din sfera ORL. Prevenirea recurențelor. Terapie adjuvantă în: bronșite acute și cronice; angine, amigdalite, faringite, laringite; rinite, sinuzite, otite; infecții refractare la antibioticoterapia curentă; complicațiile bacteriene din afecțiunile virale ale sistemului respirator, în special la copii și bătrâni.
Dz: *Trat. episoadelor acute:* o cps./zi pe stomacul gol până la dispariția simptomelor, minim 10 zile. În cazul în care sunt necesare antibiotice, se preferă să se asocieze antibioticului chiar de la începutul trat. *Tratament de consolidare:* o cps./zi pe stomacul gol 10 zile/lună, 3 luni. *Copii (de la 6 luni la 12 ani):* aceeași schemă de tratament ca pentru adulți.

D

D.T. COQ *COD ATC: J07AM51*

LAB. AVENTIS; Susp. inj. o doză (0,5 ml) conține: anatoxină difterică purificată min. 30 UI, anatoxină tetanică purificată min. 60 UI, bordetella pertussis min. 4 UI. ***(S)***

Ind: Prevenirea combinată a difteriei, tetanosului și tusei convulsive.
Dz: Se adm. i.m., s.c. *Primovaccinarea:* 3 injecții × 0,5 ml la 1-2 luni interval. *Rapel:* o injecție la 1 an după primovaccinare.

Cind: Encefalopatie progresivă cu sau fără convulsii. Oprirea vaccinării la subiecții care manifestă o reacție serioasă în următoarele 48 ore după injecție: febră (40°C), plâns encefalitic, convulsii, șoc.
A!: Existența în antecedente a convulsiilor neasociate unei vaccinări anterioare nu contraindică vaccinarea pentru tusea convulsivă la pacienții ce nu suferă de encefalopatie progresivă.
RA: Durere, eritem sau nodul la locul injectării. Febră (38°C - 39°C) cu durata de 24-48 ore. Rar, febră (40°C), sindrom de plâns encefalitic, convulsii, encefalopatie sau șoc (1:100 000 vaccinări). Aceste simptome dispar spontan dar contraindică alte vaccinări împotriva tusei convulsive.

D.T. VAX *COD ATC: J07AM51*
LAB. AVENTIS; Susp. inj. O doză de 0,5 ml conține: anatoxină difterică purificată: min. 30 UI; anatoxină tetanică purificată: min. 40 UI. ***(S)***

Ind: Prevenirea combinată a difteriei și tetanosului
Dz: Inj. i.m., s.c. *Primovaccinare:* 3 doze × 0,5 ml la interval de 1-2 luni. *Rapel:* o doză × 0,5 ml la fiecare 5-10 ani.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componenții vaccinului. Reacție de hipersensibilizare sau tulburări neurologice după o vaccinare anterioară.
A!: Nu se adm. intravascular. Terapia imunosupresivă sau imunodeficiența pot induce un răspuns imun postvaccinal diminuat. Sarcină și alăptare.
RA: Reacții locale: durere, eritem, indurație, edem. Reacții sistemice: hipertermie tranzitorie asociată sau nu cu o reacție locală și cu limfadenopatie; reacție de hipersensibilizare imediată cu prurit generalizat, urticarie sau edem, hTA; mialgii, artralgii, cefalee.

DIF-TET-ALL (ADULT/PEDIATRIC) *COD ATC: J07AM51*
BIOCINE S.P.A.; Susp. inj.; o doză de 0,5 ml conține: anatoxină difterică purificată: min. 30 UI; anatoxină tetanică purificată: min. 40 UI. adsorbite pe hidroxid de aluminiu ***(S)***

Ind: Prevenirea combinată a difteriei și tetanosului.
Dz: Inj. i.m., s.c. *Primovaccinare:* 3 doze × 0,5 ml la interval de 1-2 luni. *Rapel:* o doză × 0,5 ml la fiecare 5-10 ani.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componenții vaccinului (conține tiomersal). Stări febrile.
A!: Nu se adm. intravascular.
RA: Reacții locale: durere, eritem, indurație, edem.

DI-TE ANATOXAL BERNA (ADULT/PEDIATRIC) *COD ATC: J07AM51*
SWISS SERUM AND VACCINE INSTITUTE; Susp. inj. o doză de 0,5 ml conține: anatoxină difterică purificată: min. 30 UI; anatoxină tetanică purificată: min. 40 UI. ***(S)***

Ind: Imunizare activă împotriva difteriei și tetanosului la adulți și la copii peste 12 ani.

Dz: Inj. i.m. *Primovaccinare:* 3 doze × 0,5 ml la interval de 4 săptămâni. *Rapel:* o doză × 0,5 ml după primul an, apoi la fiecare 5 ani.
Cind: Hipersensibilitate la componentele vaccinului. Stări febrile. Copii cu antecedente convulsive.
A!: Nu se adm. intravascular.
RA: Durere, transpirații, manifestări cutanate tranzitorii.

E

ENCEPUR (ADULT), ENCEPUR K (PEDIATRIC) *COD ATC: J07BA01*
CHIRON BEHRING GmbH; Susp. inj.; O doză de vaccin (0,5 ml susp.) conține 1,5 μg ***(S)***

Ind: Persoanelor care trăiesc în zone endemice (risc crescut de transmitere BSE).
Dz: Inj. i.m. *Schemă de vaccinare la copil sub 12 ani:* adm. 3 doze: ziua 0, 1 și 3 luni, apoi în lunile 9-12 (ziua 0, 7, 21) rapel la fiecare 3 ani. *Schemă de vaccinare a adultului:* identică cu cea a copilului. Imunizarea persistă 1 an chiar dacă se întrerupe adm. după a doua inj.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre componenți. Subiecții cu boli febrile acute, severe.
RA: Tranzitorii, dispar după 24 ore: durere, eritem, indurație, transpirație, sindrom pseudogripal (oboseală, tuse, dureri musculare).

ENGERIX B 10 μg/0,5 ml, ENGERIX B 20 μg/1 ml *COD ATC: J07BC01*
GLAXO SMITHKLINE; Susp inj.; o doză de 10 μg de vaccin (0,5 ml susp.) conține 10 μg AgHBs; o doză de 20 μg de vaccin (1 ml susp.) conține 20 μg AgHBs. ***(S)***

Ind: Imunizarea activă față de infecția cu virusul hepatitei B (VHB) și hepatita D (cauzată de agentul delta) aceasta neproducându-se în absența hepatitei B.
Dz: Doza de 20 μg este destinată adm. la adulți și copii cu vârsta de peste 15 ani. Vaccin cu doza de 10 μg: este destinat adm. la copii cu vârsta de până la 15 ani, inclusiv, precum și nou-născuților. Schemă de vaccinare: adm. vaccinului la 0, 1 și 2 luni, rapel la 12 luni, sau vaccinarea la 0, 1 și 6 luni.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre componenți. Pacienți care au prezentat fenomene de hipersensibilitate după o adm. anterioară de Engerix B.
A!: Adm. trebuie amânată la subiecții cu boli febrile acute, severe. Din cauza perioadei lungi de incubație a hepatitei B, este posibilă existența unei infecții nemanifeste la momentul vaccinării. În această situație, vaccinul nu poate preveni hepatita B. Vaccinul nu previne hepatita produsă de alt virus, cum este cel al hepatitei A, C sau E sau de alți agenți infecțioși. Sarcină și alăptare.
RA: Comune: la locul inoculării: durere tranzitorie, eritem, indurație. Rare: generale: fatigabilitate, febră, indispoziție, simptome pseudogripale. SNC: vertij, cefalee, parestezie. Aparat digestiv: grețuri, vărsături, diaree, dureri abdominale. Ficat și veziculă biliară: parametri funcționali hepatici modificați. Sistem musculoscheletal: artralgie, mialgie. Piele și anexe: rash, prurit, urticarie. Foarte rare: generale: anafilaxie, boala serului; sincopă, hTA; paralizie, neuropatie, nevrită (inclu-

siv sindrom Guillan-Barré, nevrită optică și scleroză multiplă), encefalită, encefalopatie, meningită; artrită; simptome pseudo-bronhospastice; angioedem, eritem multiform; vasculită; limfadenopatie.

ERVEVAX *COD ATC: J07BJ01*
GLAXO SMITHKLINE; Liof.; o doză de 0,5 ml vaccin reconstituit conține: min. 1000 DICT 50 virus rubeolic tulpina RA 27/3 și maximum 25 mg sulfat de neomicină B. ***(S)***

Ind: Imunizarea activă a copiilor și adulților față de rubeolă, începând cu vârsta de 12 luni.
Dz: Inj. s.c. Se adm o singură doză de 0,5 ml; revaccinarea nu este necesară.
Cind: Afecțiuni febrile sau respiratorii acute sau în perioada de incubație a unei alte boli decât rubeola. Hipersensibilitate la neomicină. Pacienți cu imunodepresie. Sarcină și alăptare.
A!: Prudență în caz de antecedente personale sau familiale de boli alergice. Este preferabil ca vaccinarea copiilor cu convulsii în antecedente să nu fie făcută înaintea vârstei de 24 de luni. Subiecții cărora li s-au adm. gammaglobuline umane sau o transfuzie de sânge nu trebuie vaccinați în următoarele 3 luni, deoarece anticorpii antirubeolici dobândiți pasiv pot anihila efectul vaccinului. Vaccinul viu fiind rapid inactivat de alcool, dezinfectante și antiseptice, se recomandă evitarea contactului cu acestea în cursul reconstituirii și adm.
RA: Infecție subclinică necontagioasă, însoțită de rare reacții secundare. Simptome asemănătoare celor din rubeolă: limfadenopatie, erupție cutanată, febră, artralgie și artrită pasagere, cu sau fără efuziune articulară sau, în extrem de rare cazuri, o polineuropatie tranzitorie. La copii, aceste reacții articulare sunt benigne și de scurtă durată, neafectând activitatea fizică normală decât în cel mult 1% dintre cazuri. La femei, reacțiile articulare tind să fie mai severe și de durată mai lungă.

EUVAX – B (ADULT), EUVAX – B (PEDIATRIC) *COD ATC: J07BC01*
PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT; Susp inj. i.m.; 1 ml vaccin conține: HBsAG purificat 20 µg; 0,5 ml ml vaccin conține: HBsAG purificat 10 µg. ***(S)***

Ind: Imunizare împotriva infecțiilor cauzate de toate subtipurile cunoscute ale virusului hepatitei B.
Dz: Inj. i.m. *Nou-născuți și copii sub 15 ani:* 0,5 ml/doză; se adm. 3 doze după schema: 0 - 1 - 6 luni. *Adulți și copii peste 15 ani:* 1 ml/doză; se adm 3 doze după schema: 0 - 1 - 6 luni. Programul alternativ de imunizare prevede 1 injecție/lună timp de 3 luni (0,1-2 luni) și un rapel după 12 luni.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele vaccinului.
A!: Precauții generale: Adm. va fi amânată în cazul pacienților care prezintă afecțiuni acute febrile severe. În cazul bolnavilor de scleroză în plăci orice stimulare a sistemului imunitar poate duce la o exacerbare a simptomelor bolii. Vaccinarea împotriva hepatitei B nu are efect asupra persoanelor aflate în stadii subclinice sau progresive ale bolii. Nu se adm. în regiunea fesieră și nici i.v. Sarcină și alăptare.
RA: Reacții locale: eritem, durere, tumefiere, febră ușoară. Rare: hipertermie (peste 38,8°C); reacții sistemice: amețeli, astenie, cefalee, vărsături, mialgii, artrite; erupții cutanate și o creștere trecătoare a transaminazelor. Foarte rare: nevrite, nevrita optică, pareze faciale, s. Guillain-Barré.

F

FLUARIX *COD ATC: J07BB02*

GLAXO SMITHKLINE; Susp. inj.; o doză de 0,5 ml inoculat conține hemaglutinină și neuraminidază echivalente cu: A/Sydney/5/97 (H3N2) 15 µg HA; A/Bejing/262/95 (H1N1) 15 µg HA; B/Bejing/184/93 15 µg HA. ***(OTC)***

Ind: Prevenirea gripei. Este potrivit pentru toate persoanele la care este de dorit să se reducă probabilitatea unei infecții gripale cu posibile complicații asociate (în special la persoane peste 60 ani).
Dz: Doza pentru *adulți și copii peste 6 ani* este de 0,5 ml. Pacienții cu imunodeficiențe vor fi imunizați de 2 ori la un interval de cel puțin 4 săptămâni. Pentru *copiii de până la 6 ani,* care nu au mai fost vaccinați în prealabil: 2 doze × 0,25 ml la interval de 4-6 săptămâni. Imunizarea trebuie făcută în fiecare toamnă prin inj. i.m. sau profund subcutanat. Durata imunității post-vaccinale: 6-12 luni.
Cind: Hipersensibilitate la proteinele din ou sau la persoanele care au avut o reacție alergică severă la o vaccinare antigripală anterioară.
A!: Se recomandă ca imunizarea să fie amânată la pacienții cu infecții acute sau cu boli febrile.
RA: Roșeață (în special după inj. s.c.), umflătură și durere; uneori mărirea ganglionilor limfatici din vecinătatea locului de inj. Efecte secundare sistemice: oboseală, durere de cap, transpirații, tremurături, creșterea temperaturii, mialgii, artralgii sau simptome gastrointestinale. Aceste simptome dispar în general fără tratament în 1-2 zile. Reacții inflamatorii la nivelul SNC sau periferic, până la paralizie respiratorie. Reacții alergice, care pot duce la șoc, în foarte rare cazuri.

H

HAVRIX™ 1440 ADULT, HAVRIX JUNIOR *COD ATC: J07BC02*

GLAXO SMITHKLINE; Susp inj. Havrix 1440 Adult: antigen viral min. 1440 u ELISA (U.El)/ml; Havrix Junior: min. 720 U.El. de antigen viral/0,5 ml. ***(S)***

Ind: Imunizarea activă față de infecțiile produse de virusul hepatitei A (VHA) la subiecții cu risc.
Dz: Imunizarea primară: *adulți peste 19 ani:* o doză de Havrix 1440 Adult (1,0 ml susp); *copii și adolescenți 1-18 ani, inclusiv:* o doză de Havrix Junior (0,5 ml susp). Rapel în orice moment cuprins între a 6-a și cea de-a 12-a lună după prima doză de vaccin. Se inj. i.m. în regiunea deltoidiană la adulți și copii și în porțiunea antero-laterală a coapsei la copiii mici.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la orice component al vaccinului.
A!: Administrarea de Havrix trebuie amânată la subiecții care suferă de afecțiuni febrile acute severe. La pacienții hemodializați și la cei cu afectări ale sistemului imun este posibil ca titrul adecvat de anticorpi anti-VHA să nu fie obținut după o singură doză de Havrix, acești pacienți necesitând, de aceea, doze suplimentare de vaccin. Sarcină și alăptare.
RA: Locale: durere la locul inj., eritem și indurație ușoară. Sistemice: cefalee, indispoziție, febră, greață și diminuarea apetitului.

H-B-VAX II *COD ATC: J07BC01*

MERK SHARP & DOHME; Susp. inj. cu 5 µg de antigen hepatitic B de suprafață/0,5 ml; 10 µg de antigen hepatitic B de suprafață/1 ml. Antigenul hepatitic B de suprafață este adsorbit pe 0,5 mg de aluminiu (sub formă de sulfat hidroxifosfat amorf de aluminiu)/ml vaccin. ***(S)***

Ind: Imunizarea contra infecției produsă de toate subtipurile cunoscute ale virusului hepatitic B. Previne apariția hepatitei D (cauzată de virusul delta) în condițiile în care hepatita D nu apare în absența infecției hepatitice B.
Dz: NU LA PACIENȚI ÎN PREDIALIZĂ/PACIENȚI DIALIZAȚI. Se adm. inj. im, la adulți în mușchiul deltoid și la sugari și copiii mici pe fața anterolaterală a coapsei. *Sugari, copii și adolescenți (până la 19 ani):* (3 × 5 µg); *Adulți (peste 20 de ani):* (3 × 10 µg); *Adolescenți (11-15 ani):* (2 × 10 µg); Adolescenții (cu vârsta între 11-15 ani) pot primi fie regimul de 3 × 5 µg fie cel de 2 × 10 µg.
Cind: Hipersensibilitate la drojdie sau la oricare dintre componentele vaccinului.
A!: Persoanele cu imunodeficiență sau cele care primesc tratament imunosupresiv au nevoie de doze mai mari de vaccin. Pacienții care prezintă simptome sugestive de hipersensibilitate. Orice infecție severă activă cu excepția situațiilor în care medicul consideră că amânarea vaccinului reprezintă un risc mai mare. Adm. la persoane cu afectare gravă cardiopulmonară sau la cele la care o reacție febrilă sau sistemică trebuie făcută cu prudență și doar în condiții de asistență adecvate.

HBVAXPRO *COD ATC: J07BC01*

MERK SHARP & DOHME; Vaccin antihepatită B: 5 micrograme/0,5 ml, 10 micrograme/ml, 40 micrograme/ml

Ind: Imunizarea activă împotriva hepatitei cu virus B cauzată de toate subtipurile acestuia la copii și adolescenți (de la naștere până la 15 ani) considerați a fi expuși la risc de infectare cu virusul hepatitic B. Categoriile specifice considerate la risc, care trebuie imunizate vor fi determinate în baza recomandărilor oficiale. Este de așteptat ca prin imunizare să se asigure și prevenția față de hepatita D, deoarece aceasta (cauzată de agentul delta) nu apare în absența hepatitei B.
Dz: Administrare intramusculară *5 micrograme/0,5 ml: Copii și adolescenți (de la naștere până la 15 ani):* 1 doză (5 micrograme) de 0,5 ml la fiecare administrare.
10 micrograme/ml: Adulți și adolescenți (de 16 ani și peste): 1 doză (10 µg) de 1 ml la fiecare administrare. *Primo-vaccinarea:* o vaccinare completă trebuie să includa cel puțin trei injecții. Pot fi recomandate două scheme pentru imunizarea primară: 0, 1, 6 luni: două injecții la un interval de o lună; o a treia injecție după 6 luni de la prima administrare; 0, 1, 2, 12 luni: trei injecții cu un interval de o lună între ele; a patra doză se va administra la 12 luni. Recomandări de dozare pentru nou-născuți din mame purtătoare de virus hepatitic B: la naștere, o doză de imunoglobulină pentru hepatita B (în primele 24 de ore); prima doză de vaccin trebuie administrată în primele 7 zile de la naștere și poate fi administrată simultan cu imunoglobulina pentru hepatita B dar cu alt loc de injectare. Recomandări de dozare pentru expunere cunoscută sau presupusă la virusul hepatitic B (de ex. înțepătură cu un ac contaminat): trebuie administrată imunoglobulina pentru hepatita B la cât mai scurt timp după expunere (în primele 24 ore). Prima doză de vaccin trebuie administrată în primele 7 zile de la

expunere și poate fi administrată simultan cu imunoglobulina pentru hepatita B dar cu alt loc de injectare. Următoarele doze de vaccin, dacă este cazul (de ex. conform serologiei pacientului) trebuie administrate conform recomandărilor schemelor de imunizare. Poate fi propusă schema accelerată.
40 micrograme/ml: Pacienți în predializa și dializați: 1 doză (40 micrograme) de 1 ml la fiecare administrare. *Primo-vaccinarea:* o vaccinare completă trebuie să includă trei injecții. Schema 0, 1, 6 luni: două injecții la un interval de o lună; o a treia injecție după 6 luni de la prima administrare. Rapel: La aceste persoane vaccinate poate fi luată în considerare o doză de susținere dacă nivelul anticorpilor împotriva antigenului de suprafață al virusului hepatitic B (Ag anti-HBs) este mai mic de 10 UI/l.
Cind: Hipersensibilitate la substanță activă sau la oricare dintre excipienți. Stări febrile grave.
A!: Datorită perioadei lungi de incubație a hepatitei B, este posibil ca la momentul vaccinării infecția să fie instalată, dar nerecunoscută încă. În asemenea cazuri vaccinul nu va mai preveni infecția. Vaccinul nu va preveni infecția cauzată de alți agenți cum ar fi virusul hepatitei A, hepatitei C și al hepatitei E și de alți patogeni cunoscuți ca și cauzatori de infecții hepatice. Trebuie să fie la îndemână tratament adecvat pentru cazurile, rare, de reacții anafilactice apărute după administrarea vaccinului. Acest vaccin poate fi administrat: împreună cu imunoglobulina pentru hepatita B, dar cu loc de injectare diferit de al acesteia; pentru realizarea completă a imunizării primare sau ca doză de rapel la persoane care au primit anterior un alt vaccin hepatitic B; concomitent cu alte vaccinuri, folosind locuri de injectare și siringi diferite.
RA: Frecvente (>1/100, <1/10): Reacții locale (la locul injecției), sensibilitate trecătoare, eritem, indurație. Foarte rare (<1/10000): trombocitopenie, adenopatie limfatică; boala serului, angioedem, anafilaxie; parestezii, paralizii (paralizia Bell), neuropatii periferice (poliradiculonevrită, paralizie de facial), nevrite (inclusiv sindrom Guillain-Barré, nevrită optică, mielite inclusiv mielita transversă), encefalită, boală demielinizantă a sistemului nervos central, exacerbarea sclerozei multiple, scleroza multiplă, convulsii, cefalee; hipotensiune, vasculită; simptome de tip bronhospasm; vărsături, greață, diaree, creșteri ale enzimelor hepatice; rash, alopecie, prurit, urticarie, eritem multiform; artralgii, artrită, mialgii; astenie, amețeli, sincopă, febră, stare de rău, simptome tip gripă, dureri abdominale.

HIBERIX *COD ATC: J07AG01*
GLAXOS SMITHKLINE; Liof. conține 10 µg de polizaharid capsular purificat al Hib, legat covalent cu aproximativ 30 µg toxoid tetanic. *(S)*

Ind: Imunizarea activă a tuturor copiilor, începând cu vârsta de 2 luni, față de boala produsă de Hib (H. influenzae tip b).
Dz: *Schema de vaccinare primară:* 3 doze × 0,5 ml adm. inj. i.m. în primele 6 luni de viață și poate începe de la vârsta de 2 luni. *Rapel:* în al doilea an de viață.
Cind: Hipersensibiliate cunoscută la orice component al vaccinului. Sarcină și alăptare.
A!: Adm. trebuie amânată la subiecții suferind de boli febrile acute severe. Vaccinarea nu substituie vaccinarea antitetanică de rutină.
RA: *Locale:* eritem, indurație și durere moderate la locul injecției. *Generale:* febra, diminuarea apetitului, starea de agitație, vărsăturile, diareea și plânsul neobișnuit.

IMOVAX DT ADULT *COD ATC: J07AM51*
LAB. AVENTIS; Susp. inj.; o doză de 0,5 ml conține: anatoxină difterică purificată: min. 2 UI; anatoxină tetanică purificată: min. 20 UI.*(S)*

Ind: Rapel de rutină împotriva difteriei și tetanosului
Dz: Inj. i.m., s.c. *Primovaccinare:* 3 doze × 0,5 ml la interval de o lună. *Rapel:* o doză × 0,5 ml la fiecare 10 ani. Locurile de elecție pentru inj. sunt: regiunea antero-laterală a coapsei și regiunea antero-laterală a brațului.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componenții vaccinului. Reacție de hipersensibilizare sau tulburări neurologice după o vaccinare anterioară.
A!: Nu se adm. intravascular. Terapia imunosupresivă sau imunodeficiența pot induce un răspuns imun postvaccinal diminuat. Sarcină și alăptare.
RA: Reacții locale: durere, eritem, indurație, edem. Reacții sistemice: hipertermie tranzitorie asociată sau nu cu o reacție locală și cu limfadenopatie; reacție de hipersensibilizare imediată cu prurit generalizat, urticarie sau edem, hTA; mialgii, artralgii, cefalee.

IMOVAX POLIO *COD ATC: J07F03*
LAB. AVENTIS; Seringi preumplute cu 0,5 ml sol. inj. ce conține: poliovirus inactivat tip 1, antigen D 40 u; poliovirus inactivat tip 2, antigen D 8 u; poliovirus inactivat tip 3, antigen D 32 u. *(S)*

Ind: Profilaxia poliomielitei.
Dz: Inj. i.m., s.c. *Primovaccinarea:* 3 inj. × 0,5 ml la 1-2 luni interval, cu începere de la vârsta de 2 luni. *Rapeluri:* o injecție la 1 an după cea de-a 3-a doză și apoi câte una la fiecare 5-10 ani.
Cind: Boli infecțioase acute febrile. Alergie cunoscută la streptomicină.
RA: Rar, reacție eritematoasă, însoțită de febră moderată.

INFANRIX DTPa *COD ATC: J07AJ52*
GLAXO SMITHKLINE; Susp. inj.; o doză de 0,5 ml conține min. 30 UI toxoid difteric, 40 UI toxoid tetanic, 25 µg TP, 25 µg HAF și 8 µg pertactină. *(S)*

Ind: Imunizarea primară față de difterie, tetanos și pertussis începând cu vârsta de 2 luni.
Dz: Imunizarea primară constă în 3 doze × 0,5 ml, inj. i.m. prof, cu rapeluri în cel de-al doilea și cel de-al șaselea an de viață.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la vaccin sau celor care au prezentat în antecedente semne de hipersensibilitate după o adm. anterioară de Infanrix, vaccin difteric, tetanic sau DTPc. La copii care au prezentat encefalopatii de etiologie necunoscută produse în cursul primelor 7 zile de la administrarea unui vaccin cu componentă pertussis.
A!: Febră > 40,5°C în primele 48 de ore, fără o altă cauză decelabilă; colapsul sau starea de șoc, în primele 48 de ore de la vaccinare; plânsul perma-

nent, de nestăpânit peste 3 ore, în primele 48 de ore de la vaccinare; convulsii febrile sau afebrile, în primele 3 ore de la vaccinare. Nu se adm. i.v.
RA: *Locale:* durere, eritem, indurație. *Generale:* febră, plânset neobișnuit, vărsături, diminuarea apetitului, somnolență, agitație, insomnie.

INFANRIX HEP B *COD ATC: J07CA05*
GLAXO SMITHKLINE; Susp. inj. de vaccin combinat difteric, tetanic, pertussis acelular și hepatitic B ADN-recombinant.; o doză de 0,5 ml conține min. 30 UI toxoid difteric, min. 40 UI toxoid tetanic, 25 g TP, 25 g HAF, 8 g pertactină și 10 g proteină AgHBs recombinantă. ***(S)***

Ind: Imunizarea copiilor de la vârsta de 2 luni față de difterie, tetanos, tuse convulsivă și hepatită B.
Dz: Inj. i.m. prof. 3 doze la 2, 4 și 6 luni. Dacă este adm. începând cu vârsta de 3 luni, trebuie respectat un interval de minimum 1 lună între doze (schema 3,4 și 5 luni, 3,5 și 7 luni sau 3,5 și 11 sau 12 luni). Pentru protecție pe termen lung, o doză de rapel cu vaccin hepatitic B poate fi de asemenea adm. după primul an de viață.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la orice component al vaccinului sau subiecților ce au prezentat semne de hipersensibilitate după adm. anterioare de vaccinuri difterice, tetanice, pertussis sau hepatitice B. Afecțiuni febrile acute severe, cu temperatură > 38°C. Copilului care a suferit de encefalopatie de etiologie necunoscută, produsă în cele 7 zile care au urmat unei vaccinări anterioare cu un vaccin ce conține antigene pertussis.
A!: Temperatură > 40°C în decurs de 48 de ore, fără cauză decelabilă. Colaps sau stare de șoc (episod hipotonic-hiporeactiv) în primele 48 de ore de la vaccinare. Plâns persistent cu durata > 3 ore, produs în primele 48 de ore de la vaccinare. Convulsii cu sau fără febră, în primele 3 zile de la vaccinare.
RA: Eritem, tumefacție și durere la locul inoculării. Febră, plâns neobișnuit, vărsături, diaree, inapetență și agitație.

INFANRIX HEXA *COD ATC: J07AC*
GLAXO SMITHKLINE; Pulb. liof. și susp. inj.; o doză de 0,5 ml conține: anatoxina difterică > 30 U.I., anatoxina tetanică > 40 U.I., antigene pertussis, anatoxină pertussis 25 µg, filamente de hemaglutinină 25 µg, pertactină 8 µg, antigen de suprafață recombinant al virusului hepatitic B (proteina S) 10 µg, virusuri poliomielitice inactivate (tip 1 40 U.D, tip 28 U.D, tip 3 32 U.D), polizaharid de H. influenzae tip b 10 µg, conjugat cu anatoxină tetanică 20-40 µg. ***(S)***

Ind: Primovaccinare sau ca rapel în cazul imunizării copiilor împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei B, poliomielitei și a bolii determinate de H. Influenzae tip b.
Dz: Schema de vaccinare primară (în lunile de viață 2, 3, 4; în lunile 3, 4, 5; în lunile 2, 4, 6, în lunile 3, 5 și 11 sau 12) adm. a 3 doze × 0,5 ml, i.m. profund; între 2 adm. consecutive trebuie respectat un interval de cel puțin o lună. Schema din Programul Extins de Imunizare (la 6, 10, 14 săptămâni) poate fi utilizată numai dacă a fost adm. o doză de vaccin hepatitic B la naștere.
Cind: Subiecților care în antecedente au prezentat semne de sensibilitate față de vaccinul difteric, tetanic, pertussis, hepatitic B, poliomielitei sau Hib, sau față de oricare din excipienții vaccinului. Copiilor cu antecedente de encefalopatie de etiologie necunoscută, apărută în primele 7 zile de la adm. unui vaccin ce

conținea componente pertussis. În aceste situații, se va întrerupe vaccinarea pertussis putându-se însă continua adm. vaccinurilor diftero-tetanic, hepatitic B, poliomielitic și Hib. La subiecții suferind de boli acute febrile severe.
A!: Decizia asupra adm. trebuie făcută numai după evaluarea atentă a unor manifestări clinice în antecedente pertussis-induse, de tipul: temperatură > 40°C în primele 48 de ore de la vaccinare, fără alte cauze decelabile; colaps sau stare de pseudo-șoc în primele 48 de ore de la vaccinare; plâns persistent, neconsolabil > 3 ore, apărut în primele 48 de ore de la adm.; convulsii însoțite sau nu de febră, apărute în primele 3 zile de la vaccinare. Prudență la subiecții cu trombocitopenie sau tulburări de coagulare (se pot produce hemoragii în urma adm. i.m.). Întrucât conține urme de neomicină și polimixină, vaccinul va fi adm. cu prudență subiecților cu antecedente de hipersensibilitate la acestea. Componenta hepatitică B din vaccin nu previne infecțiile cauzate de alți agenți patogeni cum ar fi virusurile hepatitei A, hepatitei C, hepatitei E sau alți agenți cunoscuți cu efect hepatotrop patogen. Componenta Hib a vaccinului nu oferă protecție față de bolile determinate de alte serotipuri capsulare decât tipul b de H. Influenzae. Antecedentele personale de convulsii febrile necesită o atenție specială.
RA: Reacții locale: durere, eritem, edem la locul inj. Reacții sistemice: pierderea apetitului, febră, amețeală, iritabilitate. Rar: Dermatită, oboseală, durere abdominală, diaree, enterită, gastro-enterită, vomă, somnolență, infecție, otită medie, eczemă, constipație. A fost raportată o creștere a reactogenicității după rapelul cu Infanrix hexa în cazurile în care primovaccinarea s-a realizat cu Infanrix.

INFANRIX-HIB *COD ATC: J07AG52*

GLAXO SMITHKLINE; Susp. inj.; o doză de 0,5 ml conține min. 30 UI de toxoid difteric, 40 UI de toxoid tetanic adsorbit, 25 µg de TP, 25 µg de HAF, 8 µg de pertactină și 10 µg de polizaharid capsular al Hib purificat și cuplat covalent cu 30 µg toxoid tetanic. ***(S)***

Ind: Imunizarea activă a tuturor copiilor începând cu vârsta de 2 luni, față de difterie, tetanos, tuse convulsivă (DTP) și Hib.
Dz: Inj. i.m. prof., 3 doze adm. în primele 6 luni de viață și poate debuta de la vârsta de 2 luni. Pentru a asigura o protecție pe termen lung, se recomandă o doză de rapel pentru DTP și Hib în al doilea an de viață.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la orice component al vaccinului sau celor care au prezentat semne de hipersensibilitate după o administrare anterioară de vaccin difteric, tetanic, pertussis sau Hib. Ca și în cazul altor vaccinuri, adm. trebuie amânată la subiecții cu afecțiuni febrile acute severe.
A!: Febră > 40,5°C în primele 48 de ore de la vaccinare și fără altă cauză decelabilă. Starea de colaps sau șoc (episod hipotonic-hiporeactiv) în primele 48 de ore de la vaccinare. Plânsul persistent peste 3 zile și care debutează în primele 48 de ore de la vaccinare. Convulsii cu sau fără febră, produse în primele 3 zile de la vaccinare.
RA: *Locale:* durere, eritem, indurație. *Generale:* febră, inapetență, agitație, plâns nejustificat, vărsături, diaree.

INFANRIX-IPV + HIB *COD ATC: J07CA06*

GLAXO SMITHKLINE; Susp. liof. inj.; o doză de 0,5 ml conține min. 30 UI toxoid difteric, min. 40 UI toxoid tetanic adsorbit, 25 µg TP, 25 µg HAF, 8 µg pertactină, 40 u antigen D de poliovirus tip 1 (Mahoney), 8 u antigen D de poliovirus tip 2 (MEF-1) și 32 u antigen D de poliovirus tip 3 (Saukett). Mai conține 10 mg polizaharid capsular Hib purificat, legat covalent de aprox. 30 mg toxoid tetanic. ***(S)***

Ind: Imunizarea activă a copiilor începând cu vârsta de 2 luni, față de difterie, tetanos, tuse convulsivă, poliomielită și Haemophilus influenzae tip b. Rapel pt. copiii care au fost imunizați anterior cu antigene DTP, polio și Hib.
Dz: Inj. i.m., 3 doze administrate în primele 6 luni de viață, începând cu vârsta de 2 luni. Între 2 doze trebuie administrat un interval de cel puțin 1 lună. Rapelul este indicat în al doilea an de viață.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele vaccinului sau celor care au prezentat în antecedente semne de hipersensibilitate la adm. de vaccinuri difteric, tetanic, pertussis, polio sau Hib. La copiii care au prezentat encefalopatie de etiologie necunoscută, produsă în decursul primelor 7 zile de la adm. unui vaccin cu componentă pertussis.
A!: Febră > 40°C (intrarectal) în primele 48 de ore, fără nici o altă cauză decelabilă. Colaps sau stare de șoc (episod hipotonic-hiporeactiv) în primele 48 de ore de la vaccinare. Plâns persistent cu durată de peste 3 ore, în primele 48 de ore de la vaccinare. Convulsii, cu sau fără febră, în primele 3 zile de la vaccinare. Vaccinul se adm. în porțiunea antero-laterală a coapsei.
RA: Locale: durere, eritem și tumefacție. Sistemice: febra, plânsul persistent, vărsăturile, diareea, diminuarea apetitului alimentar și insomnia.

INFANRIX PENTA *COD ATC: J07CA*

GLAXO SMITHKLINE; Susp. inj.; o doză de 0,5 ml conține: anatoxină difterică > 30 U.I., anatoxină tetanică > 40 U.I., antigene pertussis, anatoxină pertussis 25 µg, filamente de hemaglutinină 25 µg, pertactină 8 µg, antigen de suprafață recombinant al virusului hepatitic B (proteina S) 10 µg, virusuri poliomielitice inactivate (tip 1 40 U.D, tip 28 U.D, tip 3 32 U.D). ***(S)***

Ind: Vaccinarea primară și ca rapel pentru sugari împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei B și a poliomielitei.
Dz: *Primovaccinare* (în lunile 2, 3, 4; în lunile 3, 4, 5; în lunile 2, 4, 6, în lunile 3, 5 și 11 sau 12): 3 doze × 0,5 ml, i.m. profund. Între 2 adm. consecutive trebuie respectat un interval de cel puțin o lună. Schema din Programul Extins de Imunizare (la vârsta de 6, 10, 14 săptămâni) poate fi utilizată numai dacă a fost adm. o doză de vaccin hepatitic B la naștere. *Rapelul:* Poate fi utilizat ca rapel numai dacă sugarului i-a fost adm. schema completă de vaccinare cu toate antigenele vaccinului, indiferent dacă au fost adm. sub forma vaccinurilor monovalente sau combinate.
Cind: Subiecților cu sensibilitate față de vaccinul difteric, tetanic, pertussis, hepatitic B, sau poliomielitic sau față de oricare dintre excipienții vaccinului. Copiilor cu antecedente de encefalopatie de etiologie necunoscută apărută în primele 7 zile de la adm. unui vaccin ce conține componente pertussis. În aceste situații, se va întrerupe vaccinarea pertussis și se continuă cu adm. de vaccinuri diftero-tetanic, hepatitic B și poliomielitic. La subiecții suferind de boli acute febrile severe.
A!: Decizia asupra adm. unui vaccin cu componentă pertussis trebuie luată numai după evaluarea atentă a prezenței unor manifestări clinice pertussis-induse, de tipul: temperatură peste 40°C în primele 48 de ore, fără alte cauze decelabile; colaps sau stare de pseudo-șoc în primele 48 de ore de la vaccinare; plâns persistent și neconsolabil peste 3 ore, apărut în primele 48 de ore de la vaccinare; convulsii însoțite sau nu de febră, apărute în primele 3 zile de

la vaccinare. Prudență subiecților cu trombocitopenie sau tulburări de coagulare (pot apărea hemoragii). Întrucât conține urme de neomicină și polimixină vaccinul va fi adm. cu prudență subiecților cu antecedente de hipersensibilitate la aceste două antibiotice. Componenta hepatitică B din vaccin nu previne infecțiile cauzate de alți agenți patogeni cum ar fi virusurile hepatitei A, hepatitei C, hepatitei E sau alți agenți cunoscuți cu efect patogen hepatotrop. Antecedentelor personale de convulsii febrile li se vor acorda o atenție specială. La subiecții cu imunodepresie este posibil să nu se obțină răspunsul imun așteptat.
RA: *Primovaccinare:* reacții locale: durere, roșeață, edem la locul injecției. Reacții sistemice: diaree, pierderea apetitului, neliniște, plâns neobișnuit, vomă. Mai puțin comune: Enterită, gastroenterită, infecție, infecție virală, otită medie, infecție de tract respirator sup., bronșită, afecțiuni respiratorii, sinuzite, eczemă, conjunctivite, somnolență. Foarte rare: Convulsii, reacții alergice. *Rapel:* Reacții locale: durere, roșeață, edem la locul injectării. Reacții sistemice: diaree, pierderea apetitului, febră peste de 38°C, neliniște, insomnie, vomă, gastroenterite, dermatite, sindrom pseudo-gripal, infecție, infecție virală, moniliază, infecții de tract respirator superior, otită medie, bronșite, tuse, rinite, faringite, eczemă, rash.

INFLUVAC *COD ATC: J07BB02*

SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.; Susp. inj. ***(P-RF)***

Ind: Prevenirea gripei. Este potrivit pentru toate persoanele la care este de dorit să se reducă probabilitatea unei infecții gripale cu posibile complicații asociate.
Dz: Doza pentru adulți și copii este de 0,5 ml. Pacienții cu imunodeficiențe vor fi imunizați de 2 ori la un interval de cel puțin 4 săptămâni. Pentru copiii de până la 6 ani, care nu au mai fost vaccinați în prealabil: 2 doze × 0,5 ml la interval de 4 săptămâni. Imunizarea trebuie făcută în fiecare toamnă prin inj. i.m. sau profund subcutanat. Durata imunității post-vaccinale: 6-12 luni.
Cind: Hipersensibilitate la proteinele din ou sau la tiomersal sau la persoanele care au avut o reacție alergică severă la o vaccinare antigripală anterioară.
A!: Se recomandă ca imunizarea să fie amânată la pacienții cu infecții acute sau cu boli febrile. Precauții la pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la gentamicină.
RA: Roșeață (în special după inj. s.c.), umflătură și durere; uneori mărirea ganglionilor limfatici din vecinătatea locului de inj. Efecte secundare sistemice: oboseală, durere de cap, transpirații, tremurături, creșterea temperaturii, mialgii, artralgii sau simptome gastrointestinale. Aceste simptome dispar în general fără tratament în 1-2 zile. Reacții inflamatorii la nivelul SNC sau periferic, până la paralizie respiratorie. Reacții alergice, care pot duce la șoc, în foarte rare cazuri. Vasculite s-au raportat în foarte rare cazuri, în interval de 2 săptămâni de la imunizare. Aceasta se poate asocia cu probleme renale temporare.

IRS-19 *COD ATC: J07AX*

SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.; Sol. pt. spray nazal de vaccin polimicrobian care conține: lizate bacteriene în suspensie 43,27 ml (în soluție de glicină 10 %); fl. × 20 ml.

Ind: Tratamentul profilactic de scurtă durată al infecțiilor ORL recurente.
Dz: Se administrează pe cale nazală. Ca metodă preventivă: 2 sprayuri zilnice în fiecare fosă nazală, pe o perioadă de aproximativ 2 săptămâni. Pentru utilizare, se menține flaconul în poziție verticală și se apasă repede pe capac.

Cind: Hipersensibilitate la unul dintre constituenți. Sarcină și alăptare.
A!: În cazul semnelor clinice de infecții bacteriene sistemice, se recomandă tratament cu antibiotice pe cale sistemică.
RA: Risc de alergie (urticarie).

M

MENCEVAX A + C *COD ATC: J07AH03*
GLAXO SMITHKLINE; Pastilă liof. + solv.; 0,5 ml de vaccin reconstituit conține 50 µg din fiecare dintre polizaharidele meningococului (Neisseria meningitidis) de serogrup A și C. ***(S)***

Ind: Imunizarea activă a adulților și copiilor peste 2 ani față de meningitele meningococice produse de meningococi de serogrup A sau C.
Dz: Inj. s.c., o doză × 0,5 ml vaccin.
Cind: Boli febrile acute, severe. Hipersensibilitate cunoscută la fenol.
A!: Nu conferă protecție față de meningite cauzate de meningococi aparținând altor serogrupe decât A și C. Rata seroconversiei la copii vaccinați sub vârsta de doi ani este mai scăzută pentru serogrupul C. În schimb, aceasta este bună față de serogrupul A chiar și la copiii vaccinați de la vârsta de 6 luni. Sarcină și alăptare.
RA: Reacții locale: eritem, ușoară indurație și jenă sau durere la locul inoculării. Reacții febrile și frisoane au fost rar observate în primele 24 de ore de la imunizare.

MMR II *COD ATC: J07BD52*
MERCK SHARP & DOHME; Pulb. liof. cu o doză de vaccin cu virus viu rujeolic, urlian și rubeolic. ***(S)***

Ind: Imunizarea simultană a copiilor în vârstă de peste 15 luni împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei.
Dz: Inj. s.c. Volumul total al unui flacon cu o doză de vaccin reconstituit (aprox. 0,5 ml) se va injecta s.c., în regiunea superioară externă a brațului.
Cind: Hipersensibilitate la neomicină (fiecare doză de vaccin reconstituit conține 25 mg de neomicină). Antecedente de reacții anafilactice sau anafilactoide la ouă. Orice afecțiune respiratorie febrilă sau alte infecții febrile active. Tbc activă netratată. Pacienți care primesc terapie imunosupresivă. Persoane cu discrazie sanguină, leucemie, limfoame de orice tip sau alte neoplasme maligne care afectează măduva osoasă sau sistemul limfatic. Status de imunodeficiență primară sau dobândită, inclusiv pacienți imunodeprimați prin asocierea cu SIDA sau alte manifestări clinice ale unor infecții cu virusuri umane imunodeficiente; deficiențe celulare imune; și status de hipogamaglobulinemie sau disgamaglobulinemie. Persoane cu antecedente familiale de imunodeficiență congenitală sau ereditară, până când se demonstrează starea imună a potențialului primitor de vaccin. Sarcină și alăptare. Sarcina va fi evitată 3 luni după vaccinare.
A!: Antecedente individuale sau familiale de convulsii, cu antecedente de afecțiuni cerebrale sau la cei aflați în orice altă situație în care stresul datorat febrei trebuie evitat. Copiii și adulții tineri cunoscuți a fi infectați cu virusuri umane imunodeficiente. După transfuzii de sânge sau plasmă sau după adm. de Ig

serice umane, vaccinarea trebuie amânată pentru cel puțin 3 luni. Vaccinurile vii atenuate cu virus rujeolic, urlian și rubeolic adm. separat pot determina o depresie temporară a sensibilității tegumentare la tuberculină.
RA: Comune: arsuri și/sau înțepături de scurtă durată la locul injectării. Ocazionale: Ale organismului ca întreg: Febră (38,3°C sau mai mult); rash. Rare: eritem, indurație și sensibilitate; dureri în gât, indispoziție, parotidită, greață, vomă, diaree, limfadenopatie regională, trombocitopenie, purpură. Hipersensibilitate: edem și eritem la locul injectării, reacții anafilactice sau anafilactoide, urticarie. Artralgie și/sau artrită, mialgie, convulsii febrile la copii, convulsii afebrile, cefalee, vertij, parestezii, polinevrită, sd. Guillan-Barré, ataxie.

P

PENTACT-HIB *COD ATC: J07CA06*
LAB. AVENTIS; Susp. liof. inj. conținând componentele DTP și polio și pulbere liof. cu polizaharidul capsular Hib purificat ***(S)***

Ind: Imunizarea activă a copiilor începând cu vârsta de 2 luni, față de difterie, tetanus, tuse convulsivă, poliomielită și Haemophilus influenzae tip b. Rapel pt copiii care au fost imunizați anterior cu antigene DTP, polio și Hib.
Dz: Inj. i.m., 3 doze adm. în primele 6 luni de viață, începând cu vârsta de 2 luni. Între 2 doze adm. se păstrează un interval de cel puțin 1 lună. Rapelul este indicat în al doilea an de viață. Vaccinul se adm. în porțiunea antero-laterală a coapsei.
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele vaccinului sau celor care au prezentat în antecedente semne de hipersensibilitate la adm. de vaccinuri difteric, tetanic, pertussis, polio sau Hib. La copiii care au prezentat encefalopatie de etiologie necunoscută, produsă în decursul primelor 7 zile de la adm. unui vaccin cu componentă pertussis.
A!: Febră > 40°C în primele 48 de ore, fără nici o altă cauză decelabilă. Colaps sau stare de șoc (episod hipotonic-hiporeactiv) în primele 48 de ore de la vaccinare. Plâns persistent cu durată de peste 3 ore, în primele 48 de ore de la vaccinare. Convulsii, cu sau fără febră, în primele 3 zile de la vaccinare.
RA: Locale: durere, eritem și tumefacție. Sistemice: febra, plânsul persistent, vărsăturile, diareea, diminuarea apetitului alimentar și insomnia.

PNEUMO 23 *COD ATC: J07AL01*
LAB. AVENTIS; Sol. inj.; o doză de vaccin conține: polizaharide capsulare înalt purificate de Streptococcus pneumoniae 25 g, din următoarele 23 serotipuri: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F. ***(S)***

Ind: Prevenirea infecțiilor pneumococice, în special respiratorii, pentru adulți și copii mai mari de 2 ani.
Dz: Inj. i.m., s.c. *Imunizare primară:* o singură injecție este suficientă pentru a proteja organismul împotriva serotipurilor pneumococice conținute în vaccin. *Revaccinarea:* nu se adm. mai devreme de 5 ani, de la prima vaccinare, excepție făcând persoanele foarte expuse riscului de îmbolnăvire sau subiecții care urmează un tratament cu imunosupresoare.

Cind: Reacție post-vaccinală puternică după o vaccinare precedentă. O vaccinare precedentă datând de mai puțin de 5 ani. Sarcină și alăptare.
RA: Reacții de hipersensibilizare; uneori, oboseală, durere ușoară și indurație la locul injecției, asociate, în unele cazuri, cu febră moderată, cu durata medie de 24 ore; rare cazuri de reacții generale minore (astenie, febră, frison, cefalee).

POLIO SABIN ORAL *COD ATC: J07BF02*
GLAXO SMITHKLINE; Sol. orală cu virusuri poliomielitice vii, atenuate, tipurile 1, 2 și 3 (tulpini Sabin) și 7 µg sulfat de neomicină B. ***(S)***

Ind: Imunizarea activă a copiilor și a adulților susceptibili față de poliomielitele produse de cele trei tipuri de virusuri polio.
Dz: O doză este reprezentată de 2 picături care se descarcă dintr-un picurător special livrat împreună cu fl. multidoză sau direct din tuburi de plastic multidoze, precum și de conținutul total al tuburilor monodoză.
Cind: Afecțiuni febrile acute sau celor cu răspunsuri imune deficitare. Hipersensibilitate cunoscută la neomicină.
A!: Se adm. doar pe cale orală și nu parenteral. Din cauza posibilității de contaminare, trebuie folosit în decurs de 8 ore de la deschidere sau se aruncă. Sarcină și alăptare.
RA: Virusurile atenuate din vaccin produc o infecție asimptomatică la subiecții susceptibili. Simptome nespecifice, cum ar fi cefaleea, voma și diareea.

POLIORAL *COD ATC: J07BF02*
LAB. CHIRON SPA; Sol. orală cu virusuri poliomielitice vii, atenuate, tipul 1 min. 106 CCID50, tipul 2 min. 105 CCID50 și tipul 3 min. 105,5 CCID50 și sulfat de neomicină B. ***(S)***

Ind: Imunizarea activă a copiilor și a adulților susceptibili față de poliomielitele produse de cele trei tipuri de virusuri polio.
Dz: O doză este reprezentată de 2 picături din fl. multidoze sau conținutul total al tuburilor monodoză.
Cind: Afecțiuni febrile acute sau celor cu răspunsuri imune deficitare. Hipersensibilitate cunoscută la neomicină.
A!: Se adm. doar pe cale orală și nu parenteral. Din cauza posibilității de contaminare, trebuie folosit în decurs de 8 ore de la deschidere sau se aruncă. Sarcină și alăptare.
RA: Virusurile atenuate din vaccin produc o infecție asimptomatică la subiecții susceptibili. Simptome nespecifice, cum ar fi cefaleea, voma și diareea.

PREVENAR *COD ATC: J07AL01*
WYETH LEDERLE PHARMA; Susp. inj.; o doză de 0,5 ml conține: Polizaharid (PZ) pneumococic serotip 4 2 µg PZ pneumococic serotip 6B 4 µg, PZ pneumococic serotip 9V 2 µg, PZ pneumococic serotip 14 2 µg, PZ pneumococic serotip 18C 2 µg, PZ pneumococic serotip 19F 2 µg, PZ pneumococic serotip 23F 2 µg. ***(S)***

Ind: Imunizarea activă a sugarilor și a copiilor de 2 luni-2 ani împotriva bolii invazive determinate de Streptococcus pneumoniae, serotipurile 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F și 23F (incluzând bacteriemie, sepsis, meningită, pneumonie bacteriană).

Dz: Adm. i.m. în regiunea antero-laterală a coapsei la sugari, sau mușchiul deltoid al brațului la copiii mici. *Sugari sub 6 luni:* 3 doze × 0,5 ml, prima doză fiind adm. la vârsta de 2 luni, cu un interval de 1 lună între doze. A patra doză se recomandă în al doilea an de viață. *Sugari între 7-11 luni:* 2 doze × 0,5 ml, cu un interval de min. 1 lună între doze. A treia doză se recomandă în al doilea an de viață. *Copii 12-23 de luni:* 2 doze × 0,5 ml, cu un interval între doze de cel puțin 2 luni. Nu a fost stabilită necesitatea unui rapel.
Cind: Hipersensibilitate la substanțele active, la oricare dintre excipienți sau la anatoxină difterică.
A!: Adm. trebuie să fie amânată în caz de afecțiuni febrile acute, moderate sau severe. Prod. nu asigură protecție fața de alte serotipuri de Streptococcus pneumoniae, în afara celor incluse în vaccin și nici împotriva altor microorganisme care pot determina boală invazivă sau otită medie. Nu se adm. sugarilor și copiilor care suferă de trombocitopenie sau alte tulburări de coagulare, cu excepția cazului în care beneficiul depășește riscul adm. Imunizarea cu acest vaccin nu se substituie imunizării de rutină împotriva difteriei. Copiii cu reactivitate imună deficitară, pot avea un răspuns imun redus la imunizarea activă. Copiii cu vârsta 24 luni, cu risc crescut (cu siclemie, asplenie, infecție HIV, cei imunocompromiși) și care au fost imunizați în prealabil cu Prevenar, trebuie să primească un vaccin polizaharidic pneumococic 23-valent, ori de câte ori este recomandat. Intervalul între adm. nu trebuie să fie mai mic de 8 săptămâni. Medicația antipiretică profilactică se recomandă la: copiii care primesc Prevenar simultan cu vaccinuri pertussis celulare, datorită unei rate crescute de reacții febrile; la copiii cu boli convulsive sau cu antecedente de convulsii febrile.
RA: Reacții locale (eritem, întărire/tumefiere, durere/sensibilitate). Febră 38°C, iritabilitate, amețeală, somn agitat. Tulburări gastrointestinale: apetit scăzut, vomă, diaree.

PRIORIX *COD ATC: J07BD52*
GLAXO SMITHKLINE; Pulb. liof.; fiecare doză de 0,5 ml de vaccin reconstituit conține min. 103 CCID50 de tulpină rujeolică Schwarz, min. 103,7 CCID50 de tulpină urliană RIT 4385 și min. 103 CCID50 de tulpină rubeolică Wistar RA 27/3. ***(S)***

Ind: Imunizarea activă față de rujeolă, oreion și rubeolă.
Dz: Inj. s.c., i.m., o singură doză de 0,5 ml de vaccin reconstituit.
Cind: Boli febrile acute severe. Hipersensibilitate sistemică la neomicină sau orice alt component al vaccinului. Pacienți cu imunodeficiență primară sau secundară. Sarcină și alăptare; sarcina trebuie evitată în primele trei luni de la vaccinare.
A!: Alcoolul și alți agenți dezinfectanți trebuie lăsați să se evapore de pe piele înaintea adm., deoarece pot inactiva virusurile atenuate din compoziția vaccinului. O protecție antirujeolică limitată poate fi obținută practicând vaccinarea în intervalul de 72 de ore de la expunerea la rujeola naturală.
RA: Eritem local, rash, febră, durere locală, tumefacție locală, tumefacție parotidiană, convulsii febrile. Iritabilitate, faringită, infecții ale tractului respirator superior, rinită, diaree, bronșită, vărsături, tuse, alte infecții virale și otită medie.

RABIPUR *COD ATC: J07BG01*
LAB. CHIRON BEHRING GmbH; Pastilă liof. + solv. cu virus rabic (tulpina Wistar PM/WI 38 -1503-3M) ***(S)***

Ind: Prevenirea rabiei la subiecții expuși riscului de contaminare. Trat. după contaminarea rabică confirmată sau doar suspectă. Tratamentul persoanelor mușcate de animale turbate sau suspecte de a fi turbate; tratamentul contactanților. Trat. trebuie început imediat după contaminare într-un Centru Antirabic și va fi adaptat tipului leziunii și conform cu statusul animalului.
Dz: Inj. i.m. *Imunizare preexpunere*. Imunizare primară: 2 inj. în zilele 0 și 28. primul rapel: 1 inj. la 1 an după prima doză. Rapeluri ulterioare: 1 inj. la fiecare 3 ani. *Imunizare postexpunere*. La subiecții nevaccinați antirabic: 5 inj. (0,5 ml) i.m. în zilele: Z 0, Z 3, Z 7, Z14, Z 30, după contactul cu un animal turbat sau suspect de turbare. Opțional se poate rapel în ziua Z 90. La subiecții imunizați anterior: înainte de 1 an - 1 in în Z 0; vaccinare anterioară între 1 și 3 ani - 3 inj. în Z 0, Z 3, Z 7; vaccinare mai veche de 3 ani sau incompletă - tratament antirabic complet și seroterapie dacă este necesar.
Cind: Trat. curativ: nu există CI. Trat. preventiv: în cazul vaccinării preventive la subiecții cu risc mare de contaminare, vaccinarea va fi amânată în caz de boli acute febrile în evoluție. Sarcină și alăptare.
A!: O persoană mușcată de un animal suspect sau contaminată cu un produs infectat se va prezenta de urgență la cel mai apropiat Centru Antirabic. Precauții în caz de alergie demonstrată la neomicină.
RA: Reacții locale minore ca: roșeață, ușoară indurație la locul injectării. Rar reacție febrilă.

RIBOMUNYL

COD ATC: J07AX

LAB. PIERRE FABRE; Cpr./pulb. susp. cu 0,525 mg ARN ribozomal, format din 10 p. fracțiuni ribozomale (3,5 p. Klebsiella pn. + 3 p. Streptococcus pn. + 3 p. Streptococcus py. + 0,5 p. Haemophiluus i.) și 15 p. fracțiuni din membrana Klebsiella pneumoniae. ***(P-RF)***

Ind: Infecții ale căilor respiratorii superioare și ORL (rinofaringite, laringite, sinuzite, otite). Infecții intercurente, infecții recidivante ale ap. Respirator. Complicații ale rino-traheo-bronșitelor.
Dz: Prima lună: 1 plic dimineața, 4 zile/săptămână, timp de 3 săptămâni. Apoi, 4 zile/lună, timp de 2-5 luni.

ROUVAX

COD ATC: J06BD01

LAB. AVENTIS; Pastilă liof. + solv.; o doză de vaccin conține: virus rujeolic viu hiperatenuat cel puțin 103 CCID50 (tulpina Schwarz) (CCID50 = culturi celulare doză infectantă 50%) ***(S)***

Ind: Prevenirea rujeolei la copii, începând cu vârsta de 12 luni.
Dz: Inj. i.m., s.c. Vaccinarea antirujeolică se face începând cu vârsta de 12 luni. Pentru copiii care trăiesc în colectivități sau în țările unde există o incidență crescută a rujeolei asociate cu o rată înaltă de mortalitate, vaccinarea poate începe la vârsta de 9 luni, fiind urmată de un rapel la 6 luni de la prima injecție, când se poate asocia cu vaccinarea antiurliană și antirubeoloasă.
Cind: Imunodepresia congenitală sau dobândită (inclusiv infecția HIV). Adm. recentă de imunoglobuline. Alergie cunoscută la neomicină. Sarcină și alăptare.
A!: Vaccinul este preparat pe culturi de celule embrionate de pui, ceea ce face posibilă apariția unei reacții de hipersensibilizare la pacienții alergici la proteina de ou (reacție anafilactică după ingestia de ou). Datorită riscului de inactivare, se recomandă ca vaccinul să nu se adm. mai devreme de 6 săptămâni și dacă

este posibil după 3 luni de la adm. de imunoglobuline sau preparate de sânge conținând imunoglobuline (sânge, plasmă). Din același motiv nu se vor adm. imunoglobuline mai devreme de 2 săptămâni de la vaccinare.
RA: Hipertermie, simptome rinofaringiene și respiratorii trecătoare; exantem morbiliform ușor. Convulsiile hipertermice au fost observate rar. Câteva cazuri de purpură trombocitopenică.

RUDIVAX™ *COD ATC: J07BJ01*

LAB. AVENTIS; Liof. cu min. 103 CCID50 virus viu atenuat împotriva rubeolei tulpina Wistar RA 27/3M. ***(S)***

Ind: Imunizarea activă împotriva rubeolei începând cu vârsta de 12 luni la copii de ambele sexe. Vaccinarea este în special indicată fetelor de vârstă pre- și postpubertală, cât și femeilor aflate la vârsta fertilității.
Dz: Inj. i.m., s.c. Doza recomandată este de 0,5 ml.
Cind: Boli acute febrile; boli acute sau cronice în curs de evoluție; imunodepresie congenitală sau dobândită (include infecția cu HIV). Sarcină și alăptare; sarcina trebuie evitată în primele trei luni de la vaccinare.
A!: Datorită riscului inactivării, vaccinul nu se va adm. înainte de 6 săptămâni și dacă este posibil 3 luni după adm. de imunoglobuline sau produse de sânge conținând imunoglobuline (sânge, plasmă). Din același motiv imunoglobulinele nu trebuie adm. 2 săptămâni după vaccinare. Indivizii tuberculino-pozitivi pot deveni tranzitoriu negativi după vaccinare.
RA: Foarte rar reacție febrilă, eritem localizat la nivelul locului de injecție sau o indurare a zonei cu sau fără limfoadenopatie localizată. La adulți, reacții benigne trecătoare: ușoară adenopatie, inflamații articulare și foarte rar o ușoară formă de erupție rubeolică.

RUDI-ROUVAX *COD ATC: J07BD53*

LAB. AVENTIS; Liof. cu min. 103 CCID50 virus viu atenuat împotriva rubeolei tulpina Wistar RA 27/3M și min. 103 CCID50 virus viu atenuat împotriva rujeolei (tulpina Schwarz) ***(S)***

Ind: Imunizarea activă împotriva rubeolei și rujeolei începând cu vârsta de 12 luni la copii de ambele sexe.
Dz: Inj. i.m., s.c. Doza recomandată este de 0,5 ml. Prima inj. la 12 luni; a doua inj. la 11-13 ani.
Cind: Boli acute febrile; boli acute sau cronice în curs de evoluție; imunodepresie congenitală sau dobândită (include infecția cu HIV). Sarcină și alăptare; sarcina trebuie evitată în primele trei luni de la vaccinare.
A!: Datorită riscului inactivării, vaccinul nu se va adm. înainte de 6 săptămâni și dacă este posibil 3 luni după adm. de imunoglobuline sau produse de sânge conținând imunoglobuline (sânge, plasmă). Din același motiv imunoglobulinele nu trebuie adm. 2 săptămâni după vaccinare. Indivizii tuberculino-pozitivi pot deveni tranzitoriu negativi după vaccinare.
RA: Foarte rar reacție febrilă, eritem localizat la nivelul locului de injecție sau o indurare a zonei cu sau fără limfoadenopatie localizată. La adulți, reacții benigne trecătoare: ușoară adenopatie, inflamații articulare.

T

TETAVAX *COD ATC: J07AM01*

LAB. AVENTIS; Susp. inj.; fiecare doză de 0,5 ml conține: anatoxină tetanică purificată *(S)*

Ind: Imunizare contra tetanosului (remanentă 10 ani după primul rapel).
Dz: Inj. s.c., i.m. *Primovaccinare:* 2 inj. la distanță de 4-6 săptămâni; *Rapel:* o inj. la fiecare 10 ani.
Cind: Nu există.
RA: Durere, eritem, noduli la locul inj.

TETRACOQ *COD ATC: J07CA02*

LAB. AVENTIS; Susp. inj.; fiecare doză de 0,5 ml conține: anatoxină difterică purificată min. 30 UI; anatoxină tetanică purificată min. 60 UI; susp inactivată de B. pertussis min. 4 UI; poliovirus inactivat tip 1 40 UD; poliovirus inactivat tip 2 8 UD; poliovirus inactivat tip 3 32 UD. *(S)*

Ind: Prevenirea combinată a difteriei, tetanosului, tusei convulsive și poliomielitei: imunizare primară la sugari; revaccinare la copii, în raport cu situația epidemiologică.
Dz: Inj. i.m., s.c. Imunizarea primară trebuie începută la vârsta de 2 luni și este compusă din 3 doze succesive × 0,5 ml, la intervale de 1 sau 2 luni; a 4-a doză (considerată a fi revaccinare) se adm. la 1 an după doza a 3-a.
Cind: Febră, boli acute sau cronice evolutive. Alergie dovedită la unul din componenții vaccinului. Encefalopatii cu sau fără convulsii. Sarcină și alăptare.
A!: Produsul nu se adm. i.v. Dacă pacientul a avut convulsii fără nici o legătură cu precedenta injectare a dozei de vaccin, se recomandă preventiv asocierea vaccinului cu produse antiepileptice și/sau antipiretice.
RA: Durere, eritem, edem, indurație la locul inoculării. Febră de 38°C - 40°C, somnolență iritabilitate, plâns encefalitic.

TRIMOVAX *COD ATC: J07BD52*

LAB. AVENTIS; Pulb. liof.; o doză conține: virus rujeolic viu hiperatenuat (tulpina Schwarz) minim 103 CCID50; virus urlian viu atenuat (tulpina Urabe AM 9) min. 103,7 CCID50; virus rubeolic viu atenuat (tulpina Wistar RA 27/3M) minim 103 CCID50 (CCID 50 = culturi celulare doză infectantă 50%). *(S)*

Ind: Imunizarea activă față de rujeolă, oreion și rubeolă, începând cu vârsta de 12 luni, la copii de ambele sexe.
Dz: Inj. i.m., s.c. Doza recomandată pentru vaccinare este de 0,5 ml. Pentru vaccinare este necesară o singură adm., dacă vârsta copilului este între 12-15 luni. Dacă vaccinarea s-a început la vârsta de 9 luni, pentru copii care trăiesc în colectivități, o a 2-a injecție este recomandată 6 luni mai târziu (la vârsta de 15 luni).
Cind: Boli acute febrile; boli acute sau cronice în curs de evoluție; imunodepresia dobândită sau congenitală (include infecția cu HIV). Alergie cunoscută la

proteinele de ou (reacție anafilactică după ingestia de ouă); adm. recentă de imunoglobuline. Sarcină și alăptare; sarcina trebuie evitată în primele două luni de la vaccinare.
A!: A se folosi cu precauție în caz de hipersensibilitate la neomicină. Datorită riscului de inactivare se recomandă ca vaccinul să nu se adm. mai devreme de 6 săptămâni și dacă este posibil după 3 luni de la injectarea cu imunoglobuline sau preparate de sânge conținând imunoglobuline (sânge sau plasmă). Din același motiv nu se vor adm. imunoglobuline mai devreme de 2 săptămâni de la vaccinare. Ca urmare a vaccinării, persoanele tuberculino-pozitive pot deveni pentru scurt timp tuberculino-negative.
RA: Hipertermie, simptome rinofaringiene sau respiratorii trecătoare, exantem ușor. Convulsiile hipertermice, adenopatia sau parotidita au fost rar observate. Cazuri rare de tulburări neurologice, ca meningita sau meningoencefalita și surditate unilaterală.

TRITANRIX-HB

COD ATC: J07CA05

GLAXO SMITHKLINE; Susp. inj.; o doză de vaccin de 0,5 ml conține min. 30 UI de toxoid D adsorbit, min. 60 UI de toxoid T adsorbit, min. 4 UI de comp. B. Pertussis și 10 g Ag-HBs recombinant. ***(S)***

Ind: Imunizarea activă față de difterie, tetanos, tuse convulsivă și hepatită B (HB) la copii începând cu vârsta de 6 săptămâni; prevenirea hepatitei D.
Dz: Inj. i.m. prof., în reg. anterolat. a coapsei. Doza de vaccin recomandată este de 0,5 ml. Schema de vaccinare primară constă din 3 doze adm. în primele 6 luni de viață, la intervale de 4-8 săptămâni. Se recomandă o doză de rapel de vaccin combinat la copii de 12-24 luni.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la orice component al vaccinului sau celor care au prezentat manifestări de hipersensibilitate după adm. de vaccin difteric, tetanic, pertussis sau HB. Copii care au suferit de encefalopatie de etiologie necunoscută, cu debut în primele 7 zile de la o vaccinare cu un vaccin pertussis.
A!: Febra peste 40,5°C în primele 48 de ore, fără o cauză decelabilă. Colapsul sau starea de șoc (episod hipotonic-hiporeactiv) în primele 48 de ore. Plâns persistent, de nestăpânit, cu durata > 3 ore, în primele 48 de ore. Convulsii cu sau fără febră, în primele 3 zile. Pacienți cu trombocitopenie sau suferind de tulburări de sângerare, deoarece se pot produce hemoragii în urma adm. i.m. la aceștia.
RA: Durere la locul injectării, plânset neobișnuit, astenie, iritabilitate, simptome gastrointestinale și tulburări de alimentare.

TWINRIX ADULT

COD ATC: J07BC20

GLAXO SMITHKLINE; Susp inj.; o doză de 1 ml conține min. 720 u ELISA de virus HA inactivat și 20 µg de proteină AgHBs recombinantă. ***(S)***

Ind: Imunizarea adulților și adolescenților în vârstă de 16 ani și peste, neimunizați și prezentând risc de contractare a hepatitei A și B.
Dz: Doza recomandată este de 1 ml inj. i.m. Schema de vaccinare primară constă din 3 doze, prima adm. la data aleasă, a doua la o lună de la adm. primei doze, iar a treia la 6 luni de la adm. primei doze.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre componenții vaccinului.
A!: Vaccinul nu previne infecția cu alți agenți infecțioși (virusul hepatitei C și E) sau cu alți agenți ce provoacă infecții la nivel hepatic. Sarcină și alăptare.

RA: Durere la locul inj., eritem și edem. Fenomene sistemice: febra, cefaleea, starea de indispoziție, oboseala, grețurile și vărsăturile. Simptome pseudogripale (febră, frisoane, cefalee, mialgie, artralgie), fatigabilitate, vertij. Rar: parestezie, grețuri, vărsături, inapetență, diaree, dureri abdominale, alterări ale funcției hepatice, rash, prurit, urticarie. Foarte rar: reacții alergice mimând boala serului, vasculite, sincopă, hTA, limfadenopatie, tulburări neurologice periferice și/sau centrale, ce pot include scleroza multiplă, nevrita optică, mielita, paralizie Bell, polinevrită, Guillan-Barré (cu paralizie ascendentă), meningită, encefalită, encefalopatie, purpură trombocitopenică, eritem exsudativ multiform.

TWINRIX PEDIATRIC *COD ATC: J07BC20*

GLAXO SMITHKLINE; Susp inj.; o doză de 0,5 ml conține min. 360 u ELISA de virus HA inactivat și 10 µg de proteină AgHBs recombinantă. ***(S)***

Ind: Imunizarea adolescenților și copiilor, începând cu vârsta de 1 an și până la 15 ani.

Dz: Doza de 0,5 ml se adm. i.m. în regiunea deltoidiană la adolescenți și copii sau în regiunea antero-laterală a coapsei la copiii mici. Schema de vaccinare primară constă din 3 doze, prima adm. la data aleasă, a doua la o lună de la adm. primei doze, iar a treia la 6 luni de la adm. primei doze.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre componenții vaccinului.

A!: Vaccinul nu previne infecția cu alți agenți infecțioși (virusul hepatitei C și E) sau cu alți agenți ce provoacă infecții la nivel hepatic. Sarcină și alăptare.

RA: Durere la locul inj, eritem și edem. Fenomene sistemice: febra, cefaleea, starea de indispoziție, oboseala, grețurile și vărsăturile. Simptome pseudogripale (febră, frisoane, cefalee, mialgie, artralgie), fatigabilitate, vertij. Rar: parestezie, grețuri, vărsături, inapetență, diaree, dureri abdominale, alterări ale funcției hepatice, rash, prurit, urticarie. Foarte rar: reacții alergice mimând boala serului, vasculite, sincopă, hTA, limfadenopatie, tulburări neurologice periferice și/sau centrale, ce pot include scleroză multiplă, nevrită optică, mielită, paralizie Bell, polinevrită, sd. Guillan-Barré (cu paralizie ascendentă), meningită, encefalită, encefalopatie, purpură trombocitopenică, eritem exsudativ multiform.

TYPHERIX *COD ATC: J07AP03*

GLAXO SMITHKLINE; Sol. inj. 25 micrograme/0,5 ml de vaccin tifoidic ce conține polizaharidul Vi ***(S)***

Ind: Imunizarea activă împotriva febrei tifoide pentru adulți și copii cu vârsta mai mare de 2 ani.

Dz: Intramuscular. Pentru *adulți și copii cu vârsta mai mare de 2 ani* se recomandă o singură doză de 0,5 ml. Vaccinul trebuie administrat cu cel puțin două săptămâni înainte de o potențială expunere la infecția cu febră tifoidă. Subiecții care riscă în continuare să fie expuși la infecția cu febră tifoidă trebuie revaccinați utilizând o singură doză de vaccin la un interval nu mai mare de 3 ani.

Cind: Subiecți cu sensibilitate cunoscută la oricare component al vaccinului sau la subiecți care au arătat semne de hipersensibilitate după administrări anterioare.

A!: Vaccinul protejează împotriva febrei tifoide cauzate de Salmonella typhi. Protecția nu este conferită împotriva bolii cauzate de Salmonella paratyphi sau

de alte Salmonellae non-tifoidice. Nu a fost evaluat la copii cu vârste mai mici de 2 ani. Vaccinurile polizaharidice au în general imunogenicitate scăzută sub aceasta vârstă. Vaccinuri diferite trebuie administrate în locuri diferite de injectare. Administrarea trebuie amânată la subiecții care suferă de boala febrilă acută severă. Prudență la subiecții cu trombocitopenie. În sarcină și alăptare se utilizează doar dacă există un risc mare de infecție. Poate afecta abilitatea de a conduce sau de a opera mașinării.
RA: În timpul studiilor clinice, efectele adverse cele mai des raportate după prima doză au fost reacții la locul injectării, inclusiv iritație, roșeață și inflamație. Reacții generale care pot apărea în asociere temporală cu vaccinarea includ: febră, cefalee, dureri, stare de rău, stare de greață, prurit. RA foarte rare: anafilaxie, reacții alergice inclusiv reacții anafilactoide.

U

URO – VAXOM

COD ATC: J07AX

OM PHARMA; Cps. conține 6 mg extract de E. coli cu proprietăți imunostimulante ***(P)***

Ind: Imunoterapia orală a infecțiilor urinare. Trat. infecțiilor recidivante sau cronice ale căilor urinare indiferent de germenii implicați. Trat. adjuvant asociat antibioterapiei uzuale. Este în special recomandat în: cistite, pielonefrite, uretrite, bacteriurii asimptomatice, infecții survenite în timpul cateterismului vezical sau uretral.
Dz: *Trat. infecțiilor recidivante în fază acută:* 1 cps./zi ca adjuvant al antibioterapiei, cel puțin 10 zile. *Trat. cazurilor rebele și recidivante:* 1 cps./zi timp de 3 luni consecutiv.
A!: Sarcină și alăptare.

V

VACCIN DIFTERO-TETANIC PENTRU ADULȚI

COD ATC: J07AM51

INST. CANTACUZINO; Susp. inj. cu anatoxină difterică purificată 5 Lf (u floculante)/ml, anatoxină tetanică purificată 10 UB (u blocante)/ml. ***(S)***

Ind: Vaccinarea și revaccinarea diftero-tetanică a gravidelor; revaccinarea diftero-tetanică a adulților; imunoprofilaxia tetanosului, în plăgile cu potențial tetanigen.
Dz: Se inoculează 0,5 ml vaccin strict i.m. în regiunea superioară latero-externă a coapsei, la întâlnirea treimii superioare cu treimea mijlocie, la 3 cm în afara liniei mediane. Vaccinarea, revaccinarea diftero-tetanică a gravidelor și adulților se efectuează conform Programului Național de Imunizări al MS. În plăgile cu potențial tetanigen se adm. o doză de 0,5 ml i.m.
Cind: Diabet zaharat decompensat, cardiopatii decompensate, nefropatii grave, boli ale sângelui, antecedente de anafilaxie sau reacții anafilactice la constituenții vaccinului.

A!: Perioada de stare și convalescența bolilor acute cu sau fără febră, tbc evolutivă, piodermite și eczeme. Antecedente neurologice (encefalită sau afecțiuni convulsive), în diabetul zaharat compensat prin tratament la persoane cu hemofilie și la pacienți cu sistem imunitar deficitar.
RA: Locale: infiltrație, eritem, durere spontană sau la apăsare la locul de inoculare, uneori nodul; generale: stare de disconfort, ascensiune febrilă (38-39°C).

VACCIN BCG LIOFILIZAT PENTRU INOCULARE INTRADERMICĂ *COD ATC: J07AN01*

INST. CANTACUZINO; Pulb. liof. + solv., conținând 2 mg masă bacteriană/doză (susp. de bacili Calmette-Guérin) ***(S)***

Ind: Profilaxia specifică a tuberculozei.
Dz: 1 doză = 0,1 ml susp de vaccin BCG. Se adm. la nou născuți începând de la vârsta de 4 zile și până la 2 luni, precum și la copii între 5-10 luni, care nu prezintă cicatrice vaccinală sau prezintă o cicatrice vaccinală sub 3 mm, fără testare tuberculinică prealabilă. Revaccinările se efectuează la grupele de vârstă stabilite de MS, pentru persoane care, după testare tuberculinică cu 2 u PPD prezintă o reacție sub 9 mm în diametru.
Cind: Nou născuți subponderali (sub 2500 g); boli febrile concomitente; convalescența unei boli infecto-contagioase (1-3 luni); afecțiuni dermatologice acute; deficit imun; subiecți infectați cu HIV și care prezintă simptome.
A!: Se va asigura un interval minim de 1 lună față de alte vaccinări; în timpul operației de vaccinare suspensia trebuie protejată împotriva luminii solare directe și difuze; vaccinul poate fi adm. în decurs de cel mult o oră după deschiderea fiolei și suspendare; timp de 6 săptămâni de la vaccinare (perioada de instalare a anergiei) vaccinatul nu va fi supus unor intervenții chirurgicale sau unui tratament medicamentos imunodepresiv. Timp de 6 săptămâni de la vaccinare vaccinatul va fi ferit de contaminare tuberculoasă.
RA: Adenopatii care depășesc 10-15 mm, adenite supurate.

VACCIN COMBINAT DIFTERO-TETANIC ADSORBIT (VCDT) *COD ATC: J07AM51*

INST. CANTACUZINO; Susp. inj.; 1 ml conține anatoxina difterică purificată 50 Lf/ml, anatoxina tetanică purificată 20 UB/ml, fosfat de aluminiu 7 mg/ml ***(S)***

Ind: Profilaxia difteriei și tetanosului pentru primovaccinarea și revaccinarea copiilor sub 3 ani.
Dz: Se inoculează 0,5 ml vaccin strict i.m. în regiunea superioară latero-externă a coapsei, la întâlnirea treimii superioare cu treimea mijlocie, la 3 cm în afara liniei mediane. Primovaccinarea constă în adm. a 2 doze × 0,5 ml la interval optim de 60 zile între doze, începând cu vârsta de 2 luni. Revaccinarea se efectuează prin adm. a 0,5 ml produs la 12 luni, 30-35 luni, 7 ani, 14 ani.
Cind: Diabet zaharat decompensat, cardiopatii decompensate, nefropatii grave, boli ale sângelui, antecedente de anafilaxie sau reacții anafilactice la constituenții vaccinului. Sarcină și alăptare.
A!: Perioada de stare și convalescența bolilor acute cu sau fără febră, tbc evolutivă, piodermite și eczeme, alte antecedente anafilactice, stări distrofice grave.

În diabetul zaharat compensat prin tratament, la persoane cu hemofilie sau cu sistem imunitar deficitar, adm. vaccinului se efectuează sub supraveghere medicală.
RA: Locale: infiltrație, eritem, durere spontană sau la apăsare la locul de inoculare; generale: stare de disconfort, ascensiune febrilă (38-39°C), însoțită uneori de frison.

VACCIN COMBINAT DIFTERO-TETANO-PERTUSSIS ADSORBIT (VCDTP) *COD ATC: J07AJ51*

INST. CANTACUZINO; Susp. inj. cu anatoxină difterică 30 Lf (unități floculante)/ml; anatoxina tetanică 12 UB (unități blocante)/ml; B. pertussis 40 UIO (unitați internaționale de opacitate)/ml. ***(S)***

Ind: Profilaxia difteriei, tusei convulsive și tetanosului.
Dz: Se injectează 0,5 ml strict i.m. în regiunea superioară latero-externă a coapsei, la întâlnirea treimii superioare cu treimea mijlocie, la 3 cm în afara liniei mediane. Primovaccinarea constă în adm. a 3 doze × 0,5 ml produs la interval optim de 60 zile între doze începând cu vârsta de 2 luni. Revaccinarea se efectuează prin adm. a 2 doze × 0,5 ml produs astfel: rapel 1 la 6 luni după primovaccinare; rapel 2 la 18 luni de la rapel 1.
Cind: Antecedente de anafilaxie, diabet zaharat, spasmofilie, cardiopatii decompensate, nefropatii, boli ale sângelui, afecțiuni neurologice în antecedente.
A!: Stări febrile, boli infecțioase acute și convalescența acestora, tbc evolutivă, stări alergice manifeste, stări distrofice grave. Imunizarea cu VCDTP va fi întreruptă la copiii care au prezentat encefalopatie evolutivă în primele 7 zile după adm. unei doze de produs.
RA: *Reacții locale:* poate să apară eritem și indurație la locul inoculării. *Reacții generale:* agitație psihomotorie minimă și reacție febrilă de până la 38°C, foarte rar peste. Aceste RA au o evoluție benignă și se remit după 24-48 h.

VACCIN DIFTERIC ADSORBIT (VDA) *COD ATC: J07AF01*

INST. CANTACUZINO; Susp. inj.; 1 ml conține anatoxină difterică purificată 25 Lf/ 0,5 ml adsorbită pe 2,5 mg fosfat de aluminiu; f. × 0,5 ml ***(S)***

Ind: Vaccinarea completă și revaccinarea antidifterică a copiilor sub 14 ani.
Dz: Se inoculează 0,5 ml vaccin strict i.m. în regiunea superioară latero-externă a coapsei, la întâlnirea treimii superioare cu treimea mijlocie, la 3 cm în afara liniei mediane. Revaccinarea se efectuează prin adm. a 0,5 ml produs la 12 luni, 30-35 luni, 7 ani, 14 ani.
Cind: Diabet zaharat decompensat, cardiopatii decompensate, nefropatii grave, boli ale sângelui, antecedente de anafilaxie sau reacții anafilactice la constituenții vaccinului.
A!: Perioada de stare și convalescența bolilor acute cu sau fără febră, tbc evolutivă, piodermite și eczeme, alte antecedente anafilactice, stări distrofice grave. În diabetul zaharat compensat prin tratament, la persoane cu hemofilie sau cu sistem imunitar deficitar, adm. vaccinului se efectuează sub supraveghere medicală.
RA: Locale: infiltrație, eritem, durere spontană sau la apăsare la locul de inoculare; generale: stare de disconfort, ascensiune febrilă (38-39°C), insoțită uneori de frison.

VACCIN DIZENTERIC VIU ORAL VADIZEN

COD ATC: J07AX

INST. CANTACUZINO; Susp. orală cu Shigella flexneri 2a T32 de 1011 germeni/ml. ***(S)***

Ind: Profilaxia și tratamentul dizenteriei bacilare.
Dz: *Imunizarea primară:* începând cu vârsta de 1 an. *Revaccinări:* Se pot efectua în număr nelimitat; anual sau în ritm de 2 revaccinări pe an (la interval de 6 luni) în funcție de prioritățile de ordin epidemiologic. În scop terapeutic (în dizenteria cronică), revaccinarea se face după un interval de 1 lună. Schema de imunizare: pentru imunoprofilaxie - atât pentru vaccinare cât și pentru revaccinare, se administrează 5 doze de vaccin la 3 zile interval. *Copii între 1-7 ani:* se adm 0,3 ml, 0,6 ml, 0,9 ml, 1,2 ml, 1,2 ml în zilele 1, 4, 7, 10 și respectiv 13. *Copii între 8-12 ani:* se adm 0,4 ml, 0,8 ml, 1,2 ml, 1,2 ml, 1,6 ml în zilele 1, 4, 7, 10 și respectiv 13. *Copii peste 12 ani și adulți:* se adm 0,5 ml, 1 ml, 1,5 ml, 1,5 ml, 2 ml în zilele 1, 4, 7, 10 și respectiv 13.
Cind: Bolile infecțioase acute și convalescența lor; formele active de tbc, reumatism; cardiopatiile decompensate; IR, IH; diabet; boli alergice, autoimune, maligne; deficiență imunitară; tratament cu imunosupresoare; boli însoțite de cașexie; distrofie. Sarcină și alăptare.
A!: Adm. strict orală. Nu se adm. concomitent cu alte vaccinuri, cu antibiotice sau substanțe cu acțiune antimicrobiană.
RA: Greață, vărsături, diaree ușoară.

VACCIN GRIPAL TRIVALENT, PURIFICAT ȘI INACTIVAT

COD ATC: J07BB02

INST. CANTACUZINO; Susp. inj.; o doză (0,5 ml) are următoarea concentrație de hemaglutinină (HA): 15 mg HA de A/Moscova/10/99 (H3N2); 15 mg HA de A/Noua Caledonie/20/99 (H1N1); 15 mg HA de B/Sichuan/ 379/99. ***(OTC)***

Ind: Profilaxia gripei, în special la persoanele care prezintă un risc crescut la complicațiile gripei sau pot transmite gripa persoanelor cu risc crescut la complicații datorate gripei. Se recomandă ca vaccinarea să se practice în perioada preepidemică (15 octombrie-31 decembrie).
Dz: *Copiii între 6-35 luni:* 0,25 ml, în cazul în care a mai fost vaccinat antigripal; 2 doze × 0,25 ml, la un interval de cel puțin 4 săptămâni, este vaccinat antigripal pentru prima dată; *Copiii între 3-8 ani:* o doză de 0,5 ml, în cazul în care a mai fost vaccinat antigripal; 2 doze × 0,5 ml, la interval de min. 4 săptămâni, când este vaccinat pentru prima dată. *Copii peste 9 ani:* o doză × 0,5 ml, adm. i.m. sau subcutanat profund. Locul de elecție este mușchiul deltoid, iar la copiii sub 3 ani pe fața anterolaterală a coapsei.
Cind: Persoanele cunoscute/suspecte de a prezenta manifestări alergice la ouă sau la carnea de pasăre; persoanele cu afecțiuni acute febrile, până la remiterea simptomelor.
A!: Trebuie avut la îndemână un trat. adecvat pentru cazurile de anafilaxie. Răspunsul în anticorpi, la pacienții cu imunosupresie poate fi diminuat. Întrucât vaccinul conține tiomersal și urme de neomicină, el trebuie folosit cu precauție la subiecții cu hipersensibilitate la aceste substanțe. Vaccinul gripal poate fi adm. concomitent cu alte vaccinuri, dar alegând locuri de inoculare diferite. Deoarece vaccinarea antigripală și antipneumococică se suprapun, atunci când vaccinarea antigripală se face pentru prima dată, să se facă distanțată în timp față de cea antipneumococică.

RA: Reacții secundare locale: durere, roșeață, indurație, edem, echimoză, sau generale: ascensiune termică, frison, astenie, cefalee, mialgii, artralgii; aceste reacții de obicei dispar după 1-2 zile. Rar, pot apărea nevralgii, parestezii (percepția anormală a senzațiilor: durere, căldură sau vibrație), convulsii, trombocitopenie tranzitorie.

VACCIN POLIMICROBIAN *COD ATC: J07AX*

INST. CANTACUZINO; Susp. inj. obținută dintr-un amestec de 30 tulpini microbiene (stafilococi, streptococi și bacili piocianici), în concentrație totală de 1 miliard germeni/ml, f × 1 ml ***(S)***

Ind: Terapia proceselor subacute și cronice în special în infecțiile organelor genito-urinare (pelviperitonite, salpingite, metrite).
Dz: Inj. i.m., cu seringă gradată de 1 ml, în doze repetate, crescânde, pornind de la 0,1 ml până la 1 ml.
Cind: Bolile infecțioase acute și convalescența lor; tbc evolutiv; RAA; cardiopatii decompensate; nefropatii; hepatite cronice decompensate; diabet; sarcină; hipersensibilitate la proteine animale.
A!: Fiolele vor fi agitate înainte de administrare pentru a se omogeniza.

VACCIN STAFILOCOCIC *COD ATC: J07AX*

INST. CANTACUZINO; Susp. inj. corpusculară în ser fiziologic de bacterii fixate și inactivate, obținută din tulpini de Staphylococcus aureus cu 1 miliard bacterii/ml; 100 milioane bacterii/ml; 10 milioane bacterii/ml; 1 milion bacterii/ml. ***(S)***

Ind: Tratamentul infecțiilor stafilococice recidivante, pentru desensibilizare la antigenele stafilococice și ca imunomodulator în parodontopatiile marginale cronice.
Dz: Se adm. doze progresive: *Din vaccinul cu 1 milion bacterii/ml:* 0,1 ml; 0,2 ml; 0,5 ml; *Din vaccinul cu 10 milioane bacterii/ml:* 0,1 ml; 0,2 ml; 0,5 ml; *Din vaccinul cu 100 milioane bacterii/ml:* 0,1 ml; 0,2 ml; 0,5 ml; *Din vaccinul cu 1 miliard bacterii/ml:* 0,1 ml; 0,2 ml; 0,3 ml; 0,4 ml; 0,5 ml; 0,6 ml; 0,7 ml; 0,8 ml. Vaccinul se adm. subcutanat, la 2-3 zile interval.
Cind: Bolile infecțioase acute și perioada de convalescență postinfecțioasă, tbc activă, bolile sângelui, cardiopatiile decompensate, stările alergice, IR, IH.
A!: Sarcină și alăptare.
RA: Reacții locale: durere, roșeață, infiltrație. Reacții generale: stare subfebrilă, curbatură.

VACCIN STAFILOCOCIC PENTRU TRATAMENTUL ACNEEI ȘI FOLICULITEI STAFILOCOCICE *COD ATC: J07AX*

INST. CANTACUZINO; Susp. inj. de bacterii fixate și inactivate, obținută din tulpini de stafilococi coagulază negativi cu 1 miliard bacterii/ml. ***(S)***

Ind: Trat. acneei și foliculitei cu stafilococi coagulazo-negativi.
Dz: Doze: se adm. doze progresive: din diluția 1/10: 0,1 ml; 0,2 ml; 0,5 ml; în vaccinul ca atare: 0,1 ml; 0,2 ml; 0,3 ml; 0,4 ml; 0,5 ml; 0,6 ml; 0,7 ml; 0,8 ml. Vaccinul se adm. subcutanat la 3-4 zile interval.

Cind: Bolile infecțioase acute și perioada de convalescență postinfecțioasă, tbc activă, bolile sângelui, cardiopatiile decompensate, stările alergice, IR, IH.
A!: Sarcină și alăptare.
RA: Reacții locale: durere, roșeață, infiltrație. Reacții generale: stare subfebrilă, curbatură.

VACCIN STREPTOCOCIC

COD ATC: J07AX

INST. CANTACUZINO; Susp. inj. de streptococi grup A (diferite tipuri), grup C și G, cu 1 miliard de germeni/ml.

Ind: Tratamentul infecțiilor streptococice cutanate și al altor afecțiuni streptococice cronice.
Dz: Doze: 0,1 ml vaccin diluat 1/10; 0,1 ml vaccin diluat 1/5 (diluția se face în ser fiziologic); apoi din vaccinul nediluat: 0,1ml; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1 ml, s.c. la 2-3 zile interval.
Cind: Stări febrile, bolile infecțioase acute, tuberculoza acută, IR, IH, cardiopatii decompensate, stări distrofice grave. Sarcină.
A!: Alăptare.

VACCIN TETANIC ADSORBIT (VTA)

COD ATC: J07AM01

INST. CANTACUZINO; Susp. inj. cu anatoxină tetanică purificată 10 UB/ 0,5 ml (10 Lf/ 0,5 ml). ***(S)***

Ind: Profilaxia activă a tetanosului
Dz: Se adm. strict i.m., în regiunea deltoidiană la adulți și pe fața antero-externă a coapsei la copii. *Primovaccinare:* cu 0,5 ml VTA; interval 4-5 săptămâni; a doua inoculare de vaccinare cu 0,5 ml VTA; interval 6-12 luni; a treia inoculare de rapel cu 0,5 ml VTA. Imunitatea dobândită persistă 5-10 ani. *Revaccinarea:* 0,5 ml VTA dacă s-a depășit intervalul de 5-10 ani de la vaccinare. *Vaccinarea de urgență:* În caz de rănire, la persoanele sigur vaccinate, la care survin plăgi tetanigene, se pot adm. 2 inj. × 0,5 ml, la interval de 15 zile.
Cind: Boli acute în evoluție; stări febrile; tuberculoza activă; tratament cu imunosupresoare; afecțiuni maligne; cardiopatii decompensate; HTA malignă; nefropatii grave. Sarcină și alăptare.
RA: Rar: durere, eritem, tumefiere la locul injectării; foarte rar, reacții generale: indispoziții, cefalee, febră.

VACCIN TIFOIDIC SUBCUTANAT

COD ATC: J07AP02

INST. CANTACUZINO; Susp. inj. cu 1 miliard de bacili tifici inactivați/ml. ***(S)***

Ind: Profilaxia febrei tifoide.
Dz: Doza recomandată: 0,5 ml vaccin pentru adulți și 0,25 ml vaccin pentru copii, strict subcutanată în regiunea externă a brațului. Pentru imunizarea primară se adm. două doze de vaccin la o lună interval, urmate de rapeluri anuale cu o singură doză de vaccin, timp de 3 ani consecutiv. După o pauză de 5 ani, dacă se mențin condițiile epidemiologice, vaccinarea plus cele trei rapeluri anuale

se pot repeta. În caz de întreruperea ciclului de vaccinare, nu există decât riscul unei imunizări insuficiente.

Cind: Bolile infecțioase acute și covalescența lor: formele active de tbc; formele active de reumatism; cardiopatiile decompensate; angină pectorală sau IMA în antecedente; HTA; ulcerul gastroduodenal; nefrita acută și cronică; IH; diabetul; stările alergice: astmul bronșic, eczeme etc.; bolile însoțite de cașexie; afecțiuni ale SNC (scleroza multiplă etc.); boli autoimune. Sarcină.

A!: Inocularea accidentală i.m. este însoțită de o exacerbare a reacțiilor post-vaccinale ca și de o diminuare a eficacității produsului. Alăptare.

RA: *Reacții locale:* eritem, edem, durere, care apar la locul de inoculare după 2-3 ore. *Reacții generale:* curbatură, greață, cefalee, ascensiune termică.

VAQTA (ADULT/PEDIATRIC)

COD ATC: J07BC02

MERCK SHARP & DOHME; Susp. inj.; o doză de vaccin conține 25 unități/ 50 unități antigen HVA (sursa CR 326F) adsorbit pe 0,22 mg săruri de aluminiu; seringă × 0,5 ml/1 ml ***(S)***

Ind: Imunizarea activă împotriva infecției cu virusul hepatitic A la subiecții cu vârsta între 2-17 ani (mai ales de cei din zonele endemice).

Dz: Inj. i.m., s.c. *Copii:* prima doză de vaccin - 0,5 ml la data aleasă, urmată de un rapel la 6-10 luni cu o doză de 0,5 ml. *Adulți:* doză × 1 ml.

Cind: Febră, o boală acută sau cronică în evoluție, hipersensibilitate la unul din compuși sau ca urmare a unei vaccinări anterioare. Sarcină și alăptare.

A!: Nu se adm. i.v., în mușchii fesieri datorită stratului variabil de țesut adipos și nici intradermic întrucât pe aceste căi de adm. se induce un slab răspuns imunologic. Acest vaccin nu asigură protecție împotriva infecțiilor cauzate de virusurile hepatitei B, C și E sau a altor agenți patogeni hepatici.

RA: Reacții locale - dureri însoțite de eritem. Foarte rar - noduli la locul injecției. Reacții sistemice - stări subfebrile, astenie, dureri de cap, mialgie, dureri articulare, tulburări gastrointestinale.

VARILRIX

COD ATC: J07BK01

GLAXO SMITHKLINE; Pastilă liof. + solv.; o doză de vaccin reconstituit conține min. 2 × 103 u. formatoare de plaje (UFP) de virus varicelo-zosterian atenuat. ***(S)***

Ind: Imunizarea activă față de varicelă a subiecților sănătoși, începând cu vârsta de 9 luni. Imunizarea activă față de varicelă a pacienților susceptibili cu risc crescut și a contacților lor sănătoși, susceptibili.

Dz: 0,5 ml de vaccin reconstituit conține o doză imunizantă. *Copii 9 luni-12 ani inclusiv:* 1 doză. *Începând cu vârsta de 13 ani:* 2 doze la un interval de minimum 6 săptămâni. În cazul pacienților cu risc crescut pot fi necesare doze suplimentare de vaccin. Se adm. subcutanat.

Cind: Afecțiuni febrile acute severe. Hipersensibilitate sistemică la neomicină. Sarcină și alăptare; sarcina trebuie evitată timp de trei luni de la vaccinare.

A!: Alcoolul și alți agenți dezinfectanți trebuie lăsați să se evapore de pe piele înaintea injectării vaccinului, deoarece pot inactiva virusul. În cazul subiecților care au primit imunoglobuline sau transfuzii sanguine, imunizarea trebuie amâ-

nată cel puțin trei luni, deoarece există riscul eșecului vaccinării datorită anticorpilor antivaricelă dobândiți pasiv.
RA: Reacții generale: erupțiile papulo-veziculare, febră, cefalee, parestezii, oboseală.

VAXIGRIP *COD ATC: J07BB02*
LAB. AVENTIS; Susp. inj.; o doză de 0,5 ml inoculat conține: A/Moscow/10/99 (H3N2) – like (A/Panama/2007/99 RESVIR-17 reass.) 15 µg HA; A/New Caledonia/20/99 (H1N1) – like (A/New Caledonia/20/99 IVR-116 reass.) 15 µg HA; B/Hong Kong/330/2001 – like (B/Shangdong/7/97) 15 µg HA. ***(OTC)***

Ind: Prevenirea gripei. Este potrivit pentru toate persoanele la care este de dorit să se reducă probabilitatea unei infecții gripale cu posibile complicații asociate.
Dz: Doza pentru *adulți și copii* este de 0,5 ml. Pacienții cu imunodeficiențe vor fi imunizați de 2 ori la un interval de cel puțin 4 săptămâni. Pentru copiii de până la 6 ani, care nu au mai fost vaccinați în prealabil: 2 doze × 0,5 ml la interval de 4 săptămâni. Imunizarea trebuie făcută în fiecare toamnă prin inj. i.m. sau profund subcutanat. Durata imunității post-vaccinale: 6-12 luni.
Cind: Hipersensibilitate la proteinele din ou sau la tiomersal sau la persoanele care au avut o reacție alergică severă la o vaccinare antigripală anterioară.
A!: Se recomandă ca imunizarea să fie amânată la pacienții cu infecții acute sau cu boli febrile.
RA: Roșeață (în special după inj. s.c.), umflătură și durere; uneori mărirea ganglionilor limfatici din vecinătatea locului de inj. Efecte secundare sistemice: oboseală, durere de cap, transpirații, tremurături, creșterea temperaturii, mialgii, artralgii sau simptome gastrointestinale. Aceste simptome dispar în general fără tratament în 1-2 zile. Reacții inflamatorii la nivelul SNC sau periferic, până la paralizie respiratorie. Reacții alergice, care pot duce la șoc, în foarte rare cazuri. Vasculite s-au raportat în foarte rare cazuri, în interval de 2 săptămâni de la imunizare. Aceasta se poate asocia cu probleme renale temporare.

VERORAB *COD ATC: J07BG01*
LAB. AVENTIS; Liof. + solv. cu virus rabic (tulpina Wistar PM/WI 38 -1503-3M) mono/multidoză. ***(S)***

Ind: Prevenirea rabiei la subiecții expuși riscului de contaminare. Trat. după contaminarea rabică confirmată sau doar suspectă. Tratamentul persoanelor mușcate de animale turbate sau suspecte de a fi turbate; tratamentul contactanților. Trat. trebuie început imediat după contaminare într-un Centru Antirabic și va fi adaptat tipului leziunii și conform cu statusul animalului.
Dz: Inj. i.m. *Imunizare preexpunere.* Imunizare primară: 2 inj. în zilele 0 și 28. primul rapel: 1 inj. la 1 an după prima doză. Rapeluri ulterioare: 1 inj. la fiecare 3 ani. *Imunizare postexpunere.* La subiecții nevaccinați antirabic: 5 inj. (0,5 ml) i.m. în zilele: Z 0, Z 3, Z 7, Z 14, Z 30, după contactul cu un animal turbat sau suspect de turbare. Opțional se poate rapel în ziua Z 90. La subiecții imunizați anterior: înainte de 1 an - 1 inj. în Z 0; vaccinare anterioară între 1 și 3 ani - 3 inj. în Z 0, Z 3, Z 7; vaccinare mai veche de 3 ani sau incompletă - tratament antirabic complet și seroterapie dacă este necesar.

Cind: Trat. curativ: nu există CI. Trat. preventiv: în cazul vaccinării preventive la subiecții cu risc mare de contaminare, vaccinarea va fi amânată în caz de boli acute febrile în evoluție. Sarcină și alăptare.
A!: O persoană mușcată de un animal suspect sau contaminată cu un produs infectat se va prezenta de urgență la cel mai apropiat Centru Antirabic. Precauții în caz de alergie demonstrată la neomicină.
RA: Reacții locale minore ca: roșeață, ușoară indurație la locul injectării. Rar reacție febrilă.

VVR *COD ATC: J07BD01*
INST. CANTACUZINO; Liof. + solv.; fiecare doză de vaccin conține: virus rujeolos atenuat (tulpina Schwarz) min. 103 CCID50 (doze infectante cultură celulară 50%), neomicină < 25 µg; f. × 1 - 3 - 5 ml. ***(S)***

Ind: Vaccinarea tuturor copiilor în vederea prevenirii îmbolnăvirii de rujeolă.
Dz: Doza individuală de vaccin reconstituită este de 0,5 ml și se adm. subcutanat, în regiunea deltoidiană.
Cind: Boli acute cu afectarea stării generale; boli transmisibile și infecțioase pe o perioadă de 14 zile de la încetarea fazei acute; contacții siguri de varicelă, rubeolă, parotidită; tbc evolutivă; subiecți tratați cu steroizi, iradieri, agenți alchilanți și anabolizante; limfoame, leucemii și alte boli maligne generalizate; persoane infectate cu HIV; alergie severă pentru proteinele din ou sau la neomicină; adm. de imunoglobuline, transfuzii de sânge și plasmă cu mai puțin de 6 săptămâni anterior vaccinării.
A!: Pentru a evita orice efect ce ar putea influența răspunsul imunologic al vaccinului, nu trebuie să se adm. imunoglobuline cu șase săptămâni înainte, preferabil trei luni, și nici produse din sânge. Se recomandă să nu fie adm. imunoglobuline timp de două săptămâni după vaccinare. După vaccinare poate fi observat un răspuns negativ temporar, la testul cu tuberculină.
RA: Vaccinul este bine tolerat. Pot apărea uneori fenomene clinice tranzitorii între a 5-a zi și a 12-a zi: febră 38°C - 39°C timp de 1-2 zile, asociată cu simptome rinofaringiene și respiratorii de scurtă durată și conjunctivită.

MONOGRAFII – PRODUSE BIOLOGICE DE UZ UMAN (Seruri terapeutice)

SER ANTICĂRBUNOS NATIV *COD ATC: J06AA*
INST. CANTACUZINO; Sol. inj. 20 ml ser antimicrobian, obținut din sângele cailor hiperimunizați cu bacili cărbunoși (B. anthracis) - tulpina acapsulogenă, nepatogenă 34 F2 Sterne, titru minim 1/10 ***(S)***

Ind: Trat. infecțiilor cu bacteria cărbunoasă (B. anthracis): cărbune cutanat (pustulă malignă, edemul malign), cărbune visceral (cărbune pulmonar, cărbune intestinal, forma meningiană), septicemie cărbunoasă.
Dz: Inj. i.m. sau i.v. Pustula malignă, 60-100 ml ser/zi; celelalte forme, 100-200 ml ser zilnic, 2-4 zile. Concomitent cu seroterapia se instituie tratament cu penicilină.
Cind: Hipersensibilitate față de ser.

A!: Fiolele *NU* se vor agita înainte de a fi deschise, ci ele vor fi manipulate cu atenție pentru a nu se repune eventualul depozit în susp.
RA: Reacții alergice imediate sau întârziate; șoc anafilactic.

SER ANTIDIFTERIC PURIFICAT ȘI CONCENTRAT *COD ATC: J06AA01*

INST. CANTACUZINO; Sol. inj. conținând anticorpi antitoxici cu titru de 20 000 UI/fiolă ***(S)***

Ind: Trat. și profilaxia difteriei.
Dz: *Terapeutic:* ca seroterapie, o doză unică și masivă în forme ușoare: *copii:* 20 000-50 000 UI; *adulți:* 40 000-100 000 UI; în forme grave: *copii:* 100 000 UI; *adulți;* 200 000 UI, ½ doză i.m. și cealaltă ½ s.c.; ca seroanatoxiterapie, în prima zi se inoculează 50 000-10 0000 UI ser antidifteric purificat și concentrat, la care se adaugă în altă regiune anatomică, i.m. 0,2 ml vaccin difteric adsorbit (VDA). În ziua a 6-a și a 12-a se inoculează tot i.m. câte 0,2 ml VDA. *Preventiv:* se adm. doze de 2 000-5 000 UI, după vârstă, s.c. și conferă o imunitate de scurtă durată, ce nu depășește 15 zile.
A!: Înainte de inocularea serului se va cerceta sensibilitatea bolnavului față de serul de cal și se va face desensibilizarea.

SER ANTIGANGRENOS POLIVALENT PURIFICAT ȘI CONCENTRAT *COD ATC: J06AA05*

INST. CANTACUZINO; Sol. inj. conținând anticorpi antitoxici cu titru de 10 000 UI antitoxină perfringens, 10 000 UI antianatoxină oedematiens, 6 000 UI antitoxină septicum, 4 000 UI antitoxină histolyticum ***(S)***

Ind: Profilaxia și terapia toxiinfecției gangrenoase, trat. unor afecțiuni în care se constată prezența unor germeni gangrenoși; melena nou născuților; colita ulceroasă însoțită de fenomene generale; febra tifoidă complicată de perforații; apendicite hipertoxice sau gangrenoase; peritonite circumscrise sau difuze; angina Ludwig; anginele ulcero-necrotice primitive sau postscarlatinoase, difteriile maligne, însoțite de fetiditate faringiană - când se asociază antitoxina difterică; gangrena pulmonară, gangrena penisului, noma.
Dz: Inj. i.m. sau i.v. *Profilactic:* se aplică în cursul primelor ore de la rănire, în toate cazurile grave care prezintă zdrobiri mari de țesuturi, corpi străini, fracturi deschise, plăgi murdare cu pământ sau dejecții, o fiolă adm. i.m. *Terapeutic:* în cazurile de gangrenă gazoasă, cât mai precoce 2-3 f./zi, 2-3 zile. Durata trat. seroterapeutic nu va depăși 4 zile.
A!: Înainte de inocularea serului se va cerceta sensibilitatea bolnavului față de serul de cal și se va efectua desensibilizarea.

SER ANTIPERFRINGENS PURIFICAT ȘI CONCENTRAT *COD ATC: J06AA*

INST. CANTACUZINO; Sol. inj. conținând anticorpi antitoxici cu titru de 10 000 UI/fiolă ***(S)***

Ind: Terapia toxiinfecțiilor monomicrobiene în care s-a identificat ca germen cauzal Cl. perfringens tip A (septicemie puerperală, septicemie postmedicamentoasă, răni infectate, gangrenă pulmonară, apendicită gangrenoasă, perforație intestinală, angină ulcero-necrotică).
Dz: Inj. i.m. sau i.v. 100 000 UI/zi în toxiinfecțiile incipiente; 200 000 UI/zi în toxiinfecțiile evolutive și cu stare generală foarte rea, 2-3 zile.

A!: Înainte de inocularea serului se va cerceta sensibilitatea bolnavului față de serul de cal și se va efectua desensibilizarea.

SER ANTIRABIC PURIFICAT ȘI CONCENTRAT *COD ATC: J06AA06*
INST. CANTACUZINO; Sol. inj. conținând anticorpi antirabici cu titru de 500 UI/fiolă sau 1500 UI/fiolă ***(S)***

Ind: Persoane mușcate grav de animale turbate sau suspecte de turbare (în special când mușcăturile sunt localizate la cap, gât, palme sau organele genitale). Se adm. în toate cazurile de mușcături produse de animale sălbatice turbate sau suspecte de turbare.
Dz: Inj. i.m. Pentru tratamentul antirabic se administrează 40 UI/kg corp. Seroterapia antirabică este urmată în mod obligatoriu de vaccinoterapia antirabică.
A!: Înainte de inocularea serului se va cerceta sensibilitatea bolnavului față de serul de cal și se va efectua desensibilizarea.

SER ANTITETANIC PURIFICAT ȘI CONCENTRAT *COD ATC: J06AA02*
INST. CANTACUZINO; Sol. inj. conținând anticorpi antitoxici cu titru de 1 500 UI/fiolă sau 20 000 UI/fiolă ***(S)***

Ind: Trat. și profilaxia tetanosului.
Dz: Adm. s.c. *Terapeutic: adulți:* o doză unică (20 000-60 000 UI); *copii:* o doză unică (10 000-20 000 UI), în raport cu precocitatea aplicării și forma clinică: ½ doză se adm. i.m. și ½ s.c.; în formele severe se recomandă și calea i.v. Concomitent cu serul se asociază vaccin tetanic adsorbit (VTA) 0,5 ml; imunizarea activă se completează cu 2 inoculări × 0,5 ml vaccin tetanic adsorbit (VTA) la interval de o săpt.; după 6 luni se execută un rapel. *Profilactic:* plăgi tetanigene, la cei nevaccinați antitetanic, la cei vaccinați incomplet, precum și la cei cu antecedente vaccinale nesigure, o doză unică de ser antitetanic (3 000-20 000 UI), vaccinare antitetanică cu vaccin tetanic adsorbit (VTA) și antibioterapie.
A!: Se va cerceta sensibilitatea bolnavului față de serul de cal și se va efectua desensibilizarea.

MONOGRAFII – PRODUSE BIOLOGICE DE UZ UMAN (Imunomodulatori)

A

AERODIN *COD ATC: J07AX*
INST. CANTACUZINO; Susp. nazală obținută dintr-un amestec de 10 specii bacteriene (S. pyogenes, S. faecalis, S. pneumoniae, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Neisseria catarrhalis, H. influenzae, E. coli, Proteus OX19), parțial lizate, în concentrație totală de 11,4 × 10^9 germeni/ml; f. × 1 ml sau 5 ml ***(S)***

Ind: Prevenirea infecțiilor nespecifice ale căilor respiratorii (rinite, sinuzite, amigdalite, faringite, laringite, bronșite); pregătirea preoperatorie în intervențiile chirurgicale ORL.

Dz: Zilnic, câte 3 pic. instilate în fiecare narină, de 3-4 ori/zi 10-12 zile. În anotimpurile cu incidență crescută a infecțiilor respiratorii se poate repeta administrarea după o pauză de 7-10 zile. Fiolele se agită înainte de utilizare.
Cind: Bolile infecțioase acute și convalescența lor; tbc evolutiv; RAA; cardiopatii decompensate; hepatite cronice; nefropatii; sarcină; diabet.

B

BRONHODIN NEDILUAT ȘI DILUAT
1/10, 1/100, 1/1000, 1/10000 *COD ATC: J07AX*
INST. CANTACUZINO; Susp. inj. cu un amestec de 9 tulpini bacteriene (H. influenzae, S. pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Neisseria catarrhalis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus faecalis, E. coli, Staphylococcus aureus, P. aeruginosa) parțial lizate prin biloliză și crioliză, inactivate termic, în concentrație totală de 2,67 miliarde germeni/ml (nediluat); f. × 1 ml ***(S)***

Ind: Imunostimulare: prevenirea infecțiilor acute respiratorii; adjuvant în tratamentul infecțiilor acute și cronice ale căilor respiratorii (rinite, sinuzite, rinofaringite recidivante, bronșite asociate sau nu cu astm, emfizem pulmonar); complicații post-gripale. Trat. de hiposensibilizare: alergii provocate de antigene bacteriene din compoziția preparatului.
Dz: s.c. Imunostimulare: *Copii până la 5 ani:* se începe cu 0,1 ml din diluția 1/10000, crescând doza cu 0,1 ml la interval de 3 zile, până la 5 inoculări. Se continuă cu diluția 1/1000, după aceeași schemă. *Copii de 5-12 ani:* se începe cu 0,1 ml din diluția 1/1000, umărind schema de mai sus. Se continuă cu diluția 1/100 după aceeași schemă. *La copiii peste 12 ani și la adulți:* se începe cu 0,1 ml din diluția 1/100, urmărind schema de mai sus. Se continuă cu diluțiua 1/10 după aceeași schemă. La adulți se poate continua cu Bronhodin nediluat după aceeași schemă. În cazul apariției unor reacții locale sau generale se va mări intervalul între inoculări și nu se va mări doza. Hiposensibilizare: se începe cu o doză de testare intradermică de 0,1 ml din diluția 1/100. Se continuă cu doze mai mici, cu un ritm de creștere mai lent decât în tratamentul de imunostimulare. Se recomandă: persoanele alergice să înceapă tratamentul cu diluții ca la copii. Trat. să se facă îndeosebi toamna și primăvara.
Cind: Boli infecțioase acute și în convalescență; tbc evolutiv; RAA; cardiopatii decompensate; hepatite cronice; nefropatii; sarcină.
RA: Reacții locale: eritem. Reacții generale: cefalee, ușoară stare de curbatură, ușoară exacerbare a fenomenelor respiratorii de tip alergic.

C

CANTASTIM *COD ATC: J07AX*
INST. CANTACUZINO; Sol. inj. cu 0,5 mg extract bacterian purificat de Pseudomonas aeruginosa/ml ***(S)***

Ind: Stimularea capacității de apărare nespecifică, în cazuri de deficit imun cu diverse exprimări clinice, înainte de intervențiile chirurgicale cu risc de infecții

post-operatorii, în parodontoze cronice, în unele infecții virale sau bacteriene cronice rebele la terapia uzuală, precum și în imunoterapia cancerului.
Dz: s.c. *Copii până la un an,* care prezintă infecții grave, peritonite, neoplazii sau malformații congenitale care necesită intervenții chirurgicale laborioase: 5 inj. × 0,5 ml la 7 zile. *Copii peste un an și adulți:* 1 ml la 7 zile în funcție de natura bolii.
A!: Sarcină și alăptare.
RA: Congestie și tumefacție la locul inoculării, hipertermie, somnolență, cefalee.

I

IMUDON *COD ATC: J07AX*
SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.; Cpr. conținând: lactobacillus acidophilus 3,50mg; Lactobacillus helveticus 3,50 mg; Lactobacillus lactis 3,50 mg; Lactobacillus fermentum 3,50 mg; grup A Streptococcus pyogenic 7,00 mg; Enterococcus faecium 3,50 mg; Streptococcus sanguis 3,50 mg; Staphylococcus aureus 2,50 mg; Klebsiella pneumoniae 2,50 mg; Corynebacterium pseudodiphteriticum 5,00 mg; Fusobacterium nucleatum 5,00 mg; Candida albicans 3,50 mg ***(S)***

Ind: Terapie de susținere în afecțiuni ale mucoasei bucale, inclusiv ulcerații.
Dz: Pentru uz local. Cpr. se dizolvă în gură. 6-8 cpr./zi pentru 6-8 zile.
Cind: Alergie la unul din constituenți. Copii sub 6 ani.

IMUNOSTIMULENT BCG LIOFILIZAT *COD ATC: L03AX03*
INST. CANTACUZINO; Liof. și solv. pentru susp. adm. prin scarificare cu bacili Calmette-Guérin vii (75 mg masă bacteriană semiumedă/fiolă) ***(S)***

Ind: Trat. leucemiilor și după intervenții chirurgicale efectuate pentru melanom malign, tumori maligne ale vezicii urinare, de sân, digestive, bronșice, laringiene, în asociere cu chimioterapie.
Dz: Pentru adm. prin scarificare, se utilizează 0,5 ml susp.; scarificările se efectuează săptămânal în prima lună, apoi lunar timp de un an. Pentru adm în instilații vezicale, se utilizează 2 ml susp. Instilațiile se efectuează săptămânal în primele 6 săptămâni, apoi lunar până la 6 luni, după care se face o instilație pe an.
Cind: Deficit imun congenital sau dobândit (boală, medicamente, diverse terapii); serologie HIV pozitivă; tuberculoză și hepatită active sau în antecedente; infecții ale tractului urinar, până la negativarea uroculturii și oprirea antibioterapiei (în cazul administrării Imunostimulentului BCG în instilații vezicale); sarcină și alăptare. Nu se adm i.v., i.m., s.c. sau i.d.
A!: Înaintea adm. este recomandabil să se efectueze IDR la tuberculină (2 UT PPD). În timpul operațiilor de reconstituire, diluare și adm., susp. trebuie protejată împotriva luminii directe a zilei. Este recomandabil ca instilațiile vezicale cu Imunostimulent BCG să nu se efectueze decât după un interval de 7-14 zile de la rezecția transuretrală, biopsie sau cateterizarea traumatică.
RA: *Reacții locoregionale:* în cazul adm. prin scarificare, în majoritatea cazurilor reacțiile locale constau în edemațierea și congestionarea tegumentelor la locul scarificării și în jurul acesteia, formarea unor cruste gălbui sau o supurație pasageră. Regional, uneori se semnalează o limfadenită care se remite fără

tratament. În cazul instilațiilor vezicale, pot apărea fen. de cistită, disurie, hematurie, care au caracter tranzitoriu: încep la 3-4 ore după instilație și durează 24-72 ore; de asemenea, pot fi înregistrate prostatite granulomatoase, epididimite. *Reacții generale:* curbatură, frison, dureri musculare, splenomegalie.

IMUNOSTIMULENT SRE "CORYNEBACTERIUM PARVUM"

COD ATC: J07AX

INST. CANTACUZINO; Susp. inj. de corpi bacterieni Corynebacterium parvum 2 mg rezidiu uscat corpi bacterieni/ml; f. × 1 ml ***(S)***

Ind: Adjuvant în trat. cancerului de diferite forme, deficiențe imunologice.
Dz: Produsul se adm. în doze crescânde: prima doză 0,1 ml, a doua doză de 0,5 ml, iar începând de la a treia doză, 1 ml, în injecții subcutanate 2-3 injecții/săpt la 1-2 zile.
Cind: Bolnavi în perioadă terminală, cașexie, stare febrilă, tbc, boli autoimune.
A!: Înainte de inoculare, fiola se agită pentru omogenizarea conținutului.
RA: Locale: eritem, indurație, fenomene de jenă locală.

L

LANTIGEN B

COD ATC: J07AX

BRUSCHETTINI; Sol. orală; 1 ml conține extract antigenic de: Streptococcus pneumoniae tip 3 63,20 UA; Streptococcus pyogenes grup A 126,20 UA; Branhamella catarrhalis 39,90 UA; Staphylococcus aureus 79,60 UA; H. influenzae tip b 50,20 UA; Klebsiella pneumoniae 39,80 UA; fl. × 18 ml ***(S)***

Ind: Profilaxia infecțiilor de tract respirator superior (rinite, rinofaringite, laringite) și a infecțiilor ORL (tonsilitele, sinuzitele și otitele medii).
Dz: *Copii până în 6 ani:* 15 picături/zi, dimineața, înainte de a mânca sau 7-8 picături dimineața și 7 picături seara înainte de culcare, adm. sublingual sau între buze și gingii. *Copii peste 6 ani și adulți:* 30 de picături/zi, 15 picături dimineața și 15 picături seara, adm. sublingual sau între buze și gingii. Trat. se aplică 30 de zile, cu pauză de 2-3 săpt. și posibilitatea repetării timp de alte 2-3 săptămâni cu aceleași doze. Ciclul terapeutic poate fi inițiat la începutul sezonului rece și repetat după 2-3 luni.
Cind: Hipersensibilitate cunoscută sau presupusă la oricare din componentele produsului. Trat. nu va fi inițiat în următoarele situații: terapie cu corticosteroizi în ultimele 3 luni, boli autoimune, deficite imunologice primare/secundare severe, fibroză chistică, sindromul de cili imobili sau alte afecțiuni severe hepatice, renale sau cardiace.
RA: În cazuri foarte rare accentuarea ușoară a simptomatologiei respiratorii.

LUIVAC

COD ATC: J07AX

SANKYO PHARMA GmbH; Cpr. cu 3 mg de lizat a cel puțin 10^9 unități de bacterii din următoarele tipuri: Staphylococcus aureus, Staphylococcus mitis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Branhamella catarrhalis, H. influenzae, Klebsiella pneumoniae ***(S)***

Ind: Prevenirea infecțiilor recurente bacteriene ale tractului respirator (rinite, sinuzite, otite, faringite, laringite, bronșite și forme mixte).
Dz: 3 mg lizat bacterian se adm. în 28 de zile succesive; după terminarea acestei faze de imunizare urmează un interval de 28 de zile fără tratament. A doua fază de imunizare începe când producția de anticorpi a fost maximă și începe o scădere a IgA secretorie; această fază durează 28 de zile. Se adm. cu puțin lichid, înainte de mese, pentru asigurarea absorbției.
A!: Asocierea cu AINS.
RA: Exantem, rinite cu tuse uscată, tulburări gastrointestinale. În câteva cazuri au apărut reacții cutanate.

O

OROSTIM *COD ATC:J07AX*
INST. CANTACUZINO; Cps. de 250 mg, ce conțin 15 mg substanță activă obținută prin lizarea (ultrasonicarea) și atomizarea unei suspensii polibacteriene inactivate termic și biliate: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Streptococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Neisseria catarrhalis, H. influenzae, Klebsiella pneumoniae, E. coli și Serratia marcescens. ***(S)***

Ind: Prevenirea infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare; adjuvant în trat. infecțiilor căilor respiratorii superioare (rinite, angine, faringite, laringite, bronșite) și în infecții O.R.L. (otite, sinuzite); se poate asocia trat. cu antibiotice; prevenirea recidivelor și cronicizării infecțiilor respiratorii superioare; prevenirea complicațiilor bacteriene ale infecțiilor virale respiratorii (ex. gripă), mai ales la copii și bătrâni; infecții refractare la trat. cu antibiotice.
Dz: Dimineața pe stomacul gol, câte o cps./zi, 10 zile/lună, 3 luni consecutiv; la copiii până la 7 ani se vor adm. 5 cps. (câte o cps. la interval de 2 zile), 3 luni consecutiv; trat se va repeta după 6 luni.

P

POLIDIN *COD ATC: J07AX*
INST. CANTACUZINO; Susp. inj. cu un amestec de 13 suspensii bacteriene (Staphylococcus aureus 6 mil. germ. inactivați/ml, Streptococcus pyogenes 3 mil germ. inactivați/ml, Streptococcus viridans 3 mil. germ. inactivați/ml, Streptococcus faecalis 11 mil. germ. inactivați/ml, Streptococcus pneumoniae 6 mil germ. inactivați/ml, E. coli 10 mil. germ. inactivați/ml, Klebsiella pneumoniae 6 mil. germ. inactivați/ml, Neisseria catarrhalis 3 mil. germ. inactivați/ml), inactivate termic, lizate parțial, diluate în soluție clorosodică (0,875%), cu o concentrație standard de 48 milioane germeni inactivați/ml; f. × 2 ml ***(S)***

Ind: *Profilactic:* stimularea rezistenței antiinfecțioase nespecifice. *Adjuvant:* în infecții acute și cronice ale căilor respiratorii superioare și inferioare; infecții genitourinare (anexite, metrite, prostatite); boli infecțioase virale (gripă); arsuri de divese grade ce afectează suprafețe mari cutanate; pregătire preoperatorie.
Dz: *La copiii sub 1 an:* 0,5 ml/zi, timp de 3-5 zile. *La copiii cu 1-3 ani:* 1 ml/zi, timp de 3-5 zile. *Adulți:* 1-2 fiole, timp de 7-10 zile, i.m.
RA: Durere la locul injecției, subfebrilitate.

MONOGRAFII – PRODUSE PENTRU DIALIZĂ

MONOGRAFII – PRODUSE PENTRU DIALIZĂ

C

CAPD/DPCA 2 STAY SAFE® *COD ATC: B05DAN1*
FRESENIUS KABI GmbH; Sol. dial. perit.; 1 litru conține: clorură de sodiu 5,7860 g; lactat de sodiu 3,9250 g; clorură de calciu dihidrat 0,2573 g; clorură de magneziu hexahidrat 0,1017 g; glucoză anhidră 15 g; Na^+ 134,00 mmol/l; Ca^{2+} 1,75 mmol/l; Mg^{2+} 0,50 mmol/l; Cl^- 103,50 mmol/l; lactat 35 mmol/l; glucoză 83,30 mmol/l. Osmolaritate teoretică 358 mOsm/l. pH 5,5. ***(S)***

CAPD/DPCA 3 STAY SAFE® *COD ATC: B05DAN1*
FRESENIUS KABI GmbH; Sol. pt. dial. perit. 1 litru soluție pentru dializă peritoneală conține: clorură de sodiu 5,7860 g; lactat de sodiu 3,9250 g; clorură de calciu dihidrat 0,2573 g; clorură de magneziu hexahidrat 0,1017 g; glucoză anhidră 42,5 g; Na^+ 134,00 mmol/l; Ca^{2+} 1,75 mmol/l; Mg^{2+} 0,50 mmol/l; Cl^- 103,50 mmol/l; lactat 35 mmol/l; glucoză 236,10 mmol/l. Osmolaritate teoretică 511 mOsm/l. pH 5,5. ***(S)***

CAPD/DPCA 4 STAY SAFE® *COD ATC: B05DAN1*
FRESENIUS KABI GmbH; Sol. pt. dial. perit. 1 litru soluție pentru dializă peritoneală conține: clorură de sodiu 5,7860 g; lactat de sodiu 3,9250 g; clorură de calciu dihidrat 0,2573 g; clorură de magneziu hexahidrat 0,1017 g; glucoză anhidră 22,73 g; Na^+ 134,00 mmol/l; Ca^{2+} 1,75 mmol/l; Mg^{2+} 0,50 mmol/l; Cl^- 101,50 mmol/l; lactat 35 mmol/l; glucoză 126,20 mmol/l. Osmolaritate teoretică 401 mOsm/l. pH 5,5. ***(S)***

CAPD/DPCA 2 A.N.D.Y. - PLUS® *COD ATC: B05DAN1*
FRESENIUS KABI GmbH; Sol. pt. dial. perit.1 litru soluție pentru dializă peritoneală conține: clorură de sodiu 5,7860 g; lactat de sodiu 3,9250 g; clorură de calciu dihidrat 0,2573 g; clorură de magneziu hexahidrat 0,1017 g; glucoză anhidră 15 g; Na^+ 134,00 mmol/l; Ca^{2+} 1,75 mmol/l; Mg^{2+} 0,50 mmol/l; Cl^- 103,50 mmol/l; lactat 35 mmol/l; glucoză 83,30 mmol/l. Osmolaritate teoretică 358 mOsm/l. pH 5,5. ***(S)***

CAPD/DPCA 3 A.N.D.Y. - PLUS® *COD ATC: B05DAN1*
FRESENIUS KABI GmbH; Sol. pt. dial. perit. 1 litru soluție pentru dializă peritoneală conține: clorură de sodiu 5,7860 g; lactat de sodiu 3,9250 g; clorură de calciu dihidrat 0,2573 g; clorură de magneziu hexahidrat 0,1017 g; glucoză anhidră 42,5 g; Na^+ 134 mmol/l; Ca^{2+} 1,75 mmol/l; Mg^{2+} 0,50 mmol/l; Cl^- 103,50 mmol/l; lactat 35 mmol/l; glucoză 236,1 mmol/l. Osmolaritate teoretică 511 mOsm/l. pH 5,5. ***(S)***

CAPD/DPCA 4 A.N.D.Y. - PLUS® *COD ATC: B05DAN1*
FRESENIUS KABI GmbH; Sol. pt. dial. perit. 1 litru soluție pentru dializă peritoneală conține: clorură de sodiu 5,7860 g; lactat de sodiu 3,9250 g; clorură de calciu dihidrat 0,2573 g; clorură de magneziu hexahidrat 0,1017 g; glucoză anhidră 22,73 g; Na^+ 134 mmol/l; Ca^{2+} 1,75 mmol/l;

Mg^{2+} 0,50 mmol/l; Cl^- 101,50 mmol/l; lactat 35 mmol/l; glucoză 126,2 mmol/l. Osmolaritate teoretică 401 mOsm/l. pH 5,5. ***(S)***

CAPD/DPCA 2 *COD ATC: B05DAN1*
FRESENIUS KABI GmbH; Sol. pt. dial. perit. 1 litru soluție pentru dializă peritoneală conține: clorură de sodiu 5,7860 g; lactat de sodiu 3,9250 g; clorură de calciu dihidrat 0,2573 g; clorură de magneziu hexahidrat 0,1017 g; glucoză anhidră 15 g; Na^+ 134 mmol/l; Ca^{2+} 1,75 mmol/l; Mg^{2+} 0,50 mmol/l; Cl^- 103,50 mmol/l; lactat 35 mmol/l; glucoză 83,3 mmol/l. Osmolaritate teoretică 358 mOsm/l. pH 5,5. ***(S)***

CAPD/DPCA 3 *COD ATC: B05DAN1*
FRESENIUS KABI GmbH; Sol. pt. dial. perit. 1 litru soluție pentru dializă peritoneală conține: clorură de sodiu 5,7860 g; lactat de sodiu 3,9250 g; clorură de calciu dihidrat 0,2573 g; clorură de magneziu hexahidrat 0,1017 g; glucoză anhidră 42,5 g; Na^+ 134 mmol/l; Ca^{2+} 1,75 mmol/l; Mg^{2+} 0,50 mmol/l; Cl^- 103,50 mmol/l; lactat 35 mmol/l; glucoză 236,1 mmol/l. Osmolaritate teoretică 511 mOsm/l. pH 5,5. ***(S)***

CAPD/DPCA 4 *COD ATC: B05DAN1*
FRESENIUS KABI GmbH; Sol. pt. dial. perit. 1 litru conține: clorură de sodiu 5,7860 g; lactat de sodiu 3,9250 g; clorură de calciu dihidrat 0,2573 g; clorură de magneziu hexahidrat 0,1017 g; glucoză anhidră 22,73 g; Na^+ 134 mmol/l; Ca^{2+} 1,75 mmol/l; Mg^{2+} 0,50 mmol/l; Cl^- 103,50 mmol/l; lactat 35 mmol/l; glucoză 126,2 mmol/l. Osmolaritate teoretică 401 mOsm/l. pH 5,5. ***(S)***

Ind: IR cronică în stadiu terminal, de diferite etiologii.
Dz: 2000 ml sol./ședință de dializă. Dacă la începutul trat. apare durere determinată de distensia abdominală, doza poate fi redusă temporar la 500-1 500 ml. La *copii:* 500-1 500 ml soluție (30-40 ml/kg) la o ședință de dializă. La pacienții supraponderali și/sau la cei care tolerează volume mai mari se pot adm. 2 500-3 000 ml. În cazul dializei peritoneale ciclice intermitente sau continue, se utilizează pungi cu volum mai mare de soluție. În cazul unui timp de echilibrare de 4-8 ore, se pot utiliza câte 2000 ml soluție × 4 ori/zi (doza totală 8 000 ml) sau doze mai mari sau mai mici, ajustate individual. Sol. de dializă trebuie încălzită la temperatura corpului, apoi introdusă în cavitatea peritoneală prin cateterul de dializă peritoneală; timpul de adm. este de 5-20 minute. Sol. rămâne în cavitatea peritoneală 4-8 ore, apoi va fi drenată și înlocuită. În funcție de echilibrul hidroelectrolitic, se poate asocia cu alte soluții de dializă peritoneală cu concentrații mai mari de glucoză sau cu concentrații diferite de sodiu și potasiu.
Cind: *Pentru CAPD/DPCA:* hipokaliemie; hipercalcemie. *Pentru dializa peritoneală în general*: traumatisme abdominale recente, arsuri la nivel abdominal, afecțiuni inflamatorii extensive ale tegumentului abdominal în regiunea de ieșire a cateterului, peritonită; perforații abdominale; intervenții abdominale cu aderențe fibroase, boala Crohn, colită ulcerativă, diverticulită, tumori intraabdominale, intervenții chirurgicale abdominale recente, ileus, hernie abdominală; fistulă abdominală internă sau externă; afecțiuni pulmonare, îndeosebi pneumonie; septicemie; acidoză lactică; cașexie sau pierderi mari în greutate, îndeosebi în cazurile în care alimentarea este imposibilă; cazuri rare de uremie care nu mai răspund la trat. prin dializă peritoneală; hiperlipidemie gravă; incapacitate fizică sau mentală de a utiliza sistemul de dializă peritoneală.

AI: Dezechilibrele electrolitice (produse de vărsături sau diaree) pot necesita utilizarea temporară a unei soluții de dializă peritoneală care conține potasiu. În hipercalcemie (produsă de adm. de doze mari de chelatori de fosfați cu conținut mare de calciu și/sau de doze mari de vitamina D) poate fi necesară folosirea temporară sau permanentă a unei soluții cu conținut mic de calciu. La copii, doza trebuie ajustată în funcție de vârstă, înălțime și greutate corporală. La vârstnici, înainte de începerea tratamentului se va avea în vedere incidența crescută a herniei. Pentru evitarea deshidratării sau hiperhidratării este necesară monitorizarea atentă a balanței hidrice și a greutății corporale. Sunt necesare monitorizarea balanței electrolitice, a ureei și creatininei, proteinelor serice, glicemiei, precum și a altor parametri (gaze sanguine, echilibru acido-bazic). La pacienții cu diabet zaharat, doza zilnică de insulină trebuie ajustată. Pentru a reduce riscul de infecție se respectă condițiile de asepsie în timpul schimbării soluției de dializă. Soluția nefolosită se va arunca. Soluția de dializă peritoneală nu trebuie adm. i.v. Se va ține cont de posibilitatea apariției hipercalcemiei în cazul adm. concomitente a compușilor de calciu sau vitaminei D. Adm. concomitentă de diuretice poate provoca dezechilibre hidroelectrolitice. În cazul trat. cu digitalice, este necesară monitorizarea kaliemiei.

RA: Complicațiile cele mai frecvente ale oricărui trat. prin dializă peritoneală sunt reprezentate de peritonită și infecții de tunel sau la nivelul locului de ieșire a cateterului. Peritonita netratată poate duce la septicemie. Simpt. incipientă a peritonitei este reprezentată de tulburarea dializatului, dureri abdominale și febră. Soluția drenată va fi examinată bacteriologic și se va efectua numărătoarea leucocitelor; este esențială instituirea precoce a terapiei (intraperitoneală și/sau sistemică), chiar înainte de primirea rezultatelor antibiogramei, utilizându-se chimioterapice antibacteriene de ultimă generație, eficace împotriva germenilor patogeni suspectați. O pierdere relativă de proteine (5-15 g/zi), aminoacizi (1,2-3,4 g/zi) și vitamine hidrosolubile este inevitabilă. Proprietățile membranei peritoneale se pot modifica pe parcursul dializei peritoneale de lungă durată, primul indiciu fiind pierderea ultrafiltrării. În cazurile severe, dializa peritoneală trebuie întreruptă, recurgându-se la hemodializă. Alte RA: distensie abdominală și senzație de balonare, tulburări la introducerea și evacuarea soluției de dializă, hernie, dureri în umăr, dispnee datorată ridicării diafragmului, diaree și constipație. Pot apărea dezechilibre hidroelectrolitice (hipokaliemie, iar în caz de aport crescut de calciu, hipercalcemie). Aceste dezechilibre electrolitice pot fi corectate prin trecerea la un alt tip de soluție peritoneală (hipercalcemia) sau prin schimbarea dietei (hipokaliemia). De asemenea, în timpul administrării soluției de dializă peritoneală pot să apară deshidratare sau hiperhidratare. Stările de deshidratare severă se pot manifesta prin hTA, tahicardie, amețeli și crampe musculare; hiperhidratarea poate determina creștere în greutate, HTA, edeme ale membrelor inferioare și tahipnee. Pot să apară tulburări ale metabolismului lipidic (dislipoproteinemie și hiperlipidemie). Datorită adm. continue de glucoză, în cazurile în care dieta pacientului nu este adaptată aportului caloric crescut, poate să apară obezitate.

D

DIANEAL PD 4 GLUCOZĂ 1,36% *COD ATC: B05DAN1*

BAXTER HEALTHCARE; Sol. dial. perit.; 100 ml conține: clorură de sodiu 538 mg; lactat de sodiu 448 mg; clorură de calciu dihidrat 18,4 mg;

clorură de magneziu hexahidrat 5,1 mg; glucoză anhidră 1,36 g; Ca^{2+} 13,2 mmol/l; Mg^{2+} 0,025 mmol/l; Cl^- 9,50 mmol/l; lactat 4 mmol/l; glucoză 7,54 mmol/l. pH 5,5. ***(S/P-RF)***

DIANEAL PD 4 GLUCOZĂ 2,27% *COD ATC: B05DAN1*
BAXTER HEALTHCARE; Sol. dial. perit.; 100 ml conține: clorură de sodiu 567 mg; lactat de sodiu 392 mg; clorură de calciu dihidrat 25,7 mg; clorură de magneziu hexahidrat 15,2 mg; glucoză anhidră 2,27 g; Na^+ 13,2 mmol/l Ca^{2+} 0,175 mmol/l; Mg^{2+} 0,075 mmol/l; Cl^- 9,50 mmol/l; lactat 10,2 mmol/l; pH 5,5. ***(S/P-RF)***

DIANEAL PD 4 GLUCOZĂ 3,86% *COD ATC: B05DAN1*
BAXTER HEALTHCARE; Sol. dial. perit.; 100 ml conține: clorură de sodiu 543 mg; lactat de sodiu 448 mg; clorură de calciu dihidrat 18,4 mg; clorură de magneziu hexahidrat 5,1 mg; glucoză anhidră 3,86 g; Na^+ 13,2 mmol/l; Mg^{2+} 0,025 mmol/l; Cl^- 9,50 mmol/l; lactat 9,5 mmol/l; glucoză 7,54 mmol/l; pH 5,5. ***(S/P-RF)***

Ind: IR cronică în stadiu terminal, de diferite etiologii.
Dz: 2000 ml sol./ședință de dializă. Dacă la începutul trat. apare durere determinată de distensia abdominală, doza poate fi redusă temporar la 500-1 500 ml. *La copii:* 500-1 500 ml soluție (30-40 ml/kg) la o ședință de dializă. La pacienții supraponderali și/sau la cei care tolerează volume mai mari se pot adm. 2 500-3 000 ml. În cazul dializei peritoneale ciclice intermitente sau continue, se utilizează pungi cu volum mai mare de soluție. În cazul unui timp de echilibrare de 4-8 ore, se pot utiliza câte 2000 ml soluție × 4 ori/zi (doza totală 8 000 ml) sau doze mai mari sau mai mici, ajustate individual. Sol. de dializă trebuie încălzită la temperatura corpului, apoi introdusă în cavitatea peritoneală prin cateterul de dializă peritoneală; timpul de adm. este de 5-20 minute. Sol. rămâne în cavitatea peritoneală 4-8 ore, apoi va fi drenată și înlocuită. În funcție de echilibrul hidroelectrolitic, se poate asocia cu alte soluții de dializă peritoneală cu concentrații mai mari de glucoză sau cu concentrații diferite de sodiu și potasiu.
Cind: *Pentru Dianeal PD4:* hipokaliemie; hipercalcemie. *Pentru dializa peritoneală în general*: traumatisme abdominale recente, arsuri la nivel abdominal, afecțiuni inflamatorii extensive ale tegumentului abdominal în regiunea de ieșire a cateterului, peritonită; perforații abdominale; intervenții abdominale cu aderențe fibroase, boala Crohn, colită ulcerativă, diverticulită, tumori intraabdominale, intervenții chirurgicale abdominale recente, ileus, hernie abdominală; fistulă abdominală internă sau externă; afecțiuni pulmonare, îndeosebi pneumonie; septicemie; acidoză lactică; cașexie sau pierderi mari în greutate, îndeosebi în cazurile în care alimentarea este imposibilă; cazuri rare de uremie care nu mai răspund la trat. prin dializă peritoneală; hiperlipidemie gravă; incapacitate fizică sau mentală de a utiliza sistemul de dializă peritoneală.
A!: Dezechilibrele electrolitice (produse de vărsături sau diaree) pot necesita utilizarea temporară a unei soluții de dializă peritoneală care conține potasiu. În hipercalcemie (produsă de adm. de doze mari de chelatori de fos-

fați cu conținut mare de calciu și/sau de doze mari de vitamina D) poate fi necesară folosirea temporară sau permanentă a unei soluții cu conținut mic de calciu. La copii, doza trebuie ajustată în funcție de vârstă, înălțime și greutate corporală. La vârstnici, înainte de începerea tratamentului se va avea în vedere incidența crescută a herniei. Pentru evitarea deshidratării sau hiperhidratării este necesară monitorizarea atentă a balanței hidrice și a greutății corporale. Sunt necesare monitorizarea balanței electrolitice, a ureei și creatininei, proteinelor serice, glicemiei, precum și a altor parametri (gaze sanguine, echilibru acido-bazic). La pacienții cu diabet zaharat, doza zilnică de insulină trebuie ajustată. Pentru a reduce riscul de infecție se respectă condițiile de asepsie în timpul schimbării soluției de dializă. Soluția nefolosită se va arunca. Soluția de dializă peritoneală nu se adm. i.v. Se va ține cont de posibilitatea apariției hipercalcemiei în cazul adm. concomitente a compușilor de calciu sau vitaminei D. Adm. concomitentă de diuretice poate provoca dezechilibre hidroelectrolitice. În cazul trat. cu digitalice, este necesară monitorizarea kaliemiei.

RA: Complicațiile cele mai frecvente ale oricărui trat. prin dializă peritoneală sunt reprezentate de peritonită și infecții de tunel sau la nivelul locului de ieșire a cateterului. Peritonita netratată poate duce la septicemie. Simpt. incipientă a peritonitei este reprezentată de tulburarea dializatului, dureri abdominale și febră. Soluția drenată va fi examinată bacteriologic și se va efectua numărătoarea leucocitelor; este esențială instituirea precoce a terapiei (intraperitoneală și/sau sistemică), chiar înainte de primirea rezultatelor antibiogramei, utilizându-se chimioterapice antibacteriene de ultimă generație, eficace împotriva germenilor patogeni suspectați. O pierdere relativă de proteine (5-15 g/zi), aminoacizi (1,2-3,4 g/zi) și vitamine hidrosolubile este inevitabilă. Proprietățile membranei peritoneale se pot modifica pe parcursul dializei peritoneale de lungă durată, primul indiciu fiind pierderea ultrafiltrării. În cazurile severe, dializa peritoneală trebuie întreruptă, recurgându-se la hemodializă. Alte RA: distensie abdominală și senzație de balonare, tulburări la introducerea și evacuarea soluției de dializă, hernie, dureri în umăr, dispnee datorată ridicării diafragmului, diaree și constipație. Pot apărea dezechilibre hidroelectrolitice (hipokaliemie, iar în caz de aport crescut de calciu, hipercalcemie). Aceste dezechilibre electrolitice pot fi corectate prin trecerea la un alt tip de soluție peritoneală (hipercalcemia) sau prin schimbarea dietei (hipokaliemia). De asemenea, în timpul administrării soluției de dializă peritoneală pot să apară deshidratare sau hiperhidratare. Stările de deshidratare severă se pot manifesta prin hTA, tahicardie, amețeli și crampe musculare; hiperhidratarea poate determina creștere în greutate, HTA, edeme ale membrelor inferioare și tahipnee. Pot să apară tulburări ale metabolismului lipidic (dislipoproteinemie și hiperlipidemie). Datorită adm. continue de glucoză, în cazurile în care dieta pacientului nu este adaptată aportului caloric crescut, poate să apară obezitate.

E

EXTRANEAL *COD ATC: B05DAN1*

BAXTER HEALTH CARE; Sol. dial. perit. 1 l soluție conține: icodextrin 75 g; clorură de sodiu 5,4 g; lactat de sodiu 4,5 g; clorură de calciu 257 mg; clorură de magneziu 51 mg. Osmolaritatea teoretică: 284 mOsm/l.

Compoziția ionică: sodiu 133 mmol/l; calciu 1,75 mmol/l; magneziu 0,2 mmol/l; clor 96 mmol/l; lactat 40 mmol/l. ***(S/P-RF)***

Ind: Trat. IR cronice, în special la pacienții care au pierdut ultrafiltrarea la soluții de glucoză. Pacienților aflați în program de dializă peritoneală continuă ambulatorie (CAPD) sau dializă peritoneală automată (APD).
Dz: O singură dată pe zi, în timpul celui mai lung schimb, de obicei în timpul nopții în CAPD, iar în APD în timpul zilei. *Adulți:* Maxim 2 l. Dacă acest volum produce senzație de tensiune abdominală, se vor utiliza doar 1,5 l. Timpul de schimb este între 6-12 ore în CAPD și 14-16 ore în APD. Drenajul lichidului se face pe baza gravitației. Lichidul drenat va fi inspectat pentru a vedea dacă există fibrină și trombuși, care pot indica prezența unei infecții. Se va administra folosind o tehnică aseptică. Punga cu soluție va fi încălzită la temperatura corpului. Volumul de soluție va fi introdus într-un timp variabil (10-20 minute), în funcție de toleranța pacientului. *Copii.* Nu se recomandă utilizarea la copii (sub 18 ani).
Cind: Alergie cunoscută la polimeri derivați din amidon, maltoză sau izomaltoză; intervenții chirurgicale abdominale în luna precedentă începerii trat.; fistule abdominale, tumori, plăgi deschise, hernie sau alte cazuri în care integritatea peretelui abdominal și a cavității peritoneale este compromisă.
A!: Nu este recomandată pacienților cu IRA. Ca și alte soluții de dializă peritoneală, icodextrina trebuie folosită după evaluarea raportului risc/beneficiu, la pacienții a căror stare împiedică o nutriție normală, cu disfuncții respiratorii sau cu carență de potasiu. Pacienții trebuie să fie monitorizați pentru a se evita hiperhidratarea sau deshidratarea. Se recomandă monitorizarea biochimiei sanguine, testelor hematologice și osmolalitatea plasmatică. În timpul dializei peritoneale apar pierderi de proteine, vitamine hidrosolubile și medicamente, necesitând trat. de substituție. Pacienții cu diabet zaharat necesită doze suplimentare de insulină (intra peritoneal) pentru controlul glicemiei în timpul CAPD. Măsurarea glicemiei trebuie realizată printr-o metodă specifică, pentru a preveni interferența cu maltoza. Se va utiliza o tehnică aseptică la administrarea soluțiilor de dializă peritoneală. Soluția trebuie încălzită în ambalajul exterior la temperatura de 37°C (căldură uscată).
RA: Dureri abdominale, hemoragii, infecții la locul de ieșire a cateterului, peritonite, obstruarea cateterului, dezechilibre electrolitice, hTA, HTA, crampe musculare. Alte RA care pot apărea în timpul dializei peritoneale (scăderea apetitului alimentar, constipație, oboseală, tulburări de vedere, edeme, tulburări respiratorii) au fost observate și la utilizarea icodextrinei. Cazuri rare de rash la pacienții care primeau și alte medicamente, asociate cu descuamare.

G

GRANUDIAL ACID AF 72 *COD ATC: B05ZA*
FRESENIUS KABI GmbH; Granulat conc. pt. hemodializă; 1 kg conține: clorură de sodiu 907,12 g; clorură de potasiu 22,7 g; clorură de calciu 39,15 g; clorură de magneziu 30,94 g ***(S)***

Ind: IR acută/cronică. Hiperhidratare. Intoxicații acute. Corectarea unor dezechilibre acido-bazice și electrolitice.
Cind: Hipercalcemie, tulburări de coagulare, insuficiență respiratorie severă.

HDY 138 CONC. HEMODIALIZĂ *COD ATC: B05ZAN1*
B. BRAUN MELSUNGEN; Conc. hemodial. 1 l soluție conține: clorură de sodiu 204,54 g; acetat de sodiu 166,72 g; clorură de potasiu 5,22 g; clorură de calciu 9 g; clorură de magneziu 7,12 g; bidon × 10 l ***(S)***

Ind: Concentrat pentru hemodializă.

HF 24 *COD ATC: B05ZBN2*
FRESENIUS KABI GmbH; Sol. hemofiltrare 1 l conține: clorură de sodiu 5,69 g; lactat de sodiu 9,98 g; clorură de potasiu 0,149 g; clorură de calciu 0,294 g; clorură de magneziu 0,294 g; sac × 4 500 ml ***(S)***

Ind: Sol. pentru hemofiltrare.

N

NUTRINEAL PD4 CU 1,1% AMINOACIZI *COD ATC: B05DB*
BAXTER HEALTHCARE Ltd; Sol. dial. perit. 1 litru conține: *Aminoacizi:* tirozină 300 mg, triptofan 270 mg, fenilalanină 570 mg, treonină 646 mg, serină 510 mg, prolină 595 mg, glicină 510 mg, alanină 951 mg, valină 1 393 mg, metionină 850 mg, izoleucină 850 mg, leucină 1 090 mg, lizină (clorhidrat) 955 mg, histidină 714 mg, arginină 1 071 mg. *Electroliți:* clorură de calciu dihidrat 184,0 mg, clorură de magneziu hexahidrat 50,8 mg, lactat de sodiu 4 480 mg, clorură de sodiu 5 380 mg.; pungă × 1 l; 1,5 l; 2 l; 2,5 l; 3 l ***(S/P-RF)***

Ind: Dializă peritoneală la pacienți malnutriți cu IR (albuminemia < 35 g/l).
Dz: Adm. intraperitoneală în prezența unui cateter peritoneal și a unui set de transfer. Înainte de utilizare soluția se va încălzi la temperatura corpului. Necesarul zilnic de proteine este de aprox. 1,2-1,3 g/kg pentru pacienți adulți dializați și 2-3 g/kg pentru copii. Doze mai mari pot fi necesare în stări catabolice severe. Trat. se va reevalua după 3 luni dacă nu se observă o îmbunătățire a stării clinice și biochimice a pacientului
Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componenții produsului; intervenții chirurgicale abdominale recente și tulburări gastrointestinale (în funcție de raportul beneficiu/risc, pot fi contraindicații relative); uremie > 38 mmoli/l (2,4 g/l).
A!: Prudență în caz de acidoză necorectată, IH severă, hiperamoniemie. Vor fi monitorizate echilibrul hidro-electrolitic, acido-bazic și modificările metabolismului proteic. Se va folosi o tehnică aseptică de adm. În caz de peritonită, se va institui tratament adecvat. Se va verifica claritatea soluției înainte de adm. Pungile deteriorate sau soluțiile rămase nefolosite se vor arunca. La pacienți tratați cu digitalice se va monitoriza kaliemia. Pacienții diabetici necesită monitorizarea dozelor de insulină sau de hipoglicemiante orale.
RA: Infecții peritoneale și infecții de tunel; reacții alergice; dezechilibre hidro-electrolitice; acidoză metabolică; hiperazotemie.

S

SOL. PT. HEMOFILTRARE HF 23 *COD ATC: B05ZBN*
FRESENIUS KABI GmbH; Sol. perf. conține: clorură de sodiu 6,09 g; lactat de sodiu 4 g; clorură de potasiu 0,14 g; clorură de calciu 0,31 g; glucoză 1,5 g; sac × 4 500 ml ***(S)***

Ind: Sol. pentru hemofiltrare.
Dz: Sol. preparată se perfuzează prin intermediul unei pompe dozatoare, în circuitul extracorporal. Un ciclu (substituirea a 18-20 l) durează 3-6 ore.

VARIA – PRODUSE STOMATOLOGICE, SUPLIMENTE NUTRITIVE, PRODUSE COSMETICE

VARIA – PRODUSE STOMATOLOGICE *COD ATC: VO7AS*

ADHESOR *CARBOFINE DENTAL AS;* 40 g pulb. + 20 g sol. ***(STO)***

ALPHAPLAST *DENTAL MATERIAL;* Pastă bază 12 g + pastă catalizator 14 g + hârtie 100 buc. + spatule plastic 100 buc. ***(STO)***

ALVOGYL *SPECIALITES SEPTODONT;* Pastă 12 g ***(STO)***

ARGIL *SPOFA;* Pulb. 80 g + comp. Lichidă 55 g + linguriță dozatoare ***(STO)***

CALXYD *DENTAL AS;* Pastă 10 g ***(STO)***

CARYOSAN *DENTAL AS;* Lichid 25 g + Pulb. tip rapid 30 g + Pulb. tip normal 30 g ***(STO)***

CAUSTINERF FORT *SPECIALITES SEPTODONT;* Pastă 4,5 g ***(STO)***

CERIN ceară de turnare *DENTAL AS;* Placă - ceară de turnare (ct. × 15 plăci) ***(STO)***

CIMPAT ROSA *SPECIALITES SEPTODONT;* Ciment (fl. × 25 g pastă) ***(STO)***

CONALOR *DENTAL AS;* 2 fl. pulb. × 8 g + 4 fl. pulb. × 4 g culori + fl. × 16 g soluție ***(STO)***

COREGA 1 MINUTE HYGIENE *BLOCK DRUG COMPANY INC.;* Spumă (fl. spray × 50 ml) ***(STO)***

COREGA MED MUNDSPULUNG *BLOCK DRUG COMPANY INC.;* Sol. ext. (fl. × 250 ml) ***(STO)***

COREGA PARTS (JUNIOR) *BLOCK DRUG COMPANY INC.;* Cpr. eferv. (ct. × 10 folii × 6 cpr. eferv.) ***(STO)***

COREGA RAUCHER TABS *BLOCK DRUG COMPANY INC.;* Cpr. eferv. (ct. × 10 folii × 6 cpr. eferv.) ***(STO)***

COREGA TABS *BLOCK DRUG COMPANY INC.;* Cpr. eferv. (ct. × 8 folii × 4 cpr. eferv.) ***(STO)***

CRESOPHENE *SPECIALITES SEPTODONT;* Sol. ext. (fl. × 13 ml) ***(STO)***

DENTOCALMIN *BIOFARM SA;* Sol. dent. (fl. × 6 g) ***(STO)***

DURACROL *DENTAL AS;* Pulb. albă 500 g + pulb. galbenă 500 g + lichid 250 ml ***(STO)***

EVICROL composit obturare *DENTAL AS;* Pulb. + soluție ***(STO)***

FRITEX *DENTAL AS;* Pulb. 30 g + lichid 25 g ***(STO)***

GK ALLOY *DENTAL AS;* 50 Cps. + 400 mg; 600 mg sau 800 mg aliaj *(STO)*

GK ALLOY *DENTAL AS;* 50 g pulb. *(STO)*

GRINAZOLE *SPECIALITES SEPTODONT;* Pastă (tub × 4,5 g) *(STO)*

GUTTAPERCHA *DENTAL AS;* 100 conuri dentare *(STO)*

IMPRESSION COMPOUND RED *DENTAL AS;* Ct. × 7 plăci *(STO)*

LIDOCARSEN *LAB. SPAD;* Pastă (plic × 1 ct. × 3,5 g pastă) *(STO)*

NEOCONES *SPECIALITES SEPTODONT;* 50 conuri dentare *(STO)*

PULPOMIXINE *SPECIALITES SEPTODONT;* Pastă (tub × 5 g) *(STO)*

SENSODYNE C *BLOCK DRUG COMPANY INC.;* Pastă de dinți (tub × 75 ml) *(STO)*

SEPTOMIXINE *SPECIALITES SEPTODONT;* Pastă dentară (tub × 7,5 g) *(STO)*

SPOFACRYL *SPOFA;* 5 fl. × 100 g comp. solidă + fl. × 100 ml sol. *(STO)*

STOMAFLEX SOLID *DENTAL AS;* 1300 g pastă + 25 g lichid *(STO)*

SUPER COREGA FLUSSIG BLOCK *DRUG COMPANY INC.;* fl. × 50 ml *(STO)*

SUPER COREGA HAFT CREME BLOCK *DRUG COMPANY INC.;* Cremă (tub × 20 ml) *(STO)*

SUPER COREGA HAFT PULVER BLOCK *DRUG COMPANY INC.;* Pulb. (fl. × 25 g sau 50 g) *(STO)*

SUPERLUX *UNIVERSALHYBRID DENTAL MATERIAL;* Pastă (2 seringi × 4,5 g) *(STO)*

SUPERPONT *DENTAL AS;* fl. × 50 g sol. + fl. × 100 g pulb. *(STO)*

ZYMAFLUOR *NOVARTIS CONSUMER HEALTH;* Cpr. florură de sodiu 0,25 mg sau 1 mg *(STO)*

VARIA – SUPLIMENTE NUTRITIVE

A

ABC SPECTRUM
WALMARK; Tb.

ACID FOLIC
LEINER HEALTH PRODUCTS; Cpr.

ALICIN
WALMARK; Gelule

ALL PURPOSE MULTIVITAMIN & MULTIMINERAL
LEINER HEALTH PRODUCTS; Cpr.

ALOE VERA 470 mg
WALMARK; Cps.

ANTACID - ASSORTED
LEINER HEALTH PRODUCTS; Cpr.

ANTIOXIDANT
WALMARK; Tb.

ARTROSTOP tablete
WALMARK; Tb.

ARTROSTOP PLUS
WALMARK; Tb.

ARTROSTOP PLUS
WALMARK; Pulb.

ASAL
ALCON CUSI SA; Cps.

ASCOVIT 100
EUROPHARM SA;

B

B COMPLEX + VITAMINA C
WALMARK; Tb.

BETABRONZ
WALMARK; Gelule

BETACAROTEN
WALMARK; Gelule

BRONȚIȘORI
WALMARK; Tb.

C

CALCIU CU ULEI DE PEŞTE
WALMARK; Gelule

CALCIPRAT D_3
HYPERICUM SRL; Cps. 1,733 g concentrat de colecalciferol, carbonat de calciu

CALCIUM, MAGNESIUM & ZINC
LEINER HEALTH PRODUCTS; Cpr.

CALCIU - MAGNEZIU - ZINC
WALMARK; Tb.

CALCIU + VITAMINA D
LARGO ambalat de EUROPHARM SA; Cpr. film.

CARBONAT DE CALCIU
EUROPHARM SA; Cpr.

CARTILAJ DE RECHIN
WALMARK; Cps.

CĂTINOFORT
HOFIGAL SA; Cps. operc.

CEDOVIX
SPECIFAR; Dj.

CIPCAL 250/500
CIPLA; Cpr. film.

CIPCAL SIROP
CIPLA; Sirop 150 ml

COD LIVER OIL
LEINER HEALTH PRODUCTS; Cps. gelat.

COENZIMA Q10 + CARNITINĂ
WALMARK; Gelule

COENZIMA Q10 ÎN ULEI DE PEŞTE
HOFIGAL SA; Cps. film. 15 mg

COLESTOP
WALMARK; Tb.

COMPLET HOFIGAL ANTIOXIDANT
HOFIGAL SA; Cpr.

CROMDIET
WALMARK; Tb.

CROM FORTE 200 μG
WALMARK; Tb.

CROM PICOLINAT
WALMARK; Tb.

CRP (CHOLESTEROL REDUCING PLAN)
WALMARK; Cps. 135 g

D

DENOXINAL
WALMARK; Tb.

DIABETIKER VITAMINE
WÖRWAG PHARMA GmbH & CO; Tb.

DOLOMIT
WALMARK; Tb.

E

EASY IRON
WALMARK; Cps.

ECHINACEEA
HOFIGAL SA; Cps. operc.

ECHINACEA 400 mg
WALMARK; Cps.

ENERGY Q10 SPECTRUM
WALMARK; Tb.

EPA MARINE
WALMARK; Gelule

EUROVITA
LARGO ambalat de EUROPHARM SA; Dj.

EUROVITA ARTROMIN
LARGO ambalat de EUROPHARM SA; Cpr. film.

EUROVITA COLESTATIN
LARGO ambalat de EUROPHARM SA; Cps.

EUROVITA S
LARGO ambalat de EUROPHARM SA; Cpr. film.

EUROVITA + FIER
EUROPHARM SA; Dj.

EUROVITA GINSENG
LARGO ambalat de EUROPHARM SA; Cpr. film.

EUROVITA MULTIMINERALE
LARGO ambalat de EUROPHARM SA; Cpr. film.

EUROVITA PENTRU PĂR ȘI UNGHII
LARGO ambalat de EUROPHARM SA; Cpr. film.

EVENING PRIMROSE
WALMARK; Gelule

EVENING PRIMROSE + GINKO BILOBA
WALMARK; Gelule

EXTRACT ULEIOS (MACERAT) DE LEVĂNŢICĂ
HOFIGAL SA; Cps. 500 mg

EXTRACT ULEIOS (MACERAT) DE MENTĂ
HOFIGAL SA; Cps. 500 mg

EXTRACT ULEIOS (MACERAT) DE SALVIE
HOFIGAL SA; Cps. 500 mg

EXTRAVIT - M
HOFIGAL SA; Cpr.

F

FEMINE CELULIT
WALMARK; Tb.

FEMINE OSTEOSTOP CU IZOFLAVONOIDE
WALMARK; Tb.

FEMINE PLUS
WALMARK; Tb.

FEMINE VIADERM
WALMARK; Tb.

FIAMARANT
HOFIGAL SA; Cpr. oblong.

FIBRE
WALMARK; Tb.

FITODIAB
HOFIGAL SA; Cpr.

FLAVOTAN® 40 mg
LABORMED PHARMA SA; Cpr. film. 40 mg

G

GALACTOGIL
HYPERICUM SRL; Gran.

GELOPECTOSE
HYPERICUM SRL; Pulb. orală

GESTARELLE G
HYPERICUM SRL; Cps.

GESTARELLE M
HYPERICUM SRL; Cps.

GINKO BILOBA
WALMARK; Tb.

GINKOPRIM
WALMARK; Tb.

GINSENG MANCIURIAN 250 mg
WALMARK; Cps.

GUARANA
WALMARK; Tb.

GYDRELLE PHYTO
HYPERICUM SRL; Cpr.

H

HEPATON PLUS
LARGO ambalat de EUROPHARM SA; Cpr. film.

HOFIMUN
HOFIGAL SA; Cps. operc.

HOFISAN
HOFIGAL SA; Cps. operc.

HOFISIL
HOFIGAL SA; Cpr.

I

IMUNO SPECTRUM
WALMARK; Tb.

L

LACTOVITA
CIPLA; Cpr. eff.

LECITINĂ
LARGO ambalat de EUROPHARM SA; Cps. gelat. moi

LECITINĂ 1000 mg
WALMARK; Gelule

LECITINĂ 1200 mg
WALMARK; Cps.

LIVERCYN
HYPERICUM SRL; Cps.

M

MAG - ANGHINAR
HOFIGAL SA; Cpr.

MAGNESIUM 200 mg
WALMARK; Tb.

MAGNESIUM MARIN - VITAMINA B_6
HYPERICUM SRL; Cps.

MEMOPLUS
WALMARK; Tb.

MINIMARȚIENI
WALMARK; Tb.

MOMORDICA CHARANTIA
HOFIGAL SA; Cps. operc.

N

NATURAL HIGH POTENCY MULTIVITAMIN & MINERAL
LEINER HEALTH PRODUCTS; Cpr.

NEUROMION
HOFIGAL SA; Cpr.

O

ONE DAILY MULTIVITAMIN
LEINER HEALTH PRODUCTS; Cpr.

OȚET AROMAT DE MENTĂ SAU TRANDAFIR
HOFIGAL SA; Sol. ext.

OȚET DE MERE
WALMARK; Tb.

OX BILL
LARGO ambalat de EUROPHARM SA; Dj.

OXUTEX
WORWAG PHARMA GmbH & CO; Cps.

P

PRENATAL
LEINER HEALTH PRODUCTS; Cpr.

PRENATAL VITAMINE
WALMARK; Tb.

PROLYTE
CIPLA; Gran. pt. susp. orală

PROLYTE FIZZ
CIPLA; Tb. eff

PROSTENAL
WALMARK; Cps.

PROTEIN FORȚĂ
HOFIGAL SA; Cpr.

PUMPKIN
WALMARK; Gelule

PYCNOGENOL
VILCO SA; Cpr. 20 mg, 50 mg

R

REDIGEST
HOFIGAL SA; Cpr. mast.; Cps.

S

SELENIU
WALMARK; Tb.

SENIOR SPECTRUM
WALMARK; Tb.

SILIMARIN 1000 mg
WALMARK; Gelule

SPIRULINĂ
HOFIGAL SA; Cpr. 200 mg; 500 mg; Cps. operc. 400 mg; 500 mg
LAROPHARM SRL; Cps. 250 mg
WALMARK; Tb.

SPIRULINĂ 200 mg; SPIRULINĂ 400 mg; SPIRULINĂ 500 mg
VITAHELP în cooperare cu LABORMED PHARMA; Cps. 200 mg, 400 mg și 500 mg

SPIRULINĂ 500 mg
BIOFARM SA; Cps 500 mg

SPIRULINĂ + CAROB
WALMARK; Tb.

STRESVIT
WALMARK; Tb.

SUPER VITAMINA C
WALMARK; Tb.

T

TAGA-MAN
LARGO ambalat de EUROPHARM; Cpr. film.

TRY ENZYMES
LARGO ambalat de EUROPHARM; Dj.

TUSIMUN
HOFIGAL SA; Sol. orală

U

ULEI DE PEȘTE
HOFIGAL SA; Cps. operc. 400 mg

URINAL
WALMARK; Cps.

URISODA
CIPLA; Gran. eff.

URSULEȚI
WALMARK; Tb.

V

VARIXINAL
WALMARK; Tb.

VIAREDIN
WALMARK; Tb.

VIAREDIN COCKTAIL
WALMARK; Pulb.

VITAMINA A
WALMARK; Gelule

VITAMINA C
WALMARK; Tb.

VITAMINA E
WALMARK; Gelule

VITAMINE PENTRU PĂR
WALMARK; Tb.

VITAVISION
WALMARK; Tb.

Y

YUCCA
WALMARK; Gelule

Z

ZINC
WALMARK; Tb.

ZINKIT 10
WÖRWAG PHARMA GmbH & CO; Tb. eff.

VARIA – PRODUSE COSMETICE

A

ACNEOGEL
HOFIGAL SA; Gel pt. ten; Tub 50 ml

ALPHA KM
Gel contur de ochi
LED; Cremă

ALPHA KM
Pentru ten cu tendință grasă
LED; Cremă

ALPHA KM
Cremă de noapte
LED; Cremă

ALPHA KM
Cremă de față
LED; Cremă

ALPHA KM
Lapte de corp
LED; Emulsie

APĂ TERMALĂ AVENE
AVENE; Spray, Fl. 150 ml; 300 ml

APĂ TERMALĂ VICHY
LAB. VICHY; Spray 150 ml

B

BUCOPROTECT
HOFIGAL SA; Gel; Tub 50 ml

C

CHELSTOP
HOFIGAL SA; Loț. pt. căderea părului și regenerare

CLEANANCE K
AVENE; Emulsie U/A, Tub 40 ml

CREMĂ ANTIRID
HOFIGAL SA;

CREMĂ PENTRU ÎNGRIJIREA GÂTULUI
HOFIGAL SA;

CREMĂ PENTRU PIELE INTOLERANTĂ (C.P.I.)
AVENE; Cremă, Tub 40 ml

D

DERCOS
Șampon antimătreață, păr gras, pielea capului seboreică
LAB. VICHY; Șampon, Fl. 200 ml

DERCOS
Șampon antimătreață, păr normal, pielea capului uscată
LAB. VICHY; Șampon, Fl. 200 ml

DERCOS
Șampon energizant cu Aminexil, vitaminele PP, B_6 și provitamina B_5
LAB. VICHY; Șampon fl. 200 ml

DERCOS
Șampon - tratament sebocorector, păr gras
LAB. VICHY; Fl. 200 ml

DERCOS
Șampon - tratament împotriva căderii părului pentru bărbați
LAB. VICHY; Fiole 6 ml

DERCOS
Șampon - tratament împotriva căderii părului pentru femei
LAB. VICHY; Fiole 6 ml

DIROSEAL
Cremă pt. tratament
AVENE; Cremă 30 ml

DIZOLVANT ACETONIC
HOFIGAL SA; Sol. ext. antiinflam.

DUCRAY ANAPHASE
DUCRAY; Șampon - cremă, Tub 150 ml

DUCRAY ANASTIM CU RTH 16
DUCRAY; Loțiune, Fl. cu pulverizator-dozator 100 ml

DUCRAY ICTYANE
DUCRAY; Cremă hidratantă pt. duș, Tub 200 ml

DUCRAY ICTYANE
DUCRAY; Cremă de tratament pt. față și corp, Tub 50 ml

DUCRAY ICTYANE
DUCRAY; Cremă pt. mâini, Tub 75 ml

DUCRAY KELYANE
DUCRAY; Cremă dermatologică pt. buze, Tub 15 ml

DUCRAY KERACNYL
DUCRAY; Cremă antiacneică, Tub 40 ml

DUCRAY KERACNYL
DUCRAY; Gel spumant, Tub 125 ml

DUCRAY KERACNYL
DUCRAY; Mască cu triplă acțiune, Tub 40 ml

DUCRAY KERTYOL
DUCRAY; Șampon - tratament contra mătreței grase, Fl. 125 ml

DUCRAY KERTYOL S
DUCRAY; Șampon - tratament contra dermatitei seboreice și psoriasisului, Fl. 125 ml

DUCRAY LACTOCERAT
DUCRAY; Șampon - tratament restructurant și nutritiv pt. păr uscat și degradat, Fl. 125 ml; Emulsie protectoare, Tub 100 ml

DUCRAY PHOTOSCREEN 30
DUCRAY; Gel - cremă protecție UV, Tub 100 ml

DUCRAY PHOTOSCREEN 60
DUCRAY; Cremă protecție UV, Tub 50 ml

DUCRAY PHOTOSCREEN 60
DUCRAY; Lapte protecție UV, Tub 100 ml

DUCRAY SABAL
DUCRAY; Șampon - tratament pt. păr gras, Fl. 125 ml

DUCRAY SELEGEL
DUCRAY; Șampon - tratament pt. mătreață uscată, Fl. 125 ml

DUCRAY TRIAZOL
DUCRAY; Șampon - tratament pt. mătreață tenace, Fl. 125 ml

E

EMULSIE FLUIDĂ ECHILIBRANTĂ
AVENE; Emulsie, Fl. 40 ml

G

GEL CONTUR OCHI
HOFIGAL SA;

GEL DEMACHIANT PENTRU PIELE SENSIBILĂ
AVENE; Gel, Fl. 150 ml

GEL EXFOLIANT PENTRU PIELE SENSIBILĂ
AVENE; Gel, Fl. 50 ml

GEL PENTRU PLAJĂ
HOFIGAL SA;

H

HOFIDENT Q10
HOFIGAL SA; Sol. orală/Apă de gură 50 ml

HYDRANCE LEGERE
Cremă pt. piele uscată
AVENE; Cremă, Tub 40 ml

HYDRANCE RICHE
Cremă pt. piele uscată
AVENE; Cremă, Tub 40 ml

I

ICHTYOSOFT - CREMĂ
LED; Cremă

ICHTYOSOFT - ŞAMPON
Şampon antimătreaţă
LED;

L

LAPTE DEMACHIANT PENTRU PIELE SENSIBILĂ
AVENE; Fl. 200 ml

LAPTE PENTRU ÎNGRIJIREA CORPULUI
HOFIGAL SA;

LIFTACTIV DE ZI
Tratament intensiv de zi antirid şi fermitate
LAB. VICHY; Pot 50 ml

LIFTACTIV DE NOAPTE
Tratament intensiv de noapte fermitate, decongestionant
LAB. VICHY; Pot 50 ml

LIFTACTIV PENTRU OCHI
Tratament intensiv pt. conturul ochilor, antirid şi fermitate
LAB. VICHY; Tub 15 ml

LIPIDIOSE 1
Lapte rehidratant pt. corp, piele uscată
LAB. VICHY; Fl. 200 ml

LIPIDIOSE 2
Cremă fluidă pt. corp piele foarte uscată
LAB. VICHY; Fl 200 ml

LIPIDIOSE CREMĂ PENTRU MÂINI
Tratament intensiv împotriva fisurilor pielii
LAB. VICHY; Tub 50 ml

LOŢIUNE PENTRU PIELE INTOLERANTĂ (L.P.I.)
AVENE; Tub 40 ml

M

MASCĂ HIDRATANTĂ CALMANTĂ PENTRU PIELE SENSIBILĂ
AVENE; Fl. 50 ml

MASCĂ TERMALĂ PURIFIANTĂ
LAB. VICHY; Tub 50 ml

MASCĂ TERMALĂ REHIDRATANTĂ
LAB. VICHY; Tub 50 ml

N

NIZORAL ȘAMPON ANTIMĂTREAȚĂ
JANSSEN PHARMACEUTICA; Șampon, Fl. 60 ml; 100 ml

NORMADERM
Cremă hidratantă antiimperfecțiuni
LAB. VICHY; Tub 50 ml

NORMADERM
Gel de curățare profundă
LAB. VICHY; Fl. pompă 200 ml

NORMADERM
Stick camuflant antiimperfecțiuni
LAB. VICHY; Stick 17,5 ml

NORMADERM
Tonic purifiant
LAB. VICHY; Fl. 200 ml

NUTRILOGIE 1
Cremă de îngrijire intensivă a tenului uscat
LAB. VICHY; Pot 50 ml

NUTRILOGIE 2
Cremă de îngrijire intensivă a tenului foarte uscat
LAB. VICHY; Pot 50 ml

NUTRILOGIE BUZE
Cremă pentru îngrijirea buzelor uscate
LAB. VICHY; Tub 15 ml

P

PEDISAN GEL
HOFIGAL SA;

PLANT INTIM
HOFIGAL SA; Sol. ext.

PLANT INTIM GEL
HOFIGAL SA; Gel 50 ml

PURETE THERMALE
Demachiant integral 3 în 1
LAB. VICHY; Tub 200 ml

PURETE THERMALE
Demachiant pentru ochi sensibili
LAB. VICHY; Fl. 150 ml

PURETE THERMALE
Exfoliant-cremă detoxifiant
LAB. VICHY; Tub 75 ml

PURETE THERMALE
Gel - spumă detoxifiant pt. curăţare cu apă
LAB. VICHY; Tub 125 ml

PURETE THERMALE
Lapte demachiant detoxifiant pt. ten normal mixt
LAB. VICHY; Fl. 200 ml

PURETE THERMALE
Lapte demachiant detoxifiant pt. ten uscat şi sensibil
LAB. VICHY; Fl. 200 ml

PURETE THERMALE
Loţiune tonică hidracalmantă detoxifiantă pt. ten uscat şi sensibil
LAB. VICHY; Fl. 200 ml

PURETE THERMALE
Loţiune tonică ultraproaspătă detoxifiantă pt. ten normal mixt
LAB. VICHY; Fl. 200 ml

S

SAFORELLE CREMĂ COPII
HYPERICUM SRL; Cremă pt. copii

SAFORELLE CREMĂ ADULŢI
HYPERICUM SRL; Cremă pt. adulţi

SAFORELLE SĂPUN LICHID
HYPERICUM SRL; Săpun lichid 100 ml; 250 ml

SĂPUN LICHID VEGETAL
HOFIGAL SA;

SĂPUN MOALE VEGETAL
HOFIGAL SA;

SPIRULIN
HOFIGAL SA; Cremă regenerantă

STICK DE BUZE CU COLD CREAM
AVENE; Creion 4,5 g

SUPLIFORM
HOFIGAL SA; Gel pt. întreţinere corporală

Ş

ŞAMPON 5R
HOFIGAL SA;

T

THERMAL S MAT
Cremă rehidratantă pt. ten normal - mixt
LAB. VICHY; Fl. pompă 50 ml

THERMAL S PENTRU OCHI
Hidrogel pt. conturul ochilor
LAB. VICHY; Fl. 15 ml

THERMAL S 1
Cremă rehidratantă pt. ten deshidratat
LAB. VICHY; Pot 50 ml

THERMAL S 2
Cremă rehidratantă pt. ten foarte deshidratat
LAB. VICHY; Pot 50 ml

TOLERANCE EXTREME
Cremă calmantă antiiritantă
AVENE; Minidoze sterile × 5 ml

TOLERANCE EXTREME
Emulsie de curăţare
AVENE; Minidoze sterile × 10 ml

TRILAVANDĂ
HOFIGAL SA; Sol. ext. după ras

TRIO S - PROTECŢIE EXTREMĂ (FACTOR DE PROTECŢIE 50)

TRIXERA CREMĂ EMOLIENTĂ
AVENE; Cremă, Tub 200 ml

TRIXERA EMULSIE EMOLIENTĂ PENTRU BAIE
AVENE; Emulsie, Tub 200 ml

Y

YSTHEAL + CREMĂ
AVENE; Cremă, Fl. cu dozator 30 ml (150 doze)

YSTHEAL + EMULSIE
AVENE; Emulsie, Fl. cu dozator 30 ml (150 doze)

YSTHEAL + CONTUR PENTRU OCHI
AVENE; Gel - cremă, Fl. cu dozator 15 ml

Z

ZENIAC - GEL PURIFIANT
LED; Gel

ZENIAC LP- CU ELIBERARE PRELUNGITĂ
LED;

ZENIAC LP - FORT
LED; Cremă

PRODUCĂTORI ROMÂNI DE MEDICAMENTE
REPREZENTANȚELE FIRMELOR STRĂINE DE MEDICAMENTE

PRODUCĂTORI ROMÂNI DE MEDICAMENTE REPREZENTANŢELE FIRMELOR STRĂINE DE MEDICAMENTE

A & A TRADING CO. S.R.L. - Reprezentantul GENZYME în România
Şos. Olteniței nr. 169, sector 4, București
Tel.: 332.21.85;
Fax: 330.76.90

ABBOT LABORATORIES
Calea Șerban Vodă nr. 133, sector 4, București
Tel.: 337.46.12;
Fax: 337.46.13

ADM FARM
Bd. Basarabiei nr. 240, Bl. MV6, sector 3, București
Tel.: 255.44.35-36;
Fax: 255.29.54

S.C. AESCULAP S.A.
Str. Livezeni nr. 8, Tg. Mureș
Tel.: 0265 25.50.34;
Fax: 0265 25.52.14

ALCON PHARMACEUTICAL LTD.
BĂNEASA CENTER, Șos. București - Ploiești nr. 17-21, et. 1, sector 1, București
Tel.: 203.93.01; 203.93.02; 203,93.14;
Fax: 203.93.00

ALPHA IMPORT EXPORT 2000 S.A. - Reprezentanța ROTEXMEDICA în România
Str. Jean Monet nr. 54, sector 1, București,
Tel.: 231.54.55 - 60;
Fax: 231.53.00

ALSIFCOM INTERMED
Calea Turzii nr. 178 C, Cluj-Napoca
Tel.: 0264 45.32.32, -33, -34;
Fax: 0264 43.80.12
Filiala București - Calea Călărași nr. 94, sector 3, București
Tel.: 322.86.91

ALTANA PHARMA A.G. GERMANIA - Reprezentantă în România prin BENTEN MEDICAL
Bd. Unirii nr. 20, bl. 5 C, sc. 1, et. 3, ap. 16, sector 4, București
Tel.: 335.86.68;
Fax: 335.69.34

ALTRO DISTRIBUTION S.R.L - PRODUSE FARMACEUTICE
Calea Giulești nr. 333
Tel.: 221.96.26;
Fax: 223.83.14

AMERSHAM HEALTH - Reprezentanța pentru România
Calea Călărașilor nr. 311, Bl. 71, sc. 1, ap. 20, sector 3, București
Tel./Fax: 323.46.32; 323.16.67

S.C. ANTIBIOTICE IAȘI
Str. Valea Lupului nr. 1, Iași
Tel.: 0232 25.36.00; 22.00.40;
Fax: 0232 21.10.20

APIC INTERNAȚIONAL
B-dul. Magheru nr. 35, bl. A, sc. A, et. 1, ap. 11, sector 1, București
Tel.: 312.39.31; Fax: 312.39.26
Depozit: Bd. N. Titulescu nr. 92, bl. 13, sector 1, București
Tel.: 222.46.98

ARENA GROUP S.A.
Str. Șt. Mihăileanu nr. 31, sector 2, București
Tel.: 322.24.21;
Fax: 321.62.97

ASTRAZENECA
Șos. Pipera-Tunari nr. 2 C, Com. Voluntari, Jud. Ilfov
Tel.: 243.25.20;
Fax: 243.23.58

AVENTIS PASTEUR - Reprezentanța în România
Str. Domnița Ruxandra nr. 12, sector 2, București
Tel.: 212.99.91;
Fax: 212.99.93

AVENTIS PHARMA INTERNAȚIONAL
Str. L. Pasteur nr. 40, Sector 5, București
Tel.: 410.53.34; 410.53.35;
Fax: 410.52.85

BAYER AG - Reprezentanța în România
Bd. Poligrafiei nr. 3 A, sector 1, București
Tel.: 224.30.81;
Fax: 224.32.37

BEAUFOUR IPSEN
Aleea Alexandru nr. 8, ap. 2, sector 1, București
Tel.: 231.13.82; 231.27.20;
Fax: 231.13.23

B. BRAUN MEDICAL S.R.L. - Reprezentantul B. BRAUN MELSUNGEN
Germania în România
Str. L. Pasteur nr. 2, Timișoara
Tel.: 0256 28.29.06; 28.49.05;
Fax: 0256 28.49.07

BERLIN–CHEMIE A.G. MENARINI GROUP
Str. Ghiozdanului nr. 6 A. sector 1, București
Tel.: 232.34.32;
Fax: 233.08.26

BIOCHIM MEDICAL S.R.L.
Str. Viitorului nr. 79, sector 2, București
Tel./Fax: 212.34.10

BIO ELL S.R.L.
Str. Bega nr. 4, Târgu Mureș
Tel.: 0265 - 25.07.83; 25.70.84; 25.05.63;
Fax: 0265 - 25.00.75

BIOFARM S.A
Str. Logofăt Tăutu nr. 99, sector 3, București
Tel.: 301.06.00;
Fax: 301.06.05

BIOMEDIAL PHARMA S.R.L.
Str. M. Cioranu nr. 2, Bl. 66, ap. 2, sector 5, București
Tel.: 781.21.08; 410.57.21;
Fax: 410.57.21

BIOTEHNOS S.A.
Str. Dumbrava Roșie nr. 18, sector 2, București
Tel.: 210.20.15;
Fax: 210.97.05

BOEHRINGER INGELHEIM
Splaiul Unirii nr. 86, et. 2, sector 4, București
Tel.: 330.99.63 - 65;
Fax: 330.94.09

BRISTOL-MYERS SQUIBB
Str. Alexandru Averescu nr. 15, sector 2, București
Tel.: 260.10.46;
Fax: 260.10.44

CATALYSIS - Reprezentanța în România
Str. Jiului nr. 6, sc. B, ap. 2, sector 1, București
Tel./Fax: 224.67.44

CENTROFARM S.A.
Str. George Vraca nr. 8, sector 1, București
Tel.: 315.36.20; 315.16.10;
Fax: 311.12.84

CHIMIMPORTEXPORT - PLURIMEX S.R.L. - Agent MERCK KGaA Germania - Reprezentanța MERCK HSEE pentru produse farmaceutice
Str. Tunari nr. 26, sector 2, București
Tel.: 211.85.68; 210.76.87;
Fax: 210.74.21

S.C. CHIMPROD S.A
Str. Chimiei nr. 3-5, Oradea
Tel.: 0259 43.34.85;
Fax: 0259 47.00.34

CIECH S.A. - POLFA - Reprezentată de APOCONSULT
Str. Dr. Lister nr. 50, sector 5, București
Tel.: 410.92.76;
Fax: 410.98.01

CLARUS INTERMED S.R.L. - Reprezentanța în România a firmelor TEMMLER PHARMA și QUEISSER PHARMA
Str. V. Lascăr nr. 23-25, et. 3, ap. 20, sector 2, București
Tel./Fax: 323.73.68; 211.07.42

COSMO PHARM ROMÂNIA S.R.L.
B-dul. C. Coposu nr. 5, bl. 103, sc. 3, et. 7, ap. 74, sector 3, București
Tel.: 320.89.74; 320.44.33; 323.20.76;
Fax: 323.00.46

CSC PHARMACEUTICALS
Calea Șerban Vodă 95-101, cod 70517, sector 4, București
Tel.: 337.32.81;
Fax: 336.51.90

DANSON S.R.L. - TRADING COMPANY
Bd. Dacia nr. 81, sector 2, București
Tel.: 212.45.10; 210.49.09;
Fax: 21.65.15

DANUBIUS EXIM S.R.L.
Str. Trestiana nr. 3, bl. 8B, ap. 4, sector 4, București
Tel.: 330.71.25;
Fax: 330.52.00

DAR-AL-DAWA
Calea Vitan nr. 112, sector 2, București
Tel.: 327.01.86;
Fax: 327.01.87

DATACOM INTERNATIONAL S.A. – Reprezentanța pentru România al: DEMO, BIOGEN, BRUSCHETINI SPA, LIFE PHARMA, SANKYO PHARMA GmbH
Str. Sf. Elefterie nr. 26, sector 5, București
Tel.: 411.98.19; 410.82.00;
Fax: 410.80.17

DESITIN ARZNEIMITTEL GmbH - Reprezentanța din România
Bd. Ferdinard nr. 17, ap. 3, sector 2, București
Tel.: 211.26.14

DIOMSANA S.R.L.
Bd. Ferdinand nr. 76, sector 2, București
Tel.: 252.80.31

DITA IMPORT-EXPORT S.R.L.
Str. Octavian nr. 42, sector 3, București
Tel.: 322.54.57;
Fax: 32.54.57

DUNAV IMPORT-EXPORT S.R.L.
Calea Griviței nr. 136, Corp B, et. 1, sector 1, București
Tel.: 222.83.05;
Fax: 222.83.64

ECZACIBAȘI
B-dul. Dinicu Golescu nr. 17, ap. 31, sector 1, București
Tel./Fax: 637.61.77

EGIS PHARMACEUTICALS Ltd., UNGARIA
Str. Maior Gh. Șonțu nr. 8, Sector, București
Tel.: 260.01.88; 260.01.89; 223.04.85; 222.84.70;
Fax: 223.05.01

E.I.P.I.C.O. - EGYPTIAN IND. PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO.
B-dul. Unirii nr. 6, Bl. 8 C, sc. 1, et. 3, ap. 9, sector 4, București
Tel.: 337.09.36; 337.11.91; 336.43.49;
Fax: 337.11.91

ELIDOR S.R.L.
Calea Giulești nr. 200, sector 1, București
Tel./Fax: 336.77.78; 335.95.63

ELI LILLY (SUISSE) S.A.
OPERA CENTER, str. Costache Negri nr.1-5, et. 7, sector 5, București
Tel.: 402.30.00; 402.30.15; 402.30.16;
Fax: 402.30.01, 402.30.53

EUROPHARM HOLDING BRAȘOV
Str. Poenelor nr. 5, Brașov
Tel.: 0268 30.75.45, 30.75.11;
Fax: 0268 30.75.30, 30.75.55

EUROMED S.R.L. - Reprezentantul în România al SEPTODONT, EMB, DMG, SOFIC
Calea Moșilor nr. 237, bl. 45, sc. 1, ap. 6, parter, sector 2, București
Tel.: 313.49.08;
Fax: 211.92.80

EWOPHARMA A.G.
Intr. Eliza Zamfirescu Leonida nr. 13, ap. 2, sector 1, București
Tel./Fax: 260.13.44; 202.93.27; 260.14.07

EXHELIOS S.R.L.
Str Martir Colonel Uță Ioan nr. 3, Timișoara
Tel./Fax: 0256 47.31.12; 47.22.13

FABIOL S.A.
B-dul. Timișoara nr. 50, sector 6, București
Tel.: 777.65.62;
Fax 444.01.55

FARMACOM ITALIA
Str. Ion Slatineanu nr. 4, corp B, ap. 4, sector 1, București
Tel.: 223.76.89,
Fax: 312.80.94

FARMEC SA
Str. Henri Barbuse nr. 16, Cluj-Napoca
Tel.: 0264 43.28.84; 0264 43.28.90;
Fax: 0264 43.25.43

S.C. FARMEXIM S.A.
Bd. Carol I, nr. 12, sector 3, București
Tel.: 315.10.95;
Fax: 312.06.97

FARMILA ITALIA - Reprezentanța pentru România
Str. Nerva Traian nr. 23-25, Bl. M 71, sc. 1, et. 6, ap. 21, sector 3, București
Tel./Fax: 320.82.34
e-mail: familia@fx.ro

FELSIN FARM S.R.L.
Bd. I. Mihalache nr. 11, sector 1, București
Tel.: 212.76.08; 312.91.00;
Fax: 312.94.71

FILDAS TRADING S.R.L.
Calea Giulești nr. 333, Sector 6, București
Tel.: 221.91.33;
Fax: 220.49.27

FITOTERAPIA S.A.
Bd. Timișoara nr. 50, sector 6, București
Tel.: 777.65.62:
Fax: 444.01.55

FRESENIUS KABI ROMÂNIA
Bd. M. Kogălniceanu nr. 21, bl. C 6, et. 7, Brașov
Tel.: 0268 32.36.43; 0722-64.20.22;
Fax: 0268 31.30.32
e-mail: contact@fresenius kabi.ro

GALENIKA a.d.
Str. N. Bălcescu nr. 24, sc. B, et. 5, ap. 4, sector 1, București
Tel.: 310.11.75;
Fax: 310.12.30

S.C. GALENUS S.A.
Str. Botizului nr. 47, Satu Mare
Tel.: 0261 76.86.45;
Fax: 0261 76.82.07

GEDEON RICHTER ROMÂNIA S.A.
Str. Cuza Vodă nr. 99-105
4300 Tg. Mureș
Tel. 0265 26.82.97; 23.78.20

GENEVA ROMFARM INTERNATIONAL
Str. Aviator Darian nr. 9, bl. 11 B, et. II, ap. 4. sector 1, București
Tel.: 231.35.61; 230.11.27; 230.17.34;
Fax: 230.09.15

GLAXO SMITHKLINE S.R.L.
OPERA CENTER, Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, București
Tel.: 302.82.08; 302.82.22
Fax: 302.82.09

HELCOR S.R.L.
Str. Victor Babeș nr. 50, Baia Mare
Tel.: 0262 27.67.51;
Fax: 0262 27.67.54

S.C. HELVETICA PROFARM S.A.
Str. Louis Pasteur nr. 2, Timișoara
Tel.: 0256 21.49.91; 21.49.93;
Fax: 0256 21.49.95

S.C. HEMAROM S.R.L.
Str. Sofia nr. 24, sector 1, București
Tel/Fax: 231.51.47; 23.51.48

HEMOFARM CONCERN VRSAC, YUGOSLAVIA - Reprezentanța în România
Splaiul Independenței nr. 1, bl. 16, et. 2, ap. 38, sector 5, București
Tel.: 336.71.07; 336.70.15; 336.70.06;
Fax: 336.70.90

HEXAL A.G.
Calea Plevnei nr. 141, Bl. 3, et. 9, ap. 33, sector 6, București
Tel.: 315.09.65; 315.09.72; 315.09.73;
Fax: 222.19.18

HIPOCRATE S.R.L.
Str. Prahovei nr. 6, sector 1, București
Tel.: 667.46.37;
Fax: 413.24.27

HOFFMANN LA ROCHE
Str. Av. N. Drossu nr. 9, sector 1, București
Tel.: 224.03.96. -98;
Fax: 224.03.99

HOFIGAL
Intr. Serelor nr. 2 A, sector 4, București
Tel.: 334.51.35; 334.78.01;
Fax: 334.59.05

HYPERICUM S.R.L.
Distribuitor al LAB. THEPENIER PHARMA INDUSTRIE, Franța; MEDEUS A.G.: Germania; ENGELNARD ARZNEIMITTEL GmbH & Co., Germania; LAB. A. BAILLY-SPEAB, Franța
Str. Moise Constantin nr. 40, Sector 6, București
Tel./Fax: 413.13.00; 413.26.66

IMEDICA S.A. - Reprezentanța FARAN, ANFARM HELLAS, BROS, VIANEX, DEMO, LEINER HEALTH PRODUCTS
Șos. București - Ploiești nr. 141 D, sect.1, București
Tel.: 231.51.03 - 10;
Fax: 231.54.43

INSTITUTUL CANTACUZINO
Splaiul Independenței nr. 103, sector 5, București
Tel.: 411.38.00; 411.42.00; 411.21.59;
Fax: 411.56.72

IRCON S.R.L.
Str. Pinului nr. 9, Iași
Tel.: 0232 21.51.47

INSTITUTUL NAȚIONAL DE HEMATOLOGIE TRANSFUZIONALĂ "PROF. DR. C. T. NICOLAU"
Str. Ctin. Caracaș nr. 2-8
Tel.: 212.89.04; 212.81.26

IRISS SERVIMPEX S.R.L. - Reprezentantul HIKMA în România
Str. Al. Depărățeanu nr. 31, sector 1, București
Tel./Fax: 222.89.51; 222.72.54; 223.76.44

IVAX - REPREZENTANȚA PENTRU ROMÂNIA
Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, București
Tel.: 403.43.22;
Fax: 403.43.26

JANSSEN - CILAG/TEOPHARM - Reprezentanța pentru România Johnson & Johnson S.E.Inc.
Str. Șipotul Fântânilor nr. 8, sector 1, București
Tel.: 312.41.85; 312.11.69;
Fax: 312.11.69

KRKA - REPREZENTANȚA PENTRU ROMÂNIA
Str. Sevastopol nr. 24, et. 5, sector 1, București
Tel/Fax.: 212.84.57; 212.84.66; 212.84.67

LABORATOIRES BOIRON
B-dul. Mircea Vodă nr. 44, bl. M 17, sc.1, et. VII, sector 3, București
Tel.: 320.13.02;
Fax: 320.61.02

LABORATOIRES FOURNIER
Str. Popa Savu nr. 77, et. 4, ap. 8, sector 1, București
Tel.: 222.14.37;
Fax: 222.14.19; 222.14.39

LABORATOIRES PIERRE FABRE
București, PO. Box 22 - 198
Tel./Fax: 312.21.21

LABORATOARELE MEDICA
Str. Frăsinetului nr. 11, Otopeni
Tel./Fax: 266.47.77; 266.47.78

LABORATORUL REMEDIA S.R.L.
Str. Traian Vuia nr. 6, sector 1, București
Tel./Fax: 211.19.89

LABORATORUL UNIVERSITAR FARMA S.R.L.
Splaiul Independenței nr. 169, sector 5, București
Tel./Fax: 760.24.07

LABORATORUL DE PRODUSE NATURALE "RUMEIN"
Str. Lucian Blaga nr. 3, Timișoara
Tel./Fax: 0256 22.09.39

S.C. LABORMED PHARMA S.A.
Splaiul Independenței nr. 319, sector 6, București
Tel./Fax: 410.87.50; 212.68.25; 312.14.57; 212.72.57

LANNACHER
Splaiul Independenței nr. 1. bl. 16, et. 2, ap. 7, sect. 4, București
Tel.: 337.49.78;
Fax: 335.15.55; 335.15.70

LAROPHARM S.R.L.
Șos. Alexandriei nr. 145 C, Com. Bragadiru S.A.I.
Tel./Fax: 448.10.12; 314.18.50; 314.18.95

LAURMED S.R.L.
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 211, Chiajna - S.A.I.
Tel.: 430.01.44; 436.01.45;
Fax: 436.01.44

LECIVA
Str. Dna. Oltea nr. 74, sector 2, București
Tel.: 212.03.11;
Fax: 212.03.12

LEK PHARMATECH
Str. Argeșului nr. 25, Tg. Mureș
Tel.: 0265 20.81.20;
Fax: 0265 25.47.67

LEK PHARMACEUTICALS d.d. - Reprezentanța pentru România
Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, București
Tel.: 403.45.53; 403.45.58;
Fax: 403.45.69

LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LIMITED - Reprezentanța LEO Danemarca în România
Str. Dr. Felix nr. 49, et. 3, sector 1, București
Tel.: 312.19.46; 312.19.63; 312.19.64;
Fax: 312.19.33

LES LABORATOIRES SERVIER
OPERA CENTER 2, str. N. Staicovici nr. 2, et. 5, sector 5, București
Tel.: 402.09.11;
Fax: 402.09.15

MAGISTRA C & C
Str. Av. Belghiru nr. 9, Constanța
Tel./Fax: 0241 63.47.42

MANGESIUS TRADING S.R.L. - Importator unic al produselor ENGELHARD ARZNEIMITTEL GmbH & Co, Germania; DENTOX GESELLSCHAFT FUR PHARMAZEUTISCHE PREPARATE; Germania; HEINRICH MACK NACHF GmbH & Co. K.G., Germania
Str. Clucerului nr. 62-66, sc. 2, et. I, ap. 9, sector 1, București
Tel./Fax: 222.81.61; 222.50.76; 222.68.94

MARK INTERNATIONAL S.R.L.
Șos. Păcurari nr. 127, et. 1, Iași
Tel./Fax: 0232 25.28.00

MEDICAL SAER - Reprezentantul în România al firmelor CADILA HEALTHCARE, JULPHAR, MISR Co.
Str. Despot Vodă nr. 14, sector 2, București
Tel.: 310.10.12; 211.56.68; 211.56.69;
Fax: 210.01.33

MED-COMP INTERNATIONAL S.R.L. - Reprezentant și importator unic în România al firmelor AVENTIS, CHIRON BEHRING, ENGELHARD DISTREX
Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M 53, sc. 1, et. 4, ap. 15, sector 3, București
Tel./Fax: 323.98.69

MEDICARE GROP S.R.L. - Reprezentantul în România al BIOTEST PHARMO GmbH
Str. Andrei Mureșanu nr. 1, sector 1, București
Tel.: 230.98.03; 230.98.04; 230.98.05;
Fax: 230.77.89

MEDICAROM GROUP S.R.L. Reprezentantul în România al: LYKA LABS, MC NEIL PERRIGO, MODI-MUNDIPHARMA, WIN-MEDICARE
Intrarea Glucozei nr. 37-39, sector 2, București
Tel.: 242.39.25;
Fax: 242.74.24

MEDIC CALL S.R.L. - Reprezentantul în România al OM PHARMA, Elveția
Str. Baba Novac nr. 11, Bl. G17, ap. 12 sector 3, București
Tel./Fax: 325.00.13

MEDICO MED S.R.L.
Str. Lucăcești nr. 10, sector 6, București
Tel./Fax: 220.22.04

S.C. MEDIMFARM S.A.
Str. Târgoviștei nr. 11, Ploiești
Tel.: 0244 58.29.35;
Fax: 0244 51.20.13

MEDIPLUS EXIM S.R.L. - Importator și distribuitor
Bd. Mărășești nr. 2, sector 4, București
Tel./Fax: 301.74.74;

MEDIROM MARKETING - Reprezentant pentru WYETHWITEHALL
Str. Fecioarei nr. 7, sector 2, București
Tel.: 211.34.09;
Fax: 210.78.02

MEDOCHEMIE ROMÂNIA S.R.L.
B-dul. Națiunilor Unite nr. 4, bl. 106, sc. A, et. 4, ap. 15, sector 5, București
Tel.: 335.04.54; 335.03.65;
Fax: 335.04.55

MERCK SHARP & DOHME
Str. A. Pușkin nr. 30, sector 1, București
Tel.: 231.63.74; 231.63.66; 231.63.77;
Fax: 231.63.55; 231.63.54

MUNDIPHARMA MEDICAL GmbH, ELVEȚIA - Reprezentantul pentru România
Str. Dr. Mihail Petrini nr. 4, ap. 6, sector 5, București
Tel.: 410.10.49;
Fax: 411.58.05

S.C. NATURA MEDICA S.R.L.
Str. Almașu Mare nr. 5-7, bl. B 16. Sc. 3, et. 1, ap. 34, București
Tel.: 629.84.47

NATUREX PHARMACEUTIC - Reprezentantul în România al PHARMASCIENCE LAB.
Bd. D. Cantemir nr. 5, bl. 6, sc. A, ap. 30, sector 4, București
Tel.: 330.71.12;
Fax: 337.27.05

NORDFARM PRODUCT S.R.L.
Str. D. Golescu nr. 23-25, sector 1, București
Tel.: 212.66.83;
Fax: 224.90.56

NOVARTIS CONSUMER HEALTH
Str. Gh. Moceanu nr. 2-4, et. 4, ap. 11, sector 1, București
Tel.: 231.63.44; 230.54.74;
Fax: 231.63.43

NOVARTIS PHARMA SERVICES INC.
Str. Iacob Felix nr. 55, sector 1, București
Tel.: 312.99.01; 312.99.76;
Fax: 312.99.07

NOVO NORDISK PHARMA S.A.
UNION INT. CENTER, str. Ion Câmpineanu nr. 11, sector 1, București
Tel.: 312.36.74;
Fax: 312.67.60

NYCOMED PHARMA S.A. – O/C RUBY DE TACOS S.R.L.
Str. Biruinței nr. 6, sector 1, București
Tel./Fax: 224.36.94; 224.38.15

S.C. OZONE LABORATOIRES S.R.L.
- Reprezentantul în România al OZONE LABORATOIRES Ltd., Marea Britanie
Bd. Mărășești nr. 2, sector 4, București
Tel.: 301.74.74;
Fax: 301.74.33

PFIZER H.C.P. CORPORATION
Splaiul Independenței nr. 179, sector 5, București
Tel.: 212.72.20; 212.73.60;
Fax: 212.72.50

PHARCO PHARMACEUTICAL
Str. Coriolan Marcius nr. 23, Sector 5, București
Tel. 311.32.56; 311.32.19;
Fax: 311.32.58

PHARMA NORD ROMÂNIA
Piața Montreal nr.10, sector 1, București
Tel.: 337.46.38;
Fax: 337.46.40

PHARMAPLANT BIOGALENICA
Spl. Unirii nr. 313, corp H, et. 4, sector 3, București
Tel.: 346 48.18; 346.48.09,
Fax: 346.48.08

PHARMEX ROM INDUSTRY - Reprezentanța pentru România al: STANLEY, PHARMACEUTICAL LABS. CORPUS CRISTI
Str. Crizantemelor nr. 1, Mogoșoaia
Tel.: 210.59.04; 210.39.54;
Fax: 210.34.48

PLANTAVOREL S.A.
Str. Cuza Vodă nr. 46, Piata Neamț
Tel./Fax: 0233 21.03.08;

PLIVA
B-dul. Eroilor nr. 18, sector 5, București
Tel.: 411.91.44; 411.92.10;
Fax: 411.91.85

POPULATION SERVICES INTERNATIONAL ROMÂNIA
Str. George Călinescu nr. 13, et. 3, sector 1, București
Tel. 230.72.25, 230.72.31;
Fax: 230.72.33

PRISUM INTERNATIONAL - Importator unic pentru România al produselor HIMALAYA HERBAL HEALTHCARE
Str. Măgura Vulturului nr. 37, sector 2, București
Tel.: 250.14.20; 250.36.88;
Fax: 250.31.19

PROCTER & GAMBLE
Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9 A, sector 2, București
Tel.: 301.11.10;
Fax: 301.12.23

PRODCOMPLEX S.A.
Str. Gh. Doja nr. 117, Tg. Mureș

S.C. PROGRESUL S.A.
Bd. Petrolului nr. 115, Ploiești

PROMABLE INCOM S.R.L.
Str. Radu Vodă nr. 19, sector 4, București
Tel./Fax: 330.84.63

PROMEDIC S.R.L.
Spl. Unirii nr. 313, sector 3, București
Tel.: 346.48.48;
Fax: 346.48.49

RANBAXY - Reprezentanța în România
Str. Emil Racoviță nr. 25, sector 4, București
Tel./Fax: 460.76.99, 460.79.41, 460.07.24

DR. REDDY'S LAB.
Str. P. Crețu nr. 74, ap. 2, sector 1, București
Tel/Fax: 224.00.32

RHODIA ROMÂNIA S.R.L. - Reprezentantul pentru România al RHODIA ORGANIQUE FINE Ltd.
Str. Domința Ruxandra nr. 12, sector 2, București
Tel.: 212.28.74; 212.28.75; 210.70.00;
Fax: 212.29.18; 212.29.07

RICHTER GEDEON LTD - Reprezentanța pentru România
Str. Calotești nr. 1, et. 2, ap. 3, sector 3, București
Tel.: 322.34.95; 322.39.70; 320.00.32;
Fax: 320.08.97

SANOFI ~ SYNTHELABO
I.B.C. Modern, b-dul. Carol I nr. 34-36, et. 6, sector 2, București
Tel.: 250.73.92 - 5
Fax; 250.73.80

S.C. SANTA S.A.
Str. Rahovei nr. 7, Brașov
Tel./Fax: 0268 42.21.32.

SANTA MED. BALANOS, GRECIA - Reprezentanța pentru România
Str. Anastasie Panu nr. 3, bl. A 3, sc. 3, ap. 86, sector 3, București
Tel.: 322.13.95;
Fax: 321.22.10

SCHERING AG
Calea Victoriei nr. 155, bl. D 1, tronson 6, et. 5, sector 1, București
Tel.: 310.49.18; 310.49.19; 310.49.20; 319.49.21;
Fax: 310.49.22

SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG
BĂNEASA CENTER, șos. București-Ploiești nr. 19-21, et. 7, sector 1, București
Tel.: 233.35.31;
Fax: 233.35.33

SEDER IMPORT-EXPORT
Splaiul Independenței nr. 7, bl. 101 Izvor, sc. 4, et. 3, ap. 61, sector 5, București
Tel.: 335.04.79; 335.06.19;
Fax: 335.04.79

S.C. SICOMED S.A.
B-dul. Th. Pallady nr. 50, sector 3, București
Tel.: 345.12.80; 345.16.32; 345.19.57;
Fax: 345.40.04; 345.49.16

SIFI
Splaiul Unirii nr. 37, bl. M 10, ap. 119, et. 4, sect. 4, București
Tel/Fax: 327.60.54

S.C. SINDAN S.R.L.
B-dul. Ion Mihalache nr. 11, sector 1, București
Tel.: 312.01.91; 312.75.80; 312.75.68; 312.75.78;
Fax: 312.02.49

S.C. SINTOFARM S.A.
Str. Ziduri între vii nr. 22, sector 2, București
Tel.: 252.17.15; 252.25.40;
Fax: 252.24.41

SLAVIA PHARM S.R.L.
Str. Știrbei Vodă nr. 53-55, sector 1, București
Tel.: 312.74.92; 315.15.25;
Fax: 312.74.92

SODIMED S.R.L. - Reprezentantul în România al LABORATOIRES MEDIX, LABORATOIRES LEURQUIN MEDIOLANUM, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, LABORATOIRES VITRIS PHARMA
Str. Dr. Taberei nr. 35, bl. F 5, sc. A. ap. 3, sector 6, București
Tel.: 413.67.55; 413.67.56;
Fax: 413.93.40

SOFMEDICA S.R.L.
Calea Bucureștilor nr. 87-91, Otopeni
Tel.: 308.21.00 - 10;
Fax: 308-21-80

SOLVAY PHARMACEUTICALS
Str. Johann Strauss nr. 2A, sector 2, București
Tel.: 231.79.90- 92, 230.78.51;
Fax: 230.78.85

S.C. SPORTENERGY S.R.L. - Reprezentanța în România pentru STEIFEL LABORATOIES (IRLANDA)
Str. Dr. Nicolae Tomescu nr. 14, sector 5, București
Tel.: 412.01.90;
Fax: 412.01.89

S.C. TAMISA TRADING S.R.L.
Sos. Pipera-Tunari nr. 2 C, Com. Voluntari, jud. Ilfov
Tel.: 243.22.20;
Fax: 243.22.04

TERAPIA S.A.
Str. Fabricii nr. 124, Cluj Napoca
Tel.: 0264 41.51.05; 0264 41.52.22; 0264 41.50.99;
Fax: 0264 41.50.97; 0264 41.55.37; 0264 41.59.81

TIS FARMACEUTIC S.A.
Str. Industriilor nr. 16, sector 3, București
Tel. 256.30.88, 256.14.75

UNIFARM S.A. (DISTRIBUITOR)
Str. Av. Sănătescu nr. 4, sector 1, București
Tel.: 224.11.13, 224.08.39;
Fax: 224.37.30

VALMEDICA S.A. - Reprezentantul în România al TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Ltd, CHAUVIN-ANKERFARM BAUSCH & L.OM
Str. Țepes Vodă nr. 89, sector 2, București
Tel.: 252.48.86; 205.54.00;
Fax: 205.54.11

VICHY LABORATOIRES - L' OREAL ROMÂNIA S.R.L.
Departament Cosmetice Active
Bd. Ficusului nr. 42 A, sector 1, București
Tel.: 232.99.21 - 23;
Fax: 232.99.61

S.C. VIM SPECTRUM S.R.L.
Șos. Sighișoarei nr. 409
Sat Corunca, Com. Livezeni, Jud. MUREȘ
Tel.: 0265 16.83.17;
Fax: 0265 16.62.10

S.C. VIOMED LINE S.R.L.
Str. Zilot Romanul nr. 14, sector 1, București

VITALIA K S.A.
Str. Cuza Vodă Bl. B 2, Ploiești

V. TARUS RO AGENTIES
Str. Octavian nr. 42, sector 3, București
Tel./Fax: 321.16.40

WALMARK ROMÂNIA S.R..L.
Piața Alba Iulia nr. 5, bloc 14, sc. 1, ap. 7, Sector 3, București
Tel.: 326.09.37; 326.09.38;
Fax: 320.78.56

WÖRWAG PHARMA GmbH & CO - Reprezentanța pentru România
Str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 18, Cluj Napoca
Tel./Fax: 0264 43.83.59; 0264 44.16.26

YAMANOUCHI EUROPE BV
Str. Eroilor Sanitari nr. 16, sector 5, București
Tel.: 310.07.72;
Fax: 212.66.52

Z GROUP PHARMA SRL
Str. Panduri nr. 9, bl. 9, sc. 1, ap. 16
Focșani, Jud. Vrancea
Tel./Fax: 313.26.94

S.C. ZEN MED S.R.L.
Str. Cupolei nr. 2, bl. 105, sc. D, ap. 114, sector 6, București
Tel./Fax: 430.61.56

ZENTIVA INTERNATIONAL - Reprezentanța pentru România
Str. Doamna Oltea nr. 74, sector 2, București
Tel.: 212.03.11
Fax: 212.03.12

REFERENŢI ŞTIINŢIFICI

Farm. Adela AGRIŞTEANU
Dr. R. BALTAG
Chim. Ctin. BÂRLĂDEANU
Farm. C. BORŞ
Dr. Sorina BOTESCU
Farm. D. BUCUR
Dr. T. BUCUR
Dr. Roxana CÂLŢEA
Farm. Georgeta CÂMPEAN
Dr. D. CÂMPEAN
Dr. C. CHIRIŢA
Dr. Claudia CIOCAN
Dr. Cristina CONSTANTINESCU
Dr. Oana COSTAN
Dr. Marilena COVACI
Farm. Margareta CUCUREZAN
Dr. Anca DALEA
Dr. Violeta DIACONIŢĂ
Farm. Liliana DINU
Farm. Cristina FLOREA
Dr. Catrinel GĂLĂŢEANU
Dr. Norina GĂVAN
Dr. Em. GEORGESCU
Farm. G. GEORGESCU
Dr. Narcisa GEORGESCU
Dr. Ileana GRIGORESCU
Dr. Ruxandra HUREZEANU
As. Mariana IACUBOVSCHI
Dr.ing. Elena IONESCU
Farm. Cristina IVAN
Farm. L. KELEMEN
Dr. Odeta LOGIN
Dr. Madeline LUCIC
Farm. Marilena LUPOI
Farm. Carmen MACARIE
Dr. V. MARCOVSCHI
Dr. Adriana MARINESCU
Dr. Corina MARINESCU
Dr. Daniela MATIEŞANU
Farm. M. MORAIT
Dr. F. MURARU
Dr. A. NANU
Farm. Simona NAGHIU
Dr. Ioana NEGOIŢĂ
Dr. farm. Simona NEGREŞ
Dr. Carmela NEGULESCU
Dr. C. NEGULESCU
Dr. CARMEN OBROCEA
Dr. Carmen OPREA

Dr. Ana PĂRĂUAN
Dr. Elena POP
Dr. Georgeta POPESCU
Dr. Cornelia PREDA
Farm. Pr. Nicoleta RĂDUCANU
Farm. Iuliana RISTEA
Farm. Pr. Adriana RUSU
Farm. Monica RUSU
Dr. N. SAMSON
Dr. Raluca SCUTELNICU
Dr. B. SLĂBESCU
Farm. C. STANCIU
Dr. G. STĂNCIULESCU
Dr. D. STĂNCULEANU
Farm. Lia SUPURAN
Farm. Ozana ŞERBAN
Dr. Ruxandra ŞIPOS
Dr. Adina ŞTEFAN
Dr. Aurelia TALPOŞ
Farm. C. TAMAŞ
Ec. Radiana TARBĂ
Dr. Ioana TEODORESCU
Farm. Florisanda TIUTIU
Dr. Tamara TRICORACHE
Dr. D. UŢĂ

CANTACUZINO

INSTITUT NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU MICROBIOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE

produse imunologice de uz uman

VACCINURI

SERURI
TERAPEUTICE



PRODUSE
FITOTERAPEUTICE

REACTIVI DE
DIAGNOSTIC
"IN VIVO"

IMUNOMODULATORI

reactivi de diagnostic "in vitro"



MEDII DE CULTURA
PENTRU DIAGNOSTIC
BACTERIOLOGIC

MEDII PENTRU
CULTURI CELULARE

SERURI SI ANTIGENE
DE DIAGNOSTIC

laborator de analize medicale


PARAZITOLOGIE
BACTERIOLOGIE
IMUNOCHIMIE
IC
VIRUSOLOGIE
IMUNOLOGIE
HEMATOLOGIE
BIOCHIMIE

Splaiul Independentei 103, C.P. 1-525, 70100, sector 5 Bucureşti, România
Tel. 021 4113800 Fax 021 4115672, email: office@cantacuzino.ro, web: http://www.cantacuzino.ro

Format: 16/54×84. Coli de tipar: 62,5
Bun de tipar: 29.11.2004

Tiparul executat la Imprimeria „Oltenia“ – Craiova
Str. Dr. Nicolae Ionescu Siseşti, nr. 21
Comanda: 108

Medicamente fabricate de SINDAN

40

PRODUS	FORMA FARMACEUTICĂ	
ADRIBLASTINA RD (Doxorubicinum)*	liofilizat pentru soluție perfuzabilă	10, 50 mg
ANTIFOLAN (Methotrexatum)	liofilizat pentru soluție injectabilă	50 mg
	comprimate	2,5 mg
CARBOPLATIN SINDAN (Carboplatinum)	concentrat pentru soluție perfuzabilă	50, 150,450 mg
	liofilizat pentru soluție perfuzabilă	50, 150, 450 mg
CLANISEN (Chlorotrianisenum)	comprimate	24 mg
DALTRIZEN (Dacarbazinum)	liofilizat pentru soluție perfuzabilă	200 mg
DIAMALIN (Tretinoinum)	drajeuri	25 mg
ENDOXAN (Cyclophosphamidum)***	pulbere pentru soluție perfuzabilă	200, 500 mg, 1 g
EPISINDAN (Epirubicinum)	liofilizat pentru soluție injectabilă	10, 50 mg
FARMORUBICIN RD (Epirubicinum)*	liofilizat pentru soluție injectabilă	10, 50 mg
FLUOROSINDAN (Fluorouracilum)	soluție injectabilă	250 mg
FLUTAMIDA SINDAN (Flutamidum)	comprimate	250 mg
FOLINAT DE CALCIU (Calcii folinas)	comprimate	15 mg
MEGESIN (Megestrolum)	comprimate	40, 160 mg
NIPALKIN (Lomustinum)	capsule	20 mg
ROFERON A (Interferonum alpha)**	soluție injectabilă	3 Mil.U.I., 9 Mil.U.I.
ROGLUTEN (Aminogluthetimidum)	comprimate	250 mg
SINDAXEL (Paclitaxelum)	concentrat pentru soluție perfuzabilă	30, 100, 260 mg
SINDOVIN (Vincristinum)	liofilizat pentru soluție injectabilă	1 mg
SINDRONAT (Acidum Clodronicum)	capsule	400 mg
SINDROXOCIN (Doxorubicinum)	liofilizat pentru soluție perfuzabilă	10, 50 mg
SINFOSFAMIDA (Cyclophosphamidum)	liofilizat pentru soluție injectabilă	200 mg
SINPLATIN (Cisplatinum)	liofilizat pentru soluție perfuzabilă	10, 50 mg
SINTOPOZID (Etoposidum)	concentrat pentru soluție perfuzabilă	100 mg
TAMONEPRIN (Tamoxifenum)	comprimate	10 mg
TAXOTERE (Docetaxelum)****	concentrat/solvent pentru soluție perfuzabilă	20, 80 mg
ZAVEDOS (Idarubicinum)*	liofilizat pentru soluție injectabilă	5, 10 mg

în cooperare cu:
*   Pfizer
* *   Hoffmann LaRoche
*** Baxter Oncology
****Sanofi - Aventis

SINDAN

Bd. Ion Mihalache, nr. 11, 011171
București, România
Tel.: +40 21 312 7568, 312 7578, 312 7580
Fax: +40 21 312 0249, 312 7593
e-mail: sindan@sindan.ro
http://www.sindan.com, http://www.sindan.ro

Șos. Odăi, nr. 179 - 185, 013604
București, România
Tel.: +40 741 820 700 / 701 / 702 / 703 / 704
Fax: +40 741 820 721 / 722
e-mail: sindan@sindan.ro

GEROT

Convulex - ac. valproicum
Gerodorm - cinolazepamum
Neurotop - carbamazepinum
Neurotop retard - carbamazepinum retard
Petinimid - ethosuximidum
Oxsoralen - 8 methoxi-psoralenum
Tratul - diclofenacum-deanolum

www.gerot.ro

LANNACHER

Ferretab comp. - ferosii fumaras + ac. folicum
Sucralan - sucralfatum
Thrombo ASS - ac. acetylsalicilicum
Tradolan - tramadolum
Vendal retard - morphinum HCl
Neuromultivit - vitamina B_1, B_6, B_{12}

www.lannacher.ro

LANNACHER GEROT
Birou în România:
Splaiul Independenței Nr. 1, Bl. 16, Et. 2, Ap. 7, București
Tel: 021-335 15 70, 337 49 78, 337 49 79 Fax:021-335 15 55
E-mail: office@lannacher.ro

RISCUL ESTE FOARTE MARE

ARTERIOPATIE MANIFESTĂ
INFARCT MIOCARDIC
AVC ISCHEMIC
AVC ISCHEMIC
INFARCT MIOCARDIC
MOARTE VASCULARĂ

MIZA ESTE CHIAR VIAȚA!

Plavix®
Clopidogrel 75mg
păstrează cursul vieții

Grup
sanofi aventis
Sănătatea mai presus de orice
Str. Fabrica de Glucoză nr. 7, Park House, sector 1, București

654000
LEI 65.40

www.ed-medicala.ro
ed-medicala@fx.ro
ISBN 973-39-0533-X